



FONDO PIZZOFALCONI





B. B. B. B.  
XVI  
50

# ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE,

OU

PAR ORDRE DE MATIÈRES;

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES,  
DE SAVANS ET D'ARTISTES;

*Précédée d'un Vocabulaire universel, servant de Table pour tout  
l'Ouvrage, ornée des Portraits de MM. DIDEROT & D'ALEMBERT,  
premiers Éditeurs de l'Encyclopédie.*



646275

# ENCYCLOPÉDIE MÉTHODIQUE.

---

## BOTANIQUE,

PAR le citoyen LAMARCK, de l'Institut national de France ;

*CONTINUÉE par J. L. M. POIRET, Professeur d'Histoire naturelle , de  
plusieurs Sociétés savantes et littéraires.*

---

### TOME SIXIÈME.

---



A PARIS,

Chez H. AGASSE, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, n°. 18.

---

AN XII — 1804.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO



**QUADRANGULAIRE** (tige). *Quadrangularis caulis*. Les tiges portent ce nom lorsqu'elles ont quatre faces ou quatre angles, comme on l'observe dans le plus grand nombre des plantes qui composent la famille des labiacées, les marrubiacées, les fitchiacées, &c.

**QUADRETTE**. *Rhexia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, régulières, de la famille des mélastomées, qui a des rapports avec les *esbeckia* : il comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges se font quadrangulaires, les feuilles simples, sessiles ou pétiolées, la plupart opposées; les fleurs axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre divisions; quatre pétales insérés sur le calice; des anthères inclinées; une capsule à quatre loges, renfermée dans le calice, ventru à sa base.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, ventru à sa partie inférieure, partagé à son orifice en quatre découpures.

2°. Une corolle à quatre pétales ouverts, arrondis, insérés sur le calice.

3°. Huit étamines, dont les filamens sont filiformes, insérés sur le calice, presque aussi longs que la corolle, terminés par des anthères véritables, un peu arquées, linéaires, inclinées, obtuses.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, incliné, & terminé par un stigmate oblong, épais.

Le fruit est une capsule ovale, presque ronde, à quatre loges, à quatre valves, enveloppée par le calice ventru, contenant des semences fort petites, nombreuses, arrondies.

Observations. Nous renvoyons le lecteur aux observations qui ont été faites sur ce genre & sur celui des *melastoma*, à l'article MELASTOME.

#### ESPÈCES.

\* Feuilles sessiles.

1. QUADRETTE de Virginie. *Rhexia virginica*. Linn.

Botanique, Tome VI.

*Rhexia foliis sessilibus, lanceolatis, trinerviis, serrato-ciliatis; calicibus glanduloso-ciliatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 301. n°. 1.

*Rhexia foliis sessilibus, serratis; calicibus glabris*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 146. — Gronov. Virg. 41. — Miller. Dict. n°. 1. — Lam. Illustr. Genr. tab. 183. fig. 2.

*Alifanus vegetabilis carolinianus*. Pluk. Amalt. 8.

*Lyfnachio non poposa virginiana, tuberaria foliis hirsutis; flore tetrapetalo, rubello*. Pluk. Almag. 235. tab. 202. fig. 8.

*Rhexia (virginica), caule alato angulato, pilis rarioribus aulifero; foliis sessilibus, ovato-lanceolatis; de utroque latere distinctisque, ciliolato-serratis, hirsute sparsa, utrinque hispaulis*. Michaux. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 222.

A. *Rhexia (septemnervia), foliis acuminato-ovatis, pilosis, septemnerviis, margine subcaulicibus; caule tetragono, antheris rostratis*. Walther. Flor. carol. pag. 130.

Cette plante a des tiges glabres ou munies de quelques poils rares, quadrangulaires, presque simples; un peu membraneux sur leurs angles, &c qui s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds; garnies de feuilles opposées, sessiles, ovales, un peu lancéolées, distantes, marquées de trois nervures & plus, simples, parallèles, longitudinales, presque glabres à leurs deux faces, munies à leurs bords de petites dentelures courtes, inégales, scissacées ou en forme de cils.

Les fleurs sont disposées presque en cimes axillaires & terminales, portées sur un pédoncule commun, bifurqué vers son sommet, muni à ses divisions de petites bractées opposées; chaque fleur à peine pédiculée. Leur calice est hérissé de petits poils droits ou de cils glanduleux, quelquefois presque nu; la corolle est légèrement purpurine.

La plante A n'est qu'une variété, dont les tiges s'élèvent à quatre & cinq pieds; les feuilles sont plus grandes, marquées de cinq à sept nervures; cette variété se rencontre particulièrement dans les terrains inondés.

Cette plante croît dans la Virginie, la Caroline, &c. Elle m'a été communiquée par M. Roze, qui l'a recueillie dans la Caroline. x (V. f.)

2. QUADRETTE de Mariland. *Rhexia mariana*. Linn.

*Rhexia foliis sessilibus, lanceolatis, trinerviis, villosis-ciliatis; calicibus stellato-pilosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 301. n°. 2. — Gxrtm. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 143. tab. 112. fig. 6.

*Rhexia foliis ciliatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 147. n°. 2. — Miller. Dict. n°. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 183. fig. 1.

*Lysimachia non papposa, terra mariana, leptoneuros; flore tetrapetalo, rubello; folio & caule hirsute ferrugineis, hispida.* Pluken. Mamif. 123. tab. 428. fig. 1.

*Rhexia (matiana), caule rufescente, hirsutissimo; foliis hirsutis, basi subpetiolatis, angustatis, ovali-oblongis, vel lanceolatis, vel etiam linearibus; calice longe tubuloso, glabrescente.* Mich. Flor. boreal-amér. vol. 1. pag. 221.

« *Eadem, purpurea, foliis angulo-lanceolatis; floribus saturate purpureis.* Mich. l. c.

« *Eadem, rubella, foliis ovali-lanceolatis vel oblongis; floribus dilute rubellis.* Mich. l. c.

« *Eadem, exalbida, foliis linearibus, caule hirsutiore, floribus pallidis.* Mich. l. c.

*Rhexia (lanceolata), foliis lineari-lanceolatis, ciliatis; caule piloso, antheris rostratis, ensifolia urceolata.* Walther. Flor. catol. pag. 129.

Ses tiges sont grêles, droites, quadrangulaires, hautes d'un à deux pieds, touffantes, simples, hérissées de poils nombreux, roides, droites; garnies de feuilles opposées, simples, sessiles ou légèrement pétiolées, très-variées dans leur forme, lancéolées, ovales, oblongues ou linéaires, médiocrement velues à leurs deux faces, ciliées à leurs bords, marquées de trois nervures longitudinales, conniventes à leurs deux extrémités.

Les pédoncules sont axillaires ou terminaux, presque simples, supportant de deux à quatre ou cinq fleurs au plus. Leur calice est allongé, tubulé avant la maturité des fruits, presque glabre ou chargé de quelques poils écartés. La corolle est rougeâtre, à quatre pétales arrondis, ongiculés.

Dans la variété «, les fleurs sont purpurines, les feuilles étroites, lancéolées. La plante « a ses feuilles oblongues ou ovales-lancéolées; ses fleurs d'un rouge clair.

La variété γ est la plus remarquable par ses feuilles linéaires, ses tiges plus fortement velues, & ses fleurs blanchâtres. Waltherius la regarde comme une espèce distincte.

Toutes ces plantes croissent dans la Caroline, & y ont été recueillies par M. Bosc, qui m'en a communiqué des exemplaires. (V. f.)

### 3. QUADRETTE lancéolée. *Rhexia lanceolata.*

*Rhexia foliis oppositis, sessilibus, glabris, lineari-*

*lanceolatis, margine crenatis; floribus solitariis, axillaribus.* (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 183. fig. 3.

Ses tiges sont droites, glabres, à peine quadrangulaires, presque point rameuses, garnies de feuilles opposées, sessiles, très-glabres, linéaires, très-étroites, lancéolées, médiocrement aiguës, longues d'environ un pouce, crenelées à leurs bords, marquées de trois nervures, vertes à leurs deux faces, mais un peu plus pâles en dessous.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des tiges, dans l'aisselle des feuilles; elles sont solitaires, portées sur des pédoncules courts, filiformes. Leur calice est glabre, à cinq dents aiguës; la corolle composée de cinq pétales assez grands, ovales, oblongs, obtus, un peu dépassés par les anthères longues, pendantes, d'un beau jaune.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. (V. f. in herb. Lam.)

### 4. QUADRETTE à feuilles linéaires. *Rhexia linearifolia.*

*Rhexia foliis alternis, linearibus, oblongis, sessilibus; floribus luteis; caule cylindrico, subpubescente.* (N.)

Cette plante s'élève à la hauteur d'un à deux pieds; ses tiges sont cylindriques, point anguleuses, jaunâtres, légèrement pubescentes, garnies à des intervalles éloignés de feuilles alternes, sessiles, linéaires, très-étroites, obtus, longues d'environ deux pouces, sur deux lignes de large; la plupart marquées de trois nervures longitudinales, un peu fermes, pubescentes à leurs deux faces, entières à leurs bords.

Les fleurs sont, ou solitaires, ou placées deux ou trois à l'extrémité d'un pédoncule commun, axillaires à la partie supérieure des tiges; elles sont un peu inclinées sur leur pédoncule propre. Le calice est presque glabre, un peu tubulé, à quatre divisions ovales, obtuses. La corolle est jaune.

Cette plante a été recueillie à la Caroline par M. Bosc, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

### 5. QUADRETTE de Jusseu. *Rhexia jussoides.* Linn. f.

*Rhexia foliis alternis, costatis, margine scabris.* Linn. f. Suppl. pag. 215. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 302. n°. 6.

C'est un arbrisseau haut d'environ quatre pieds, dont les tiges, les pédoncules & les fruits sont pubescents; les feuilles alternes, presque sessiles, rapprochées, lancéolées, à côtes & à nervures saillantes, que de très-fines dentelures rendent

scabres à leurs bords. Les fleurs sont jaunâtres, solitaires, axillaires, portées sur des pédoncules à peine de la longueur des feuilles.

Le calice est divisé à sa partie supérieure en quatre découpures ouvertes, lancéolées, aiguës. La corolle est composée de quatre pétales presque ovales, sessiles, une fois plus longs que le calice : elle renferme huit étamines, dont les filaments, plus courts que la corolle, se terminent par des anthères linéaires, inclinées, plus longues que les filaments. Le style, de la longueur des étamines, est surmonté d'un stigmate verruqueux. Le fruit est une capsule presque tétragone, de la longueur du calice, divisé en quatre loges qui renferment des semences nombreuses & fort petites.

Cette plante se trouve à Surinam. *h* (*Descript. ex Linn. f.*)

#### 6. QUADRETTE alifane. *Rhexia alifana*. Walt.

*Rhexia foliis subovatis caule erecto, sublevibus; calicibus cordatis glanduloso-pilosis.* Walp. Flor. carol. pag. 130.

Vulgairement oseille de cerf.

*C. Rhexia* (glabella), caule cylindraceo, glabro; foliis sessilibus, erectis, lanceolatis, levibus, glabris, integris; floribus brachiato-subpaniculatis; calicibus brevissimis hirsutis, glutinosi. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 222.

Ses tiges sont glabres, presque cylindriques, droites, simples, quelquefois un peu pubescentes, garnies de feuilles opposées, sessiles, étroites, lancéolées, aiguës, relevées, lisses, glabres à leurs deux faces, entières ou finement & médiocrement denticulées à leur sommet.

Les fleurs sont presque terminales, disposées en une sorte de panicule peu garnie. Le pédoncule commun se divise à son sommet en deux rameaux opposés & écartés, terminés par une ou deux fleurs pédicelées, & souvent une solitaire au point de la bifurcation. Le calice est garni de quelques poils courts, glutineux & glanduleux à leur sommet. La corolle est assez grande, d'un pourpre clair ; les anthères grosses & jaunâtres.

La plante se différencie très-peu de celle-ci : les tiges & les feuilles sont très glabres, très entières ; les fleurs un peu plus petites.

On trouve cette plante dans la Caroline. M. Bosc m'en a communiqué des exemplaires qu'il y a recueillis. (*V. f.*) Ses feuilles ont une saveur acide, assez agréable, approchant de celle de l'oseille.

#### 7. QUADRETTE glutineuse. *Rhexia glutinosa*. Linn. f.

*Rhexia foliis oppositis, trinerviis, levibus; floribus*

*chrysoidis.* Linn. f. Suppl. pag. 216. — Mufil. Amer. vol. 1. tab. 6.

C'est un petit arbrisseau rameux, assez semblable à un *melastoma*, dont les rameaux sont articulés, akernés, canaliculés ; les feuilles opposées, pétiolées, très-rapprochées, lisses, elliptiques, très-entières, à trois nervures, longues d'un pouce.

Les fleurs sont presque disposées en thyrses, axillaires, supportées par des pédoncules à peine plus longs que les feuilles. Le calice est campanulé, à quatre divisions ouvertes ; la capsule inférieure plus courte que le calice, à quatre valves, à quatre loges ; obtuse, & renfermant un grand nombre de semences. Les calices & la partie supérieure des rameaux sont glutineux.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. *h* (*Descript. ex Linn. f.*)

#### 8. QUADRETTE trichotome. *Rhexia trichotoma*. Vahl.

*Rhexia floribus solitariis, axillis lobis terminalibusque; foliis sessilibus, oppositis, lanceolatis, hirsutis.* Vahl. Symbol. 2. pag. 45.

*Rhexia foliis sessilibus, ovato lanceolatis, trinerviis, villosis, ciliatis; pilis calicinis sessilibus, glandulosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 301. n°. 3.

*Rhexia caule inferius trichotomo, apicibus dichotomis, filiformibus; floribus solitariis, subsessilibus.* Roettb. Plant. surin. pag. 9. tab. 5.

Ses tiges sont frutescentes, divisées en rameaux quadrangulaires, hérissés sur leurs angles ; les inférieurs trichotomes ou à trois divisions ; les supérieurs dichotomes, garnis de feuilles sessiles, opposées, lancéolées, velues, très-entières, longues d'un pouce ; les fleurs, situées dans l'aisselle des feuilles, sont solitaires, presque terminales, soutenues par des pédoncules courts. La corolle est divisée en quatre découpures ovales, ciliées à leurs bords ; elle renferme huit étamines.

Cette plante se trouve à Surinam. *h*

#### 9. QUADRETTE à fleurs jaunes. *Rhexia lutea*. Walp.

*Rhexia hispida, foliis lanceolatis, subundulatis, trinerviis; antheris nudis.* Walp. Flor. carol. pag. 130.

*Rhexia caule quadrangulo, hirsuto; foliis variis longiusculis hirsutis; inferioribus cuneato-oblongis, obtusis; superioribus lanceolatis; floribus luteis, antheris brevissimis.* Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 222.

Ses tiges sont quadrangulaires, hérissées de poils  
A ij



roides, garnies de feuilles médiocrement velues, marquées de trois nervures; les inférieures oblongues, obtuses, rétrécies en forme de coin à leur base; les supérieures lancéolées, un peu ondulées à leurs bords. Les fleurs sont terminales & axillaires, la corolle jaune, les anthères courtes.

Cette plante croît dans la Géorgie & la Floride.

10. QUADRETTE ciliée. *Rhexia ciliosa*. Mich.

*Rhexia ovale subquadrangulata, glabra; foliis parvis, subpetiolatis, ovalibus, juncius glaucis, supra rariter hispaulis, margine promissis & apiculis ciliatis; floribus paucioribus, involucriatis; antheris breviusculis*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. p. 222.

An *Rhexia* (petiolata), foliis subovatis, trinerviis, ciliatis, petiolatis; capsulis globosis, antheris nudis? Walth. Flot. carol. pag. 130.

Cette espèce se distingue à la disposition de ses fleurs terminales, très-peu nombreuses, & enveloppées par les feuilles supérieures.

Les tiges sont glabres, droites, simples, à peine quadrangulaires, légèrement sillonnées sur leurs angles, garnies de feuilles opposées, ovales, à peine pétiolées, aiguës à leur sommet, glabres à leur face supérieure, munies de quelques poils rares en dessous, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont d'un pourpre violet, médiocrement pédonculées, axillaires, terminales; les anthères plus courtes que dans les autres espèces.

Cette espèce paroît être la même que la *rhexia petiolata* de Waltherius, ou du moins une variété dont les feuilles sont bien moins pétiolées. Elle croît dans la Caroline. (V. f. Comm. Bosc.)

\* \* Feuilles pétiolées.

11. QUADRETTE aquatique. *Rhexia aquatica*. Swartz.

*Rhexia foliis oppositis, cordatis, crenulatis, hirsutiusculis; paniculis terminalibus, trichotomis; ramulis filiformibus, patentissimis*. Swartz. Flot. Ind. occid. vol. 2. pag. 690.

*Melasma* (aquatica), foliis quinquenerviis, cordatis, acutis, crenulatis, superne hirtis, subius levibus; paniculis terminalibus, trichotomis, diffusis. Swartz. Prodr. 37.

*Melasma* (aquatica), foliis cordatis, crenatis, supra hirsutis, ferrugineis, subius levibus; floribus albis, paniculatis. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 430. tab. 169.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds; elles sont quadrangulaires, divisées vers leur partie supérieure en rameaux grêles, hérissés de poils roussâtres, garnis de feuilles opposées, ovales, en cœur à leur base, crénelées à leurs bords,

lisses en dessous, couvertes en dessus d'un duvet court & roussâtre, marquées de cinq à sept nervures longitudinales, portées sur des pétioles courts.

Les fleurs sont terminales, disposées en panicules diffusées, trichotomes. Leur calice, globuleux à sa base, se divise en cinq découpures aiguës. La corolle est composée de cinq pétales, dont un plus grand que les autres: ils sont blancs, un peu concaves, alternés avec les divisions du calice, & renferment dix étamines, dont les filaments, insérés sur un disque charnu & rougeâtre au fond du calice, sont terminés par des anthères longues & arquées. La capsule est ovale, divisée en cinq loges remplies de semences nombreuses & fort petites.

Cette plante croît dans l'Amérique, à Cayenne, sur le bord des ruisseaux. (Description, ex Aublet.)

J'ai reçu de M. Leduc une plante qu'il avoit recueillie à Porto-Ricco, & qui ne m'a paru différer de celle d'Aublet que par les tiges & les feuilles glabres, cendrées en dessous, vertes en dessus. Le calice est globuleux, couvert de tubercules, divisé en quatre ou cinq découpures subulées.

12. QUADRETTE à larges feuilles. *Rhexia latifolia*.

*Rhexia foliis petiolatis, subrotundis, acutis, quinquenerviis, hirsutis; pedunculis terminalibus, unifloris*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 305. n°. 14.

*Rhexia folio amplo, subrotundo, villosa; flore violaceo*. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 336. tab. 129. fig. 1.

Ses tiges sont ligneuses, & se divisent en rameaux quadrangulaires, opposés, noueux, grêles, velus, étendus sur la terre, membraneux à leurs angles, & garnis de feuilles pétiolées, opposées, presque rondes, larges, velues à leurs deux faces, denticulées à leurs bords.

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux, sur des pédoncules simples, axillaires, uniflores. Leur calice est velu, partagé en quatre découpures oblongues, muni à sa base de deux petites bractées. La corolle est de couleur violette, composée de quatre pétales concaves, arrondis, attachés au calice par un onglet; elle contient huit étamines: le stigmate est arrondi en tête, creux dans son milieu; la capsule divisée en quatre loges, couronnée par les découpures du calice; elle renferme des semences petites & nombreuses.

Cette plante croît à Cayenne, dans les terrains sablonneux & inondés. (V.)

13. QUADRETTE à longues feuilles. *Rhexia longifolia*. Vahl.

*Rhexia pilosa*, *decandra*; *foliis lanceolatis*, *integerrimis*, *quinqnerviis*; *pedunculis axillaribus terminalibusque*, *dichotomis*; *foliis brevioribus*. Vahl. Eglog. 1. pag. 39. tab. 15.

Ses tiges sont herbacées, anguleuses, munies de poils longs & couchés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, larges d'un pouce, longues de trois à quatre pouces, très-entières, lanceolées, aiguës, couvertes à leurs deux faces de poils couchés, plus pâles en dessous, marquées de trois nervures principales, dont les deux latérales se bifurquent presque dès leur base : leur pétiole est court, pileux.

Les pédoncules sont axillaires, presque terminaux, beaucoup plus courts que les feuilles, deux fois dichotomes, terminés par des fleurs pédiculées, dont le calice est oblong, à cinq découpures subulées ; la corolle composée de cinq pétales oblongs, ciliés ; dix étamines plus longues que la corolle ; une capsule presque globuleuse, à cinq valves, plus courte que le calice.

On rencontre cette plante dans l'Amérique méridionale.

#### 14. QUADRETTE uniflore. *Rhexia uniflora*. Vahl.

*Rhexia foliis petiolatis*, *ovatis*, *seratis*; *floribus axillaribus*, *solitariis*, *decandris*; *caule dichotomo*. Vahl. Symbol. 2. pag. 48.

Ses tiges sont herbacées, tétragones, munies sur chacun de leurs angles de quatre ailes décurren-tes, visqueuses, chargées de poils glanduleux : elles se divisent en rameaux dichotomes, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, à trois nervures peu saillantes, longues de trois à quatre lignes, dentées, ciliées & glanduleuses à leurs bords ; les feuilles supérieures plus étroites & presque lanceolées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées à la partie supérieure des tiges. Le calice est pileux ; la corolle composée de quatre pétales lanceolés ; les étamines au nombre de dix ; la capsule à deux lobes, de la grosseur d'une semence de co-riandre.

Cette plante croît à Cayenne. (*Descript. ex Vahl.*)

#### 15. QUADRETTE acisanthère. *Rhexia acisanthera*. Linn.

*Rhexia foliis petiolatis*, *ellipticis*, *obtusis*, *crenatis*; *floribus axillaribus*, *solitariis*, *pedunculatis*, *alternis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 303.

*Rhexia floribus alternis*, *axillaribus*, *pedunculatis*, *quinquefidis*. Linn. Amoen. acad. vol. 5. pag. 396.

*Acisanthera erecta*, *ramosa*; *ramulis quadratis*; *foliis trinerviis*, *ovatis*, *crenatis*, *oppositis*; *floribus singularibus*. Brown. Jam. 217. tab. 22. fig. 1.

C'est un arbusteau dont les tiges sont ligneuses, divisées en rameaux effilés, alternes, à quatre angles tranchans, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, oblongues, nues, finement denticulées. Les fleurs sont axillaires, solitaires, supportées par des pédoncules plus courts que la corolle.

Le calice est monophylle, ventru, à cinq dents profondes ; la corolle, à cinq pétales ovales, ongucules ; les étamines sont au nombre de dix, inclinées, plus courtes que la corolle ; le style court, le stigmate aigu ; la capsule, à deux loges, un peu arrondie, contenant des semences presque rondes.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les plantations. *H*

#### 16. QUADRETTE variable. *Rhexia inconstans*. Willd.

*Rhexia foliis ovatis*, *hispidis*; *setis adpressis*, *subtus incanis*, *trinerviis*; *pedunculis terminalibus*, *subnullis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 304. n°. 13. — Vahl. Eglog. 1. pag. 37.

*Oreochia* (ornata), *foliis petiolatis*, *floribus terminalibus*, *umbellulatis*, *decandris*. Swartz. Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 647.

*Melastoma* (ornata), *foliis trinerviis*, *integris*, *rigidis*, *suprà hispidis*; *setis adpressis*, *subtus incanis*; *umbellis quadrifidis*, *terminalibus*, *rareis*; *cap-sulis hispidis*. Swartz. Prodr. 69.

C'est un arbusteau agréable, dont les tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds, divisées en rameaux tétragones, opposés, hérissés de poils couchés, garnis de feuilles petites, opposées, ovales, acuminées, roides, membraneuses, blanchâtres en dessous, chargées de poils couchés.

Les fleurs sont terminales, assez grandes, presque disposées en ombelles, au nombre de quatre environ à chaque ombelle, soutenues par des pédoncules partiels, courts. Leur calice est divisé en quatre ou cinq découpures persistantes, courtes, droites, hispides, linéaires, aiguës. La corolle est purpurine, composée de quatre ou cinq pétales ovets, arrondis, presque en cœur, médiocrement ongucules, un peu ciliés à leurs bords : elle renferme huit à dix étamines. L'ovaire est velu, le style incliné, le stigmate obtus ; la capsule ovale, obtuse, couronnée par les découpures du calice, à cinq loges & à cinq valves, contenant des semences fort petites, un peu comprimées, de couleur brune.

Cette plante croît à la Guadeloupe & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale, ainsi qu'au Mont-Serrat, sur le sommet de la Solitaire, parmi la mousse qui recouvre la lave. *H*

17. QUADRETTE glomérulée. *Rhexia glomerata*. Roettb.

*Rhexia foliis petiolatis, ovatis, integerrimis, trinerviis, villosis; floribus terminalibus, glomeratis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 304. n°. 10.

*Rhexia caule ramosissimo, hirsuto; floribus glomeratis, pedunculatis; calicibus hirsutissimis.* Roettb. Plant. furin. pag. 8. tab. 4.

Cette espèce a des tiges velues, très-rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, très-entières à leurs bords, veines à leurs deux faces, marquées de trois nervures longitudinales. Les fleurs sont glomérulées à l'extrémité des rameaux, pédonculées, très-velues sur leurs calices.

Cette plante croît à Sutina, dans les prairies basses.

18. QUADRETTE courbée. *Rhexia recurva*.

*Rhexia foliis petiolatis, ovatis, minimis; caule quadrangulari-angulato, apice recurvo; floribus terminalibus, subsolitariis.* (N.)

C'est une petite plante dont les tiges sont hautes de six à huit pouces, quadrangulaires, un peu membracées sur leurs angles, grêles, d'un brun rougeâtre, pubescentes, articulées, nues à leur partie inférieure, recourbées & rameuses supérieurement; les rameaux alternes, velus, étalés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, petites, ovales, finement crenelées à leurs bords, un peu blanchâtres en dessous, légèrement pubescentes.

Les fleurs sont petites, terminales & presque solitaires à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules courts, simples, filiformes, velus; les calices divisés à leur orifice en cinq dents aiguës; les étamines saillantes, à longues anthères vibratiles.

Cette plante a été recueillie à Cayenne par M. Leblond. (*V. f. in herb. Lam.*)

QUADRIE hétérophylle. *Quadria heterophylla*. Ruiz & Pav. (*Voy. Lamarck*, Dict. vol. 2. pag. 712, article GEXIN du Chili.)

En conservant à ce genre de plantes le nom de *gewina arellana*, sous lequel il a été décrit dans ce Dictionnaire, nous nous bornerons à présenter ici quelques nouveaux détails, ayant eu occasion de voir cette plante dans l'herbier de M. Jussieu, qui d'ailleurs a bien voulu nous communiquer quelques observations sur ce genre, qui appartient à la famille des protées, & se rapproche des bractéum.

Sa corolle est divisée en quatre découpures linéaires, obtuses, presque spatulées, tétrécues en

dedans, pubescentes, concaves à leur sommet. Les anthères, au nombre de quatre, presque sessiles, ovales, sont placées dans la cavité supérieure de chaque pétale; l'ovaire ovale, formé d'un style velu, épais, cylindrique, terminé par un stigmate charnu. Le fruit est une capsule sphérique, coriace, contenant une amande d'une saveur douce.

Cette plante se trouve dans Feuillée, sous le nom de :

*Nesú subrotundo, fraxini folio.* Feuill. vol. 3. pag. 46. tab. 33.

*Quadria (heterophylla), foliis pinnatis, bipinnatisque; racemis simplicibus, pedunculatis bifloris.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 63. 99. A.

Les Péruviens, au rapport de Ruiz & Pavon, recueillent les fruits de cette plante, les laissent pendant quelques jours exposés au soleil, & lorsqu'ils sont desséchés, ils les vendent sur les marchés assez chèrement. Ces fruits ont une saveur très-agréable, fort douce; & les enveloppes de sucre. On en obtient de l'huile par expression. Leur écorce est astringente. Le bois est dur & flexible; il est employé pour la fabrique de plusieurs ustensiles de ménage.

Cet arbre croît en assez grande quantité dans les forêts & au pied des collines de la Concepcion, au Chili, au Pérou. (*V. f. in herb. Jussieu*)

QUADRICAPSULAIRE (fruit). *Quadricapsularis fructus*. Quand les fruits sont formés de quatre capsules rapprochées, conniventes ou souvent réunies par leur base, ils prennent une dénomination relative au nombre des capsules qui les composent. Ils sont quadricapsulaires dans le *rhodiola*, &c.

QUADRILOCULAIRE (capsule). *Quadriocularis capsula*. La capsule, d'après le nombre de ses cavités ou de ses loges, se nomme quadriloculaire lorsqu'elle est divisée intérieurement en quatre loges, comme dans l'*evonimus*, le *vaccinium*, &c.

QUAKITE. *Bladhia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, qui a beaucoup de rapports avec la famille des apocynées, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs réunies en petit nombre sur des pédoncules axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle en roue, partagée en cinq; cinq étamines; une baie supérieure, contenant une seule semence tubulée.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, très-court, persistant, partagé en cinq découpures ouvertes.

2°. Une *corolle* monopétale, en roue, divisée en cinq coupures ouvertes, ovales, obtuses.

3°. Cinq *étamines*, dont les filaments sont très-courts, terminés par des anthères en cœur, aiguës, conniventes, en cône, plus courtes que la corolle.

4°. Un *ovaire* supérieur, surmonté d'un style filiforme, plus long que la corolle, terminé par un stigmate simple, aigu.

Le fruit consiste en une baie globuleuse, en forme de pois, nuoncée par le style persistant, & ne contenant qu'une semence globuleuse, enveloppée par une membrane particulaire.

## E S P È C E S.

1. QUAKITE du Japon. *Bladhia japonica*. Thunb.

*Bladhia foliis aetatis, serratis, glabris; caule basi decumbente.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1122. n°. 1.

*Bladhia foliis ovatis, serratis, glabris.* Lamarck, Illustr. Gener. vol. 2. pag. 102. n°. 2727. tab. 133. fig. 1.

*Bladhia foliis serratis, glabris.* Thunb. Flor. japon. pag. 95. tab. 18.

*Bladhia japonica.* Hornstedt, Dissert. Nov. Plant. Gen. p. 1. pag. 67.

*Sankits, vulgò jamma-tadsi-banna.* Kämpf. Amoen. exot. Fascic. 5. pag. 775.

C'est un petit arbrisseau dont les racines sont rampantes & fibreuses; les tiges flexueuses, couchées à leur partie inférieure, à peine rameuses, hautes d'environ un pied, garnies vers leur partie supérieure de feuilles opposées, très-rapprochées, pétiolées, ovales, aiguës, glabres, dentées en scie à leurs bords, ouvertes, longues d'un pouce & plus, supportées par des pétioles courts, longs d'environ une ligne.

Les fleurs sont axillaires, solitaires ou disposées en très-petites grappes à l'extrémité d'un pédoncule glabre, recourbé. La corolle est blanche, odorante, petite, en roue, à cinq divisions ovales, aiguës. Les pédoncules propres un peu tougeâtres.

Cette plante croît au Japon, sur les montagnes, parmi les broussailles. (J. Descript. ex Thunb.)

2. QUAKITE velue. *Bladhia villosa*. Thunb.

*Bladhia foliis ovatis, serratis, villosis.* Lamarck, Illustr. Gener. vol. 1. pag. 102. n°. 2528. tab. 133. fig. 2.

*Bladhia foliis serratis, villosis.* Thunb. Flor. japon. pag. 96. tab. 19.

Petite plante, haute de trois ou quatre pouces, dont les tiges sont simples, droites, un peu courbées à leur partie inférieure, filiformes, tomenteuses, garnies de feuilles opposées, distantes, pétiolées, ovales, aiguës, lâchement dentées en scie à leurs bords, longues d'environ un demi-pouce, scabres, velues à leurs deux faces; leurs pétioles d'un tiers plus courtes que les feuilles. Les fleurs sont latérales, longuement pédonculées; les pédoncules, filiformes, tomenteux, ne supportant qu'une, deux ou trois fleurs.

Cette plante croît au Japon, où elle porte le nom de *jamma-tadsi-banna*. (J. Descript. ex Thunb.)

3. QUAKITE cîrpie. *Bladhia crispa*. Thunb.

*Bladhia foliis oblongis, crispis, glabris.* Thunb. Flor. japon. pag. 97. — Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 102. n°. 2729.

*Kyakits, vulgò sauno-tadsi-banna.* Kämpf. Amoen. exot. Fascic. 5. pag. 776. — Idem. Reliq. tab. 7.

Ses tiges sont simples, glabres, droites, cylindriques, hautes de six à sept pouces, garnies de feuilles pétiolées, alternes, glabres, oblongues, obtuses ou rétrécies à leur sommet, finement crépues à leurs bords, nerveuses, plus pâles en dessous, droites; les supérieures longues de cinq à six pouces, supportées par des pétioles longs à peine d'un demi-pouce. Les fleurs sont latérales & paniculées; les fruits consistent en une petite baie rouge, de la grosseur d'un pois.

On trouve cette plante au Japon, dans l'île Niphon. (J. Descript. ex Thunb.)

4. QUAKITE glabre. *Bladhia glabra*. Thunb.

*Bladhia foliis oppositis, serratis, glabris; caule erecto.* Ait. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 331.

*Bladhia foliis serratis, glabris, levibus.* Thunb. Flor. japon. pag. 350. n°. 5.

Ses tiges sont basses, simples, frutescentes, articulées, garnies, vers leur partie supérieure, de feuilles opposées, agrégées, médiocrement pétiolées, lisses, glabres, ovales, acuminées, dentées en scie à leurs bords, au nombre de quatre environ, longues d'un pouce & demi. Les fruits sont de petites baies rouges, de la grosseur d'un pois.

Cette espèce croît au Japon, où elle porte le nom de *uigeki*. (J. Descript. ex Thunb.)

**QUALIER.** *Qualca.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, dont la famille n'est pas encore bien déterminée, qui paroit le rapprocher de celle des *guttiers* : il ressemble des arbres exotiques à l'Europe, dont les rameaux font opposés, ainsi que les feuilles, & les fleurs disposées en panicules terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice irrégulier, partagé en quatre découpures; deux pétales inégaux; le supérieur éperonné à sa base; l'inférieur plus grand & incliné; un fruit globuleux, polysperme.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice profondément divisé en quatre découpures inégales, ovales, concaves, coriaces; les deux inférieures plus grandes.

2°. Une corolle composée de deux pétales inégaux, attachés au calice; le supérieur relevé, arrondi, échancré, terminé à sa base par un éperon court, obtus, saillant entre les deux découpures supérieures du calice; l'inférieur plus grand & penché.

3°. Une étamine, dont le filament, court, montant, est opposé au pétale inférieur & s'insère sous l'ovaire, terminé par une anthère oblongue, recourbée, partagée par un filon.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté d'un style filiforme, ascendant, de la longueur de l'étamine, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une baie à une seule loge, contenant des semences nombreuses, éparpillées dans la pulpe.

#### ESPÈCES.

1. **QUALIER à fleurs rouges.** *Qualca rosea.* Aublet.

*Qualca floribus roseis; petalo infimo, integro.* Lam. illustr. Gen. vol. 1. pag. 11. n°. 30. tab. 4.

*Qualca floribus amplis, carneis.* Aublet. Guian. vol. 1. pag. 1. tab. 1.

*Qualca petalo infiori, obtuso; foliis acuminatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 18. n°. 1.

C'est un grand arbre qui s'élève à la hauteur de soixante pieds & plus, sur deux pieds de diamètre, dont l'écorce est ridée, le bois rougeâtre & compacte : il pousse des branches étalées en tout sens, horizontales, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles opposées, en croix, pétioles ovales, lancéolés, acuminés, verdâtres, fermes, lisses, très-entières, munies à leur base de deux stipules caduques.

Les fleurs sont disposées en une panicule de médiocre grandeur, à l'extrémité des rameaux, dont les ramifications sont opposées & en croix, garnies à leur base de deux petites bractées échailées & caduques. Le calice est d'une seule pièce, à quatre découpures inégales, larges, profondes, concaves, membranées, coriaces & arrondies. La corolle est composée de deux pétales; un supérieur, relevé, échancré, muni à sa base d'un petit cornet creux, en forme d'éperon, blanc en dehors, couleur de rose en dedans; le pétale inférieur, entier à son sommet, incliné & très-grand, d'abord de couleur rougeâtre, devient blanc vers son ongle; & jaune dans le reste. Le filament est courbé en forme de croc; l'anthère jaune, à deux lobes; l'ovaire velu, le style recourbé vers son sommet.

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane, le long des bords de la rivière Sinemari : ses fleurs paroissent vers l'automne; elles répandent au loin une odeur très-agréable. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

2. **QUALIER à fleurs bleues.** *Qualca caerulea.* Aublet.

*Qualca floribus intus subcaeruleis; petalo infimo, emarginato.* Lam. illustr. Gen. vol. 1. pag. 11. n°. 31.

*Qualca floribus parvis.* Aublet. Guian. vol. 1. pag. 7. tab. 2.

*Qualca petalis emarginatis, foliis acutis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 18. n°. 2.

Cet arbre, un peu plus grand que le précédent, s'élève à quatre-vingt pieds, sur trois pieds de diamètre : son bois est compacte, roussâtre, ses branches étalées, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles pétioles, opposées, courtes, ovales, entières, terminées par une pointe moufle, luisantes, verdâtres, dont le pétiole est accompagné de deux stipules caduques.

Les fleurs sont terminales, disposées en panicules amples, à rameaux opposés, quelquefois alternes, garnis de bractées caduques. Le calice est de couleur cendrée. La corolle est bleue en dedans, cendrée en dehors, sur le pétale supérieur, l'inférieur, également de couleur bleue, est jaune, & tacheté de noir vers son ongle, échancré à son sommet. L'ovaire est arrondi & velu; les fleurs très-odorantes.

Cet arbre se rencontre dans les grandes forêts de la Guiane, sur les bords de la rivière de Sinemari. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

**QUAMOCLIT.** *Ipomoea.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des *lières*, qui a de grands rapports avec

avec les *convolvulus* : il comprend des herbes exotiques à l'Europe, la plupart volubiles & laiteuses, à feuilles simples, digitées ou ailées, dont les fleurs sont axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle infundibuliforme ou campanulée ; un stigmate capité & globuleux ; une capsule à plusieurs loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice oblong, fort petit, persistant.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme ou campanulée, dont le limbe est plissé, ouvert, à cinq lobes souvent peu marqués.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont subulés, presque de la longueur de la corolle, attachés à la base, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style filiforme, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate en tête, souvent à trois lobes peu marqués.

Le fruit est une capsule arrondie, à trois loges, contenant des semences presque ovales.

Observations. Ce genre n'est, selon moi, qu'une division forcée de celui des *liserans*, déjà très-nombreux en espèces ; & comme, par leur réunion, ils forment un genre assez naturel, il est résulté de leur séparation, que les caractères dont on s'est servi pour les distinguer, deviennent très-souvent communs aux deux genres, & en font disparaître les limites.

Linné donne pour caractère aux *ipomaea* une corolle infundibuliforme, un stigmate en tête, une capsule à trois loges, tandis que les *liserans*, d'après ce même auteur, ont une corolle campanulée, un stigmate à deux divisions linéaires, une capsule à deux ou trois loges.

Il n'existeroit nulle difficulté entre la distinction de ces deux genres si chacune de leurs espèces réunissoit ces trois caractères ; mais il arrive qu'un assez grand nombre appartiennent aux *liserans* par leur corolle, aux *ipomaea* par leur stigmate, & vice versa, & qu'en s'arrêtant à ces deux premiers caractères, il est en suite des *liserans* dont les capsules sont à trois loges, & des *ipomaea* où elles n'en ont que deux.

Il faut donc nécessairement renoncer à la réunion de ces trois caractères, & s'en tenir à un seul : il faut choisir entre la corolle, le stigmate & les divisions de la capsule. J'aurois volontiers choisi exclusivement la forme de la corolle, *injun-*

Botanique. Tome VI.

*biduliforme* ou *campaniforme*, quoique dans quelques espèces elle tienne presque le milieu entre ces deux formes ; mais les *liserans*, déjà traités dans ce Dictionnaire, d'après les divisions du stigmate & le nombre de loges de la capsule, ont déterminé mon opinion.

Le stigmate, à deux divisions linéaires dans les uns, en tête & à deux ou trois lobes dans les autres, présente des caractères plus faciles à saisir que solides. En effet, quelle différence y a-t-il réellement entre un stigmate bifide & un en tête, à deux lobes ? Aucune autre, sinon que les divisions sont plus longues dans les uns, plus courtes dans les autres. Lorsque le stigmate est à trois divisions, il annonce assez ordinairement une capsule à trois loges ; mais il est des espèces dans lesquelles le stigmate est simple, capité, ou, si l'on veut, dont les divisions ne sont pas apparentes, & dont néanmoins la capsule est à deux ou trois loges : d'où il résulte que la considération du stigmate est très-foible. Il ne reste donc que le nombre des loges de la capsule, foible distinction qui est soumise elle-même à des variations, à des avortemens, surtout dans les espèces dont les semences sont grosses ou plus nombreuses.

Il eût donc mieux valu réunir ces deux genres, y établir des divisions & sous-divisions : les premières, appuyées sur la corolle monopétale ou infundibuliforme ; les secondes, sur le stigmate bifide ou capité, &c. & enfin sur le nombre des loges de la capsule.

La difficulté de distinguer exactement toutes les parties de la fructification dans les plantes en herbier, ne nous a pas permis de prononcer affirmativement sur plusieurs espèces que nous y avons observées, & dont nous n'avons pu voir ni les divisions du stigmate, ni celles de la capsule. Nous avons cru, d'un autre côté, devoir rappeler dans ce genre quelques autres espèces déjà mentionnées à l'article *Liserans* : il est difficile, dans des genres aussi nombreux en espèces, de donner un travail parfait.

#### ESPÈCES.

\* Feuilles ailées, digitées ou palmées.

1. QUAMOCLIT empenné. *Ipomaea quamoclit*. Linn.

*Ipomaea foliis pinnatis ; pinnis tenuissimis ; pedunculis toxis, subbipartitis ; corollis infundibuliformibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 463. tab. 104. fig. 1.

*Convolvulus pennatus*. Desfroux. Diction. vol. 3. pag. 567. n°. 107.

Nous ne mentionnons ici cette espèce que pour prévenir le lecteur que déjà elle a été décrite

B

parmi les *Lisérans* (voyez dans cet ouvrage l'article cité plus haut), & qu'elle doit y rester si son stigmate n'a que deux lobes, & ses capsules deux loges; caractères dont nous n'avons pas pu nous assurer, & qui doivent constituer la différence de ces deux genres, d'après les principes présentés dans ce Dictionnaire. (Voyez l'article *Lisérans* & les observations ci-dessus, à la suite de l'exposition des caractères du genre *quamoclit*.)

Nous ajoutons ici les deux espèces suivantes, citées d'après Cavanilles, quoiqu'elles paroissent appartenir aux *Lisérans*, d'après les caractères assignés à ce dernier genre, dans cet ouvrage.

2. QUAMOCILIT hérissé. *Ipomaea muricata*. Cavan.

*Ipomaea floribus axillaribus, foliariis; foliis quinatis, subsessilibus; calicibus muricatis*. Cavan. Icon. vol. 5. pag. 52. n°. 543. tab. 478. fig. 2.

Cette espèce a des rapports avec l'*Ipomaea quamoclit*. Ses tiges sont filiformes, longues d'un pied & plus, à rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, linéaires, très-étroites, médiocrement pétiolées. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules munis de deux bractées en écailles, & situées sous le calice: celui-ci est à cinq folioles glabres, ovales, acuminées. La corolle, d'un rouge violet, infundibuliforme, longue d'un pouce; le limbe à cinq découpures ovales, finement aiguës à leur sommet; les filamens velus à leur base; le stigmate globuleux, à deux lobes; la capsule arrondie, à deux loges, à quatre valves; deux semences anguleuses dans chaque loge, noires, convexes extérieurement.

Cette plante croît au Mexique. (*Descript. ex Cavan.*)

3. QUAMOCILIT à trois folioles. *Ipomaea ternifolia*. Cavan.

*Ipomaea floribus axillaribus, foliariis; foliis linearibus, ternis, petiolo communi longioribus*. Cavan. Icon. vol. 5. pag. 52. n°. 542. tab. 478. fig. 1.

Espèce facile à distinguer par ses feuilles ternées, filiformes. Ses tiges sont filiformes, herbacées, à rameaux alternes, glabres, garnis de feuilles alternes, composées de trois folioles très-étroites, linéaires, plus longues que le pétiole.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par un pédoncule simple, plus long que les feuilles; le calice divisé en cinq folioles acuminées, dont deux intérieures; la corolle infundibuliforme, d'un pourpre violet; le limbe à cinq découpures ovales, obtuses; les étamines un peu velues à leur base, les anthères sagittées, le stigmate bilobé, l'ovaire globuleux.

On rencontre cette espèce au Mexique. (*Descript. ex Cavan.*)

4. QUAMOCILIT lacinié. *Ipomaea diffusa*. Willd.

*Ipomaea foliis palmatis, laciniis angustis, pinnatifidis, dentatis; pedunculis fasciculatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 880. n°. 2. — Idem. Phytogr. t. pag. 5. n°. 19. tab. 2. fig. 3.

Cette espèce a des tiges farmenteuses & grimpantes, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, assez grandes, palmées, dont les découpures sont étroites, dentées, pinnatifides. Les pédoncules sont axillaires, terminés par une, & plus souvent par deux fleurs.

Cette plante croît naturellement dans la Guinée.

5. QUAMOCILIT à ombelles. *Ipomaea umbellata*. Linn.

*Ipomaea foliis digitatis, septenis; pedunculis umbellatis, brevissimis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 227. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2109.

*Quamoclit heptaphyllus, flora coccinea, uncinulato*. Plum. Catal. Spec. 3. — Tournef. Inil. R. Herb. 116.

*Ipomaea foliis digitatis, foliolis septenis, lanceolatis, integerrimis; pedunculis multifloris, brevissimis, subumbellatis*. Burm. Amér. pag. 81. tab. 92. fig. 1.

On distingue cette espèce au grand nombre de ses fleurs, presque disposées en ombelle, & à ses feuilles divisées en sept folioles lancéolées.

Ses tiges sont glabres, farmenteuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, composées de sept folioles distinctes à leur base, presque égales, très-entières, acuminées. Les fleurs sont axillaires, très-abondantes, réunies en corymbe ou presque en ombelle, sur un pédoncule commun, chacune d'elles pédiculée; les capsules sont glabres, oblongues, acuminées, à trois loges.

Cette espèce croît dans l'Amérique.

6. QUAMOCILIT digité. *Ipomaea digitata*. Linn.

*Ipomaea foliis palmatis, lobis septenis, lanceolatis, obtusis; pedunculis trifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 162. — Millev. Dict. n°. 9.

*Quamoclit foliis digitatis, flore coccineo*. Plum. Catal. amer. Spec. pag. 5. & Burm. Amér. tab. 92. fig. 1. — Tournef. Inil. R. Herb. 116.

Cette plante a des tiges glabres, tortes, grimpantes, qui s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq pieds & plus, & sont garnies de feuilles alternes, pétiolées, larges, palmées ou divisées en cinq ou sept digitations inégales, assez profondes, lancéolées, presque obtuses, glabres à leurs deux faces, supportées par des pétioles souples, comprimés, élargis.

Les fleurs sont axillaires, latérales, réunies au nombre de deux ou trois sur des pédoncules courts. La corolle est infundibuliforme, d'une belle couleur pourpre; le stigmate est globuleux, à trois lobes peu marqués; il leur succède une capsule arrondie, à trois lobes, contenant chacune une semence brune, presque ovale.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale: (*V. f. in herb. Lam.*)

7. QUAMOCLIT de Caroline. *Ipomaea caroliniana*. Linn.

*Ipomaea foliis digitatis, foliolis petiolatis, pedunculis unifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 227. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2110.

*Convolvulus minor, pentaphyllus, flore purpureo, minore*. Catesb. Carol. 2. pag. 91. tab. 91.

Ses tiges sont grimpantes, garnies de feuilles digitées, composées de cinq à sept folioles lancéolées, un peu rétrécies à leur base; chacune d'elles portée sur un pétiole partiel. Les fleurs sont solitaires, les calices courts, la corolle infundibuliforme, le tube évasé, vert en dehors, violet en dedans, le limbe d'un rouge pourpre, à cinq divisions un peu réfléchies en dehors.

Cette plante croît sur les rochers, dans plusieurs des îles Bahama, en Amérique.

8. QUAMOCLIT tubéreux. *Ipomaea tuberosa*. Linn.

*Ipomaea foliis palmatis, lobis septenis, lanceolatis, acutis, integerrimis; pedunculis trifloris*. Linn. Hort. Uptal. 39. — Jacq. Observ. 1. pag. 39. — Miller. Dict. n°. 5. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2112. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 881. n°. 9.

*Ipomaea heptadactyla, major, scandens, flore majori, campanulato; calice membranaceo, seminibus villosis*. Brown. Jam. 155.

*Convolvulus major, heptaphyllus, flore sulphureo, odorato*. Sloan. Jam. 56. Hist. 1. pag. 152. tab. 96. fig. 2.

*Convolvulus americanus Mandiucca, multifido folio, heptaphylos, flore albo, fundo purpureo, radice tuberosa, cortice albo*. Pluk. Almag. 416. tab. 276. fig. 6.

✓ *Valguierum* liane à cornelle, ou vigne de boreau d'Espagne.

Cette plante a des racines tubéreuses, des tiges blanchâtres, purpurines sur les rameaux, très-rameuses, volubiles, qui s'élèvent à une très-grande hauteur, & sont garnies de feuilles alternes, pétiolées, vertes à leurs deux faces, glabres, un peu pubescentes à leur face inférieure, divisées en

sept digitations très-profondes, très-inégaux, étroites, lancéolées, acuminées; les deux inférieures bien plus petites que les autres, & un peu pendantes.

Les fleurs sont grandes, axillaires, latérales, infundibuliformes, odorantes, d'un jaune clair, quelquefois blanchâtres, médiocrement purpurines à leur base, réunies au nombre de trois sur un pédoncule commun. Les capsules font vésiculeuses, grosses, arrondies, à trois lobes, contenant des semences un peu velues, d'une couleur obscure.

Cette plante croît dans les îles & contrées méridionales de l'Amérique. (✓ *V. f.*) On s'en sert pour couvrir les berceaux les plus étendus.

9. QUAMOCLIT du Sénégal. *Ipomaea senegalensis*. Lam.

*Ipomaea foliis palmatis; lobis quinis, ovatis, intermedio majori; pedunculis subtrifloris*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2113.

Ses tiges sont blanchâtres, grimpantes, tuberculées, divisées en rameaux souples, volubiles, glabres, garnis de feuilles glabres, alternes, divisées en cinq lobes ovales, obtus, celui du milieu beaucoup plus grand que les autres; supportées par des pétioles grêles, presque filiformes.

Les fleurs sont latérales & axillaires, réunies au nombre de deux ou trois sur un pédoncule commun. Leur calice est court, glabre, à cinq découpures ovales, un peu membraneuses & blanchâtres à leurs bords. La corolle est grande, blanchâtre ou un peu purpurine, campaniforme, très-évasée.

Cette plante croît au Sénégal, où elle a été recueillie par M. Roussillon. (✓ *V. f. in herb. Lamarck.*)

10. QUAMOCLIT pied de tigre. *Ipomaea pes tigridis*. Linn.

*Ipomaea foliis palmatis, lobis ovato-quinatis; floribus aggregatis, caule petiolisque hispidis*. (N.)

*Ipomaea foliis palmatis; lobis ovatis, quinis, septenis; floribus aggregatis*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2114.

*Ipomaea foliis palmatis; floribus aggregatis*. Linn. Flor. zeyl. 79. — Kuiph. Centur. 9. tab. 53.

*Convolvulus zeylanicus, villosus, pentaphyllus & heptaphyllus minor, pes tigridis*. Herm. Lugd. Bat. 184. tab. 187. — Ad. Bonon. 11. p. 2. pag. 362. tab. 23. fig. 2.

✓ *Volubilis zeylanica, pes tigridis dicta*. Dillen. Elch. 420. tab. 328. fig. 411.

✓ *Puffi-fhouadi*. Rheed. Malab. p. 11. pag. 121. tab. 59.



Cette espèce a le port du *Ipomoea pectophylla*, tant par la division de ses feuilles que par la disposition de ses fleurs agglomérées en tête.

Ses tiges sont tortues, grimpantes, rudes, hérissées, ainsi que les pétioles & les pédoncules, de poils fins, horzontaux, écartés; garnies de feuilles alternes, pétiolées, palmées, divisées en cinq, quelquefois sept digitations ovales, acuminées, rétrécies à leur base, couvertes à leurs deux faces de poils fins & couchés.

Les pédoncules sont axillaires, plus longs que les feuilles, cylindriques; ils supportent à leur extrémité une tête de fleurs, touffue, serrée, très-velue, munie à sa base de plusieurs folioles lancéolées, plus longues que les corolles, en forme de collerette, ciliées à leurs bords, ainsi que les calices. La corolle est infundibuliforme; la capsule, à trois loges, contenant des semences anguleuses, un peu velues.

Cette plante croît dans les Indes, à Java. ○ (*V. f. in herb. Lam. ex Comberfon.*)

#### 11. QUAMOCLIT papiru. *Ipomoea papiru*. Ruiz & Pav.

*Ipomoea foliis palmatis, cordatis; lobis quinis, lanceolatis; pedunculis unifloris; radice tuberosa*. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 2. pag. 11. tab. 120. fig. A.

A. *Ipomoea* (subtiloba), foliis cordatis, integerrimis, subtrilobisque; pedunculis unifloris, radice tuberosa. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 12.

Cette plante a des racines grosses, tubéreuses, arrondies ou oblongues, épaisses, brunes en dehors, blanches en dedans; les tiges nombreuses, filiformes, peu rameuses, garnies de feuilles palmées, divisées en cinq digitations inégales, lancéolées, très-entières, supportées par des pétioles de la longueur des feuilles.

Les pédoncules sont axillaires, courts, solitaires, uniflores, munis vers leur milieu de deux petites bractées subulées. Le calice a ses divisions presque en cœur; la corolle est purpurine, ample, infundibuliforme, quatre fois plus longue que le calice.

Cette plante croît au Pérou, sur les collines, dans la province de Tarma. x (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

La plante a pourroit bien n'être qu'une variété de la précédente, mais pubescente, à feuilles entières ou à trois lobes; elle lui ressemble d'ailleurs par ses autres caractères. Ses racines sont employées en infusion, par les Péruviens, dans les diarrhées & les dysenteries.

\* Feuilles simples, entières, anguleuses ou trilobées.

#### 12. QUAMOCLIT écarlate. *Ipomoea coelestis*. Linn.

*Ipomoea foliis cordatis, acuminatis; basi angulatis, pedunculis multifloris*. Linn. Hort. Upl. 39. — Miller. Dict. n°. 2. — Fabric. Helmst. 3. pag. 223. — Kniph. Cenur. 4. n°. 33. — Swartz. Oef. 65. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 464. n°. 2115. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 880. n°. 5.

*Ipomoea foliis cordatis, acuminatis, vix dentatis*. Hort. Cliff. 66. — Roy. Lugd. Bat. 429.

*Ipomoea foliis cordatis, integerrimis; limbo floris quinquefid.* Sauvag. Method. 114.

*Quamoclit americana, folio hedera, flore coccineo*. Connel. Rar. 21. tab. 21.

*Convolvulus coccineus, folio anguloso*. Plum. Amér. 89. tab. 103. — Rai. Suppl. 380.

*Ipomoea puberula, foliis cordatis, promissis acuminatis, imâ parte interdum subangulatis; pedunculis subquinquefloris; calice verruculoso, aristato; limbo corollæ tubuloso subintegr.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 140.

G. *Ipomoea* (luteola), foliis cordatis, acuminatis, subangulatis; pedunculis primùm dichotomis, deinde racemosis. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 35. — Coll. 2. pag. 266.

Cette plante, distinguée par ses belles fleurs écarlates ou d'un jaune orangé, & par ses feuilles simples & en cœur, s'élève à la hauteur de six à huit pieds, sur une tige glabre, cylindrique, grimpante, divisée en rameaux grêles, nombreux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, en cœur, acuminées à leur sommet, échancrées & anguleuses à leur base, excepté les supérieures, supportées par des pétioles presque filiformes.

Les fleurs naissent au nombre de cinq à six & plus sur des pédoncules particuliers vers l'extrémité d'un pédoncule commun, droit, axillaire, plus long que les feuilles. Les divisions du calice sont glabres, terminées chacune par un filet sétacé. La corolle a un tube presque égal, long; son limbe est petit, à cinq lobes courts. La capsule est globuleuse, surmontée d'une pointe à son sommet.

La variété n'en diffère de la précédente que par sa corolle d'un jaune orangé.

Cette plante croît naturellement à l'île Saint-Domingue. On la cultive dans les jardins comme plante d'ornement. ○ (*V. v.*)

#### 13. QUAMOCLIT anguleux. *Ipomoea angulata*. Lam.

*Ipomoea foliis cordatis, angulosis, subtilibus; pedunculis multifloris, folio longioribus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 464. n°. 2116.

On distingue cette espèce de l'*Ipomœa coccinea* à ses feuilles anguleuses à leurs bords, & à la longueur des pédoncules.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, rudes au toucher, garnies de feuilles alternes, pétioles, amples, glabres à leurs deux faces, divisées en trois lobes, excepté les dernières; largement échancrées à leur base, anguleuses à leurs bords, terminées en pointe.

Les fleurs sont disposées en une panicule beaucoup plus longue que les feuilles. Le pédoncule commun est glabre, cylindrique, ordinairement dichotome; chaque fleur, alterne, pédonculée. Le calice est divisé en cinq découpures glabres, étroites, aiguës. La corolle infundibuliforme, d'un beau rouge écarlate; son tube est long, rétréci à sa base; son limbe divisé en cinq lobes ovales; la capsule globuleuse, à trois loges; les semences glabres, ovales, un peu anguleuses, presque tronquées à leur sommet, d'un brun noirâtre.

Cette plante croît à l'Île-de-France, où elle a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Lam.)

#### 14. QUAMOCLIT lacuneux. *Ipomœa lacunosa*. Linn.

*Ipomœa foliis cordatis, acuminatis, serobiculatis, basi angulatis; pedunculis subnifloris, flore brevioribus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228.

*Convolvulus stellatus, periploca rotundioris folio.* Dillen. Eltham. 103. tab. 87. fig. 102.

*Convolvulus carolinianus, flore minore sanguineo.* Rai. Suppl. pag. ult.

*Ipomœa glabra, foliis cordatis, inferne obscurè repandis, aut rarius angulatis; pedunculis brevibus subnifloris; calice piloso & ciliato; corollâ parvâ, brevî; capsulâ pilosâ.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 140.

Malgré les rapports qui existent entre cette espèce & l'*Ipomœa angulata*, on l'en distingue aisément à ses feuilles bien moins anguleuses, & surtout à ses pédoncules courts, presque uniflores.

Ses tiges sont grimpantes, très-glabres, divisées en rameaux sarmenteux, garnis de feuilles simples, entières, ovales, en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, un peu anguleuses ou sinuées à leur partie inférieure, glabres & vertes à leurs deux faces, soutenues par des pétioles longs, droits, herbacés.

Les fleurs sont d'un rouge de sang, axillaires, supportées par des pédoncules courts, simples, presque uniflores, un peu pubescens. Les calices sont pileux, divisés en cinq découpures lancéolées, aiguës, ciliées à leurs bords. La corolle a

un tube court, mais ample, droit, divisé à son orifice en cinq lobes presque droits, courts, munis chacun d'une petite pointe setacée. La capsule est ovale, presque ronde, revêtue de quelques poils rates.

Cette plante se rencontre dans la Virginie & à la Caroline. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 15. QUAMOCLIT épineux. *Ipomœa bona nox*.

*Ipomœa foliis cordatis, acutis, subangulatis; caule aculeato, corollis amplis, tubulosis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 465. n.º 1118.

*Ipomœa foliis cordatis, acutis, integerrimis; caule aculeato, paribus ternis; corollis indivisis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228.

*Convolvulus foliis cordatis, caule aculeato.* Hort. Cliff. 496.

*Ipomœa glaucifolia, foliis & floribus amplissimis; tubis florum subteretibus.* Brown. Jam. 155.

*Convolvulus maximus, caule spinulis obtusis obfuso.* Sloan. Jam. 55. Hist. 1. pag. 151. tab. 276. fig. 10.

*Convolvulus americanus, subrotundis foliis; viticulis spinosis.* Pluken. Almag. 115. tab. 276. fig. 3.

*Smilax aspera India occidentalis.* Baub. Pin. 296.

*Ipomœa glaberrima, caule sarmentoso, passim scabrato; foliis lato-cordatis, incisis seu diversè angulosis; pedunculis uni seu trifloris; calice aristato; corollâ maximâ albâ; tubo angustè longissimo, viridescens, fasciis limbi concoloribus.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 140.

Ses tiges sont grimpantes, foibles, très-glabres, chargées de petites pointes épineuses, qui les rendent scabres & rudes au toucher. Elles sont garnies de feuilles simples, entières, ovales, en cœur à leur base; les unes, un peu sinuées à leurs bords; d'autres, légèrement anguleuses, acuminées à leur sommet, amples, vertes à leurs deux faces; les supérieures, plus étroites, lancéolées, auriculées.

Les pédoncules sont axillaires, & supportent une ou trois fleurs, dont le calice est divisé en découpures aristées à leur sommet. La corolle est ample, blanchâtre, verte à sa base, & marquée également de bandes vertes à son limbe; son tube est très-long, un peu rétréci & cylindrique.

Cette plante croît dans la Floride, à la Jamaïque, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 16. QUAMOCLIT à feuilles glauques. *Ipomœa glaucifolia*. Linn.

*Ipomaea foliis sagittatis, posioide truncatis; pedunculis bifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 228. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 465. n° 2119.

*Convolvulus foliis cordato-lanceolatis.* Hort. Cliff. 67.

*Convolvulus stellatus, arvensis, folio glauco.* Dill. Elth. pag. 103. tab. 87. fig. 101.

Ses tiges sont grimpantes, grêles, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles alternes, glabres, lanceolées, sagittées à leur base, dont les oreillettes sont obtuses, quelquefois un peu anguleuses, soutenues par de très-longs pédoncules.

Les fleurs sont axillaires, portées sur des pédoncules au moins de la longueur des feuilles, terminés par deux fleurs pédonculées, petites, dont le calice est à cinq folioles courtes, ovales, aiguës; la corolle infundibuliforme, purpurine, ou de couleur de chair; le tube renflé, le limbe à cinq divisions ovales, aiguës; la capsule ovale, aiguë, à trois et quatre loges, contenant chacune une semence foliaire.

Cette plante croît en Amérique.

#### 17. QUAMOCLIT batate. *Ipomaea batatas.*

*Ipomaea foliis cordatis, hastatis, subangulatis; radice tuberosa, pedunculis multifloris.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 465. n° 2120. — Feuill. Per. vol. 3. tab. 11. — Pluken. Phyt. tab. 167. fig. 3.

*Convolvulus (batatas), foliis cordatis, hastatis, quinquevallis; caule repente, hispido, tuberifero.* Miller. Dict. n° 7.

*Convolvulus foliis cordatis, angulatis; radice tuberosa.* Hort. Cliff. 67. — Roy. Lugd. Bat. 427.

*Convolvulus radice tuberosa, esculenta, &c.* Catesb. Carol. pag. 60. tab. 60.

*Convolvulus indicus orientalis, inhone, seu batatas.* Morif. Hist. 2. pag. 11. §. 1. tab. 3. fig. 4.

*Convolvulus indicus, vulgò patate diuers.* Rai. Hist. 728.

*Batatas.* Bauh. Pin. 91. — Rumph. Amboin. 5. pag. 367. tab. 130. — Kalm. Iter 2. pag. 300.

*Kappa-ketengu.* Rheed. Malab. 7. pag. 95. tab. 50.

*Convolvulus (batatas), radice tuberosa, repens; foliis glaberrimis, lato-cordatis, sinu lato pumilique profundo, modò hastatis, modò variabiliter angulato-lobatis; pedunculis longis, fasciculato-plurifloris; pedicellis brevibus; calicis glabri laciniis lanceolatis, acuminatis; corollâ campanulata.* Mich. Flor. boreal. amer. vol. 1. pag. 138.

Vulgairement patate ou iname.

A. Eadem, caule, petiolis pedunculisque pilosissimis. Lam. Illustr. l. c.

B. Eadem, caule, petiolis pedunculisque glabris, atro-purpureis. Lam. Illustr. l. c.

Cette espèce, si intéressante par ses usages comme comestible, est une plante rampante, herbacée, dont les racines sont grosses, tubéreuses, charnues, & poussent des tiges qui sont glabres, un peu purpurines, ou bien hispides & velues, selon les variétés; garnies de feuilles alternes, très-variables, larges, ovales, acuminées, en cœur à leur base, ou fortement échancrées, munies de deux oreillettes courtes ou lanceolées, assez généralement hautes ou divisées en trois lobes simples ou anguleux, supportées par des pétioles glabres ou velus.

Les pédoncules sont axillaires, plus longs que les feuilles, lisses ou velus, terminés par des fleurs fasciculées ou presque en ombelle, soutenues par des pédoncules partiels, courts, épais, presque egaux. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures lanceolées, acuminées. La corolle est blanchâtre en dehors, purpurine en dedans; grande, campanulée; le stigmate est capité, à trois lobes peu sensibles; la capsule un peu ovale, à trois loges.

Cette plante croît dans les deux Indes, où on la cultive pour les usages domestiques. (V. f.) Ses racines tuberculées offrent les mêmes ressemblances que celles de la pomme de terre.

#### 18. QUAMOCLIT hasté. *Ipomaea hastata.*

*Ipomaea foliis sagittato-hastatis, pedunculis bifloris.* Linn. Mantiff. 204. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 884. n° 18.

*Ipomaea (sagittata-folia), foliis hastatis, pedunculis bifloris.* Burm. Flor. ind. pag. 50. tab. 18. fig. 2.

*Convolvulus juvenicus.* Garzin. Herb.

Ses tiges sont délicates & grimpantes, garnies de feuilles alternes, glabres, hirsutes, hautes, lanceolées, dont les deux lobes inférieurs sont très-écartés, acuminés. Les pédoncules sont axillaires, simples, épais, terminés par deux fleurs pédonculées, dont le calice est très-court; la corolle jaune, tubulée, infundibuliforme, longue d'un pouce, terminée par un limbe court, un peu plane, à cinq divisions ovales, aiguës.

Cette plante croît dans les Indes & à l'île de Java.

#### 19. QUAMOCLIT de deux couleurs. *Ipomaea bicolor.* Lam.

*Ipomaea foliis cordatis, integris tritubisque; pedunculis subbifloris, folio brevioribus; calicibus lanceolatis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 465. n° 2122.

Cette espèce a de grands rapports avec le *convolvulus Dillenii*, Dict. n° 223; mais elle appartient aux *ipomaea* par les caractères génériques.

Ses tiges sont volubiles, blanchâtres, un peu rudes, legerement pubescentes, garnies de feuilles alternes, médiocrement velues, ovales, en cœur, acuminées; les unes, entières; d'autres, à trois lobes aigus, supportées par des pétioles grêles, un peu hispides. Les pédoncules sont simples, plus courts que les feuilles, terminés par une ou deux fleurs. Leur calice, un peu velu, est divisé en cinq découpures très-longues, lineaires, lancéolées, presque obtuses. La corolle est grande, campanulée, blanche inférieurement, d'un bleu céleste à son limbe. Le stigmate est en tête étendue.

Cette plante croit au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été recueillie par M. Sonnerat. (V. f. in herb. Lam.)

20. QUAMOCUIT pubescens. *Ipomaea pubescens*. Lam.

*Ipomaea villosa* - pubescens, foliis cordatis, rare trilobis, molissimis; pedunculis unifloris, calicinis foliis subcoratis. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 465. n°. 2123.

Il existe une grande affinité entre cette espèce & le *convolvulus tomentosus*, Dict. n°. 93; mais elle est bien moins tomenteuse. Ses tiges & ses feuilles ne sont que pubescentes, & son stigmate est capité.

Ses tiges sont grêles, torces, grimpantes, garnies de feuilles alternes, ovales, échancrées en cœur à leur base, acuminées, molles, quelquefois divisées en trois lobes aigus, très-inégaux; pubescentes à leurs deux faces, à peine tomenteuses. Les pédoncules sont uniflores; les divisions du calice velues, presque en cœur & élargies à leur base, aiguës ou acuminées à leur sommet. La corolle est grande, purpurine, campanulée; la capsule ovale.

Cette plante croît en Amérique. (V. f. in herb. Lamarck.)

21. QUAMOCUIT hédérac. *Ipomaea hederacea*.

*Ipomaea foliis cordatis, semi-trilobis; pedunculis unifloris, petiolo brevioribus; calicibus barbato-hispidis*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 466. n°. 2124.

*Ipomaea foliis trilobis, quinquelobisve cordatis; pedunculis unifloris, calicibus villosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 884.

*Ipomaea* (hederacea), foliis trilobis, quinquelobisve, cordatis; pedunculis unifloris. Jacq. Icon. 1. tab. 36. — Idem. Collect. 1. pag. 124.

An *convolvulus* (nil)? Linn. Var.

Cette plante a de si grands rapports avec le *convolvulus nil*, Linn. qu'elle paroît en être à peine une variée, & se rapporte aux *ipomaea* par ses caractères généraux.

Ses tiges sont grimpantes, sèches, revêtues de poils fins & mous, garnies de feuilles alternes, longuement pétiolées, échancrées en cœur à leur base, velues à leurs deux faces, molles, verdâtres, divisées en trois lobes profonds, ovales, aigus. Les pédoncules sont simples, plus courts que les pétioles, velus, axillaires, uniflores. Les calices divisés en cinq découpures longues, lineaires, recourbées en corne extérieurement, garnies à leur base d'une touffe de poils simples, longs, très-fins. La corolle est grande, campanulée, purpurine; le stigmate capité.

22. QUAMOCUIT à feuilles de lierre. *Ipomaea hederifolia*. Linn.

*Ipomaea foliis trilobis, cordatis; pedunculis multifloris, rac. mossis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 229. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 466. n°. 2125.

*Quamocuit hederifolia villosa*. Plum. Amer. Spec. pag. 3. — Burm. Amer. tab. 93. fig. 2. — Tourn. Inst. R. Herb. 116.

Ses tiges sont grimpantes, un peu anguleuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, échancrées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, très-ordinairement divisées en trois lobes, & assez semblables aux feuilles du lierre. Les pédoncules sont axillaires; ils supportent des fleurs disposées en grappes, dont les corolles sont longues, tubulées, cylindriques, de couleur violette.

Cette plante croît dans les îles de l'Amérique. ○

23. QUAMOCUIT à feuilles d'hépatique. *Ipomaea hepaticifolia*. Linn.

*Ipomaea foliis trilobis, obtusis; floribus aggregatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 466. n°. 2126.

*Ipomaea foliis trilobis, floribus aggregatis*. Linn. Flor. zeyl. 79. — Mill. Dict. n°. 7. — Burm. Flor. ind. pag. 50. tab. 20. fig. 2.

*Convolvulus indicus, villosus, hederifolia bipartito, flore caruleo*. Herm. Lugd. Bat. 182.

*Convolvulus zeylanicus, hirsutus, foliis hepaticis*. Herm. Prodr. 327.

Ses tiges sont grimpantes, velues, & s'élèvent à la hauteur de quatre à cinq pieds: elles sont garnies de feuilles alternes, velues, assez semblables à celles des hépatiques, ordinairement divisées en trois lobes. Ses fleurs sont réunies en paquets à l'extrémité d'un pédoncule commun & axillaire; les calices sont presque à cinq angles, à cinq divisions; la corolle petite, tubulée, de couleur purpurine: elle ne s'épanouit que le soir dans nos climats.

Cette plante croît naturellement aux Indes, à l'île de Ceylan. On la cultive dans plusieurs jardins botaniques.

24. QUAMOCLIT à feuilles de morelle. *Ipomaea folanifolia*. Linn.

*Ipomaea foliis cordatis, acutis, integerrimis; floribus foliariis*. Mill. Dict. n° 3. — Roy. Lugd. Bat. 430. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 881. n° 8. — Lam. Illustr. Gener. n° 2127.

*Quamoclit folanifolia, flore roseo*. Plum. Amer. Catal. Spec. pag. 3. — Burm. Amer. Ic. 94. fig. 2. — Tourn. Infl. R. Herb. 116.

Ses tiges sont grimpantes, garnies de feuilles alternes, amples, ovales, échancrées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, très-entières à leurs bords, point lobées. Les pédoncules sont axillaires, foliaires, de la même longueur que les feuilles, & ne soutiennent qu'une seule fleur couleur de rose & tubuleuse.

Cette espèce croît dans l'Amérique, & se cultive dans quelques jardins botaniques.

25. QUAMOCLIT pourpre. *Ipomaea purpurea*. Lam.

*Ipomaea foliis cordatis, integris; pedunculis multifloris, calice basi hispido*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 466. n° 2129.

*Convolvulus (purpureus), foliis cordatis, indivisis; frutibus ternis, pedicellis incrassatis*. Mill. Dict. n° 4. — Knorr. Del. 1. tab. W. 2. & W. 4.

*Convolvulus calicibus tuberculatis, pilosis*. Linn. Virid. Cliss. 18. Hort. Upf. 38. — Gronov. Virg. 141.

*Convolvulus purpureus, folio subrotundo*. Bauh. Pin. 295. — Ehret. Pi& 7. fig. 2.

6. *Convolvulus caruleus, minor; folio subrotundo*. Dillen. Eltham. 97. tab. 82. fig. 94.

7. *Convolvulus folio cordato, glabro*. Dillen. Elth. 100. tab. 84. fig. 97.

A. *Ipomaea (violacea), foliis cordatis, integerrimis; floribus confertis, corollis indivisis*. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 466. n° 2128. — Mill. Dict. n° 4. — Sauvag. Monsp. 114.

*Quamoclit foliis amplifloris, corolliformibus*. Plum. Amer. Catal. Spec. pag. 3. — Burm. Amer. Ic. 93. fig. 1. — Tourn. Infl. R. Herb. 116.

*Convolvulus major, folio subrotundo; flore amplo, purpureo*. Sloan. Jam. 55. Hist. 1. pag. 155. tab. 98. fig. 1.

Nous n'avons pas cru pouvoir séparer ces deux plantes, qui nous ont paru appartenir à la même espèce, & peu distinguées entr'elles, à moins que nous ne nous soyons trompés sur l'*ipomaea violacea* de Linné.

Cette espèce est remarquable par ses belles & grandes fleurs blanchâtres à la base de leur corolle,

d'un beau rouge pourpre à son limbe, supportant très-bien la température de notre climat; ce qui l'a fait admettre comme fleur d'ornement dans tous les jardins.

Ses tiges sont grimpantes, velues, un peu anguleuses, garnies de feuilles amples, pétioles, alternes, vertes, molles, presque glabres, ovales, en cœur, aiguës à leur sommet, souventes par des pétioles longs, plus ou moins velues. Les pédoncules sont axillaires, à peu près de la longueur des feuilles, médiocrement hispides, terminés par trois à cinq fleurs & plus, pédonculeux, munies de quelques petites bractées à la base de leurs pédoncules partiels. Le calice est hispide à sa base, divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës; la corolle campanulée; le limbe très-ouvert, un peu réfléchi, à peine lobé à ses bords; le stigmate globuleux, à trois lobes.

La plante A en diffère par toutes ses parties beaucoup plus glabres, & par les calices plus tubulés, presque point hispides; les feuilles un peu plus arrondies.

Ces plantes naissent naturellement dans les contrées méridionales de l'Amérique. ☉ (V. v.)

16. QUAMOCLIT paniculé. *Ipomaea paniculata*.

*Ipomaea foliis ovato-acuminatis, calce subcordatis, glaberrimis; pedunculis cymoso-paniculatis*. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 466. n° 2131. — Burn. Flor. ind. tab. 21. fig. 3.

*Convolvulus cymosus*. Desfrouff. Dict. vol. 3. pag. 556. n° 64.

Nous renvoyons, pour la description de cette plante, à l'article *Lifera en cime*; que M. Lamarck a rangée depuis parmi les *ipomaea*, lui ayant reconnu les caractères de ce genre.

27. QUAMOCLIT à grandes fleurs. *Ipomaea grandiflora*. Lam.

*Ipomaea foliis cordatis, integerrimis; pedunculis subhispidis, caule petiolisque pubescentibus*. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 467. n° 2133.

*Convolvulus (grandiflorus), foliis cordatis, ovatis, obtusifolius, integerrimis; pedunculis subhispidis, calicibus coriaceis, caule petiolisque pubescentibus*. Linn. f. Suppl. pag. 136. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 859. n° 57.

*Convolvulus maximus, femine hirsute*. Herm. Mus. Munda-valli. Rheed. Mal. p. 11. pag. 103. tab. 50.

Cette plante a des tiges presque arborescentes, droites d'abord, & qui deviennent ensuite volubiles, & se divisent en rameaux pubescents, garnis de feuilles amples, alternes, ovales, en cœur, formant à leur base deux oreillettes arrondies, glabres,

glabres, obtusés à leur sommet, supportées par des pétioles pubescens. Les pédoncules sont axillaires, terminés par une ou deux fleurs. Le calice est coriace, divisé en découpures oblongues, aiguës. La corolle, campanulée, est remarquable par sa beauté, son extrême grandeur & son odor agréable; le stigmate est capité, les semences velues.

Cette plante croît dans les Indes, sur le bord des rivières. (j)

28. QUAMOCLIT féfifère. *Ipomœa fœfifera*.

*Ipomœa foliis cordato-auriculatis, glabris; pedunculis subhispidis; calicibus amplis, apice fœfiferis, ramis villosis.* (N.)

Ses tiges sont longues, grêles, sarmenteuses, glabres, divisées en rameaux velus, particulièrement vers leur partie supérieure; garnis de feuilles alternes, pétiolées, glabres à leurs deux faces, ovales, en cœur, & même auriculées à leur base, acuminées à leur sommet, les oreillettes arrondies.

Les pédoncules sont axillaires, simples, glabres, terminés ordinairement par deux fleurs. Leur calice est divisé en cinq folioles larges, ovales, oblongues, minces, glabres, terminées chacune à leur sommet par un poil fin. La corolle est ample, campanulée, d'une belle couleur purpurine ou rougeâtre; le stigmate est capité.

Cette plante a été recueillie dans la Guiane, par M. Brocheton. (V. f. in herb. Lam.)

29. QUAMOCLIT fagittée. *Ipomœa fagittata*. Poit.

*Ipomœa foliis glaberrimis, cordato-fagittatis; filamentis basi v. llojis, seminibus tumentosis.* (N.)

*Ipomœa foliis fagittatis, pedunculis unifloris.* Poit. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 122. — Edit. Allen. vol. 2. pag. 160. Ic. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 466. n°. 1132. tab. 104. fig. 1.

*Ipomœa caule volubili; foliis glaberrimis, inferioribus cordatis, superioribus fagittatis.* Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 177.

*Convolvulus fagittaria foliis, flore purpureo* Wheleri. Tourn. Inst. R. Herb. 82. — Pluk. Almag. 113. tab. 85. fig. 3.

*Convolvulus* (Wheleri), *foliis fagittatis, posticis fubrotundatis, integris; pedunculis teretibus, unifloris.* Vahl. Symbol. 2. pag. 36. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. 488. 845. n°. 3.

*Ipomœa* (fagittata), *caule volubili, foliis fagittatis, floribus solitariis.* Cavan. Ic. vol. 2. pag. 4. n°. 116. tab. 109.

Cette belle espèce, digne de figurer à côté de l'*Ipomœa purpurea*, qui y ressemble beaucoup, a des tiges très-glabres, grimpantes, volubiles, Botanique. Tome VI.

hautes au moins de six à huit pieds & plus, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-entières, les inférieures échancrées en cœur, les supérieures plus étroites, lancéolées, aiguës, fagittées à leur base, prolongées par deux oreillettes aiguës ou obtuses, glabres à leurs deux faces.

Les pédoncules sont solitaires, axillaires, terminés par une, quelquefois par deux fleurs. Leur calice est droit, glabre, divisé en découpures linéaires, elliptiques, obtuses, les deux extérieures plus petites que les autres. La corolle est campanulée, grande, d'une belle couleur de rose pourpre; les filaments sont velus à leur base, le stigmate capité; la capsule arrondie, à cinq valves, contenant des semences brunes, anguleuses, velues.

Nous avons rencontré cette plante, M. Desfontaines & moi, sur les bords des grands lacs voisins de la Calle, & dans les environs du bassin de France en Barbarie. Elle croît aussi en Espagne. (V. v.)

30. QUAMOCLIT couleur de chair. *Ipomœa carnæa*. Jacq.

*Ipomœa foliis cordatis, glabris; pedunculis multifloris, corollis emarginatis.* Jacq. Amer. p. 26. tab. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 883. n°. 15.

C'est une plante ligneuse, grimpante, dont les tiges s'élèvent à la hauteur de vingt pieds & plus, & se divisent en rameaux glabres, verticillés, garnis de feuilles presque arrondies, en cœur à leur base, aiguës ou acuminées à leur sommet, longues de huit pouces.

Les pédoncules supportent des fleurs presque disposées en grappes, très-agréables, de couleur de chair, dont le calice est glabre, court, à cinq folioles concaves, obtuses, conniventes. La corolle, infundibuliforme à sa base, se resserre ensuite en un tube cylindrique, allongé, & se développe en un limbe très-ample, presque de la longueur du tube, ayant cinq échancrures à ses bords. Le stigmate est globuleux, presque à quatre lobes; la capsule ovale, à quatre lobes, à quatre valves, contenant des semences foliaires, ovales, lanugineuses.

Cette plante croît dans les grandes forêts, en Amérique. (j)

31. QUAMOCLIT à grosses racines. *Ipomœa macrorhiza*. Mich.

*Ipomœa radice crassissima; foliis subulis tomentosis, cordatis, simplicibus lobatisque, plicatis; pedunculis subunifloris; calice foliolis ovalibus, mucis; corollâ albâ, grandi; seminibus prolixè lanuginosis.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 141.

Cette espèce est remarquable par ses racines épaisses, très-grosses, d'où s'élèvent des tiges grimpantes, garnies de feuilles alternes, ovales, C

en cœur, plissées, simples ou quelquefois lobées, tomenteuses à leur face inférieure. Les pédoncules sont axillaires, presque à une seule fleur. Le calice est composé de folioles ovales, obtuses. La corolle est grande, blanche, infundibuliforme; la capsule ovale, à trois loges, contenant des semences très-lanugineuses.

Cette espèce se rencontre sur les côtes maritimes, dans la Géorgie & la Floride. (*Descript. ex Mich.*)

31. QUAMOCLIT à bractées colorées. *Ipomaea bracteata*. Cavan.

*Ipomaea foliis ovato-acutis, cordatis; floribus racemosis; bracteis carnis, venosis*. Cavan. Ic. vol. 5. pag. 51. n°. 546. tab. 477.

Ses tiges sont grimpantes, volubiles, revêtues d'une écorce spongieuse, garnies de feuilles alternes, ovales, aiguës, en cœur à leur base, plus longues que leur pétiole. Les fleurs sont disposées en grappes pendantes sur un pédoncule commun, flexueux; les partiels sont courts, uniflores; les calices munis à leur base d'une bractée orbiculaire, en cœur, d'un pouce & plus de diamètre, d'une belle couleur de chair, veinée & plissée.

Le calice est composé de cinq folioles coriaces, ovales, subulces. La corolle est infundibuliforme, de couleur de chair un peu rougeâtre; le tube long d'un pouce & demi; le limbe entier & réfléchi; cinq filaments glabres, égaux, filiformes; les anthères ovales; le stigmate ovale, petit; la capsule ovale, aiguë, plus longue que le calice.

Cette plante croît au Mexique. Il n'est pas bien certain qu'elle appartienne à ce genre. (*Descript. ex Cavan.*)

33. QUAMOCLIT à tiges droites. *Ipomaea flans*. Cavan.

*Ipomaea caule suffruticosa, ramosa, erecto; foliis cordatis, ovato-truncatis, dentatis; floribus axillaribus, solitariis*. Cavan. Icon. vol. 3. pag. 26. n°. 273. tab. 250.

Ses tiges sont droites, cylindriques, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, rapprochées, longues d'un pouce, ovales, en cœur, tronquées obliquement à leur sommet, dentées à leurs bords, rugueuses, à peine pétioles.

Les fleurs sont grandes, axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules plus courts que les feuilles, garnis de deux écailles. Les calices sont cylindriques, profondément partagés en cinq découpures inégales, linéaires, obtuses. La corolle est campanulée, d'un violet clair; le tube est blanchâtre; le limbe divisé en cinq lobes arrondis; les étamines velus à leur base; le stigmate à deux lobes, caractère qui doit faire placer cette espèce

parmi les *liferons*, d'après les caractères qui leur ont été assignés dans cet ouvrage.

Cette plante, dont la patrie n'est pas encore connue, a été cultivée au Jardin botanique de Madrid. (*Carail. ex Cavan.*)

34. QUAMOCLIT rampant. *Ipomaea repens*. Lam.

*Ipomaea foliis cordatis, nervosis; pedunculis multifloris, caule repente*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 2134.

*Belcdamboe*. Rheed. Malab. vol. 11. pag. 119. tab. 58.

Ses tiges sont glabres, presque ligneuses, sarmenteuses, rampantes, radicales à chaque articulation, d'où sortent des feuilles pétioles, glabres, entières, ovales, en cœur à leur base, marquées de fortes nervures. Les pédoncules sont axillaires, à peine de la longueur des feuilles, terminés par trois ou quatre fleurs, dont le calice est divisé en cinq folioles oblongues, verdâtres, deux plus petites. La corolle est grande, campaniforme, blanche; son limbe terminé par cinq dents courtes, aiguës; le contour ondulé ou frangé. Les capsules sont ovales, surmontées du style persistant; elles renferment trois à quatre semences oblongues, anguleuses.

Cette plante croît au Malabar, dans les lieux pierreux. *h*

35. QUAMOCLIT aquatique. *Ipomaea aquatica*.

*Ipomaea foliis cordato-lanceolatis, subhastatis, basi subdentatis; pedunculis bifloris, caule repente*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 467. n°. 2135.

*Ipomaea (aquatica), foliis cordato-acutis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 44. n°. 44.

*Ballel*. Rheed. Malab. vol. 11. pag. 107. tab. 52.

*Convolvulus (repens), foliis sagittatis, positiè obtusis; caule repente, pedunculis subbifloris*. Vahl. Symbol. 1. pag. 17.

*Convolvulus (repens), foliis sagittatis, positiè obtusis; caule repente, pedunculis unifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 225. — Desfrouss. Dict. n°. 30.

*C. Convolvulus (repens), foliis hastato-lanceolatis, auriculis rotundatis; caule repente, pedunculis unifloris*. Linn. Syn. veg. t. 171. — Osbeck. It. 196. — Desfrouss. Dict. n°. 31.

*Olus vagum*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 419. tab. 155. fig. 1.

Cette plante a des tiges rampantes, radicales à la plupart de leurs articulations, garnies de feuilles alternes, pétioles, glabres, lancéolées, presque haillées, échantrées en cœur à leur base,

dont les deux oreillettes sont arrondies, finies ou presque dentées. Les pédoncules sont axillaires, longs de trois pouces, deux fois plus longs que les feuilles, terminés ordinairement par deux fleurs : celles-ci sont grandes, violettes, campanulées.

La plante nous paroît peu différer de la précédente : elle est plus petite ; les riges sont basses, filiformes ; les feuilles glabres, sagittées ; les oreillettes recourbées, acuminées, souvent dentées ; les pédoncules courts ; les divisions du calice arrondies à leur sommet.

Cette espèce croît en Arabie & dans les Indes orientales. ♀

36. QUAMOCLIT verticillé. *Ipomaea verticillata*. Forskh.

*Ipomaea foliis cordatis, pedunculis axillaribus, ternis, reflexis; calicibus trifloris*. Vahl. Symbol. 3. pag. 33. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 883. n°. 14.

*Ipomaea verticillata*. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 44. n°. 41.

Ses riges sont farmenteuses, grimpantes, velues, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-entières, velues, échanquées en cœur à leur base. Les pédoncules sont axillaires, au nombre de trois dans chaque aisselle, presqu'en verticille, réfléchis ou un peu pendans. Les calices sont hérissés de poils, & les capsules à quatre loges.

Cette plante se rencontre dans les plaines de l'Arabie heureuse.

37. QUAMOCLIT campanulé. *Ipomaea campanulata*. Linn.

*Ipomaea foliis cordatis, pedunculis multifloris, perianthio exteriori orbiculati; corollis campanulatis, lobatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 118. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 882. n°. 12.

Adambor. Rheed. Malab. part. 11. pag. 375. tab. 56.

Ses riges sont cylindriques, un peu velues, rampantes, radicantes, garnies de feuilles alternes, amples, échanquées en cœur à leur base, ovales, acuminées, entières à leurs bords, molles & glabres, soutenues par des pétioles longs, pileux, lisses.

Les fleurs sont réunies plusieurs ensemble à l'extrémité d'un pédoncule commun. Le calice est divisé en cinq aigües, environné à la base de bractées orbiculaires. La corolle est très-grande, d'un pourpre mêlé de blanc, campanulée, partagée à son orifice en cinq grandes lobes profonds. La capsule est divisée en trois ou quatre loges, renfermant autant de semences anguleuses.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar.

38. QUAMOCLIT anguleux. *Ipomaea angulata*. Ruiz & Pav.

*Ipomaea foliis cordato-sagittatis, acuminatis acutis; caule angulato, pedunculis subbifloris, calicibus unguiculatis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 11. tab. 120. fig. 6.

*Ipomaea (angulata), foliis cordato-sagittatis, acutis; caule pedunculisque angulatis, pedicellis subbifloris*. Ortega. Decad. 7. pag. 83.

Ses racines sont blanches, fibreuses ; les riges sont anguleuses, farmenteuses, divisées à leur partie inférieure en rameaux garnis de feuilles perfoliées, très-entières, sagittées, en cœur à leur base, acuminées, aiguës, marquées de sept nervures, soutenues par des pétioles longs, canaliculés, coitilles à leur base.

Les fleurs sont axillaires, soutenues par des pédoncules solitaires, anguleux, plus longs que les pétioles, ramor uniflores, d'autres fois de trois à cinq fleurs, munies chacune d'un pédicule penché, garni d'une bractée ovale, un peu réflé vers son sommet. Les découpures du calice sont inégales, un peu tuberculeuses ; la corolle infundibuliforme, le rubis grêle, quatre fois plus long que le calice, d'un rouge safran ; le limbe court, ouvert, arrondi & roulé à ses bords, de couleur écarlate ; les filamens glabres, glanduleux à leur base ; les anthères blanchâtres, en cœur ; l'ovaire environné d'un anneau jaunâtre, le stigmate globuleux, à trois lobes ; la capsule de la grosseur d'un pois, à trois ou quatre angles, à trois ou quatre loges, souvent à deux par l'avortement des autres ; des semences solitaires, noires, à trois côtes.

Cette plante croît dans les lieux élevés & pierreux, aux environs de Lima. ○ (Descript. ex Ruiz & Pav.)

39. QUAMOCLIT à angles aigus. *Ipomaea acutangula*. Ruiz & Pav.

*Ipomaea foliis sagittato-triangularibus, angulis positis, dentatis; caule tereti, pedunculis tri-quinquefloris, foliorum longitudoine*. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 2. pag. 11. tab. 119. fig. 6.

Ses riges sont filiformes, grimpantes, cylindriques, divisées en rameaux garnis de feuilles longuement pétiolées, triangulaires, sagittées, aiguës, dentées, anguleuses à leurs bords. Les fleurs sont axillaires, au nombre de trois à cinq, pédiculées, à l'extrémité d'un pédoncule commun ; munies de deux bractées subulées, opposées, situées à la division du pédoncule commun. La corolle est infundibuliforme, de couleur écarlate ;



son limbe est médiocre, légèrement lobé à son contour.

Cette espèce fleurit au commencement de l'automne, au Pérou, dans les forêts de Chincho & de Pozuzo. ○ (*Descript. ex Ruiz.*)

40. QUAMOCLIT cuspidé. *Ipomaea cuspidata*. Ruiz & Pav.

*Ipomaea foliis cordatis, trilobis; lobis cuspidatis, pedunculis unifloris, lacinia calicis linearibus, basi hirsutissima*. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. & chil. vol. 2. pag. 111. tab. 119. fig. 2.

C'est une plante herbacée, annuelle & pileuse, dont la racine est blanchâtre & fibreuse, les tiges droites, filiformes, flexueuses, médiocrement rameuses, garnies de feuilles longuement pétiolées, en cœur, à trois lobes cuspidés; celui du milieu allongé, aigu; les deux latéraux, très-courts.

Les fleurs sont solitaires, axillaires; leurs pédoncules cylindriques, plus courts que les pétioles, garnis à leur sommet de deux bractées opposées, subulées. Le calice est couvert de poils dorés, à découpures longues & linéaires. La corolle est purpurine, dure peu: elle est infundibuliforme; son limbe est étendu, presque entier.

Cette plante croît dans les terrains pierreux au Pérou. ○ (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

41. QUAMOCLIT velu. *Ipomaea villosa*. Ruiz & Pavon.

*Ipomaea foliis cordatis, trilobis; lobis acuminatis, lateralibus, extorsum excavatis; pedunculis trifloris, involucriatis*. Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 2. pag. 12. tab. 121. fig. B.

Plante très-velue, dont les tiges sont filiformes, rameuses, garnies de feuilles à trois lobes; celui du milieu plus allongé, plus étroit, rétréci à sa base; les deux latéraux, ovales, échancrés à leur côté intérieur, supportés par de longs pétioles cylindriques. Les pédoncules sont solitaires, axillaires, à trois fleurs, dont les pédoncules partiels sont garnis à leur base de quelques petites folioles.

Les calices sont très-velus; la corolle infundibuliforme, purpurine, glabre; son tube évasé, son limbe entier, ample, roulé en dehors; les étamines velues à leur base; le stigmate capité & granulé.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts & sur le bord des chemins. ○ (*Descript. ex Ruiz & Pav.*) Elle a beaucoup de rapports avec l'*Ipomaea triloba*.

42. QUAMOCLIT glanduleux. *Ipomaea glandulifera*. Ruiz & Pav.

*Ipomaea foliis cordato-subtriangulis, acuminatis; pedunculis subquadrifloris, inaequalibus; calicibus glanduliferis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 12. tab. 121. fig. A.

Plante liresue, velue, grimpante, dont les racines sont blanchâtres, fistuleuses; les tiges très-rameuses, cylindriques; les feuilles entières, longuement pétiolées, presque arrondies, échancrées en cœur à leur base, un peu acuminées à leur sommet. Les pédoncules sont solitaires, axillaires, filiformes, de la longueur des feuilles, terminés par trois ou quatre fleurs.

Le calice a ses trois folioles extérieures beaucoup plus grandes & plus larges que les deux intérieures; il est couvert de poils terminés par de petites glandes. La corolle est infundibuliforme, le tube de couleur pourpre, le limbe violet, très-ample, plane, presque entier; les filaments inégaux, velus à leur base; le stigmate capité, à trois lobes; la capsule à trois loges, contenant chacune deux semences noires.

Cette plante croît pendant toute l'année dans les moissons & les lieux cultivés, aux environs de Lima, &c. &c. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

\* *Espèces douteuses ou moins connues.*

\* *Ipomaea* (simplex), *foliis lanceolatis, integris; floribus solitariis*. Thunb. Prodr. 36.

\* *Ipomaea* (linguica), *foliis cordatis, trilobis; lobis lateralibus, postice angulato sublobatis; pedunculis trifloris; calicibus glabris*. Vahl. Symbol. 3. pag. 33.

\* *Ipomaea* (stolonifera), *caulibus stoloniformibus; foliis inferioribus bilobis, superioribus hastatis*. Cynil. Plant. rar. Neap. Fasc. 1. tab. 5.

QUAPALIER. *Sloanea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des lilacées, qui a des rapports avec les *apocynées*, & qui renferme des arbres exotiques à l'Europe, garnis de grandes feuilles, & dont les fleurs font en épis axillaires ou terminaux, munies chacune d'une bractée.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice de cinq à dix divisions; point de corolle; des étamines nombreuses, dont les anthères sont attachées latéralement à des filaments courts; un ovaire velu; une capsule coriace, à cinq loges; des semences enveloppées d'une substance charnue.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq ou dix découpures caduques, inférieures.

## 1°. Point de corolle.

3°. Un très-grand nombre d'étamines, dont les filaments subulés, & à peine de la longueur du calice, sont élargis supérieurement, munis d'anthères attachées latéralement un peu au dessous du sommet de ces filaments; les extérieures, stériles & foliacées.

4°. Un ovaire velu, inséré dans le fond du calice, surmonté d'un style subulé, court, terminé par un stigmate perforé ou à plusieurs divisions.

Le fruit est une capsule grande, ovale ou arrondie, coriace, presque ligneuse, hérissée, à cinq loges, à cinq valves, dont souvent une ou deux avortent, contenant d'une à trois semences oblongues, enveloppées par une substance charnue.

## E S P È C E S.

1. QUAPALIER denté. *Sloanea dentata*. Linn.

*Sloanea foliis ovatis, stipulis cordato-triangularibus, serratis*. Swartz. Prodr. 82. — Idem. Observ. 213.

*Sloanea foliis cordato-ovatis, denticulatis; stipulis serratis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 730. Excluf. L'Esling. synonyme.

*Sloanea Plumieri*. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 536.

*Sloanea amplis, castanea foliis, fructu echinato*. Plum. Gener. 43. — Burm. Amer. pag. 240. tab. 244.

*Castanea foliis oblongo-ovatis, serratis; fructu rotundo, echinato, maximo*. Millet. Dict.

C'est un arbre dont le tronc, d'environ deux pieds de diamètre, s'élève à quarante ou cinquante pieds de haut; il se divise en branches étalées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, quelquefois un peu échancrées en cœur à leur base, très-amplies, terminées en pointe, denticulées à leurs bords, munies de stipules triangulaires, en cœur, dentées en scie à leur contour; leur pétiole est long.

Les fleurs sont disposées en grappes dans l'aisselle des feuilles, supportées par un pédoncule assez long, muni à sa base d'une petite bractée en forme d'écaille. Le calice, d'une seule pièce, est divisé en cinq ou six dents; les étamines sont insérées dans le fond du calice, sur un réceptacle velu; leur filament est fort court, surmonté d'une anthere longue, verdâtre & velue. L'ovaire est arrondi, composé de trois à six côtes, mais plus ordinairement de cinq; il supporte un style droit, velu, dont le stigmate à ordinairement autant de divisions très-courtes, que la capsule a de loges.

Cet ovaire se convertit en une capsule sèche,

très-grosse, roussâtre, hérissée de piquans ligneux & flexibles; elle se divise en trois, cinq ou six loges, & en autant de valves, qui tenement chacune une semence oblongue, quelquefois deux ou trois, enveloppées d'une substance charnue, succulente, de couleur rouge.

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane. *h* (Description. ex Aublet.)

2. QUAPALIER de Sinémari. *Sloanea sinemariensis*. Linn.

*Sloanea foliis subrotundo-ovatis, integerrimis; capsulis ovatis, setosis, ex apice dehiscentibus*. Swartz. Prodr. 82.

*Sloanea (sinemariensis), foliis subrotundis, integerrimis; fructu parvo, aculeis hispido*. Aublet. Guian. pag. 534. tab. 212. — Lam. Illustr. Gener. tab. 469.

Cet arbre est revêtu d'une écorce épaisse & ridée; son bois est rougeâtre, dur & compact; son tronc s'élève à la hauteur de quarante ou cinquante pieds; il se divise en branches & en rameaux épars, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lisses, vertes, ovales ou arrondies, fermes, coriaces, entières à leurs bords, quelquefois un peu échancrées à leur sommet, longues d'un pied, sur au moins neuf pouces de large, marquées de nervures latérales, parallèles, courbées, & de veines agréablement sinuées; leur pétiole est ferme, long, un peu ligneux, accompagné à sa base de deux stipules longues, élargies, aiguës, très-caduques.

Les fleurs naissent en petites grappes courtes dans l'aisselle des feuilles, supportées sur un pédoncule garni à sa base d'une bractée courte. Le calice est divisé en cinq dents ovales, aiguës. Les étamines ont leurs filaments courts, insérés sur un disque velu; l'ovaire est arrondi, velu; le style court, la capsule hérissée de longs piquans, divisée en quatre ou cinq loges, en autant de valves, renfermant chacune une semence oblongue, enveloppée d'une substance rouge, pulpeuse.

Cet arbre croît dans les forêts de la Guiane, situées le long des bords de la rivière de Sinémari. *h* (Description. ex Aublet.)

Observations. Le *Sloanea emarginata* de Linné, d'après l'observation de Willdenow, est une espèce très-douteuse; sa figure de catechi que Linné y rapporte, est l'*Achras sapota*.

\* Espèce moins connue.

\* *Sloanea (Massoni), foliis cordato-ellipticis, stipulis linearibus, calice quinquepartito, setis capsula longissimis*. Swartz. Prodr. 82.

QUAPOYER. *Quapoya*. Aubl. Genre de plantes

dicotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des guttières, voisin des *cavomita*, qui renferme des arbrustes exotiques à l'Europe, d'où distille un suc jaunâtre, résineux, & dont les feuilles sont charnues, opposées; les fleurs en panicule terminale, munies de bractées à leurs divisions.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dictiques; un calice à cinq folioles; cinq pétales; cinq anthères sessiles, insérées sur un disque central, monadelphiques & sit. à dans les fleurs femelles; point de style; une capsule couronnée par le stigmate.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles offrent :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé en cinq ou six découpures petites, concaves, imbriquées, accompagnées de deux bractées à leur base.

2°. Une corolle composée de cinq ou six pétales ouverts, plus grands que le calice, insérés sur le disque des étamines.

3°. Cinq étamines sans filaments, mais dont les anthères sont insérées sur un disque central, charnu & glutineux, & formant, par leur rapprochement, une tête en forme de bouclier.

Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice & une corolle, comme dans les fleurs mâles.

2°. Cinq étamines stériles, monadelphiques, dont les anthères sont droites, larges, oblongues.

3°. Un ovaire arrondi, à cinq ou six stries; couronné par un stigmate sessile, épais, persistant, à cinq divisions.

Le fruit est une capsule petite, à une seule loge, s'ouvrant en cinq valves du sommet à la base, renfermant plusieurs semences attachées sur un réceptacle central à cinq angles, & environnées d'une substance pulpeuse.

#### ES P È C E S.

1. QUAPOYER à fruits ronds. *Quapoya scandens*. Aublet.

*Quapoya foliis ovatis, carnosæ, paniculis laxis, capsulis parvis, globosis*. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 831.

*Quapoya foliis ovatis, carnosæ, integerrimis; floribus racemosis, mas & femina*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 898. n°. 1. tab. 843.

*Quapoya scandens*. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 514. var. 6.

Arbrustau dans les branches & les rameaux fo

repandent sur le tronc des arbres voisins; ils sont opposés, nouveaux, glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, entières, sessiles, épaisses, charnues, ovales, glabres & vertes à leurs deux faces, rétrécies en pétiole à leur base, élargies à leur sommet, & terminées par une pointe particulière.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, lâche, à ramifications opposées, portant chacune deux ou trois fleurs, munies à chaque division de deux petites bractées opposées. Le calice est divisé en cinq ou six découpures verdâtres, arrondies, concaves, imbriquées, un peu aiguës, garnies à leur base de deux bractées en forme d'écaille. La corolle est jaune, composée de cinq pétales épais, arrondis, concaves, attachés par leur onglet sur un disque charnu. Le fruit est une capsule ronde, charnue, assez petite, couronnée par les cinq stigmates, qui deviennent alors droits, aigus, noirs, & réunis ensemble. Les semences sont rouges, disposées en cinq rangs sur un placenta central.

Cet arbrustau croît dans la Guiane, dans les forêts de Sinemari. Il découle un suc blanc, visqueux, transparent de ses feuilles & de l'écorce des branches & des rameaux. (N. Descript. ex Aubl.)

2. QUAPOYER à fruits oblongs. *Quapoya panapanari*. Aubl.

*Quapoya foliis minoribus, subcarnosis; floribus confertis, capsulis oblongis*. (N.)

*Quapoya* (panapanari), *frutic. oblongo*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 900. tab. 344.

*Quapoya scandens*. Gmel. System. Nat. vol. 2. pag. 514.

Cet arbrustau ressemble beaucoup au précédent : il en diffère par ses feuilles plus petites, moins charnues; par ses panicules, dont les fleurs sont plus serrées & plus rapprochées; enfin par ses fruits, plus gros & plus allongés. Il découle des feuilles & de l'écorce un suc jaune qui ressemble à la gomme-gutte lorsqu'il est desséché, & se dissout dans l'eau.

On rencontre cet arbrustau dans les grandes forêts de la Guiane. (N.)

QUARARIBÉE. *Quararibea*. Aubl. Genre de plantes dicotylédones, de la famille des malvacées, qui a des rapports avec les *plagianthus*, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, stipulacées, dont les fleurs sont axillaires & les pédoncules écailleux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à trois ou cinq dents; une corolle à cinq pétales; un très-long style; un stigmate

à deux lobes ; une capsule coriace , à deux loges ; cinq à neuf étamines.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant , d'une seule pièce , divisé à son orifice en trois ou quatre dents aiguës.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, obtus, ondulés, insérés au fond du calice, fortement réfléchis en dehors.

3°. Cinq à neuf étamines sessiles, ou dont les filamens sont réunis en un tube grêle, cylindrique, très-long, garni extérieurement de plusieurs petites glandes éparées, presque verticillées, verdâtres, assez semblables aux anthères, également verticillées, presque terminales, globuleuses, jaunâtres.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, fort petit, surmonté d'un style très-long, engainé à sa base par le tube des étamines, terminé par un stigmate charnu, épais, divisé en deux lobes.

Le fruit est une capsule coriace, ovale, enveloppée par le calice, à deux loges, à deux semences ovales, convexes d'un côté, planes de l'autre.

#### E S P È C E.

1. QUARARIÉ de la Guiane. *Quararibea guianensis*. Aubl.

*Quararibea guianensis*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 692. tab. 278. — Lam. Illustr. Gen. tab. 571. — Juss. Gener. Plant. pag. 274. — Gmel. Syst. Nar. vol. 2. pag. 1014.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de huit à dix pieds, & dont le tronc n'a que trois ou quatre pouces de diamètre. Son écorce est grise, son bois blanc, peu compacte ; il se divise en branches flexibles, droites, longues, rameuses, garnies de feuilles alternes, molles, lisses, vertes, entières, ovales, aiguës, soutenues par des pétioles courts & renflés, munis à leur base de deux stipules très caduques. Les plus grandes feuilles ont neuf pouces de longueur sur trois de largeur.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, depuis deux jusqu'à cinq à chaque feuille, vers le sommet des rameaux : elles sont supportées par des pédoncules courts, chargés de plusieurs petits corps glanduleux, verdâtres, presque en forme d'écaillés. Leur calice est rude, coriace, long d'environ un pouce & demi, divisé en trois ou cinq dents, quelquefois fendu d'environ un tiers à un de ses côtés. La corolle est blanche, composée de cinq pétales longs, étroits, ondulés, attachés au fond du calice par un onglet, & for-

tement réfléchis en dehors. Les étamines, au nombre de cinq à neuf, sont situées vers l'extrémité d'un tube fort grêle, cylindrique, long de quatre pouces & plus, terminé & garni à différentes distances de petites glandes verdâtres, concaves, arrondies. Le style est beaucoup plus long que les étamines, enveloppé à sa base par leur tube, terminé par un stigmate vert, arrondi, divisé en deux lobes.

L'ovaire se convexait en une capsule longue d'un pouce & demi, sur un demi-pouce de diamètre, lisse, coriace, verdâtre, enveloppée en partie par le calice persistant, séparée en deux loges par une cloison membraneuse, à laquelle est attachée de chaque côté une amande dure, longue d'environ un pouce.

Cette plante croît dans la Guiane, sur les bords des rivières d'eau douce. Son écorce est filamenteuse, & peut servir à faire des liens. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

QUASSIER. *Quassia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs polypétales, de la famille des magnolières, voisin des *ochne*, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, ailées, dont les fleurs, souvent monoïques, sont paniculées, axillaires ou terminales. L'écorce est amère : il en distille une liqueur laiteuse.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales ; cinq capsules monoïques, à une loge ; un réceptacle charnu, garni de dix écailles ; dix étamines libres.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, court, à cinq folioles ovales.

2°. Une corolle composée de cinq pétales lancéolés, égaux, oblongs, sessiles.

3°. Dix étamines, dont les filamens sont égaux, filiformes, plus longs que la corolle, terminés par des anthères oblongues, inclinées.

4°. Un ovaire à cinq lobes ovales, inséré sur un réceptacle charnu, orbiculaire, environné de dix écailles ; le style est filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple. Cet ovaire est stérile dans un grand nombre de fleurs.

Le fruit consiste en cinq capsules ovales, écartées entr'elles, allongées, un peu charnues, à une seule loge, renfermant une semence solitaire & globuleuse.

Observations. Les espèces qui composent ce genre ne se conviennent essentiellement que par le calice, la corolle, la nature & la disposition des fruits,

divisés en plusieurs capules, qui sont presque des drupes, ayant la plupart une enveloppe un peu pulpeuse: le nombre de ces capules varie de trois à cinq, les étamines de cinq à dix. Dans le *quassier simarouba*, les fleurs sont monoïques; elles sont polygames dans le *quassier élevé*. Le nombre des écailles inférées sur le réceptacle charnu est de cinq à dix, relativement au nombre des étamines.

## ESPÈCES.

1. QUASSIER arder. *Quassia amara*. Linn. f.

*Quassia floribus hermaphroditis; foliis imparipinnatis; foliolis oppositis, sessilibus; petiolo articulatissimo; floribus racemosis*. Linn. f. Suppl. pag. 333. — Lam. Illustr. Gen. tab. 343. fig. 1.

*Quassia amara*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 475. n. 1. — Mater. médic. 114. — Amoen. acad. vol. 6. pag. 421. tab. 419.

*Nux americana, foliis alatis bifidis.* ? Commel. Hort. 1. pag. 149. tab. 77.

C'est, d'après Linné fils, un arbre élevé (qui conserve toujours la forme d'un arbrisseau, selon Willdenow), dont les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de trois ou cinq folioles opposées, sessiles, ovales ou elliptiques, acuminées à leurs deux extrémités, entières à leurs bords, veinées, très glabres. Les pétioles sont ailés, membraneux, comme dans les citronniers, articulés à l'insertion des folioles.

Les fleurs sont disposées en grappes allongées, presque unilatérales. Ces fleurs sont écartées les unes des autres, munies de bractées linéaires; le calice est très-petit, à cinq folioles ovales et les pétales épais, assez grands, tous redressés, ovales, oblongs, presque obus; les filamens beaucoup plus longs que la corolle; le réceptacle charnu, sensil et dépassant le calice, supportant l'ovaire, à cinq lobes séparés, rapprochés par leur base, ovales, obtus, très-glabres.

Cette plante croît à Surinam. ♀

Cette plante est très-rare, dit Willdenow: son bois l'emporte sur les autres espèces de ce genre par son amertume. Celui qui a cours dans le commerce ne provient point de cet arbre, mais du *quassia excelsa*, qui lui est très-inférieur; aussi a-t-il aujourd'hui beaucoup perdu de son ancienne réputation. Lond. Act. Soc. Hist. Nat. Haf. 1. p. 2. pag. 68.

2. QUASSIER simarouba. *Quassia simarouba*. Linn. f.

*Quassia floribus monoïcis; foliis abrupte pinnatis; foliolis alternis, subpetiolatis; petiolo nudo, floribus paniculatis*. Linn. f. Suppl. 234. — Lam. Illustr. Gen. tab. 343. fig. 2.

*Simarouba amara*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 359. tab. 331 & 332.

*Simarouba*. Aublet. Act. Paris. 1776.

*Evonymus frutia nigro, tetragono, vulgè simarouba*. ? Barrère. Franc. équinox. pag. 50.

C'est un arbre dont le tronc est revêtu d'une écorce, de laquelle distille un suc amer, laiteux & jaunâtre. Ses rameaux sont d'un brun noirâtre, garnis de feuilles ailées, alternes, amples, composées de folioles alternes, sans impaire, presque entières, au nombre de douze à quatorze, très-glabres, ovales, lancéolées, acuminées à leur sommet, aiguës à leur base, entières à leurs bords, longues de quatre à cinq pouces, sur un pouce & demi de large; fermes, coriaces, d'un vert foncé à leurs deux faces. Le pétiole commun est cylindrique, très-glabre, toide, long d'un pied & plus, nu dans la partie inférieure.

Les fleurs sont disposées en une panicule ample, axillaire; elles sont monoïques. Les fleurs mâles ne diffèrent des femelles que par la forme des étamines, qui sont d'ailleurs dépourvus de style & de stigmate; les étamines manquent dans les fleurs femelles. Le calice est court, divisé en cinq dents aiguës. La corolle blanche, composée de cinq pétales lancéolés, inférés sur le calice; à l'ovaire à cinq lobes, le style à cinq filices; le stigmate divisé en cinq rayons ovaires, en étoile; le réceptacle épais, charnu, à cinq filices, environné de dix écailles velues. Le fruit consiste en cinq capules un peu charnues, de la forme & de la grosseur d'une olive, écartées entr'elles, contenant chacune une semence ovale.

Cette plante croît dans les lieux sablonneux de l'Amérique méridionale, dans la Guinée, à la Jamaïque, dans la Caroline, &c. (V. f. comm. Dupuis.)

L'usage que les naturels du pays faisoient depuis long-temps de l'écorce des racines de cet arbre dans les fièvres & les diarrhées, a fait naître l'idée d'essayer le même remède en Europe pour les mêmes maladies. On retire, de la décoction, de grands avantages dans les dysenteries & les diarrhées.

3. QUASSIER élevé. *Quassia excelsa*. Swartz.

*Quassia floribus polygamis, pentandris, paniculatis; foliis imparipinnatis; foliolis oppositis, petiolatis, petiolo nudo*. Swartz. Act. Holm. 1788. pag. 301. tab. 8. — Prodr. pag. 67. — Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 742.

*Quassia polygama*. Ad. Edimb. 3.

Cet arbre est revêtu d'une écorce cendrée, d'un blanc jaunâtre intérieurement: le bois est blanc & dur; les rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, éparies,

éparfés, ailées, avec une impaire ; compofées de neuf à treize folioles oppofées, elliptiques, acuminées, très-entières, glabres à leurs deux faces, munies à la bafe des pétioles de ftilipules petites, lancéolées, caduques.

Les fleurs font difpofées en grappes axillaires, paniculées, divifées en rameaux dichotomes, diftus, étalés, terminés par de petites fleurs nombreuses, polygames, les unes mâles, ne contenant que les rudimens d'un ovaire ftérile ; les autres hermaphrodites, dont le calice eft compofé de cinq folioles coniques, ovales ; cinq pétales blanchâtres, oblongs, obtus ; cinq étamines légèrement velues ; trois capfules ou drupes globuleux, à une loge, à deux valves, portés fur un réceptacle charnu, muni de cinq écailles ciliées.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les forêts, aux lieux montagneux. (J. Defcript. ex Swartz.)

**QUATELÉ.** *Lecythis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polygérales, de la famille des myrtes, qui a des rapports avec les *couaripita* d'Aublét, & qui comprend des arbres ou arbufles exotiques à l'Europe, dont les feuilles font alternes ; les fleurs en épis terminaux ou axillaires, dont les pédoncules font munis de bractées.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice à fix folioles ; une corolle à fix pétales ; un difque ligulé, dans l'intérieur duquel font placées les éamines ; une capfule ligneufe, operculée, s'ouvrant tranfverfalement à l'opercule, de quatre ou de deux à fix loges, contenant chacune des fémences prefque folitaires.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice compofé de fix folioles concaves, perfiftantes, un peu arrondies.

2°. Une corolle à fix pétales grands, planes, oblongs, obtus, dont deux fupérieurs plus étendus.

3°. Des éamines nombreuses, dont les filamens font courts, renfés fupérieurement, terminés par des anthères petites, oblongues.

Il exifte, dans le centre de la corolle, une forte de difque cortice, inféré fur le calice & fous la corolle, en forme de pétale ; perforé dans fon milieu pour le paffage de l'ovaire & du ftyle, entier à fon bord, garni d'éamines intérieurement, fe prolongeant en une languette laterale, arquée, membraneufe, large, alongée, à deux lames épaiffes à fon fommet, qui eft muni de papilles ou petites lames imbriquées.

4°. Un ovaire à demi-inférieur, un peu comprimé, Botanique, Tome VI.

acuminé, furmonté d'un ftyle conique, & terminé par un ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule ligneufe, à demi-inférieure, ordinairement à quatre loges, plus rarement à deux ou à fix, de groffeur & de forme très-variables, environnée vers fon fommet, mais bien au dedous, des telfes du calice, s'ouvrant tranfverfalement par un opercule qui forme intérieurement, par le prolongement de fon centre, un réceptacle anguleux, central, & qui s'unit aux cloifons de la capfule. Chaque loge contient ordinairement une feule fémence anguleufe, revêue d'une enveloppe membraneufe, inférée fur le réceptacle.

#### E S P È C E S.

1. QUATELÉ à grandes fleurs. *Lecythis grandiflora*.

*Lecythis foliis petiolatis, oblongis, acutis, integerrimis ; racemis axillaribus terminalibusque, petiolo minutissimis longioribus, petalis oblongis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 113. n°. 3. — Lam. Illust. Gener. tab. 476.

*Lecythis (grandiflora), foliis ovatis, forum pedunculatis crassis.* Aublet. Guian. vol. 2. pag. 112. tab. 183. 184. 185.

Arbre d'une hauteur affez confidérable, dont les rameaux font étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolees, glabres, ronds, très-entières, ovales, oblongues, aiguës, un peu ondulées à leurs bords, longues d'environ fept pouces, larges de fix à fept, travées en dedous par une côte faillante. Les fleurs naiffent dans l'aiffelle des feuilles & à l'extrémité des rameaux, où elles forment des grappes beaucoup plus longues que les pétioles : les pédoncules font épais, particulièrement vers leur fommet ; garnis de petites bractées caduques.

Les folioles calicinales font épaiffies, concaves, larges, un peu arrondies, de couleur rougeâtre à l'extérieur. La corolle eft d'une belle couleur de rofe, compofée de fix pétales obtus, dont deux plus grands, attachés au réceptacle par des onglets épais & charnus. Le difque qui fupporte les éamines eft également rouge, chargé en dedous d'un grand nombre de petites lames étroites & pointues.

Le fruit eft une capfule en forme d'urne, dure, épaiffe, ligneufe, haute d'environ fept pouces, large de quatre pouces & plus, arrondie à la partie inférieure, convexe & terminée en pointe à fon fommet, mife vers le haut d'un rebord ligneux & faillant, formé par les impreffions du calice ; recouvert par une opercule convexe, pointue ; protonge intérieurement en un réceptacle conique & anguleux, qui fupporte des amandes oblongues, irrégulières, bonnes à manger.

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane.  
 h (Descript. ex Aubl.)

2. QUATELÉ amér. *Lecythis amara*.

*Lecythis foliis petiolatis, oblongis, acuminatis, integerrimis; racemis axillaribus terminalibusque, petiolo duplo longioribus, petalis acutis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1173. n°. 4.

*Lecythis (amara), foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; fructu parvo, nucleo amaro.* Aublet. Guian. vol. 2. pag. 716. tab. 286.

Vulgairement petite marmite de finge.

Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze pieds. Son tronc se divise à la partie supérieure en branches droites & horizontales, & en rameaux penfants, garnis de feuilles alternes, pétioles, fermes, épaisses, glabres, ovales, oblongues, acuminées, très-entières. Les fleurs sont axillaires, terminales, disposées en grappes une fois plus longues que les pétioles. Les pédoncules qui les supportent, sont courts, munis à leur base de trois petites bractées en forme d'écaïles.

La corolle est jaune, petite, composée de six pétales aigus. Le fruit est une capsule de la grosseur d'un œuf, dure, mince, ligneuse, en forme de pot. L'opercule se prolonge intérieurement & à son centre en un réceptacle à quatre angles, auxquels se réunissent les cloisons des quatre loges, contenant chacune une amande oblongue, anguleuse, amère, dont les sînges se nourissent.

Aublet cite une variété de cet arbre, dont les capsules sont plus petites, & souvent comprimées à un de leurs côtés, & dont les pédoncules sont munis d'une seule bractée.

Ces arbres croissent dans les forêts de la Guiane.  
 h (Descript. ex Aubl.)

3. QUATELÉ à petites fleurs. *Lecythis parviflora*.

*Lecythis foliis petiolatis, oblongis, acuminatis, integerrimis; racemis paniculatis, terminalibus; petalis acutis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1174. n°. 7.

*Lecythis (parviflora), foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; fructu parvo, biloculari; operculo cum appendice lignoso, intus productâ.* Aublet. Guian. vol. 2. pag. 717. tab. 287.

Cette espèce est un arbrisseau dont le tronc s'élève à peine à la hauteur de trois ou quatre pieds, divisé en rameaux épars, inclinés vers la terre, garnis de feuilles alternes, ovales, pétioles, fermes, aigües, entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, paniculées, d'une odeur très-agréable.

La corolle est petite, d'un beau jaune doré. Le

fruit est une petite capsule en forme de pot, mince, cassante, peu ligneuse. Son opercule produit à son centre intérieurement un réceptacle auquel se réunit une cloison mince, ferme & large, qui divise la capsule en deux loges, contenant chacune une amande oblongue, anguleuse, attachée à la partie supérieure de la cloison; ces amandes sont fort amères, & recherchées par les sînges; l'opercule & les cloisons formant un seul corps, tombent ensemble.

On rencontre cette plante dans la Guiane, fur le bord des rivières. h (Descript. ex Aubl.)

4. QUATELÉ idatimon. *Lecythis idatimon*.

*Lecythis foliis petiolatis, oblongis, acutis, integerrimis; racemis axillaribus, pedunculis glandulosis, petalis obtusis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1173. n°. 6.

*Lecythis (idatimon), foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; fructu parvo, quadriloculari.* Aublet. Guian. vol. 2. pag. 721. tab. 289.

5. *Lecythis (lutea), foliis lanceolatis, oblongis, acuminatis; flore parvo.* Aublet. Guian. vol. 2. pag. 721. n°. 6.

Cette espèce, assez semblable à *Lecythis tabacica* par sa grandeur, par la forme de ses feuilles, en diffère par ses grappes de fleurs axillaires & non terminales, par ses pétales obtus, ses pédoncules glanduleux, & par ses fruits beaucoup plus petits, à quatre loges au lieu de six.

Cet arbre s'élève à la hauteur de soixante pieds au moins : il se divise en branches & en rameaux étalés, garnis de feuilles glabres, entières, oblongues, aigües. Les fleurs font axillaires vers l'extrémité des rameaux, & forment des grappes presque simples, ayant le pédoncule commun poissé & chagriné dans toute sa longueur; les pédoncules particuliers simples, rougeâtres, chargés de points glanduleux, blanchâtres, très-nombreux, & rapprochés un peu au dessous du calice.

Les folioles calicinales sont charnues, concaves, aigües, veinées de rouge. La corolle se divise en six lobes inégaux, de couleur de chair, obtus, dont deux, réunis latéralement, recouvrent les deux lobes latéraux. Ces derniers font plus grands, & enveloppent la languette du disque, qu'est d'une belle couleur de rose. Les étamines occupent en entier la circonférence interne du disque; les filaments sont fort courts & blancs, comme dans les autres espèces; les anthères jaunes & fort petites. La capsule est ligneuse, ovale, en forme de pot operculé, fort petite, n'ayant qu'un pouce de haut, sur un & plus de diamètre; elle se divise en quatre loges qui contiennent chacune une amande brune, oblongue & amère.

Cet arbre croît dans les forêts désertes de la

Guiane, après le deuxième faut de la rivière de Sinémari. Les Galibis le nomment *idatimon*.  $\mathfrak{H}$  (*Descript. ex Aubl.*)

5. QUATELÉ zabucaïe. *Lecythis zabucaia*.

*Lecythis foliis petiolatis, lanceolatis, acuminatis, integerrimis; racemo terminali, petalis acutis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1173. n°. 5.

*Lecythis (zabucaia), foliis lanceolato-oblongis, acuminatis; fructu magno, multo eduli.* Aubl. Guian. vol. 2. pag. 718. tab. 288. *exclusa synonymis.*

Vulgairement grande marmite de finge.

C'est un grand arbre dont le tronc s'élève à plus de soixante pieds de haut, sur deux pieds & plus de diamètre, revêtu d'une écorce grise & raboteuse. Son bois, rougeâtre dans le centre, est blanc à la circonférence; il se divise en branches étalées & en rameaux garnis de feuilles pétiolées, alternes, très-entières, lancéolées, oblongues, acuminées, fermes, lisses, d'un vert pâle, longues de dix pouces, larges de deux & demi, supportées par un pétiole court, creusé en gouttière. Les fleurs sont terminales, disposées en grappes pendantes, munies chacune d'un pédoncule épais, garni à sa base d'une petite bractée caduque, en forme d'échelle.

Les folioles calicinales, au nombre de six, sont étroites, charnues, rougeâtres, inégales, aiguës. La corolle est composée de six pétales inégaux, larges, fort épais, charnus à leur onglet, blancs, d'une belle couleur de rose à leur contour, dont deux plus grands; les étamines très-nombreuses, portées particulièrement du côté des deux pétales plus grands, insérées sur les parois internes du disque, qui est couleur de rose.

La capsule, en forme de pot, est dure, épaisse, ligneuse, de forme ovale, arrondie à sa partie inférieure, convexe à sa partie supérieure, haute de cinq à sept pouces, sur trois ou quatre de diamètre; elle se divise en six loges qui contiennent des amandes oblongues, de forme irrégulière.

Cet arbre croît dans les forêts de l'intérieur de la Guiane.  $\mathfrak{H}$  (*Descript. ex Aubl.*)

Les Indiens emploient son écorce à former des liens pour les sardeaux. Les amandes sont douces, délicates, & préférables à celles d'Europe, selon Aublet. Les oiseaux & les singes en sont très-francs. Les Portugais font, avec les capsules, des boîtes & autres petits ouvrages travaillés au tour. Les créoles de Cayenne donnent aux fruits le nom de *canari makuque* ou *marmite de finge*.

6. QUATELÉ lancéolé. *Lecythis lanceolata*.

*Lecythis foliis petiolatis, lanceolato-acuminatis, argutis serratis; racemis lateralibus, petalis obtusis.* (N)

*Lecythis*. Commerf. Herb. & Ic.

Cette espèce se rapproche du *Lecythis zabucaia*; mais ses feuilles sont finement dentées en scie, rapports qui la rendent aussi voisine du *Lecythis minor*, dont elle diffère par la finesse des dentelures, par la petitesse des fleurs & la grandeur des fruits.

Ses rameaux sont souples, étalés, de couleur brune, glabres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, acuminées, longues d'environ trois pouces, larges d'un pouce & plus, presque chagrinées par l'élevation de leurs nervures en réseau très-agréable, d'un vert foncé & luissantes en dessus, plus pâles en dessous.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales, simples, supportées par des pédoncules courts & simples. Le calice est divisé en six folioles ovales, concaves; la corolle petite, à six pétales arrondis, blanchâtres, presque égaux. Les fruits sont très-gros, ovales, de même caractère que ceux des autres espèces de ce genre.

Cette plante est cultivée à Madagascar, où elle a été apportée du Brésil, & observée par Commerf.  $\mathfrak{H}$  (*V. f. in herb. Juss.*)

7. QUATELÉ à feuilles dentées. *Lecythis minor*. Linn.

*Lecythis foliis petiolatis, lanceolatis, serratis.* Linn. Syst. veget. 410. — Jacq. Amér. 168. tab. 109.

Cette espèce est remarquable en ce qu'elle a des feuilles fortement dentées en scie: les fruits sont assez petits.

Cet arbre parvient à la hauteur de soixante pieds & plus, sur un tronc droit, divisé en rameaux souples & longs, garnis de feuilles pétiolées, oblongues, lancéolées, glabres, dentées en scie à leurs bords, longues d'un pied & demi. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, avec une ou deux axillaires, simples, grasses; les pédoncules propres, très-courts, épais, uniflores.

Le calice est divisé en six folioles concaves, obtuses, fort petites. La corolle est grande, de couleur blanche, médiocrement odorante; les fruits sont très-durs, d'un brun roussâtre, ayant environ deux pouces de diamètre; souvent plusieurs des loges avortent: elles contiennent ordinairement deux ou trois semences chacune.

Cette espèce croît en Amérique, dans les environs de Carthagène.  $\mathfrak{H}$  (*Descript. ex Jacq.*)

8. QUATELÉ à feuilles sessiles. *Lecythis ellaria*.

*Lecythis foliis sessilibus, cordato-ovatis, subintegerrimis.* Linn. System. veget. pag. 410. — L'zf. lter, pag. 189.



*Jacupucaya*. Marteg. Basil. 128. — Pison. Brasil. pag. 135. Icon.

Cette espèce se distingue à ses feuilles sessiles, presque entières, & à ses fruits, remarquables par leur grosseur & par leur forme.

C'est un arbre très-élevé, dont l'écorce est dure, gristée, gerlée; les rameaux sont étalés, tortueux, garnis de feuilles alternes, sessiles, ovales, en cœur, presque entières ou légèrement denticulées à leurs bords. Les fruits sont très-gros; ils ont la forme d'une marmite ventrue, & offrent d'ailleurs les caractères des autres espèces dans leur fructification.

Cet arbre croît au Brésil. On fabrique avec ses capsules plusieurs ustensiles de ménage. h

QUÉBITE de la Guiane. *Quebites guianensis*. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 859. tab. 327.

C'est une plante dont les parties de la fructification sont encore peu connues, & qu'Aublet soupçonne très-rapprochées des *dracontium*.

D'après cet auteur, les racines de cette plante sont garnies de fibres longues, roussâtres, qui s'enfoncent dans le limon sablonneux des bords des ruisseaux: elles produisent une tige qui rampe sur la surface de la terre; elle est torueuse, couverte de poils roussâtres, & garnie de feuilles alternes, éparées, horizontales, ovales, pétioolées, plus ou moins allongées, vertes, tachetées de rouge & herissées de poils roussâtres, particulièrement sur les nervures; saillantes en dessous, supportées par un pétiole cylindrique, court & velu.

A l'extrémité des tiges, un peu au dessus du pétiole, s'élève un petit épi de fleurs cylindriques: ces fleurs sont fort petites, très-pressées les unes contre les autres. Leur pedoncule est court, muni d'une écaille qui paroît avoir servi de spathe aux fleurs avant leur développement.

Cette plante croît aux bords des ruisseaux, dans les grandes forêts de la Guiane. Les Galib's la nomment *duquojaibite*. Lorsqu'on en mâche les racines, elles laissent dans la bouche une impression très-piquante. Les naturels emploient son suc à l'extérieur contre la morsure des serpents.

QUENOUILLETTE. *Arahydis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des *cinarosphéales*, qui a des rapports avec les *carthames*, & comprend des herbes épineuses, tant exotiques qu'indigènes, dont les tiges sont biffes dans la plupart, les fleurs solitaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un double calice; l'extérieur lâche, pinnatifide,

très-épineux, plus long que l'intérieur; une aigrette plumeuse, sessile; le réceptacle garni de paillettes.

# CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées, quelquefois radiées, hermaphrodites; elles offrent :

1°. Un double calice: l'extérieur composé de plusieurs folioles lâches, pinnatifides, épineuses, enveloppant le calice intérieur, & beaucoup plus longues que lui; l'intérieur ovale, imbriqué, composé d'écailles oblongues, lancéolées.

2°. Une corolle composée, quelquefois radiée; les fleurons du centre tubuleux, infundibuliformes, à cinq divisions aigriés à son limbe: les demi-fleurons de la circonférence ligulés; la languette plane, à cinq dents profondes, très-aigües: ils manquent dans plusieurs espèces.

3°. Cinq étamines synergènes, dont les filamens sont courts & capillaires; les anthères réunies en un cylindre.

4°. Un ovaire court, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate bifide ou simple.

Les semences sont turbinées, un peu comprimées, surmontées d'une aigrette plumeuse, & insérées sur un réceptacle plane, garni de paillettes.

Observations. Il est difficile de donner à ce genre d'autres caractères constants, 1°. qu'un calice double, l'extérieur étant composé très-ordinairement de folioles pinnatifides, épineuses, disposées en forme d'involucre ou de collerette, ayant souvent beaucoup de rapports avec la forme des feuilles; 2°. un réceptacle garni de paillettes, quoique Linne l'indique comme sétacé. Toutes les espèces que j'ai pu observer m'ont offert des paillettes sur leur réceptacle.

Si l'on s'attache aux caractères de la corolle, il sera difficile de conserver la plupart des espèces de ce genre; & si l'on essaie de les faire entrer dans d'autres, d'après cette considération, elles en seront rejetées à cause de leur calice & de leur réceptacle: les uns sont radiées, & ont cependant toutes leurs fleurs hermaphrodites; d'autres présentent des fleurs stériles à leur circonférence; d'autres enfin ne sont composées que de fleurons fertiles.

Nous avons donc cru, d'après ces considérations, devoir exclure la corolle du caractère essentiel de ce genre, & nous en tenir à ceux que nous venons d'indiquer; mais en même temps nous avons été forcés de rappeler quelques espèces que M. Lamarck avoit rangées parmi les *carthames*, d'après le caractère de leur corolle, mais auxquels

elles ne peuvent convenir par la différence de leur calice & de leur réceptacle.

ES P È C E S.

1. QUENOUILLETTE gommifère. *Atraäthylis gummifera*. Linn.

*Atraäthylis acaulis, foliis pinnatifido-finnatis, inaequaliter dentatis, spinofis; foliis calicinis exterioribus tricuspidatis*. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 252. — Idem. Adc. Soc. Nat. Parif. 49. — Cavan. Icon. n°. 250. tab. 228.

*Atraäthylis flore acauli*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1161. — Millet. Dict. n°. 3. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 234.

*Cnicus carlina, folia acaulis, gummifera, aculeatus*. Tournef. Coroll. pag. 33.

*Carlina acaulis, gummifera*. C. Bauh. Pin. 380.

*Carlina acaulis, flore speciosa, purpurea, non radiata; radice gummifera, fucco ulia & rubro*. Schaw. Specim. n°. 114.

*Chamaelea apulus, purpureo flore, gummifera*. Col. Echpr. 12. Icon.

*Carduus pinas Theophrasti*. Pt. Alpin. exot. Icon. 124 & 125, abfque foliis.

*Crocodylides acaulis, gummifera*. Vaillant. Adc. Acad. Parif. 1718. pag. 162.

*Carduus violaceus, gummifera, humilis*. Morif. Oxon. Hill. 3. §. 7. tab. 33. fig. 11.

*Carthamus gummiferus*. Lam. Dict. n°. 12.

A. *Atraäthylis* (macrocephala), acaulis, foliis pinnatifidis, lobatis; lobis inaequaliter dentato-spinofis; foliis calicinis exterioribus planis, margine aculeato-ciliatis. Desfont. Hor. atl. vol. 2. pag. 253.

Ses racines font charnues, blanchâtres, laiteufes, fufiformes, très-fimples; elles pouffent de leur collet un grand nombre de feuilles difpofées en rosette, étalées fur terre, divifées en découpures très-profondes, prefque pinnatifides, inégalement dentées, chaque dent terminée par une épine roide & jaunâtre; un peu blanchâtres en dedous, quelquefois légèrement pubefcentes, fupportées par des pétioles canaliculés, épineux à leurs bords.

Du centre des feuilles s'élève une fleur fufille ou médiocrement pédonculée, ordinairement folitaire, aflez groffe, environnée de bractées oblongues, obtufes, épineufes à leurs bords. Le calice extérieur eft compofé de folioles prefque planes, fouverit élargies vers leur fommét, un peu tomenteufes, roides, garnies d'épines droites à leur contour, dont trois fupérieures, ordinairement plus fortes & diftinctes. Le calice intérieur

eft imbriqué, cylindrique, compofé d'écaillés ovales, oblongues, un peu étroites, terminées par une épine courte; les intérieures plus longues, linéaires, obtufes. La corolle n'eft point radiée. Les fleurons, de couleur violette, font tous hermaphrodites; le ftigmate eft fimple, les femences oblongues, un peu velues, furmontées d'une aigrette rouffe, blanche, feffile, plumeufe à la bafe; le réceptacle concave, chatou, garni de paillettes blanchâtres, luifantes.

La plante A peut être regardée comme une variété. Les têtes de fleurs font du double plus groffes; les folioles du calice extérieur plus larges, planes, très-épineufes à leurs bords.

J'ai recueilli cette plante & fa variété dans les plaines fableufes du royaume de Tunis. x (V. v.)

Il découle des têtes de fes fleurs & du collet de fes racines un fuc gommeux d'un jaune pâle, qui adhère aux folioles du calice & aux feuillets. Les Maures le recueillent, & en font une forte de glu pour la chaffe des petits oifeaux. Ses racines & le réceptacle de fes fleurs, cuits à l'eau & préparés avec du beurre ou de l'huile, fourmillent, dit M. Desfontaines, un très-bon aliment.

2. QUENOUILLETTE à tiges courtes. *Atraäthylis humilis*.

*Atraäthylis foliis dentato-finnatis, flore radiata, abvallato, involucre, patete; caule herbaceo*. Linn. Syft. Plant. vol. 3. pag. 696. n°. 2. — Milier. Dict. n°. 2. — Lam. Illuftr. Genet. tab. 660. — Gouan. Illuftr. & Obferv. botan. — Cavan. Icon. n°. 60. tab. 54.

*Atraäthylis radiata, squamis calicinis truncatis, cum spinulâ fetudâ*. Lx. luer. pag. 161.

*Crocodylides atraäthylidis folia, flore purpureo, caranata*. Vaill. Adc. Parif. 1718. pag. 172.

*Cnicus aculeatus, purpureus, humilior*. Tournef. Infl. R. Herb. 451.

6. *Carlina minima, caulodes, hispanica*. Barrel. Rat. pag. 1127. tab. 592.

Cette efèce a des tiges peu élevées, roides, flêries, glabres, à peine rameufes, quelquefois prefque nulles, depuis deux à trois pouces jufqu'à fix ou huit de haut, garnies de feuilles alternes; les caulinaires feffiles, lancéolées, finuées à leurs bords, à dents inégales, épineufes, vertes, glabres: ces mêmes feuillets, mais plus étroites, forment l'involucre ou le calice extérieur des fleurs.

Celles-ci font terminales, folitaires: le calice intérieur eft compofé d'écaillés ovales, imbriquées, très-obtufes, & même tronquées à leur fommét, qui fe terminent par une épine roide,

longue, sétacée, insérée dans le milieu. Les fleurs sont de couleur purpurine, radiées à leur contour; les semences sont velues, surmontées d'une aigrette plumée. Le réceptacle est garni de paillettes blanchâtres, longues, étroites, subulées à leur sommet.

La variété *c* se distingue par ses tiges très-basses, & par ses écailles calicinales, ovales, & non tronquées à leur sommet.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Narbonne, & en Espagne, sur les collines arides. *c* (V. v.)

### 3. QUENOUILLETTE cancellée. *Atractylis cancellata*.

*Atractylis involucris cancellatis, ventricosis, linearibus, dentatis; calicibus ovatis, floribus flocculosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1162. — Mill. Dict. n°. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 253. — Poiret. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 235.

*Cnicus exiguus, capite cancellato, semine tomentoso*. Tournef. Inst. R. Herb. 451. — Schaw. Spec. n°. 161.

*Crocodilodes exigua, purpurascens flore*. Vaill. Act. Acad. Paris. 1718. pag. 162.

*Atractylis foliis linearibus, dentatis; calicibus connatis*. Hort. Clifford. 395. — Roy. Lugd. Bat. 137.

*Atractylis flore radiata, nudo; calice inermi, involucro connivente, abulsa*. Lxfl. Iter, pag. 162.

*Acarna capitulis globosis*. Bauh. Pin. 379.

*Carthamus cancellatus*. Lam. Dict. n°. 11.

En considérant le calice extérieur, pinnatifide, comme le principal caractère de ce genre, & non la corolle rasée, nous devons rappeler ici cette espèce, déjà mentionnée dans le genre *carthame*, ainsi que nous l'avons fait pour l'*atractylis gummifera*.

Ses tiges sont cylindriques, lanugineuses, blanchâtres, lisses, & d'un roux clair lorsqu'elles ont perdu leur duvet; elles s'élèvent peu, & se divisent en quelques rameaux étalés, garnis de feuilles caulinaires, alternes, sessiles, étroites, lancéolées, blanchâtres, médiocrement lanugineuses, entières, dentées à leurs bords; chaque dent très-courte, terminée par une épine jaunâtre.

Les fleurs, situées à l'extrémité des rameaux, & presque solitaires, forment, par leur ensemble, presque un corymbe lâche. Le calice extérieur est composé de plusieurs folioles, dont les divisions, profondes, filiformes, pinnatifides, sont arquées, un peu lanugineuses, & se réunissent toutes en une tête globuleuse, & présentent un réseau assez agréable & délicat. Le calice intérieur est ovale,

cylindrique, légèrement tomentueuse, composé d'écailles fortement imbriquées, lineaires, entières, obtuses, quelquefois aiguës. Les corolles sont violettes, presque point radiales; cependant elles offrent quelques demi-fleurs stériles à leur circonférence, qui manquent fort souvent. Les semences sont oblongues, foveuses; le réceptacle garni de paillettes sétacées.

Cette plante croît sur les rochers arides en Espagne, dans l'île de Crète. Je l'ai également recueillie en Barbaie. *o* (V. v.)

### 4. QUENOUILLETTE en gazon. *Atractylis cespitosa*. Desfont.

*Atractylis caule prostrata, ramofo; foliis linearibus, glaberrimis, confertissimis, inaequaliter serrato-spinatis*. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 254. tab. 225.

Les anciennes tiges sont dures, presque ligneuses, nues, couchées, disposées en gazon serré; elles produisent un grand nombre de rameaux peu élevés, diffus, garnis de feuilles éparées, très-rapprochées, roides, glabres, sessiles, très-étroites, lineaires, lancéolées, longues au plus d'un à deux pouces, très-aiguës, rétrécies à leurs deux extrémités, munies à leurs bords de petites dents épineuses. Les fleurs sont terminales.

Le calice extérieur est composé de folioles étroites, lâches, aiguës, divisées à leurs bords en découpures profondes à la partie intérieure, & terminées par deux ou trois dents aiguës, épineuses; leur partie supérieure est entière, munie de cils spinuliformes. Le calice intérieur est cylindrique, composé d'écailles lineaires, elliptiques, glabres, entières, imbriquées, obtuses, arrondies à leur sommet, & terminées par une longue pointe roide & subulée. Les fleurs sont d'un violet pâle, routes hermaphrodites & bisculéuses, divisées à leur ovide en cinq dents courtes, aiguës, droites, à peine plus longues que le calice. Le stigmate est simple, presque en masse; les semences oblongues, lanugineuses; l'aigrette sessile & plumée; le réceptacle garni de paillettes luisantes, divisées à leur partie supérieure en découpures égales, sétacées, de la longueur des fleurs.

J'ai recueilli cette plante assez avant dans les terres, en face de l'île de Tabarque; elle croît aussi dans les environs de Constantine & de Tlemcen, dans le royaume de Tunis, où elle a été observée par M. Desfontaines. *x* (V. v.)

### 5. QUENOUILLETTE amplexicaule. *Atractylis amplexicaulis*.

*Atractylis foliis caulinis amplexicaulis, integris, cordato-lanceolatis; calicibus exterioris foliis linearibus, lanceolatis; floribus subsolitariis*. (N.)

Ses tiges sont blanchâtres, droites, striées, cylindriques, garnies de feuilles très-rapprochées, rondes, sessiles, amplexicaules, échancrées en cœur à leur base, entières, très-aiguës, épineuses à leur contour, lancéolées, glabres, d'un vert blanchâtre à leurs deux faces, à nervures saillantes, longitudinales & médiocrement rameuses.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires, médiocres; les folioles du calice extérieur sont étroites, lancéolées, médiocrement pinnées, glabres, un peu plus longues que les écailles intérieures.

Cette espèce a été recueillie par M. Sonnerat au Cap de Bonne-Espérance.  $\times$  (V. f. in herb. Lamack.)

6. QUENOUILLETTE à fleurs jaunes. *Atractylis flava*. Desfont.

*Atractylis caule simpliciter, tomentoso; foliis lanceolatis, dentato-spinosis; floribus radiatis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 154.

Cette plante a des tiges simples, droites ou couchées, tomenteuses, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles rondes, presque sessiles, lancéolées, lanugineuses, canaliculées, munies à leurs bords de dents épineuses, jaunâtres. Les fleurs sont solitaires, terminales, environnées d'un double calice.

Le calice extérieur est composé de folioles lancéolées, très-longues; les extérieures tomenteuses, étroites, subulées à leur sommet, épineuses, dentées à leurs bords; chaque dent munie de trois ou cinq épines. Le calice intérieur est cylindrique, tomenteux, imbriqué d'écailles serrées, linéaires, lancéolées, membraneuses à leurs bords, obtuses & épineuses à leur sommet. Les fleurs sont jaunes, radiées; les demi-fleurons de la circonférence femelles, au nombre de sept à huit, linéaires, stériles; les fleurons hermaphrodites, nombreux; un stigmate simple, les semences oblongues & velues, l'aigrette plumée, le réceptacle garni de paillettes setacées à leur sommet.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les plaines sablonneuses de la Barbarie, proche Siex.  $\times$  (V. f. in herb. Desfont.)

7. QUENOUILLETTE à grandes feuilles. *Atractylis macrophylla*. Desfont.

*Atractylis foliis sessilibus, ovato-oblongis, rigidis, nervosis, margini profunde dentato-spinosis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 155. tab. 226.

Cette plante a le port d'un chardon: ses tiges sont droites, simples ou médiocrement rameuses, hautes d'environ deux pieds, blanchâtres, lanugineuses, de la grosseur du petit doigt, garnies de feuilles nombreuses, éparées, ovales ou ovales-

lancéolées, sessiles, glabres ou un peu lanugineuses, nerveuses, rondes & presque membraneuses, longues de huit à dix pouces, larges de quatre ou cinq, aiguës à leur sommet, inégalement & profondément dentées; les dents souvent divisées en d'autres, épineuses.

Les fleurs sont terminales & solitaires; le calice extérieur composé de folioles lâches, étroites, courbées en dedans, enveloppant en totalité le calice intérieur, dentées; les dents terminées par une épine, quelquefois divisée en deux ou trois au res. Le calice intérieur est cylindrique, composé d'écailles imbriquées, terminées par une pointe épineuse.

Cette plante a été observée par M. Desfontaines proche Tlemcen, dans le mont Atlas.  $\times$  (V. f. in herb. D. stout.)

8. QUENOUILLETTE à feuilles ovales. *Atractylis ovata*. Thunb.

*Atractylis involucri pinnatis, foliis ovatis, ciliatis, glabris*. Thunb. Flor. japon. pag. 306.

Cette espèce a des tiges fibreuses, des tiges simples, striées, flexueuses, droites, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, aiguës, ciliées en dens de scie à leurs bords, nerveuses, velues à leur face supérieure, plus pâles en dessous, glabres; les inférieures, longues d'un pouce & demi, & supportées par des pétioles de trois ou quatre lignes, plus courts aux feuilles supérieures, dentées & ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires & terminales; leur calice extérieur, composé de folioles pinnatifides & ciliées.

Cette plante croît au Japon. (Descript. ex Thunberg.)

9. QUENOUILLETTE lancéolée. *Atractylis lancea*. Thunb.

*Atractylis involucri pinnatis, foliis lanceolatis, ciliatis, glabris*. Thunb. Flor. japon. pag. 306.

Cette plante se rapproche de l'*arctylis cancellata*, dont elle diffère en ce qu'elle est partiellement glabre, & que ses feuilles sont plus nombreuses.

Ses tiges sont droites, cylindriques, flexueuses, très-glabres, hautes d'environ un pied, divisées en rameaux alternes, sessiles, garnis de feuilles sessiles, alternes, lancéolées, aiguës, droites, glabres, longues d'un pouce, épineuses & ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, presque sessiles, situées à l'extrémité de chaque rameau: leur calice extérieur est composé de folioles pinnatifides, setacées.

Cette plante croît à Nagasaki, dans le Japon. (Descript. ex Thunb.)

10. QUENOUILLETTE à fleurs purpurines. *Atractylis purpurea*. Linn. f.

*Atractylis foliis hastatis, runcinatis*. Linn. f. Suppl. pag. 349.

Cette plante a l'aspect du *Sanchus alpinus*, auquel elle ressemble par ses feuilles haillées, décurrentes & déchiquetées le long de leur pétiole, blanches & tomenteuses en dessous, velues en dessus, longues de trois à quatre pouces. Les fleurs sont disposées sur des pédoncules longs & rameux.

Le calice commun est médiocrement imbriqué, composé de folioles linéaires, lancéolées, amincies sur leurs bords & mucronées. La corolle est purpurine & radiée : les demi-fleurons de la circonférence sont mâles, au nombre de vingt environ, divisés en trois dens à leur sommet. Les fleurons du centre sont hermaphrodites, tubulés, à cinq divisions égales & droites à leur orifice. L'ovaire est oblong, le style filiforme, le stigmate simple & obtus dans les demi-fleurons, bifide dans les fleurons ; les semences allongées, leur aigrette pileuse, & de la longueur du calice ; le réceptacle nu.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade.

Observations. Nous doutons que cette plante, dont nous venons de présenter la description d'après Linné fils, puisse appartenir aux *atractylis*, puisqu'elle paroît manquer des deux principaux caractères qui les constituent, ayant son réceptacle nu, & point de calice extérieur, Linné fils n'en faisant aucune mention.

11. QUENOUILLETTE du Mexique. *Atractylis mexicana*. Linn. f.

*Atractylis foliis oblongis, integerrimis*. Linn. f. Suppl. pag. 350.

C'est une grande plante, dont les tiges se divisent en rameaux simples, légèrement tomenteux, longs de deux pieds, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, très-entières, glabres à leur face supérieure, un peu tomenteuses en dessous. Les fleurs sont terminales & filitantes.

Le calice commun est tomenteux, composé d'écaillés imbriquées & subulées. La corolle est radiée, de couleur purpurine ; les demi-fleurons de la circonférence sont nombreux, tridentés ; le style simple, l'aigrette un peu velue, à peine plumeuse ; le réceptacle garni de paillettes très-courtes.

Cette plante croît au Mexique. (*Descript. ex Linn. f.*)

Observations. Cette plante ne convient aux *atractylis* que par son réceptacle garni de paillettes ; mais ce caractère est insuffisant, à moins

qu'elle ne soit en outre munie d'un double calice, dont Linné fils ne parle pas : ce qui nous porte à croire qu'elle en est privée.

Observations. Nous renvoyons pour l'*atractylis oppositifolia* Linn. Mantiss. 477, & Syst. veget. 730, aux articles *Gorteria carthamoides*, vol. 3. pag. 3. n°. 11 de ce Dictionnaire, & au *Carthamus africanus*, vol. 1. n°. 13 du même ouvrage.

QUÉRIE. *Queria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des *carryophyllées*, qui a les plus grands rapports avec les *minuartia*, & qui comprend des herbes tant indigènes qu'exotiques, dont les feuilles sont petites, opposées, les fleurs ramassées en têtes ou axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles ; point de corolle ; une capsule uniloculaire, à trois valves ; une seule semence.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, à cinq folioles droites, oblongues, aiguës ; les extérieures recouvertes.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont courts, capillaires, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté de trois styles aussi longs que les étamines, & terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule arrondie, uniloculaire, à trois valves, qui renferment une seule semence.

Observations. Ce genre n'est distingué des *minuartia* que par le nombre des semences ; il pourroit y être réuni sans inconvénient.

#### E S P È C E S.

1. QUÉRIE d'Espagne. *Queria hispanica*. Linn.

*Queria floribus confertis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 131. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 220. n°. 1203. tab. 52. — Ortega. Centur. pag. 112. tab. 15. fig. 1.

*Queria hispanica, bracteis patulis, hamatis*. Lxfl. Iter, pag. 48.

C'est une petite plante blanchâtre, qui a l'aspect d'un *scleranthus*, & ressemble beaucoup au *minuartia montana*. Il s'élève de ses racines des tiges hautes de deux ou trois pouces, ramifiées presque dès leur base, à rameaux presque simples, glabres, géniculés, cylindriques, garnis de

feuilles oppoſées, ſeſiles, linéaires, très-étroites, aiguës, longues de trois à quatre lignes.

Les fleurs ſont réunies en tête, latérales & terminales, environnées de bractées droites, un peu glauques, ſubulées, ſétacées à leur ſommet, & recourbées en dehors en forme d'hameçon. Les folioles calicinales reſſemblent aux bractées, mais elles ſont plus courtes & droites. Les capſules, un peu ovales, ne contiennent qu'une ſemence.

Cette plante ſe rencontre en Eſpagne. ○ (P. f.)

2. QUÉRIE DU CANADA. *Queria canadensis*. Linn.

*Queria floribus foliariis, caule dichotomo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 132. — Ortega. Centur. pag. 113. tab. 15. fig. 2.

*Mollugo foliis oppoſitis, ſtipulis quaternis, caule dichotomo*. Gronov. Virg. 14.

On diſtingue aſſément cette eſpèce de la précédente à ſes fleurs ſolitaires. Ses racines ſont fibreuſes, ſes tiges dichotomes, droites, hautes de fix à ſept pouces & davantage, roides, filiformes, cylindriques, garnies de feuilles ſeſiles, oppoſées, ovales, lancéolées, aſſez ſemblables à celles du *linum catharticum*, chargées à leurs deux faces de quelques poins noirs, munies de chaque côté de deux ſtipules droites, aiguës, membraneuſes.

Les fleurs ſont petites, ſolitaires, médiocrement pédonculées, verdâtres, ſituées dans la bifurcation des rameaux. Le calice eſt diviſé en cinq folioles concaves, un peu obruſes; les anthères ſont jaunes, l'ovaire arondi, ſurmonté de trois ſtyles.

Cette plante croît en Virginie & dans le Canada. ✕

3. QUÉRIE trichotome. *Queria trichotoma*. Thunb.

*Queria floribus racemosis, caule trichotomo*. Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 529.

*Robinia spiciis ternis*. Thunb. Flor. japon. pag. 357. n°. 44.

Ses tiges ſe diviſent en rameaux très-étalés, filiformes, glabres, trichotomes, garnis de feuilles oppoſées, légèrement pétiolées, ovales, aiguës, entières, glabres, très-ouvertes, longues de quatre à cinq lignes.

Les fleurs ſont diſpoſées en petites grappes axillaires, oppoſées, terminales, au nombre de trois, compoſées chacune de trois ou quatre petites fleurs oppoſées, caduques.

Cette plante croît au Japon. (Description. ex Thunb.) Botanique. Tome VI.

QUILLAI. *Quillaia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monoïques, dont la famille n'eſt pas encore bien connue, qui comprend des arbres ou arbuſtes exotiques à l'Europe, dont les feuilles ſont ſimples, alternes; les fleurs axillaires.

Le cataſtère eſſentiel de ce genre eſt d'avoir :

Des fleurs monoïques; un calice à cinq diviſions; point de corolle; douze étamines & plus; cinq ſtyles, cinq capſules réunies par leur baſe, à une loge, à deux valves, contenant pluſieurs ſemences ailées.

1. CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs ſont monoïques; elles oſtent chacune :

1°. Un calice court, inſéſieut, perſiſtant, à cinq diviſions ovales, pointues.

2°. Point de corolle.

3°. Douze étamines & plus dans les fleurs mâles, dont les filements ſont capillaires, de la longueur du calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Cinq ovaires dans les fleurs femelles, ovales, oppoſés aux diviſions du calice, ſurmontés par autant de ſtyles ſubulés.

Le fruit conſiſte en cinq capſules coriaces, ovales, elliptiques, ſupérieures, rapprochées par leur baſe, s'ouvrant latéralement en deux valves, à une ſeule loge, contenant pluſieurs ſemences oblongues, munies à leur ſommet d'une aile plane, membraneuſe, un peu aiguës à leur baſe, & attachées au fond de la capſule.

E S P È C E.

1. QUILLAI ſavonneux. *Quillaia ſaponaria*.

*Quillaia foliis alternis, ovato-oblongis; floribus axillaribus*. (N.)

*Quillaia ſaponaria*. Gmel. Syſt. Nat. vol. 1. pag. 767.

*Quillaia*. Molina. Chili. trad. fr. pag. 146. — Juſſ. Genes. Plant. pag. 444. — Lamarck. Illuſtr. Gener. tab. 774. — Frézier. Hiſt. pag. 127.

C'eſt un arbre d'une grandeur médiocre, dont l'écorce eſt épaiſſe, cendrée, ſavonneuſe; ſon bois eſt dur; ſon tronc ſe diviſe à ſa partie ſupérieure en branches & en rameaux alternes, garnis de feuilles périolées, alternes, aſſez ſemblables à celles du chêne vert; ovales, oblongues, entières, un peu denticulées à leurs bords, vertes à leurs deux faces & perſiſtantes.

Les fleurs ſont axillaires, les unes mâles, les autres femelles, pédonculées, ſans corolle : le calice perſiſte avec le fruit; il eſt d'une ſeule pièce, diviſé aſſez profondément en cinq découpures

ovales, aiguës, très-ouvertes. Le fruit est composé de cinq capicules, disposées en étoile; chacune d'elles s'ouvre intérieurement en une loge, &c. contient un grand nombre de petites semences ailées à leur partie supérieure.

Cette plante croît dans le Chili & au Pérou. *Hy (Vid. Fruit. in herb. Juss.)*

Cet arbre est précieux dans la Chili. Son écorce, pulvérisée & mêlée à une quantité d'eau suffisante, devient moussieuse, comme celle où l'on fait dissoudre du savon; elle sert à dégraisser les laines & les autres étoffes. On fait avec cette écorce un commerce assez considérable dans le Pérou & le Chili.

**QUINCHAMALI.** *Quinchamalium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des chales, qui a des rapports avec *thesium*, &c. comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, linéaires; à fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice inférieur, persistant, à cinq dents; une corolle tubulée, à cinq découpures; cinq anthères presqu' sessiles; une semence recouverte par le calice.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice très-court, globuleux, inférieur, divisé à son orifice en cinq dents aiguës, persistantes.

2°. Une corolle supérieure, monopétale, tubulée, dont le tube est cylindrique, allongé, terminé par un limbe plane, à cinq divisions ovales.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont presqu' nuls, insérés à l'orifice du tube, terminés par des anthères ovales, oblongues.

4°. Un ovaire inférieur à la corolle, globuleux, surmonté d'un style filiforme, terminé par un ligamate capité.

Le fruit consiste en une seule semence sphérique, inférieure à la corolle, recouverte par le calice persistant, qui lui tient lieu de péricarpe.

*Observations.* En plaçant ce genre dans la famille des chales (*clagni*), Jussieu regarde la corolle comme le véritable calice, conformément au caractère des plantes qui composent cette famille, & le calice comme un second calice inférieur, tous les autres rapports étant d'ailleurs parfaitement exacts, rapports qui se trouveroient contredits en partie par la position de l'ovaire, en conservant le nom de corolle au calice tubulé.

#### ESPÈCES.

1. **QUINCHAMALI** du Chili. *Quinchamalium chilense*.

*Quinchamalium foliis alternis, linearibus; floribus subumbellatis, terminalibus.* (N.)

*Quinchamalium chilense*. Lam. Ill. Gener. vol. 2. pag. 125. n°. 2791. tab. 142. — Jussieu. Gener. pag. 75. — Molina. Chil. édit. fr. pag. 121.

*Quinchamala chilensis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1217.

*Quinchamali linifolio*. Feuillé. vol. 2. pag. 80. tab. 44.

*Santolina*, &c. Frézier. pag. 107. tab. 15.

C'est un petit arbristeau peu élevé, qui se divise en un grand nombre de rameaux glabres, étalés, garnis de feuilles alternes, dissuées, presque sessiles, étroites, linéaires, entières, glabres à leurs deux faces, obtusés ou un peu aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole très-court.

Les fleurs sont terminales, fasciculées, presqu'en ombelles sessiles; la corolle est jaune, divisée à l'extrémité de son tube en un limbe à demi-ouvert, à cinq divisions ovales, presqu'obtusées. Le calice persiste, tient lieu de péricarpe, & renferme une seule semence noirâtre, lenticulaire.

Cette plante croît au Chili & au Pérou. Les gens de la campagne emploient sa décoction ou son suc exprimé comme un résolutif après les chutes. *Hy (V. f. in herb. Juss. & Lam.)*

**QUINIER.** *Quina*. Aubl. Guian. vol. 2. suppl. pag. 20. tab. 379.

C'est un arbre de la famille des rubiacées, dont toutes les parties de la fructification ne sont pas encore bien connues. Il s'élève à la hauteur d'environ quinze pieds. Son tronc se divise en branches & en rameaux chargés de feuilles opposées, entières, ondulées à leurs bords, minces, fermes, presque sessiles, de forme ovale, & terminées par une longue pointe, munies en dessous de nervures saillantes. Les plus grandes feuilles ont sept pouces de long sur trois de largeur; elles sont munies de stipules longues, étroites, aiguës, fort caduques.

Les fruits sont, ou solitaires, ou réunis par bouquets sur un pédoncule commun, garni à sa base de deux petites bractées en forme d'écaillés. Le calice est persistant, divisé en quatre petites découpures. Il accompagne une baie jaunâtre dans sa maturité, lisse, ovale, striée, terminée par une pointe en forme de mamelon, au centre duquel

on remarque une très-légère cavité. Sous l'enveloppe charnue de cette baie, qui est acide & agreable au goût, on trouve deux osselets convexes en dehors, aplatis du côté où ils se touchent, couverts d'un duvet rouffâtre, foyeux, & contenant chacun une amande.

Cette plante croît à Cayenne, sur les bords de la crique des Galibis. *(Descript. ex Aubl.)*

**QUINQUINA.** *Cinchona.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *toycena*, & qui comprend des arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, munies de stipules; les fleurs disposées la plupart en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice turbiné, à cinq dents; une corolle tubulée à cinq divisions; cinq étamines insérées vers le milieu du tube; une capsule oblongue, à deux valves, à deux loges polyspermes.

# CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, d'une seule pièce, campanulé, persistant, divisé en cinq dents à son orifice.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, infundibuliforme, partagée en cinq divisions profondes, souvent plus courtes que le tube, oblongues, la plupart lanugineuses à leur sommet.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, insérés vers le milieu du tube de la corolle, terminés par des anthères alongées, tantôt saillantes, plus souvent renfermées dans la corolle.

4°. Un ovaire presque ovale, inférieur, surmonté d'un style de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate épais, oblong, simple ou légèrement biface.

Le fruit est une capsule oblongue, couronnée par le calice, à deux valves, à deux loges, dont les valves, courbées en dedans à leurs bords, forment, à l'époque de la maturité, une separation, & prennent l'apparence de deux capsules; chacune d'elles contient plusieurs semences oblongues, comprimées, bordées, attachées à un receptacle central, oblong.

*Observations.* Ce genre est caractérisé par le long tube de sa corolle, en quoi il se distingue des *macrocnemum* & des *bellonia*, avec lesquels il a de grands rapports: la capsule le sépare des *posoqueria* & des *rondeletia*, dont le fruit est une baie; ses semences des *toycena*, qui ont les leurs pulpeuses;

enfin les cinq étamines des *catesba*, qui n'en ont que quatre, &c.

Ce n'est guère que vers l'an 1639 que ces plantes intéressantes fixèrent l'attention des Européens qui habitoient le Pérou, par leur propriété de guérir les fièvres intermittentes, soit que cette découverte fût l'effet d'un hasard heureux, comme il arrive souvent, soit que les Indiens eussent déjà reconnu les propriétés fébrifuges du quinquina. Quoi qu'il en soit, cette plante obtint en très-peu de tems une grande réputation dans sa patrie, par la guérison de la comtesse de Cinchona, épouse du vice-roi du Pérou en 1638, & que la fièvre tourmentoit depuis long-tems. Cette femme s'empressa de faire connoître ce puissant spécifique, & il fut long-tems employé en Amérique avant d'être connu en Europe. Plus de trente ans s'écoulèrent avant qu'il fût admis comme remède par les médecins européens, quoique les Jésuites l'eussent fait connoître avec avantage. Ce fut, dit-on, un Anglais nommé Talbot qui le mit en vogue en 1676, & Louis XIV acheta de lui la manière de l'employer à doses convenables.

A dater de cette époque jusqu'à nos jours, le quinquina a soutenu sa réputation; mais celui connu sous le nom de *quinquina officinal*, qui long-tems est resté la seule espèce employée & même connue, a été forcé de partager la réputation avec plusieurs autres espèces découvertes par les voyageurs modernes, & dont l'écorce, d'après des essais assez nombreux, a produit les mêmes effets. Au reste, de tous les quinquinas introduits dans le commerce, il est encore très-difficile de prononcer sur l'espèce qui mérite la préférence: il y a d'ailleurs tant de falsifications, tant de prétendues écorces de quinquina, ou fausses ou de vertu faible, & il existe encore si peu de principes certains, même aux yeux des gens de l'art, pour les distinguer, que ce puissant fébrifuge ne produit pas toujours l'effet qu'on a droit d'en attendre. Au reste, si la gélatine annoncée récemment par M. Seguin, comme aussi efficace que l'écorce du Pérou pour guérir la fièvre, répond à l'attente du public & aux essais heureux qu'en a faits ce célèbre chimiste, nous n'aurons plus besoin d'aller chercher au Pérou un remède pour la fièvre.

# E S P È C E S.

1. QUINQUINA des Caribes. *Cinchona caribaea*. Linn.

*Cinchona pedunculis unifloris.* Linn. Syst. veget. pag. 214. n°. 2. — Jacq. Amer. pag. 61. tab. 179. fig. 95. — Idem. Observ. botan. 1. pag. 27. tab. 47. — Amer. Piet. pag. 35. tab. 63. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 3. tab. 33. fig. 4.

*Cinchona pedunculis axillaribus, unifloris.* Vahl. Act. Soc. Hist. Nat. Hafn. 1. pag. 21.

E ij



*Cinchona foliis ovato-lanceolatis; pedunculis axillaribus terminalibusque, unifloris; flaminibus exsertis.* Swartz. Oberv. 72.

*Cinchona jamaicensis, seu caribbeana.* Wright. Afr. Angl. vol. 67. pag. 504. tab. 10.

*Cinchona pedunculis unifloris, floribus pentandris.* Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 361. n°. 6.

Cette espèce est facile à distinguer par ses pédoncules axillaires & solitaires, chargés d'une seule fleur.

Ses rameaux sont glabres, étalés, d'un brun noirâtre, striés, glabres, souvent marqués de petites taches brillantes, ovales, blanches ou jaunâtres, garnis de feuilles ovales, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, entières à leurs bords, minces, glabres à leurs deux faces, longues de deux pouces & plus, larges d'environ un pouce, supportées par des pétioles courts, munies de bractées ciliées, acuminées, fort petites, plus larges que longues.

Les fleurs sont nombreuses; elles naissent solitaires dans les aisselles des feuilles & vers l'extrémité des rameaux. Leur pédoncule est à peine plus long que les pétioles, glabre, uniflore. Le calice est glabre, court, un peu cylindrique, à cinq dents très-courtes, fort petites, aiguës. La corolle a un tube cylindrique; son limbe se divise en cinq longues découpures linéaires, presque obtuses, glabres, plus longues que le tube; les étamines sont un peu saillantes; les anthères étroites, très-longues, d'un jaune pâle. La capsule est noire, ovale, lisse, très glabre, luisante; les semences ovales, comprimées, environnées d'une bordure saillante.

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Guadeloupe, dans les falaises de la grande baie. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

#### 2. QUINQUINA à longues fleurs. *Cinchona longiflora.*

*Cinchona pedunculis axillaribus, unifloris; foliis linearis-lanceolatis, glabris; corollis longissimis.* Lambert. Gen. Cinchon. pag. 38. n°. 12.

*Cinchona caribaea?* Journ. de Phys. octob. 1790. pag. 243. tab. 1.

Quoique très-rapprochée du *cinchona caribaea*, cette espèce paraît devoir en être distinguée par la longueur remarquable de ses fleurs, & par les feuilles bien plus longues & plus étroites.

Ses rameaux sont garnis de feuilles opposées, très-rapprochées, longues, étroites, linéaires, lancéolées, à nervure saillante, très-obliques, médiocrement pétioles, munies à leur base de deux petites stipules courtes, élargies, aiguës. Les fleurs sont axillaires; leur calice est divisé à son orifice en cinq petites dents droites, obtuses;

leur corolle a un très-long tube, cylindrique, plus long que les feuilles; le limbe est découpé en cinq parties linéaires, trois ou quatre fois plus courtes que le tube.

Cette plante croît dans la Guiane. (V. La figure qu'en a donnée M. Lambert a été prise sur un exemplaire de l'herbier d'Aublet, qui se trouve chez M. Banks.

#### 3. QUINQUINA corymbifère. *Cinchona corymbifera.*

*Cinchona foliis oblongo-lanceolatis, corymbis axillaribus.* Linn. Syst. veget. pag. 214. — Linn. f. Suppl. pag. 144. — Forst. in Nov. Act. Upf. 3. pag. 176. — Idem. Flor. austr. Prodr. 88. — Vahl. Act. Soc. Hist. Nat. — Hahn. 1. pag. 22. — Lamb. Gen. Cinch.

Ses rameaux sont garnis de feuilles amples, opposées, pétioles, ovales, oblongues, lancéolées, glabres, acuminées, très-entières, d'un vert foncé, à nervures un peu purpurines en dessous, supportées par des pétioles à peine longs d'un demi-pouce, munis à leur base de stipules membraneuses, aiguës.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires vers l'extrémité des rameaux, très-amples, étalées, de la longueur des feuilles; les pédoncules comprimés, trichotomes; la corolle tubuleuse, dont le limbe est découpé en cinq parties plus courtes que le tube, étroites, obtuses, recourbées en dehors; les anthères droites, médiocrement saillantes; le stigmate épais & simple.

Cette plante a été observée par Forster, dans les îles de Tongarabua & autres de la mer Pacifique. (V. Description ex Forst. & ex fig. Lamb.)

#### 4. QUINQUINA à longues fleurs. *Cinchona linearis.*

*Cinchona paniculata terminali, foliis ovatis, acuminatis, glabris; caulis pentagonis.* Vahl. Act. Soc. Hist. Nat. Hahn. 1. pag. 22. tab. 4. — Lambert. Gen. Cinch. pag. 26. tab. 6.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce, le *cinchona floribunda*, & le *cinchona angustifolia*; mais elle diffère de ce dernier par ses feuilles bien moins étroites, & de tous deux par ces mêmes feuilles étendues à leur base, & par leurs nervures apparentes des deux côtés.

Ses rameaux sont cylindriques, surtout à leur base, striés, mais d'un couleur purpurine, & comprimés à leur partie supérieure; garnis de feuilles presque filiformes, ovales, acuminées, longues de deux pouces & plus, sur un de large, à peine luisantes à leur face supérieure, minces à leur base de deux petites stipules courtes, élargies, aiguës. Les fleurs sont axillaires; leur calice est divisé à son orifice en cinq petites dents droites, obtuses;

Les panicules sont amples, terminales, à ramifications d'abord opposées, puis trichotomes, garnies de bractées serrées. Le calice est muni à son orifice de dents longues, subulées. La corolle a deux pouces & plus de longueur ; son tube est cylindrique ; les découpures du limbe linéaires, obtuses ; les étamines saillantes ; l'ovaire à cinq côtes obtus ; le stigmate globuleux ; les capsules courtes, petites, brunes, glabres, ovales, couronnées par les dents subulées du calice.

Cette plante croît à Saint-Domingue, où elle a été recueillie par Jof. Martin. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

5. QUINQUINA à fleurs nombreuses. *Cinchona floribunda*.

*Cinchona paniculata terminali ; capsulis turbinatis, levibus ; foliis ellipticis, acuminatis.* Vahl. *Act. Soc. Hist. Nat. Hafn.* t. pag. 125. — *Lam. Illustr. Gen. tab. 164. fig. 2.* — Lambert. *Gen. Cinch.* pag. 27. tab. 7. — Mallet. *Mémoire sur le quinquina.*

*Cinchona floribus paniculatis, glabris ; capsulis turbinatis, levibus ; foliis oblongis, acuminatis, glabris.* Swartz. *Prodr.* 41. — *Id. Flor. Ind. occid.* 1. pag. 375. — Nov. *Act. Acad. Nat. Curios.* 9. pag. 1. tab. 1.

*Cinchona montana.* Badier. *Journ. de Phys.* fév. 1789. pag. 129. tab. 1. — *Urt. Mag. de Bot.* pag. 96. tab. 3.

*Cinchona Santha-Lucia.* Philof. *Transf. Davids.* vol. 74. pag. 452. tab. 19.

*Trachelium arboreum et fruticosum, lauri foliis conjugatis ; floribus racemosis et corymbofis, albis ; capsulis conicis, nigris.* Desport. *Hist. Morb. S. Doming.* 2. pag. 231. — Nicol. *Hist. S. Doming.* 235.

*Quinquina piton.* *Journ. de Phys.* 1781. pag. 169-179.

Vulgairement quinquina des pitons.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de trente à quarante pieds, sur un tronc droit, ayant environ un pied de diamètre : son écorce est une des plus amères parmi les espèces de ce genre. Il se divise en rameaux cylindriques, un peu tétragones, très-glabres, de couleur purpurine, foncée ; garnis de feuilles amples, pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, acuminées, très-glabres ; lisses & luisantes en dessus, plus pâles en dessous, veinées, à nervures latérales saillantes, parallèles, un peu rameuses & confluentes à leur extrémité, longues de huit à dix pouces, larges de trois ou quatre, supportées par des pétiotes d'un demi-pouce de long, muni à leur base de deux stipules opposées, vaginales, oblongues, obtuses, très-caduques.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en une

belle panicule terminale, ample, étalée, & dont les ramifications sont opposées, comprimées, très-glabres. Le calice est divisé à son orifice en dents subulées, très-courtes. La corolle a un tube cylindrique, long d'un pouce, divisé à son limbe en longues découpures glabres & linéaires ; les étamines saillantes ; le stigmate ovale, entier ; la capsule très-lisse, oblongue, noire, rétrécie à sa base.

Cette plante croît à Sainte-Lucie, à la Martinique & à la Guadeloupe, où elle a été recueillie par M. Badier. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

L'écorce de cette espèce est beaucoup plus amère, plus astringente que dans le quinquina officinal. On lui a donné en Amérique le nom de *quinquina des pitons*, parce qu'on le rencontre plus ordinairement sur le sommet des montagnes : ce sommet se nomme *piton*, & les montagnes portent celui de *morne*.

6. QUINQUINA à grosses côtes. *Cinchona brachycarpa*.

*Cinchona paniculata terminali ; capsulis obovatis, costatis ; foliis ellipticis, obtusis.* Vahl. *Act. Soc. Hist. Nat. Hafn.* 1. pag. 24. — Lambert. *Gen. Cinch.* pag. 28. tab. 8.

*Cinchona floribus paniculatis, glabris ; capsulis obovatis, costatis ; foliis ellipticis, obtusis, glabris.* Swartz. *Prodr.* 42. — *Id. Flor. Ind. occid.* vol. 1. pag. 378.

Cette plante ressemble beaucoup par son port au *cinchona macrocarpa* ; mais elle est glabre dans toutes ses parties, & elle en diffère encore par sa corolle & par ses étamines saillantes.

Ses feuilles sont amples, ovales ou elliptiques, obtuses, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures alternes, latérales, un peu rameuses à leur sommet, à périotes très-courts, munis à leur base de stipules courtes, ovales, aiguës. Les fleurs forment une panicule terminale, trichotome, munie de petites bractées à la division des pédoncules.

Les calices sont ovales, à cinq dents courtes, presqu'obtus. Le tube de la corolle est grêle, cylindrique, assez long ; le limbe divisé en cinq grandes découpures linéaires, réfléchies ; les étamines saillantes ; le stigmate simple, globuleux ; les capsules ovales, munies extérieurement de dix côtes fortes, saillantes, conniventes à leur base.

Cette plante croît à la Jamaïque. *h* (*Descript. ex fig. Lam.*)

7. QUINQUINA à feuilles étroites. *Cinchona angustifolia.* Swartz.

*Cinchona floribus paniculatis, glabris; capsulis oblongis, pseudopellis; foliis lineari-lanceolatis, pubescentibus.* Swartz. Act. Stockh. ann. 1787. pag. 117. tab. 3. — Idem. Prodr. 42. — Idem. Flor. Ind. occid. 1. pag. 389. — Vahl. Atl. Soc. Hist. Nat. Halm. 1. pag. 25. — Lam. Illustr. Genet. tab. 164. fig. 3. — Lambert. Genus Cinch. pag. 29. tab. 9.

Cette espèce a quelques rapports avec la *Cinchona corymbifera*; elle ressemble aussi à *Cinchona caribaea* par la forme de la corolle & de ses étamines, mais elle diffère de tous deux par les étamines disposées en une belle panicule terminale.

Ses tiges sont divisées en rameaux grêles, effilés, glabres, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, étroites, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, légèrement pubescentes à leurs deux faces, particulièrement sur la principale nervure; très-douces au toucher, supportées par des pétioles très-courts, longues de deux ou trois pouces, larges à peine d'un demi-pouce.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en une panicule dont les ramifications sont souvent trifides, filiformes, munies à la base de leurs divisions de quelques petites bractées très-courtes. Les calices sont courts, tubulés, médiocrement pubescents, divisés à leur orifice en cinq dents droites, subulées. La corolle, longue au moins de deux pouces, & glabre, a un tube grêle: son limbe se divise en cinq découpures linéaires, étroites, obtuses, réfléchies en dehors, de la longueur du tube; les étamines plus longues que la corolle; les capsules sont courtes, ovales, presque à cinq angles, à deux loges, & contiennent des semences fort petites, glabres & arrondies.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne, sur le bord des fleuves, dans les terrains pierreux. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. *h* (*V. f.*)

8. QUINQUINA à feuilles coriaces. *Cinchona coriacea.*

*Cinchona foliis ovato-oblongis, utrinque nitidis, coriaceis; paniculis brevibus, glabris; antheris exsertis, filiformibus.* (N.)

*Cinchona (nitida), foliis obovatis, nitidis; panicula brachiata, corollis alio-purpureis, limbo parum hirsuto.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 50. tab. 191.

Ses rameaux sont lisses, ltrés, couverts d'une écorce cendrée, garnis de feuilles opposées, pétioles, coriaces, ovales, oblongues, très-lisses, rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet, luisantes à leurs deux faces, marquées de nervures latérales, alternes, un peu rameuses ou bifurquées à leur sommet, filiformes, saillantes en dessous.

Les fleurs sont terminales, & forment une pani-

cule ordinairement courte, à ramifications presque dich. tomes; les pedoncules roides, glabres, terminés par des fleurs presque sessiles, glabres, dont le calice oblong est garni à son bord de cinq dents droites, aiguës. La corolle est longue de deux pouces; le tube droit, cylindrique; le limbe, à cinq divisions étroites, obtuses, de la longueur du tube, glabres, rabattues en dehors; les étamines saillantes; les anthers droites, filiformes. Les fruits sont longs d'un pouce, noisettes, cylindriques.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. *h* (*V. f. in herb. Jul. & Lam.*)

La plante de Ruiz & Pavon me paroît avoir de grands rapports avec la nôtre: la panicule est plus ample; le tube de la corolle une fois plus court; les fruits allongés, un peu rétrécis à leur sommet.

9. QUINQUINA à grandes feuilles. *Cinchona grandifolia.* Ruiz & Pav.

*Cinchona foliis oblongis, ovulibusque glabris; panicula brachiata; floribus subcorymbosis, corollis albis, limbo villosifusculo.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 53. tab. 196.

*Casavillo amarillo.* Ruiz. Quinolog. art. 6. pag. 71.

Cet arbre est grand, & supporte une cime fort touffue. Son tronc est revêtu d'une écorce lisse, d'un brun cendré, rouillâtre intérieurement, amère & acide sans être rebarbant. Les jeunes rameaux sont quadrangulaires, rougeâtres, garnis de feuilles amples, ovales, très-entières, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, traversées par des veines purpurines; les principales munies à leur base de quelques poils foyeux & blanchâtres: ces feuilles ont d'un à deux pieds de long; elles sont garnies de stipules ovales, acuminées, caduques.

Les fleurs forment une panicule grande, étalée, feuillée, longue d'environ un pied, très-rameuse, munies de petites bractées ovales, aiguës. Leur calice est pourpre, à cinq dents; la corolle blanche, odorante, longue d'un pouce; le limbe un peu velu en dedans; les étamines renfermées dans le tube; les anthers oblongues, bifides à leur base; la capsule grande, à peine trisée, longue d'un pouce & demi, contenant des semences ovales, membraneuses à leurs bords.

Cet arbre croît au Pérou, à Cinchao, dans les forêts des Andes, au voisinage des torrents. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pavon.*)

10. QUINQUINA à petites fleurs. *Cinchona parviflora.*

*Cinchona foliis ovatis, obtusis, glabris; floribus paniculatis, bi-trichotomis, villosis; corollis minimis.* (N.)

*Cinchona (micrantha), foliis ovalibus, obtusis;*

*paniculâ maximâ; floribus numerosis, parvis; corollis albis, limbo lanato.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 52. tab. 194.

Si l'on considère la corolle de cette plante, bien plus petite que dans les autres espèces, on la distinguera aisément de ses congénères.

Ses rameaux sont glabres, droits, cylindriques, garnis de feuilles minces, ovales, obtuses, entières, glabres, membranaceus, médiocrement pétiolées, à nervures latérales & filiformes, longues de trois pouces & plus, larges d'environ un pouce & demi, rétrécies à leur base, munies de stipules opposées, vaginales, élargies à leur base, subulées.

Les fleurs forment une panicule médiocre, dont les pedoncules sont axillaires, opposés vers l'extrémité des rameaux, droits, bifurqués à leur sommet; chaque bifurcation trichotome, velue, comprimée, fournissant environ trois fleurs pédiculées, munies de petites bractées à la base des divisions. Le calice est court, tubulé, velu, à cinq dents à peine sensibles. La corolle, longue de trois ou quatre lignes, est pubescente en dehors, divisée à son limbe en cinq découpures obtuses; les étamines ne sont point saillantes. Je ne connois pas les fruits.

Cette plante croît à la Martinique. *Th* (P. f. in herb. Lamarck.)

Dans la plante du Pérou de Ruiz & Pavon, les panicules sont plus amples; la corolle est blanche en dedans, rougeâtre en dehors, pubescente; la capsule oblongue, aigue, brune, à dix styles légères.

11. QUINQUINA à feuilles lancéolées. *Cinchona lanceolata*. Ruiz.

*Cinchona foliis lanceolato-oblongis; paniculâ brachiata, magnâ; floribus subcorymbofis, corollis roseo-purpureis, limbo hirfuto.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 51.

*Cascarillo lampino*. Ruiz. Quinolog. art. 4. pag. 64.

C'est un arbre très-élevé, dont le tronc est revêtu d'une écorce brune, un peu panachée, jaunâtre intérieurement, d'une grande amertume, un peu acide, mais point désagréable. Il se divise en rameaux étalés, redressés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, traversées par des veines purpurines, supportées par des pétioles longs d'un demi-pouce, munies de stipules planes, ovales, obtuses, connées à leur base.

Les fleurs sont disposées en une panicule ample, terminale, feuillée, très-étalée, & dont les ramifications sont garnies de petites bractées subulées,

caduques. Leur calice est court, de couleur pourpre; la corolle d'un pourpre de rose; son limbe velu, ouvert; les étamines velues à leur base; la capsule oblongue, étroite, d'un ponce de long, légèrement fînée, d'un brun rougeâtre, s'ouvrant de sa base au sommet, contenant des semences ovales, jaunâtres, environnées d'une bordure membraneuse, souvent déchiquetée.

Cette plante croît au Pérou, sur les montagnes de Mugna. *Th* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

12. QUINQUINA à grandes fleurs. *Cinchona grandiflora*. Ruiz & Pav.

*Cinchona foliis ovalibus obovatisque, subvenitis, coriaceis, subius albidis; corymbis terminalibus; corollis magnis, glabris, canatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 54. tab. 198.

Espèce distinguée par ses grandes fleurs, par ses feuilles blanchâtres en dessous.

Le tronc s'élève à environ vingt pieds, revêtu d'une écorce d'un brun cendré, jaunâtre en dedans, un peu moins amère que les autres; les rameaux sont étalés; les plus jeunes médiocrement tétragones, garnis de feuilles très-ouvertes, assez rapprochées, ovales, obtuses, très-entières, d'un vert luisant en dessus, blanchâtres en dessous, munies à la base de leurs pétioles de stipules assez grandes, obtuses, médiocrement fînées.

Les fleurs forment des corymbes terminaux, feuillés, très-étalés, composés d'environ trente fleurs grandes & d'une odeur très-agréable, chacune d'elles pédiculée, garnie de bractées subulées. Leur calice est court, tubulé, à cinq dents droites, aiguës; la corolle blanche, glabre, large de trois pouces, infundibuliforme, dont le tube est cylindrique, presque à cinq angles; le limbe à cinq découpures ovales, réfléchies; le stigmate à deux lobes oblongs; la capsule oblongue, rétrécie à sa base, marquée de deux sillons, s'ouvrant du sommet à sa base, contenant des semences nombreux, fort petites, munies d'une membrane linéaire, portées sur un large réceptacle.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes. *Th* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

13. QUINQUINA à fleurs de rose. *Cinchona rosea*. Ruiz & Pav.

*Cinchona foliis oblongis, obtusè acuminatis; paniculâ brachiata, floribus corymbofis, corollis roseis, limbo margine tomentoso.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 54. tab. 199.

*Cascarillo parco*. Ruiz. Quinolog. art. 8. p. 77.

C'est un arbre d'environ quinze pieds de haut, dont le tronc est droit, caveux, très-rarement, revêtu d'une écorce brune, lisse, variegée de taches

d'un brun cendré, très-astringente, médiocrement amère; les rameaux sont presque quadrangulaires, un peu comprimés entre les articulations supérieures; garnis de feuilles opposées, pétiolées, très-amplies, oblongues, acuminées, très-entières, glabres & luisantes, veinées en dessous, munies à la base des pétioles de stipules ovales, obtuses, purpurines, pubescentes extérieurement, connées à leur base.

Les fleurs sont disposées en une panicule droite, terminale, dont les peduncules sont étalés, pubescents, comprimés, & qui supportent de petites cimes de filices pédiculées, garnies de petits bractées ovales, aiguës. Le calice est court, de couleur purpurine; la corolle couleur de rose, ayant un tube court, légèrement courbé, cylindrique, glabre à son orifice, dilaté en un limbe tomenteux, à cinq divisions courtes, ovales. Les étamines sont velues à leur base, plus courtes que la corolle; la capsule à deux loges, un peu recourbée.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes. *h* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

#### 14. QUINQUINA dichotome. *Cinchona dichotoma*. Ruiz & Pav.

*Cinchona foliis oblongo-lanceolatis; pedunculis terminalibus, dichotomis, paucifloris; capsulis angustis, linearibus, longis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 53. tab. 197.

Espèce bien distincte & reconnoissable aux ramifications simples, dichotomes & très-ouvertes de ses panicules.

C'est un arbre glabre, peu élevé. Son tronc est revêtu d'une écorce brune, un peu raboteuse, marquée de taches blanchâtres. Sa cime est composée de rameaux cylindriques, un peu comprimés entre les articulations, garnis de feuilles planes, oblongues, lancéolées, dont les principales nervures sont opposées, les plus petites presque réticulées, munies de stipules ovales, oblongues, obtuses.

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, dont les ramifications opposées se terminent par une bifurcation très-ouverte, qui supporte des fleurs unilatérales, à peine pédiculées. Les capsules sont étroites, linéaires, longues d'environ deux pouces, légèrement striées, dont les valves sont en forme de barque, contenant des semences nombreuses, brunâtres, environnées d'une aile membraneuse, étroite, souvent déchiquetée.

Cette plante se rencontre au Pérou, dans les forêts des Andes. *h* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

#### 15. QUINQUINA de Caroline. *Cinchona caroliniana*.

*Cinchona pubescens, foliis ovatis; floribus paniculato fasciculatis, axillaribus.* (N.)

*Pinckneya* (pubens), *foliis ovalibus, utrinque acutis, subtus tomentosis.* Michaux. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 103. tab. 13.

Cette plante offre, dans ses fruits, quelques particularités qui ont déterminé Michaux à en faire un genre nouveau sous le nom de *pinckneya*. Nous ne prononçons pas sur le type de ce nouveau genre; mais les grands rapports avec celui des *quinquina* nous a déterminés à le présenter ici à la suite des espèces de ce dernier genre.

C'est un arbrisseau assez élevé, dont les tiges droites sont divisées en rameaux opposés, velus, cylindriques, un peu comprimés à leur partie supérieure, garnis de feuilles opposées, grandes, ovales, pétiolées, rétrécies à leur base, aiguës & quelquefois obtuses à leur sommet, pubescentes en dessous, particulièrement le long des principales nervures; vertes & glabres en dessus, longues de six pouces au moins, larges de trois; leur pétiole est très-court, pubescent, muni à sa base de deux bractées lancéolées, aiguës, caduques.

Les fleurs sont axillaires, disposées en panicules courtes, presque fasciculées, à ramifications opposées, épaisses, velues, terminées par des fleurs presque sessiles, dont le calice est oblong, turbiné, divisé à son orifice en cinq découpures oblongues, aiguës, presque égales, caduques, l'une desquelles s'allonge fort souvent & se dilate en forme de feuille ou de bractée ovale, longue d'un pouce, d'un blanc jaunâtre, comme dans le *mustardia fiordosa*. La corolle est tubulée, cylindrique, pubescente, longue d'un pouce au moins, divisée à son limbe en cinq découpures oblongues, obtuses, roulées en dehors, de deux tiers plus courtes que le tube. Elle renferme cinq étamines, dont les filaments, attachés un peu au dessus de la base de la corolle, sont sétacés, droits, terminés par des anthères saillantes, presque versatiles, obtuses, bien plus courtes que dans les autres espèces.

L'ovaire est renfermé dans le tube du calice, surmonté d'un style de la longueur des étamines, terminé par un stigmate épais, presque à deux lobes. Le fruit est une capsule assez grande, presque ronde, un peu comprimée, marquée de deux sillons opposés, obtuse, applatie & nue à son sommet; coriace, à deux loges, médiocrement ouverte en deux valves partagées par une cloison jusque vers le milieu seulement: elles renferment des semences nombreuses, presque orbiculaires, un peu échancrées à leur base au point de leur attache, environnées d'une aile courte, membraneuse.

Cette plante croît sur les rivages du fleuve Sainte-Marie, dans la Génie; elle a été également recueillie dans la Caroline par M. Bosc, qui a bien voulu

voulu nous en communiquer un exemplaire. *Th* (V. f.)

16. QUINQUINA officinal. *Cinchona officinalis*.

*Cinchona foliis ovato-lanceolatis, glabris; capsulis oblongis.* Vahl. Act. Soc. Hist. nat. Hafn. 1. pag. 17. tab. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 164. fig. 1.

*Cinchona paniculâ brachiât.* Matet. medic. 61. — Sylt. veget. pag. 178.

*Quinquina.* Condam. Act. Parif. ann. 1738. — Geoffr. Matet. medic. 2. pag. 180.

*Arbor febrifuga, peruviana.* Rai. Hist. ann. 1796.

Cette espèce, si intéressante par son emploi en médecine, est composée de rameaux opposés, revêtue d'une écorce d'un brun rougeâtre, rude en dehors, chargée de cicatrices occasionnées par la chute des feuilles, marquée de rides transverses & obliques, les rameaux supérieurs un peu comprimés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, lancéolées, aiguës, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, marquées de nervures latérales, simples, parallèles, un peu courbées en arc à leur sommet, longues de deux à trois pouces sur un de large, supportées par des pétioles canaliculés en dessus, munis à leur base de deux stipules fort petites, aiguës, caduques.

Les fleurs forment une panicule terminale, étalée, à ramifications ordinairement trichoromes, les pédoncules légèrement pubescents, garnis à leur base & vers leur milieu de petites bractées opposées, aiguës. Le calice est muni, à son orifice, de petites dents courtes, aiguës. La corolle est légèrement tomenteuse à l'extérieur, longue d'un demi-pouce & plus, divisée à son orifice en cinq découpures aiguës, plus courtes que le tube; les anthers non saillantes; l'ovaire tomenteux; le stigmate épais; légèrement bifide; la capsule glabre, ovale, oblongue, d'un demi-pouce au plus, marquée de quelques lignes peu élevées, de couleur brune, composée de deux loges qui s'écartent à leur base à l'époque de la maturité, & contiennent plusieurs semences arrondies, comprimées & bordées.

Cette plante croît au Pérou. *Th* (V. f. in herb. Lam.)

Observations. Quoique cette espèce porte le nom de *quinquina officinal* ou des boutiques, il ne s'ensuit pas qu'elle soit préférable à toutes les autres; mais elle ne porte ce nom que parce qu'elle a été pendant long-tems la seule connue ou employée.

17. QUINQUINA pubescens. *Cinchona pubescens*.

*Cinchona foliis ovatis, basi elongatis; subtus pubescentibus; capsulis cylindricis.* Vahl. Act. Soc. Botanique, Tome VI.

Hist. nat. Hafn. 1. pag. 19. tab. 2. — Lambert. Gen. Cinch. pag. 21. tab. 2.

*Cinchona (hirsuta), foliis ovatis; crassis, marginibus reflexis, terminalibus subcordatis; floribus corymbosis; corollis purpureis; corollis albo-purpureis; limbo hirsuto.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 51. tab. 19.

A. *Cinchona (purpurea), foliis oblongo-ovalibus ovatisque, purpureis; paniculâ brachiâtâ, magnâ; floribus subcorymbosis; corollis albo-purpureis; limbo hirsuto, albo.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 52. tab. 193.

Son écorce est blanchâtre; ce qui a fait donner à cette espèce le nom de *quinquina blanc*; ses rameaux pubescents à leur partie supérieure, garnis de feuilles amples, pétiolées, ovales, longues de huit à dix pouces sur cinq à six pouces de large, obtuses, rétrécies à leur base, & même un peu décurrentes vers le haut du pétiole, pubescentes & tomenteuses en dessous, velues sur les principales nervures, presque glabres en dessus, à nervures fortes, simples, parallèles, qui se divisent en petites veines simples & latérales; les pétioles ont environ deux pouces de long.

Les panicules sont terminales, fort amples, pubescentes, garnies de fleurs nombreuses & de petites bractées à la base des divisions des pédoncules. Le calice est très-court, divisé à son orifice en cinq petites dents aiguës. La corolle est médiocre, à peine longue d'un pouce, pubescente, à cinq divisions ovales, plus courtes que le tube, garnies de poils blanchâtres tant à leur contour que sur leurs bords intérieurs, contenant cinq étamines non saillantes. Les capsules sont cylindriques, glabres, longues d'un pouce, un peu rétrécies à leurs deux extrémités.

Cette plante croît au Pérou. Elle a beaucoup de rapports avec le *cinchona macrocarpa*. *Th* (V. f. in herb. Juss. & Lam.)

La plante de Ruiz & Pavon a de grands rapports avec la nôtre, & celle notée A. des mêmes auteurs ne m'en paroît être qu'une variété. Je crois que l'on pourroit également soupçonner que le *cinchona ovata* des mêmes auteurs appartient encore à la même espèce, & qu'ils caractérisent par

*Cinchona (ovata), foliis ovatis, subtus tomentosis; paniculâ brachiâtâ, floribus subcorymbosis, corollis purpureis, limbo hirsuto.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 52. tab. 195.

18. QUINQUINA à gros fruits. *Cinchona macrocarpa*. Vahl.

*Cinchona foliis oblongis, subtus pubescentibus, cef-tatis.* Vahl. Act. Soc. Hist. nat. Hafn. 1. pag. 29. tab. 3. — Lambert. Gen. Cinch. pag. 22. tab. 3.

*Cinchona off. inolis.* Linn. System. veget. Edit. pag. 164. Descriptio.

*Cinchona (officinalis), foliis ellipticis, subtus pubescentibus; corollæ limbo lanato.* Linn. f. Suppl. pag. 144.

*A. Eadem floribus minoribus, foliis subtus albobubescentibus.* (N.)

Cette plante, que Linné avoit prise pour le *cinchona officinalis*, a des rameaux velus & tomenteux, garnis de feuilles pétiolées, elliptiques, oblongues, un peu coriaces, glabres & lissantes en dessus, pubescentes en dessous, marquées d'une forte nervure dans le milieu, & d'autres simples, latérales, aérées, la plupart pileuses. Leur pétiole, long d'un pouce, est muni à sa base de deux stipules lancéolées, caduques, connées à leur base, glabres en dedans, souvent plus longues que les pétioles. Les panicules sont terminales, pubescentes, presque tricotomes; les pédoncules des ramifications comprimés, longs d'un pouce & demi, soutenant trois fleurs presque sessiles, munis de bractées linéaires, lancéolées, longues d'un pouce, & d'autres beaucoup plus petites & subulées à la base de chaque fleur.

Le calice est campanulé, pubescent, foyeux en dedans, à cinq, quelquefois six dents peu marquées, aiguës. La corolle est coriace, longue d'un pouce & demi, velue, presque tomenteuse; son limbe se divise en découpures lancéolées, obtuses, de la longueur du tube; les filaments sont très courts; les anthères linéaires, plus longues que le tube, l'ovaire à cinq côtés obtus, le stigmate bifide; la capsule cylindrique, glabre, longue de deux pouces, rétrécie à sa base, leurs deux valves écartées tant à leur base qu'à leur sommet à l'époque de la maturité.

Cette espèce croît dans l'Amérique, à Santa-Fé. *h*

*Observations.* La grosseur remarquable des pédoncules & des fleurs, dans la figure que M. Lambert a donnée de cette plante, quoiqu'il n'en soit pas fait mention dans le texte, ne nous a pas permis d'y rapporter la plante A, que nous avons observée dans l'herbier de M. Lamarck, mais sans fruits. Cette grosseur exceptée, elle en présente tous les caractères; seulement les fleurs n'ont qu'un pouce de longueur: les découpures du limbe de la corolle sont larges, obtuses; les feuilles, dans leur jeunesse, sont revêtues en dessous d'un duvet blanc argenté, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, longues d'un à deux pouces, tandis que les anciennes sont une & deux fois plus amples, les unes obtuses, d'autres aiguës, pubescentes & cendrées en dessous. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

*Observations.* Le *cinchona spinosa* de Lambert, qu'il caractérise par ces expressions: *Cinchona*

*foliis minims, subrotundis; pedunculis unifloris; corollis glabris, quadrifidis, tetrandris; seminibus subemarginatis.* Gen. Cinch. pag. 38. tab. 13. & qui est le *cinchona (pinosa)*, *pedunculis unifloris, floribus tetrandris.* L'avaiseur. Journ. de Physiq. ann. 1790. octob. pag. 243. tab. 2. & Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 361. n°. 7. est évidemment une espèce de *catesbaui*, & même me paroît être très-voisin du *catesbaui spinosa* Linn.

QUIRIVEL de Ceilan. *Quirivelia zeylanica.*

*Quirivelia foliis ovato lanceolatis, subacuminatis; floribus racemosis, axillaribus.* (N.)

*Apocynum (frutescens), caule erecto, frutescente; foliis lanceolato-ovalibus, corollis auris, fauce villosis.* Linn. Syst. veget. pag. 258. n°. 7. — Flor. zeyl. 114. — Miller. Dict. n°. 6.

*Apocynum caule erecto, arboreo; foliis ovatis, acutis.* Roy. Lugd. Bat. 412.

*Apocynum floribus fasciculatis.* Burm. Flor. zeyl. pag. 23. tab. 12. fig. 1. *Kiriwatt zeylonensium.*

L'examen qu'a fait M. Lamarck de quelques parties de la fructification de cette plante, & que nous avons vérifiées dans son herbier, prouve évidemment qu'elle n'appartient ni au genre des apocins ni même à leur famille; elle doit donc constituer un genre particulier que nous ne faisons ici qu'indiquer, plusieurs parties de la fructification ne nous étant pas suffisamment connues. Son caractère principal consiste dans le fruit, qui se présente sous la forme d'une petite capsule mince, ovale, supérieure, à peine longue d'une ligne, environnée à sa base par le calice, à une loge, à cinq valves. Les semences manquent.

C'est d'ailleurs un arbrisseau dont les rameaux sont cylindriques, d'un brun rouilleux, légèrement pubescents, garnis de feuilles opposées, ovales, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, glabres, d'un vert foncé en dessus, pâles en dessous, ayant, outre leurs nervures, beaucoup de petites veines qui, en se croisant, font paroître cette partie de leur surface délicatement réticulée; elles ont deux pouces ou deux pouces & demi de longueur, sur environ un pouce de large, & sont soutenues par des pétioles très-courts.

Les fleurs sont petites, & naissent dans la partie supérieure des rameaux, en petites grappes axillaires & terminales, sur des pédoncules branchus, pubescents, & souvent opposés à chaque nœud. Les corolles sont tubulées, & leur limbe partagé en cinq découpures ouvertes en étoile; l'orifice du tube est velu.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan. Elle y a été recueillie par M. Sonnerat, qui en a communiqué des échantillons à M. Lamarck. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

**QUISQUALE.** *Quisqualis*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des thymélées, qui a des rapports avec les *neilandra*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe; dont les feuilles sont opposées, les fleurs en épis terminaux ou axillaires, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice très-long, filiforme, à cinq dents; cinq pétales; dix étamines; un stigmate obtus; un drupe monosperme, à cinq angles.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, dont le tube est très-long, & dont le limbe est divisé en cinq dents ouvertes, caduques.

2°. Une corolle à cinq pétales (cinq écailles, selon Jussieu), insérés à l'orifice du calice, oblongs, obtus, plus longs que les dents calicinales.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont sétacés, insérés à l'orifice du calice; cinq inférieurs, terminés par des anthères fort petites.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines, terminé par un stigmate obtus, élargi.

Le fruit est un drupe sec, à cinq angles, contenant une noix arrondie.

ESPÈCES.

1. *QUISQUALE pubescens*. *Quisqualis pubescens*.

*Quisqualis foliis oppositis, floribus aggregatis, caule scapubescens*. (N.) Lam. Illustr. Gen. tab. 357. fig. 2.

*Quisqualis indica*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 556.

*Quisqualis pubescens*. Burm. Flor. Ind. tab. 35. fig. 2.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, ramifiées, un peu pubescentes, garnies de feuilles pétioolées, opposées, ovales, entières, médiocrement échanquées en cœur à leur base, un peu acuminées à leurs bords, glabres, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont terminales ou axillaires vers l'extrémité des rameaux, munies d'un pédoncule commun, simple, filiforme, plus court que les feuilles, terminé par un fascicule de fleurs sessiles, munies à leur base de bractées ovales, opposées. Le calice est très-long, cylindrique, tubulé, un peu pubescent; la corolle composée de cinq pé-

tales oblongs, elliptiques, insérés sur l'orifice du calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5

2. *QUISQUALE glabra*. *Quisqualis glabra*.

*Quisqualis foliis oppositis, floribus subracemosis, bracteis imbricatis, calicibus glabris*. (N.) Lam. Ill. Gen. tab. 357. fig. b-f.

*Quisqualis glabra*. Burm. Flor. Ind. tab. 2. fig. 2.

*Quisqualis*. Rumph. Amboin. 5. pag. 71. tab. 38.

Je ne crois pas que cette plante puisse être réunie avec la précédente, à laquelle elle ressemble à la vérité par ses feuilles, mais dont elle diffère par la forme & par la disposition de ses fleurs, autant qu'on peut en juger par les figures qu'en ont données Rumphé & Burman.

Ces fleurs sont terminales, supportées par un pédoncule à ramifications opposées, peu nombreuses; chacune d'elles terminée par des fleurs alternes, presque sessiles, garnis de bractées ovales, imbriquées. Les calices sont glabres, leur tube long & filiforme; la corolle plus petite que dans l'espèce précédente, à cinq pétales courts, ovales. Leur fruit est un drupe allongé, presque cunéiforme, à cinq angles.

Cette plante croît dans l'île d'Amboine, aux Indes orientales. 5

**QUIVI.** *Quivisa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des zédérachés, qui a des rapports avec les *guarea*, & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, rarement opposées, simples, quelquefois pinnatifides, & dont les fleurs sont axillaires, en grappes ou solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice campanulé, à quatre ou cinq dents; quatre à cinq pétales; huit à dix étamines sessiles; les anthères fixées à l'extrémité d'un tube central; une capsule coriace, à quatre valves monospermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, persistant, divisé à son orifice en quatre ou cinq dents.

2°. Une corolle composée de quatre à cinq pétales lancéolés, obtus, attachés extérieurement à la base du tube qui soutient les anthères.

3°. Huit à dix étamines dépourvues de filaments,



mais dont les anthères sont fixées à l'extrémité d'un tube central, urcéolé.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, fillonné, surmonté d'un style simple, plus long que le tube des anthères, terminé par un stigmate épais, globuleux, fillonné.

Le fruit est une capsule ovale, coriace, à quatre loges, divisée jusque vers son milieu en quatre valves, chaque loge contenant une ou deux semences glabres, ovales.

Observations. Ce genre, très-voisin des *guarea*, en diffère par l'infertion des étamines, attachées à l'extrémité du tube qui les supporte, tandis que dans les *guarea* elles sont insérées en dedans même du tube, & non terminales; de plus, ce dernier genre a des semences recouvertes d'une enveloppe propre, & les feuilles ailées.

Commerçon, dans ses manuscrits, donne à ce genre le nom de *baretia*, & le consacre à la mémoire d'une femme courageuse, nommée *Baret*, qui, par amour pour les voyages, avoit voulu l'accompagner, & s'étoit déguisée sous un habit d'homme pour mieux exécuter son projet. Elle resta inconnue à tous les gens de l'équipage pendant une grande partie du voyage; mais étant arrivée à Orahiti, les insulaires de cette île ne furent pas un instant trompés sur son sexe; cette femme extraordinaire accompagna Commerçon dans toutes ses excursions botaniques; elle mourut dans le cours du voyage.

#### ESPÈCES.

##### 1. QUIVI à dix étamines. *Quivisia decandra*.

*Quivisia foliis alternis, lanceolatis, glabris, integerrimis; floribus axillaribus, racemosis.* Cavan. Dissert. botan. 7. pag. 367. n°. 531. tab. 211.

*Baretia bonafidia, foliis constantibus, ovato-oblongis; floribus albis, flaminibus decem, nectarii limbo incumbentibus.* Commerf. Herb. manuscrit. & fig.

Arbusteau dont les tiges se divisent en rameaux nombreux, alternes, glabres, cylindriques, striés, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, lancéolées, pointues à leurs deux extrémités, entières à leurs bords; luisantes à leur surface supérieure, d'un vert pâle en dessous.

Les fleurs sont axillaires, disposées en petites grappes courtes. Leur calice est petit, à peine pubescent, campanulé, à cinq dents très-courtes, aiguës. La corolle est blanche, composée de cinq pétales ovales, trois fois plus longs que le calice; elle contient dix étamines. Le fruit est une capsule rouffâtre, tomenteuse, à quatre loges, contenant chacune une semence.

Cette plante croît à l'île-de-France, où elle a été recueillie par Commerçon. h (V. f. in herb. Lamarck.)

##### 2. QUIVI à feuilles opposées. *Quivisia oppositifolia*. Cavan.

*Quivisia foliis oppositis, ovatis, integerrimis, glabris; floribus axillaribus, pedunculis trifloris.* Cavan. Dissert. botan. 7. pag. 368. n°. 534. tab. 224.

C'est un arbre ou arbusteau à rameaux épars; les supérieurs opposés, dont l'écorce est ridée, d'un gris foncé, la bois jaunâtre, les feuilles ovales, entières, médiocrement pétiolées, glabres; les inférieures un peu alternes; les supérieures opposées.

Les fleurs sont axillaires, les pédoncules communs, longs d'environ un demi-pouce, divisés à leur sommet en trois autres, courts, uniflores, tomenteux. La capsule est globuleuse, presque ligneuse, de la grosseur d'un pois, couverte d'un duvet un peu jaunâtre, tomenteux; à demi-divisée en quatre ou cinq valves, contenant quatre ou cinq loges, dans chacune desquelles sont renfermées deux semences ovales, oblongues, attachées à un placenta droit, marqué de quatre ou cinq sillons.

Cette plante a été recueillie à l'île-de-France par Commerçon. h (V. f. in herb. Lamarck.)

##### 3. QUIVI ovale. *Quivisia ovata*. Cavan.

*Quivisia foliis ovatis, alternis, integerrimis; floribus subsessilibus, axillaribus, binis aut pluribus.* Cavan. Dissert. botan. 7. pag. 368. n°. 532. tab. 222.

*Baretia foliis tetrapetalis, obovatis; foliis constantibus, ovatis.* Commerf. Herb. & fig.

Ses tiges sont divisées en rameaux alternes, grisâtres, revêtus d'une écorce grisâtre & glabre, garni de feuilles pétiolées, alternes, ovales, glabres, très-entières, obovales, coriaces, luisantes à leur face supérieure. Les fleurs sont axillaires, en grappes extrêmement courtes, presque sessiles ou solitaires.

Leur calice est un peu pubescent, à quatre petites dents. La corolle est composée de quatre pétales blanchâtres en dehors, rougeâtres en dedans, un peu aigus à leur base, trois fois plus longs que le calice; elle renferme huit anthères, situées à l'extrémité d'un tube rougeâtre. La capsule est tomenteuse.

Cette plante croît à l'île Bourbon, où elle a été recueillie par Commerçon. h (V. f. in herb. Lamarck.)

4. QUIVI hétérophylle. *Quivisa heterophylla*. Cavan.

*Quivisa foliis ovatis, integris aut pinnatifidis ; floribus axillaribus, binis*. Cavan. Dissert. botan. 7. pag. 368. n°. 533. tab. 213.

*Barrisa floribus tetrapetalis, obovatis ; foliis multabilibus*. Commerst. Herb.

Espèce remarquable par la forme très-variée de ses feuilles : les tiges se divisent en rameaux alternes, grêles, ridés, très-glabres, garnis de feuilles alternes, pétiolées ; les unes ovales ou presque rondes, très-entières ; les autres lobées,

sinuées, assez semblables à celles du chêne ; d'autres enfin pinnatifides, à pinnules plus ou moins fines, obtuses, glabres, luisantes à leur face supérieure, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont fort petites, axillaires, presque sessiles, souvent pas plus de deux dans chaque aisselle. Le calice & la corolle sont légèrement pubescens ; la capsule presque glabre, ovale ou arrondie, très-petite.

Cette plante croît à l'île Bourbon, où elle a été observée par Commerst. Peut-être n'est-elle qu'une variété remarquable du *quivisa ovata*. *♂* (*V. f. in herb. Lam.*)



**RABOTEUSES, RUDES** (Feuilles). *Aspera*, *scabra folia*.

On désigne par ce nom les feuilles dont la superficie est parsemée de tubercules rudes ou d'aspérités qui ordinairement s'accrochent aisément aux étoffes, comme les feuilles de quelques espèces de *galium*, l'*aparine*, &c.

Le calice prend la même dénomination lorsqu'il offre le même caractère.

**RACARIER** des bois. *Racaria silvatica*. Aubl. Guian. vol. 2. Suppl. pag. 24. tab. 381.

Ce genre, décrit par Aublet, dont il n'a connu que les fruits, parait se rapprocher beaucoup de celui des *salispa*, établi par le même auteur, & dont il n'avait pas vu les fruits : l'un & l'autre appartiennent à la famille des favoniers.

Quant à la plante dont il s'agit ici, c'est un arbrisseau qui, d'après Aublet, s'élève à la hauteur de dix à douze pieds. Son tronc est droit, & à environ trois ou quatre pouces de diamètre, revêtu d'une écorce mince, lisse, marquée par les impressions des feuilles tombées, & garni, un peu au dessous de ces impressions, de tubercules, d'où sortent des épines dures, longues de trois ou quatre lignes. Le bois est blanc & fort dur; les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées d'environ trois paires de folioles glabres, ovales, aiguës, très-entières, rangées par opposition le long d'un pétiole d'environ dix pouces, triangulaire, très-épais à la base, terminé par une pointe fort aiguë. Chaque foliole est longue de sept à huit pouces, sur trois & demi de large, d'inégale grandeur, les supérieures étant plus larges.

Les fruits sont disposés en une sorte de grappe au sommet du tronc sur lequel Aublet n'a jamais vu de branches. Ces fruits ont la grosseur & la forme d'un gland, revêtus d'une écorce épaisse & jaune, qui recouvre une substance acide & molle, sous laquelle se trouvent trois noyaux oblongs, triangulaires, rapprochés par leur face interne, convexes à leur face extérieure. Chacun de ces noyaux renferme une amande verte, qui a la faveur d'un pois vert : quelquefois il n'y a qu'un seul noyau de forme ovoidé; d'autres fois il y en a deux comprimés, appliqués l'un contre l'autre, convexes à leur face extérieure. Ces fruits sont supportés par un pédoncule ligneux, profondément enfoncé dans leur substance.

On rencontre cet arbrisseau dans les forêts de la Guiane, au bas de la montagne Serpent; il porte ses fruits vers le milieu de l'été. ¶

**RACHIS ou RAPE.** *Rachis*. C'est le nom que l'on donne, dans les graminées, à cette partie sur laquelle sont immédiatement appuyés les épillets, & qui leur sert de réceptacle, comme dans l'orge, le froment, le seigle, &c.

**RACINE.** *Radix*. C'est un organe situé communément à l'extrémité inférieure de la plante, & qui s'enfonce presque toujours dans la terre, où son accroissement le fait tantôt de haut en bas, tantôt horizontalement, & très-rarement de bas en haut. Cet organe est doué fortement de la faculté de pomper les sucs nécessaires à la nutrition & à l'accroissement des végétaux.

On appelle plantes *parasites* (voyez ce mot) celles dont les racines ne sont fixées ni dans la terre ni sur aucun corps inorganique, mais qui sont attachées à d'autres plantes, aux dépens desquelles elles se nourrissent en suçant leur substance.

Il y a des plantes dont les racines s'attachent aux corps les plus durs, comme les lichens & les mousses, qui croissent sur les pierres & sur l'écorce des arbres; d'autres plantes naissent à fleur d'eau sans adhérer à la terre; d'autres paraissent entièrement privées de racines, comme les *conferva*, le *nothæ*; d'autres enfin semblent en être tout-à-fait composées, & n'avoir aucune autre partie, comme les *truffes*.

La structure, la forme, la durée, la situation & la consistance des racines étant différentes dans les différentes plantes, on a donné à cette partie diverses dénominations particulières pour en exprimer les caractères les plus saillants. D'abord on en a distingué de trois espèces; savoir : les racines bulbeuses, les tubéreuses & les fibreuses.

**A. LA RACINE BULBEUSE** (*radix bulbosa*) porte communément le nom d'*oignon* : sa substance est tendre, succulente, & sa forme arrondie ou ovale. On remarque à sa partie inférieure une portion charnue, d'où part un paquet de fibres : ce sont elles qui, dans ces sortes de plantes, paraissent constituer les racines proprement dites.

On distingue plusieurs sortes de bulbes; les uns sont écailleuses (*squamosi*), & sont composées de membranes épaisses, disposées en écailles, comme dans les lys; les autres sont d'une substance charnue & solide (*solidi*), comme dans la tulipe; d'autres forment plusieurs tuniques (*tunicati*) qui s'enveloppent les uns dans les autres, comme celles de l'ail, de l'oignon, &c.; d'autres enfin sont articulées (*articulati*), & composées de portions charnues distinguées entr'elles, mais qui

communiquent par des fibres intermédiaires, comme celles de la *fasitrago granulata*.

B. La RACINE TUBÉREUSE (*radix tuberosa*) est un corps charnu, arrondi, solide, & d'où partent souvent latéralement & inférieurement de petites racines fibreuses, comme dans la pomme de terre : on la nomme :

— Globuleuse (*globosa*), lorsqu'elle est d'une forme un peu sphérique, comme dans le navet, le radis.

— Noueuse (*nodosa*), quand elle forme des nœuds, comme dans la niépulide, où ces nœuds sont suspendus par des filets, comme des grains de chapelot.

— Fasciculée (*fasciculata*), lorsqu'un grand nombre de ses portions partent d'un centre commun en s'allongeant, comme dans l'asphodèle.

— Palmée (*palmata*), lorsque ces mêmes portions charnues font un peu ouvertes, presqu'en forme de main, comme dans l'orchis à larges feuilles, & plusieurs autres.

— Grumeleuse (*grumosa*), lorsqu'elle est disposée par grumeaux ou par petites portions adhérentes, comme dans les griffes de renoncule, les pattes d'anémone, &c.

C. La RACINE FIBREUSE (*radix fibrosa*) est celle qui est composée de plusieurs jets longs, fibreux ou chevelus, comme dans la *veronica beccabunga*, le *plantago lanceolata*, &c.

On la considère quant à sa forme & à sa direction, & alors on la nomme :

— Rameuse (*ramosa*), lorsqu'elle se divise en plusieurs branches latérales, comme dans le *plantago psyllium*.

— Fusiforme (*fusiformis*), lorsqu'elle est épaisse, allongée, & qu'elle va en diminuant, comme dans la carotte, le panais, la rave, &c.

— Pivotante (*perpendicularis*), lorsqu'elle s'enfonce profondément & perpendiculairement à l'horizon, comme celle de la rave.

— Horizontale (*horizontalis*), lorsque, sans s'étendre beaucoup, elle est disposée parallèlement à l'horizon, comme dans l'iris.

— Tronquée (*truncata*, *pramosa*), lorsqu'elle ne se termine pas en pointe, mais que son extrémité parait tronquée ou rongée, comme dans la scabieuse des bois.

— Articulée (*articulata*), lorsqu'elle forme différents nœuds & plusieurs articulations, comme dans le *convallaria polygonatum*.

— Traçante ou rampante (*repens*), lorsqu'elle

s'étend horizontalement, & qu'elle jette des biins de tous côtés, sans pénétrer profondément dans la terre, comme dans le *panium datylon*.

— Stoloniifère (*stolonifera*), lorsqu'étant traçante, elle pousse à & là des rejets rampans, qui portent eux-mêmes des racines, comme dans le chiendent.

Les racines fibreuses & même les autres sortes de racines se distinguent aussi par leur durée, & alors on dit qu'elles sont :

— Ligneuses (*fruticosa*), lorsqu'elles ont beaucoup de consistance, que leurs fibres sont dures & difficiles à rompre, & qu'elles subsistent avec leurs tiges pendant plus de trois ans, comme celles des arbres, des arbrisseaux & des sous-arbrisseaux.

— Vivaces (*perennes*), lorsqu'elles subsistent pendant plusieurs années, quoique leur tige périt, comme celles de l'oselle, de la violette.

— Bisannuelles (*biennes*), lorsqu'elles durent avec leurs tiges pendant deux ans seulement, comme le persil, le salifis.

— Annuelles (*annua*), lorsqu'elles périssent avec leurs tiges dans l'année même qu'elles sont nées, comme celles du blé, de la laitue, &c.

Des observations particulières viennent se joindre à ces détails. Une racine n'a pas toujours besoin d'être entière pour produire une plante. Une petite tranche de la racine du *solanum tuberosum*, la pomme de terre, mise en terre, vit & reproduit très aisément une plante complète, & de simples biins du *triticum repens* donneront de même une nouvelle plante, comme seroit une racine entière.

On remarque un rapport & une correspondance singulière entre les racines & les tiges ; car les unes & les autres se développent & se divisent assez uniformément dans beaucoup de plantes. En effet, une tige qui fournit peu de branches, ou qu'on empêche de s'élever, n'a ordinairement que de médiocres racines.

Cette observation, qu'il est intéressant de connaître pour la culture de certains arbres, n'est cependant pas générale ; car il y a des plantes dont les racines n'ont presque aucune proportion avec les tiges : certaines herbes balsées, comme plusieurs *geranium*, *hieracium*, &c. ayant de fort grosses racines, & certains arbres, comme les sapins, n'en ayant que de médiocres, par comparaison avec les tiges auxquelles elles appartiennent.

Les racines sont quelquefois pleines d'un suc laiteux, blanc & doux, comme dans la laitue, la chicorée ; âcre, comme dans le tithymale, le colchique, & de couleur jaune, comme dans la chélidoine.

Elles sont quelquefois plus odorantes que les autres parties de la plante, comme celles de la valériane, de la benoite, &c.

En général, les racines sont recouvertes d'un épiderme un peu coloré, sous lequel on trouve ordinairement une écorce assez épaisse. Dans les végétaux ligneux, elles sont, comme le tronc, composées du corps ligneux & de couches corticales. Ces dernières contiennent des vaisseaux séveux, des vaisseaux propres, & le tissu cellulaire, ordinairement plus abondant dans les racines que dans les autres parties de la même plante.

Si un accident quelconque détruit une portion de racine, la partie qui reste cesse de s'étendre, mais elle produit des ramifications latérales plus nombreuses, & qui suppléent abondamment à celle qui a été détruite : la plante n'en est pas affaiblie, & même souvent elle n'en pousse que mieux.

Plusieurs circonstances particulières peuvent donner aux racines une direction différente de celle qu'elles auroient avoir naturellement, chacune selon sa nature. Les corps durs, les pierres, les dérangements fréquemment de la route qu'elles ont à suivre : alors elles poussent un plus grand nombre de branches latérales, comme si elles avoient été coupées, & il se forme ordinairement une sorte de nœud à l'extrémité des rameaux qui sont privés de la liberté de s'étendre. Mais si, par une circonstance opposée, il se rencontre dans le voisinage des racines une terre nouvellement remuée & d'une bonne qualité, les jeunes racines se dirigent de préférence vers ce côté, où elles font des progrès étonnans, sans presque former de branches latérales.

**RACLE.** *Cenchrus*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *agilops*, & comprend des herbes la plupart exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épi.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un involucre lacinié ou divisé en poils roides, à trois ou quatre fleurs; une balle bivalve, à deux fleurs; une corolle bivalve, musquée; un style bifide; les fleurs souvent polygames.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un involucre lacinié ou divisé en poils roides, filiformes ou sétacés, contenant de deux à quatre fleurs.

La balle calicinale biflore, à deux valves lancéolées, concaves, aiguës, plus courtes que la corolle; une des deux fleurs hermaphrodite, l'autre souvent mâle.

2°. Une corolle à deux valves concaves, lancéolées, acuminées, musquées, l'une des deux plus courte.

3°. Trois étamines dont les filaments sont capillaires, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères sagittées.

4°. Un ovaire médiocrement arrondi (il manque dans les fleurs mâles), surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates oblongs, velus, écartés entr'eux.

Les semences sont courtes, un peu arrondies, enveloppées par la corolle persistante.

*Observations.* Si l'on excepte quelques espèces, les autres de ce genre n'offrent que très-imparfaitement les caractères qui le constituent : il est d'ailleurs difficile de savoir auquel des caractères il convient le plus de s'arrêter. Celui qui paroît le plus saillant consiste dans une bractée ou un involucre très-variable, divisé en poils roides ou par digitations, hérissé de plus, dans certaines espèces, de pointes particulières sur le dos; dans d'autres, les valves calicinales prennent ce caractère, mais l'involucre manque; les épillets contiennent deux à trois fleurs, dont quelquefois une d'elles est stérile, les autres hermaphrodites; dans certaines espèces toutes les fleurs sont hermaphrodites, & les épillets en contiennent d'une à quatre.

Ces différences ont occasionné l'établissement de deux ou trois autres genres, dont quelques autres espèces seroient encore susceptibles. En les réunissant en un seul, nous avons considéré l'involucre ou les valves calicinales hétéroïdes de pointes, comme un des caractères constitutifs de ce genre. Dans des genres aussi peu naturels, il faut y faire entrer pour beaucoup le *facies*, ou se déterminer à faire presque autant de genres qu'ils renferment d'espèces.

#### ESPÈCES.

1. *RACLE épineuse.* *Cenchrus tribuloides*. Linn.

*Cenchrus spica glomerata, glumis femineis, globosis, muricato-spinosis, hirsutis.* Linn. Spec. Pl. t. vol. 2. pag. 1489.

*Cenchrus capitatus spinosus, tomentosus.* Gronov. Virgin. pag. 122.

*Panicostrella americana, minor, annua; spica angusta, aenfa, albicante.* Mich. Gen. 37.

*Gramen maritimum, echinatum, procumbens, culmo longiori, spicis frigosioribus.* Sloan. Jam. 30. Hist. 1. pag. 108. tab. 65. fig. 1. — Rai. Suppl. 602.

*Gramen tribuloides, spicatum, locustis crassioribus, tribuloides virginianum.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 195. §. 8, tab. 5. fig. 4.

*Cenchrus*

*Cenchrus* (tribuloides), *vaginis ad margines pubescentibus, glumis villosis, & spinis longis rigidisque, horridis*. Michaux. Flor. boreal. - amer. vol. 1. pag. 61.

Cette plante est remarquable par les pointes dures, roides, presque écartées en croix, & très-quantités, qui garnissent les épis agglomérés en tête.

Ses tiges sont glabres, rameuses, articulées, striées, garnies de feuilles assez rapprochées, glabres, striées, souvent plus longues que les hampes, un peu rudes à leurs bords, larges de deux à trois lignes, un peu pubescentes sur les bords supérieurs de leur gaine, dont l'orifice est garni d'une touffe de poils fins, sétacés, blanchâtres.

Ses fleurs sont réunies en un épi terminal, oblong ou plus souvent capité, très-ferré, aggloméré; les épillets sessiles, globuleux, garnis de fortes épines glabres, très-quantités, ouvertes; les balles calicinales pubescentes ou velues, surtout vers leur base ciliées à leurs bords, mucronées, très-dures.

Cette plante croît en Amérique, dans la Virginie, sur les côtes maritimes. (V. f.)

## 2. RACLE hérissée. *Cenchrus echinatus*.

*Cenchrus spica oblonga, conglomerata*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1488. — Royen. Lugd. Bat. 72. — Brown. Jam. 367. n°. 1. — Schreb. Gram. 9. tab. 23. fig. 1. — Gärtn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 4. tab. 8. fig. 3. — Vahl. Symbol. 1. pag. 81. — Desfontaines. Flor. atlant. vol. 2. pag. 387. — Lam. Illustr. Gener. tab. 830. fig. 1.

*Gramen locustis tumidiore, echinatis*. Scheuz. Gram. 77.

*Gramen americanum, spica echinata, majoribus locustis*. Pluken. Almag. 177. tab. 92. fig. 3.

*Gramen echinatum, maximum, spica rubra seu alba*. Sloan. Hill. 1. pag. 108. — Rai. Suppl. 602.

*Gramen americanum, spica echinata, majoribus glumis*. Morit. Hill. 3. pag. 195.

*Panicofrella americana, major, annua, spica laxa, purpurascens*. Mich. Gen. 36. tab. 31.

*Elymus caput Medusae*. Forskh. Flor. ægypt. tab. pag. 25.

Les tiges sont glabres, coudees à leurs articulations inférieures, striées, comprimées, presque anguleuses, hautes de huit à dix pouces & plus, garnies de feuilles longues, glabres, larges de quatre à cinq lignes, lisses, striées; légèrement romescentes à l'orifice de leur gaine, qui est lâche & glabre.

Chaque tige est terminée par un épi simple, Botanique. Tome VI.

droit, long de deux à trois pouces, garni de fleurs un peu dilantes, éparées ou alternes, & dont les épillets, médiocrement pédiculés, sont munis d'un involucre large, d'une seule pièce, coriace, déchiré à ses bords; chaque déchirure terminée par une pointe roide, subulée, sétacée, jaunâtre ou un peu violette: il contient depuis deux jusqu'à quatre fleurs glabres, fort petites, aiguës. Les lemences sont ovales, presque elliptiques, sans sillon, planes, un peu convexes.

On rencontre cette plante dans l'Amérique, à la Jamaïque; elle croît aussi sur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

## 3. RACLE capitée. *Cenchrus capisatus*. Linn.

*Cenchrus spica ovata, simplicis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1488. — Royen. Lugd. Bat. 71. — Sauvag. Monsp. 40. — Lxii. Iter, pag. 172. — Gouan. Monsp. 515. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 631. n°. 1192. 1. — Monti. Prodr. 64. Ic. 102. — Gerard. Flor. gall.-prov. 107.

*Echinaria (capitata), culmo basi nodoso, superne nudo; floribus capitatis, echinatis, rigidis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 385.

*Gramen minimum, spica globosa, echinata*. Parrel. Icon. rar. pag. 1176. tab. 28. fig. 1. & tab. 863. fig. 2.

*Gramen montanum, echinatum, tribuloides, capitatum*. Col. Ecphr. 1. pag. 340. tab. 338. fig. 1.

*Gramen spica subrotunda, echinata*. Bauh. Pin. 7. Prodr. 16. Ic. — Fournet. Inst. R. Herb. 519. — Scheuz. Gram. 74. — Garid. Aix. pag. 213. — Morit Oxon. 5. 8. tab. 5. fig. 1. — Shaw. Spec. 301.

*Gramen perpusillum, capitulo rotundo, spinoso, che-leri*. J. Bauh. Hill. 2. pag. 468. Ic.

*Gramen spica subrotunda, echinata, vel gramen echinato capitato*. C. Bauh. Theatr. 107. Icon. — Scheuz. Gram. 74. tab. 2. fig. 7. — Monti. Prodr. 64. fig. 102.

C'est une plante fort petite, dont les tiges sont striées, grêles, menues, nouées à leur base, hautes au plus de quatre à six pouces, n'ayant qu'une ou deux articulations au plus, presque nues, garnies, dans leur partie inférieure seulement, de feuilles disposées en gazon; pubescentes, larges d'environ une à deux lignes, au moins une fois moins longues que les chaumes.

Les fleurs sont réunies en une petite tête terminale, arrondie ou un peu ovale, courte, verdâtre, sans involucre particulier, mais dont le calice est membraneux, à trois fleurs, à deux valves elliptiques, presque égales, terminées à leur sommet par une, deux ou trois pointes. La corolle est

égale, composée de deux valves rudes, fermes; l'extérieure plus grande, à quatre ou cinq divisions dures, longues, subulées, inégales; l'intérieure plus petite, à deux ou trois divisions: elles renferment une semence libre, petite & oblongue.

Cette plante croît dans les lieux arides en Italie, en Espagne, dans les départemens méridionaux de la France, & sur la côte de Barbarie. ○ (V. v.)

Observations. On doit avoir remarqué par les détails que j'ai présentés de la fructification de cette plante, observés par M. Desfontaines, & que j'ai vérifiés, qu'elle s'écarte des *Cenchrus* par le défaut d'involucre & par quelques autres caractères, & que dès-lors elle se prête à la formation d'un nouveau genre que M. Desfontaines a établi sous le nom d'*echinaria*, & dont voici le caractère essentiel :

Des fleurs hermaphrodites, réunies en une tête arrondie; un calice presque à trois fleurs, à deux valves membraneuses & mucronées; une corolle à deux valves, dont l'extérieure est divisée en quatre ou cinq découpures roides, longues, subulées, inégales; l'intérieure plus petite, bipale ou trifide; trois étamines; deux styles; une semence petite, supérieure, oblongue; souvent une fleur terminale, stérile. Desfont.

#### 4. RACLE bardanière. *Cenchrus lappaceus*. Linn.

*Cenchrus panicula ramis simplicissimis, corollis retrorsum hispidis; calicibus trivalvibus, bifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1488.

Cette espèce paroît se rapprocher beaucoup des *panicum* par ses calices à trois valves; & pour qu'il puisse tenir dans ce genre, il faut supposer que la troisième valve tient lieu de l'involucre particulier aux *cenchrus*, auxquels cette plante convient encore par ses fleurs polygames.

Ses hampes sont lisses & ramufes; ses feuilles en cœur, lancéolées, rudes à leurs bords. La panicule est très-ouverte, ample, composée de ramifications très-simples & capillaires. Les épillets sont alternes, pédiculés, ovales-oblongs: ils sont munis d'un calice à trois valves, contenant deux fleurs; l'inférieure fertile, la supérieure mâle ou stérile. La valve extérieure de la corolle est armée d'un des côtés de sa partie supérieure de pointes épineuses, & garnie vers sa base de poils courts, rigides, noueux & tresséchés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Description, ex Linn.)

#### 5. RACLE mucronée. *Cenchrus muricatus*. Linn.

*Cenchrus frica muricata, squamis variis, mucronatis.* Linn. Syll. veget. pag. 97. — Mantiss. 302. — Schreb. Gram. 2. pag. 69. tab. 34.

*Panicum (squamosum), fricis geminis, horizontalibus, involucri florum squarrosi; culmis decumbentibus.* Retz. Observ. 4. pag. 15 & 5. tab. 1.

La disposition des fleurs dans cette plante lui donne l'aspect d'un *panicum*; elle a aussi beaucoup de rapports avec les *panicum*, parmi lesquels Retzius a cru devoir la ranger.

Ses tiges sont couchées, longues de huit à dix pouces, rameuses, garnies de feuilles molles, d'une largeur médiocre, enveloppant la tige presque en totalité par leur gaine: il sort de l'aisselle des feuilles supérieures quelques pédoncules longs, filiformes, qui supportent chacun un épi grêle, nu, presque unilatéral, très-ferré, dont le rachis est flexueux, articulé, muni à chacun de ses côtés d'une membrane assez large, soutenant des fleurs sessiles, très-serrées, scarieuses, environnées extérieurement d'involucres formés par des écailles variées, larges, roides, quelquefois un peu tortueuses, ovales ou lancéolées, glabres, dures, subulées ou mucronées; la balle calicinale ciliée à ses bords, contenant d'une à deux fleurs.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○ (V. f.)

#### 6. RACLE recourbée. *Cenchrus inflexus*.

*Cenchrus foliis lanceolatis, villosis, racemis lateralibus, inflexis, longe pedunculatis; spiculis sessilibus, secundis.* (N.)

Cette belle espèce a des tiges rampantes, cylindriques, entièrement revêtues de feuilles courtes, lancéolées, longues d'un pouce & demi, larges à leur base d'environ quatre lignes, presque en cœur à leur base, velues particulièrement sur leur gain: & à leurs bords, finement striées.

Des aisselles des feuilles supérieures sortent de longs pédoncules de six à sept pouces, simples, glabres, terminés par un épi de fleurs sessiles, toutes tournées du même côté, & dont le rachis approche de celui des *passium*: il se courbe à son point d'insertion, de manière à former presque un angle droit avec la tige. Les épillets sont lancéolés, étroits, très-aigus. La valve calicinale extérieure est hérissée de pointes spinuliformes, ciliée à ses bords, très-pointue; l'intérieure est plus courte, velue à son sommet: elles renferment une à deux fleurs au plus. La balle de la corolle, beaucoup plus courte que celle du calice, est plane, glabre, obtuse, à une seule valve; une semence nue, luisante, oblongue, cylindrique.

Cette plante, que je n'ai pu observer que sur un médiocre échantillon, pourroit bien appartenir à un autre genre, malgré ses rapports avec celui-ci. Je n'y ai pas vu d'involucre: elle mériteroit d'être mieux examinée. M. Richard l'a recueillie à Cayenne. (V. f. in herb. Jusieu & Lam.)

7. RACLE à feuilles rudes. *Cenchrus asperifolius*.

*Cenchrus foliis retrorsum asperis, involucriis setosis, flore quadrato longioribus, inferne villosis, albis, aut aut bifloris.* Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 388.

*Alaearum* (hordeiformis), *racemo simpliciter, foliis aristis, circumvallatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 90.

*Cenchrus* (hordeiformis), *racemo spicato, simpliciter, florum involucris polyphyllis, scabro; culmo erecto.* Thunberg. Prodr. 24. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 518. n. 8.

Cette plante est très-rapprochée du *cenchrus rufescens* & du *cenchrus citraris*; mais elle diffère de l'un & de l'autre par ses feuilles roides, coupantes & rudes à leurs bords; par les fleurs solitaires ou geminées, par ses involucreux composés de folies blanchâtres, par les ligmates non colorés.

Les tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, garnies de feuilles glabres, roulées sur elles-mêmes, tubuleuses, roides, larges d'environ une ligne. Les épis sont longs de cinq à six pouces, blanchâtres, non interrompus, munis de bractées noueuses, composées de filaments soyeux, inégaux, velus à leur base, trois & quatre fois plus longs que les fleurs; celles-ci sont sessiles, solitaires ou deux ensemble, aiguës, muriques; l'une mâle, l'autre hermaphrodite, placées sur un rachis velu.

Cette plante croît dans les Indes & au Cap de Bonne-Espérance: elle a été aussi observée par M. Desfontaines dans les montagnes de l'Afrique, proche Bugie. ♀ (*V. f. in herb.* Desfont.)

8. RACLE ovale. *Cenchrus ovatus*.

*Cenchrus foliis glaberrimis, durissculis, spicis densis ovatis.* (N.) Lam. Illustr. Gen. tab. 838. fig. 1.

Ses tiges sont roides, lisses, cylindriques, garnies de feuilles fermes, roides, glabres, aiguës, roulées intérieurement à leurs bords, striées en dessous: leur gaine est cylindrique, longue, étroite, garnie à son orifice d'une petite touffe de poils fins & blanchâtres. Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, un épi épais, touffu & rameux: les valves extérieures des épillets sont chargées de poils roides, blanchâtres; elles renferment deux ou trois fleurs lisses, ovales, muricées.

Cette plante a été recueillie par M. Sonnerat au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb.* Lam.)

9. RACLE tomenteuse. *Cenchrus tomentosus*.

*Cenchrus foliis superius tomentoso-lanatis, subulis striatis; spicis ovato-longis.* (N.)

Cette jolie espèce est une des plus distinctes de ce genre. Ses tiges sont droites, glabres, garnies de feuilles roides, étroites, planes, un peu roulées à leurs bords, & dont la face supérieure est chargée de poils lanugineux, tomenteux, fins, cendrés; leur face inférieure striée; les gaines cylindriques, striées, garnies de poils rates & fins, ainsi que le dessous des feuilles.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en un épi très-fermé, ovale, oblong, quelquefois interrompu à la base. Les valves extérieures des épillets sont munies, tant à leurs bords que sur leur dos, de pointes courtes, roides, inégales, renfermant trois à quatre fleurs glabres, oblongues, dont les valves sont fort aiguës.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Elle a été cultivée dans le jardin de M. Lheritier. (*V. f. in herb.* Lam.)

10. RACLE rouffâtre. *Cenchrus rufescens*. Desf.

*Cenchrus foliis glabris, spica elongata; involucriis confertis, setiformibus, rufescentibus, inferne villosis; flore triplo longioribus, calicibus subulioris.* Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 388.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *cenchrus citraris*. Elle en diffère par ses feuilles glabres, par les épis plus longs, par les involucreux rouffâtres & par les fleurs bien plus petites.

Ses tiges sont presque couchées, fermes, noueuses, juniformes, garnies de feuilles glabres, roulées, rudes à leurs bords: leur gaine est munie à son orifice d'une membrane décomposée à ses bords. L'épi est serré, long de quatre à cinq pouces; les involucreux sont formés de plusieurs filaments soyeux, rouffâtres, longs, inégaux, velus à leur base. Le calice est composé de deux valves membraneuses, plus courtes que celles de la corolle; elles contiennent d'une à deux fleurs: les valves de la corolle sont violettes.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines dans la Barbarie, proche Mascara, où elle croît dans les lieux sablonneux. (*V. f. in herb.* Desfont.)

11. RACLE rameuse. *Cenchrus ramosissimus*.

*Cenchrus caule frutescente, ramis dichotomis, spicis longissimis; involucriis mollibus, setaceis, nudis; spiculis subquadrifloris.* (N.)

Cette espèce est très-remarquable par la grande & la dureté de ses tiges, qui sont très-lisses, pleines, fort hautes, & se ramifient en plusieurs dichotomies. Les feuilles sont glabres, longues, aiguës, striées, un peu rudes, nues & serrées à l'orifice de leur gaine.

Les fleurs terminent chaque rameau, & forment



un épi cylindrique, long de deux ou trois pouces & plus, garni d'épillets féssiles, épars, alternes, dont le rachis est glabre, flexueux, comprimé. Chaque épillet est environné à sa base d'un involucre composé de poils soyeux, très-fins, nombreux, presque argentés, un peu plus longs que les fleurs. Le calice est composé de deux valves inégales, minces, concaves, obtuses, contenant de deux à quatre fleurs.

Cette plante croît en Égypte. (*V. f. in herb. Lam.*)

12. RACLE ciliée. *Cenchrus ciliaris*, Linn.

*Cenchrus spicid involucrellis setaceis, ciliatis, quadrifloris*. Linn. Mantiss. 102. — Gisecke. Ic. Falc. t. tab. 23. — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 387. — Lam. Illustr. Gener. tab. 838. fig. 3.

Espèce distinguée par ses feuilles velues, par ses involucrets sétacés & ciliés, renfermant quatre fleurs.

Ses tiges sont grêles, filiformes, hautes d'environ un pied & demi, noueuses, un peu coudées à leurs articulations, nues à leur partie supérieure, garnies de feuilles assez étroites, un peu velues & frisées sur leur gaine, ciliées à son orifice.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité de chaque tige en un épi cylindrique, un peu interrompu, long de deux à trois pouces, garni d'épillets alternes, féssiles, épars. L'involucre ou la bractée est divisé en pois fins, soyeux, de couleur pourpre, ciliés à leur base, deux & trois fois plus longs que les valves, enveloppant ordinairement quatre fleurs réunies : chacun des calices est biflore, à deux valves membraneuses, inégales ; l'une de ces deux fleurs est mâle, l'autre hermaphrodite ; les stigmates sont violets, & le rachis flexueux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. M. Desfontaines l'a également observée sur les côtes de Barbarie, proche Cafa, dans les lieux sablonneux, & Forskhal l'a recueillie en Égypte. On la cultive au Jardin des Plantes du Muséum de Paris. 2. (*V. v.*)

13. RACLE à petites fleurs. *Cenchrus parviflorus*.

*Cenchrus spicid involucrellis setaceis, nuais ; spiculis subnullis, minimis*. (N.)

Cette plante a des riges grêles, filiformes, hautes d'un à deux pieds, glabres, garnies de feuilles longues, étroites, très-aiguës, rudes au toucher ; les gaines sont lisses, un peu lâches, nues à leur orifice, munies d'une petite membrane courte, rouffâtre, un peu déchirée à son sommet.

Les fleurs sont disposées en un épi lancéolé, un peu comprimé, verdâtre ou de couleur purpurine, composé d'épillets féssiles, fort petits, chacun

enveloppé par un involucre de poils roides, très-longes, sétacés, accrochant, point ciliés. Il n'y a ordinairement qu'une seule fleur à chaque épillet, glabre, fort petite, ovale, à peine aiguë.

Cette plante croît à Porto-Ricco. Elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Ventenat. (*V. f.*)

14. RACLE à grappes. *Cenchrus racemosus*, Linn.

*Cenchrus paniculid spicidat, glumis muricatis, setis ciliaribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1487. — Guertard. Stramp. 2. pag. 188. — Dalib. Paris. 305. — Gouan. Monsp. 514. — Vahl. Symbol. t. p. 81. — Schreb. Gram. 45. tab. 4. — Sauvag. Monsp. 40.

*Tragus (racemosus), foliis ciliatis, asperis ; floribus interruptis spicatis, glumid calicidin exteriore muricatis*. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 386.

*Agrostis paniculid spicidat, glumis echinatis*. Gerard. Prov. 83.

*Phalaris (muricata), spicid cylindric ; floribus geminatis ; calice frustifero, aculeato-muricato*. Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 202.

*Tragus*. Hall. Helv. n°. 1413.

*Lappago racemosa*. Willd. Spec. Plant. vol. t. pag. 484. — Schreb. Gen. Plant. n°. 131.

*Gramen caninum, maritimum, spicatum ; echinatis glumis*. Bartel. Icon. rar. 718.

*Gramen caninum, maritimum spicid echinatis*. Bauh. Pin. 2. — Scheur. Gram. 76. tab. 1. fig. 7. — Morif. Oxon. §. 8. tab. 2. fig. 4. — Gesner. tab. 3. fig. 20.

*Gramen caninum, maritimum, asperum*. C. Bauh. Theatr. 16. lc. — Prodr. 2. tab. 2. — Magnol. Monsp. 112.

*Gramen spicatum, locustis echinatis*. Tourn. Inst. R. Herb. 519. — Garidel. Aix. 218.

*Gramen parvum, echinatum*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 462. lc. — Monti. Prodr. 64. tab. 103. — Zann. Ist. tab. 208.

*Cenchrus paniculid spicidat, glumis muricatis, setis ciliaribus, foliis ciliatis*. Gouan. Hort. Monsp. p. 31. n°. 1.

*Cenchrus linearis*. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 631. n°. 1192. II.

Après avoir promené cette plante de genre en genre, l'avoir fait passer successivement parmi les *agrostis*, les *phalaris*, les *cenchrus*, on a fini par en former un genre particulier sous le nom de *Lappago*, & que M. Desfontaines a nommé *tragus* d'après Haller. C'étoit le parti le plus simple pour éviter les embarras ; elle s'écartoit en effet de la plupart des genres auxquels on la rapportoit, & en voulant éviter d'en faire un genre nouveau, celui des *cenchrus* paroïssoit le genre dont elle approchoit le

plus, quoiqu'elle fût dépourvue de cet involucre qui en fait un des principaux caractères ; mais le calice, ayant une de ses valves armée de cils roides, pourroit être considérée comme remplaçant l'involucre. On conçoit les raisons qui ne nous permettent pas de retrancher cette espèce des *Cenchrus*, quoique très-éloignée de désapprouver son passage dans un nouveau genre.

Cette plante est petite, munie de racines fibreuses & blanchâtres, d'où s'élèvent plusieurs chaumes coulés à leurs articulations inférieures, hauts de six à huit pouces, quelquefois rameux un peu au dessus de leur base, garnis de feuilles courtes, aiguës, larges d'environ une ligne, vertes à leurs deux faces, glabres, médiocrement ciliées à leurs bords, souvent purpurines sur leur gaine, qui est velue à son orifice, garnie d'une membrane courte.

Les fleurs sont disposées en un épi grêle, lâche, étroit, interrompu, long de deux ou trois pouces, & qui prend une teinte rougeâtre ou purpurine à l'époque de la maturité. Les épillets sont un peu écartés les uns des autres, portés sur des pédoncules courts. Chaque épillet contient de deux à quatre fleurs mutiques, ordinairement hermaphrodites ; quelquefois le rudiment d'une cinquième ; la balle caliciale, garnie à ses bords de cils roides & courts ; celles de la corolle inégales, l'une d'elles comme retournée.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans les terrains secs & sablonneux : on la trouve aussi à Fontainebleau. ○ (V. v.)

*Observations.* En établissant pour cette plante un nouveau genre, il aura pour caractère essentiel :

Des épillets de deux à quatre fleurs mutiques, la terminale stérile ; un calice pour chaque fleur, à une seule valve ovale, convexe, striée, parcheminée, muronnée, armée de pointes courtes, roides, recourbées ; une corolle à deux valves membraneuses, obtuses, inégales ; trois étamines ; deux styles ; une semence oblongue, recouverte par le calice. Desfont.

15. *RACLE* purpurine. *Cenchrus purpurascens*. Thunb.

*Cenchrus racema spicato, simplicii; foliulis circumvallatis, aristis longissimis, calmo erecto.* Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. vol. 2. pag. 329.

*Panicum hordeiforme.* γ. Thunb. Jap. 38.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles plus longues que les tiges. Les fleurs sont disposées en une grappe simple, presque en forme d'épi, lâche, longue de six à sept pouces ; les épillets placés sur deux rangs, pédonculés, environnés chacun de filets roides, de couleur purpurine, cinq ou six fois plus longs que les fleurs qu'ils entourent ; les pédoncules de la longueur des épillets.

Cette plante croît au Japon.

\* *Espèces moins connues.*

\* *Cenchrus (setosus), spica linear-oblonga; involucri scirpi, setis inermibus, interioribus basi villosis, villis ciliatis; glumis levibus.* Swartz. Prodr. 26.

\* *Cenchrus (geniculatus), racemo spicato, simplicii; florum involucri polyphylo, scabro; calmo geniculato.* Thunb. Prodr. 24.

\* *Cenchrus (carolinianus), spica glomerata; glumis globosis, muricato-spinosis, levibus.* Walter. Flor. carol. pag. 79.

*Observations.* Nous n'avons point parlé du *Cenchrus frutescens* Linn., espèce très-incertaine. Si c'est d'après Tournefort & Prosper Alpin que Linné a établi cette espèce, nous renvoyons alors nos lecteurs à l'article PANICAUT, n°. 15. vol. 4. pag. 756 (*Eryngium lateriflorum*). On n'y verra pas sans étonnement que Tournefort, trompé par les apparences du port, avoit pris pour une graminée une plante que M. Lamarck a reconnu être un *Eryngium*, d'après l'exemplaire qu'il en a vu dans l'herbier de Vaillant.

Si Linné n'a fait que rapporter les synonymes de Tournefort & de Prosper Alpin à une plante qu'il avoit lui-même observée, nous ne pouvons rien ajouter à ce qu'il en dit dans sa phrase spécifique, qui d'ailleurs nous paroît indiquer qu'il n'en a parlé que d'après les deux botanistes que nous venons de citer.

**RADICALES** (Feuilles). *Radicalia folia*. On donne ce nom aux feuilles lorsqu'elles naissent immédiatement du collet de la racine, & ne sont point attachées aux tiges, comme dans la primevère & le pissenlit.

Le pédoncule est également radical lorsqu'il s'insère immédiatement sur la racine, & dans ce cas il ne diffère point de la hampe ; telle est l'anémone hépatique.

Enfin les fleurs sont radicales lorsqu'elles sortent directement de la racine, comme celles du colchique.

**RADICANTE** (Tige). *Radicans caulis*. Les tiges prennent ce nom lorsqu'elles s'attachent à des corps élevés, par le moyen des racines qu'elles produisent latéralement dans toute leur longueur, comme dans le lierre.

On donne le même nom aux feuilles lorsque, couchées sur la terre ou sur d'autres corps, elles s'y attachent par de petites racines qu'elles fournissent de leur propre substance : tel est le *Saxifraga corydolon*.

**RADIÉE** (Fleur). *Flos radiatus*. C'est une fleur composée, dont le centre ou le milieu, que

l'on appelle disque (*discus*), est occupé par des fleurons, & dont la circonférence est garnie de demi-fleurons qui présentent autant de rayons: cependant ce qu'on nomme communément le rayon (*radius*) dans la fleur radice, c'est la totalité des demi-fleurons qui environnent le disque, comme dans le *helianthemum*, les *bellis*, les *aster*, &c.

**RADIS.** *Raphanus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptalées, de la famille des crucifères, très-voisin des *sinapis* & des *brassica*, qui comprend des herbes, les unes indigènes, d'autres exotiques à l'Europe, munies de racines tubéreuses, charnues, & de feuilles rudes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice connivent, non ouvert ; quatre glandes peu apparentes sur le disque de l'ovaire ; une filique articulée, noueuse, & ventrue aux articulations.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles droites, oblongues, conniventes, parallèles, caduques, relevées en bourse à leur base.

2°. Une corolle à quatre pétales en croix, ouverts, en cœur à leur sommet, terminés par des onglets un peu plus longs que le calice.

3°. Six étamines, dont les filamens sont droits, subulés, quatre plus grands, aussi longs que les onglets des pétales ; deux plus courts, opposés, de la longueur du calice, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire oblong, ventru, subulé à son sommet, surmonté d'un style très-court, presque nul, terminé par un stigmate simple, capité.

Quatre glandes, dont deux situées entre les étamines les plus courtes & le pistil ; deux autres, placées entre les étamines les plus longues & le calice.

Le fruit est une filique oblongue, articulée, noueuse & ventrue à les articulations, presque cylindrique, terminée par une pointe subulée, à une ou deux loges, contenant des semences glabres & arrondies.

*Observations.* Ce genre, très-voisin des *sinapis* & des *brassica*, diffère des premiers par son calice fermé, des seconds par ses filiques divisées par articulations, & par la corne cylindrique, subulée & non aplatie qui les termine. On pourroit y ajouter, comme caractère secondaire, des feuilles assez généralement rudes au toucher, & point amplexicaules, comme celles de la plupart des *brassica*. Certaines espèces ont leur filique divisée en

deux loges ; dans d'autres, il n'y a qu'une seule loge.

#### ESPÈCES.

1. RADIS sauvage. *Raphanus raphanistrum*. Linn.

*Raphanus foliis lyratis, filiquis teretibus, articulatis, levibus, unilocularibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 560. n°. 3.

*Raphanus filiquis teretibus, articulatis, levibus, unilocularibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 935. — Hort. Clifford. 340. — Flor. suec. 568. 612. — Roy. Lugd. Bat. 344. — Haller. Helv. n°. 268. — Dalib. Paris. 198. — Sauvag. Monip. 285. — Linn. Dissert. de Raphanid. — Eder. Flor. dan. tab. 6-8. — Crantz. Austr. pag. 37. — Pollich. Pal. n°. 644. — Hoffm. Germ. 242. — Roth. Germ. I. 282. II. 99. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 9. tab. 143. fig. 6. — Curris. Flor. londin. tab. 267. — Ger. Em. 240. fig. 1.

*Raphanus silvestris*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 495. n°. 521. II.

*Raphanistrum filiqua articulata, glabra, majore & minore*. Tournef. Inst. R. Herb. 230. — Moris. Oxon. Hist. 2. pag. 265.

*Rapistrum flore albo, filiqua articulata*. C. Bauh. Pin. 95.

*Rapistrum flore albo, striato*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 851. Icon.

*Rapistrum flore albo, lineis nigris depicto*. C. Bauh. Pin. 95.

*Rapistrum album, articulatum*. Parkins. Theatr. 863.

*Sinapi agreste, album trago*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 251.

*Lampfana apula Plinii & Dioscoridis*. Column. pag. 261.

*Lampfana*. Czfalp. 355.

*Rapistrum flore albo, cruce foliis*. Lobel. Ic. 159.

*Raphanistrum arvensis, flore albo*. Tournef. II. R. Herb. 230.

5. *Rapistrum segetum, flore luteo vel pallido*. Tourn. Inst. R. Herb.

*Rapistrum flore melino*. Tabern. 408.

*Rapistrum flore luteo*. C. Bauh. Pin. 95.

*Rapistrum flore luteo, filiqua glabra, articulata*. Rai. Hist. 805.

7. *Rapistrum purpureum*. Tabern. 407.

Ses tiges sont hautes d'un à deux pieds, chargées de poils roides, durs, rieurs, et acérés, et les filiques en rampeaux denses, etales : toutes les

feuilles sont pétioles, alternes, un peu rudes, quelquefois glabres, en lyre ou plutôt pinnatifides, divisées en lobes oblongs, obtus; les inférieurs aigus, augmentant de grandeur à mesure qu'ils approchent davantage du sommet des feuilles, à larges dentelures obtuses; le lobe terminal ovale, &c beaucoup plus grand que les autres.

Les fleurs sont disposées en grappes longues, latérales & terminales. La corolle est grande, très-variée dans ses couleurs, ordinairement d'un blanc un peu jaunâtre ou tout-à-fait blanche, traversée par des veinules noires ou bleuâtres. Dans plusieurs individus cette corolle est d'un jaune de soufre, de couleur purpurine ou d'un rouge-violet. Les filiques sont glabres, droites, articulées, subulées à leur sommet, quelquefois interrompues entre les articulations; il arrive aussi qu'il n'existe qu'une seule articulation, mais plus forte, plus grosse: toutes munies en dehors de côtes saillantes, n'ayant qu'une seule loge, ne contenant ordinairement qu'une seule semence brune, comprimée, orbiculaire.

Cette plante croît partout, dans les champs, sur le bord des chemins, dans les terrains cultivés, où elle devient très-incommode par sa grande multiplication. ○ (P. v.)

#### 2. RADIS à longues filiques. *Raphanus caudatus*.

*Raphanus foliis lyrato-runcinatis, filiquis unilocularibus, depressis, plantâ longioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 560. n°. 2.

*Raphanus filiquis decumbentibus, totâ plantâ longioribus*. Linn. Mantiss. 95. — Idem. Decas. 3. tab. 10.

Cette plante a le même port que le *raphanus sativus*; mais elle s'en distingue aisément à la longueur remarquable de ses filiques.

Ses tiges ne sont que médiocrement élevées, divisées en rameaux diffus & nombreux, lisses, glauques ou de couleur pourpre, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées en lyre; les lobes aigus. Les fleurs, disposées en grappes axillaires, sont blanchâtres; les filiques sont pendantes, recourbées, longues de deux ou trois pieds, & surpassent les tiges par leur longueur, à une seule loge, munies de quatre suturez peu marquées, relevées à leur base par deux bossés; les semences sont placées alternativement sur la cloison. Ces filiques sont courber les tiges & rampent sur la terre, tellement que ces tiges ne sont droites que dans leur jeunesse.

Cette plante croît dans le Final. ○ (Descript. ex Linn.)

#### 3. RADIS pileux. *Raphanus pilosus*. Willd.

*Raphanus filiquis teretibus, levibus, articulatis,*

*unilocularibus; foliis lanceolato-linearibus, basi pinnatifidis, caule piloso-hispido*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 562. n°. 8.

Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, velues, hétérotes, divisées en rameaux divariqués, très-étalés, garnis de feuilles longues de trois pouces, étroites, lancéolées, linéaires, pinnatifides à leur base, dentées à leur partie moyenne, entières, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées en grappes peu garnies, situées dans toutes les aisselles des feuilles: elles produisent des filiques presque unilobées, cylindriques, longues d'un pouce & demi, articulées, à une seule loge, terminées par une pointe courte, en forme de bec.

Cette plante croît dans la Guinée. (Descript. ex Willden.)

#### 4. RADIS de Sibérie. *Raphanus sibiricus*. Linn.

*Raphanus filiquis teretibus, torulosis, villosis; foliis linearibus, pinnatifidis*. Linn. Spec. Plant. 935. — Murr. Nov. Comment. Gött. 1775. pag. 48. tab. 11.

*Raphanus foliis pinnatis, pinnis confluentibus; filiquis teretibus, articulatis, unilocularibus*. Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 266. n°. 28.

Cette espèce se distingue à sa petitesse, à ses feuilles linéaires, pinnatifides; à ses filiques velues & à la grandeur de sa corolle.

Elle a le port d'un *eruca*. Ses tiges sont très-basses, velues, nues dans une grande partie de leur longueur, garnies de feuilles presque toutes radicales ou inférieures, linéaires, presque ailées, composées de pinnules confluentes à leur base. La corolle est ample, de couleur jaune. Les filiques sont médiocrement pédonculées, cylindriques, velues, divisées par articulations, un peu arrondies, terminées par une pointe allongée en forme de bec.

Cette plante croît dans la Sibérie. ○ (Descript. ex Linn.)

#### 5. RADIS cultivé. *Raphanus sativus*. Linn.

*Raphanus foliis lyratis, filiquis teretibus, torulosis, bilocularibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 560. n°. 1.

*Raphanus filiquis teretibus, torulosis, bilocularibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 935. — Hort. Cliff. 347. — Hort. Ups. 188. — Mater. medic. 164. — Roy. Lugd. Bat. 344. — Miller. Dict. n°. 1. — Poir. Vnyag. en Barb. vol. 2. pag. 199. — Linn. Flor. franç. vol. 2. pag. 495. n°. 541. l. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 9. tab. 143. fig. 5. — Lam. Illustr. Gener. tab. 566.

*Raphanus major, orbicularis vel rotundus*. C. Bauh. Pin. 96. — Tournef. Inst. R. Herb. 219.

*Raphanus magnus*. Lobel. Icon. 201. — Idem. Observ. 99.

*Raphanus fve radícula fativa*. Dodon. Pempt. 676. Icon.

*Raphanus rotundus, radice rotundâ*. Miller. Dict. n°. 2.

*Raphanus orbicularis, radice orbiculatâ, depressâ*. Miller. Dict. n°. 3.

*Raphanus major, orbicularis vel rotundus, floribus canâdis*. C. Bauh. Pin. 96.

RADIS ou grand raifort blanc.

6. *Raphanus niger*. C. Bauh. Pin. 96. — Tournef. Inst. R. Herb. 229. — Lobel. Icon. 202.

*Raphanus niger, radice fusiformi*. Miller. Dict. n°. 4.

Vulgairement RADIS noir. Raifort cultivé. Raifort des Parisiens.

7. *Raphanus minor, oblongus*. C. Bauh. Pin. 96. — Tournef. Inst. R. Herb. 229. — Blackwel. tab. 81.

*Radicula fativa, minor*. Dodon. Pempt. 676. Icon.

*Raphanus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 846. Icon.

*Raphanus niger, purpureus*. L. bel. Icon. 201 & Observ. 59. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 636. Ic.

Vulgairement RAVE.

8. *Raphanus chinensis, annuus, oleiferus*. Linn. l. c.

Cette plante, si généralement cultivée dans tous les jardins potagers, à cause de l'usage de ses racines que l'on mange crues, sous les noms de *radis* & de *rave*, pousse des tiges très-rameuses, hautes de deux ou trois pieds, ordinairement rudes au toucher, garnies de feuilles amples, alternes, pétiolées, rudes, surtout les intérieures; ailées en forme de lyre, divisées en lobes très-irréguliers, ovales, oblongs, arrondis ou aigus à leur sommet, denticulés à leur contour; le lobe terminal beaucoup plus grand que les autres, presque arrondi. Le nombre des lobes est moindre à mesure que les feuilles sont plus supérieures; les dernières presque simples, denticulées.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, nombreuses vers l'extrémité des rameaux; chaque fleur portée sur un pédoncule simple, presque hémisphérique, long d'un pouce. La corolle varie dans ses couleurs; elle est ordinairement d'un violet tendre, quelquefois blanche ou rougeâtre. Les siliques sont articulées, renflées vers leur base, coniques, terminées par une pointe subulée, divisées intérieurement en deux loges, contenant des semences arrondies.

La culture a obtenu plusieurs variétés des racines de cette plante, plus ou moins estimées selon leur faveur. Celles qui ont une forme ronde, globuleuse, ou qui sont allongées, mais très-grosses, portent ordinairement le nom de *radis*, parmi lesquels on distingue le petit *radis blanchâtre*, globuleux; le même, couleur de rose tendre; le *ronchard*; le gros *radis blanc*, arrondi ou fusiforme; le même, revêtu d'un épiderme noirâtre (le *radis noir*), dont la faveur est plus piquante, la chair plus ferme: c'est le *raifort des Parisiens*.

On donne le nom de *raives* à celles dont la forme est allongée, fusiforme, menue, ordinairement de couleur rougeâtre.

Il ne faut pas regarder comme variétés de cette plante plusieurs autres qui appartiennent à des genres différens, quoiqu'elles portent souvent le même nom vulgaire: ainsi le grand *raifort sauvage* ou *raifort des bouquiers* est le *cochlearia armorica* Linn. (Voyez dans ce Dictionnaire l'article CRANON rustique.) Le *rave*, qu'on appelle aussi *turnep* ou *rabouille*, a d'abord été regardée comme une variété du *brassica rapa* Linn. Le caractère de son calice nous a déterminés à la ranger parmi les *sinapis*. (Voyez MOUTARDE tubéreuse.)

La patrie de cette plante, cultivée depuis si long-tems dans tous nos jardins potagers, n'est pas très bien connue. On la soupçonne cependant originaire de la Chine. O (V. v.)

Je dois prévenir ici que cette plante, présentée dans mon *Voyage en Barbarie* comme naturelle à ces contrées, n'y est que cultivée dans quelques jardins particuliers; celle que j'ai recueillie dans les lieux incultes est le *raphanus raphanistrum*, que j'aurois dû citer à la place du premier.

Le *radis* & la *rave* sont des alimens sains, que l'on mange crus; mais ils sont peu nourrissans, de digestion un peu difficile pour les estomacs faibles, qu'ils fatiguent par les renvois & les ventosités qu'ils occasionnent. Le *radis noir* est plus acre, plus difficile à digérer. Son suc, dit M. Durande, adouci avec le miel, convient dans l'asthme humide, l'enrouement, le scorbut. Ce radis, mêlé avec l'huile & appliqué à la peau, agit comme rubéfiant. Les feuilles jeunes se mangent en salade ou cuites.

#### 6. RADIS lancéolé. *Raphanus lanceolatus*. Willd.

*Raphanus siliquis bilocularibus, ventricosis, levibus; rostro subterragano, foliis oblongo-lanceolatis, apice subdentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 562. n°. 7.

*Sinapis (integrifolia), foliis inferioribus oblongis, inaequaliter serratis; supremis linearilanceolatis, integerrimis*. ? Weib. Sandz-Crucis. pag. 222.

Cette plante est glabre dans toutes les parties. Ses

Ses tiges sont droites, flexueuses, hautes d'environ un pied & demi, divisées en rameaux courts, garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, lancéolées; les inférieures munies à leur sommet de dents obtuses; les supérieures très-entières, plus étroites, lancéolées.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, longues d'environ un demi-pied. La corolle est jaune, d'une médiocre grandeur: il lui succède une filique lisse, ventrue, à deux loges, terminée par une pointe allongée, obtuse, presque à quatre faces.

Cette espèce croît dans l'Amérique, aux Antilles, &c. ( *Descript. ex Willd.* )

7. RADIS à filiques arquées. *Raphanus arcuatus*. Willd.

*Raphanus filiquis subulatis, arcuatis, bilocularibus, levibus; foliis oblongo lanceolatis, dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 562.

Ses tiges sont peu élevées, hautes à peine de six à huit pouces, droites, rameuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, oblongues, lancéolées, finées, dentées à leurs bords, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont petites, violettes; les filiques lisses, bûchées, cylindriques, articulées, courbées en arc, à deux loges, terminées par une pointe subulée.

Cette plante, selon Willdenow, ressemble beaucoup à l'*Asperis arenaria* Desfont. Flor. atlant. tab. 162, mais elle en diffère par le caractère de ses filiques.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ( *Descript. ex Willd.* )

8. RADIS fluit. *Raphanus tenellus*.

*Raphanus filiquis subulatis, articulatis, bilocularibus; foliisque glabris, lanceolatis, dentatis, infimis pinnatifidis*. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 405.

*Raphanus tenellus*. Pallas. Iter 3. Append. n.º 105. tab. 1. fig. 3.

C'est une plante fort petite, dont les tiges sont presque glabres, hautes de trois à quatre pouces au plus, garnies de feuilles pétiolées, alternes; les racines profondément découpées, presque ailées, & dont les lobes sont oblongs, très-entiers à leurs bords, un peu obtus à leur sommet; les feuilles caulinaires lancéolées, pétiolées, entières, munies à leur contour de dents écartées, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont petites & de couleur purpurine; les filiques toruleuses, articulées, rabotées, à deux loges, terminées par une longue pointe subulée.

Cette plante croît dans les déserts, sur les bords de la mer Caspienne. ( *Descript. ex Willd.* )

Botanique. Tome VI.

9. RADIS à feuilles de roquette. *Raphanus crucoides*. Linn. f.

*Raphanus filiquis ovatis, gibbis; rostro longitudine filiqua*. Linn. f. Suppl. pag. 299.

*Eruca silvestris, lutea, bursa pastoris folio, italica*. Bartel. Icon. rar. pag. 422. tab. 1076. Mala.

Ses racines sont grêles, simples, à peine plus épaissies que les tiges: celles-ci, hautes d'un pied & demi environ, sont rudes, purpurines à leur base, divisées à leur partie supérieure en rameaux simples, garnis de feuilles pétiolées, lisses, toncées, divisées en de coupures aiguës, dont la terminale est plus étroite; denticulées à leur bord antérieur.

Les fleurs sont disposées en grappes; leur calice est un peu ouvert; la corolle jaune, les pétales échancrés, les étamines de la longueur de la corolle. Leur filique est ovale, lisse, charnue, relevée en bosse, mais non articulée; à deux valves, terminée par une pointe conique, presque tétragone, aussi longue que la filique. Les semences sont comprimées, au nombre de quatre à sept, séparées par une cloison blanchâtre & membracée.

On trouve cette plante en Italie. ( *Descript. ex Linn. f.* )

Observations. Cette plante nous paroît se rapprocher davantage des *sinapis* que des *raphanus*, ayant son calice ouvert; elle a aussi des rapports avec les *brassica* par ses filiques non articulées. Willdenow soupçonne qu'elle doit être la même espèce que le *brassica cheiranthus* de Villars, ou le *sinapis Tournefortii* d'Allioni.

10. RADIS à feuilles en lyre. *Raphanus lyratus*. Forsk.

*Raphanus filiquis teretibus, hispidis; foliis lyratis; caule basi procumbente*. Forsk. Flot. ægypt.-arab. pag. 119. n.º 65.

Il s'élève de la même racine plusieurs tiges rudes, couchées à leur base, ensuite redressées, garnies de feuilles toutes alternes, velues, en forme de lyre; les inférieures longues de trois pouces. Les fleurs sont réunies en grappes terminales, supportées par des pedoncules courts, munis chacun à leur base d'une bractée oblongue & dentée. Leur calice est velu, roussâtre; la corolle est jaune, violette à son orifice; les filiques toruleuses, cylindriques, articulées, un peu courbées, terminées par une pointe lancéolée.

Cette plante croît en Égypte; sur le bord des champs, dans les environs des pyramides & parmi les roseaux. ( *Descript. ex Forsk.* )

Observations. Nous ne parlons point du *raphanus erucaria* de Gzemet, de Frucht. & Sem. Coctur. 9. H

tab. 143, fig. 9, ne le connoissant pas suffisamment, & qui paroît d'ailleurs s'écarter un peu de ce genre par les caractères de sa fructification. Ses siliques sont composées de deux articulations, une inférieure à plusieurs semences, une supérieure presque stérile.

**RADULIER.** *Arbor radulifera*. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 201. tab. 129.

Grand arbre des Indes, décrit par Rumphé, mais dont les détails imparfaits de plusieurs parties de sa fructification n'ont pas encore permis de déterminer la famille à laquelle il peut appartenir, ni le genre avec lequel il a le plus de rapports.

Son tronc est droit, revêtu d'une écorce glabre: il se divise en branches & en rameaux garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; composées de folioles pédiculées, presque opposées, lancéolées, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, longues de trois à quatre pouces, larges d'environ deux pouces.

Les fleurs sont odorantes, pendantes en longues grappes: il leur succède des fruits ovales, oblongs, aigus, à cinq faces, couverts extérieurement de tubercules nombreux, courts, aigus, mais point piquans, divisés intérieurement en cinq loges, s'ouvrant en cinq valves qui paroissent contenir des semences comprimées, presque imbriquées, fixées à peu près comme celles des melons.

Cet arbre n'est pas très-commun. On construit des palissades avec son bois. L'écorce de ses fruits est employée pour raper les racines tendres de certaines plantes dont on fait usage, soit comme astringens, soit comme remèdes ou assaisonnement.

**RAIANE.** *Rajania*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, dioïques, de la famille des asperges, qui a des rapports avec les *ramnus*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à racines rubescentes, à tiges grimpantes, & dont les fleurs sont disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; un calice campanulé, à six divisions; point de corolle; six étamines; trois styles; une capsule inférieure, munie d'une aile membraneuse, oblique & latérale.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre,

Dans les fleurs mâles :

1°. Un calice campanulé, supérieur, partagé en six folioles oblongues, acuminées, ouvertes supérieurement.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines dont les filamens sont stériles, plus courts que le calice, terminés par des anthères simples.

Dans les fleurs femelles :

1°. Un calice, comme dans les fleurs mâles. Point de corolle.

2°. Un ovaire inférieur, comprimé, muni à un de ses côtés d'une membrane saillante, surmonté de trois styles aussi longs que le calice, terminés chacun par un stigmate obtus.

Le fruit est une silique presque ronde, garnie d'une large membrane ailée, attachée à un des côtés, & courbée de manière à envelopper une grande partie du fruit: on n'y aperçoit ordinairement qu'une seule loge & une seule semence arrondie par l'avortement de plusieurs loges & semences.

#### ES P È C E S.

1. **RAIANE hastée.** *Rajania hastata*. Linn.

*Rajania foliis hastato-cordatis*. Linn. Syll. veget. pag. 888. — Hort. Cliff. 458.

*Jan-raia scandens, folio oblongo, angusto, auriculato*. Plum. Gen. 33.

*Bryonia frutic alata, foliis auriculatis*. Plumier. Amér. 84. tab. 98. — Filic. tab. 78.

Cette espèce est remarquable par la forme de ses feuilles élargies à leur base, où elles forment deux oreillettes arrondies.

Ses racines sont tuberculeuses, grosses, charnues, ovales, garnies de fibres tortueuses, blanchâtres, sinueuses: elles poussent une tige grêle, farinacée, très-lisse, d'un vert tendre, simple, garnie de feuilles alternes, pétioles, minces, glabres, longues de trois pouces environ, hautes, élargies & échancrées à leur base en forme de cœur, prolongées à leur sommet en une pointe longue, fort aiguë; vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, marquées de trois à cinq nervures dans leur longueur.

Les fleurs sont fort petites, verdâtres & disposées en grappes axillaires, pendantes: il leur succède des fruits capsulaires, garnis latéralement d'une aile très-mince, presque argentée dans sa jeunesse. Les semences ont la forme d'une petite lentille.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. V. f. in herb. Juss.)

2. **RAIANE lobée.** *Rajania lobata*.

*Rajania foliis lanceolato-sagittatis, auriculatis*;

*auriculis prolongis, lobatis; racemis compositis, floribus diffusis.* (N.)

Cette espèce est remarquable par ses feuilles étroites, auriculées, & dont les oreillettes prolongées sont échancrées latéralement en lobes.

Ses tiges sont glabres, presque herbacées, blanchâtres, grimpantes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, étroites, acuminées, lancéolées, hâfées, échancrées profondément à leur base, & divisées en deux longues oreillettes rapprochées, prolongées latéralement en deux lobes obliques, obtus, au dessus desquels est une large échancrure; elles sont longues de trois à quatre pouces, larges au plus d'un pouce, marquées de trois nervures blanchâtres, sans veines apparentes; les pétioles sont lisses, comprimés, de la longueur des oreillettes.

Les grappes sont plus longues que les feuilles, droites, un peu rameuses, pendantes, très-glabres, garnies de fleurs distantes, verticillées, pédicelées, dont le calice est d'une seule pièce, à demi divisé en cinq ou six découpures ovales, obtuses.

Cette plante croît au Pérou, d'où elle a été rapportée par Dombey. (V. f. in herb. Jusseu.)

### 3. RAÏANE EN CŒUR. *Rajania cordata*. Linn.

*Rajania foliis cordatis, septinerviis.* Linn. Syst. veget. pag. 888. — Lam. Illustr. Gener. tab. 818. — Griseb. de Fruct. & Sem. Centur. 1. tab. 14. fig. 1.

*Jan-raia scandens, folio tamni.* Plum. Gen. 33. Icon. 155. fig. 1.

Ses racines sont fusiformes, tuberculées, munies d'un grand nombre de fibres simples, étendues à la surface de la terre. Il s'en élève des tiges grimpantes, cylindriques, très-souples, garnies de feuilles simples, pétiolées, oblongues, acuminées, très-glabres, échancrées en cœur à leur base, marquées de sept nervures longitudinales, coupées transversalement par des veinules simples, fines.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, pendantes, simples, sur lesquelles chaque fleur est pédicelée, dont le calice varie dans ses divisions de cinq à six, fort petites, ovales, aiguës; l'ovaire est comprimé, un peu arrondi. Le fruit est environné à un de ses côtés d'une large membrane mince, qui entoure une grande partie d'une petite capsule à une seule loge, recouvrant une semence arrondie.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. (Descript. ex Plum.)

### 4. RAÏANE FLEXUEUSE. *Rajania flexuosa*.

*Rajania foliis lanceolato-cordatis; racemis flexuosis, subcompositis.* (N.)

Ses tiges sont très-foibles, grêles, d'un vert tendre, grimpantes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, échancrées en cœur & arrondies à leur base, acuminées, entières, d'un vert tendre, un peu plus pâles en dessous, glabres, réticulées, réfléchies sur leur pétiole.

Les fleurs sont disposées en petites grappes flexueuses, géniculées, à peine aussi longues que les feuilles; axillaires, filiformes: ces fleurs sont souvent deux ou trois à chaque articulation, supportées par des pédoncules capillaires, plus longs que les fleurs, munis à leur base d'une petite bractée ovale, concave, aigue. Les calices sont divisés en six petites folioles ovales, aiguës, d'un vert tendre & jaunâtre, glabres & transparentes.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombey. (V. f. in herb. Jusseu.)

### 5. RAÏANE OVALE. *Rajania ovata*. Swartz.

*Rajania foliis ovatis, acuminatis, trinerviis.* Swartz. Prodr. pag. 59. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 618.

Ses tiges sont filiformes, grimpantes, rameuses, garnies de feuilles glabres, distantes, pétiolées, ovales à leur base, acuminées à leur sommet, entières, à trois nervures, veinées, supportées par des pétioles cylindriques & de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont diques, disposées en grappes axillaires, filiformes, un peu flexueuses, plus longues que les feuilles; celles qui portent les fleurs mâles plus composées que celles des fleurs femelles. Les calices sont très-petits, d'un vert jaunâtre pour les fleurs mâles, rougeâtres pour les fleurs femelles. Il leur succède un fruit capillaire, comprimé, muni d'une aile ovale, courbée en faux, membraneuse.

Cette plante croît sur les montagnes; à Saint-Domingue. (Descript. ex Swartz.)

### 6. RAÏANE À FEUILLES ÉTROITES. *Rajania angustifolia*. Swartz.

*Rajania foliis lineari-lanceolatis, basi rotundatis.* Swartz. Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 639. — Prodr. 59.

C'est une plante annuelle, dont les tiges sont glabres, filiformes, grimpantes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres, linéaires-lancéolées, arrondies à leur base, entières à leurs bords, veinées, marquées de trois nervures, longues de cinq à six pouces, supportées par des pétioles rougeâtres, torseux.

Les fleurs sont extrêmement petites, polygames, H ij



rougeâtres, presque sessiles, alternes, disposées en grappes axillaires, filiformes, pendantes, de la longueur des feuilles. Le calice est d'une seule pièce, à six divisions obtuses, ouvertes; il renferme six filaments très-courts, dont les anthères représentent un triangle par leur disposition; l'ovaire oblique, à trois côtés, surmonté de trois stigmates sessiles; la capsule est munie d'une aile latérale, oblongue, membraneuse.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne. (Description ex Swartz.)

7. RAÏANE quintefeuille. *Rajania quinquefolia*. Linn.

*Rajania foliis quinatis, ovato-oblongis*. Linn. Syst. veget. pag. 888.

*Jan-raia* scandens quinquefolia. Plum. Gen. Amer. 33. — Icon. 155. fig. 2.

C'est une plante grimpante & sarmenteuse, remarquable par la disposition de ses feuilles & la situation de les grappes de fleurs.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, souples, garnies de feuilles alternes, composées de cinq folioles distinctes, pédonculées, oblongues ou ovales, lancéolées, entières, un peu obtuses, marquées de trois nervures longitudinales & parallèles, dont les pétioles sont très-courts, insérés immédiatement sur les articulations des tiges, sans pétiole commun; ce qui doit faire considérer ces folioles comme autant de feuilles séparées.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, point axillaires, attachées sur les tiges entre les articulations; chaque fleur est pédiculée, munie d'un calice à six folioles petites, ovales, obtuses. Les fruits sont garnis d'une membrane latérale, en forme d'aile, arrondie à ses deux extrémités.

Cette plante est rare, & se trouve dans les îles de l'Amérique. h

8. RAÏANE à cinq folioles. *Rajania quinata*. Thunb.

*Rajania foliis quinatis; foliolis emarginatis; floribus umbellatis, axillaribus*. Thunberg. Flor. jap. pag. 148.

Ses tiges sont grimpantes, cylindriques, glabres, rameuses, de couleur cendrée, garnies de feuilles presque fasciculées, réunies plusieurs ensemble au même point d'insertion, pédonculées, composées de cinq folioles pédonculées, imitant une ombelle par leur disposition ovales, longues d'environ un pouce, glabres à leurs deux faces, entières, échinées à leur sommet, avec une pointe particulière; les pétioles communs longs de deux pouces, glabres, filiformes; les partiels très-courts.

Les fleurs sont axillaires, disposées en ombelles, supportées par des pédoncules communs, filiformes & de la longueur des pétioles, & munies chacune d'un pédoncule particulier, capillaire, long d'une à deux lignes.

Cette plante croît au Japon, où elle fleurit vers le milieu du printemps. (Description ex Thunb.)

Cette espèce est suffisamment distinguée de ses congénères par ses fleurs disposées en ombelle.

9. RAÏANE à six folioles. *Rajania hexaphylla*. Thunb.

*Rajania foliis senatis, foliolis oblongis, acutis; floribus racemosis*. Thunb. Flor. jap. pag. 149.

Cette plante diffère du *rajania quinata* par ses folioles au nombre de six, aiguës, non échan-crées, & par ses fleurs en grappes & non en ombelle.

Elle s'élève sur une tige sarmenteuse, cylindrique, glabre, striée, garnie de feuilles alternes, pétioles, composées très-ordinairement de six folioles glabres, oblongues, aiguës, très-entières, vertes en dessus, plus pâles en dessous, longues de deux pouces, veinées, supportées par un pétiole commun, long de trois pouces, renflé tant à sa base qu'à son sommet; les pétioles partiels filiformes, divergens. Les fleurs sont blanches, axillaires, disposées en grappes.

Cette plante se trouve au Japon. (Description ex Thunb.)

\* Espèce moins connue.

\* *Rajania (ovata), foliis ovatis, venosis, petiolatis; caule volubili*. Walter. Flor. carol. pag. 247.

*Rajania caroliniana*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 581.

RAÏSINIER. *Coccoloba*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des polygones, qui a des rapports avec les *araphaxis* & les *polygonum*, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, & les fleurs disposées en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à cinq divisions; point de corolles; huit étamines; trois styles; une noix recouverte par le calice converti en baie.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, inférieur, à

cinq divisions oblongues, obtuses, concaves, corolées, très-ouvertes, persistantes.

2°. Point de corolle.

3°. Huit étamines, dont les filamens sont subulés, un peu plus courts que le calice, terminés par des anthères arrondies, à deux loges.

4°. Un ovaire ovale, à trois côtés, surmontés de trois styles courts, terminés chacun par un stigmate simple.

Le fruit est une noix ovale, aiguë, à une seule loge recouverte par le calice converti en baie.

E S P È C E S.

1. RAISINIER à grappes. *Coccoloba uvifera*. Linn.

*Coccoloba foliis cordatis, subrotundis, nitidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 523. — Lam. Illustr. Gen. tab. 316. fig. 1.

*Coccoloba foliis subrotundis, integris, nitidis, planis; racemis fructuum cernuis*. Jacq. Amer. 112. tab. 73. — Miller. Dict. n°. 1.

*Coccoloba foliis crassis, orbiculatis; sinu aperto*. Brown. Jam. 208.

*Polygonum foliis subrotundis; caule arboreo, frutibus baccatis*. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 65.

*Uvifera foliis subrotundis, amplissimis*. Hort. Clifflort. 487.

*Uvifera listorea, foliis amplioribus, ferè orbiculatis, crassis, americana*. Pluken. Almag. 394. tab. 256. fig. 7.

*Gu jabaya racemosa, foliis ciliatis, subrotundis*. Plum. Ic. tab. 145.

*Populus americana, rotundifolia*. Bauh. Pin. 430.

*Prunus maritima, racemosa, folio subrotundo, globoso, fructu minore, purpureo*. Sloan. Jam. 185. Hist. 2. pag. 125. tab. 220. fig. 3. — Raf. Dendr. 40. — Catesb. Carol. 2. pag. 96. tab. 96.

2. *Coccoloba* (leoganensis), *foliis subrotundis, integerrimis, nitidis, planis; racemis fructuum erectis*. Jacq. Amer. 113. tab. 178. fig. 33.

C'est un grand & bel arbre, remarquable surtout par la forme & la beauté de ses feuilles : ses rameaux sont étalés, diffus, sans ordre, revêtus d'une écorce cendrée, glabre ou ridée, garnis de feuilles grandes, alternes, médiocrement pétioles, entières à leurs bords, arrondies, échanrées en cœur à leur base, terminées à leur sommet par une petite pointe obtuse, mais souvent tout-à-fait arrondies, épaisses, coriaces, lustrées, à nervures alternes & saillantes, d'un vert foncé, traversées par de petites veines rougeâtres, suppor-

tées par des pétioles durs, très-courts, épaïs : une stipule en forme de gaine enveloppe les tiges au point d'insertion des feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, terminales, épaisses, solitaires, droites à l'époque de la floraison, pendantes à la maturité des fruits, longues d'environ un pied ; chaque fleur est pédiculée, blanchâtre, fort petite ; le style est tantôt simple, tantôt tridé. Les fruits sont des drupes arrondis, de la grosseur d'une petite cerise, médiocrement ombiliqués, de couleur purpurine, d'une saveur douce, acidulée, contenant une noix à trois lobes.

La variété 6 diffère de la précédente par ses feuilles une fois plus petites : ses tiges sont bien moins élevées, & conservent la forme d'un arbrisseau.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, sur les rives sablonneuses & maritimes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (P. v.)

Dans quelques contrées de l'Amérique on vend ses fruits aux marchés : ils se servent sur les tables. Le bois est rougeâtre, & donne, bouilli dans l'eau, une belle couleur rouge.

2. RAISINIER à larges feuilles. *Coccoloba latifolia*.

*Coccoloba foliis integris, latissimis, basi coarctatis*. (N.) — Lam. Illustr. Gener. tab. 316. fig. 4.

Cette plante, dont je ne connois pas les fleurs, & qui a été cultivée au Jardin des Plantes, approche beaucoup, par son port, du *coccoloba uvifera*, mais elle en diffère par ses feuilles d'une manière remarquable. Elles sont beaucoup plus minces, plutôt membraneuses que coriaces, glabres, très-entières, presque ovales, au moins aussi larges que longues, rétrécies & non en cœur à leur base, à nervures latérales, simples & jaunâtres. Il part des nervures un grand nombre de veines capillaires, disposées en un réseau à larges mailles. Leur pétiole est court ; il présente à sa base une stipule vaginale qui embrasse la tige. Les jeunes rameaux sont glabres, finement striés, un peu comprimés.

Cette plante est originaire des contrées méridionales de l'Amérique. 7 (P. v.)

2. RAISINIER pubescent. *Coccoloba pubescens*. Linn.

*Coccoloba foliis orbiculatis, pubescentibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 523. — Miller. Dict. n°. 2.

*Coccoloba* (grandifolia), *foliis subrotundis, integerrimis, rugosis*. Jacq. Amer. 113.

*Coccoloba arborea, foliis orbiculatis*. Brown. Jam. 210.

*S. sortea arbor americana, ampliffimis foliis, averfa parte nervis extantibus.* Pluk. Phyt. 222. fig. 8.

On distingue cette espèce à ses grandes feuilles rugueuses, pubescentes en dessous.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de soixante ou quatre-vingts pieds, dont le tronc très-inegal ne se divise qu'en deux ou trois branches principales, très-peu rameuses, épaisses, diffusés, revêtues d'une écorce brune, garnies de feuilles alternes, très-amplies, presque orbiculaires ou arrondies, très-entières à leurs bords, un peu échan-crées en cœur à leur base, chargées en dessous d'un duvet brun plus ou moins épais, qui disparaît ordinairement dans les anciennes feuilles; à grosses nervures lacuneuses & en réseau, rudes & très-ridées en dessus, d'un vert sombre, soulevées par des périoles durs, épais, très-courts, ayant à peine deux ou trois lignes de long. Ces feuilles ont quelquefois jusqu'à environ deux pieds de diamètre. Les rameaux sont munis de stipules vaginales à l'insertion des pétioles.

Cette plante croît sur les montagnes & dans les forêts de la Martinique. *h (V. f. absque flor. & fruct. in herb. Lam.)*

Son bois, d'après Jacquin, est d'un rouge foncé, très-dur, très-peinant, presque incorruptible, employé avantageusement pour construire des poutres, des palissades, &c. La partie enfoncée dans la terre y acquiert la dureté d'une pierre. On assure que ses fruits sont bons à manger.

4. RAISINIER à feuilles variées. *Coccoloba diversifolia.* Jacq.

*Coccoloba foliis ramificalorum ovatis, ramorum ovato-cordatis.* Jacq. Amer. t. 14. tab. 76.

La forme des feuilles différentes sur les tiges & sur les rameaux distingue particulièrement cette espèce.

Cet arbruste s'élève à la hauteur de dix à douze pieds: ses rameaux sont garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, noncheues, un peu coriaces, très-entières, légèrement rugueuses, luisantes, veinées, ovales sur les rameaux, échan-crées en cœur à leur base sur les branches, terminées à leur sommet en pointe obtuse.

Les grappes sont terminales, droites, simples, foliaires, longues d'environ trois pouces. Aux fleurs succèdent des drupes presque arrondies, de la grosseur d'une petite cerise, presque ombiliquées à leur sommet par la réunion des folioles calicinales grossies & charnues: la pulpe est molle, d'une belle couleur purpurine, d'une saveur assez semblable à celle du *coccoloba uvifera*, mais un peu plus acide, recherchée par les enfants & les paysans.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue, à

long des chemins & sur le revers des montagnes boisées. *h (Descript. ex Jacq.)*

5. RAISINIER jaunâtre. *Coccoloba flavescentes.* Jacq.

*Coccoloba foliis ellipticis, obtusis, mucronatis, basi cordatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 458. n°. 5.

*Coccoloba foliis lanceolato-oblongis, obtusis cum acamine.* Jacq. Amer. t. 14. tab. 75.

Cette espèce a quelques rapports avec le *coccoloba obtusifolia*; mais ses feuilles, moins étroites, sont mucronées à leur sommet.

Cette plante s'élève à la hauteur d'environ douze pieds, sous la forme d'un arbristeau rameux, garni de feuilles alternes, luisantes, coriaces, très-entières à leurs bords, obtuses & mucronées à leur sommet, supportées par des pétioles très-courts. Les grappes sont droites, simples & terminales: elles sont garnies de petites drupes arrondies, de couleur purpurine, un peu plus gros qu'un pois; leur pulpe est rougeâtre, d'une saveur douce, assez agréable au goût, mais dont on fait peu d'usage.

On rencontre cette plante dans les buissons, au Port-au-Prince, dans l'île Saint-Domingue. *h*

6. RAISINIER à écorce fine. *Coccoloba excoriata.* Linn.

*Coccoloba foliis oblongo-ovatis, acutiusculis, basi cordatis; racemis pennis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 458. n°. 6.

*Coccoloba foliis ovatis, ramis quasi excoriatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 524. — Mill. Dict. n°. 4.

*Coccoloba montana, major, arborea; foliis subrotundis, cortice levi.* Brown. Jam. 210.

*Guajabara alba, racemosa; foliis oblongis.* Plum. Ic. 146. fig. 1.

*Arbor indica, glycyrriza foliis fabrotundis; floribus in praelongam spicam adactis.* Pluk. Amath. 22. tab. 363. fig. 4.

7. *Eadem, foliis ovato-fabacatis, racem'a praelongis.*

C'est un arbre assez élevé, divisé en branches & en rameaux revêtus d'une écorce extrêmement fine & lisse, tellement qu'ils paraissent presque être privés. Ils sont garnis de feuilles alternes, pétioles, coriaces, ovales, oblongues, arrondies & médiocrement échan-crées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, entières & légèrement bordées à leur contour, lisses à leurs deux faces, vertes en dessus, jaunâtres en dessous, traversées par des nervures fines, médiocrement saillantes, ramées à leur sommet, se divisant en veines très-fines. Leur pétiole est fort court. Elles sont munies

à leur inflexion d'une stipule qui embrasse les rameaux. Les fleurs sont disposées en longues grappes pendantes.

Cette plante croît dans l'Amérique, sur les lieux montueux. *h* (V. f. *aequis flor. in herb. Lam.*)

J'en ai observé, dans l'herbier de M. Lamarck, une autre espèce très-voisine de celle-ci, mais dont les feuilles sont trois fois plus longues, lancéolées, acuminées, arrondies, mais non échancrées à leur base, plutôt membraneuses que coriaces, égales à leurs deux faces, munies à leur base de stipules vaginales. Je n'ai pas vu les fleurs. *h* (V. f.)

La plante *C*, rapportée de Porto-Ricco par M. Ledru, diffère des précédentes par ses feuilles plus courtes, ovales, arrondies & sans échancrure à leur base, un peu rétrécies, mais obtuses à leur sommet. Les fleurs sont petites, & forment des grappes pendantes, longues au moins de huit à dix pouces. L'écorce des rameaux est fine, lisse, grise, finement striée. *h* (V. f.)

7. RAISINIER à fruits blancs. *Coccoloba nivea*. Jacq.

*Coccoloba foliis oblongis, acuminatis; racemis erectisculis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 458. n°. 7.

*Coccoloba (nivea), foliis oblongis, acuminatis, venosis, supra nitidis; racemis erectisculis*. Swartz. Prodr. 64. — Idem. Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 693.

*Coccoloba (nivea), foliis ovato-oblongis, acutis, rugosis*. Jacq. Amer. 115. tab. 78.

Arbre d'environ vingt pieds, droit, rameux, dont les branches sont garnies de feuilles alternes, pétioles, ovales, oblongues, minces, membraneuses, rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, luisantes à leurs deux faces, à nervures latérales, alternes, filiformes, saillantes, jaunâtres, rameuses ou confluentes à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, solitaires, très-simples, redressées : ces fleurs sont petites & jaunâtres. Leur calice devient épais, succulent, & acquiert, en grossissant, une couleur blanche : il revêt jusque vers le milieu une noix à trois côtés, luisante & noirâtre : il en résulte des fruits d'une saveur douce, agréable.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue & à la Martinique, le long des rivières & des torrents. On la cultive dans l'île Saint-Eustache. Ses fruits se mangent. *h* (V. f. *aliqua flor.*)

8. RAISINIER ponctué. *Coccoloba punctata*.

*Coccoloba foliis lanceolatis, ovatis*. Mill. Dict. 1°. 3.

*Coccoloba (coronata), foliis ovato-oblongis, acuminatis, planis*. Jacq. Amer. 114. tab. 77.

*Coccoloba foliis oblongo-ovatis, venosis; uvis minoribus, punctatis*. Brown. Jam. 240.

*Uvifera arbor, americana; fructu aromatico, punctato*. Pluk. Almag. 394. tab. 237. fig. 4.

Arbuste haut de douze à quinze pieds, droit, rameux, garni de feuilles alternes, pétioles, ovales, oblongues, planes, très-entières, un peu coriaces, échancrées en cœur à leur base, longues d'un demi-pied, luisantes, au nombre de deux ou trois seulement sur chacun des rameaux à fleurs, munies à la base des pétioles d'une stipule qui engaine les tiges.

Les grappes sont droites, simples, terminales, solitaires, à peine longues d'un pouce & demi : les fleurs sont blanches. Une grande portion du réceptacle, avec une médiocre partie du calice, se convertit en un drupe presque arrondi, d'un rouge foncé, d'une saveur douce, mais un peu acerb.

Cette plante croît en Amérique, dans les environs de Carthagène. *h* (Description. ex Jacq.)

9. RAISINIER à feuilles membraneuses. *Coccoloba tenuifolia*. Linn.

*Coccoloba foliis ovatis, membranaceis*. Linn. Amoen. Acad. vol. 5. pag. 397. — Miller. Dict. n°. 5. — Lam. Illustr. Gener. tab. 316. fig. 1 & 3.

*Coccoloba frutescens, foliis subrotundis; fructu minore, trigono*. Brown. Jam. 210. tab. 14. fig. 3.

Cette espèce se distingue de ses congénères par ses feuilles ovales, membraneuses & non coriaces.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, glabres, médiocrement pétioles, entières, ovales, obtusés ou un peu acuminés à leur sommet, minces, dont les pétioles, au lieu de stipules, sont munies d'une membrane particulière. Les fleurs sont disposées en grappes terminales très-simples : elles sont éparfes, pédicelées ; le calice à quatre divisions, d'après la figure de Brown.

Cette plante croît à la Jamaïque. *h*

Observations. Cette plante, selon Linné, est dépourvue de stipules que remplace une membrane particulière, adnée au pétiole. J'ai vu dans l'herbier de M. Lamarck une plante recueillie à la Martinique, qui a tous les caractères de celle de Linné ; mais elle est pourvue de stipules vaginales. Ses fleurs sont disposées en épis droits, épais, subulés à leur sommet, cylindriques, longs de trois à quatre pouces. Les feuilles sont médiocrement acuminées, obtusés. (V. f.)

10. RAISINIER des Barbades. *Coccoloba barbadensis*. Linn.

*Coccoloba foliis cordato-ovatis, undulatis*. Linn. Syst. veger. 314. — Jacq. Amer. 37. — Ld. Obferv. vol. 1. tab. 8.

La fructification de cette espèce ne nous est pas encore connue; cependant, comme ses autres parties conviennent parfaitement aux plantes de ce genre, Jacquin & Linné ont cru devoir l'y placer.

Cet arbre a des feuilles alternes, simples, entières, médiocrement pétiolées, très-grandes, ovales, échancrées en cœur à leur base, ondulées à leurs bords, acuminées à leur sommet, g'aires à leurs deux faces, marquées de nervures simples, latérales, confluentes à leur sommet un peu avant d'arriver au bord des feuilles. L'interveille est rempli par un réseau fin & à petites mailles.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les îles Barbades.  $\text{h}$

11. RAISINIER échanuré. *Coccoloba emarginata*. Linn.

*Coccoloba foliis coriaceis, subrotundis, eximio-emarginatis*. Linn. Syst. veger. 314. — Jacq. Amer. 37. — Obferv. vol. 1. pag. 18. tab. 9.

Il en est de cette espèce comme du *coccoloba barbadensis*. Sa fructification n'est pas encore connue; mais elle s'annonce par son port pour devoir appartenir à ce genre.

Ses rameaux sont un peu flexueux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, coriaces, presque rondes, entières à leurs bords, échancrées en cœur à leur base, remarquables surtout par l'échancrure profonde, anguleuse de leur sommet. Les nervures sont parallèles & latérales: leur intervalle est rempli par des veines fines, formant un réseau à larges mailles.

Cette plante se trouve dans les contrées méridionales de l'Amérique.  $\text{h}$

12. RAISINIER à feuilles obovées. *Coccoloba obtusifolia*. Jacq.

*Coccoloba foliis oblongis, obtusissimis*. Jacq. Amer. 114. tab. 74.

On distingue cette espèce à ses feuilles étroites, obtuses, elliptiques.

C'est un arbrisseau très-rameux, diffus, haut de dix à douze pieds, dont les rameaux sont glabres, revêtus d'une écorce cendrée, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, luisantes, coriaces, très-nombreuses, oblongues, obtuses, très-entières, arrondies à leurs deux extrémités, agréablement veinées.

Les grappes de fleurs sont solitaires, terminales, simples, souvent alternes sur les jeunes rameaux, munies de fleurs petites, blanchâtres, & dont les calices accrus & succulents enveloppent presque jusqu'à son sommet une noix luisante, nue à sa partie supérieure. Les fruits ont une saveur astringente.

Cette plante croît en Amérique, dans les environs de Carthagène, parmi les haies & dans les bois.  $\text{h}$

13. RAISINIER à petits épis. *Coccoloba microstachia*. Willd.

*Coccoloba foliis ovatis, obtusis, glaberrimis; racemis nutantibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 459. n°. 9.

Cette plante a des rameaux glabres, cylindriques, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, obovées, plus larges à un de leurs côtés, glabres à leurs deux faces, entières, longues au moins d'un pouce & demi. Les fleurs sont petites, disposées en grappes terminales, très-courtes, penchées.

On trouve cette plante dans les ludes occidentales; elle approche du *coccoloba visifolia*, dont elle diffère par ses feuilles ovales & par ses grappes, beaucoup plus petites & pendantes.  $\text{h}$  (*Descript. ex Willden.*)

14. RAISINIER à petites feuilles. *Coccoloba parvisolia*.

*Coccoloba foliis ovatis, utrinque obtusis; racemis axillaribus, filiformibus*. (N.)

Cette plante a des rameaux diffus, épars, tortueux, en désordre, revêtus d'une écorce lisse, d'un blanc cendré, garnis de feuilles alternes, pétiolées, longues d'un à deux pouces au plus, à peine d'un pouce de large, coriaces, ovales, arrondies & obtuses à leurs deux extrémités, luisantes en dessus, un peu moins en dessous, marquées de nervures latérales, ramifiées en veines à réseau lâche: les rameaux sont réunis au point d'insertion des feuilles supérieures.

Les fleurs sont fort petites, disposées en grappes filiformes, longues de trois à quatre pouces, nombreuses, latérales & terminales, placées, le long des branches, sur de petits rameaux très-courts, sans feuilles, noueux au point d'insertion des pédoncules.

Cette plante a été recueillie dans l'Amérique méridionale, & communiquée par M. Vahl à M. Juskieu.  $\text{h}$  (*V. f. in herb. Juss.*)

15. RAISINIER sagitté. *Coccoloba sagittata*.

*Coccoloba foliis minimis, ovato-oblongis, basi truncatis, subsagittatis; racemis axillaribus*. (N.)

C'est

C'est une espèce très-remarquable par ses petites feuilles presque sagittées à leur base, & par ses petites grappes latérales.

Ses rameaux sont glabres, tortueux, revêtus d'une écorce très-mince, noirâtre, striée, fort glabre, garnis de feuilles pétiolées, alternes, très-rapprochées, longues d'environ un pouce, larges à peine d'un demi-pouce, ovales, oblongues, entières à leurs bords, obtuses, un peu mucronées à leur sommet, tronquées, élargies à leur base ou bien presque sagittées, chaque côté se terminant très-souvent par deux petites pointes; les pétioles longs de trois à quatre lignes, comprimés, rendus à leur base.

Les fleurs sont d'un blanc jaunâtre, petites, la plupart pédiculées, placées sur de petites grappes latérales, longues de deux à trois pouces, situées vers l'extrémité des rameaux.

Cette plante croît au Pérou, où elle a été recueillie par Dombey. *H. (V. f. in herb. Juss.)*

\* Espèce moins connue.

*Coccoloba (australis), foliis cordato-ovatis, acutis; floribus polygamis.* Forst. Prodr. n° 176.

**RAMASSÉS (Rameaux).** *Rami conferti.* On distingue par ce nom la situation des rameaux, lorsqu'étant épars ils sont tellement nombreux, qu'ils garnissent presque toute la tige ou d'autres rameaux communs, & ne laissent entr'eux que très-peu d'intervalle.

On donne le même nom aux feuilles (*folia conferta*) lorsque leur nombre est si grand que la tige ou les rameaux en sont partout couverts, comme dans l'*euphorbia cyparissias*.

Les fleurs sont aussi ramassées (*flores congestae*) lorsqu'elles sont rassemblées en un ou plusieurs paquets, comme dans le *daphne genkwa*, l'*illœum fistulosum*, &c.

Enfin, les verticilles portent le même nom (*verticilli conferti*) lorsqu'ils sont composés d'un grand nombre de petites fleurs très-serrées entr'elles, ainsi qu'on peut l'observer dans les *phloxes*, les *marubium*, &c.

**RAMEAUX ou BRANCHES.** *Rami.* Ce sont des productions ou même des divisions de la tige, qui offrent, dans certaines plantes, une disposition remarquable; c'est ainsi qu'ils forment un buisson sur le rozier, une tère sur le pommier, un cône sur le cyprès. Considérés séparément, les rameaux sont :

— **Alternes (alterni)**, lorsqu'ils sont disposés l'un après l'autre, par gradation, autour de la tige.

— **Opposés (oppositi)**, lorsqu'ils sont disposés par paires sur la tige, où leur insertion le fait sur deux points diamétralement opposés, tels que sur le cornouiller.

— **Distiques (distichi)**, lorsqu'ils sont disposés sur deux rangs seulement, c'est-à-dire, qu'ils ne sont tournés exactement que de deux côtés.

— **Epars (sparsi)**, lorsqu'ils sont disposés de tous les côtés, c'est-à-dire, qu'ils naissent sans garder aucun ordre remarquable.

— **Ramassés (conferti)**, lorsqu'étant épars ils sont tellement nombreux, qu'ils garnissent presque toute la tige ou d'autres rameaux communs, & laissent à peine quelque part un vuide sensible.

— **Verticillés (verticillati)**, lorsqu'ils sont plus de deux à chaque articulation, & qu'ils entourent ainsi la tige par étage, en manière de verticille ou d'étoile; & dans ce cas l'on considère leur nombre à chaque verticille, & l'on dit qu'ils sont ternés, quaternés, quinqués (*terni, quaterni, quini, &c.*), comme dans le nerium, &c.

— **Droits (erecti)**, lorsque la tige étant dans une situation droite, ils forment avec elle des angles très-aigus, comme ceux du cyprès, &c.

— **Serrés (coarcti)**, lorsqu'ils sont serrés contre la tige, quelle que soit la direction.

— **Divergens (divergentes)**, lorsqu'étant opposés ou verticillés, ils s'écartent tellement de la tige, qu'ils forment chacun un angle presque droit avec elle.

— **Eralés (divaricati)**, lorsqu'étant alternes ou épars, ils forment avec la tige, & entr'eux, des angles presque droits.

— **Courbés, pliés (flexi)**, lorsqu'ils penchent en dehors, en formant un peu l'arc, de sorte que leur extrémité est plus basse que leur insertion.

— **Pendants (penduli)**, lorsque, par leur longueur ou par leur foiblesse, ils tombent presque perpendiculairement, comme dans le *salix babylonica*, le saule pleureur, &c.

— **Réfléchis (reflexi, inflexi)**, lorsqu'étant pendants, leur extrémité se recourbe vers la tige.

— **Replés (retroflexi)**, lorsqu'étant courbés en dehors & presque pendants, leur extrémité se replie encore en divers sens.

Enfin, on distingue ceux qui ont des supports (*voyez ce mot*) d'avec ceux qui n'en ont pas, & dans ce cas on nomme les premiers *rameaux à supports (rami fulcrati)*.

Les rameaux fournissent encore, par leur consistance, leur couleur, &c. beaucoup de caractères utiles pour les distinguer.

Ils sont succulents dans le pourpier, la bourra-  
che & la betterre; fics dans les *smilax*, &c.; laiteux  
dans les chicorées, les campanules, les lisérans,  
les apocins, les pavots, les euphoïbes, &c.; verres  
dans l'hibeille, le fenouil; cendrés dans le sureau,  
le charme, le peuplier; blancs dans le bouleau;  
rouges dans le cornouiller sanguin, dans la pa-  
riette sang-de-dragon, dans la betterave, &c.;  
tachés dans la serpentaire, la ciguë, la vige-  
rine, &c.; gluans dans plusieurs filénés, dans  
l'aune, &c.

**RAMEUSE** (Racine). *Radix ramosa*. Lorsque  
l'on considère la racine quant à sa forme & à sa  
direction, on nomme *ramée* celle qui se divise  
en plusieurs branches latérales, comme dans le  
*plantago rhyllium*.

On dit aussi que la tige est *rameuse* lorsque, con-  
sidérant sa composition, elle produit latéralement  
des rameaux qui ne sont point opposés, comme  
celle de l'absynthe : elle est *branchue* lorsque ces  
rameaux sont opposés.

**RAMONTCHI**. *Flacurtia*. Genre de plantes di-  
cotyledones, à fleurs incomplètes, dioïques, de  
la famille des tilleuls, voisins des *oncoba*, qui  
comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont  
les feuilles sont alternes, les rameaux épineux,  
les fleurs disposées en grappes terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; le calice, dans les mâles, di-  
visé en cinq parties; point de corolle; des étamines  
nombreuses, attachées sur le calice; le calice à plu-  
sieurs folioles dans les femelles; un ovaire supérieur,  
de cinq à neuf styles; une baie à plusieurs loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé en cinq  
découpures presque égales, un peu arrondies, ou-  
vertes, obovées.

2°. Point de corolle.

3°. Des étamines nombreuses, de cinquante à  
cent, dont les filaments capillaires sont plus longs  
que les calices, insérés sur le fond du calice, ter-  
minés par des anthères arrondies, à deux lobes.

4°. Point de pistil, mais quelquefois le rudi-  
ment d'un ovaire & d'un stigmate.

Les fleurs femelles offrent :

1°. Un calice à cinq ou sept folioles droites, un  
peu arrondies, rapprochées par leurs bords, pu-  
bescentes intérieurement.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire supérieur, grand, ovale, jaunâtre,  
plus long que le calice, surmonté de cinq à neuf  
styles ouverts en rayons divergens, épais, à une  
strie longitudinale, persistans, terminés par des  
stigmates obtus.

Le fruit est une baie globuleuse, charnue, con-  
servant les impressions & les débris des styles &  
des stigmates, à cinq ou sept loges, contenant  
chacune deux semences comprimées, oléuses, un  
peu striées à leur sommet.

#### E S P È C E S.

1. **RAMONTCHI** de Madagascar. *Flacurtia ra-  
montchi*.

*Flacurtia foliis ovatis, crenulato-serratis, glabris;  
floribus subracemosis.* (N.)

*Flacurtia ramontchi*. Lhéritier. Stirp. Nov. 3.  
pag. 59. tab. 30. — Lam. Illustr. Gener. tab. 826.  
— Jussieu. Gener. Plant. pag. 291. — Gmel. Syst.  
Nat. vol. 1. pag. 852.

*Flacurtia madagassica*. Commerf. Manuf. & Icon.

*Alamoton*. Flaccourt. Hist. Madag. 124.

Vulgairement prunes de Madagascar.

C'est un arbrisseau qui croît à la hauteur de  
huit à dix pieds, en buisson fort épais, dont les  
tiges se divisent en rameaux alternes, diffus, tubercu-  
lés, de couleur cendrée; les tubercules se  
prolongent en épines latérales ou axillaires, droi-  
tes, aiguës, subulées, solitaires ou deux à deux,  
plus longues que les pétioles. Les feuilles sont  
alternes, pétiolées, ovales, un peu aiguës, cré-  
nelées à leur contour, particulièrement vers leur  
sommet; d'un beau vert en dessus, plus clair en  
dessous, longues d'un pouce & demi à deux pou-  
ces, larges d'un pouce & plus, supportées par  
des pétioles rougeâtres, cylindriques, pubescentes,  
fort courts.

Les fleurs sont disposées en petites grappes ter-  
minales, droites, peu garnies; les mâles n'ont  
qu'une ou deux fleurs; les femelles en ont cinq à  
six : elles sont portées sur des pédoncules particu-  
liers, jaunâtres, fort courts. Les calices sont  
courts, verdâtres, épais en réceptacle dans leur  
centre. Les fruits forment une petite prune glo-  
buleuse, verte en naissant, passant ensuite à une  
belle couleur rouge, qui se convertit en un vio-  
let obscur à l'époque de la maturité.

Cette plante croît à Madagascar : elle est cul-  
ivée au Jardin des Plantes de Paris. f. (V. f. in  
herb. Lam. & Jussieu.)

Les habitants de l'île de Madagascar mangent  
les fruits du *ramontchi* : il est doux au goût, mais  
il laisse, après l'avoir mangé, une légère acréte  
dans la bouche. Les amandes sont un peu amères,

& ont quelque chose de la faveur des noyaux de prune.

L'écorce, le bois, la feuille & la figure extérieure du fruit de cet arbrisseau, par leur ressemblance avec notre prunier, lui en ont fait donner le nom par les marins, & la quantité de ces arbrisseaux a fait appeler l'île où ils croissent, *l'île aux prunes*. Elle en est toute couverte, & est située fur la côte de Madagascar, à dix lieues au sud de Foulpointe.

#### RAMPANTE (Racine). *Radix repens*.

On donne aux racines le nom de *rampantes* ou *traçantes* lorsque, considérées relativement à leur direction, elles s'étendent horizontalement, & qu'elles jettent de tous côtés des ramifications presque simples, sans pénétrer profondément dans la terre, comme celles du *panicum dactylon*.

La tige porte le même nom quand elle est entièrement couchée sur la terre, qu'elle s'y étend un peu au loin, & que souvent elle s'y attache par de petites racines qu'elle pousse de toutes parts, comme il est facile de l'observer dans celles de la nummulaire & de l'argentine.

**RAPANE.** *Rapanea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des vinétiers, qui a de grands rapports avec les *ohera*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, entières, & les fleurs presque sessiles, réunies en petits paquets le long des rameaux & des branches.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice à cinq divisions ; une corolle en roue, à cinq découpures profondes ; une baie sphérique, à une seule semence.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, fort petit, persistant, divisé en cinq ou six découpures.

2°. Une corolle monopétale, en roue, dont le tube est très-court, le limbe profondément divisé en cinq ou six découpures arrondies.

3°. Cinq (quelquefois six) *étamines*, dont les filaments sont courts, attachés au tube, à la base de chaque lobe; terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style très-court, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une baie sphérique, à une seule loge.

*Observations.* Ce genre, d'après les observations de M. Swartz, paroitroit devoir être réuni aux *sumara* Linn. ; cependant l'espèce que nous allons décrire a bien plus de rapports avec les *fiduoroxylum*, & ce genre convient assez bien à la famille des sapotilliers, ainsi que l'a observé M. Jussieu, quoiqu'il l'ait rangé parmi les vinétiers.

#### E S P È C E.

1. **RAPANE de la Guiane.** *Rapanea guianensis*. Aublet.

*Rapanea foliis ovato-oblongis ; floribus lateralibus, subsiliis confertis.* (N.) Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 46. n°. 1483. tab. 122.

*Rapanea guianensis*. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 121. tab. 46.

C'est un arbrisseau dont le tronc s'élève à cinq ou six pieds de haut, fur quatre à cinq pouces de diamètre, revêtu d'une écorce cendrée, & dont le bois est blanc, peu compacte. Son sommet se divise en branches, de l'aiselle desquelles sortent un grand nombre de petits rameaux garnis de feuilles alternes, pétioles, lisses, vertes, molles, épaisses, entières, ovales, un peu oblongues, un peu rétrécies à leur base, médiocrement élargies à leur sommet; les unes échancrées, d'autres terminées en pointe, longues de trois à quatre pouces, sur un & demi de largeur; supportées par un pétiole court.

Les fleurs sont réunies par petits paquets, presque sessiles, le long des branches & des rameaux. Leur calice est divisé en cinq & quelquefois six découpures vertes, lisses, ovales, aiguës. La corolle, à peine de la longueur du calice, est blanche; elle se divise en cinq ou six lobes oblongs, arrondis à leur sommet: les étamines varient de cinq à six. Le fruit est une baie de couleur violette, arrondie, à une seule loge, qui renferme cinq à six semences, dont ordinairement une seule fructifie.

Cette plante croît à Cayenne, dans les bords des Savannes, où elle fleurit & fructifie vers la fin de l'automne. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

**RAPAT.** *Caju rapat*. Cortex consolidans. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 50. tab. 29.

C'est un arbrisseau qui n'est encore connu que très-imparfaitement, & que Rumphius a mentionné dans son herbier d'Amboine. Ses tiges poussent de toutes parts de longs rejets rampans, épais d'un pouce, revêtus d'une écorce rugueuse, d'où découle, ainsi que des feuilles, une liqueur laiteuse, blanche, visqueuse: ces rejets se divisent en d'autres fort grêles, extrêmement longs, qui s'entortillent autour des arbres, & y adhèrent fortement.



Les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles opposées, pédicelées, entières, ovales, un peu étroites, longues de quatre à cinq pouces, larges d'environ un pouce & demi, glabres, luisantes, d'un vert gai, d'une saveur acide, approchant de celle de l'oseille. Les fleurs sont terminales, disposées en corymbes touffus. La corolle est blanche, monopétale; son tube est très-court; son limbe se divise en cinq découpures courtes, ovales, arrondies à leur sommet, ouvertes. Ces fleurs répandent, surtout vers le soir, une odeur très-forte, pénétrante, & qui me ne occasionne des maux de tête. Le fruit n'est pas connu.

Cette plante croît dans les forêts, à l'île d'Amboine. Son bois est blanc, souple, tendre, peu propre à aucun usage économique.

**RAPATE.** *Rapatea*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs lilacées, de la famille des juncs, voisin des *mayaca* d'Aublet, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont radicales, graminiformes; les fleurs nombreuses, disposées en têtes comme celles de l'ail, enveloppées par une spathe à deux valves.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une spathe à deux valves; une corolle à six découpures, dont les trois extérieures glumacées; des anthères presque sessiles, appendiculées à leur sommet; une capsule à trois loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une spathe d'une seule pièce, divisée en deux valves très-amples à leur base, rétrécies, aiguës, alongées à leur sommet.

2°. Une corolle monopétale, à six découpures très-profondes, dont les trois extérieures sont glumacées, concaves, oblongues, aiguës; les trois intérieures réunies à leur base en un tube très-court, ovales, alongées, roulées en spirale sur elles-mêmes.

3°. Six étamines insérées sur le tube intérieur de la corolle par des filaments extrêmement courts, surmontés de très-longues anthères quadrangulaires, qui se terminent chacune par un appendice foliacé, anthéroïforme, jaunâtre & concave.

4°. Un ovaire à trois faces arrondies, surmonté d'un style charnu, strié, terminé par trois stigmates roulés les uns sur les autres.

Le fruit (d'après Jussieu) est une capsule à trois loges, à trois valves, à trois semences, chacune des valves séparée par une demi-cloison jusque vers leur milieu.

#### 1. RAPATE des marais. *Rapatea paludosa*.

*Rapatea foliis omnibus radicalibus, graminæis, sesq. longioribus; floribus capitulo-congestis.* (N.)

*Rapatea paludosa*. Aublet. Guian. vol. 1. pag. 305. tab. 118. — Juss. Gener. Plant. 44. — Lam. illustr. Gener. tab. 226.

C'est une plante marécageuse, dont les racines sont dures, fibreuses, & qui produisent immédiatement de leur collet des feuilles sessiles, longues, étroites, fermes, droites, sèches, terminées en pointe & assez semblables à celles des graminées, élargies & vaginales à leur base, au dessus de laquelle elles se rétrécissent, & puis s'élargissent jusque vers leur milieu, en diminuant ensuite vers leur sommet; elles sont longues de deux pieds & plus, larges d'environ deux pouces.

Du centre de ces feuilles s'élevent des hampes ou tiges simples, droites, fermes, dures, comprimées, à deux tranchans, glabres & striées. Une spathe divisée en deux grandes valves lancéolées, ensiformes à leur partie supérieure, enveloppe un grand nombre de fleurs réunies en tête terminale, & portées chacune sur un pédoncule long de quatre à cinq lignes, muni à sa partie supérieure d'écaillés opposées, imbriquées, concaves, aiguës, recouvrant même la corolle à sa base.

La corolle est divisée en six découpures: les trois extérieures sont minces, concaves, terminées en pointe, assez semblables par leur substance aux balles des graminées. Les trois divisions intérieures, réunies à leur base en une sorte de tube très-court, sont jaunes, concaves, aiguës: c'est sur les parois internes de ce tube que les étamines sont attachées. Leur filament est à peine sensible, & les anthères sont presque aussi longues que la corolle, en y comprenant l'appendice anthéroïforme qui les termine.

Cette plante croît à Cayenne, dans les bois marécageux, sur le bord des rivières. Elle fleurit au commencement de l'été. (*V. f. in herb.* Juss.)

**RAPETTE.** *Aserugo*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des butraginées, qui a des rapports avec les butrachs & les vipérines, renfermant des herbes indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont axillaires, les feuilles rudes & simples.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice irrégulier, à cinq dents inégales; une corolle, dont l'orifice est fermé par des écaillés; des semences recouvertes par le calice comprimé.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions inégales, persistantes, dentées irrégulièrement à leurs bords.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est court, cylindrique; le limbe divisé jusque vers son milieu en cinq découpures orbiculées; l'orifice fermé par cinq écailles convexes, conniventes.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, insérés sur la corolle, terminés par des anthères recouvertes.

4°. Quatre ovaires comprimés, surmontés d'un style court, terminé par un stigmate obtus.

Les semences sont au nombre de quatre; oblongues, comprimées, rapprochées deux par deux, chaque paire écartée; recouvertes par le calice, comprimé & fort agrandi.

Observations. La forme irrégulière & comprimée des calices, ainsi que leur développement considérable à l'époque de la maturité des fruits, constitue le caractère le plus essentiel de ce genre, duquel M. Lamarck a retranché l'*Asperugo aegyptiaca* de Linné, à cause de ses calices renflés & non comprimés.

## E S P È C E.

1. RAPETTE couchée. *Asperugo procumbens*. Linn.

*Asperugo calicibus fructibus compressis, caule procumbente.* (N.) Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 411. n°. 1852. tab. 54.

*Asperugo calicibus fructibus compressis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 198. — Flor. Lappon. 76. — Flor. Suec. 159. 166. — Hort. Cliffort. 44. — Haller. Helv. n°. 666. — Gunn. Norveg. n°. 508. — Eder. Flor. Dan. tab. 352. — Hoffm. Germ. 65. — Roth. Germ. 1. 85. II. 217. — Linn. Flor. franc. vol. 2. p. 279. n°. 322. — Dalib. Paris. 61.

*Baglossum silvestre, caulibus procumbentibus.* C. Bauh. Pin. 257. — Morif. Hist. 3. pag. 439. 5. 11. tab. 26. fig. 13.

*Aparine major* Plinil. Tabern. 788.

*Borrago minor, silvestris.* Column. pag. 181. Ic. 183.

*Asperugo vulgaris.* Tournef. Inst. R. Herb. 135. — Garidel. Aix. pag. 46. tab. 9.

*Cynoglossa forte toriaria* Plinio, sive *echium lapidatum* & *thuidium*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 350. Ic.

*Asperugo spuria.* Dodon. Pempt. 356. Ic.

*Alyssum germanicum, echinoides.* Lobel. Ic. 803. — Id. Olfert. 466. Ic. — Dalechamp. Hist. vol. 2. pag. 1145. Ic.

2. *Asperugo tenuior, floribus albis.* Tournef. Inst. R. Herb. 135.

*Baglossum caulibus procumbentibus, tenerius; floribus albis.* Mentz. Poug. tab. 7.

Cette plante pousse de ses racines un grand nombre de tiges rameuses, éréduées sur la terre, foibles, anguleuses, munies de poils rudes. Les feuilles sont distantes, deux, quatre ou cinq à chaque nœud, presque opposées, mais réellement alternes, oblongues, très-entières, un peu variées dans leur forme & leur grandeur, orbiculées, presque sessiles, réticées en pétiole à leur base, très-rudes, velues, ciliées légèrement à leurs bords.

Les fleurs sont axillaires, presque solitaires, sessiles ou médiocrement pédonculées. La corolle est petite, de couleur violette, quelquefois blanche. Les calices se développent & s'accroissent considérablement à la maturité des semences; ils sont fortement comprimés, à cinq divisions irrégulières, garnies à leurs bords de dents inégales.

Cette plante croit dans les lieux incultes, sur le bord des chemins ou le long des haies. O (V. v.)

On lui attribue, mais à un degré un peu inférieur, les mêmes propriétés qu'à la bourrache: elle passe pour détersive, vulnéraire & incisive. Dans quelques contrées de l'Italie, on se sert des jeunes feuilles comme de plantes potagères.

Observations. L'*Asperugo aegyptiaca* de Linné, dont les calices sont renflés au lieu d'être comprimés, a été rangée par M. Lamarck parmi les *baglosses*. Elle se trouve déjà décrite à cet article dans ce Dictionnaire: elle est aussi mentionnée dans les Illustrations des Genres, au genre *Anchusa*.

RAPONCULE. *Phyteuma*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des campanulacées, qui a des rapports avec les *scavola*, & qui comprend des herbes tant indigènes qu'exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont tantôt éparées, plus souvent réunies en un épi terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Une corolle en roue, partagée en cinq découpures linéaires; une capsule inférieure, à deux ou trois loges.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieurement, d'une seule pièce, partagé en cinq découpures aiguës, à demi ouvertes.

2°. Une corolle monopétale, en roue, ouverte, partagée en cinq découpures linéaires, étroites, recourbées.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont plus courts que la corolle, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire inférieurement, surmonté d'un style filiforme, recourbé, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate à deux ou trois divisions oblongues, roulées.

Le fruit est une capsule arrondie, couronnée par le calice, à deux ou trois loges, s'ouvrant de chaque côté par un trou, contenant des semences nombreuses, petites, arrondies.

Observations. Parmi les espèces qui composent ce genre, les unes ont leurs fleurs terminales, réunies en tête ou en épi; les autres les ont axillaires, latérales, presque solitaires; & ce qui paroît assez singulier, c'est que toutes les espèces d'Europe offrent le premier caractère, & que celles qui ont leurs fleurs éparées, sont originaires du Levant, & quelques-unes des Indes.

## E S P È C E S.

\* Fleurs capitées ou en épis.

1. RAPONCULE à épi. *Phyteuma spicatus*. Linn.

*Phyteuma spicatum* conico-oblongum; foliis radicalibus, cordatis, serratis; capsulis bilocularibus. Lam. Ill. Gener. vol. 2. pag. 68. n°. 2589. tab. 124. fig. 1.

*Phyteuma spicatum* oblongum, capsulis bilocularibus, foliis radicalibus cordatis. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 242. — Oeder. Flor. Dan. 362. — Pollich. Pfl. n°. 215. — Murrusch. Sil. n°. 141. — Gmel. Tub. pag. 58. — Doerr. Naif. pag. 174. — Roth. Germ. 1. pag. 97. II. pag. 248. — Hoffm. Germ. 74. — Dalibart. Paris. 69.

*Phyteuma spicatum* oblongum, elongatum; stylis pilosissimis, trifidis; foliis radicalibus, cordatis, duplicato-dentatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 923. n°. 9.

*Phyteuma (spicatum)*, foliis radicalibus cum inferioribus caulinis cordatis, duplicato-serratis, peristylatis, ad basin ferrugineo-maculatis, scissimis sessilibus, linearibus lanceolatis, rarius serratis; spicis oblongis, bracteis linearibus, corollis longioribus. Schmidt. Bohem. 1. n°. 191.

*Rapunculus foliis radicalibus, cordatis; tubis bicornibus, revolutis.* Haller. Helv. n°. 684.

*Rapunculus spicatus*. Miller. Dict. n°. 1. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 238. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 330. n°. 926. II. — Tournet. Inst. R. Heio. 113. Varietates quatuor.

*Phyteuma spicatum* oblongum, nudum; foliis earlinis, lanceolatis, serratis. Amoenit. Academ. vol. 1. pag. 149.

*Rapunculus spicatus* sive *comosus*, *caruleus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 809. Ic.

*Rapunculus corniculatus*, folio urtica, flore caruleo & albo, seu *alopecuroides* longiore spici. Motil. Oxon. Hist. 2. pag. 463. §. 5. tab. 5. fig. 46.

*Rapunculum alopecuron*. Dodon. Pempt. 165. Icon. ?

*Rapuntium majus alopecuri*, *comoso* flore. Lob. Icon. 329. ? & Observ. 178.

*Rapunculus major* *Dodonai*. Dalech. Hist. 1. pag. 641. Icon.

*Rapunculum alopecuron*, flore albo, italicum. Barrel. Icon. rar. 592. Optima.

*Rapunculus foliis cordatis*, spicis floribus oblongis. Monnier. Observ. 130.

*Rapunculus spicatus*, albus. C. Bauh. Pin. 92.

6. *Rapunculus spicatus* sive *comosus*, folio maculato. J. Bauh. Hist. 2. 809.

*Rapunculus spicatus*, flore saturatè violaceo, foliis maculis nigris notatis. C. Bauh. Pin. 92.

A. *Phyteuma (betonicifolia)*, foliis cordatis, oblongis, crenatis; spicis oblongis. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 518. tab. 12. fig. 5.

*Phyteuma (betonicifolia)*, spicis oblongis, foliis simpliciter crenatis, radicalibus, lanceolato-cordatis, caulinis, lanceolatis. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 922. n°. 8.

*Phyteuma foliis radicalibus, cordato-oblongis, crenatis, caulinis lanceolatis, spicis oblongis*. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 68. n°. 2588.

Nous avons cru devoir réunir sous la même dénomination plusieurs variétés de cette espèce, qui en avoient été séparées, n'offrant d'autres différences que de légères changements dans la forme des feuilles, conservant d'ailleurs le caractère de l'espèce, continuée par un épi de fleurs oblong, des feuilles crénelées, plus ou moins allongées; les inférieures, échanquées en cœur.

Les racines sont charnues, blanchâtres, presque fusiformes; il s'en élève des tiges hautes d'un pied au moins, droites, très-simples, presque glabres, filices, garnies de feuilles, dont les radicales & inférieures sont ovales, oblongues, plus ou moins larges, échanquées en cœur à leur base, vertes & glabres à leurs deux faces, souvent à double dentelure à leurs bords, médiocrement acuminées à leur sommet, supportées par des pétioles comprimés, au moins aussi longs que les feuilles; les supérieures sont plus étroites, lancéolées, presque filices.

Les fleurs sont ramassées à l'extrémité des tiges en un épi long d'un à deux pouces & plus, ovale, conique ou cylindrique, touffu ou grêle, muni de bractées linéaires, lancéolées, étroites, entières, membranées & blanchâtres : ces fleurs varient par leur couleur ; elles sont ordinairement bleues, quelquefois blanches ou jauvâtres : les capsules n'ont que deux loges.

Parmi les variétés de cette espèce, il en est dont les feuilles sont marquées de taches noires ; dans d'autres, ces mêmes feuilles sont amples, larges, ovales, assez semblables à celles de l'ortie. La plante A o'en diffère essentiellement que par ses feuilles plus étroites, toutes lancéolées, à un simple rang de dentelures : les fleurs sont un peu plus petites.

Cette plante croît dans les bois & les pâturages des montagnes, en Suisse, en France, en Italie. Je l'ai recueillie dans la forêt de Villers-Cotterêts. J'en ai trouvée une variété dans les environs d'Avanches, dont les tiges & les feuilles étoient légèrement pubescentes. ♀ (V. v.)

2. RAPONCULE hémisphérique. *Phyteuma hemisphaericum*. Linn.

*Phyteuma capitato subrotundo, foliis linearibus, angustis, integerrimis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 67. n°. 2584. tab. 124. fig. 2.

*Phyteuma capitato subrotundo, bracteis ovatis, foliis linearibus, subintegerrimis*. Linn. Syst. veget. pag. 211. — Mærch. Hsb. n°. 176. — Allion. Flor. Pedem. n°. 425. — Jacq. Collect. 2. pag. 61. — Idem. Icon. rar. vol. 2.

*Phyteuma capitato subrotundo, bracteis ovatis, foliis linearibus, subintegerrimis, caule vix brevioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 920. n°. 4.

*Phyteuma foliis linearibus, floribus capitatis*. Roy. Lugd. Bat. 248.

*Rapunculus hemisphaericus*. Miller. Dict. n°. 3.

*Rapunculus foliis linearibus, bracteis ovato-lanceolatis*. Haller. Helv. n°. 679.

*Rapunculus hemisphaericus*. Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 331. n°. 926. VI.

*Rapunculus umbellatus, folio gramineo*. C. Bauh. Pin. 92.

*Rapunculus strobilatus, caeruleus, umbellatus*. Thal. Herc. 94. tab. 8. fig. 3.

*Rapuntium alterum, angustifolium, alpinum*. Column. Ecphr. 2. pag. 23. tab. 26.

*Rapunculus folio gramineo*. Tournef. Inst. R. Herb. 113.

A. *Phyteuma* (Michellii), *capitula subrotundo*,

*bracteis oblongo-lanceolatis; foliis linearibus, rigidis, subintegerrimis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 920. n°. 3.

*Phyteuma* (Michellii), *spica oblonga, foliis linearibus, lanceolatis, subintegerrimis*. Allion. Flor. Pedem. n°. 427. tab. 7. fig. 3.

*Rapunculus alpinus, caeruleus, angustifolius, raro, & subinde dentato folio*. Mich. Hort. Bot. pag. 80.

*Rapunculus montanus, gramineus, corniculatus*. Barrel. Icon. rar. tab. 23. fig. 1. ?

*Rapunculus alpinus, angustifolius*. Moris. Oxon. Hist. 2. 9. 5. tab. 5. fig. 53.

On distingue cette espèce à ses feuilles très-étroites, presque graminées, & à ses têtes de fleurs arrondies, un peu comprimées supérieurement.

Ses tiges sont simples, un peu striées, glabres, hautes de quatre à six pouces, garnies, surtout dans leur partie inférieure, jusque vers leur milieu, de feuilles longues, très-étroites, simples, aiguës, souples, molles, glabres, rétrécies à leur base en un pétiole filiforme, longues souvent de deux ou trois pouces.

Les fleurs sont terminales, réunies en une tête globuleuse, hémisphérique, munie extérieurement de bractées lancéolées, aiguës, minces, entières, à peine garnies de quelques cils rares. La corolle est bleue, quelquefois blanche ; le style tiède.

Il existe plusieurs variétés de cette espèce. Quelquefois elle n'a pas plus d'un à deux pouces de haut : les feuilles, aussi longues & même plus longues que les tiges, sont très-étroites, presque filiformes.

La plante A en est une des variétés les plus remarquables ; & quoiqu'Allion en ait fait une espèce distincte, nous ne lui trouvons point de caractères suffisants pour la séparer de celle-ci. Ses feuilles sont un peu plus roides, plus larges, moins longues, munies quelquefois à leurs bords d'une ou deux petites dents à peine sensibles : les bractées ont un peu plus de largeur, & la tête des fleurs s'allonge médiocrement après la floraison.

Cette plante croît en Suisse, dans les Alpes & dans les départements méridionaux de la France. La variété A se rencontre particulièrement au Mont-Cenis. ♀ (V. f.)

3. RAPONCULE pauciflore. *Phyteuma pauciflora*. Linn.

*Phyteuma capitato subfolioso, bracteis ovatis, ciliatis; foliis omnibus linearibus lanceolatis, subcrenatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 919. n°. 1.

*Phyteuma capitato subuloso, foliis omnibus lanceolatis*. Linn. Syst. veget. pag. 176. — Allion. Flor. Pedem. n.º 424. — Jacq. Collect. 2. pag. 63. — Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 67. n.º 2583.

*Rapunculus foliis ovatis, obtusè dentatis; bracteis maximis, obtusis*. Haller. Helv. 680.

*Rapunculus pauciflorus*. Miller. Dict. n.º 4. — Scop. Carn. 2. n.º 241.

*Rapunculus alpinus, parvus, comosus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 811.

*Rapunculus corniculatus, alpinus, parvus*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 5. fig. 50.

Cette plante a des rapports avec le *phyteuma orbicularis* elle se distingue par ses fleurs peu nombreuses, environnées de bractées ovales & ciliées, & surtout par ses feuilles toutes lancéolées, linéaires, point échancrées à leur base.

Ses tiges sont simples, droites, grêles, hautes d'environ huit à dix pouces, munies de quelques poils rars & courts, garnies de feuilles alternes, pétiolées; les radicales semblables aux caulinares, oblongues, linéaires, lancéolées, vertes & glabres à leurs deux faces, médiocrement crénelées à leurs bords, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, longues d'un à deux pouces, larges de trois à cinq lignes; les inférieures portées sur de très-longues pétioles; les supérieures plus petites, presque sessiles.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en un épi capité, court, peu garni, environné de quelques bractées assez grandes, ovales, ciliées, échancrées en cœur. La corolle est bleuâtre, le style souvent biffé, la capsule divisée en deux ou trois loges.

Cette plante croît en Suisse, dans les Alpes, &c. (V. f.)

#### 4 RAPUNCULE OVALE. *Phyteuma ovata*. Lam.

*Phyteuma capitato ovato, foliis lineari-lanceolatis, rariter dentatis, bracteis linearibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 68. n.º 2585.

*Phyteuma* (Schreuzeri), *capitula subuloso, bracteis linearibus, cavitate longioribus; foliis lanceolatis, dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 919. r.º 2. — Allion. Flor. Pedem. n.º 428. tab. 39. fig. 2.

*Phyteuma* (scorzoniferifolia), *foliis omnibus oblongis, leviter crenatis, supremis linearibus; spica oblonga*. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 519. tab. 12. fig. 2.

*Rapunculus foliis imis, longè petiolatis, caulinis linearibus, integris; bracteis linearibus, duabus, imis, longissimis*. Haller. Helv. n.º 682.

*Rapunculus alpinus, petraeus, caruleus; foliis flori subulatis, longis, angustioribus*. Schreuzer. Iter 6. pag. 460.

Il existe beaucoup de rapports entre cette plante & le *phyteuma hamiphratica* : elle en diffère par son port, par ses épis ovales, par ses bractées linéaires.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied, glabres, presque cylindriques, simples, roides, garnies de feuilles très-longues, linéaires, lancéolées, fort étroites, glabres à leurs deux faces, munies à leurs bords de quelques dents rares, écartées, à peine sensibles, rétrécies à leur base en un long pétiole filiforme; les supérieures sessiles.

Les fleurs sont bleues, réunies en une tête épaisse, ovale, munies de bractées linéaires, dont deux sont très-longues; les autres à peine aussi longues que la corolle.

Cette plante croît dans les montagnes alpines, dans les départements méridionaux de la France, dans le Piémont, au Mont-Cénis. (V. f. in herb. La nark.)

La plante de M. Villars paroît appartenir à cette espèce comme variété. Outre ses épis un peu plus allongés, les feuilles inférieures sont plus larges, quelquefois un peu échancrées en cœur, légèrement crénelées. J'en possède une espèce des Alpes de la Suisse, qui diffère de celle-ci par ses feuilles inférieures velues, ainsi que la base de leurs tiges. (V. f.)

#### 5. RAPUNCULE de Haller. *Phyteuma Halleri*. Allion.

*Phyteuma spica ovata, styis hirsutis, flore longioribus, emarginato-bifidis; foliis radicalibus, cordatis, duplicato-dentatis*.

*Phyteuma ovata*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 923. n.º 10.

*Phyteuma* (ovatum), *foliis petiolatis, radicalibus cum infima caulinis cordatis, duplicato-ferratis, superioribus lanceolatis, simpliciter serratis; spica ovata, obtusè; styis hirsutis, bracteis linearibus*. Schmidt. Flor. Bohem. t. n.º 190. — Schrank. Salzb. n.º 225.

*Phyteuma Halleri*. Allion. Flor. Pedem. n.º 430.

*Rapunculus foliis radicalibus, cordiformibus, acutè incisè; tabis longissimis, hirsutis, emarginatis*. Hall. Helv. n.º 683.

*Rapunculus spicatus, flore purpureo, caruleo*. Schreuz. Iter, pag. 518.

On distingue cette espèce du *phyteuma spicata* à ses épis ovales & à ses styles velus & biffés.

Ses tiges sont simples & droites, garnies de feuilles

feuilles pétiolées, alternes, lancéolées; les radicales & les caulinaires inférieures échanquées en cœur à leur base, & munies à leurs bords d'un double rang de dentelures; les supérieures sont plus étroites, lancéolées, presque sessiles, à dentelures simples. Les fleurs sont réunies en un épi ovale, de couleur bleue ou purpurine, épais, serré, garni de bractées linéaires, ayant les styles très-velus & bifides.

Cette plante croît dans les prairies sous-alpines, en Suisse, dans le Piémont & la Bohême. ♀

6 *RAPUNCULUS orbiculata*. *Phyteuma orbiculata*. Linn.

*Phyteuma capitulo subrotundo, foliis serratis, radicalibus cordatis, petiolatis, superioribus sessilibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 68. n°. 1586.

*Phyteuma capitulo subrotundo, foliis serratis, radicalibus cordatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 223. — Grim. Ilen. in Nov. Act. A. N. C. tom. 3. Append. pag. 180. — Mémch. Hall. n°. 179. — DORT. Nass. pag. 174. — Roth. Germ. 1. pag. 197. II. pag. 247.

*Phyteuma foliis oblongis, spica orbiculari*. Guett. Stamp. 1. pag. 34. — Dalib. Paris. 69.

*Rapunculus foliis imis, cordatis, oblongis; caulinis sessilibus, acutis; bracteis ovato-lanceolatis*. Hall. Helv. n°. 681.

*Rapunculus orbicularis*. Miller. Dict. n°. 5. — Scop. Cat. 1. n°. 215. — Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 330. n°. 926. IV.

*Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari*. Motif. Oxon. Hist. 2. pag. 463. 5. 5. tab. 5. fig. 47. — C. Bauh. Pin. 92. — Tournef. Inst. R. Herb. 113.

*Rapunculus corniculatus, caruleus, minor*. Barrel. Icon. rar. 525.

*Rapunculus flore globofo, purpureo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 810. IC.

*Rapuntium montanum, rariis corniculatum*. Column. Ecphr. 1. pag. 222. tab. 224.

A. *Eadem, foliis caulinis, linearibus*. Lam. III. Gen. 1. c.

*Phyteuma (Charmellii), foliis radicalibus, cordatis, subdentatis; caulinis linearibus, integerrimis*. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 526. tab. 11. fig. 3.

*Phyteuma (orbicularis δ), foliis radicalibus, cordatis, dentatis; caulinis linearibus, integerrimis*. Willden. Spec. Plant. 1. c.

B. *Phyteuma (orbicularis ε), foliis omnibus oblongis, lanceolatis*. Willden. Spec. Plant. 1. c.

*Phyteuma lanceolata*. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 177. tab. 12. fig. 1.

Botanique. Tome VI.

*Rapunculus corniculatus, caruleus, montanus, minor*. Barrel. Icon. rar. 526.

Cette plante se reconnoît à ses épis globuleux, arrondis, particulièrement à ses feuilles oblongues, lancéolées, dentées en scie à leurs bords, ayant très-ordinairement les feuilles radicales plus larges, échanquées en cœur : elle est d'ailleurs sujette à plusieurs variétés remarquables, que quelques botanistes ont regardées comme autant d'espèces.

Ses tiges sont droites, simples, glabres, cylindriques, hautes de huit à dix pouces, dont les feuilles inférieures, particulièrement les radicales, sont longuement pétiolées, ovales, oblongues, obtuses, très-souvent échanquées en cœur à leur base, dentées ou plutôt crénelées à leurs bords, glabres à leurs deux faces : les supérieures, insensiblement plus étroites, sont lancéolées, téréciées à leur base, moins pétiolées, à dentelures souvent peu marquées; les dernières sont sessiles, amplexicaules, acuminées, redressées.

Les fleurs sont tassées en une tête terminale, arrondie ou orbiculaire, compacte, munie de bractées extérieures ovales, lancéolées, glabres, ou garnies à leurs bords de quelques cils rares. La corolle est d'un bleu vif, médiocrement courbée en arc avant son épanouissement.

Les feuilles caulinaires, dans la plante A, sont toutes linéaires, étroites, obovées, à peine dentelées, sessiles; les radicales en cœur à leur base : elles sont toutes oblongues, lancéolées dans la variété B.

Elles se rencontrent toutes dans les Alpes, en Suisse, en Italie, dans les départemens méridionaux de la France. ♀ (V. f.)

7. *RAPUNCULUS* à feuilles elliptiques. *Phyteuma elliptica*. Villars.

*Phyteuma capitulo subrotundo, foliis serratis, ciliatis, inferioribus oblongo ellipticis, longè petiolatis; supremis sessilibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 1587.

*Phyteuma elliptica*. Villars. Dauph. vol. 2. pag. 517. tab. 1. fig. 2.

*Phyteuma (orbicularis γ), foliis omnibus oblongo-ellipticis, obtusis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 922. n°. 6.

Quoique très-rapprochée du *phyteuma orbicularis*, cette plante néanmoins peut en être distinguée par la forme particulière de ses feuilles inférieures, oblongues, elliptiques, portées fur de très-longes pétioles.

Ses tiges sont simples, droites, striées, glabres, médiocrement élevées, garnies de feuilles assez nombreuses, éparées, rapprochées, étroites,

K

allongées, elliptiques, un peu crénelées & ciliées à leurs bords; les inférieures munies de pétioles comprimés, presque deux fois aussi longs que les feuilles; les supérieures sessiles & plus courtes. Les fleurs sont réunies en une tête médiocrement arrondie, environnée de quelques bractées courtes, aiguës, un peu échancrées en cœur à leur base. La corolle est bleueâtre.

Cette plante croît en Suisse & sur les montagnes alpines du ci-devant Dauphiné. (V. f.)

8. RAPONCULE à larges bractées. *Phyteuma comosif*. Linn.

*Phyteuma fasciculo terminali, sessili, bracteis cordatis involucreto; foliis dentatis, radicalibus subcordatis*. Lamarck. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 2590.

*Phyteuma fasciculo terminali, sessili; foliis dentatis, radicalibus cordatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 242. — Scop. Ann. 2. pag. 48. — Jacq. Austr. Append. tab. 50.

*Rapunculus comosif*. Mill. Dict. n°. 2. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 240. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 331. n°. 926. V.

*Trachelium minus, petraum pona*. Barrel. Ic. 889.

*Campanula sphaercephalus, pervenusta, foliorum ad aras insigniter denticulata*. Pluken. Almag. 77. tab. 152. fig. 6.

*Trachelium petraum, minus*. Pon. Bald. 336. tab. 336.

*Rapunculus alpinus, corniculatus*. C. Bauh. Pin. 113. Prodr. 31. tab. 33. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. tab. 5. fig. 49.

*Rapunculo comoso, spicato, aliquatenus affinis ex balao*. J. Bauh. Hist. 2. 811.

Cette plante, voisine du *phyteuma orbicularis*, est une espèce très-facile à distinguer par les amples & larges bractées placées sous les fleurs.

Ses racines sont charnues, jaunâtres extérieurement, fortes, partagées en plusieurs ramifications droites, médiocrement fibreuses; il s'en élève des tiges glabres, cylindriques, droites, simples, un peu brisées, hautes de huit à dix pouces, garnies de feuilles fermes, pétiolées, d'un vert noirâtre, à nervures fines, en réseau, fortement crénelées à leurs bords, lanceolées, obtuses, presque elliptiques, glabres à leurs deux faces; les inférieures, un peu échancrées en cœur; celles du haut, presque sessiles.

Les fleurs sont terminales, sessiles, plutôt rapprochées en faisceau que capitées, de couleur bleue, garnies en dessous de larges bractées en forme de feuilles, légèrement crénelées, glabres, acuminées, presque aussi longues que la corolle.

On en connoît une variété dont toutes les feuilles sont spatulées, obtuses.

Cette plante croît dans les Alpes, en Espagne & dans les environs de Grenoble, sur les hautes montagnes. (V. f.)

9. RAPONCULE à fleurs noirâtres. *Phyteuma nigra*. Willd.

*Phyteuma capitulo ovato, bracteis fetacis, foliis simpliciter dentatis, radicalibus cordatis, caulibus lanceolatis, amplexicaulibus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 922.

*Phyteuma (nigrum), foliis simpliciter serratis, radicalibus & inferioribus caulibus petiolatis, cordatis, summis amplexicaulibus, lanceolatis; spicae florenti ovali, fructificante, elongata; bracteis fetacis*. Smith. Bohem. 1. n°. 189.

*Phyteuma cordacea*. Vill. Dauph. vol. 2. pag. 517. tab. 11. fig. 12.

Cette espèce se distingue particulièrement à ses fleurs d'un pourpre foncé & noirâtre, accompagnées de bractées sétacées.

Ses tiges sont simples, droites, cylindriques, garnies de feuilles, dont les radicales & les caulinaires inférieures sont pétiolées, échancrées en cœur à leur base, à un simple rang de dentelures à leurs bords; les supérieures sessiles, amplexicaules, lanceolées. Les fleurs sont terminales, disposées en un épi ovale à l'époque de la floraison, mais qui s'allonge & devient cylindrique après la chute des fleurs: il est garni de bractées fines, sétacées. La plante décrite par M. Villars ressemble parfaitement à celle-ci, mais elle en diffère un peu par ses bractées & par la forme de ses épis.

Cette plante croît dans les prés & les bois en Bohême. (V.)

\* \* Fleurs éparfes & axillaires.

10. RAPONCULE amplexicaule. *Phyteuma amplexicaule*. Willd.

*Phyteuma foliis amplexicaulibus, cordatis, ovatis, duplicato-serratis; floribus sparsis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 925. n°. 15.

*Rapunculus orientalis, campanula pratensis folio*. Tournef. Corol. 4.

Cette plante ressemble, par la forme & la grandeur de la corolle, au *phyteuma spicata*; mais elle en diffère essentiellement par la disposition des fleurs.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, point rameuses, garnies, dans presque toute leur longueur, de feuilles alternes, amplexicaules, glabres, échancrées en cœur à leur base, munies à leurs

bords d'un double rang de petites dents inégales. Les fleurs sont écartées les unes des autres, situées à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules, au nombre de cinq environ; garnis de bractées ovales, lancéolées, finement denticulées en scie.

Cette plante croît dans le Levant.

11. RAPONCULE lancéolée. *Phyteuma lanceolata*. Willd.

*Phyteuma foliis linearilanceolatis, tenuissimè denticulatis, scabris; caule basi ramoso; ramis simplicibus, foliis; floribus sparsis, geminatis, sessilibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 924. n°. 13.

*Rapunculus orientalis, foliis angustis, dentatis*. Tournef. Corol. 4.

Ses tiges se divisent, dès leur base, en plusieurs rameaux très-simples, raboteux, filiformes, garnis jusque vers leur milieu de feuilles alternes, linéaires, lancéolées, rudes au toucher, finement denticulées à leurs bords. Les fleurs sont distichées le long des rameaux vers leur extrémité, distantes les unes des autres, éparées, sessiles, deux par deux à chaque point d'insertion.

Cette plante croît dans les plaines de l'Arménie, où elle a été recueillie par Tournefort.

12. RAPONCULE à tige roide. *Phyteuma rigidum*. Willd.

*Phyteuma foliis linearilanceolatis, obsolete denticulatis, glabrisculis; caule simplicissimo, foliis; floribus sparsis, pedunculis trifloris*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 925. n°. 14.

*Rapunculus orientalis, altissimus, folio glabro & rigido*. Tournef. Corol. 4.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *phyteuma lanceolata*; mais, outre qu'elle est plus élevée, elle est encore bien moins raboteuse, tant sur les tiges que sur les feuilles.

Ses tiges sont hautes, droites, roides, très-simples, garnies de feuilles alternes, glabres, fermes, linéaires, lancéolées, entières vues à l'œil nu; mais à la loupe on aperçoit à leurs bords de très-petites dents rares, écartées, obtuses. Les fleurs sont latérales, éparées, disposées le long des rameaux, vers leur partie supérieure, supportées ordinairement trois par trois sur un pédoncule commun, presque simple.

On rencontre cette plante dans le Levant.

13. RAPONCULE à feuilles de julienne. *Phyteuma lobelioides*. Willd.

*Phyteuma foliis linearilanceolatis, denticulatis, hispida; caule paniculato, floribus geminis, pedun-*

*culatis, sparsis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 924. n°. 12.

*Phyteuma (lobelioides), foliis linearilanceolatis, denticulatis; caule brachiato, paniculato*. Willd. Phytogr. 1. n°. 20. tab. 4. fig. 2.

*Rapunculus orientalis, hesperidis folio*. Tournef. Corol. 4.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *campanula virgata* (Labillardiere, Decas. Plant. Syr. 2. pag. 11. tab. 6.) que Lamarck a conservé parmi les campanules, Muller. Gener. n°. 2540, &c que Willdenow a cru devoir placer parmi les *phyteuma*, sous le nom de *phyteuma virgata*.

Cette espèce a des tiges divisées en rameaux paniculés, branchus, étalés, garnis de feuilles linéaires, lancéolées, hispides, denticulées à leurs bords; les dents inférieures plus longues. Les fleurs sont rangées deux par deux, latéralement, vers l'extrémité des rameaux; éparées, pédunculées. En conservant parmi les campanules la plante de Labillardiere, peut-être convient-il d'y rapporter également cette espèce.

Cette plante croît dans l'Arménie.

14. RAPONCULE à feuilles ailées. *Phyteuma pinnata*. Linn.

*Phyteuma floribus sparsis, foliis pinnatis*. Linn. Syst. veget. pag. 212. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 68. n°. 1591. — Roy. Lugd. Bat. 248.

*Phyteuma foliis pinnatis, floribus cymosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 925. n°. 16.

*Rapunculus creticus, seu pyramidalis altera*. Bauh. Pin. 93. — Tournef. Int. R. Herb. 113.

*Rapunculus creticus, petromarula*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 811. Icon. 812.

*Petromarula, rapunculus creticus*. Imperat. 663.

5. *Rapunculus creticus, petromarula, flore albo*. Tournef. Corol. 4.

Cette plante a beaucoup de rapports avec les *lobelia*, auxquels peut-être il conviendrait de la réunir si elle étoit mieux connue: elle est d'ailleurs très-remarquable par ses feuilles ailées.

Ses tiges sont glabres, striées, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles oblongues, lancéolées, obliques, dentées à la partie inférieure de leur contour, entières à leur partie supérieure; la foliole, impaire & terminale, est très-grande, ovale, un peu arrondie, incisée & dentée à ses bords, brusée à son sommet. Les fleurs sont les plus grandes de ce genre, éparées, alternes, mais dont l'ensemble forme, à l'extrémité des tiges, une sorte de corymbe en cime.

k j



Cette plante croit dans l'île de Crète : elle se trouve aussi dans le Levant. (*Descript. ex Willd.*)

15. RAPONCULE à feuilles deux fois ailées. *Phyteuma bipinnata*. Lourer.

*Phyteuma foliis bipinnatis, serratis; racemis terminalibus*. Lam. Illustr. Geogr. vol. 2. pag. 68. n°. 2598. — Lourer. Flor. cochinch. pag. 172.

On distingue aisément cette espèce à ses feuilles deux fois ailées, composées de folioles nombreuses, lisses, dentées en scie à leurs bords. Les fleurs sont blanches, disposées en grappes terminales. Le fruit consiste en une baie inférieure, en forme de poire, à trois loges, contenant des semences ombreuses.

Cette plante croit dans les environs de Canton. h?

16. RAPONCULE de la Cochinchine. *Phyteuma cochinchinensis*. Lourer.

*Phyteuma foliis bipinnatis, rugosis; pedunculis divaricatis, terminalibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 2. pag. 69. n°. 2593. — Lourer. Flor. cochinch. pag. 172.

Cette espèce, ainsi que le *phyteuma bipinnata*, avec lequel elle a de grands rapports, s'écarte des autres plantes de ce genre, non-seulement par la forme singulière de leurs feuilles, mais encore plus particulièrement par leurs fruits, qui sont des baies & non des capsules : celle-ci a les feuilles deux fois ailées, composées de folioles ridées. Les fleurs sont blanches, disposées en panicules terminales, dont les pédoncules ou les ramifications sont étalées & divergentes. Le fruit est une baie inférieure, arrondie, perforée, à une seule loge, contenant plusieurs semences.

Cette plante croit sur les montagnes de la Cochinchine. h?

#### RAPPORTS des plantes entr'elles.

Le rapport des plantes consiste à les rapprocher, à les comparer, afin de bien connoître dans celles qui ont le plus de ressemblance, par quels caractères elles diffèrent entr'elles, & quels sont leurs traits de ressemblance. Cette comparaison est la base de tout le travail du botaniste; c'est d'elle que doivent naître les principes de la science; c'est la seule voie qui puisse nous faire découvrir la méthode naturelle, s'il en existe une.

Mais ces recherches, quelque faciles qu'elles puissent paroître au premier aperçu, sont très-difficiles, très-minutieuses; elles exigent une grande habitude d'observer, un grand discernement, des détails très-déliés, une connoissance parfaite de toutes les parties d'une plante, depuis l'instant où elle commence à végéter, jusqu'à celui de la parfaite

maturité de ses semences. L'étude de son organisation intérieure n'est pas moins essentielle. L'on conçoit, d'après ce court exposé, combien nous sommes encore loin de la perfection, malgré les recherches constantes de la plupart des botanistes modernes.

Les premiers botanistes n'avoient eu aucune idée de ce travail : les anciens, parmi les modernes, ont commencé à l'entrevoir; mais s'attachant à rapprocher les plantes d'après la seule considération de leur port & de leurs parties les plus frappantes, telles que les feuilles, la disposition des fleurs, leur forme extérieure, ils nous ont très-souvent présenté un assemblage bizarre de plantes très-différentes, réunies sous la même dénomination générale, fondées sur la ressemblance de leurs feuilles ou de leur port : c'est ainsi, par exemple, qu'ils ont réuni à l'ortie commune (*urtica urens* & *dioica*), des *slachys*, des *laminum*, des *galeopsis*, &c.; au laurier (*laurus nobilis*), des *vikarum*, des *epilobium*, des *prunus*, des *rufus*, des *myrica*, &c.

Ces erreurs grossières sont peu à peu disparues, à mesure que l'on s'est livré plus particulièrement à l'étude des parties de la fructification; mais comme on s'est borné long-temps à la seule inspection de la forme de la corolle, à celle des fruits, à la nature de leur enveloppe ou de leur péricarpe, l'on étoit encore bien éloigné de saisir la marche & le secret de la nature. La connoissance des parties sexuelles, des étamines & des pistils a fait faire un grand pas; ces parties, réunies à l'examen du germe ou de l'embryon, à sa position, à la nature de la substance qui l'enveloppe, aux lobes ou cotylédons qui l'accompagnent, à son développement, toutes ces considérations & un grand nombre d'autres, telles que la position de l'ovaire supérieur ou inférieur au calice ou à la corolle, l'insertion des étamines, leur grandeur respective, leur nombre défini ou indéfini, le rapport des stigmates avec le nombre des loges du fruit, ont prouvé que des plantes qui paroissent souvent très-éloignées entr'elles par leur port extérieur, étoient très-rapprochées, & apparteñoient quelquefois à une même famille, tant par leur organisation que par la ressemblance des parties essentielles de leur fructification.

Il s'agissoit, dans l'étude des rapports, de connoître à quelles parties des plantes il convenoit de donner la préférence pour les rapprocher ou les éloigner, surtout lorsque, se réunissant par un certain nombre de caractères, elles s'écartoient par plusieurs autres : il falloit donc apprécier leur valeur. Il a été facile de reconnoître que les parties de la fructification devoient avoir la préférence; mais quelles étoient celles qui, parmi elles, devoient l'obtenir? C'est encore là où en est aujourd'hui la question, assez éclaircie cependant

pour ne plus laisser de difficultés. Parmi les diverses parties de la fleur, le calice & la corolle doivent le céder aux organes sexuels, & ceux-ci aux fruits, parmi lesquels le germe & ses cotylédons méritent une considération toute particulière : néanmoins les plantes qui se rapprochent par un plus grand nombre de parties, ou qui ont un plus grand nombre de caractères communs dans leur calice, leur corolle, leurs parties sexuelles, dans la disposition de leurs fleurs, la forme de leurs feuilles, forment essentiellement des familles tellement naturelles, qu'elles se trouvent encore réunies, même dans les méthodes & les divisions artificielles.

Pour connoître quelle importance on doit donner aux diverses parties de la fructification, & les caractères qu'ils peuvent fournir, il faut consulter les articles *cotylédons*, *monocotylédon*, *embryon*, *ovaire*, *étamines*,  *pistil*, *fruits*, *semences*, &c.

**RAPPROCHÉES** (Feuilles). *Folia approximata*. On désigne sous cette dénomination une situation particulière des feuilles lorsqu'elles naissent toutes si près les unes des autres, qu'elles ne laissent que de très-petits intervalles entre les points de leur insertion : telles sont plusieurs espèces de joubarbe, &c.

**RAPUTIER**. *Raputia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, dont la famille naturelle n'est pas encore bien connue, qui paroît avoir des rapports avec les *monniera* & les *pulices*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont opposés, les feuilles ternées, opposées, chargées de points transparents ; les fleurs sont axillaires, en épis, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice court, à cinq dents ; une corolle tubulée, courbée, le limbe presqu'à deux lèvres, à cinq divisions inégales ; cinq étamines, dont deux plus grandes, fertiles, munies de deux écailles à leur base ; un style, un stigmate épais, à trois lobes ; cinq capsules bivalves, réunies, monospermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, d'une seule pièce, à cinq dents presque rondes, courtes, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, courbée, divisée à son limbe en deux lèvres ; la supérieure à trois découpures, dont celle du milieu est plus longue ; l'inférieure bifide.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont velus, attachés au tube de la corolle, vers sa base, dont trois stériles, plus courts, sans anthères ; deux plus longs, fertiles, terminés par des anthères

oblongues, à deux loges ; chaque filament fertile, muni à sa base de deux écailles.

4°. Un ovaire supérieur, presque rond, à cinq côtes, supporté par un disque charnu, surmonté d'un style allongé, & terminé par un stigmate épais, à trois lobes.

Le fruit consiste en cinq capsules réunies, arrondies, anguleuses, bivalves, à une seule loge, s'ouvrant en dedans, & contenant chacune une semence ovale, aromatique.

#### E S P È C E.

1. **RAPUTIER aromatique**. *Raputia aromatica*.

*Raputia foliis ternatis, foliolis ovato-oblongis, pellucidis ; floribus spicatis, axillaribus*. (N.)

*Raputia aromatica*. Aublet. Guian. vol. 2. pag. 671. tab. 272. — Just. Gener. Plant. pag. 421. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 33. n°. 93. tab. 10.

*Seiuris aromatica*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 153. — Schreb. Gen. Plant. n°. 53.

C'est un arbrisseau dont le tronc s'élève à environ deux pieds de haut, sur deux ou trois pouces de diamètre, revêtu d'une écorce lisse, blanchâtre, aromatique : son bois est blanc. Le sommet se divise en branches droites & rameuses, garnies de feuilles opposées, pétioles, composées de trois folioles lisses, vertes, fermes, ovales, terminées par une longue pointe, & supportées par un pétiole ligneux : ces folioles sont criblées de petits points transparents.

Les fleurs naissent en épis sur les branches & aux aisselles des feuilles, rangées alternativement le long d'un pédoncule recourbé, convexe en dessous, canaliculé en dessus. Leur calice est glabre, vert, à cinq petites dents aiguës. La corolle est de couleur verdâtre, monopétale, irrégulière, divisée assez profondément en deux lèvres ; la supérieure plus longue, à trois lobes ; l'inférieure à deux lobes. Parmi les étamines, au nombre de cinq, trois n'ont que des filaments sans anthères, chargés à leur base de poils blanchâtres : les deux autres sont plus longues, fertiles, munies à leur base de deux petites écailles. L'ovaire est environné d'un disque charnu sur lequel il repose, surmonté d'un style long & courbé, terminé par un stigmate évasé & aplati. Le fruit est composé de cinq capsules rapprochées, minces, vertes, coriaces : chacune d'elles s'ouvre en deux valves, & contient dans une seule loge une amande verdâtre & aromatique.

Cet arbrisseau croît en Guiane, dans les forêts d'Orapu ; il fleurit & fructifie vers le milieu de l'été. *h* (Descript. ex Aubl.)

**RATEAU**. *Biferrula*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, irrégulières, poly-pétales, de la famille des légumineuses, qui a

des rapports avec les *astragalus*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, dont les feuilles ailées sont garnies de stipules, & les fleurs disposées en épis axillaires & terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Une gousse plane, oblongue, tronquée, finée & dentée à ses bords, à deux loges polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, droit, tubulé, divisé jusque vers sa moitié en cinq dents égales, subulées ; les deux supérieures plus écartées.

2°. Une corolle papilionacée, dont l'étendard est grand, ascendant, presque arrondi, réfléchi à ses côtés ; les ailes libres, ovales, oblongues, plus courtes que l'étendard ; la carène ascendante, obtuse, aussi longue que les ailes.

3°. Dix étamines diadelphiques, dont neuf réunies par leurs filaments, la dixième libre, renfermée dans la carène, & terminée par des anthères fort petites.

4°. Un ovaire oblong, comprimé, surmonté d'un style tubulé & ascendant, terminé par un stigmate simple.

Le fruit consiste en une gousse plane, linéaire, comprimée, tronquée, finée & dentée à ses bords, à deux loges séparées par une cloison opposée aux valves, contenant des semences comprimées, un peu convexes, petites, réniformes.

#### E S P È C E.

1. RATEAU à fleurs bleues. *Biserrula pectinatus*. Linn.

*Biserrula foliolis ovatis, apice emarginatis, floribus caeruleis.* (N.)

*Biserrula*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1073. — Hort. Cliffort. 361. — Giseck. Icon. Fascic. 1. tab. 17. — Gerard. Gall. Prov. 523. — Mill. Dict. — Allion. Flor. Pedem. n°. 1279. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 634. n°. 616. — Idem. Illustr. Gen. tab. 622. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 218. — Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 190.

*Pectinatus vulgaris*. Tournem. Inst. R. Herb. 417. tab. 234. — Shaw. Spec. n°. 469.

*Astragalus purpureus, annuus, peregrinus, filiquis utrinque serrata*. Robinson. Motif. Oxon. Hist. 2. pag. 107. §. 2. tab. 9. fig. 6.

*Securidaca peregrina*. Clus. Hist. 2. pag. 238. Ic. — Parkinson. Theat. 1089. Ic.

*Securidaca filiquis planis, utrinque dentatis*. C. Bauh. Pin. 349. — Gerard. Hist. 1284. Ic.

*Lunaria radiata*. Robinson. J. Bauh. Hist. 2. p. 348. Icon.

*Utriquè serrata*. Rivin. 2. tab. 107.

*Hedysarum congestis & utrinque lunatis filiquis*. Barrel. Icon. rar. tab. 1137.

Cette plante a des racines fibreuses, d'où s'élèvent des tiges nombreuses, couchées, divisées, presque dès leur base, en rameaux presque simples, longs d'environ un pied & plus, velus, garnis de feuilles alternes, pétiolées, médiocrement velues, composées de folioles par paires opposées, au nombre de quinze à vingt, petites, ovales, entières, échancrées à leur sommet, rétrécies à leur base, longues de trois à quatre lignes, munies, à la base des pétioles, de deux stipules membraneuses, ovales, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en épis oblongs ou capités, presque sessiles, à l'extrémité d'un pédoncule commun, velu, filiforme, une fois plus court que les feuilles. Leur calice est velu, cylindrique, terminé par cinq dents sétacées ; la corolle petite, d'un bleu tendre, deux ou trois fois plus longue que le calice. Le fruit est une gousse presque glabre, comprimée, tronquée à son sommet, divisée à ses bords en dents larges, égales, pointues. Les semences sont petites, légèrement bombées à une de leurs faces, orbiculaires, échancrées en rein.

Cette plante croît dans la Sicile, l'Espagne, l'Italie, & dans les départemens méridionaux de la France. Je l'ai également rencontrée dans le royaume d'Alger. ☉ (V. v.)

RATEGAL. *Mathiola*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *gustardia*, & comprend des arbres ou arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont amples, rides, opposées ; les fleurs axillaires, disposées en bouquets.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice entier à ses bords ; une corolle tubulée, dont le limbe est entier & finé ; cinq étamines ; un stigmate ; un ovule contenant une noix à six loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, supérieur, cylindrique, court, droit, très-entier.

2°. Une corolle monopétales, tubulée, très-longue, qui s'élargit en entonnoir à l'orifice du tube, & forme un limbe entier, un peu finé à ses bords.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont tubulés, plus courts que la corolle, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire globuleux & inférieur, surmonté d'un style filiforme, de la longueur de la corolle, & terminé par un stigmate épais & obtus.

Le fruit est un drupe globuleux, un peu comprimé à son sommet, ombiliqué, & couronné par le calice, contenant une noix à six loges & à six semences.

**Observations.** Il nous manque, pour les caractères de ce genre, une certitude que nous ne pouvons acquérir que par les observations des voyageurs qui auront occasion de rencontrer vivantes les plantes qui le composent. Ce que nous en savons jusqu'à présent rapproche tellement les *mathiola* des *guettarda*, que je regarde ces espèces comme devant appartenir au même genre. La principale différence consiste dans la corolle, dont le limbe est entier, & simplement finu ou frangé à ses bords dans les *mathiola*, tandis qu'il est divisé en cinq ou huit lobes obtus dans les *guettarda*, & que ses étamines varient de cinq à huit.

Jusqu' alors il n'a été fait mention que d'une seule espèce de *mathiola*.

## E S P È C E.

1. RATEGAL à feuilles tudes. *Mathiola scabra*.

*Mathiola folio aspero, subrotundo.* Plum. Gen. Amer. pag. 16. fig. 6. & Plum. Amer. tab. 173. fig. 2.

*Mathiola scabra.* Linn. Syst. veget. pag. 218.

*Rategal, arborindiana.* ? Zanon. Hist. 67. tab. 75.

C'est un arbre divisé en rameaux garnis de feuilles opposées, petiolées, ovales ou médiocrement arrondies, assez grandes, entières, tudes à leurs surfaces, munies à leur base de bractées caduques. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles, portées sur des pédoncules ramifiés, & formant une cime médiocrement garnie; la base des pédoncules pourvue d'une bractée dentée ou pinnée. Le calice est court, tubulé, tronqué à son sommet; il persiste en partie sur le fruit. La corolle a un tube long & grêle, qui s'élève en entonnoir à son orifice: les fruits sont des baies noirâtres.

Cette plante croît en Amérique. *h*

**Observations.** J'ai reçu de plusieurs voyageurs deux espèces sous le nom de *mathiola*, qui sont évidemment des *guettarda* par le caractère de leurs fleurs, mais qui ont tous les autres caractères des *mathiola*. J'en parlerai au mot *Guettarda*, dans le Supplément.

**RATONCULE.** *Myofurus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des renonculacées, qui a des rapports avec les *ranunculus*, & qui comprend des herbes indigènes à l'Europe, fort petites, à feuilles étroites, entières, dont les fleurs sont jaunes, fort petites, & les fruits disposés en un épi serré, terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles colorées, à demi-sagittées à leur base; cinq pétales tris-petits, tubulés à leur onglet; cinq étamines; des pistils nombreux.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq folioles colorées, caduques, à demi-lanceolées, obtuses, prolongées en queue à leur base.

2°. Une corolle composée de cinq pétales très-petits, plus courts que le calice, tubulés & filiformes à leurs onglets.

3°. Cinq (quelquefois six ou sept) étamines, dont les filaments sont de la longueur du calice, terminés par des anthères droites & oblongues.

4°. Un grand nombre d'ovaires insérés sur un réceptacle long & conique, sans styles, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en un grand nombre de petites capsules acuminées, non ouvertes, disposées par imbrication sur un réceptacle allongé en style, contenant des semences oblongues, acuminées.

## E S P È C E.

1. RATONCULE basse. *Myofurus minimus*.

*Myofurus foliis angustissimis, integris; caule nudo.* (N)

*Myofurus foliis integerrimis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 427. — Hort. Cliff. 117. — Flor. Suec. 161. 176. — Roy. Lugd. Bat. 492. — Hall. Helv. n°. 1159. — Pollich. Pal. n°. 324. — Gmel. Iter 2. pag. 198. tab. 31. — Roth. Germ. I. p. 141. II. 375. Flor. dan. tab. 456. — Kniph. Centur. 5. n°. 58. — Hoffm. Germ. 114. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 87. n°. 725. — Idem. Illustr. Gener. tab. 221. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 5. tab. 74 fig. 5.

*Holosteum affinis, cauda muris.* C. Bauh. Pln. 190.

*Ranunculus gramineo folio, flore caudato, seminibus in capitulum spicatum congestis.* Tourn. Inst. R. Herb. 293.

*Myofurus.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 512. Ic.

*Cauda muris.* Dod. Pempt. 112. 1. — Lobel. Ic. 440. — Idem. Observ. 241. — Dalech. Hist. vol. 2. pag. 1318. édit. lat.

Vulgairement queue de souris.

C'est une petite plante très-voisine des renonculacées par sa fructification, mais remarquable par la disposition de ses semences en une longue queue droite.

Ses racines sont fibreuses, courtes, menues; elles produisent des tiges nues, glabres, cylindriques, filiformes, hautes de deux à trois pouces au plus, garnies à leur base de feuilles radicales nombreuses, presque disposées en gazon, très-étroites, linéaires, simples, redressées, assez rapprochées de celles des graminées, plus courtes que les tiges: celles-ci se terminent par une seule fleur fort petite.

Le calice est composé de cinq folioles étroites, colorées, qu'on prendroit d'abord pour la corolle: celle-ci consiste en cinq pétales très-courts, tubulés en cornet. Les étamines, ordinairement au nombre de cinq, varient de quatre à vingt, disposées sur un seul rang. Du centre de chaque fleur s'élève un grand nombre d'ovaires très-ferrés, formant d'abord un petit cône aigu, un peu plus long que le calice: il s'allonge ensuite à mesure que la fructification se perfectionne, & acquiert quelquefois jusqu'à un pouce de long: il forme alors une queue droite & subulée, sur laquelle les femences sont rangées dans un ordre symétrique très-agréable, sans aucun intervalle.

Cette plante croît en Europe, sur les collines arides & dans les terrains secs & sablonneux. On la trouve aux environs de Paris, à Villers-Cotterêts, &c. ○ (V.v.)

**RAVENALA.** *Ravenala*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des bananiers, voisin des *Heliconia*, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les tiges, simples, sont terminées par des feuilles en éventail, & les fleurs en faisceaux opposés.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une spathe commune, multiflore; un involucre partiel à deux folioles; une corolle à quatre divisions; six étamines très-longues; un stigmate à six dents; une capsule à trois loges polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une spathe commune, à plusieurs fleurs, d'une seule pièce, ovale, lancéolée; une spathe partielle, bise.

Point de calice.

2°. Une corolle à quatre pétales alongés, étroits, aigus, creusés en gouttière, l'inférieur plus large, enveloppant les organes de la fructification.

3°. Six étamines, dont les filaments sont aussi longs que les pétales, un peu courbés supérieurement, supportant une anthere linéaire, très-longue, adnée au filament.

4°. Un ovaire inférieur, alongé, surmonté d'un

style de la longueur des étamines; terminé par un stigmate épais, diviné en trois dents bise. , conniventes.

Le fruit est une capsule épaisse, alongée, triangulaire, divisée intérieurement en trois loges polyspermes, s'ouvrant en trois valves à son sommet, contenant des semences ovales, noires, enveloppées chacune d'une pellicule d'un beau bleu de ciel.

Observations. Ce genre se distingue par ses capsules à trois loges polyspermes, de l'*Heliconia*, dont les capsules sont monospermes, & du bananier (*Musa*), en ce que celui-ci n'a qu'une capsule à une seule loge.

#### E S P È C E S.

1. **RAVENALA** de Madagascar. *Ravenala madagascariensis*. Sonnerat.

*Ravenala foliis ellipticis, petiolatis, flabellatis; spathis axillaribus, suboppositis.* (N.)

*Ravenala*. Sonnerat. Voyag. vol. 2. pag. 213. tab. 124. 126. — Lam. Illustr. Gener. tab. 122. — Juss. Gener. Plant. pag. 61.

*Vouffouisi*. Flacourt. Hist. de Madag. pag. 113. n°. 23.

Le ravenala s'élève fort haut sur un tronc droit, très-simple, semblable à celui des palmiers, marqué par les impressions circulaires des anciennes feuilles; d'un tissu filamenteux, terminé par un grand nombre de feuilles disposées en un bel éventail, assez semblables à celles du bananier, mais plus longues & plus épaisses, presque elliptiques, obrusées à leur sommet, un peu échancrées en cœur à leur base, supportées par des pétioles longs de deux pieds, élargis à leur base, très-rapprochés, presque opposés.

Les régimes qui portent les fleurs & les fruits, naissent dans l'aisselle des feuilles, & sont également disposés en éventail. La spathe commune est dure, fort épaisse à sa base, charnue, contenant dix à douze fleurs, chacune d'elles munie d'une spathe partielle, partagée en deux pièces longues, pointues, persillantes, enveloppant la fleur avant son épanouissement.

La corolle est blanche, divisée jusqu'à sa base en quatre segments ou en quatre pétales étroits, canaliculés, dont l'inférieur, plus épais que les autres, renferme les organes de la fécondation. Les filaments des étamines sont durs, coriaces, un peu épaissis à leur base, longs d'environ sept pouces: à deux pouces au dessus de leur base est une cannelure qui règne jusqu'au sommet, & qui contient la poussière fécondante. Le style est aussi long que la corolle & les étamines; il est ferme, anguleux, trié, épaissi vers le stigmate.

Cet arbre croît à Madagascar, dans les lieux marécageux. *Th. (V. f. in herb. Lam. & Juss. & Descript. ex Sonnerat.)*

Les Madagasses se servent de ses feuilles pour couvrir leurs maisons. On l'a transporté à l'île-de-France, où il a très-bien réussi. Flacourt en fait mention dans son *Histoire de Madagascar*, sous le nom de *vousoufi* : il dit que les Madagasses font de l'huile avec cette pellicule d'un beau bleu, qui enveloppe les semences, & que de celles-ci ils en font de la farine qu'ils mangent avec du lait.

**RAVENSARA.** *Agatophyllum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des Lauriers, qui comprend des arbres exotiques, à feuilles alternes, à fleurs paniculées, axillaires & terminales, dont les fruits sont très-aromatiques.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Des fleurs dioïques ; un calice entier, fort petit, tronqué au sommet ; six pétales velus intérieurement ; une noix drupacée, contenant une semence à six lobes inférieurement.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont dioïques. Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice inférieur, entier, fort petit, tronqué à son sommet.

2°. Une corolle à six pétales insérés sur le calice, courts, ovales, velus intérieurement.

3°. Douze étamines, dont les filamens sont courts, six insérés sur le calice ; six alternes, attachés à la base des pétales, terminés par des anthères arrondies.

4°. Point de pistil, quelquefois le rudiment d'un ovaire stérile.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs mâles.

2°. Des étamines stériles, quelquefois nulles.

3°. Un ovaire supérieur, fort petit, chargé d'un style très-court, terminé par un stigmate pubescent.

Le fruit est une noix drupacée, renfermée dans une coque dure, coriace, aromatique, ainsi que la pulpe ou le brou, renfermant une amande blanchâtre, divisée inférieurement en six lobes.

*Observations.* Sonnerat a regardé ce genre comme présentant des fleurs hermaphrodites ; mais les individus que M. Lamarck possédait dans son herbier, ont été reconnus par lui comme dioïques, & très-remarquables en ce que les fleurs mâles forment de petites panicules, tandis que les femelles sont solitaires.

*Botanique, Tome VI.*

#### E S P È C E.

1. *RAVENSARA aromatique.* *Agatophyllum aromaticum.* Sonnerat.

*Agatophyllum foliis ovatis, coriaceis, basi acutis ; floribus masculis paniculatis, femineis solitariis.* (N.)

*Agatophyllum.* Lam. Illustr. Gener. tab. 825. — Juss. Gener. Plant. 431.

*Ravensara aromatica.* Sonnerat. Voyag. vol. 2, pag. 226. tab. 127.

*Vouravendfara.* Flacourt. Hist. de Madag. p. 125. n°. 24.

*Evdia ravensara.* Gxtn. de Fruct. & Sem. 2. pag. 101. tab. 103. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 404.

C'est un arbre gros & touffu, dont la cime est pyramidale, comme celle du giosfier : son tronc est revêtu d'une écorce roussâtre & odorante ; son bois, dur, pesant, sans odeur, blanc & mêlé de quelques fibres rouillâtres ; les rameaux, garnis de feuilles périodées, simples, alternes, ovales, entières, un peu aiguës, plus souvent obtuses, rétrécies à leur base, fermes, coriaces, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, blanchâtres & un peu glauques en dessous, portées sur un périole court.

Les fleurs sont fort petites, les mâles disposées en petites panicules axillaires, terminales ; les fleurs femelles axillaires, solitaires. Les fruits sont arrondis, de la grosseur d'une forte cerise, contenant une amande d'une saveur acre, piquante, qui prend à la gorge, & qui est presque caustique. La coque, ainsi que le brou, est très-aromatique.

Le ravenfara, dit M. Céré, est un arbre à épicerie de Madagascar, dont la feuille & le fruit tiennent des quatre épices fines que nous connoissons. Il rapporte à l'âge de cinq ou six ans, & fleurit au commencement de janvier & février. Le fruit est dix mois à se former & à mûrir : les Madagasses le cueillent vraisemblablement à six ou sept mois, parce que peut-être ils le trouvent plus propre à ce point pour l'assainissement. L'amande du ravenfara, fraîchement cueillie, a une excellente & fine odeur aromatique, mais elle est d'une saveur amère, fort acre, très-piquante & mordicante, brûlant les papilles nerveuses & la gorge, enfin très-désagréable. Ces qualités n'ont pas dû plaire à ces peuples encore trop peu instruits pour soupçonner qu'elle pourroit être conservée quelque temps, ou, étant préparée, acquiescer tout un autre goût.

La manière de préparer les feuilles du ravenfara, pour les conserver avec tout leur arôme, est très-simple. On en fait des chapelets, & on les laisse à l'air pendant un mois, pour leur faire perdre

leur suc aqueux. Au bout de ce tems on les jette dans de l'eau bouillante , & on les y laisse quatre à cinq minutes : on les fait ensuite sécher au soleil ou à la cheminée ; ils ne se trouvent plus alors imprégnés que de leur huile , qui les conserve plusieurs années. Les procédés sont les mêmes pour la conservation des fruits.

Cette plante croît naturellement à l'île de Madagascar. Flacourt, dans son histoire de cette île, la nomme *voaravendfara*. Th. (V. f. in herb. Lam. D. script. ex Sonnerat.)

**RAUVOLFE.** *Rauwolfia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des apocinées, qui a des rapports avec les *ophioxylon*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont droites, les feuilles verticillées ou quaternées, les fleurs souvent terminales ou en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, à cinq dents ; une corolle infundibuliforme ; un drupe globuleux, à deux semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, fort petit, d'une seule pièce, divisé à son orifice en cinq dents.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est cylindrique, globuleux à sa base ; le limbe plane, à cinq découpures un peu arrondies, échanquées à leur sommet.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont plus courts que le tube de la corolle, terminés par des anthères simples, droites, aiguës.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style droit & court, terminé par un stigmate en forme de tête.

Le fruit est un drupe presque globuleux, sillonné à un de ses côtés, contenant une noix à deux loges, à deux semences ; quelquefois deux noix, à une seule loge chacune.

#### E S P È C E S.

1. *RAUVOLFE* blanchâtre. *Rauwolfia canescens*, Linn.

*Rauwolfia foliis quaternis, oblongo-obovatis, acuminatis, pubescentibus, floribus terminalibus axillari-busque.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1218. n°. 2. — Gärtn. de Frucl. & Sem. Centur. 3. tab. 51. fig. 4.

*Rauwolfia subpubescens.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 303.

*Rauwolfia hirsuta.* Jacq. Amer. 47. n°. 2.

*Rauwolfia fruticosa, foliis verticillatis, tenuissimè villosis.* Brown. Jam. 180.

*Rauwolfia tetraphylla, angustifolia.* Plum. Gen. 19. Icon. 236. fig. 2.

*Solanum fruticosa, foliis laurinis oblongis, integris, subius hirsutis.* Sloan. Jam. 173. Hist. 2. pag. 167. tab. 211. fig. 1. — Rai. Dendr. 75.

*Arbor lycophora jamaicensis, foliis minoribus.* Pluk. Phytogr. 266. fig. 2.

Cet arbrisseau, selon son lieu natal, varie singulièrement de grandeur, ayant depuis un pied jusqu'à sept & huit de haut ; les autres parties d'une grandeur proportionnée. Ses jeunes rameaux sont médiocrement velus, garnis de feuilles quaternées, ovales, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, entières à leur contour, rugueuses, velues, supportées par des pétioles cylindriques & velus.

Les fleurs sont fort petites, rougeâtres & sans odeur ; elles sont disposées en grappes sur des pédoncules communs, rameux, quaternés, terminaux. Leur calice est composé de cinq petites folioles lancéolées ; les découpures du limbe de la corolle sont presque carrées, un peu échanquées à leur sommet, à peine obliques. Les poils qui en garnissent l'orifice sont contus & sans ordre. Le fruit est un drupe presque à deux lobes, d'abord de couleur rouge, & qui devient ensuite presque noire ; il renferme deux noix rugueuses, planes d'un côté, convexes de l'autre, à deux loges, contenant un seul noyau, rarement deux.

Cette plante croît dans l'Amérique, dans les lieux secs & parmi les broussailles. Th. (V. f. in herb. Lam.)

2. *RAUVOLFE* tomenteuse. *Rauwolfia tomentosa*, Linn.

*Rauwolfia foliis quaternis, oblongis, utrinque attenuatis, tomentosis ; floribus terminalibus & axillaribus.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1218. n°. 4.

*Rauwolfia tomentosa.* Jacq. Amer. 48. — Oberv. 2. tab. 35. — Linn. Syst. veg. t. pag. 250.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles simples, épaisses, très-entières, lancéolées, aiguës, tomenteuses à leurs deux faces, mais bien plus fortement à leur face inférieure ; au nombre de quatre à chaque verticille, dont deux plus longues que les autres.

Les fleurs sont petites, inodores, disposées en grappes axillaires & terminales, sur un pédoncule commun. Leur calice est composé de cinq petites

folioles ovales; la corolle blanche, à cinq découpures ovales; le stigmate globuleux; le fruit de la grosseur d'un pois, rouge d'abord, noir lorsqu'il est mûr.

Cet arbrisseau croît en Amérique, dans les environs de Carthagène, sur les rochers, & même dans les vieux murs, parmi les pierres, où il est très-abondant. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

3. RAUVOLFE à feuilles luisantes. *Rauvolfia nitida*. Linn.

*Rauvolfia foliis quaternis, lanceolatis, acuminatis, glaberrimis, nitidis; floribus terminalibus.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1217. n°. 1. — Gartn. de Fruct. & Sem. Centur. 3. tab. 52. fig. 4. — Lam. illustr. Gener. tab. 172.

*Rauvolfia nitidissima*. Jacq. Amer. 47. n°. 1. — Miller. Dict. n°. 2. — Linn. Syst. veget. 150.

*Rauvolfia*. Hort. Cliffort. 75.

*Rauvolfia tetraphylla, latifolia*. Plum. Gén. 19. Icon. 236. fig. 1. An potius fig. 2?

C'est un arbrisseau d'environ douze pieds de haut, luisant dans toutes les parties, droit, contenant une liqueur blanche, laiteuse & glutineuse: il se divise en rameaux, dont les articulations sont garnies de trois ou quatre feuilles verticillées, pétiolées, très-entières, lancéolées, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, dont deux rapprochées, plus longues que les autres, d'environ cinq pouces de long, velues sur leur principale nervure.

Les fleurs sont blanches, petites, sans odeur, disposées, sur un pédoncule commun, en deux ou trois grappes terminales, longues d'un demi-pouce. Leur calice est divisé en cinq petites dents, droites, aiguës; la corolle tubulée, à cinq découpures planes, très-ouvertes. L'orifice est fermé par un double rang de pois connexes. Les fruits, d'abord jaunâtres, prennent ensuite une couleur d'un pourpre foncé; ils sont laiteux, & deux ou trois fois plus gros qu'un pois.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue, sur les montagnes boisées. *h* (*V. f.*)

4. RAUVOLFE à feuilles glabres. *Rauvolfia glabra*. Cavan.

*Rauvolfia foliis alternis, lanceolatis, glabris; cymis scorculatis, paucifloris, oppositifoliis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1218. n°. 2.

*Rauvolfia (glabra), caule fruticoso, ramoso; foliis omnibus oppositis, ovato-lanceolatis, glabris.* Cavan. Icon. 3. pag. 50. tab. 297.

Cette espèce est bien distincte par ses feuilles

alternes & ses grappes de fleurs très-courtes, peu garnies.

Ses tiges sont hautes de trois pieds, divisées en rameaux glabres, souples & plans, garnis de feuilles pétiolées, éparées, lancéolées, étroites, très-entières. Les fleurs sont réunies en petites grappes courtes, opposées aux feuilles. Le calice est court, à cinq dents fort petites; la corolle blanche; le tube globuleux, tant à sa base qu'à son sommet. Le limbe se divise en cinq découpures ovales, aiguës, très-entières. Les filaments sont très-courts, les anthères presque fagittées, l'ovaire globuleux. Le fruit est un drupe rétréci à sa base, un peu convexe, à une seule loge, contenant une noix ovale-oblongue.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. *h* (*Descript. ex Cavan.*)

5. RAUVOLFE striée. *Rauvolfia striata*.

*Rauvolfia foliis quaternis, ovato-sublanceolatis, nitidis, argute striatis; floribus corymbosis.* (N.)

*Ochroma*. Juss. Gener. Plant. pag. 144.

Vulgairement bois jaune de l'île-de-France.

C'est un joli arbrisseau, remarquable par ses feuilles luisantes, marquées de stries transverses, régulières & nombreuses.

Ses tiges sont jaunâtres, mais surtout le bois, divisées en rameaux opposés, & même quaternes vers l'extrémité des branches, garnis de feuilles au nombre de quatre, quelquefois trois à chaque verticille; ovales ou ovales oblongues, un peu acuminées à leur sommet, vertes & luisantes à leur face supérieure, d'un vert jaunâtre en dessous, marquées de nervures latérales, droites, très-rapprochées, parallèles, saillantes en dessus, formant en dessous des stries assez agréables & régulières, dont l'intervalle est rempli par un réseau très-fin. Ces stries sont moins sensibles quand les feuilles sont plus épaisses & plus coriaces: elles sont supportées par des pétioles longs d'un pouce & plus.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires & terminaux, dichotomes, formant, par leur réunion, des bouquets épais, en cime. La corolle est d'un blanc jaunâtre, tubulée, infundibuliforme, divisée en son limbe en cinq découpures ouvertes; un seul style, un stigmate épais, un drupe ovale, plus gros qu'une olive, contenant une noix à deux loges, & dans chacune de deux à trois semences planes, inégales, un peu membraneuses à leur sommet.

Cette plante croît à l'île-de-France, où elle a été recueillie par Commerson. *h* (*V. f. in herb. Lam. & Juss.*)

Les feuilles varient de longueur & d'épaisseur; elles ont de deux à cinq pouces: dans ce dernier



ces les nervures & les stries sont beaucoup plus écartées, moins sensibles sur les feuilles épaisses, à moins que ces individus n'appartiennent à une autre espèce; ce que ne m'ont point permis de soupçonner la disposition de leurs fleurs & la forme de leurs fruits.

6. RAUVOLFE FLEXUEUX. *Rauvolfia flexuosa*. Ruiz & Pav.

*Rauvolfia foliis oblongis obovatis, angustis; racemis flexuosis, paucifloris.* Ruiz & Pavon. Flor. peruv. vol. 2. pag. 26. tab. 152. fig. A.

Arbrisseau de dix à douze pieds, épineux, très-rameux, dont les tiges sont droites, cylindriques; les rameaux étalés, tétragones, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, opposées, ovales, oblongues, obtuses, très-entières, quelquefois échancrées, glabres, tides, luisantes en dessus, veinées & pubescentes en dessous: les épines sortent de l'aisselle des feuilles; elles sont droites, aiguës, écartées: en vieillissant elles deviennent rameuses, & supportent quelques feuilles.

Les fleurs sont petites, d'une odeur très-agréable, disposées en grappes courtes, dont le pédicule commun est très-flexueux; chaque fleur presque sessile, marie à son insertion d'une petite bractée aiguë. La corolle est d'un blanc jaunâtre; le limbe & l'orifice sont velus. Le fruit est un drupe d'un noir pourpre, de la grosseur d'un pois, contenant deux noix ovales, convexes extérieurement, à deux loges.

Cette plante croît au Pérou, parmi les buissons. *(Descript. ex Ruiz & Pav.)*

7. RAUVOLFE à grandes feuilles. *Rauvolfia macrophylla*.

*Rauvolfia foliis obovatis ovatis, emarginatis interrimis; racemis erectis, multifloris.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 26. tab. 152. fig. B.

Arbrisseau épineux, dont les tiges sont droites, cylindriques, très-rameuses, hautes de huit à dix pieds, divisées en rameaux tétragones, branchus, granuleux, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, obtuses, quelquefois légèrement échancrées à leur sommet, luisantes en dessus, pubescentes en dessous, ridées, coriaces, veinées, supportées par des pétioles très-courts & pubescents, de l'aisselle desquels sortent deux épines opposées, presque horizontales, qui deviennent souvent, en vieillissant, des rameaux chargés de feuilles & de fleurs.

Celles-ci sont axillaires, disposées en grappes simples, pédicellées. Leur calice est pubescent, à cinq faces; la corolle jaunâtre, une fois plus longue que le calice, velue à son orifice: les étamines varient de quatre à cinq. Le fruit est un drupe

noir, à deux loges, muni du calice persistant, considérablement augmenté.

On trouve cette plante au Pérou, sur les coteaux arides & sablonneux. *(Descript. ex Ruiz & Pav.)*

REAUMURE. *Reaumuria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des ficoides, qui a des rapports avec les *nitaria*, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont petites, fasciculées, assez semblables à celles des *salsola*; les fleurs solitaires, presque sessiles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions, environné d'un involucre à folioles linéaires; une corolle à cinq pétales; des étamines nombreuses; une capsule supérieure, à cinq loges, à cinq valves polyspermes.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, inférieur, divisé en cinq découpures ovales, aiguës, environné à sa base de plusieurs folioles linéaires, imbriquées.

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, égaux, sans onglets, un peu plus grands que le calice, recourbés à leur sommet, munis à leur base intérieure de deux appendices ciliés.

3°. Un grand nombre d'étamines, de la longueur du calice, dont les filaments font terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté de cinq styles droits, filiformes, rapprochés, de la longueur des étamines, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule à cinq faces, ovale, à cinq valves, à cinq loges, contenant des semences nombreuses, oblongues, foveuses.

E S P È C E S.

1. REAUMURE vermiculaire. *Reaumuria vermiculata*. Linn.

*Reaumuria foliis carnosiss, semiteretibus, subulatis; caule frutescente.* (N)

*Reaumuria foliis subulatis, semiteretibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1249. n°. 1.

*Reaumuria vermiculata.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 734. — Lamarck. Illustr. Gen. tab. 489. fig. 1. — Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 431.

*Reaumuria foliis carnosiss, planis, parvis, confertissimis.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. 101.

*Sedum siculum vermiculatum*, flore suavis alba, semine villosa. Boccon. Sicc. pag. 6. tab. 4. fig. G. — Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 481. §. 12. tab. 9. fig. 6.

*Sedum minus arborescens, vermiculatum*. Lobel. Icon. 380. — Idem. Observ. 266.

*Kali vermiculatum*, albo & amplo sed rosei flore. Barrel. Icon. Rar. 883.

*Kali arabicum primum genus*.? Rauwolf. Iter 37. tab. 37. — C. Bauh. Pin. 289.

*Vermicularis fruticosa minori*. Gerard. Hist. 323. Ic.

*Sedum minus fruticosum*. C. Bauh. Pin. 284.

C'est une plante d'environ un pied de haut, qui ressemble beaucoup par son port au *salsola fruticosa*, & dont les tiges sont presque ligneuses, droites, glabres, cylindriques, revêtues d'une écorce blanchâtre, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles très-approchantes de celles du *sedum reflexum*, glauques, charnues, éparées, nombreuses, à demi-cylindriques, planes à leur face supérieure, linéaires, subulées.

Les fleurs sont solitaires, situées le long des rameaux, soutenues par des pédicules très-courts, dont le sommet est garni, sous le calice, de folioles nombreuses, imbriquées. Le calice est profondément divisé en découpures ovales, aiguës, persistantes. La corolle est blanche, composée de cinq pétales obtus, elliptiques, un peu plus longs que le calice. Les étamines, au nombre de vingt à trente, sont insérées sur le réceptacle. Aux fleurs succède une capsule lisse, ovale, à cinq côtes, un peu plus longue que le calice, à cinq valves & à cinq loges, qui s'ouvrent du sommet à la base, & qui perdent les cloisons qui les séparent, d'où elles paroissent souvent n'avoir qu'une seule loge. Les semences qu'elles renferment sont six à huit, étroites, oblongues, couvertes de poils nombreux, foyeux, mous, assez longs, blancs ou roussâtres.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans les plaines sablonneuses, en Egypte, dans la Barbarie, la Syrie, & sur les côtes de la Sicile. (V. f.)

2. RÉAUMURE à feuilles de millepertuis. *Reaumuria hypericoides*.

*Reaumuria foliis planis, ovato-acutis; caule herbaceo*. (N.) — Lam. Illustr. Gen. tab. 489. fig. 2.

*Reaumuria* (hypericoïdes), foliis ellipticis, planis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1250. n°. 2.

*Hypericum* (alternifolium), floribus pentagynis calicibus foliaceis; caule herbaceo; foliis alternis, ovatis, acutis. Labillard. Plant. Syriac. Decaf. 2. pag. 17. tab. 10.

Cette espèce a l'aspect d'un *hypericum*: ses tiges sont droites, herbacées, glabres, cylindriques, divisées en rameaux axillaires, effilés, simples, érales; les feuilles des tiges sont planes, assez larges, glabres, ovales, aiguës, alternes, sessiles; les supérieures & celles des rameaux beaucoup plus étroites, linéaires, très-aiguës.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées le long des rameaux, médiocrement pédonculées, munies sous leur calice de folioles étroites, aiguës, nombreuses, imbriquées; les découpures du calice glabres, très-profondes, ovales, aiguës; les pétales presqu'en cœur, obtus à leur sommet; les étamines disposées sur un seul rang autour de l'ovaire; celui-ci est ovale, surmonté de cinq styles droits, terminés par autant de stigmates simples, subulés.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses & désertes de la Syrie, où elle a été découverte par M. Labillardière. 2.

RÉCEPTACLE. *Receptaculum*. C'est l'espèce de base sur laquelle reposent immédiatement la fleur & le fruit: c'est en général l'extrémité du pédoncule, & ordinairement le centre de la cavité du calice. On lui donne le nom de *placenta* lorsqu'il reçoit les vaisseaux ombilicaux, destinés à transmettre la nourriture aux femences.

On divise le réceptacle en propre & en commun.

Le RÉCEPTACLE propre (*receptaculum proprium*) est celui qui ne porte que les organes d'une fructification simple, c'est-à-dire, une seule fleur non composée, comme le réceptacle du lis, de la rose, du liseron, &c. Il y a deux sortes de réceptacles propres, savoir: le complet & l'incomplet.

Le RÉCEPTACLE complet (*receptaculum completum*) est celui qui porte d'abord la fleur & ensuite le fruit: tel est celui de l'œillet, de la prime-vère, de la giroflée, &c.

Le RÉCEPTACLE incomplet (*receptaculum incompletum*) est celui qui ne porte que le fruit, jamais la fleur, celle-ci s'insérant alors sur l'ovaire, comme dans la carotte, l'*epilobium*, &c. ou sur le calice, comme dans le poirier, la ronce, &c. ce qui fait que l'on distingue souvent le réceptacle du fruit, d'avec celui de la fleur.

Le fruit adhère immédiatement au réceptacle dans la plupart des plantes; mais dans quelques-unes la communication se fait à l'aide d'un pédoncule qui soutient le fruit d'une part, & de l'autre repose sur le réceptacle, comme dans le *passiflora*, le *caparis*, l'euphorbe, &c.

Le RÉCEPTACLE commun (*receptaculum commune*) est celui qui porte plusieurs petites fleurs, dont l'assemblage forme une fleur composée (voyez ce mot); dans ce cas il conserve le nom de réceptacle,

soit qu'il ait une figure plane, concave ou convexe, comme dans le *carduus*, le *leontodon*, le *chrysanthemum*; arrondie, comme dans l'*echinops*, le *spharanthus*; ou conique, comme dans le *disficus*, le *bellis*, &c.

Lorsqu'il forme une espèce d'axe ou de fîet on le nomme *chaton* (voyez ce mot). Il prend encore dans d'autres cas celui de *spodice* & de *rachis* (voyez ces mots).

La considération de la surface du réceptacle commun fournit plusieurs caractères avantageux pour distinguer la plupart des fleurs composées : c'est pourquoi on dit qu'il est :

— Nu (*nudum*) lorsqu'il n'est chargé d'aucune production particulière disposée entre les fleurs, & distincte de la corolle ou du calice : tel est le réceptacle du *leontodon* ou pissenlit, qui paroît, après la chute des graines, comme une tête entièrement chauve.

— Velu (*vilosum*, *pilosum*, *serotum*) lorsqu'il est chargé de poils plus ou moins flexibles, comme dans les chardons, les centaurees, les bleues, &c.

— Garni de paillettes ou lamelle (*poloecum*), lorsqu'il porte des paillettes ou des espèces de lames plus ou moins linéaires, très-aplaties & disposées entre les fleurs, comme dans la chicorée, l'*ochilla mollifolium*, &c.

— Alvéolé (*favosum*) lorsqu'il est chargé de rets alvéolaires, c'est-à-dire, de cellulis membraneux & tétragones, comme dans l'*onopordum*, &c.

**RECOMPOSÉES** (Feuilles). *Folia decomposita*. On donne ce nom aux feuilles lorsque, considérées relativement à leur degré de composition, elles sont en quelque sorte composées, c'est-à-dire, toutes les fois que leur pétiole, au lieu de porter des folioles de chaque côté, porte d'autres petits pétioles, d'où sortent à droite & à gauche des folioles particulières, comme dans un grand nombre d'*umbellifères*, la carotte, le persil, &c.

**RECOURBÉ** (Pétiole). *Petiolus recurvatus*. C'est le nom qu'on donne au pétiole, considéré relativement à sa direction. Son sommet est alors tourné vers la terre, & la feuille qu'il supporte, est pendante ou à peu près.

**REDOUL**. *Coriaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioïques ou polygames, dont la famille & les rapports ne sont pas encore bien déterminés, qui comprend des arbrisseaux, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les tiges sont quadrangulaires, les branches, les rameaux opposés, ainsi que les feuilles. Les fleurs sont en épis axillaires & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; un calice à cinq folioles; cinq pétales très-petits; dix onchères presque sessiles; cinq ovaires rapprochés; autant de styles & de stigmates; cinq capsules conniventes, monospermes, recouvertes par les pétioles agrandis.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont dioïques, quelquefois monoïques ou polygames.

\* Chaque fleur mâle offre :

1°. Un *calice* très-court, composé de cinq folioles concaves, presque ovales.

2°. Une *corolle* formée de cinq pétales très-petits, placés entre les ovaires. (M. Jussieu les regarde comme cinq corps glanduleux, appuyés sur le disque en dehors des étamines.)

3°. Dix *étamines* insérées sur le disque, dont les filaments sont extrêmement courts, terminés par des anthères droites, oblongues, séparées en deux loges à leur base.

\* Chaque fleur femelle offre :

1°. Un *calice* semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Une *corolle* à cinq pétales connivents, fort petits, comme dans les mâles.

3°. Dix *étamines* presque sessiles, dont les anthères sont stériles.

4°. Cinq *ovaires* comprimés, réunis, surmontés d'autant de styles longs, sétacés, & terminés par autant de stigmates simples.

Le fruit consiste en cinq capsules petites, conniventes, monospermes, recouvertes à leur côté extérieur par les cinq pétales persistants, agrandis & épaissis, qui donnent au fruit l'apparence d'une baie à sa moitié inférieure. Ces capsules ne s'ouvrent point, & renferment chacune une semence ténoforme.

#### E S P È C E S.

1. **REDOUL** à feuilles de myrte. *Coriaria myrtifolia*. Linn.

*Coriario foliis subpetiolatis, ovato-oblongis; floribus racemosis*. (N.)

*Coriaria foliis ovato-oblongis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1467. — Hort. Upf. 1799. — Sauvag. Monsp. 151. — Gouan. Monsp. 508, & Illustr. 83. — Miller. Dict. n°. 1. — Lamarck. Illustr. Gener. tab. 822. — Idem. Flor. fr. vol. 2. pag. 236. n°. 244. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 369. — Angl. Hort. tab. 20. fig. 1. — Gerard. Flor. gall. prov. pag. 341. — Medic. in Observ. Soc. œcon. Lutr. 1774. pag. 177.

*Coriaria*. Hort. Cliff. 462. — Roy. Lugd. Bat. 222.

*Coriaria hermaphrodita*. Turr. Farf. 13. (*Flus fenina*.)

*Rhus myrsifolia monspeliaca*. C. Bauh. Pin. 414. — Garid. Aix. pag. 403.

*Rhus pinii myrsifolia*. Lobel. Icon. p. 2. — 98. — Tabern. Icon. 1027. — Lob. Advers. pag. 413. Icon.

*Coriaria vulgaris*. Nissol. Académ. 1711. tab. 12. — Duhamel. Arbr. 1. pag. 180. tab. 73.

Arbrisseau assez agréable, qui s'élève à la hauteur de quatre à cinq pieds, dont les tiges sont glabres, cendrées, divisées en rameaux opposés, lâches, flexibles, les plus jeunes tétragones, garnis de feuilles opposées, sessiles, ou médiocrement pétiolées, entières, glabres, ovales, aiguës, vertes à leurs deux faces, marquées de trois nervures principales dans leur longueur: ces feuilles sont beaucoup plus petites sur les petites branches latérales & florifères.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des jeunes rameaux qu'elles terminent en forme de grappes simples, garnies de petites bractées linéaires, tubulées à la base de chaque pédoncule. Ces pédoncules sont simples, un peu plus longs que les bractées. Le calice est d'un vert tendre, ainsi que la corolle, qui se convertit en une sorte de baie à cinq capsules distinctes, noires, mais réunies à leur base & à leur côté intérieur. Les fleurs sont ordinairement dioïques, mais elles varient, & on en observe quelquefois de monoïques ou de polygames.

Cette plante croit dans les départemens méridionaux de la France. On la rencontre aussi dans la Barbarie, sur les montagnes de l'Atlas. *h* (*V. v.*)

Toutes les parties de cette plante sont très-astringentes: on peut s'en servir utilement pour ranner les cuirs; les teinturiers l'ont souvent employée pour teindre en noir.

2. REDOUL à feuilles de fragon. *Coriaria ruscifolia*. Linn.

*Coriaria foliis cordato-ovatis, sessilibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 270. n°. 2.

*Coriaria ruscifolia*, vulgèrè deu. Feuill. Pérou. vol. 3. pag. 17. tab. 12.

Cette espèce, qui a de grands rapports avec la précédente, s'en distingue par ses feuilles, bien plus grandes, ovales, en cœur, sessiles & presque amplexicaules.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur de vingt à vinger-cinq pieds, & dont le tronc est de la grosseur d'un homme, rameux dès la partie inférieure, garni de feuilles opposées & même ternées sur

les jeunes rameaux, d'un pouce & demi de longueur, sur un de largeur, presque amplexicaules, ovales, en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, d'un vert gai à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis latéraux, axillaires, simples, pendans, longs de quatre à cinq pouces. Chaque fleur est fort petite, péliculée, semblable à celles de l'espèce précédente.

On trouve cette plante au Chili. Les habitants s'en servent pour teindre en noir. *h* (*Descript. ex Feuill.*)

3. REDOUL à petites feuilles. *Coriaria microphylla*.

*Coriaria foliis minimis, ovatis, obtusis, subsessilibus; floribus spicatis, lateralibus*. (N.)

Cet arbrisseau a des tiges (ou branches) quadrangulaires, divisées en rameaux nombreux, très-rapprochés, filiformes, souples, courts, garnis d'un grand nombre de feuilles opposées, longues à peine de quatre à cinq lignes, larges de trois, ovales, très-obtuses, fermes, entières, presque sessiles, un peu échanquées à leur base, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, marquées de trois nervures.

Les fleurs sont disposées sur des épis simples, latéraux, portées chacune sur de petits pédoncules épars, filiformes, munis à leur base d'une petite bractée aiguë.

Cette plante a été recueillie au Pérou par M. Jof. Jusseu. *h* (*V. f. in herb. Jusseu.*)

\* Espèce moins connue.

*Coriaria (armentosa), foliis cordato-ovatis, subpetiolatis; caule procumbente diffuso*. Forst. Flor. austr. pag. 71.

REDRESSÉ (Pérole). *Petiolus erectus*. On dit que le pétiole est redressé lorsqu'il a son sommet tourné vers le ciel, & qu'il forme, avec la tige, un angle plus ou moins aigu.

REDUTTA. *Redutea*. Genre de plantes dicotylédones, monadelphiques, de la famille des malvacées, qui a des rapports avec les *hybiscus*, les *gossypium*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, stipulacées, à fleurs solitaires, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice double, persistant; l'extérieur à plusieurs folioles; l'intérieur à cinq divisions; les filamens monadelphiques, libres & rameux à leur partie supérieure; trois stigmates; une capsule polysperme, à trois loges, à trois valves, trois placentas.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double, inférieur, persistant; l'extérieur composé de plusieurs folioles très-petites; l'intérieur un peu plus grand, d'une seule pièce, à cinq divisions.

2°. Une corolle à cinq pétales arrondis, onguiculés, insérés à la base du tube des étamines.

3°. Des étamines monadelphiques, en nombre indéfini; les filaments réunis en tube à leur partie inférieure, libres à leur partie supérieure, rameux ou réunis de trois à cinq ensemble, épars sur toute la surface du tube, supportant des anthères réniformes.

4°. Un ovaire simple, supérieur, surmonté d'un style renfermé dans le tube des étamines, épaissi à sa partie supérieure, terminé par trois stigmates.

Le fruit est une capsule à trois loges, à trois valves, séparées par des cloisons membraneuses, adhérentes au milieu des valves; contenant, dans chaque loge, six ou huit semences ovales, aiguës à leur base, enveloppées par un duvet floconneux.

On distingue trois *placentas* fixés au fond de la capsule, alternes avec ses valves, droits & linéaires, supportant les semences à leurs côtés.

*Observations.* Ce genre se distingue des *hyssifera* par son stigmate à trois divisions & par ses capsules à trois loges; des *gossypium*, par son calice extérieur, à plusieurs folioles; du *sagosa* Juss., par le nombre & la disposition des étamines, par ses trois stigmates, par son fruit polyépisperme & par ses semences laineuses; enfin de toutes les malvacées connues, par ses trois placentas alternes avec les valves.

M. Ventenat, l'auteur de ce genre, l'a dédié à M. Redouté, artiste très-distingué, & un de ceux qui ont le plus contribué à la perfection des divers ouvrages qui ont paru en France sur la botanique.

## E S P È C E.

1. REDUTEA hétérophylle. *Redutea heterophylla*. Ventenat. Jard. de Cels. pag. 11. tab. 11.

*Redutea foliis ovatis seu trilobatis, floribus solitariis, axillaribus.* (N.)

C'est une plante herbacée, annuelle, parsemée dans tous ses parties de petites écailles frangées & blanchâtres, qu'on aperçoit facilement avec la loupe.

Ses racines sont pivotantes, garnies de quelques fibres, revêtues d'une écorce jaunâtre, très-mince: il s'en élève une tige droite, fongueuse,

anguleuse, glabre, rameuse, d'un vert foncé, haute d'environ un pied & demi, garnie de feuilles alternes, presque droites, pétiolées, ovales ou trilobées, bordées de quelques cils peu apparents, d'un vert foncé en dessus, plus pâles à leur face inférieure, supportées par des pétioles coulés & comme articulés à leur insertion avec les feuilles, munis à leur base de deux stipules latérales, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont axillaires & terminales, solitaires, d'un beau jaune soufre, tachées & rayées intérieurement à leur base d'un violet pourpre, supportées par des pédoncules dilatés à leur sommet, triangulaires, munis sur chaque angle d'une glande concave. Les pétales sont arrondis, un peu ondulés sur leur bord supérieur, rétrécis à leur base en un onglet très-court: les étamines d'un violet pourpre; un style terminé par trois stigmates; une capsule à trois loges, contenant chacune plusieurs semences ovales, revêtues d'un duvet pubescent.

Cette plante a été découverte à l'île Saint-Thomas par M. Riedle: elle est cultivée dans le jardin de M. Cels. ☉ (*Descript. ex Venten.*)

La beauté de ses fleurs, l'élégance de son feuillage, lui méritent une place distinguée parmi les plantes qui ornent nos parterres.

REFLÉCHIS (Rameux). *Rami reflexi, inflexi*. Considérés relativement à leur direction, les rameaux sont réfléchis lorsqu'étant pendans, leur extrémité se recourbe vers la tige.

Les feuilles portent le même nom (*folia reflexa*) lorsqu'étant redressées ou ouvertes dans leur partie inférieure, elles se replient de manière que leur sommet devient horizontal, ou même se rabat vers la terre. Les stipules reçoivent également la même dénomination lorsqu'elles se trouvent dans la même position (*stipula reflexa*).

RÉGLISSE. *Glycyrrhiza*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *galega*, & qui comprend des herbes ou arbrisseaux, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ailes, munies de stipules séparées des pétioles, & dont les fleurs sont disposées en épis ou en tête, les gouffes glabres ou hispides.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à deux lèvres; la supérieure à quatre divisions inégales; l'inférieure simple, linéaire; une gouffe ovale, comprimée.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°.

1°. Un *calice* persistant, d'une seule pièce, tubulé, à deux lèvres, l'*supérieure*, à quatre divisions inégales; les deux latérales, linéaires; les deux autres moins profondes; la *levre inférieure*, simple, linéaire.

2°. Une *corolle* polypétale, papilionacée, dont l'*étendard* est droit, ovale, lancéolé; les ailes oblongues, semblables à la carène, mais plus courtes; la *carène* composée de deux pétales aigus, &c dont l'onglet est aussi long que le calice.

3°. D'*x étamines* diadelphiques, neuf réunies par leurs filaments, une simple; droites, terminées par des anthères simples, arrondies.

4°. Un *ovaire* plus court que le calice, surmonté d'un style subulé, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus, ascendant.

Le fruit est une gousse ovale ou oblongue, comprimée, aiguë, à une seule loge, ne contenant ordinairement que très-peu de semences, de trois à six, réniformes.

## E S P È C E S.

1. RÉGLISSE glabre. *Glycyrrhiza glabra*. Linn.

*Glycyrrhiza leguminibus glabris, floribus racemosis, stipulis nullis; foliis ovatis, subretusis, subius subglutinosus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1144. n°. 4.

*Glycyrrhiza leguminibus glabris, stipulis nullis; foliolo impari, petiolato*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1046. — Hort. Cliff. 490. — Mater. medic. 173. — Roy. Lugd. Bar. 386. — Sauvag. Monsp. 252. — Miller. Dict. n°. 1. — Gmel. Iter. 1. pag. 155. — Ludw. Ed. tab. 64. — Kniph. Cent. 4. n°. 29. — Regn. Boron. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 654. n°. 625. — Idem. Illustr. Gener. tab. 625. n°. 2.

*Glycyrrhiza glabra & germanica, radice repente*. Tournef. Inst. R. Herb. 389.

*Glycyrrhiza filiquosa & germanica*. C. Bauh. Pin. 352.

*Glycyrrhiza levis*. Pallas, It. 1. Append. n°. 120.

*Glycyrrhiza vulgaris*. Dodon. Pempt. 341. Ic.

*Glycyrrhiza filiquosa*. Lobel. Icon. 2. pag. 86. — Idem. Obsef. pag. 529. Icon.

*Glycyrrhiza radice repente, vulgaris, germanica*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 328. Icon.

La RÉGLISSE ordinaire.

Cette plante a des racines rampantes, très-étendues, jaunâtres en dedans, d'une saveur sucrée: il s'en élève des tiges hautes de trois ou quatre pieds, très-rameuses, garnies de feuilles glabres, ailées, avec une impaire; pétioles, composées

Botanique. Tome VI.

de folioles légèrement pétioles, opposées, ovales, très-entières, un peu glumineuses à leur face inférieure, lisses en dessus, au nombre de treize à quinze; privées de stipules.

Les fleurs sont petites, rougeâtres ou purpurines, disposées latéralement en épis grêles, un peu lâches, pédonculés, axillaires. Les gouffes sont glabres, oblongues, comprimées, aiguës; elles contiennent trois ou quatre semences au plus. On distingue cette espèce à l'absence des stipules & à ses fruits glabres, oblongs.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, en Espagne, en Italie, &c. x (V. v.)

Chacun connoît l'usage des racines de cette plante, qui passent pour adoucissantes, pectorales, diurétiques. Elles servent à édulcorer les tisanes amères: on les emploie contre la toux, l'asthme, les douleurs néphrétiques; elles calment la soif lorsqu'on les mâche; elles fournissent un extrait d'un brun noirâtre, qu'on emploie aux mêmes usages, particulièrement pour la toux. Il est connu sous le nom de *suc de réglisse*. On le prépare surtout en Espagne, sous la forme de bâtons cylindriques, enveloppés de feuilles de laurier. On en fait aussi des pâtilles aromatisées avec de l'essence d'anis, &c.

2. RÉGLISSE à tiges rudes. *Glycyrrhiza asperma*.

*Glycyrrhiza leguminibus glabris, moniliformibus; racemo terminali; stipulis lanceolatis; foliis ovatis, emarginatis, subius cauleque scabris*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1144. n°. 5.

*Glycyrrhiza (asperma), leguminibus glabris, foliis ellipticis, cuspidatis; caule hispido, scabro*. Linn. f. Suppl. pag. 350.

*Glycyrrhiza aspera*. Pallas, Iter, vol. 1. Append. n°. 131. tab. M. fig. 3.

*Glycyrrhiza hispida*. Pallas, Iter, vol. 3. Append. n°. 127. tab. G. 9. fig. 1. 2.

Ses racines sont très-longues, lisses, douces, rameuses: il s'en élève des tiges glabres dans leur jeunesse, mais hérissées de poils rudes dans leur jeunesse; garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, composées de folioles ovales, échanquées en cœur à leur sommet, rudes, velues à leur face inférieure, particulièrement le long de la nervure du milieu & à leurs bords. Les stipules sont lancéolées.

Les fleurs sont d'une couleur pâle-violette, disposées en grappes terminales; elles produisent des gouffes glabres, contenant trois à quatre semences saillantes, qui rendent les gouffes presque articulées extérieurement.

M

Cette plante croît en Sibérie, dans les environs du Volga, sur les collines sablonneuses. ♀

3. RÉGLISSE hérissée. *Glycyrrhiza echinata*. Linn.

*Glycyrrhiza leguminibus echinatis, floribus capitatis, stipulis lanceolatis; foliis glabris, oblongis, mucronatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1143. n°. 1.

*Glycyrrhiza leguminibus echinatis, foliis stipulatis; folio impari, sessili*. Linn. Syst. veget. p. 669. — Royen. Lugd. Bat. 386. — Hort. Upf. 230. — Miller. Dict. n°. 2. — Jacq. Kniph. tab. 95. — Pall. Iter. Append. n°. 118. — Kniph. Cent. 5. n°. 37. — Griseb. de Fruct. & Sem. Centur. 9. tab. 148. fig. 6.

*Dulcis radix*. Camer. Epitom. 423.

*Glycyrrhiza capite echinato*. C. Bauh. Pin. 352. — Tournef. Inlt. R. Herb. 389.

*Glycyrrhiza Diofcoridis, echinata, non repens*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 327. lc.

*Glycyrrhiza echinata Diofcoridis*. Lobel. Icon. 2. pag. 85. — Idem. Observ. 528. lc.

*Glycyrrhiza vera Diofcoridis*. Dodon. Pempt. 341. lc.

*Glycyrrhiza echinata Dodonai*. Dalech. Hist. 2. pag. 247. lc.

*Glycyrrhiza femineibus echinatis, in capitulum congestis*. Morit. Oxon. Hist. 2. 5. 2. tab. 11. fig. 13.

Cette plante se distingue aisément de ses congénères par ses gouffes armées de pointes roides, presque épineuses; par les folioles terminées par une petite pointe particulière, & par la foliole terminale, sessile.

Ses racines sont grosses, pivotantes, peu rameuses: il s'en élève des tiges hautes de quatre à six pieds, rameuses, striées, presque anguleuses, dures, glabres, de couleur verte, garnies de feuilles ailées, alternes, composées de folioles opposées, sessiles, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures latérales, simples, parallèles, ovales, oblongues, acuminées à leurs deux extrémités, au nombre de neuf à onze au plus; munies de stipules étroites, lancéolées, aiguës; le pétiole commun un peu ailé à ses bords, ayant une nervure saillante dans son milieu.

Les fleurs sont portées sur des pédoncules courts, latéraux, épais, durs, à l'extrémité desquels elles sont sessiles, réunies en une tête épaisse; les gouffes ovales, comprimées, surtout à leur partie supérieure; mucronées, hérissées de pointes épineuses, contenant une à deux semences convexes, orbiculaires, à peine échancrées en rein, glabres & rouffâtres.

Cette plante croît dans le Levant, la Tartarie; dans quelques contrées de l'Italie, &c. On la cultive au Jardin du Muséum d'histoire naturelle de Paris. ♀ (V. v.)

Ses racines possèdent, mais à un degré très-inférieur, les mêmes propriétés que la réglisse ordinaire.

4. RÉGLISSE fétide. *Glycyrrhiza fetida*. Desfont.

*Glycyrrhiza floribus capitatis; leguminibus ovalibus, mucronatis, echinatis*. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 170. tab. 199.

*Glycyrrhiza leguminibus echinatis, floribus racemosis, stipulis lanceolatis; foliis oblongis, mucronatis, subius lepidotis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1143. n°. 2.

Cette plante est remarquable par l'odeur forte & désagréable qu'elle exhale de toutes les parties.

Ses racines sont rameuses & rampantes: il s'en élève des tiges droites, striées, hautes de deux à trois pieds, rameuses, garnies de feuilles ailées avec une impaire, composées de neuf à onze folioles presque opposées, les inférieures en cœur renversé; les supérieures ovales, lancéolées, mucronées, couvertes en dessous de points ou de petits lames cendrées; longues de sept à huit lignes, larges de quatre à cinq, munies à la base des pétioles de deux stipules opposées, subulées & caduques.

Les fleurs sont disposées en épis latéraux, axillaires, simples, au moins aussi longs que les feuilles; très-fertiles & sessiles sur le pédoncule commun. Le calice est divisé en cinq dents aiguës; la corolle d'un jaune pâle; l'étendard étroit, obtus, plus court que la carène & les ailes; les gouffes comprimées, ovales, oblongues, hérissées de poils roides, terminées par le style persistant & subulé, contenant deux ou trois semences.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans le mont Atlas & dans les campagnes aux environs de Marane, où elle fleurit au commencement du printemps. ♀ (V. f. in herb. Desfont.)

5. RÉGLISSE glanduleuse. *Glycyrrhiza glandulifera*. Willd.

*Glycyrrhiza leguminibus glandulosis, echinatis; floribus racemosis; stipulis marcescentibus; foliis oblongis lanceolatis, emarginatis, subius glanduloso-pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1144. n°. 3.

*Glycyrrhiza (glandulifera), leguminibus echinatis; foliis glanduliferis; folio impari, petiolato*. Walldt. & Kraib. Plant. rar. Hung. vol. 1. pag. 20. tab. 21.

On distingue cette espèce aux poils glanduleux

dont les feuilles ainsi que les fruits sont couverts à leur surface.

Ses tiges se divisent en rameaux garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de folioles oblongues, lancéolées, échancrées à leur sommet, glabres en dessus, médiocrement pubescentes, glaucesques, & luisantes à leur face inférieure; munies à la base de leurs pétioles, de stipules sèches, fort petites. Les fleurs sont de couleur violette, disposées en grappes: il leur succède des gouffes oblongues, hérissées de poils très-courts, épars, terminés par une petite glande globuleuse.

Cette plante croit dans la Hongrie. ✕

6. REGLESSE velue. *Glycyrrhiza hirsuta*. Linn.

*Glycyrrhiza leguminibus hirsuta, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus racemosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1145. n°. 6.

*Glycyrrhiza leguminibus hirsuta; foliolo impari, petiolato*. Linn. Syst. veg. p. 669. — Roy. Lugd. Bat. 386. — Mill. Dict. n°. 3. — Pallas, Iter, vol. 1. Append. n°. 119. — Iter, vol. 2. pag. 461. — Gmel. Iter t. pag. 155.

*Glycyrrhiza orientalis, siliquis hirsutissimis*. Tourn. coroll. 26.

Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, glabres, rameuses, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de folioles ovales, oblongues ou lancéolées, glabres à leurs deux faces; la foliole impaire, pétiolée, aiguë. Les fleurs sont axillaires, disposées en grappes; elles produisent des gouffes oblongues, velues.

Cette plante croit dans le Levant. ✕

RÈGNE VÉGÉTAL. C'est une expression poétique, qui donne en deux mots l'idée de ces brillantes productions de la Nature, comprises sous le nom de plantes, considérées ici comme formant une division particulière, séparée des animaux & des minéraux, qu'on a également distribués en deux autres règnes.

Linné, enchanteré sur cette première idée, a établi l'empire de Flore, l'a divisé en tribus, a fixé l'état & le rang des individus qui les composent.

La première tribu est formée par les plantes monocotylédones. Elle renferme les palmiers, les graminées, les liliacées.

La seconde, par les dicotylédones. Elle se compose des herbes & des arbres.

La troisième, par les acotylédones. Elle comprend les fougères, les mousses, les algues & les champignons.

Les palmiers sont les princes de ce bel empire; ils habitent les plus riches contrées du globe, celles où le soleil brille avec le plus d'éclat, les magnifiques & riantes provinces de l'Inde. Ils s'élèvent avec majesté sur une grande & belle colonne lisse, cylindrique, couronnée d'une touffe de feuilles toujours vertes, d'entre lesquelles pendent de longues grappes de fruits délicieux. Ils sont tributaires des grands animaux, & surtout de l'homme, qui en est le chef.

Les graminées sont des plébéiens très-nombreux, répandus partout, robustes, peu délicats, d'un extérieur simple, existant particulièrement dans les campagnes; qu'on écale, qu'on foule aux pieds impunément, qui n'en deviennent que plus nombreux. Négligés & méprisés quoiqu'ils soient la force & le soutien de cet empire, le soin de leur conservation coûte peu, & cependant ils paient de forts tributs à tous les animaux granivores; ils nourrissent l'homme.

Les lys sont les patriciens; ils en imposent par la vivacité & le luxe de leurs couleurs, brillent par l'élégance de leurs formes, & sont un des plus beaux ornemens de l'empire de Flore.

Les herbes forment l'ordre de la noblesse. Ornement des prairies, elles s'y montrent sous toutes les formes, attirent les regards par leurs couleurs variées, récréent l'odorat par leurs parfums, & flattent le palais par leur saveur.

Les arbres constituent l'ordre des grands. Ils composent les forêts, ces vastes & beaux jardins de la Nature: leur fouche antique se divise en un grand nombre de rameaux; leur cime élevée se perd dans les nues, arrête l'impétuosité des vents, protège de son ombre les plantes délicates, répand sur elles une rosée bienfaisante, & fournit une retraite aux musiciens ailés des forêts. De la surabondance de leurs sucres ils nourrissent les plantes parasites; d'autres ne les quittent point, & sont leurs esclaves ou composent leur cour.

Parmi eux les arbrisseaux épineux sont autant de soldats armés pour écarter les attaques des quadrupèdes.

Les fougères, habitants nouveaux, à peine connus, sans éclat, vivant dans l'obscurité à l'ombre des bois, préparant pour leur postérité une terre fertile.

Les mousses, esclaves destinés au service des autres plantes. Elles occupent les lieux que celles-ci ont abandonnés, en recouvrant les rochers.



& les racines, les garantissent des rigueurs de l'hiver, détendent les jeunes pouttes des ardeurs de l'été. Elles font très-vivaces : plus vigoureuses dans les temps froids & humides, elles forment & augmentent la terre végétale, la disposent à recevoir les autres plantes.

Les *algues*, inférieures aux mousses, n'existant que par l'humidité, mal-propres, sans éclat, presque nues, jettent les premiers fondemens de la terre végétale.

Les *champignons*, nomades barbares, fâles, nus, putrides, voraces, s'attachant à la substance des autres plantes qu'ils détruisent, vivant de leurs débris infects, ne se montrant qu'après la saison des fleurs.

On reconnoît, dans cette belle allégorie qu'il faut lire dans l'ouvrage de Linné, la brillante imagination de cet auteur célèbre, dont le style est d'ailleurs si fertile lorsqu'il s'agit de descriptions rigoureuses.

La plupart des naturalistes modernes, au lieu de la distinction des productions naturelles en trois règnes, en ont établi une plus concise. Ils divisent les êtres naturels en deux ordres ; savoir : 1°. les êtres vivans, organiques ; 2°. les êtres bruts ou inorganiques. Ils distinguent, dans les premiers, les êtres organiques *inférieurs* ; ce sont les végétaux : les êtres organiques *supérieurs* ; ce sont les animaux. Le second ordre renferme les minéraux.

Si cette nouvelle définition donne une idée plus exacte des objets que l'on veut peindre, la première plaît davantage à l'imagination, & il n'est personne qui ne sache distinguer une pierre d'une plante, une plante d'un animal, un corps organique d'une substance brute. ( *Voyez l'article PLANTES.* )

**RÉGULIÈRE** (Corolle). *Regularis*, *aqualis corolla*. On appelle régulière toute corolle, soit monopétale, soit polyptale, dont les divisions sont uniformes, semblables entr'elles, & présentent un ensemble très-symétrique. Telle est la corolle de la bourrache, du liseron, de la rose, de la giroflée, &c.

**REJETS** ou **DRAGEONS**. *Stolones*. On donne ce nom à des branches enracinées, qui tiennent au pied de l'arbre, d'où on les arrache pour les replanter. Cette opération est un des moyens de propagation que l'art emploie pour féconder la fécondité de la Nature.

**RELEVÉES** (Feuilles). *Affurgentia folia*. C'est sous ce nom que l'on caractérise les feuilles lorsqu'elles sont inclinées ou simplement horizontales, elles se relèvent dans leur partie supérieure, à un tel point que leur sommet est entièrement droit.

**RELHANTIA**. *Relhania*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *leysera*, qui comprend des arbrustes ou herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont petites, linéaires ; les fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs radiées ; un calice imbriqué, scarieux ; toutes les semences couronnées par un tube membraneux, divisé en forme de paillettes ; le réceptacle entièrement garni de paillettes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont radiées ; elles offrent :

1°. Un calice commun, oblong, composé d'écaillés imbriquées, ovales, scarieuses.

2°. Une corolle composée, 1°. dans son disque, de fleurons hermaphrodites, tubulés ; à cinq divisions courtes, aigues ; 2°. à la circonférence, de demi-fleurons femelles.

3°. Cinq étamines filiformes, dont les filamens sont capillaires, courts ; les anthères cylindriques, tubulées.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme & d'un stigmate à deux divisions.

Le fruit consiste en plusieurs semences oblongues, toutes couronnées par une sorte de tube déchiqueté, & dont les découpures forment comme autant de paillettes. Le réceptacle est également garni de paillettes, tant dans son disque qu'à la circonférence.

*Observations.* Ce genre a été établi par Lhéritier ; il a cru devoir le distinguer des *leysera* avec lequel il a de grands rapports, & y placer plusieurs espèces d'*athanasia*, qui n'offrent point le caractère particulier à leur genre. En effet, les *athanasia* ont des fleurs toutes fistuleuses, hermaphrodites, tandis qu'elles sont radiées dans les *relhania*. Le réceptacle est, dans ces deux genres, également garni de paillettes, & les semences couronnées par une aigrette paléacée.

La différence entre les *leysera* & les *relhania* est moins tranchée : elle consiste en ce que dans les *leysera* le réceptacle n'a de paillettes qu'à sa circonférence, & qu'il en a dans son disque ; de plus, que les semences du disque sont surmontées d'aigrettes plumueuses, & celles de la circonférence d'aigrettes paléacées. Le *leysera calliornia*, dont le réceptacle est entièrement chargé de paillettes, mais dont les semences sont couronnées par une aigrette composée de cinq fillets plumeux, tient le milieu entre ces deux genres. Quant au *leysera palacea*, il rentre nécessairement dans les *relhania*. Il faut y joindre également les *ojmitis*,

ou plutôt les *relhania*, qui appartiennent au genre *osmunda* de Linne, dont Lhéritier auroit pu le dispenser peut-être de changer le nom. Nous n'y trouvons d'autre différence que celle de l'aigrette paléacée, beaucoup plus courte, ne formant quelquefois qu'un simple rebord. Le *zoëga capensis* de Linn. f. Suppl. devient aussi un *relhania*. Quant au *zoëga leptandra*, cette plante se trouve décrite dans cet ouvrage sous le nom de *centaurea calendulacea*, &c., quoiqu'il n'y ait point de synonymie, nous nous sommes assurés qu'il étoit la même plante.

Nous sommes forcés de rappeler dans ce genre plusieurs espèces déjà décrites dans d'autres genres : nous nous bornons alors à une simple indication. Je prévins d'ailleurs que plusieurs de ces espèces ne m'étant pas connues, je ne les rapporte à ce nouveau genre que sur la foi de Lhéritier.

## ESPÈCES.

## \* Fleurs agrégées.

1. *RELHANIA* scarieuse. *Relhania squarrosa*.

*Relhania foliis oblongis, acuminatis, nervibus apice recurvis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 22. tab. 29.

*Athanasia* (squarrosa), *pedunculis unifloris, lateralibus; foliis ovalibus, recurvis*. Linn. Amoen. academ. vol. 4. pag. 329, & vol. 6. pag. 52.

Cette plante est décrite dans cet ouvrage sous le nom d'*athanasia rude*. (Voyez le volume premier, pag. 325. n°. 1.)

2. *RELHANIA* à feuilles de genêt. *Relhania genistifolia*.

*Relhania foliis lanceolatis, acuminatis, uninerviis, subimbricatis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 22. n°. 2.

*Athanasia* (genistifolia), *corymbis simplicibus; foliis lanceolatis, indivisis, nudis, confertis*. Linn. Mantiss. 464.

Espèce décrite par M. Lamarck, sous le nom d'*athanasia à feuilles de genêt*. Vol. 1. pag. 326. n°. 4.

3. *RELHANIA* à petites feuilles. *Relhania myrsophylla*.

*Relhania foliis linearibus, nervibus, confertis; floribus pedicellatis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 22. n°. 3.

Ses feuilles sont fort petites, nombreuses, très-rapprochées, linéaires, sans aucune nervure apparente : les fleurs sont disposées en corymbes & médiocrement pédonculées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

4. *RELHANIA* à feuilles de passerina. *Relhania passerinoides*.

*Relhania foliis linearibus, nervibus; floribus subsessilibus*. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 4.

Cette espèce est distinguée de la précédente, particulièrement par ses fleurs presque sessiles, une fois plus grandes, & par ses feuilles bien plus longues. Ses tiges d'ailleurs sont droites, point diffusées, garnies de feuilles alternes, linéaires, sans aucune nervure apparente.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive en Angleterre. h

5. *RELHANIA* visqueuse. *Relhania viscosa*.

*Relhania foliis linearibus, triquetris, carnosifolius, viscidis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 5.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & le *relhania passerinoides*, particulièrement dans la disposition de leurs fleurs ; mais elles diffèrent par la forme de leurs feuilles. Dans le *relhania viscosa* elles sont médiocrement charnues, presqu'à trois faces, linéaires.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. h

## Fleurs solitaires.

6. *RELHANIA* lâche. *Relhania laxa*. Lhérit.

*Relhania foliis linearibus, villosis, remotis; floribus longius pedunculatis, calice erecto*. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 6.

Cette plante a des tiges droites, rameuses, garnies de feuilles alternes, linéaires, velues, écartées les unes des autres. Les fleurs sont solitaires, portées sur de longs pédoncules. Elle croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. o

7. *RELHANIA* pédonculée. *Relhania pedunculata*. Lhérit.

*Relhania foliis linearibus, villosis; floribus pedunculatis, calicibus diffusis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n°. 7.

*Zoëga* (capensis), *foliis linearibus; calice glabro, basi gibbo*. Linn. f. Suppl. pag. 382.

*Athanasia* (pumila), *foliis linearibus, pilosis; pedunculis unifloris, folio longioribus*. Linn. f. Suppl. pag. 362.

Ses tiges sont droites, divisées dans toute leur longueur en rameaux diffus, garnis de feuilles alternes, linéaires, velues ou légèrement pubescentes.

gentes. Les fleurs sont solitaires, terminales, pédonculées; leur calice est ovale, à six, imbriqué, jaunâtre; la corolle tubuleuse, de couleur jaune; le disque fort petit, les demi-fleurons de la circonférence du tube de longueur du calice. Les semences sont insérées sur un réceptacle garni de paillettes; elles sont oblongues, couronnées par un tube très-court, divisé à son orifice en paillettes setacées.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance. ○

8. RELHANIA à fleurs latérales. *Relhania lateriflora*. Lhérit.

*Relhania foliis lateralibus, villosis; pedunculis lateralibus, folio brevioribus*. Lhérit. Sertor. angl. pag. 23. n° 8.

*Athanasia (cassiflora), foliis linearibus, pilosis; pedunculis unifloris, folio brevioribus*. Linn. f. Suppl. pag. 362.

C'est une fort petite plante, dont les feuilles sont alternes, presque unilatérales, velues, linéaires; les fleurs solitaires, latérales, supportées par des pédoncules plus courts que les feuilles. Cette plante a été découverte par Thunberg au Cap de Bonne-Espérance. ○

9. RELHANIA cunifolium. *Relhania cuneata*. Lhérit.

*Relhania foliis obovatis, glabris; floribus sessilibus*. Lhérit. Sert. angl. pag. 23. n° 9.

*Athanasia (uniflora), foliis obovatis, imbricatis, glabris; floribus terminalibus, sessilibus, solitariis*. Linn. f. Suppl. pag. 362.

Ses feuilles sont petites, en ovale renversé, rétrécies en coin à leur base, glabres à leurs deux faces, très-rapprochées, & même imbriquées; les fleurs sont solitaires, sessiles, situées à l'extrémité des rameaux.

Cette espèce a été observée par Thunberg au Cap de Bonne-Espérance.

10. RELHANIA effilée. *Relhania virgata*. Lhérit.

*Relhania foliis linearibus, glabris; acumine recurvo, folio brevioribus; floribus sessilibus*. Lhérit. Sertor. angl. pag. 23. n° 10.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *relhania virgata*, dont elle n'est peut-être qu'une simple variété. Ses tiges se divisent en rameaux effilés, garnis de feuilles alternes, linéaires, glabres, terminées par une pointe recourbée; ses fleurs sont sessiles, solitaires & terminales. Elle croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. ¶

11. RELHANIA paléacée. *Relhania paleacea*. Lhérit.

*Relhania foliis linearibus, triquetris, subita turionibusque cuneatis; calicibus sessilibus, turionatis*. Lhérit. Sert. angl. pag. 24. n° 11.

*Leysera (paleacea), foliis triquetris, apice callosis, recurvatis*. Linn. Syst. veget. pag. 361.

*Leysera (ericoides), foliis triquetris, obtusis; floribus sessilibus*. Berg. Plant. Cap. pag. 294. n° 2.

*Ascropteris fruticosas, luteas; foliis rarissimis, crebris; ovario hirsuto*. Vaillant, Act. Paris. 1710. pag. 383.

Cette plante a des tiges frutescentes, hautes d'environ un pied, cylindriques, de couleur cendrée, divisées en rameaux droits, nombreux, garnis de feuilles sessiles, épaisses, linéaires, subulées, obtuses, presque triangulaires, longues de deux à trois lignes, très-rapprochées, un peu réfléchies à leur sommet & même un peu callosées, blanchâtres & légèrement tomenteuses à leur face inférieure, marquée d'un sillon profond; munies en dessous de quelques poils rares.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, situées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est turbiné, presque globuleux, glabre, composé de six ailles imbriquées, lancéolées, aiguës, un peu caduques, très-lisses, d'un jaune de rouille; les supérieures un peu scarieuses. La corolle est tubuleuse, plus grande que le calice; les fleurons du centre couleur de rouille, les demi-fleurons de la circonférence d'un jaune rougeâtre; les semences étroites, linéaires, couronnées par un tube tronqué, entier, scarieux, quelquefois un peu denticulé ou déchiré à ses bords; fixées sur un réceptacle garni de paillettes linéaires, étroites, caduques, de la longueur des fleurons.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ¶

12. RELHANIA à feuilles de santoline. *Relhania santolinoides*. Lhérit.

*Relhania foliis linearibus, triquetris, subita turionibusque incanis; calicibus globosis, subpetiolatis*. Lhérit. Sertor. angl. pag. 24. n° 12.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & le *relhania paleacea*; peut-être aussi conviendrait-il d'y rapporter la plante décrite par Bergius, que j'ai citée à l'espèce précédente. La seule différence qui est indiquée par Lhéritier, consiste dans les fleurs médiocrement pétiolées, & dans les calices parfaitement globuleux. Les semences sont, comme dans le *relhania paleacea*, couronnées par un petit tube membraneux, denticulé à ses bords.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. ¶

13. *RELHANIA* piquante. *Relhania pungens*. Lherit.

*Relhania foliis linearibus, subpungentibus, subtristis; floribus sessilibus*. Lherit. Sertor. angl. pag. 24. n°. 13.

Cette espèce a de petites feuilles sessiles, épar-  
ses ou alternes, linéaires, aiguës & presque pi-  
quantes à leur extrémité, tristes à leur face in-  
érieure : les fleurs sont sessiles, foliaires & termi-  
nales : leur calice est plus grand que celui des  
espèces précédentes, composé d'écaillés im-  
briquées, les intérieures plus grandes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espé-  
rance. h

14. *RELHANIA* à feuilles croisées. *Relhania de-  
cussata*. Lherit.

*Relhania foliis triquetris, linearibus, acutis, de-  
cussatis; floribus sessilibus*. Lherit. Sertor. angl. pag. 24. n°. 14.

Cette plante est remarquable par la disposition  
de ses feuilles croisées ; elles sont petites, tristes,  
linéaires à trois côtes extérieurement, aiguës à  
leur sommet. Les fleurs sont terminales, foliaires,  
sessiles : leur calice est composé d'écaillés im-  
briquées, les extérieures plus petites.

On trouve cette espèce au Cap de Bonne-Espé-  
rance. h

15. *RELHANIA* à grand calice. *Relhania calicina*. Lherit.

*Relhania foliis linearilanceolatis, subternerviis, acutis; floribus sessilibus*. Lherit. Sertor. angl. pag. 24. n°. 15.

*Osmites* (calicina), *foliis lanceolatis, nudis; calicibus scariosis*. Linn. f. Suppl. pag. 380.

Là description de cette espèce se trouve dans le  
quatrième volume de cet ouvrage, p. 647, sous le  
nom d'*OSMITE* CALICINALE. (*Osmites calicina*.)

16. *RELHANIA* tomenteuse. *Relhania bellidif-  
strum*. Lherit.

*Relhania foliis linearibus, tomentosis; floribus sessilibus*. Lherit. Sertor. angl. pag. 24. n°. 16.

*Osmites* (bellidifstrum), *foliis linearibus, tomentosis; calicibus scariosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1235.

*Bellidifstrum subhirsutum, linifolium*. Vaillant, Act. Parit. 1724. pag. 316.

*Anthemis suffruticosa, foliis linearibus, triquetris, tomentosis, indivisis; floribus sessilibus*. Linn. Amœn. acad. vol. 4. p. 330.

Cette plante a été décrite dans le quatrième

volume de cet ouvrage, pag. 647, sous le nom  
d'*OSMITE* TOMENTEUSE. (*Osmites bellidifstrum*.)  
Peut-être conviendrait-il de rapporter au genre  
*relhania* les deux autres espèces d'*osmites*, décrites  
à la suite de celles que nous venons de citer, puis-  
qu'il n'existe aucune différence bien sensible entre  
les *osmites* & les *relhania*, & que c'est à tort,  
comme je l'ai déjà remarqué, que l'auteur a créé un  
nouveau genre pour y ranger des espèces qui  
pouvoient entrer dans un genre déjà connu, &  
qu'il ne devoit pas détruire ; & si j'en ai fait ici  
mention, c'est que les *osmites* ayant été déjà traités,  
je ne pouvois plus y rapporter les espèces  
dont il a été question dans cet article.

**REMIRE.** *Remirea*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *pomerula* & les *killigia*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les chaumes se ramifient à leur partie supérieure, & portent des fleurs disposées en panicules serrées & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une bête à deux valves, uniflore ; une corolle à deux valves, plus petite que le calice ; trois stigmates.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Pour calice une bête uniflore, à deux valves concaves, aigres, intégales.

2°. Une corolle à deux valves plus petites que le calice, minces, concaves, pointues, inégales.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont très-longs, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, à trois faces, surmonté d'un style long, filiforme, terminé par trois stigmates seracés.

Les semences sont oblongues, à trois faces, recouvertes par la corolle persistante.

#### ESPÈCES.

**REMIRE** maritime. *Remirea maritima*.

*Remirea foliis marginis asperis; floribus dense panicatis, subsessilibus*. (N.)

*Remirea maritima*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 45. tab. 16. — Lamarck, Ill. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 615. tab. 37. — Juss. Gener. Plant. pag. 34.

*Miegia maritima*. Schreb. Gener. Plant. 1713. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 311.

Cette plante a des racines longues, cylindriques, noueuses, traçantes, poussant de chaque nœud un grand nombre de fibres capillaires &

roufflées; il s'en élève des chaumes fines, droites, qui se ramifient vers leur extrémité en rameaux alternes, axillaires, étalés, au nombre de trois à sept. Les feuilles sont nombreuses, très-rapprochées, imbriquées, courtes, aiguës, finement denticulées à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en panicules touffues, très-scissées à l'extrémité de chaque rameau, presque sessiles, & en partie enveloppées par les feuilles supérieures. Ces fleurs sont petites; les stigmates de couleur pourpura.

Cette plante croît dans le sable sur le bord de la mer, à Cayenne & dans la Guiane.

Ses racines ont une odeur aromatique assez agréable. Lorsqu'on les tient dans la bouche, elles font sur la langue une impression piquante & point désagréable. On les regarde, prises en tilane, comme très-propres pour exciter les sucres & faire couler les urines.

**RENÉAULME.** *Renalmia*. Genre de plantes unilobées, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des balafrés, qui a des rapports avec les *caena* & les *glabba*; qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à grandes feuilles simples, dont les fleurs forment des grappes pendantes, composées de plusieurs épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux ou trois dents; une corolle tubulée, trois découpures à son limbe; une anthère sessile; une baie charnue.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, rubulé, d'une seule pièce, divisé à son sommet en deux ou trois dents irrégulières.

2°. Une corolle tubulée, dont le limbe se divise en trois découpures, dont les deux supérieures sont munies en dedans d'un appendice bidenté à sa base, à trois lobes à son sommet; la troisième découpure est inférieure & supporte l'anthère.

3°. Une seule étamine insérée sur la découpure inférieure de la corolle, sessile, dont l'anthère est longue, linéaire, libre, droite, échancrée, aussi longue & aussi large que la découpure qui la supporte.

4°. Un ovaire inférieur, glabre, oblong, presqu'à trois faces, surmonté d'un style filiforme, très-glabre, droit, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate en forme de bouclier applati, tronqué, & percé vers un de ses côtés d'une ouverture qui pénètre dans le style.

Le fruit est une baie charnue, oblongue, glabre,

arrondie, marquée de trois sillons, terminée par un on bilic, divisée dans son milieu en trois loges qui contiennent plusieurs semences oblongues, très-glabres, tronquées, tétragones.

*Observations.* Ce genre a de grands rapports avec les *glabba*; il en diffère en ce que ce dernier a deux étamines, un stigmate aigu, une capsule couronnée par le calice.

#### E S P A C E S.

1. **RENÉAULME élevé.** *Renalmia exaltata*. Linn. f.

*Renalmia foliis lanceolatis, longissimis; spadicis nutante.* (N.)

*Renalmia exaltata*. Linn. f. Suppl. pag. 7 & 79. (*Excluso synonymo Rumphii.*) — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 6.

*Catimbium*. Juss. Gener. Plant. pag. 62.

*Renalmia*. Neve. Bot. Ann. 3. pag. 136.

C'est un arbre qui s'élève au moins à vingt pieds de haut, sur un tronc droit, simple, cylindrique, garni de feuilles simples, alternes, dont les pétioles engainent les tiges; très-glabres, étroites, lanceolées, longues de cinq à six pieds, à nervures obliques, rétrécies à leur base, qui se confond presque avec les pétioles; acuminées à leur sommet, dont la pointe est obtuse.

Les fleurs naissent sur des grappes pendantes, munies de bractées alternes, lanceolées, canaliculées, nerveuses, glabres & caduques; les pédoncules situés dans l'aisselle des bractées, sont courts, solitaires, recourbés, pubescents, comprimés, terminés par une spathe monophylle, qui s'ouvre à son sommet, où elle se divise en deux ou trois découpures, & d'où sortent deux ou trois fleurs: le calice ressemble parfaitement à cette spathe: les fruits pendent en longues grappes; ils ont la grosseur & la forme de ceux du *momordica elaterium*: ce sont des baies rougeâtres, très-charnues, divisées intérieurement en trois loges, séparées par des cloisons molles, membraneuses, contenant des semences noires, petites, très-glabres.

Cette plante croît aux Indes & à Surinam. Les habitants aiment beaucoup les fruits préparés convenablement. *h* (*Descrip. ex Linn. f.*)

**RENFLÉES** (Feuilles). *Folia gibba*. Dénomination que prennent les feuilles lorsqu'elles sont charnues, elles sont plus épaisses dans leur milieu, & sont convexes des deux côtés: tel est le *sedum acre*.

**RENIFORMES** (Feuilles). *Reniformia folia*. Nom que portent les feuilles lorsqu'elles ont la figure

figure d'un rein, c'est-à-dire, qu'elles sont arrondies, un peu plus larges que longues, &c de plus échancrées à leur base comme celles de l'*Asarum europæum*, le cabaret.

Les semences portent également le même nom lorsqu'elles offrent la même forme: *semina reniformia*.

**RENONCULES ou RENONCULACÉES** (les). *Ranunculaceæ*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un grand nombre de genres qui ont de grands rapports avec celui des renoncles, qui y est compris.

Les plantes qui composent cette famille ont des tiges ordinairement herbacées, garnies de feuilles alternes, rarement opposées, excepté dans les climats & les atragènes: quelques-unes sont à demi-vaginales, les unes composées, ailées ou digitées; les autres, &c c'est le plus grand nombre, simples, entières, ou palmées ou lobées.

Le calice est composé de plusieurs folioles; il manque souvent. La corolle est polypétale, très-souvent composée de cinq pétales; les étamines en nombre indéfini, les anthères adnées aux filaments. Les ovaires sont nombreux (rarement uniques), définis ou indéfinis, insérés sur un réceptacle commun, chacun d'eux pourvu d'un style qui manque rarement, terminés par un stigmate simple.

Le fruit consiste en autant de capsules qu'il y a d'ovaires (quelques genres ont des baies): ces capsules sont monospermes dans les uns, elles ne s'ouvrent point; polyspermes dans d'autres, à deux valves à demi-ouvertes, les semences insérées sur leurs bords. L'embryon est fort petit, placé dans la cavité supérieure d'un péricarpe grand et corné.

Voici les principaux genres qui composent cette famille.

1. *Capsules monospermes non ouvertes*. (Baies dans l'*Physalis*.)

Les climacites.....	<i>Clematis</i> .
Les atragènes.....	<i>Atragene</i> .
Les pigamons.....	<i>Thalictrum</i> .
Les hyarites.....	<i>H. drapsis</i> .
Les anémones.....	<i>Anemone</i> .
Les hamatryades.....	<i>Hamatryas</i> .
Les adonides.....	<i>Adonis</i> .
Les renoncles.....	<i>Ranunculus</i> .
Les ratoncles.....	<i>Myosotis</i> .

2. *Capsules polyspermes, s'ouvrant à leur côté intérieur; pétales irréguliers*.

Les troilles.....	<i>Trollius</i> .
Les hellébores.....	<i>Helleborus</i> .
Les isopyres.....	<i>Isopyrum</i> .
Les nigelles.....	<i>Nigella</i> .

Botanique, Tome VI.

Les garidelles.....	<i>Gariella</i> .
Les ancoïes.....	<i>Aquilegia</i> .
Les dauphinelles.....	<i>Delphinium</i> .
Les acônites.....	<i>Aconitum</i> .

3. *Capsules polyspermes, s'ouvrant à leur côté intérieur. Pétales réguliers*.

Les populages.....	<i>Coltsa</i> .
Les pivoinés.....	<i>Paeonia</i> .
Les zanthorhizas.....	<i>Zanthorhiza</i> .
Les cimicaires.....	<i>Cimicifuga</i> .

4. *Un seul ovaire; une baie à une seule loge polysperme; un réceptacle latéral, semisifère*.

Les actées.....	<i>Actea</i> .
Les podophylles.....	<i>Podophyllum</i> .

**RENONCULE**. *Ranunculus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des renonculacées, qui a des rapports avec les anémones, &c qui comprend des herbiers la plupart acres & caustiques, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples, lobées ou dichotomées, les fleurs très-souvent terminales, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice à cinq folioles; cinq pétales; une fessette glanduleuse ou une membrane fort petite à la base de leur onglet; des capsules saillantes, monospermes & agrégées.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice à cinq folioles inférieures, ovales, concaves, colorées, caduques.

2°. Une corolle composée de cinq pétales obtus, luisans, dont les onglets sont munis à leur base d'une fessette glanduleuse ou d'une petite membrane courte.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments, de moitié plus courts que la corolle, sont terminés par des anthères droites, oblongues, obtuses, à deux loges.

4°. Un grand nombre d'ovaires agrégés, sans style, terminés par des stigmates réfléchis & fort petits.

Les fruits consistent en un grand nombre de capsules monospermes, à une seule loge point ouverte, de forme très-irrégulière, glabres ou hérissés de pointes.

Observations. Si l'on examine avec attention les pétales des plantes qui composent ce genre, on reconnoitra aisément qu'ils doivent être regardés comme tubulés, ayant à la vérité un tube extrêmement court, mais qui n'en existe pas moins,

puisque'il forme le principal caractère de ce genre : la partie extérieure de ce tube se dilate en une lame ovale, arrondie, & forme la partie la plus considérable du péricarpe. Ce caractère est commun à un assez grand nombre de genres de cette famille. (Voyez les observations à la suite de l'explication du caractère générique de *Enallagma*, vol. 3, p. 95.)

Les formes variées que présentent les fruits de ces plantes fournissent de bons caractères pour la distinction d'un grand nombre d'espèces. Ces fruits sont ou ronds ou comprimés, nus ou armés de pointes, obtus ou terminés par une pointe enfiliforme, &c.; les feuilles simples ou lobées, ou composées, fournissent d'assez bonnes sous-divisions.

### ESPÈCES.

#### \* Feuilles simples & entières.

1. RENONCULE petite douce. *Ranunculus flammula*. Linn.

*Ranunculus foliis ovato-lanceolatis, petiolatis; caule declinato*. Linn. Spec. Plant. vol. 3, pag. 772. — Hort. Cliffort. 228. — Flor. lucc. 418. 493. — Roy. Lugd. Bat. 489. — Daltb. Parif. 163. — Buliard, Herb. tab. 15. — Pollich. Pal. n°. 527. — Reys. Ged. 1. pag. 143. — Scop. Carn. 682. — Mer. Flor. dan. tab. 975. — Hoffm. Germ. 193. — Roth. Germ. 1. pag. 237. II. 659. — Lam. Flor. franç. vol. 3, pag. 190. n°. 789. XXV. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2, pag. 181. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1, pag. 435.

*Ranunculus foliis ovato-oblongis, integerrimis; caule procumbente*. Flor. lappon. 325.

*Ranunculus longifolius, palustris, minor*. Tournef. Inst. R. Herb. 292. — C. Bauh. Pin. 190.

*Ranunculus foliis subintegerrimis; calicibus pentaphyllis, corollatis; floribus hexapetalis*. Neck. Gallob. pag. 238.

*Flammula ranunculus aquaticus, angustifolius*. &c. Lobel. Icon. 670. — Idem. Observ. 382.

*Flammula ranunculus*. Dodon. Pempt. 432. Icon. Pauli. Dan. tab. 109.

*Ranunculus flammula, aquaticus, angustifolius*. Dalech. Hist. vol. 1, pag. 1035. Icon.

*Ranunculus lanceolatus minor*. Tabern. Icon. 49.

*Ranunculus flammula minor*. Gerard. Hist. 961. Icon. — Paikins. Theatr. 1215. Icon. 2.

*Ranunculus longifolius, palustris, minor*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 49. fig. 34.

A. *Eodem, foliis serratis*.

*Ranunculus caule declinato; foliis elliptico-lanceolatis, subserratis*. Haller. Helv. n°. 1182.

*Ranunculus p. l. stris, serratus*. Tournef. Inst. R. Herb. 292. — C. Bauh. Pin. 190.

*Flammula ranunculus, folio serrato*. Dodon. Pempt. 432. Icon.

*Ranunculus longifolius, palustris, minor, serratus*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 29. fig. 35.

*Ranunculus aquaticus, angustifolius, serratus*. Lob. Icon. 670. — Idem. Observ. 382. Icon.

B. *Eodem, caule erecto*. (N.) Poir. Voyag. en Barb.

B. *Eodem, foliis latioribus, minus elongatis, subserratis*. (N.)

C. *Eodem, minor, foliis obovatis ovatis, longipetiolatis, subserratis*. (N.)

Cette plante a des tiges hautes d'environ deux pieds, couchées à leur partie intérieure, très-glabres, rameuses, striées, garnies de feuilles linéaires; les inférieures longuement pétiolées, élargies en une gaine membraneuse à leur base, lancéolées, elliptiques ou ovales, acuminées à leurs deux extrémités, entières à leurs bords ou un peu dentées; les feuilles intermédiaires sont plus étroites, lancéolées, médiocrement pétiolées; les supérieures presque sessiles, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont terminales ou axillaires, supportées par de longs pedoncules simples, cylindriques, glabres, uniflores. Le calice est composé de cinq folioles concaves, obtusés, colorées. La corolle, un peu plus grande que le calice, est jaune, luisante; les semences glabres, sont petites, réunies en une tête globuleuse & terminale.

On trouve un grand nombre de variétés de cette espèce : nous avons indiqué les plus saillantes. La plante A est remarquable par la plupart de ses feuilles, plus ou moins fortement dentées à leurs bords. La variété B, que j'ai observée en Barbarie, tient à celle-ci, mais ses tiges sont entièrement droites, plus roides, hautes, fortement striées, plus épaisses; excepté quelques feuilles radicales, qui sont ovales, toutes les autres sont fort longues, linéaires, lancéolées, aiguës, dentées en scie à leurs bords, rétrécies à leur base en pétiole, embrassant la tige par une large membrane vaginale; les fleurs plus nombreuses, formant par leur ensemble une sorte de panicle lâche.

La variété B, que j'ai également recueillie sur les côtes de l'Afrique septentrionale, a toutes les feuilles inférieures plus courtes, plus larges, ovales, pétiolées, quelques-unes tronquées ou très-élargies à leur base, tantôt entières à leurs bords, d'autrefois plus ou moins dentées en scie. Les tiges sont droites, moins élevées que dans la variété précédente, rameuses ou bifurquées; les fleurs presque paniculées au sommet des rameaux; la corolle un peu plus petite. On trouve dans l'E-

tang de Montmorency une variété très-voisine de celle-là, plus grande, naissant à la surface de l'eau, dont toutes les feuilles sont entières, les inférieures ovales, obtuses, portées sur de très-longues pétioles; les supérieures étroites, linéaires, aiguës; les pédoncules presque uniflores.

Enfin la plante C, que j'ai observée dans l'herbier de M. Lamarck, & qui lui avoit été communiquée par M. Roussel, est une des variétés les plus remarquables de cette espèce. Elle est fort petite, sa tige n'ayant que deux ou trois pouces de haut; couverte à la base, garnie de feuilles toutes de même forme, longuement pétiolées, longues de cinq à six lignes, glabres, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, entières ou un peu dentées à leur contour. Les fleurs sont portées par des pédoncules simples, latéraux, plus longs que les riges. Elle a été recueillie sur les bords de l'Odon, dans les environs de Caen.

Toutes ces plantes croissent dans les prés humides, dans les marais, sur le bord des étangs. Elles sont acres, caustiques, nuisibles aux bestiaux. (V. v.)

#### 2. RENONCULE basse. *Ranunculus pusillus*.

*Ranunculus foliis omnibus longè petiolatis; inferioribus ovatis, subdentatis; superioribus linearilanceolatis, caule humili decumbente.* (N.)

*Ranunculus flammula.* Walter. Flor. carol.

*Ranunculus (flammula), glaber, decumbens; foliis petiolatis, subdentatis; inferioribus ovali-lanceolatis, superioribus sublinearibus.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 321.?

Malgré les rapports que cette petite plante peut avoir avec le *ranunculus flammula*, surtout avec la variété C, je crois qu'elle doit être distinguée comme espèce.

Il s'élève des mêmes racines un grand nombre de tiges couchées presque dans toute leur longueur, n'ayant guère que trois ou quatre pouces de long, grêles, lisses, presque simples, à peine feuillées; les feuilles caulinaires, courtes, ovales, obtuses, glabres, entières ou légèrement dentées à leur contour; les caulinaires, très-peu nombreuses, étroites, linéaires, lancéolées, toutes longuement pétiolées.

Les fleurs sont petites, d'un blanc jaunâtre, portées sur de longs pédoncules axillaires, latéraux, simples, grêles, uniflores. Les fruits sont glabres, réunis en une très-petite tête globuleuse.

Cette plante croît dans la Caroline, dans les lieux humides & marécageux. Elle m'a été communiquée par M. Boic, qui l'y a recueillie. (V. f.)

#### 3. RENONCULE radicante. *Ranunculus reptans*. Linn.

*Ranunculus foliis linearibus, caule reptante.* Linn. Syst. veget. pag. 515. — Flor. lippon. 236. tab. 3. fig. 5. — Flor. suæc. 459. 497. — Martius. Sil. 405. — Wedd. Flor. dan. tab. 108. — Kniph. Centur. 9. n° 84. — Hoffm. Germ. 195. — Roth. Germ. 1. pag. 237. II. 610. — Flor. tcor. fig. in fronte. vol. 1.

*Ranunculus caule reptante; foliis linearibus, fasciculatis.* Haller. Helv. n° 1183.

*Ranunculus flammæus, minimus, spergula folio.* Buxb. Centur. 5. Append. 41.

*Ranunculus reptans, graminæ foliis, à singulis geniculis, radice agens.* Amm. Ruth. 80. tab. 13. fig. 1.

Quoique rapprochée du *ranunculus flammula*, cette espèce ne peut en être regardée comme une variété, s'offrant constamment dans les marais sous des caractères qui lui sont particuliers.

Ses tiges sont grêles, filiformes, longues d'environ un pied, tout-à-fait couchées, divisées en rameaux un peu relevés, & qui produisent la plupart de petites racines capillaires & fibreuses au point de leur insertion sur les tiges. Ils sont garnis de feuilles glabres, vertes; les inférieures & les radicales longuement pétiolées, lancéolées, très-aiguës à leur sommet, pointues à leur base; les supérieures étroites, linéaires, presque semblables à celles des graminées, quelquefois un peu dentées; les dernières filiformes, rétrécies à leur base en un pétiole qui embrasse la tige, quelquefois fasciculées aux articulations.

Les fleurs sont petites, jaunâtres, solitaires, soutenues par des pédoncules presque capillaires, terminaux ou axillaires: ces derniers ont à peine un pouce de long. Les fruits forment une petite tête glabre & globuleuse.

On rencontre cette plante dans les marais, sur le bord des étangs; elle croît en Suède, dans la Suisse, aux environs de Paris, à Saint-Léger: je l'ai également recueillie aux environs de Soissons, dans les marais au bas de la chaumière & dans les environs de Fougères. (V. v.)

#### 4. RENONCULE filiforme. *Ranunculus filiformis*.

*Ranunculus perpusillus, glaber; caulis filiformis, reptantibus, distanter geniculatis, quasi aphyllis; geniculis unifloris, flore pedicellato, foliis subulato-linearibus, obtusis.* Michaux. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 320.

Cette espèce, beaucoup plus petite que le *ranunculus reptans*, lui ressemble beaucoup; elle en diffère par son port & par la disposition des feuilles & des fleurs.

Les riges sont rampantes, glabres, filiformes, divisées par des articulations distantes entr'elles.

N j



nurs ; les feuilles, situées à chaque nœud, sont petites, linéaires, glabres à leurs deux faces, subsulcées, obtuses. Il n'existe à chacun de ces nœuds qu'une seule fleur médiocrement pédonculée.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, le long des bords du fleuve de Saint-Laurent & à la baie d'Hudson, où elle a été recueillie par Michaux. (V. f.)

5. RENONCULE à longues feuilles. *Ranunculus lingua*, Linn.

*Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 773. — Hort. Cliff. 218. — Flor. suec. 459. — Royen. Lugd. Bat. 489. — Dalib. Paris. 163. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 189. n° 789. XXIV. — Scop. Carn. n° 683. — Pollich. Pal. n° 518. — Crantz. Austr. pag. 120. n° 19. — Oeder. Flor. dan. tab. 755. — Hoffm. Germ. 193. — Roth. Germ. l. pag. 237. II. 610. —

*Ranunculus erectus, ramulosus ; foliis ensiformibus, subserratis*, Haller. Helv. n° 1181.

*Ranunculus longifolius, palustris, major*, C. Bauh. Pin. 34. — Tournef. Inst. R. Herb. 292. — Morrif. Oxon. Hist. 2. § 4. tab. 29. fig. 33.

*Ranunculus longifolius, maximus ; Engad. Plinii*, J. Bauh. Hist. 3. Adj. perd. 863. Icon.

*Ranunculus lanceolatus, major*, Tabern. Icon. 48. *Lingua Plinii*, Dalech. Hist. vol. 1. p. 1037. Icon.

β. *Ranunculus flammeus, latiori plantaginifolio, marginibus pilosis*, Pluk. Almag. 3. 2.

A. *Eadem, elatior flore minore*. (N.)

B. *Eadem, pedunculis numerosis, filiformibus ; flore minore*. (N.)

Dans cette espèce toutes les feuilles sont sessiles, lancéolées ; les tiges droites, la corolle ordinairement très-grande ; ce qui la distingue du *ranunculus flammula*.

Elle s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds. Ses tiges sont cylindriques, striées, légèrement velues, rameuses, garnies de feuilles fort longues, étroites, lancéolées, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, adhérentes à la tige par une base élargie en une membrane vaginale, entières ou légèrement denticulées à leurs bords, très-souvent couvertes, sur leurs deux faces, de petits poils très-courts & couchés.

Les fleurs ont des terminaisons, presque paniculées, portées sur de très-longes pédoncules sortant de l'aisselle des feuilles, ou opposées aux feuilles, au nombre de deux, qui se ramifient à leur sommet presque par bifurcation, feuillées aux pointes de leurs divisions, chacune d'elles terminée par une seule fleur, dont le calice est coloré, velu, pubes-

cent ou presque glabre. La corolle est ordinairement remarquable par sa grandeur, d'un beau jaune luisant. Les femences sont glabres, réunies en une tête ovale, presque ronde.

En suivant les variétés de cette plante & les rapprochant du *ranunculus flammula*, les caractères spécifiques qui distinguent ces deux plantes s'évanouissent peu à peu, le rapprochement se confondent tellement, qu'il devient très-difficile de savoir à laquelle des deux espèces on doit rapporter certains individus.

Dans la variété A, les fleurs sont beaucoup plus petites, les feuilles un peu plus élargies, plus courtes, dentées en scie à leurs bords, & souvent si longuement rétrécies à leur base, qu'elles paraissent pétiolées, tantôt glabres, tantôt légèrement velues. Dans la plante B que j'ai recueillie sur les côtes de Barbarie, les feuilles & les fleurs offrent à peu près le même caractère ; mais ces dernières sont très-nombreuses, terminées, supportées par des pédoncules longs, filiformes, à peine velus.

Dans toutes ces variétés les tiges sont droites, très-hautes, ramcues ; les feuilles toutes semblables dans leur forme ; elles ne diffèrent que par leur grandeur & par le rétrécissement de leur base, plus ou moins long, plus long aux feuilles inférieures.

Ces plantes croissent dans les lieux aquatiques, sur le bord des fossés & des étangs. Elles sont acres & caustiques. γ (V. v.)

6. RENONCULE nodiflore. *Ranunculus nodiflorus*, Linn.

*Ranunculus foliis ovatis, petiolatis ; floribus sessilibus*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 773. — Hort. Cliffort. 218. — Dalib. Paris. 164. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 191. n° 789. XXX.

*Ranunculus parifensis, pumilus, plantaginifolia*, Petiv. Gazoph. 40. tab. 25. fig. 4. — Vaillant. Act. 1719. pag. 52. tab. 4. fig. 4.

*Ranunculus plantaginifolia, sessilibus canticulis adhaerentibus*, Vaill. Paris. 168.

β. *Ranunculus scutellus, folio rotundo, vix serrato*, Petiv. Gazoph. 39. tab. 24. fig. 9.

Cette plante est petite, les racines sont fibreuses, capillaires ; elles produisent un assez grand nombre de tiges basses, très-rameuses, étalées, grêles, lisses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, petites, ovales, quelquefois lancéolées, obtuses, entières à leurs bords ou un peu denticulées, luisantes en dessus, à peine nerveuses, soutenues par des pétioles à peu près aussi longs que les feuilles, filiformes & comprimés.

Les fleurs sont, les unes terminales, supportées

par des pédoncules fasciculés, solitaires; les autres feuilés, situés dans la bifurcation des rameaux. Chacune de ces fleurs est ordinairement accompagnée de deux ou trois petites bractées courtes, étroites, linéaires, quelquefois plus grandes, sans sembler aux feuilles. La corolle est jaune, petite; les fruits réunis en une tête globuleuse.

Quoique cette plante ait un grand nombre de fleurs terminales, il est facile de reconnoître qu'elles ne sont telles que par circonstance, & qu'elles deviennent souvent axillaires lorsque la végétation continue, parce qu'alors la partie de la tige qui se présente comme un pédoncule, s'allonge & se ramifie.

Cette plante croît dans les lieux humides, inondés par les eaux, à Fontainebleau. (V. v.)

7. RENONCULE à feuilles de gramin. *Ranunculus gramineus*. Linn.

*Ranunculus foliis lanceolato-linearibus, indivisis, caule erecto, levigato, pauciflora*. Linn. Syst. veget. pag. 418. — Müller. Dict. n°. 5. — Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 190. n°. 789. XXV. — Bulliard. Herb. tab. 123.

*Ranunculus foliis lanceolatis linearibus, sessilibus; caule erecto, radice bulbosa*. Linn. Sp. c. Plant. vol. 1. pag. 75. — Horrt. Cliffort. 228. — Roy. Lugd. Bat. 439. — Dalech. Paris. 163. — Sauvag. Montpellier.

*Ranunculus foliis lanceolato-linearibus, sessilibus; caule erecto, radice fasciculata*. Gerard. Flor. gall. prov. 384.

*Ranunculus gramineo folio, bulbosus*. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 292.

*Ranunculus montanus, gramineo folio*. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. L. c.

*Ranunculus phœniceus, myconi*. Dalech. Hist. 1. pag. 1036. Icon.

*Ranunculus angustifolius, bulbosus*. J. Bauh. Hist. 3. Append. 866. Icon.

*Ranunculus bulbosus, gramineus, montanus*. Col. part. 1. pag. 313.

*Ranunculus montanus, folio gramineo*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 30. fig. 38.

Cette espèce a de grands rapports avec le *ranunculus pyrenaicus*. Elle en est distinguée par ses fleurs jaunes, par ses feuilles plus larges, les tiges plus élevées, terminées par trois à quatre fleurs pédonculées.

Ses racines sont tubéreuses, presque fasciculées, entremêlées de fibres capillaires; les tiges qui s'en élèvent sont très-glabres, presque point striées, garnies de feuilles alternes, lisses, flétries, lin-

éolées, longues, linéaires, aiguës, assez semblables à celles des graminées; les inférieures rétrécies en pétiole; les supérieures élargies à leur base, par laquelle elles embrassent la tige.

Les fleurs sont terminales, portées sur de longs pédoncules, munis quelquefois d'une ou de deux petites feuilles; ce qui rend la tige presque ramifiée à son sommet. Les folioles calicinales sont glabres, ovales, obtuses, colorées en un jaune verdâtre, souvent bordées à leur ceinture par un petit liséré blanchâtre. La corolle est d'un jaune pâle, assez grande; ses pétales élargis, ovales, obtus; les fruits font réunis en une tête presque globuleuse.

Cette plante se rencontre dans les prés secs & montagneux des départemens méridionaux de la France. x (V. f.)

8. RENONCULE des Pyrénées. *Ranunculus pyrenaicus*. Linn.

*Ranunculus foliis linearibus, indivisis; caule erecto, striato, subulfo*. o. Linn. Mantiss. 248. — Syst. veget. p. 418. — Jacq. Miscell. 1. pag. 154. tab. 18. fig. 1. — Villars. Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 732. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 186. n°. 789. XII.

*Ranunculus foliis radicalibus, lineari-lanceolatis, nervosis; scapo unifloro, germinibus uncinatis*. Hohenarth & Rejncr. Iter 1. pag. 187.

*Ranunculus plantagininus*. Allion. Pedem. n°. 1445. tab. 76. fig. 1.

*Ranunculus r. acibus fasciculatis, in d. caule reticulato, foliis gramineis*. Haller. H. v. n°. 1180.

*Ranunculus foliis linearibus, caule subnudo; radice fasciculata, comosa*. Gerard. Flor. gall. prov. p. 384.

*Ranunculus alpinus, pumilus, gramineo folio; flore albo*. Tournef. Inst. R. Herb. 292. — Garidel, Aix, pag. 356.

*Ranunculus pumilus, graminei foliis*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 850.

*Pumilus ranunculus, graminei foliis*. Lobel. Ic. 67.

p. *Ranunculus montanus, folio gramineo multiplex*. C. Bauh. Pin. 181. — Town. Inst. R. Herb. 292.

*Ranunculus gramineus, flore pleno*. J. Bauh. Hist. 3. Append. 865.

*Ranunculus gramineus, multiplex*. Label. Icon. pag. 671.

*Ranunculus folio gramineis*. Dr d. Pempt. pag. 413. Icon.

Les rapports de cette plante avec le *ranunculus gramineus* sont tels, que ces deux espèces ne sont guère distinguées que par la couleur de leur co-

rolle, qui est blanche dans celle dont il est ici question.

Sa racine est composée de bulbes oblongues, cylindriques, blanchâtres, charnues : son collet est formé par un faisceau presque bulbeux de fibres très-ferrées ; il s'en élève une tige grêle, haute de quatre à six pouces, glabre, striée, velue à sa partie supérieure, qui sort du pédoncule ; garnie part culièrement à sa base de feuilles longues, plus ou moins étroites, linéaires, aiguës, rétrécies en pétiole à leur base ; striées, marquées de nervures longitudinales, très-entières à leurs bords, graminiformes ; il existe à peine une ou deux feuilles caulinaires, filiformes, fort étroites.

Les fleurs sont terminales, pédonculées, une ou deux sur chaque tige : les folioles calicinales sont ovales, concaves, glabres, obtuses, blanchâtres, colorées en jaune dans leur milieu ; la corolle blanche ; les pétales ovales, presque arrondis : les fruits sont comprimés, terminés par une petite pointe musée, un peu recourbée ; réunis en une tête ovale, petite, terminale.

Cette plante croît sur les montagnes, dans les Pyrénées, la Suisse, & dans les départemens méridionaux de la France. ♀ (V. f.)

9. RENONCULE de Buenos-Ayres. *Ranunculus bonariensis*.

*Ranunculus foliis ovalibus petiolatis, cordato-ovatis, subcrenatis ; pedunculis axillaribus, unisporis. (N.)*

Plante buette, herbacée, dont les tiges sont glabres, foibles, presque rampantes, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, toutes pétioles, glabres, petites, ovales ou elliptiques, & souvent écharcrées en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, médiocrement crénelées à leurs bords, marquées dans leur milieu de quelques petites nervures longitudinales, ramifiées latéralement, supportées par des pétioles, élargies à leur base, jaunes vers leur milieu, en une membrane vaginale.

Les fleurs sont latérales, soutenues par des pédoncules simples, solitaires, longs d'un pouce, à peine aussi longs que les feuilles, axillaires, s'écartant en un sens opposé aux feuilles ; filiformes, glabres, cylindriques. La corolle est petite ; les fruits réunis en une très-petite tête globuleuse.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Comberfon. (V. f. in herb. Lam.)

10. RENONCULE amplexicaule. *Ranunculus amplexicaulis*, Linn.

*Ranunculus foliis ovatis, acuminatis, amplexicaulis ; caule multifloro, radice fasciculata. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Hort. Cliff. 229.*

— Roy. Lugd. Bat. 484. — Sauvag. Monsp. 76. — Kniph. Centur. 2. n°. 66. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 185. n°. 769. X.

*Ranunculus montanus, foliis plantagininis*. Tourn. Inst. R. Herb. 292. — C. Bauh. Pin. 180.

*Ranunculus folio plantagininis*. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 444. §. 4. tab. 30. fig. 36.

*Ranunculus dulcis, foliis latis rapifolii perfoliatis ; floribus albis*. Menzel. Pugill. tab. 8. fig. 8.

*Ranunculus pyrenaeus, foliis sublongis, non laciniatis ; albo flore*. J. Bauh. Hist. 3. Append. 364. Icon.

9. *Ranunculus pyrenaeus, albo flore*. Clus. Append. alter. — Morif. Hist. 2. §. 4. tab. 30. fig. 37.

On peut aisément distinguer cette espèce à ses feuilles très-approchantes de celles des lilacées, & dont les supérieures sont amplexicaules, lancéolées, aiguës.

Elle a des racines composées de fibres fasciculées, épaisses, charnues : il s'en élève une tige haute de huit à neuf pouces, assez droite, lisse, cylindrique, garnie de quelques feuilles lisses, très-entières, aiguës ; les radicales sont ovales, un peu élargies, pointues, rétrécies à leur base, presque en pétiole, engainant les tiges à leur point d'insertion par un élargissement membraneux, munies, surtout à leur partie inférieure, de cils très-fins ; les supérieures sont lancéolées, plus étroites, amplexicaules, presque plissées longitudinalement, longuement acuminées, entièrement glabres, toutes marquées de nervures longitudinales.

Les tiges soutiennent à leur sommet trois ou quatre fleurs blanches, assez grandes, pédonculées. Leur calice est composé de cinq folioles oblongues, caduques, concaves, obtuses, glabres, colorées en un jaune pâle, blanchâtres : les pétales sont larges, obtus, en cœur renversé, une fois plus longs que le calice. Les fruits sont disposés en une petite tête ovale ; leur réceptacle est pubescent, garni de poils touffus, courts & blanchâtres.

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, les Apennins, & aux environs de Montpellier. ♀ (V. f.)

11. RENONCULE des salines. *Ranunculus falguginosus*, Pallas.

*Ranunculus foliis ovatis, subcordatis, apice tri seu quingidentatis ; caule repente*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1311. n°. 11.

*Ranunculus falguginosus*. Pallas. Itin. edit. min. 3. pag. 173.

*Ranunculus (plantaginifolius), foliis cordato-ova-*

*alis, apicè vel integris, vel tridentatis; flagellis repentibus.* Murr. Comment. Gott. 1777. pag. 39. tab. 2.

*Ranunculus (rothenicus), foliis ovatis, ad apicem paucidentatis; caule repente.* Jacq. Hort. 3. pag. 19. tab. 31.

*Ranunculus foliis petiolatis, ovatis, integris, aut varie ineis; pedunculis radicatis, natis.* Omelin, Sibir. 4. pag. 205.

*Ranunculus repens, flore in caule singulari; foliis variè fectis.* Amm. Ruth. pag. 81. n°. 107. tab. 13. fig. 2.

Espèce bien distincte par son port, dont les tiges font couchées & rampantes. Elles sont garnies de feuilles ovales, presque elliptiques, entières & arrondies à leur base, quelquefois élargies, un peu échancrées en cœur, divisées à leur sommet, en trois dents ou en trois lobes obtus, quelquefois cinq; glabres, un peu épaissies, marquées dans leur milieu de trois nervures longitudinales, supportées par des pétioles très-longs, comprimés, un peu velus.

De chaque articulation, souvent radicante, s'élève un très-long pédoncule, simple, grêle, cylindrique, un peu velu, terminé par une seule fleur d'un blanc-paâtre, de cinq à sept pétales ovales, d'une médiocre grandeur. Les fruits sont glabres, réunis en une tête ovale.

Cette plante croît dans la Sibérie, dans les terrains chargés de sels. (V. f. *l. herb.* Lam. Comn. Patrin.)

11. RENONCULE à feuilles de patma. *Ranunculus parnassifolius.* Linn.

*Ranunculus foliis subovatis, nervosis, lineatis, integerrimis, petiolatis; floribus umbellatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Gouan. Illustr. pag. 34. — Villars. Dauph. vol. 3. pag. 733. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 186. n°. 789. XI.

*Ranunculus montanus, graminis parnassifolio.* Tournef. Init. R. Herb. 286.

*Ranunculus radicans fasciculatus, imò caule recitatus; foliis cordiformibus.* Haller. Helv. n°. 1179.

*Ranunculus foliis nervosis; radicalibus subrotundis ovatis, subcordatis; caulinis sessilibus, ovato-lanceolatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1310.

*Ranunculus caule multifloro, hirsuto; foliis radicalibus, petiolatis, ovatis, integerrimis, supra hirsutis, subius nervosis; calicibus purpureis.* Wulfen. in Jacq. Collect. 1. pag. 191. tab. 9. fig. 3. — Hohenwarth & Reiner. Itin. 1. pag. 190. tab. 5.

Ses racines, un peu arrondies & charnues à leur collet, se divisent inférieurement en de longues fibres droites, cylindriques, aiguës, blanchâtres;

le dessus du collet est environné de larges membranes fines, vaginales, très-blanches, qui servent de base aux feuilles. De leur centre s'élève une tige basse, cylindrique, haute de deux à six pouces, un peu courbée à sa base, presque nue, glabre, striée, garnie de feuilles presque toutes radicales, épaisses, ovales ou en forme de cœur, coriaces, nerveuses, glabres ou légèrement velues, surtout à leurs bords; supportées par de longs pétioles: les feuilles caulinaires sont sessiles, amplexicaules.

Les fleurs sont au nombre de trois à cinq, situées à l'extrémité des tiges, sur des pédoncules un peu velus, inégaux, sortant de l'aisselle d'une feuille sessile très-aiguë. Leur calice est composé de folioles courtes, ovales, lisses, concaves, d'un blanc mélange de pourpre. La corolle est blanche, souvent teinte en rouge à sa base; les pétales arrondis à leur sommet, marqués de petites veines roussâtres: les fruits sont globuleux, terminés par une petite pointe recourbée, ténue en une tête arrondie.

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, & sur les hautes montagnes des environs de Grenoble: elle m'a été communiquée par M. Foucault, qui l'a recueillie sur le mont de Lens. (V. f.)

12. RENONCULE ophioglosse. *Ranunculus ophioglossifolius.* Vill.

*Ranunculus foliis integerrimis, obtusis, imis cordatis; caulinis ovato-lanceolatis, supremis linearibus; caule erecto.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 731. tab. 49.

*Ranunculus (ophioglossoides), caule simpliciter, erecto; foliis nervosis, inferioribus ovatis, subcordatis, petiolatis; floralibus sessilibus, lanceolatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1310. n°. 8.

Cette plante a beaucoup de rapports avec l'espèce précédente; cependant nous la croyons différente, d'après les caractères que lui attribue M. Villars.

Sa racine est fusiforme, simple, chevelue; ses tiges droites, hautes d'un pied, glabres, cylindriques, garnies dans toute leur longueur de quelques feuilles distantes, pétiolées, ovales, la plupart échancrées en cœur à leur base; lisses, un peu charnues, & dont les pétioles, trois fois plus longs que les feuilles, embrassent la tige par une gaine membraneuse; les feuilles, situées à la base des pédoncules, sont sessiles, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont terminales, au nombre de trois ou quatre, petites, pédonculées. Leur corolle est d'un jaune luisant, trois fois plus petite que celle du *ranunculus parnassifolius*; les fruits forment une petite tête arrondie.

Cette plante a été observée dans les montagnes alpines des environs de Grenoble, par M. Villars.

14. RENONCULE des hautes montagnes. *Ranunculus frigidus*, Willd.

*Ranunculus foliis radicalibus cuculiformi-ovatis, apice quinqueangulatis; caulibus sessilibus, palmatis*. Willden. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 1312. n.º 13.

Ses tiges sont droites, peu élevées, garnies de feuilles radicales, nombreuses, pétioles, à peine longues d'un demi-pouce; ovales, cuculiformes, très-entières, tronquées à leur sommet, & dirigées en cinq grandes dents obtuses; elle n'a que deux ou trois feuilles caulinaires, alternes, écartées, sessiles, cuculiformes à leur base, divisées en cinq lobes profonds, lancéolés, très-entiers, un peu obtus, assez semblables à des digitations.

Les fleurs terminent les tiges, au nombre d'une ou de deux au plus. Leur calice est composé de folioles elliptiques, velues, obuses: les pétales, beaucoup plus grands que le calice, sont blanchâtres (dans les individus secs) & en forme de cœur renversé.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibérie. & (Description ex Willden.)

15. RENONCULE grumuleuse. *Ranunculus bulbatus*, Linn.

*Ranunculus foliis ovatis, serratis; scapo nudo, unifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Flor. Cliffort. 229. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 435.

*Ranunculus latifolius, bulbatus, ophiodoli radice*. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 286.

*Ranunculus hispanicus, folio sub-ovato, flore parvo*. Tournef. Inst. R. Herb. 286. — Schaw. Sp. cim. n.º 501.

*Ranunculus grumosa radice, fructus secunda*. Clus. Hist. 233. Icon.

*Ranunculus hispanicus*. Tabern. Icon. 50. — De-deo. Pempt. 427. Icon. — Dal ch. Hist. 1. pag. 133. Icon. — Lankens. Theatr. 312. Icon.

*Ranunculus autumnalis, folio lato, rotundo, serrato*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 806. Icon.

*Ranunculus latifolius, autumnalis; caulibus bifido, flore minimo*. Moris. Oxon. Hist. 2. pag. 247. 5. 4. tab. 31. fig. 51.

*Ranunculus autumnalis*. Gerard. Hist. 954. Icon.

*Ranunculus latifolius, bulbatus, autumnalis; fructu ovato & profuso*. Moris. Hist. 2. 5. 4. tab. 31. fig. 40. 50.

*Ranunculus latifolius, multipl. x. ferocious*. Cornut. 94. — Tournef. Inst. R. Herb. 286.

Cette plante a des racines composées de bulbes nombreuses, allongées, fasciculées, épaisses, charnues, cylindriques, amincies à leur extrémité, mêlées de fibres tortueuses. Elles poussent de leur collet plusieurs feuilles radicales, pétioles, disposées en rosette & étendues sur la terre, au nombre de trois, fix ou huit; ovales, obtuses, médiocrement velues, divisées à leur contour en crénelures inégales, les unes obtuses, d'autres aiguës. Les pétioles sont planes, comprimés, velus, allés à leurs bords, ordinairement au moins aussi longs, & quelquefois plus courts que les feuilles.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, nue, haute de six à huit pouces & plus, velue dans toute sa longueur, terminée par une seule fleur, dont le calice est à cinq folioles velues, ovales, obtuses, un peu colorées. La corolle est jaune, assez grande, composée de cinq à huit pétales linéaires, obtus. Les fruits sont réunis en une petite tête arrondie.

Cette plante fleurit dans l'hiver, au milieu des tertius incults: Elle croît en Espagne, dans l'île de Crète, & sur les côtes de l'Afrique septentrionale. & (V. f.)

Cette plante varie par la grandeur & la forme de ses feuilles, qui sont quelquefois plus amples, plus allongées, velues ou presque velues, bulbées ou lenticulaires à leur centre: les fleurs se doublent très-fréquemment.

16. RENONCULE venimeuse. *Ranunculus thora*, Linn.

*Ranunculus foliis reniformibus, sublobis, crenatis; caulibus sessilibus, floralibus lanceolatis, caule subbifido*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 775. — Scop. Carn. n.º 685. — Linn. Germ. 194. — Jacq. Austr. 5. tab. 442. — Vill. Dauph. vol. 3. pag. 729. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 192. n.º 789. XXXI.

*Ranunculus foliis doris, venosis, reniformibus, rotundis crenatis; convexitate retusa, acutis serratis*. Haller, Helv. n.º 1178.

*Ranunculus foliis inferioribus subrotundo-reniformibus, crenatis; floralibus lanceolatis, integerrimis; caule inflexo nudo*. Jacq. Vind. 249. Observat. 1. pag. 25. tab. 13.

*Ranunculus phthora*. Crantz. Austr. pag. 119. n.º 17.

*Ranunculus cyclaminis folio, ophiodoli radice major*. Tournef. Inst. R. Herb. 285.

*Thora seu phthora bulderesi*. Gerard. — Moris. Oxon. Hist. 2. 5. 4. tab. 31. fig. 59.

Phthora

*Phthora valdensium*. Lobel. Icon. 604. — Cluf. Hist. 1. pag. 239.

*Aconitum pardalianches I., seu thora major*. C. Bauh. Pin. 184.

*Thora folio cyclaminis*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 650. Icon.

*Limcum alterum, duplici folio*. Dalech. Hist. 2. pag. 1739. Icon.

Vulgairement le thora des Vaudois.

β *Ranunculus cyc'amis folio, asphodeli radice, minor*. Tournef. Inst. R. Herb. 186.

*Aconitum pardalianches alterum, sive thora minor*. C. Bauh. Pin. 184.

*Ranunculus grumofa radice, tertia*. Cluf. Hist. 259. Icon.

*Thora minor*. Camer. Epitom. 826.

*Limcum pardalianches genus, uno tantum folio*. Dalech. Hist. 2. pag. 738.

C'est une espèce très-distincte, dont les racines sont composées de bulbes assez semblables à celles de l'asphodèle : ses tiges sont fermes, droites, glabres, striées, hautes de cinq à six pouces, munies d'une ou de deux feuilles larges, planes, glabres, un peu coriaces, en forme de rein, feuilées, arrondies, veinées, crénelées à leur contour : celles de la base des pédoncules sont lanceolées, amplexicaules, acuminées, entières, ou quelquefois divisées en deux ou trois lobes aigus.

La tige est terminée par une ou deux petites fleurs jaunes, pédonculées, dont les folioles calicinales sont lancéolées, aiguës, presque aussi longues que les pétales. Les fruits sont un peu ovales, surmontés d'une petite pointe recourbée, réunis en tête.

Cette plante croît sur les montagnes dans les environs de Grenoble, à la Grande-Chartreuse, en Suisse, dans les Pyrénées. (V. f. Comm. Foucault.)

C'est une des espèces les plus caustiques de ce genre. On prétend que les anciens Gaulois se servoient de son suc pour empoisonner leurs flèches.

17. RENONCULE ficaria. *Ranunculus ficaria*. Linn.

*Ranunculus foliis cordatis, angulatis; caule unifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 774. — Flor. suec. 460. 495. — Hort. Cliffort. 228. — Marer. medic. 141. — Roy. Lugd. Bar. 490. — Dalib. Paris. 167. — Æder. Flor. dan. tab. 499. — Berg. Phytoz. 1. pag. 43. Ic. — Goert. Ingr. pag. 88. — Curt. Flor. lond. Ic. — Scop. Carn. n° 684. — Pollich. Pal. n° 529. — Ludw. Ed. tab. 52. — Kniph. Centur. 1. n° 73. — Hoffm. Germ. 194.

Botanique. Tome VI.

— Bulliard, Herb. tab. 48. — Lam. Flor. frang. vol. 3. pag. 191. n° 789. XXVIII. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 182. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 486.

*Ranunculus colicibus triphyllis, cucullatis*. Crantz. Austr. pag. 120.

*Ranunculus foliis radicalibus, glabris, cordato-subrotundis, angustis, seu integerrimis; pedunculis unifloris*. Necker, Gallob. pag. 257.

*Ficaria*. Haller, Helv. n° 1160. — Blackw. tab. 51.

*Ficaria ranunculoides*. Roth. Germ. I. pag. 241. II. 622.

*Ranunculus vernus, rotundifolius minor*. Tournef. Inst. R. Herb. 186. — Schaw. Specim. n° 502.

*Chelidonia rotundifolia minor*. C. Bauh. Pin. 309.

*Ficaria*. Brunsf. 1. pag. 215. Icon.

*Scrophylaria minor, sive chelidonium minus*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 468. Icon.

*Ranunculus rotundifolius, asphodeli radice*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 30. fig. 45.

*Chelidonium minus*. Fusch. Hist. 867. Icon. — Lobel. Icon. 503. — Idem. Observ. 213. — Tabern. Ic. 752. — Matth. Comment. 468. Ic. — Gerard, Hist. 816. Icon. — Parkins, Theatr. 617. Icon. — Traguf. 113. Icon. — Dodon. Pempt. 49. Icon. — Camer. Epirom. 403. — Paul, Dan. tab. 33. — Dodart, Icon. — Dalech, Hist. 1. pag. 1048. Ic.

β *Ranunculus vernus, rotundifolius, major*. Tournef. Inst. R. Herb. 186.

*Chelidonia rotundifolia major*. C. Bauh. Pin. 309.

γ *Ranunculus vernus, rotundifolius; petalis florum gemino ordine digestis*. Tournef. Inst. R. Herb. L. C.

δ *Ranunculus vernus, rotundifolius; flore pleno*. Tournef. L. C.

ε *Ranunculus vernus, rotundifolius, minor, maculatus*. Tournef. Inst. L. C.

*Chelidonia rotundifolia minor; foliis maculâ purpureâ notatis*. C. Bauh. Pin. 309.

Vulgairement la petite chélidoine ou l'éclairrette. Regnault, Bot. Icon.

Plusieurs naturalistes ont cru devoir établir pour cette plante un genre particulier, étant distinguée des autres espèces de renoncules par son calice à trois folioles, & par ses pétales assez généralement au nombre de huit à dix.

Elle a le port du *caltha palustris* : ses racines sont composées de bulbes oblongues, petites, charnues, réunies en faisceaux, entremêlées de

fibres blanchâtres & tortueuses. Elles produisent plusieurs tiges couchées & rampantes, longues de trois à six pouces, très-glabres, garnies de feuilles pétiolées, épaisses, luisantes, obtuses, en cœur, échancrées à leur base, sinuées ou anguleuses à leur contour, très-lisses, marquées de petites veines disposées en un réseau élégant. Les pétioles sont longs, comprimés, élargis, un peu canaliculés, dilatés à leur base en une membrane vaginale.

Les fleurs sont supportées par de longs pédoncules axillaires, stries, uniflores, qui poussent, dans la jeunesse de la plante, soit immédiatement du collet de la racine. Leur calice est coloré, à trois folioles concaves, oblongues, obtusés, caduques. La corolle est d'un blanc jaune vermillé, composée de huit à dix pétales ovales, lancéolés, obtus, d'un jaune plus pâle à leur base, un peu verdâtre à leur face inférieure; ouverts en ét. Il. Les filaments des étamines sont très-souvent jaunâtres; les autres droites & oblongues; les filaments lisses, ovales, convexes, réunis en une tête arrondie.

On rencontre quelques variétés de cette plante, assez remarquables: elle a quelquefois ses feuilles marquées d'une tache rougeâtre ou ferrugineuse. Souvent ces mêmes feuilles, & toutes les autres parties de la plante, parviennent à une grandeur double de celle que nous avons indiquée. Les fleurs sont tantôt composées d'un double rang de pétales, tantôt elles sont presque entièrement doubles.

Cette plante fleurit de très-bonne heure. On la rencontre dans les lieux couverts, dans les bois, les endroits humides. (V. v.)

Elle est bien moins âcre que les autres espèces, & même dans quelques contrées on la mange comme herbe potagère. Son suc, mêlé avec du beurre frais, est recommandé contre les douleurs des hémorroïdes: elle passe aussi pour antiscorbutique; mais son usage à l'intérieur est peu usité, & ne peut pas produire un grand effet. Les moutons & les chèvres la mangent, mais les chevaux & les vaches n'en veulent point. On a cru remarquer que toutes les fois que cette plante, ainsi que la plupart des autres renoncules aquatiques s'établissent dans les prairies, c'étoit une preuve de la dégénération de ces dernières.

\* Feuilles divisées ou composées.

18. RENONCULE de Crète. *Ranunculus creticus*. Linn.

*Ranunculus foliis radicalibus reniformibus, crenatis, sublobatis; caulis tripartitis, lanceolatis, integerrimis; caule multifloro.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 775. — Miller, Dict. n°. 3.

*Ranunculus foliis radicalibus, cordato-subrotundis;*

*caulis tripartitis, sessilibus, lanceolatis, integerrimis.* Roy. Lugd. Bat. 490.

*Ranunculus asphodeli radice, creticus.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 290.

*Ranunculus creticus, latifolius.* Clus. Hist. 1. pag. 239.

Cette plante a des racines bulbeuses, fasciculées, d'où s'élève une tige haute d'un à deux pieds, velue, striée, épaisse, rameuse, garnie de feuilles pétiolées, alternes, routes velues; les radicales très-amples, arrondies, échancrées en forme de rein, divisées à leur contour en cinq ou six lobes obtus, inégaux, chaque lobe ordinairement tri-fide, & chaque découpeure souvent munie de trois dents plus ou moins prononcées; les feuilles caulinaires à peine pétiolées, divisées en trois lobes profonds, lancéolés, écartés, entiers, les terminales ou les feuilles florales simples, entières, sessiles, lancéolées.

Les fleurs sont nombreuses, & se forment, à l'extrémité des tiges & des rameaux, une sorte de panicule étalée, dont les pédoncules sont très-velus, terminés par une fleur assez grande, de couleur jaune. Le calice est composé de cinq folioles concaves, ovales, un peu aiguës, velues, médiocrement colorées; les pétales presque ronds, veinés, striés; les fruits comprimés, terminés par une pointe en forme de bec recourbé, réunis en une tête presque globuleuse.

Cette plante croît dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

19. RENONCULE à grandes feuilles. *Ranunculus macrophyllus*.

*Ranunculus coule hisfuto; foliis radicalibus, orbiculatis, profunde lobatis, incis; ramis superioribus lanceolatis, integris.* Desfont. Flot. atlant. vol. 1. pag. 437.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & le *ranunculus creticus*, dont elle n'est peut-être qu'une variété. Sa corolle est un peu moins grande, ses lobes plus divisés, toute la plante moins velue, les feuilles caulinaires découpées au sommet de leurs lobes.

Les tiges sont droites, roides, velues, divisées en rameaux presque dichotomes, étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, velues; les radicales arrondies, échancrées à leur base, amples, divisées en trois ou cinq lobes presque uniformes, à trois larges divisions à leur sommet, qui est muni de dentelures ovales, un peu aiguës; les feuilles supérieures divisées en trois ou cinq lobes inégaux, à créneures profondes à leur sommet, inégaux, très-aiguës; les feuilles terminales découpées en digitations lancéolées ou linéaires, très-entières.

Les fleurs forment, par leur ensemble à l'extrémité des rameaux, une panicle étalée, dont les pédoncules sont très-velus, inégaux, presque dichotomes. Les folioles calicinales sont velues, linéolées, concaves, aiguës, blanchâtres; la corolle d'un beau jaune foncé; les pétales ovales, arrondis à leur sommet.

Cette plante croît sur le bord des ruisseaux proche Sbiba en Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. Je l'ai également observée dans les environs du Balthion de France. (V. v.)

20. RENONCULE des jardins. *Ranunculus astaticus*. Linn.

*Ranunculus foliis ternatis, bitermatisque; foliolis trifidis, incis; caule infernè ramoso.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 777. — Miller, Dict. n°. 11. & Icon. t. b. 216.

*Ranunculus foliis tripartitis, lacinatis; caule infernè ramoso, radice tuberosa.* Hort. Cliff. 230. — Hort. Upf. 156. — Roy. Lugd. Bat. 490.

*Ranunculus grumosa radice, ramosa.* Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 287. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 2.

*Ranunculus astaticus, polyclonus, seu grumosa radice secundus.* Cluf. Hist. 1. pag. 241.

6. *Ranunculus grumosa radice, flore flavo, var.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 227. — Morif. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 3 & 6.

*Ranunculus astaticus, grumosa radice, flore flavo, cævis venis distincto.* Cluf. Cur. Poll. in-fol. 26.

7. *Ranunculus grumosa radice, flore albo.* Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 287.

*Ranunculus peregrinus, grumosa radice, primus.* Cluf. Hist. 241. — Morif. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 4.

8. *Ranunculus grumosa radice, flore albo, leviter crenato.* C. Bauh. Pin. 181.

9. *Ranunculus grumosa radice, flore nigro.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 287. — Morif. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 1. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 864. Icon.

*Ranunculus peregrinus, grumosa radice, tertius.* Cluf. Hist. 3. pag. 242. Icon.

10. *Ranunculus grumosa radice; flore phæniceo, minimo, simpliciter.* C. Bauh. Pin. 181.

11. *Ranunculus asphodeli radice, flore sanguineo.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 288. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 9.

*Ranunculus (sanguineus), foliis ternatis, bitermatisque; foliolis trifidis, obusis; caule simpliciter.* Miller, Dict. n°. 10.

*Ranunculus sanguineus, multiplex.* Lobel. Ic. 672.

*Ranunculus constantinopolitanus.* Dodon. Pempt. 430. Ic. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 1034. Ic.

*Ranunculus astaticus, grumosa radice, pleno flore.* Cluf. Hist. 242.

Vulgairement renoncule rouge, vulgaire. Tourn.

12. *Ranunculus asphodeli radice; flore sphaerica, rubente.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 288. — Morif. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 5 & 7.

*Ranunculus astaticus, grumosa radice, flore pleno secundus.* Cluf. Hist. 243. Icon.

Vulgairement renoncule cramoisie.

13. *Ranunculus asphodeli radice, proflifer, minimus.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 288. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 27. fig. 8.

\* *Esdem varietates duplici flore.*

Cette belle espèce de renoncule, l'éclair de nos parterres au printemps, est connue de tous les amateurs de fleurs, qui s'occupent à en varier les nuances, & à profiter de la facilité avec laquelle cette plante double ses fleurs, pour offrir leur jardin des plus belles variétés qu'ils peuvent en obtenir. Ces variétés sont infinies dans le mélange des couleurs.

L'espèce à fleurs simples a des racines comptées d'un grand nombre de petits tubercules fasciculés, que l'on nomme griffes, & qui varient dans leur forme : elles produisent une tige pubescente, cylindrique, droite, rameuse, haute d'environ un pied. Les feuilles radicales sont pétiolées, simples, lobées, incisées, pubescentes, partiellement à leur face inférieure, ainsi que leur pétiole : les supérieures & caulinaires, alternes, ternées, ou presque deux fois ailées; les pinnules, ordinairement pétiolées, à trois folioles sessiles, pinnatifides, velues, divisées en segments irréguliers, lancéolés, très-aigus.

Les fleurs sont grandes, en nombre égal à celui des rameaux; terminales, très-variées dans leurs couleurs. Leur calice est composé de cinq folioles non réfléchies, velues, lancéolées, aiguës; les pétales sont amples, larges, entiers, quelquefois un peu crénelés à leur sommet.

Cette plante croît dans le Levant & dans plusieurs contrées de l'Afrique, où elle a été apportée dans nos jardins. (V. v.)

La renoncule, par la beauté, la variété & la vivacité de ses couleurs, ainsi que par les formes gracieuses de ses fleurs, occupe dans nos parterres le même rang que les crocus, les tulipes, les anémones, &c. ; elle les surpasseroit même toutes si, à la richesse de ses couleurs, elle joind

O ij



gnoit le mérite de l'odeur ; mais ses qualités éminentes se bornent aux seuls agréments de la vue. On prétend que ce fut sous le règne de Mahomet IV, en 1683, que cette fleur commença à briller dans les jardins de Constantinople. On la distingue en simple, en double & en semi-double. Ces deux dernières sont seules cultivées : la dernière est même préférée à l'autre, parce qu'elle produit une plus grande variété de couleurs ; elle donne des graines : les doubles sont stériles.

On élève les renoncules en planches isolées ; on en plante les griffes au commencement de l'automne, dans une terre légère, composée de terreau, de fumier préparé, d'un peu de sable fin, à l'exposition du midi ou du soleil levant : il faut les garantir du grand froid avec des paillassons.

On retire les racines de terre quelque temps après que les tiges sont fanées : on sépare les petites griffes de leur mère ; elles produisent des fleurs toutes semblables. Il faut enlever tout ce qu'elles ont de gâté, les mettre sécher au grand air & à l'ombre, & les serrer dans un lieu sec. Lorsqu'elles ont un ou deux ans, elles n'en valent que mieux pour être replantées.

#### 21. RENONCULE à épi. *Ranunculus spicatus*. Desfont.

*Ranunculus foliis radicalibus, rotundatis, lobatis, incis; caule simplici, villosa, pauciflora ; seminibus longe spicatis.* Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 438. tab. 115.

Cette espèce, remarquable par ses fruits disposés en longs épis cylindriques, a des racines bulbueuses, composées de bulbes nombreuses, oblongues, fasciculées : il s'en élève une tige presque simple, droite, velue, légèrement striée, haute d'un pied & plus. Les feuilles radicales sont larges, velues, longuement pétiolées, presque orbiculaires, échancrées à leur base, irrégulièrement & médiocrement lobées, incisées & crénelées ; les crénelures obtuses. Les feuilles caulinaires sont rares, & n'existent guère qu'à la naissance des pédoncules ; elles sont, ou simples, ou divisées en trois lobes profonds, étroits, lancéolés.

Les pédoncules naissent au nombre de trois ou quatre à l'extrémité des tiges : ils sont très-longs, inégaux, pubescens, uniflores ; les calices sont composés de cinq folioles ovales, oblongues, colorées ; la corolle jaune, assez grande ; les pétales ovales, arrondis à leur sommet. Il leur succède un grand nombre de semences planes, bordées, surmontées d'une pointe très-recourbée, réunis en un épi cylindrique, obtus, droit, long de deux pouces & plus.

Cette plante a été observée par M. Desfontaines dans les environs d'Alger ; elle croît dans les lieux

marécageux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

#### 22. RENONCULE des marais. *Ranunculus palustris*. Poir.

*Ranunculus pubescens ; foliis imis tripartitis ; foliolis multifidis, flabeliformibus ; superioribus linearibus, integerrimis ; calice erecto.* Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 439.

*Ranunculus foliis inferioribus tripartito-multifidis, incis ; superioribus linearibus.* Poiteb. Voyag. en Sib. vol. 2. pag. 184.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées, & paroissent bulbueuses à leur collet par les enveloppes membraneuses des pétioles : il s'en élève plusieurs tiges droites, pubescentes, hautes de huit à dix pouces, divisées en rameaux éralés, garnis de feuilles presque glabres ou pubescentes, recouvertes par des poils très-courts & couchés ; les radicales, de deux sortes, les unes simples, presque ovales, élargies, profondément dentées à leur contour ; les autres presque ailées, divisées en lobes ternés, étroits, allongés, incisifs ou à découpures aiguës ou obtuses ; les intermédiaires moins composées, les supérieures & terminales, simples, linéaires, très-minces, aiguës. Les pétioles des feuilles inférieures sont longs, comprimés, élargis.

Les fleurs, très-éralées, sont terminales, nombreuses, supportées par des pédoncules inégaux, effilés, cylindriques, pubescens, point striés. Les calices sont velus, ovales, aigus, concaves, d'un vert jaunâtre ; la corolle d'un jaune foncé, d'une grandeur médiocre ; les pétales élargis ; les fruits oblongs, glabres, comprimés, presque mutiques à leur sommet, réunies en une tère un peu allongée, ovale, obtuse, presque elliptique.

J'ai rencontré cette plante dans les environs des grands marais qui avoisinent la Calé, & dans quelques autres lieux de la Barbarie. x (V. v.)

#### 23. RENONCULE de Cassubie. *Ranunculus cassubicus*.

*Ranunculus foliis radicalibus, subrotundis-cordatis, crenatis ; caulinis digitatis, dentatis ; caule multifloro.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 775. — Reyg. Ged. 1. pag. 143. n°. 4.

*Ranunculus rotundifolius, vernus, silvaticus, major vel cassubicus ; folio thora caltha.* Breyn. Prodr. 1. pag. 45.

*Ranunculus aconitifolius, folio rotundo, ad radicem prostrato.* Loëfel. Pruff. 225. tab. 72.

Cette plante paroît avoir beaucoup de ressemblance avec le *ranunculus auricomus* : peut-être même n'en est-elle qu'une simple variété, dont la

principale différence, d'après la figure donnée par Loëfel, consiste dans les feuilles caulinaires, lancéolées, dentées à leurs bords, & non pas linéaires & entières, comme dans le *ranunculus auricomus*. Les feuilles radicales sont arrondies, crénelées à leurs bords, échancrées en cœur à leur base. Les fleurs sont terminales, presque paniculées.

Cette plante croît dans la Sibérie, dans la Poméranie & dans quelques autres contrées du Nord. ♀

14. RENONCULE AVORTON. *Ranunculus abortivus*. Linn.

*Ranunculus foliis radicalibus, cordatis, crenatis; caulinis ternatis, angulatis; caule subrisifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 776.

*Ranunculus foliis radicalibus, crenatis; caulinis digitatis, petiolatis*. Royen, Lugd. Bat. 490.

*Ranunculus foliis radicalibus, reniformibus, crenatis, petiolatis; caulinis paucis, digitatis, sessilibus*. Gronov. Virg. 166.

*Ranunculus virginianus, flore parvo, molliori folio*. Herm. Lugd. Bat. 514.

Cette renoncule a les feuilles radicales, pétiolées, molles, réniformes, crénelées à leurs bords, échancrées en cœur à leur base. Les feuilles caulinaires sont pétioolées, digitées, terminées, anguleuses. peu nombreuses; les dernières sessiles. Les fleurs sont petites, terminales, de deux à trois.

Cette plante croît dans la Virginie & le Canada.

15. RENONCULE LANUGINEUSE. *Ranunculus lanuginosus*.

*Ranunculus calicibus patulis, pedunculis teretibus, caule petiolisque hirsutis; foliis trifidis, lobatis, crenatis, holofericeis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 779. — Flor. dan. Oeder. tab. 397. — Reyg. Ged. 2. pag. 97. — Leers, Herborn. n.º 419. — Matzsch. Sil. n.º 414. — Derr. Naff. pag. 191. — Roth. Germ. I. 140. II. 617. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 199. n.º 789. LIII.

*Ranunculus foliis tripartitis, acutè sinuatis, tomentosis*. Linn. Spec. 554. — Gouan, Monsp. 166.

*Ranunculus tomentosus, calicibus retroflexis; foliis radicalibus, tripartitis; lobis incis; caulinis multipartitis, sessilibus*. Gerard, Flor. gall. prov. p. 387.

*Ranunculus foliosus, ramosus, erectus; foliis semitriobatis, hirsutis; vaginis sericeis*. Hall. Helv. n.º 1171.

*Ranunculus foliis tripartitis, acutè sinuatis, lanuginosis*. Crantz. Austr. pag. 118.

*Ranunculus foliis hispitis, trilobis; calicibus pa-*

*tulis; caule multifloro, tereti*. Scop. Carn. 1. pag. 564. n.º 5. edit. 2. n.º 691.

*Ranunculus foliis radicalibus, pinnatis*. Sauvag. Monsp. 227.

*Ranunculus montanus, lanuginosus; foliis ranunculipratenfis repentis*. C. Bauh. Pin. 182. Prodr. 96. — Tourn. Infl. R. Herb. 291.

*Ranunculus magnus, valdè hirsutus; flore luteo*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 417. Leon.

g. *Ranunculus montanus, subhirsutus, geranii folio*. Bauh. Pin. 182. — Tourn. Infl. R. Herb. 291.

*Ranunculus montanus, subhirsutus, latifolius*. C. Bauh. Prodr. 56. tab. 96.

*Ranunculus nemorosus, hirsutus, foliis caryophyllata*. Loëfel, Pruff. 120. tab. 71.

γ. *Eadem, minima, vix ramosa*.

*Ranunculus lanuginosus*. Valter. Flor. carol.

On distingue aisément cette espèce aux poils abondants, lanugineux, qui recouvrent toutes ses parties, & à ses feuilles inférieures, divisées en trois grands lobes.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques; fermes, velues, feuilles, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles alternes, pétioolées, très-velues; les caulinaires & les inférieures sont amples, à demi-divisées en trois lobes larges, aigus, incisés & dentés, d'un vert obscur en dessus, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous; les feuilles supérieures plus petites & presque sessiles, présentent à peu près le même caractère, mais elles sont bien plus velues, lanugineuses, soyeuses & luissantes en dessous.

Les fleurs sont terminales & sortent de l'aisselle des dernières feuilles: leur pédoncule est pileux, mou, uniflore. Le calice est blanchâtre, tomenteux, à cinq folioles ovales, lancéolées, aiguës; la corolle jaune, d'une grandeur médiocre; les pétales arrondis à leur sommet.

La plante s'est beaucoup moins lanugineuse: ses tiges sont pubescentes & non pileuses. La variété γ est beaucoup plus petite; ses tiges sont presque simples, molles, basses, très-pileuses; ses feuilles sont plutôt à trois qu'à cinq lobes; les fleurs, jaunes & petites. Peut-être devroit-elle être distinguée comme espèce. Elle croît dans la Caroline, & m'a été communiquée par M. Bosé.

Cette plante se rencontre sur les montagnes, dans les Alpes, les Pyrénées; dans les prés & les bois. La variété β vient de l'Auvergne; elle croît aussi ailleurs. ♀ (V. f.)

16. RENONCULE SOYEUSE. *Ranunculus sericeus*.

*Ranunculus villosus, foliis ternatis, foliolis tri-*

*bois; lobis multifidis, acutis; caule valde hirsuto, fereco. (N.)*

Cette espèce a quelques rapports avec le *ranunculus lanuginosus*. Ses racines sont fibreuses, fasciculées, longues & tordues; il s'en élève une tige forte, haute d'un pied & plus, droite, rameuse, couverte de poils fins, soyeux, blonds, couchés, très-abondans. Les feuilles radicales sont longuement pétioolées, ainsi que les inférieures; formes, épaissies, très-douces au toucher, chargées à leurs deux faces de poils luisans, ainsi que les pétioles: elles se divisent en trois folioles pétioolées, trilobées; les lobes profondément divisés, incisés, dentés, aigus; les feuilles terminales moins composées, presque sessiles.

Les tiges se divisent en rameaux nombreux à leur partie supérieure, tous terminés par une fleur pédonculée, d'un jaune pâle, d'une grandeur médiocre. Les pédoncules sont inégaux, cylindriques, très-velus, presque filiformes, roides; les calices composés de cinq folioles persistantes, non réfléchies, pubescentes, lancéolées, aiguës; les pétales ovales, arrondis à leur sommet; les fruits comprimés, imbriqués, glabres, ovales, aigus, à peine recourbés à leur sommet, réunis en une tête ovale & courte.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île-de-France. ♀ (V. f. in herb. Lam. & Jusl.)

27. RENONCULE hispide. *Ranunculus hispidus*. Mich.

*Ranunculus erectus, hirsutissimus; foliis trifoliatis, foliolis acutis lobatis; caulibus infra primum pedunculum nudis, paucifloris; calice appresso.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 321.

Les tiges sont droites, très-velues; les feuilles pétioolées, alternes, composées de trois folioles velues, divisées en lobes aigus: toutes ces feuilles sont radicales: il n'en existe de caulinaires qu'à la base du pédoncule. Les fleurs sont peu nombreuses, pédonculées; leur calice fermé contre la corolle.

Cette plante croît dans les forêts ombragées de la Caroline inférieure.

28. RENONCULE flabellée. *Ranunculus flabellatus*. Desfont.

*Ranunculus caule simplici, hirsuto; foliis radicalibus flabelliformibus, inciso-lobatis; caulinis paucis, multipartitis; caule subnifloro.* Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 438. tab. 114.

Ses racines sont composées de bulbes oblongues, fasciculées, terminées par des fibres filiformes: il s'en élève une tige droite, simple, velue, haute d'environ un pied, nue inférieurement & dans la grande partie de sa longueur. Les feuilles radicales sont pétioolées, velues sur leurs pétioles,

variées dans leur forme; les unes allongées, dentées à leur sommet; d'autres lobées & incisées & quelques-unes découpées en barières aiguës, très-inégales. Il n'existe ordinairement qu'une ou deux feuilles caulinaires, à plusieurs divisions étroites, oblongues, lancéolées.

Les fleurs sont terminales, de deux à trois, quelquefois une seule, supportées par de longs pédoncules. Les folioles calicinales sont velues, ovales, oblongues; la corolle jaune, de la grandeur de celle du *ranunculus bulbosus*; les semences lisses, mucronées, réunies en une tête oblongue.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les environs d'Alger, sur les collines incultes & humides. Elle fleurit pendant l'hiver. ♀ (Descript. ex Desf.)

29. RENONCULE dorée. *Ranunculus auricomus*. Linn.

*Ranunculus foliis radicalibus reniformibus, crenatis, incisis; caulinis digitatis, linearibus; caule multifloro.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 775. — Hort. Cliffort. 229. — Flor. succ. 462. 498. — Roven. Lugd. Bat. 490. — Dalib. Paris. 167. — Leyf. Hall. 487. — Gmel. Sibir. 4. pag. 202. n°. 47. — Cranz. Austr. pag. 112. — Gort. Ingr. pag. 89. — Scop. Carn. n°. 687. — Pollich. Pal. n°. 530. — Wedd. Flor. dan. tab. 665. — Kniph. Centur. 2. n°. 67. — Hoffm. Germ. 194. — Roth. Germ. I. 238. II. 611. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 198. n°. 789. L.

*Ranunculus foliis radicalibus, integris & semiterlobatis, rotundis crenatis; caulinis multipartitis, linearibus, integerrimis.* Haller, Helv. n°. 1177.

*Ranunculus rotundifolius, vernus, silvaticus.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 341. Icon.

*Ranunculus nemorosus, seu silvaticus; foliis subrotundis.* C. Bauh. Pin. 178. — Tournef. Inst. R. Herb. 185.

*Ranunculus primus, silvestris.* Dalch. Hist. 1. pag. 1029.

*Ranunculus auricomus; ranunculus dulcis tragi.* J. Obel. Icon. 669.

*Ranunculus da'cis, nemorosus.* Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 4. tab. 28. fig. 17.

p. Idem, foliis subcarnosis, caulinis digitatis, dentatis incisis. (N.)

γ. *Ranunculus (polymorphus), foliis radicalibus, subrotundis, petiolatis; caulinis sessilibus, digitatis; foliolis integerrimis.* Ailison, Flor. pedem. tab. 82. fig. 2.

Ses racines poussent de toutes parts des fibres grêles, presque filiformes, de couleur brune: il s'en élève une tige grêle, presque simple, glabre, haute de huit à dix pouces. Les feuilles radicales

sont longuement pétiolées, très-glabres, médiocres, assez minces; les unes entières, en forme de rein, arrondies, crénelées à leurs bords; les autres à demi-divisées en trois lobes, à crénelures inégales, obtuses ou aiguës: les feuilles caulinaires intermédiaires sont profondément divisées en lanières étroites, entières, divergentes, presque digitées, sessiles; quelquefois les dernières sont simples, linéaires.

Les fleurs sont jaunes, terminales, pédonculées, peu nombreuses. Le pédoncule est légèrement pubescent à la partie supérieure; le calice glabre, coloré, concave; la corolle médiocre, remarquable par les pétales, qui ne se développent que les uns après les autres, & quelquefois avortent. Les fruits sont comprimés, ovales, un peu pubescens, surtout à leurs bords; terminés par une petite pointe recourbée, & réunis en une petite tête ovale.

Cette plante, cultivée dans des terrains gras, devient plus forte; ses feuilles sont presque charnues, plus divisées; les feuilles caulinaires digitées, lancéolées, crénelées ou dentées sur les digitations. C'est la variété  $\gamma$ . Celle notée  $\gamma$  ne me parait être également qu'une simple variété de cette espèce.

On rencontre cette plante de bonne heure au printemps, dans les bois & dans les prés un peu humides.  $\gamma$  (V. v.)

30. RENONCULE de Montpellier. *Ranunculus montellianus*.

*Ranunculus foliis tripartitis, crenatis; caule simpliciter, villosa, subnuda, uniflora*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 778. — Sauvag. Monp. 181. — Gouan, Monp. 266. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 183. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 438.

*Ranunculus saxatilis, magro flore*. C. Bauh. Pin. 182. — Prodr. 96. — Tournef. Inst. R. Herb. 251.

Cette plante est velue; ses tiges uniflores, presque nues, très-simples; les feuilles à trois lobes crénelés.

Ses racines sont composées de bulbes courtes, charnues, entremêlées de longues fibres droites, capillaires.

Les tiges sont droites, hautes d'environ un pied, point rameuses, velues, grêles, à peine triées, rarement munies de feuilles caulinaires; les radicales arrondies, pétiolées, très-velues, divisées en trois lobes élargis, crénelés à leurs bords; les caulinaires fort petites, à trois lobes lancéolés, ou simples & linéaires.

Il n'y a ordinairement qu'une seule fleur terminale, assez grande, de couleur jaune, dont le calice est composé de cinq folioles étroites, glabres, lancéolées, aiguës, colorées.

Cette plante croît dans les environs de Montpellier. Je l'ai également recueillie en Barbarie dans les environs de la Calle.  $\gamma$  (V. v.)

31. RENONCULE de Gouan. *Ranunculus Gouani*. Willd.

*Ranunculus foliis quinquelobis, dentatis; caulino sessili, palmato; laciniis lanceolatis, dentatis; caule uniflora*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1322. n°. 33.

*Ranunculus (pyrenæus), foliis radicalibus reniformibus, trilobis, quinquelobis; caulino palmato, sessili*. Gouan, Illust. 33. tab. 17. fig. 1. 2.

Cette espèce se rapproche du *ranunculus montellianus*, ainsi que du *ranunculus nivalis*; elle diffère de toutes deux par les divisions de ses feuilles.

Ses racines sont épaisses, presque noueuses, garnies de longues fibres simples, nombreuses, éparées: il s'en élève une tige haute de six à huit pouces, simple, velue, feuillée. Les feuilles radicales sont pétiolées, velues, échancrées à leur base, divisées ordinairement en cinq lobes élargis, confluents à leur base, inégaux, incisés à leur contour; les divisions pointues. Les feuilles caulinaires, au nombre de deux ou trois, sont larges, sessiles, en lobes presque palmés, & dont les divisions sont lancéolées & dentées.

La tige est terminée par une seule fleur de couleur jaune, dont le calice est coloré, les pétales oblongs, élargis vers leur sommet, à peu près de la grandeur de ceux du *ranunculus montellianus*.

Cette plante croît entre les rochers, dans les Pyrénées & les Alpes.  $\gamma$  (V. f.)

32. RENONCULE cerfeuil. *Ranunculus charophyllus*. Linn.

*Ranunculus calicibus retroflexis; pedunculis sulcatis; caule erecto, uniflora; foliis compositis, linearimultifidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 780. — Guetard, Scamp. 275. — Dalib. Parif. 166. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 762. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 199. n°. 789. LV. — Gouan, Monp. 266.

*Ranunculus foliis compositis; caule simpliciter, villosa, subnuda, uniflora; radice tuberosa*. Zinn. Goett. 129.

*Ranunculus calicibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto, radice granulosa*. Gerard, Flor. gall. prov. pag. 387. n°. 15.

*Ranunculus charophyllus, eschodeli radice*. Tournef. Inst. R. Herb. 285. — C. Bauh. Pin. 181.

*Ranunculus rennifolius, luteus, granulosa radice, saxatilis*, &c. Barrel. Icon. tab. 181.?

*Ranunculus grumosa radice, folio ranunculi bulbosi.* Bauh. Pin. 181. Prodr. 96.

*Ranunculus montanus, leptophyllus, asphodeli radice.* Colum. Ecphr. 1. pag. 312. tab. 311. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 30. fig. 44.

On distingue cette plante à ses feuilles composées, approchant de celles du cerfeuil.

Ses racines sont composées de tubercules fasciculés, entremêlés de fibres capillaires : il s'en élève des tiges simples ou rameuses, hautes de six à quinze pouces, un peu velues, striées, cylindriques. Les feuilles radicales sont couchées, longuement pétiolées, ailées, composées de folioles pinnatifides, finement découpées, vertes, glabres ; quelques-unes sont entières, arrondies & crénelées ; celles de la tige moins pétiolées ou sessiles, à découpures plus fines, moins composées.

Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules velus : les calices glabres ou un peu velus, ovales, aigus ; la corolle jaune, d'une grandeur médiocre ; les pétales ovales, un peu oblongs, arrondis. Les fruits sont comprimés, un peu convexes, pointus, à peine réfléchis à leur sommet, disposés en un épi ovale, oblong.

Cette plante varie beaucoup pour la grandeur : elle est souvent fort petite, à tige simple, uniflore, presque nue ; d'autrefois elle s'élève considérablement, se ramifie, & produit plusieurs fleurs portées sur de très-longes pédoncules droits & roides. Les folioles sont aussi plus longues.

On rencontre cette plante dans les lieux montagneux & couverts, en France, en Italie, &c. (V. f.)

33. RENONCULE millefeuille. *Ranunculus millefolius.* Desfont.

*Ranunculus foliis multifariam decompositis, linearis-fubulatis ; caule subaphyllo, villosa, pauciflora ; calicibus erectis, hirsutis.* Desfont. Flor. atlant. 201. 1. pag. 441. tab. 116.

*Ranunculus foliis supra decompositis, linearibus ; calicibus pilosis ; caule ramoso, sericeo, villosa.* Vahl. Symbol. 2. pag. 63.

Quoique rapprochée du *ranunculus cherophyllus*, cette plante s'en distingue par ses feuilles plus finement découpées, par ses pinnules beaucoup plus petites, très-aigues ; par sa corolle plus grande, & par ses calices droits & non réfléchis.

Ses racines sont composées d'un amas de tubercules fasciculés, oblongues, épaisses, fusiformes, prolongées en une pointe fibreuse, filiforme : il s'en élève une tige simple, droite, rarement ramifiée, velue, cylindrique, haute à peine d'un pied, uniflore. Les feuilles radicales sont pétiolées, plusieurs fois composées, munies de folioles

nombreuses, gâbres, inégales, fort petites, linéaires, aigues ; les pétiolés velus. Les feuilles caulinares sont rares ; elles ressemblent aux précédentes, mais elles sont bien moins composées.

Les fleurs sont terminales, foliaires : leur calice est à cinq folioles colorées, ovales, oblongues, aigues, concaves, un peu velues ; la corolle jaune, assez semblable à celle du *ranunculus lingua* pour la grandeur ; les pétales arrondis à leur sommet : les fruits un peu convexes, glabres, ovales, bordés à leur contour, terminés par une pointe crochue, réunis en un épi court, cylindrique, ovale.

Cette plante croit dans le royaume de Tunis, sur les montagnes de Siba. (V. f.)

34. RENONCULE rampante. *Ranunculus repens.* Linn.

*Ranunculus calicibus patulis ; pedunculis sulcatis, farmentis repensibus, foliis compositis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 779. — Flor. suec. 458. 505. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 206. — Crantz. Austr. pag. 114. n°. 9. — Scop. Carn. n°. 689. — Pollich. Pal. n°. 534. — Blackw. tab. 31. — Hoffm. Germ. 196. — Roth. Germ. 1. 239. II. 611. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 196. n°. 789. XLVI. — Gouan, pag. 271. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 748. — Gerard, Flor. gall. prov. 386. n°. 12.

*Ranunculus foliis ternatis ; foliolis petiolatis, trifidis, medio productiore ; caule multifloro.* Hort. Cliff. 230. — Gronov. Virg. 166. — Roeyen, Lugd. Bat. 421.

*Ranunculus caule reptante, radicato ; foliis semitriobatis, lobis petiolatis.* Hall. Helv. n°. 1173.

*Ranunculus pratensis, repens, hirsutus.* C. Bauh. Pin. 179. — Tourn. Inst. R. Herb. 189. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 28. fig. 18.

*Ranunculus pratensis, etiamque hortenfis ; reptante cauliculo.* Lobel. Icon. 664.

*Ranunculus hortenfis primus.* Dod. Pempt. 425. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 1031. Icon.

*Ranunculus repens, flore luteo, simpliciter.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 419. Icon.

Vulgairement le basilinet.

1. *Ranunculus pratensis, erectus, dulcis.* Tourn. Inst. R. Herb. 189. — C. Bauh. Pin. 179. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 28. fig. 17.

*Ranunculus dulcis, harrachium saluterum.* Tabern. 51. Icon.

2. *Idem, flore minore, calice subreflexo, caulibus subrepentibus.* (N.)

Cette plante se distingue en ce qu'elle pousse de la racine un assez grand nombre de rejets rampans, & que ses tiges elles-mêmes sont quelquefois

fois couchées en partie, mais souvent relevées, droites, hautes d'un pied, plus ou moins velues, rameuses, munies de racines assez longues, fibreuses, un peu épaisses, qui produisent de leur collet des feuilles radicales, grandes, longuement pétiolées, presque ailées, composées de folioles anguleuses, lobées, incisées & dentelées, d'un vert foncé, glabres, quelquefois veinées ou parsemées de taches blanchâtres. Les feuilles supérieures, moins composées, sont, surtout les dernières, partagées en lobes lancéolés, linéaires, entiers. Les feuilles florales sont simples, très-étroites, aiguës.

Les fleurs sont peu nombreuses, terminales, soutenues par des pédoncules fillonnés, à peine pubescens, plus ou moins longs. Le calice est glabre, coloré, à cinq folioles ovales, obtuses; la corolle d'un beau jaune, assez grande; les fruits comprimés, ovales, aigus, un peu velus à leur contour, réunis en une tête ovale, presque ronde.

Cette plante croît dans les prés, les lieux cultivés; elle est assez commune. (V. v.)

Elle a très-peu d'âcreté, & même, dans certaines contrées, on la mange comme herbe potagère: cependant elle est incommode dans les prairies par ses rejets rampans, quoique les chevaux & les chèvres ne la dédaignent pas.

La plante s'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline; elle ne me parait différer du *ranunculus repens* que par ses fleurs plus petites, ses calices presque réfléchis: ses tiges sont en partie couchées, mais je n'y ai point remarqué de rejets rampans.

### 35. RENONCULE couchée. *Ranunculus prostratus*.

*Ranunculus foliis villosis, minimis, trilobis, incisis; caudibus prostratis, subflexuosis.* (N.)

C'est une petite espèce, qui a des rapports avec le *ranunculus repens*; mais, outre la petitesse, elle en diffère encore par ses tiges toutes couchées, même pendant le tems de la floraison. Elles sont velues, grêles, un peu flexueuses, garnies de feuilles très-petites, pétiolées, velues à leurs deux faces, divisées en trois lobes un peu ovales, arrondis, crénelés ou incisés à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, semblables à celles du *ranunculus repens*; d'un beau jaune. Le calice est glabre, à cinq folioles ovales, aiguës; les pétales ovales, arrondis. Je ne connois pas les fruits.

M. Lamarck avoit déjà mentionné cette plante dans sa *Flora française*, à l'article du *Ranunculus repens*, vol. 2, pag. 196. Je l'ai vue dans son herbier, & j'ai cru, comme lui, qu'elle devoit être distinguée comme espèce.

Botanique. Tome VI.

Cette plante croît dans les lieux secs & montagneux, aux environs de Paris. (V. f.)

### 36. RENONCULE à feuilles luisantes. *Ranunculus lucidus*.

*Ranunculus foliis tri feu quingelobis, subpinnatifidis, lucidis; caule erecto, calicibus reflexis.* (N.)

Cette plante a quelques rapports avec le *ranunculus repens*, dont elle diffère par ses tiges toutes redressées, & par ses calices réfléchis, ainsi que par ses feuilles à lobes plus courts, plus élargis.

Ses tiges sont hautes d'un à deux pieds, très-glabres, rendres, striées, rameuses, feuillées. Les feuilles sont pétiolées, alternes, très-ouvertes ou écartées des tiges, glabres, luisantes, & comme vernissées à leur face supérieure, divisées en trois ou cinq lobes distans, élargis, les deux inférieurs rétrécis à leur base, inégalement incisés, obtus. Les pétioles sont longs, presque pubescens, élargis à leur base en une large membrane.

Les fleurs sont nombreuses, frisées à l'extrémité des rameaux & dans leur bifurcation, supportées par de longs pétioles un peu pubescens, cylindriques, simples, uniflores. Les folioles calicinales sont glabres, colorées, concaves, réfléchies après l'épanouissement des fleurs; la corolle d'un beau jaune luisant; les pétales ovales, presque arrondis, assez grands.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On la soupçonne originaire du Levant. (V. f.)

### 37. RENONCULE oxyperme. *Ranunculus oxyspermus*. Willd.

*Ranunculus foliis radicalibus oblongis, obtusis, sinuato-dentatis; caulibus sessilibus, digitatis, incisis; seminibus aristatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1328. n°. 51.

*Ranunculus oxyspermus* Morcheilli. Stephan. in Litt.

Ses tiges sont droites, rameuses, pileuses, hautes d'un pied & plus; les feuilles radicales pétiolées, ovales, obtuses, inégalement sinuées & dentées, couvertes de poils à leurs deux faces, ainsi que les pétioles; les feuilles caulinaires sessiles, digitées; les inférieures inégalement pinnatifides; les supérieures linéaires, très-entières. Les fleurs ont leur calice réfléchi, leur corolle jaune, de la grandeur de celle du *ranunculus bulbosus*; leurs semences comprimées, subulées, terminées par une longue pointe droite, réunies en une tête elliptique.

Cette plante se rencontre dans la Sibirie, sur les bords du fleuve Terreck. (Description ex Willd.)

38. RENONCULE fasciculée. *Ranunculus polyrrhizos*. Willd.

*Ranunculus foliis radicalibus palmatis; caulinis sessilibus, digitatis; caule multifloro, radice fasciculata*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1324. n°. 42.

*Ranunculus polyrrhizos*. Stephan. in Litt.

Ses racines font abondantes, fasciculées: il s'en élève deux ou trois tiges droites, hautes de trois à quatre pouces, pubescentes, presque simples. Les feuilles 12 radicales, assez semblables à celles du *ranunculus sceleratus*, sont divisées en trois lobes principaux: les deux latéraux se soudifient en deux autres tridentés à leur sommet, cunéiformes à leur base. Les feuilles caulinaires sont sessiles, digitées en forme de coin, à découpures linéaires obtuses, très-entières.

Les fleurs sont terminales, au nombre de deux ou quatre, supportées par de très-longes pédoncules simples, cylindriques, un peu pubescens, point striés. Les folioles calicinales sont glabres, colorées, ouvertes, obtuses; la corolle jaune, de la grandeur de celle du *ranunculus flammula*; les fruits ovales, lisses, comprimés, terminés par une pointe obtuse, & réunis en une petite tête arrondie.

Cette plante croît dans la Sibérie. (Description ex Willden.)

39. RENONCULE de Cappadoce. *Ranunculus cappadocius*. Willd.

*Ranunculus calicibus patulis, pedunculo tereti, caule subfido; foliis cordatis, trilobis, dentatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1326. n°. 46.

*Ranunculus orientalis, dulcis, doronic radice*. Tournef. Coroll. 20.

Ses racines sont dures, de la grosseur d'une plume d'oie, semblables à celles du *doronicum*; elles produisent une tige haute de six à sept pouces, simple ou dichotome, couverte de poils couchés. Les feuilles radicales sont presque rondes, échancrees en cœur à leur base, à trois lobes courts; acuminées, munies de quelques dents larges, garnies à leurs deux faces de poils couchés. Il n'existe ordinairement qu'une seule feuille caulinare pétiolée, assez semblable aux radicales; & une autre sessile, petite, lancéolée, très-entière, située sur le milieu du pédoncule.

Les fleurs sont foliaires: très-souvent il n'y en a qu'une seule, quelquefois deux, portées sur des pédoncules qui se bifurquent à l'extrémité de la tige. La corolle est jaune, de la grandeur de celle du *ranunculus polyanthemus*. Les fruits sont comprimés, terminés par une pointe crochue, & réunis en une petite tête arrondie.

Cette plante croît dans le Levant, en Cappadoce. (Description ex Willden.)

40. RENONCULE âcre. *Ranunculus acris*. Linn.

*Ranunculus calicibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, summis linearibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 779. — Flor. suec. 466. 567. — Dalib. Paris. 164. — Gmel. Sibir. 4. pag. 206. n°. 53. — Scop. Carn. pag. 690. — Pollich. Pal. n°. 336. — Hoffm. Germ. 156. — Knorr. Delic. 1. tab. H. 1. — Roth. Germ. I. pag. 239. II. 616. — Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 199. n°. 789. LIII. — Ger. Em. 951. fig. 2.

*Ranunculus foliis peltatis, quinquangularibus, multipartitis; laciniis linearibus, caule multifloro*. Hort. Cliff. — Roy. Lugd. Bar. 492.

*Ranunculus foliis hirsutis, semitriobatis; lobis lateralibus bipartitis; laciniis caulinis semitriobatis*. Haller, Helv. n°. 1169.

*Ranunculus foliis inferioribus tri-quinque & partito-multifidis, superioribus linearibus lanceolatis, sessilibus, integerrimis*. Neck. Gallob. pag. 239.

*Ranunculus pratensis, cretulus, acris*. C. Bauh. Pin. 178. — Flor. lapp. 228. — Tournef. Infr. R. Herb. 289.

*Ranunculus reclus, non repens; flore simplici, luteo*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 416. Icon.

*Ranunculus pratensis, forrestii cauliculis*. Lobel. Icon. 665. — Idem, Observ. 379.

*Ranunculus hortensis seuendus*. Dodon. Pempt. 426. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 1032. Icon.

*Ranunculus napellifolius*.? Crantz, Austr. pag. 114. n°. 10. tab. 4. fig. 1.

*Ranunculus pratensis, cretulus, acris & maculatus*. C. Bauh. Pin. 179. — Tournef. Infr. R. Herb. 289.

*Ranunculus alterius speciei, maculis notata*. Trag. 95. Icon.

Vulgairement la grenouillette.

g. *Ranunculus hortensis, cretulus; flore pleno*. C. Bauh. Pin. 179. — Knorr. Delic. 1. tab. H. 2.? An Ran. polyanthemii varietas?

Vulgairement le bouton d'or.

Cette plante a des racines fibreuses, presque fasciculées, d'où s'élèvent quelques tiges droites, hautes de huit à dix pouces & plus, stériles, à peine velues, point striées, médiocrement rameuses. Les feuilles radicales sont pétioolées, quelquefois maculées, divisées en trois ou cinq lobes principaux, soudifiées en plusieurs autres bien moins profonds, ovales ou linéaires, incisées & dentées à leur sommet, presque glabres, supportées par des pétioles lisses, sans luites, comprimés. Les feuilles supérieures sont moins composées, digitées ou divisées en cinq ou trois lanières étroites, entières, sessiles.

Les fleurs sont peu nombreuses, pédonculées, terminales. Leur calice est composé de cinq folioles ovales, larges, obtuses, glabres, colorées; la corolle d'un beau jaune, d'une grandeur médiocre & variable; les pétales ovales, élargis & arrondis à leur sommet. Les fruits sont glabres, comprimés de couleur brune, ovales, aigus, terminés par le style persistant, recourbé, & qui conserve assez long-tems sa couleur jaune.

La variété  $\mu$  se cultive dans les jardins, comme plante d'ornement, sous le nom de *bouton d'or*. Ses fleurs sont doubles, les feuilles plus divisées. Au reste, cette espèce a tant de rapports avec le *ranunculus polyanthemus*, qu'on pourroit aussi bien y rapporter la plante de nos jardins.

On rencontre cette plante partout dans les prés, les pâturages & les champs.  $\gamma$  (V. v.)

Elle est d'une grande acréte; on l'emploie quelquefois comme vésicatoire, surtout dans les fièvres intermittentes; mais il faut être bien circonscrit dans l'usage même extérieur que l'on fait de ces plantes vénéneuses, qui peuvent occasionner de grands défordres, exciter des ulcères, occasionner la gangrène, changer la fièvre intermittente en continue, avec délire. Les chèvres & les moutons mangent cette plante malgré son acréte, mais les autres bestiaux n'en veulent pas.

41. RENONCULE multiflore. *Ranunculus polyanthemus*.

*Ranunculus calicibus patulis, pedunculis sulcatis, caule erecto, foliis multipartitis*. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 779. — Flor. suec. 467. 506. — Scholl. Barb. n°. 447. — Pollich, Pal. pag. 535. — Marrusch, Sil. n°. 412. — Derr. Nass. pag. 194. — Hoffm. Germ. 196. — Roth. Germ. 1. 239. II. 616.

*Ranunculus ramosus, multiflorus; foliis semi-septilobis; lobis tridentatis, acutis*. Hall. Helv. 1171.

*Ranunculus foliis inferioribus peltatis, tri-quadrifido-multifidis; caulibus linearibus, subdenticulatis, sessilibus*. Necker, Gallob. pag. 240.

*Ranunculus polyanthemus simplex*. Lobel. Icon. 666. — Idem, Observ. 380. Ic. — Tournef. Infl. R. Herb. 289.

*Ranunculus silvestris*. Tabern. Ic. 42. Hist. 117.

*Ranunculus silvestris secundus*. Dodon. Pempt. 427. Icon.

Il y a de tels rapports entre cette plante & le *ranunculus acris*, qu'on pourroit bien ne la regarder que comme une variété plus grande. Nous y trouvons cependant des caractères assez constants & suffisants pour aider à la distinguer, tels que son calice velu, ses tiges striées & ses feuilles plus velues, de sorte qu'elle tient le milieu entre le *ranunculus acris* & le *ranunculus lanuginosus*.

Ses racines sont fibreuses; les fibres simples, un peu charnues; les tiges quelquefois un peu courbées à leur base, droites, hautes d'environ deux pieds, velues, rameuses, fistuleuses. Les feuilles radicales sont longuement pétiolées, assez grandes, un peu velues, souvent marquées d'une raie noirâtre dans leur centre, divisées en trois & quelquefois cinq lobes jusque vers leur base, chacun d'eux soudé à moitié en trois autres lobes incisés, aigus, les grands lobes ordinairement cunéiformes; les feuilles caulinaires, assez semblables aux radicales, plus petites, & les supérieures presque sessiles, à découpages profondes & linéaires. Les pétiols sont striés, velus, surtout à leur base élargie en une gaine qui embrasse la tige.

Les fleurs sont terminales, nombreuses, solitaires sur de longs pédoncules presque filiformes. Les calices sont velus, un peu blanchâtres; la corolle jaune, d'une grandeur médiocre; les fruits convexes à leurs deux faces, presque orbiculaires, à peine surmontés d'une petite pointe droite, obuse, réunis en une tête globuleuse.

Cette plante croît dans les prés & les champs; elle se double facilement, & paroît avoir les mêmes propriétés que le *ranunculus acris*.  $\gamma$  (V. v.)

42. RENONCULE bulbeuse. *Ranunculus bulbosus*. Linn.

*Ranunculus calicibus retroflexis, pedunculis sulcatis; caule erecto, multifloro; foliis compositis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 778. — Flor. suec. 469. 504. — Dalib. Parif. 165. — Pollich, Pal. n°. 533. — Scop. Car. n°. 692. — Hoffm. Germ. 195. — Kniph. Centur. 7. n°. 74. — Oeder. Flor. dan. tab. 551. — Roth. Germ. 1. 239. II. 614. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 194. n°. 789. XXXVIII. — Desfont. Flor. atlant. vol. 6. pag. 439. — Miller, Illustr. Icon. — Balliard, Herb. tab. 27. — Currie, Lond. Icon.

*Ranunculus radice simplici globosa*. Hort. Cliffort. 230. — Royen, Lugd. Bar. 491.

*Ranunculus radice subrotunda, foliis hirsutis, semiretibus, lobis petiolatis, acutis serratis*. Haller, Helv. n°. 1174.

*Ranunculus calicibus retroflexis; radice simplici, globosa*. Crantz, Stirp. Austr. pag. 114. n°. 8.

*Ranunculus (bulbosus), radice bulbosa, foliis radicalibus trifoliatis, foliolis variegatis incisis; pedunculis elongatis, sulcato-friatis, unisporis; calice viloso, reflexo; capsulis leniformibus, globoso-capitatis*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 321.

*Ranunculus pratensis, radice verticilli, modo rotunda*. C. Bauh. Pin. 179. — Tournef. Infl. R. Herb. 289.



*Ranunculus tuberosus*, major. J. Bauh. Hist. 3. pag. 415. Icon.

*Ranunculus tuberosus*. Dodon. Pempt. 43 t. Icon. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 1034. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 28. fig. 19. *Medicinis*.

*Ranunculus bulbosus*. Lobel. Icon. 667. — Idem. Observ. 380. Icon.

*Crus galli*. Brunfeld. t. pag. 125. Icon.

*Ranunculi tertia species*. Fusch. Hist. 160. Icon.

*Ranunculus quintus*. Matth. Comment. 459. Icon.

*Ranunculus minor*. Tabern. Icon. 41.

*Ranunculus pratensis*, radice verticilli, modò rotundâ, minor. Tournef. Infl. R. Herb. 289. — C. Bauh. Pin. 179.

8. *Ranunculus tuberosus*, flore multiplici. Dodon. Pempt. 43 t. Icon.

*Ranunculus magnus*, anglicus polyanthos. Lobel. Icon. 666.

*Ranunculus radice tuberosâ, flore pleno & prolifero*. Tournef. Infl. R. Herb. 290.

*Ranunculus maximo tubere; flore magno, pleno*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 418. Icon.

Cette espèce est reconnaissable à ses calices tout-à-fait réfléchis sur leur pédoncule, à ses racines rondes & bulbueuses, d'où s'échappent, de leur partie inférieure, un grand nombre de fibres longues, droites, simples, un peu charnues.

Les tiges s'élèvent à la hauteur de huit à dix pouces, & parviennent souvent à plus d'un pied. Elles sont droites, un peu couchées dans leur jeunesse, un peu rameuses, médiocrement velues, garnies de feuilles pétiolées, glabres ou velues, les radicales & inférieures divisées en trois parties, quelquefois en trois folioles bien distinctes: chacune de ces folioles est ou à demi-découpée en trois lobes, ou profondément incisée, crénelée & dentée à son sommet, d'un vert noirâtre, quelquefois marquée de taches blanches. Les feuilles supérieures sont presque sessiles, à découpures plus étroites, linéaires.

Les fleurs sont terminales, solitaires, peu nombreuses, portées sur de longs pédoncules pubescents. Le calice est légèrement hispide, à cinq folioles concaves, ovales, colorées, rabateuses quand la fleur est entièrement épanouie; la corolle d'un beau jaune. Les fruits forment une petite tête globuleuse.

On trouve cette plante partout dans les prés, le long des haies; elle devient quelquefois très-grande, selon les localités, & se double souvent. \* (V. v.)

Cette plante est fort dangereuse à cause de son

âcreté & de son extrême causticité. On s'en sert, dans quelques pays, pour faire pètir les rats: les mendians s'en froient les jambes pour se faire des petites ulcères & exciter la commisération publique. Les moutons la mangent sans en être incommodés, mais les vaches n'en veulent point. On se sert de sa racine comme vésicatoire.

« Je me suis souvent servi de cette plante, dit M. Villars, au lieu de mouches cantharides, qui quelquefois manquent dans certains endroits reculés. Son effet est moins prompt, mais aussi sûr, pourvu qu'on se serve de la racine. Elle est plus active dans le printemps, & il ne faut alors la laisser que quatre ou six heures. Si on la laisse plus longtemps, elle attaque la peau & occasionne une plaie durable. Il n'est pas rare aussi de voir la plaie s'élargir avant même qu'il se soit écoulé aucune sérosité. Elle commence à mordre sur les bords avant que d'arracher le milieu, où la peau se trouve encore entière au bout de vingt-quatre heures, tandis que les bords, même au-delà de la partie que couvrait le corréosif, se trouvent couverts de flicaines le même jour. »

43. RENONCULE du Japon. *Ranunculus japonicus*. Thumb.

*Ranunculus foliis inciso-ternatis; lobis ineis, dentatis, cauleque hispidis*. Thumb. Act. Soc. lin. Lond. 2. pag. 337.

*Ranunculus japonicus*. Thumb. Flor. jap. p. 24 t.

Ses tiges sont flexueuses, striées, velues, à peine feuillées, divisées à leur extrémité en plusieurs rameaux qui deviennent des pédoncules. Les feuilles radicales sont arrondies; les supérieures laciniées, à découpures lancéolées, toutes à trois divisions incisées, dentées, aiguës, velues à leurs deux faces: les pétiolés sont très-velus, & varient de longueur depuis un pouce jusqu'à un pied.

Cette plante croît au Japon. (Descript. ex Thumb.)

44. RENONCULE moyenne. *Ranunculus intermedius*.

*Ranunculus foliis inferioribus trilobatis, incisâ; superioribus subdigitatis, pedunculis subsolitariis, calicibus reflexis, radice fibrosâ, seminibus glabris*. (N.)

*Ranunculus* (pumilus), totus pubescens, humillimus, caespitosus; foliis trilobis; pedunculis terminalibus, subsolitariis, elongatis; calice reflexo. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 277. n°. 16.

Cette plante paroît tenir le milieu entre le *ranunculus bulbosus*, dont elle a les calices réfléchis sans avoir de bulbes aux racines, & le *ranunculus repens*.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées: il s'en élève plusieurs tiges basses, presque simples, peu

feuillées (excepté à leur base), foibles, striées, légèrement velues, souvent dichotomes à leur partie supérieure; garnies de feuilles radicales longuement pétiolées, presque glabres, divisées en trois lobes arrondis, souvent incisés; les feuilles caulinaires à trois lobes linéaires ou lancéolés, irréguliers; les feuilles supérieures très-étroites, presque digitées.

Les fleurs sont axillaires ou terminales, au nombre de deux ou trois au plus sur chaque rameau, portées par de longs pédoncules simples, filiformes, très-longs, presque glabres. Les calices sont colorés, concaves, chargés de quelques poils fins, très-longs, réfléchis à l'époque de la floraison; la corolle médiocre, d'un beau jaune; les pétales striés. Les fruits sont glabres, comprimés, obronds, entourés d'un bourrelet verdâtre, réunis en une petite rete ovale ou globuleuse.

Cette plante croît aux environs de Paris, sur le bord des mares de la Belle-Croix, à Fontainebleau. (V. v.)

Cette espèce a encore beaucoup de rapports avec notre *ranunculus prostratus*.

#### 45. RENONCULE scélérat. *Ranunculus sceleratus*.

*Ranunculus foliis inferioribus, palmatis, summis digitatis, frutibus oblongis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 776. — Hort. Cliff. 230. — Flor. Suec. 463. 499. — Roy. Lugd. Bat. 490. — Gronov. Virg. 63. — Dalib. Paris. 167. — Gmel. Sibir. 4. pag. 203. tab. 83. fig. 2. — Gunn. Norweg. n. 84. — Scop. Carn. n. 688. — Pollich, Pal. n. 531. — Derr. Naff. p. 193. — Eder. Flor. dan. tab. 371. — Hoffm. Germ. 194. — Roth. Germ. I. 238. II. 612. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 197. n. 789. XLIX. — Gerard, Flor. gall. prov. pag. 385. — Gouan, Monsp. 269.

*Ranunculus foliis levibus, semi-trilobatis, rotundis ferratis; fructu ovato.* Hall. Helv. n. 1175.

*Ranunculus fructu oblongo, impatient.* Crantz, Stirp. Austr. pag. 111.

*Ranunculus palustris.* Tabern. 42. — Blackw. tab. 259.

*Ranunculus palustris, apii folio, levis.* C. Bauh. Pin. 180. — Tourn. Inf. R. Herb. 291. — Magn. bot. 207. — Hort. 168.

*Ranunculus silvestris, primus.* Dod. Pempt. Icon.

*Ranunculus palustris, flore minimo.* J. Bauh. Hist. 3. Append. pag. 878. Icon.

*Ranunculus palustris, rotundioris folio.* Lobel. Ic. 669. — Idem, Observ. 382. Icon.

*Ranunculus primus Matthioli.* Dalech. Hist. vol. 2. pag. 1027.

*R. Ranunculus palustris, apii folio, levis; flore purpureo.* C. Bauh. Pin. 180. — Tourn. Inf. R. Herb. 291.

*Ranunculus palustris, floribus purpureis.* Valer. Cord. pag. 119 verso. Icon.

Cette espèce se distingue aisément par ses feuilles, mais plus particulièrement par les petites fleurs & par les semences très-petites, globuleuses, disposées en un épi ovale.

Ses racines sont fibreuses, ses tiges droites, hautes d'un à deux pieds, glabres, tendres, creuses, épaisses, très-lisses. Les feuilles radicales sont pétiolées, glabres, d'un vert jaunâtre, un peu arrondies, à demi-divisées en trois lobes incisés & crénelés. Les feuilles caulinaires ont des découpures plus profondes, plus étroites & quelquefois presque digitées ou palmées; les supérieures sessiles.

Les fleurs sont nombreuses, petites, terminales, supportées par des pédoncules filiformes, inégaux. Les folioles calicinales sont ovales, obtuses, concaves, légèrement pubescentes & colorées. La corolle est d'un jaune-pâle, purpurine dans la variété *f.*, un peu plus grande que le calice. Les ovaires se développent aussitôt l'épanouissement des pétales, qu'ils surpassent bientôt en grandeur; ils se convertissent en un épilongé, cylindrique, ovale, obtus. Les semences sont glabres, nombreuses, presque orbiculaires, fines, fort petites, un peu comprimées latéralement, & tombent aisément.

Cette plante est commune dans les marais, sur le bord des eaux & des étangs. (V. v.)

Cette plante est acre & très-caustique; elle brûle & enflamme la peau, qu'il suffit cependant de laver avec beaucoup d'eau lorsque ce topique n'a pas séjourné long-temps, car autrement il ulcère la peau en trois ou quatre heures; il pourroit même produire la gangrène si son application durait plus long-temps. « Cette plante, dit M. Durande, prise intérieurement, cause des anxiétés, des douleurs d'estomac insupportables, des syncopes, des convulsions, la gai grène; en un mot, tous les accidents que peut produire un poison caustique. Elle est dangereuse dans les prairies, où elle se montre dès que celles-ci deviennent marécageuses; cependant les chèvres & les moutons la mangent, mais les vaches & les chevaux n'en veulent pas. »

#### 46. RENONCULE agriote. *Ranunculus agrarius*.

*Ranunculus villosus, foliis inferioribus trilobatis; lobis subrotundis, crenatis; caulibus distichis, pinnatifidis; ramis numerosis, erectis; calicibus reflexis.* (N.)

Cette espèce a quelques rapports extérieurs avec le *ranunculus sceleratus*; mais elle en est bien distincte par sa corolle ample, ses calices réfléchis, & par les poils abondants dont toutes ses parties

sont recouvertes : elle a aussi beaucoup de rapports avec le *ranunculus philonotis*, dont elle n'est peut-être qu'une variété ; mais ne connoissant cette dernière que d'après les descriptions, je ne peux avoir aucune certitude sur leur identité. D'ailleurs, celle-ci n'en présente point tous les caractères.

Ses racines sont fibreuses, épaisses, fasciculées, garnies de chevelus filiformes : il s'en élève des tiges nombreuses, tendres, hautes de six à huit pouces, très-velues, divisées presque dès leur base en rameaux nombreux, droits, rapprochés. Les feuilles radicales sont pétiolées, divisées en trois lobes séparés, peu écartés, presque arrondis, crénelés à leurs bords. Les feuilles inférieures & caulinaires sont pinnaïfides ; les pinnales courtes, incisées, lancéolées, aiguës, presque en coin à leur base, velues & pétiolées ; les supérieures laciniées, presque en corne de cerf.

Les fleurs sont nombreuses, portées par des pédoncules droits, velus, allongés, uniflores. Les calices sont presque globuleux, colorés, réfléchis ; la corolle d'un beau jaune, assez grande ; les pétales élargis, arrondis ; les fruits un peu comprimés, bordés, canaliculés à leur contour, marqués à leurs deux faces d'un rang circulaire de petits tubercules.

Cette plante croît sur le Mont-Cénis & dans les environs de Turin. (V. J. Comm. Bosc.)

#### 47. RENONCULE sardonique. *Ranunculus sardous*. Crantz.

*Ranunculus annuus, foliis subvillosis, trilobis, pallidis ; caulibus ternatis, calicibus reflexis.* Vill.

*Ranunculus pallidior.* Vill. Dauph. vol. 3. p. 751. n°. 25.

*Ranunculus (sardous), foliis radicalibus, apii trilobis, fructu rotundo.* Crantz, Stirp. Austr. pag. 111. n°. 2.

*Ranunculus palustris, apii folio, lanuginosus.* C. Bauh. Pin. 180. Tourn. Inst. R. Herb. 291.

*Ranunculus secundus.* Matth. Comm. 611. — Camer. Epitom. 381. Icon.

*Ranunculus, secunda species, vel sardous.* Valer. Cord. Hist. fol. 119 verso.

*Ranunculus palustris, &c. folio lanuginoso, sardonius.* Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 29. fig. 27 & 28.

Cette espèce a de grands rapports avec le *ranunculus sceleratus*. Il m'a paru néanmoins qu'on pouvoit l'en distinguer, ainsi que l'ont fait plusieurs auteurs, particulièrement Crantz & Villars, qui ont très-probablement parlé de la même plante, quoique sous des noms différens. Je crois aussi qu'il convient de retrancher de la synonymie la

phrase de J. Bauhin (*Ranunculus rebus, foliis pallidioribus, hirsutis*), citée par M. Villars.

Quoi qu'il en soit, cette espèce se distingue du *ranunculus sceleratus* par ses feuilles plus larges, plus divisées, velues ; par ses fleurs un peu plus grandes, & par ses épis bien plus courts, & sur lesquels les semences sont bien plus attachées. Les calices sont lanugineux, réfléchis, colorés ; la corolle d'un jaune luisant ; les semences fort petites, comprimées, terminées à leur sommet par une petite pointe droite, aiguë, qui n'existe pas dans le *ranunculus sceleratus*.

Cette plante croît sur le bord des étangs, dans les marais, en Autriche, dans l'île de Sardaigne & dans les départemens méridionaux de la France. ○

#### 48. RENONCULE philonote. *Ranunculus philonotis*. Retz.

*Ranunculus calicibus demum reflexis, setosis ; pedunculis sulcatis ; foliis tripartitis, inciso-lobatis, hirsutis ; fructu subgloboso.* Retzius, Prod. Flor. scand. edit. 2. n°. 653. — Idem, Observ. 6. pag. 31. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1324. n°. 41.

*Ranunculus (philonotis), radice fasciculata, herb. pilosa ; caule erecto, ramoso ; foliis ternatis, foliolis trilobis ; lobis crenato-incisis, apicibus puncto albo terminatis ; pedunculis sulcatis, calice reflexo, fructu globoso ; seminibus compressis, acuminatis.* Ehrh. Beitr. 2. pag. 145. — Hoffm. Germ. 194.

*Ranunculus (hirsutus), radice fibrosa, annua ; caule hirsuto ; calicibus papilloso-hispidis, acuminatis, demum reflexis.* Aiton, Hort. Kew. 2. pag. 268. — Curtis, Lond.

*Ranunculus rebus, foliis pallidioribus, hirsutis.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 417. fig. 3. — Petiv. tab. 38.

Cette espèce seroit-elle la même que le *ranunculus sardous* ? Crantz. Elle paroît avoir avec elle beaucoup d'affinité, & exige, sous ce rapport, un examen particulier de la part de ceux qui pourront l'observer. Elle doit être aussi rapprochée de notre *ranunculus agrarius*.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées : il s'en élève des tiges droites, rameuses, très-velues. Les feuilles radicales sont pétolées, ternées, à trois folioles velues ; divisées en trois lobes crénelés, incisés ; chaque créoleure terminée à son sommet par un point blanc. Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules filonnés ; les calices composés de cinq folioles velues, soyeuses, réfléchies ; les fruits comprimés, acuminés, réunis en une tête globuleuse.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux humides & marécageux. ○

*Observations.* Je n'ai pas osé réunir les trois espèces que je viens de décrire, ne connoissant ni le *ranunculus phlonois*, ni le *ranunculus sardous*. Il m'a paru qu'il existoit des différences entre ces deux espèces & notre *ranunculus agrarius*. Il est cependant très-possible que ce ne soit que la même espèce un peu variable.

49. RENONCULE à feuilles de platane. *Ranunculus platanifolius*, Linn.

*Ranunculus foliis quinquelobis, dentatis; lobis obtusis, intermediis trifidis; floralibus summis digitatis, fissilibus, linearifolubatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1316. n°. 22.

*Ranunculus foliis palmatis, levibus, incisfis; caule erecto, bracteis linearibus.* Linn. Manif. 79. — Eder. Flor. dan. tab. 111. — Gouan, Illustr. 35. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 734. n°. 10. — Gouan, Monsp. 270. Var. 8.

*Ranunculus montanus, aconitifolio; flore majore.* C. Bauh. Pin. 182. — Tournef. Inst. R. Herb. 150.

*Ranunculus montanus, albus.* Dalech. Hist. vol. 1. pag. 1031. Icon.

*Ranunculus albus, flore simplici, seu batrachium album.* Tabern. 43. Icon.

*Ranunculus albus, flore simplici.* Lobel. Icon. 668. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 859. Icon.

*Ranunculus flore albo.* Dodon. Pempt. 429. Icon.

*Ranunculus montanus, quartus.* Clus. Hist. 1. p. 236. — Idem, Pann. 370. Icon.

*Ranunculus albus floribus, tertius; foliis magnis platani, circa latices.* Gesn. Hort. 275.

Il existe entre cette plante & le *ranunculus aconitifolius*, de tels rapports, que plusieurs auteurs les ont réunis : il est en effet assez difficile de les bien distinguer, même dans la Nature, & bien plus difficile encore de rapporter avec exactitude la synonymie qui convient à ces deux plantes.

Quoi qu'il en soit, on les distingue par des caractères qui ne permettent pas de les confondre s'ils étoient confus. Dans celle dont il s'agit ici, les lobes des feuilles inférieures sont connivens à leur base, les pétales plus grands, les tiges plus élevées. C'est d'ailleurs une très-belle plante, dont les racines font fibreuses, épaisses, fasciculées, & qui s'élève à la hauteur de deux à trois pieds sur une tige ferme, rameuse, pubescente ou presque glabre; un peu anguleuse, cannelée, feuillée. Les feuilles radicales font pétiolées, amples, planes, légèrement velues, divisées en cinq grands lobes presque palmés, aigus, irréguliers, ordinairement trifides, incisés & dentés. Les feuilles supérieures sont sessiles, semblables aux précédentes, mais moins amples; les terminales presque simples, linéaires, aiguës.

Les fleurs sont assez nombreuses, terminales, portées sur des pédoncules communs, très-longs, grêles, qui se divisent en deux ou trois autres filiformes, uniflores, & qui forment par leur réunion une sorte de panicule étalée. Leur calice est muni de quelques poils fins & longs, composé de cinq folioles très-caduques, larges, obtuscs, concaves, colorées, un peu purpurines. La corolle est d'un blanc de neige, assez grande; les pétales ovales, oblongs, arrondis à leur sommet; les fruits peu nombreux, assez gros, réunis en une petite tête arrondie.

Cette plante croît sur les montagnes & dans les bois ombragés, au Puy-de-Dôme & dans les départemens méridionaux de la France, à la Grande-Chartreuse, dans les environs de Gap, d'Embrun, &c. (V. f.)

50. RENONCULE à feuille d'aconit. *Ranunculus aconitifolius*, Linn.

*Ranunculus foliis quinquelobis, dentatis; foliis acuminatis, intermediis trifidis; floralibus summis digitatis, fissilibus, lanceolatis.* Willd. Spic. Plant. vol. 2. pag. 1316. n°. 21.

*Ranunculus foliis, omnibus quinatis, lanceolatis, ineisfo-ferratis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 776. — Hort. Cliff. 229. — Hort. Upt. 156. — Flor. succ. 2. n°. 497. — Roy. Lugd. Bat. 490. — Scop. Carn. n°. 680. — Pallas, Itin. 2. pag. 568. — Crantz, Stirp. pag. 112. n°. 4. — Pollich, Pal. n°. 532. — Matulich, Sil. n°. 409. — Hoffm. Germ. 195. — Roth. Germ. 1. 238. II. 613. — Lamarck, Flor. fr. vol. 3. pag. 188. n°. 789. XIX. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 735. n°. 11. — Gouan, Monsp. 269. n°. 8.

*Ranunculus caule ramoso, multifloro; foliis venosis, quinquelobis; lobis rhomboides, acutis, acutis ferratis.* Haller, Helv. n°. 1164.

*Ranunculus albus, folio denso.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 860.

*Ranunculus montanus, aconiti folio, albo; flore minore.* C. Bauh. Pin. 182. — Tournef. Inst. R. Herb. 290.

*Ranunculus montanus quartus.* Clus. Hist. 1. pag. 236. — Idem, Pann. 370. Icon.

*Ranunculus aconitum batrachoides.* Lobel. Icon. 668. fig. Bana.

8. *Ranunculus folio aconiti; flore albo, multiplici.* C. Bauh. Pin. 179. — Kniph. Centur. 2. n°. 65.

*Ranunculus nivus, polyanthes.* Dalech. Hist. 1. pag. 1035. — Lob. Icon. 667.

*Ranunculus pleno flore albo.* Clus. Hist. 1. pag. 236.

Vulgairement le bouton d'argent.

Cette espèce se confond aisément avec le *ranunculus platensis* : on l'en distingue à ses tiges bien moins élevées, à ses feuilles plus profondément découpées, & dont les lobes ne sont point connivens ; à ses fleurs plus petites ; mais ces différences ne nuancent tellement dans les variétés, que ces deux espèces pourroient bien n'être que la même plante.

Les racines, épaisses & charnues à leur collet, se prolongent par des fibres droites, longues, presque simples, charnues, fasciculées : il s'en élève des tiges hautes d'environ un pied, cylindriques, striées, presque glabres, rameuses. Les feuilles radicales sont pétiolées, amples, glabres, divisées jusqu'à leur base en cinq grands lobes ovales, aiguës, profondément laciniés, incisés, dentés irrégulièrement à leurs bords. Quelquefois ces lobes sont supportés par un petit pétiole particulier ; les feuilles supérieures & caulinaires bien moins composées, souvent lancéolées, fortement dentées, très-aiguës.

Les pédoncules des fleurs sont en général moins grêles & plus courts que dans le *ranunculus platensis*. La corolle est également blanche, mais plus petite ; le calice coloré en blanc, un peu velu, teint de rouge avant son épanouissement. Elle devient double & semi-double dans les jardins, où on la cultive sous le nom de *bouton d'argent*.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les départements méridionaux de la France & ailleurs. (V. v.)

51. RENONCULE de Pensylvanie. *Ranunculus pensylvanicus*, Linn.

*Ranunculus calceolus reflexus*, caule erecto ; foliis ternatis, trifidis, incisis, subius pilosis. Linn. f. Suppl. pag. 272.

*Ranunculus canadensis*, Jacq. Icon. rar. 1. tab. 105. — Miscell. 2. pag. 343.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, couvertes de poils diffus, & garnies de feuilles ternées, velues à leur face inférieure, ainsi que les pétioles, composées de folioles à trois divisions, aiguës, incisées ou dentées en scie.

Les fleurs sont terminales, solitaires, supportées par des pédoncules lisses, cylindriques, étalés. Le calice est composé de cinq folioles ovales, concaves, rabattues en dehors ; la corolle de couleur jaune, à peine aussi grande que le calice ; les filaments des étamines de la longueur des pétales ; les fruits ovales, comprimés, mucronés, disposés en une petite tête ovale, plus longue que la corolle.

Cette plante croît au Canada & dans la Pensylvanie. (V. f. in herb. Bosc.)

52. RENONCULE à feuille de rue. *Ranunculus rupefolius*, Linn.

*Ranunculus foliis supra decompositis ; caule simplicissimo, unifolio, unifloro ; radice tuberosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 777. — Hort. Cliff. 230. — Royen, Lugd. Bat. 491. — Miller, Dict. n°. 6. — Crantz, Stirp. Austr. pag. 113. n°. 6. — Allion, Pedem. n°. 1451. tab. 67. fig. 1. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 187. n°. 789. XVI. — Seg. Veron. vol. 1. pag. 486.

*Ranunculus foliis pinnatis, ternatisque ; foliis tripartito-multifidis, incisis ; caule simplicissimo, corollae polyptalae, radice tuberosa*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1319. n°. 28.

*Ranunculus foliis pinnatis decompositis, caule unifloro*. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 740.

*Ranunculus caule subtrifloro, foliis bipinnatis ; pinnis fissilibus, latissimis, lobatis, subpalmatis multifidis ; radice fusiformi, longe undique fibrosa*. Wulfen, in Jacq. Collect. 1. pag. 186. tab. 6 & 7.

*Ranunculus caule unifloro ; foliis imbricatis, pinnatis ; pinnis lobatis, obtuse palmatis*. Haller, Helv. n°. 1165.

*Ranunculus alpinus, fumaria folio*. Berard, 2. 1005.

*Ranunculus rutae-folio, flore suave rubente*. C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 289. — Moris. Oxon. Hist. 2. pag. 448. §. 4. tab. 31. fig. 54. Medicea.

*Ranunculus alpinus, coriandrifolio*. Pona, Bald. 34.

*Ranunculus alpinus, coriandrifolio ; flore albo, purpurascens*. Barrel, Icon. rar. 456.

*Ranunculus folio rutae*. J. Bauh. Hist. 3. p. 414. *Ranunculus praeox, primus, ruta folio*. Clus. Hist. 1. pag. 232. Icon. Mala.

Cette plante s'élève peu ; ses racines sont divisées en fibres épaisses, bulbeuses, blanchâtres, garnies de chevelus. Les tiges sont hautes de quatre à six pouces, glabres, tendres, cylindriques, point striées, très-rarement rameuses. Les feuilles radicales sont pétiolées, glabres, ailées, assez semblables à celles de la fumeterre ou de la rue ; composées de pinnules très-découpées, presque palmées, ou divisées en lobes nombreux & divergens, d'un vert pâle. Les feuilles caulinaires sont sessiles, d'une à deux ; à pinnules plus finement découpées, mais semblables aux précédentes.

La tige est très-ordinairement terminée par une seule fleur, quelquefois cependant elle se ramifie & en porte deux ou trois : ces fleurs sont blanches, quelquefois rouges dans les Hautes-Alpes. Le calice est composé de cinq à six folioles colorées comme les pétales. La corolle a de cinq à six, & neuf pétales oblongs, étroits, munis à leur base d'un pore rouffâtre. Les fruits sont très-peu nom-

breux,

breux, assez gros, ovales, un peu aigus, comprimés.

Cette plante croît sur les Hautes-Alpes, au mont Baldo, en Suisse, en Italie, en Autriche & dans les départemens méridionaux de la France; au mont de Lens, &c. Elle fleurit de bonne heure.  $\frac{\pi}{4}$  (V. f. Comm. Foucault.)

53. RENONCULE de Séguier. *Ranunculus Seguieri*. Villars.

*Ranunculus foliis palmatis, orbiculatim multifidis; caule prostrato, multifloro.* Villars. Dauph. vol. 3. pag. 737. n°. 13. tab. 49.

*Ranunculus (Columnæ), foliis rotundis, nitentibus, quinquefidis; laciniis bis trifidis, floribus terminalibus.* Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 880. — Allion. Flor. pedem. n°. 1453. tab. 67. fig. 3 & 4.

*Ranunculus (Seguieri), foliis tripartitis; lobis multifido-lacinatis, acutis, omnibus petiolatis; caule multifloro, calicibus glabris.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1320. n°. 30.

*Ranunculus (Columnæ), foliis palmato-quinquepartitis; laciniis cuneiformibus, pinnatifido-trifidis, quinquefidis; caule tereti, villosa, ramosa; pedunculis unifloris, radicis asphodeli fibrosa.* Wulfen, in Jacq. Collect. 4. pag. 345.

*Ranunculus alpinus, apii folio; flore albo, magno.* Ponteder. Compend. 117. — Seg. Plant. Veron. vol. 1. pag. 490. tab. 12. fig. 2 & 3.

*Ranunculus minor, ruscifolio; flore simplici, grumosa radice, italicus.* ? Barrel. Icon. rar. 1153. *Medicaris.*

*Ranunculus alter, saxatilis, asphodeli radice.* Colum. Ephr. 312. tab. 313. ?

Cette espèce est voisine du *ranunculus alpestris*. Ses racines sont bulbeuses, & poussent plusieurs fibres simples, épaisses, très-longues; elles produisent des tiges basses, presque couchées, rameuses, courbées en ondulations, glabres ou un peu velues, nouées à leurs bifurcations, longues de quatre à six pouces & plus. Les feuilles radicales sont épaisses, velues, quelquefois presque glabres, arrondies ou en forme de rein, divisées en trois grands lobes, chacun d'eux découpé plus ou moins profondément, lancéolé, incisé, aigu; les feuilles caulinaires pétioolées, assez semblables aux précédentes, plus petites, moins nombreuses.

Les fleurs sont assez nombreuses, portées sur des pédoncules axillaires, à l'extrémité de chaque rameau; velus, cylindriques. Le calice est composé de cinq folioles concaves, ovales, blanches ou un peu rougeâtres, munies de quelques poils longs & fins vers leur sommet. La corolle est blanche, assez grande, ouverte; les pétales ovales, obtus,

Botanique. Tome VI.

ou un peu échançrés à leur sommet; les semences dures, assez grosses, un peu écartées entr'elles, au nombre de cinq à neuf.

Cette plante croît en Italie, en Espagne, dans les Alpes sur les roches calcaires, & dans les départemens méridionaux de la France.  $\frac{\pi}{4}$  (V. f.)

*Observations.* Il me paroît que cette plante varie selon les localités. J'en ai vu des exemplaires très-velus, d'autres presque glabres, très-différens pour leur grandeur, ainsi que dans la forme de leurs feuilles, mais remarquables par les courbures en ondulations des tiges, & même des pétioles, qui souvent sont très-longues, également distingués par leur corolle blanche.

54. RENONCULE d'Illyrie. *Ranunculus illyricus*. Linn.

*Ranunculus foliis fericeo-villosis, ternatis; foliolis trifidis, incisiss, integerrimis; calice reflexo.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1316. n°. 24.

*Ranunculus foliis ternatis, integerrimis, lanceolatis.* Linn. Syst. veget. pag. 516. — Her. (El. 71. Flor. suæ. 471. 500. — Jacq. Austr. 222. — Pallas, Itin. 3. pag. 584. — Hoffm. Germ. 195. — Roth. Germ. 1. 238. II. 613. — Gérard. Flor. gall. prov. pag. 386. n°. 9. — Gouan, Monsp. 169.

*Ranunculus foliis tripartitis, laciniis linearibus, caule multifloro, radice tuberosa.* Hort. Cliffort. 230. — Royen, Lugd. Bat. 491. — Sauvag. Monsp. 181.

*Ranunculus lanuginosus, angustifolius; grumosa radice, major & minor.* C. Bauh. Pin. 181. — Tourn. Inst. R. Herb. 289. — Magn. bot. 218. Hort. 170.

*Ranunculus grumosa radice quartus.* Clus. Hist. 1. pag. 240.

*Ranunculus illyricus, radicibus bulbosis, foliis longis.* J. Bauh. Hist. 3. Append. 863. Icon.

*Ranunculus illyricus major.* Clus. Hist. pag. 240.

*Ranunculus (illyricus), foliis radicalibus trifidis; lobis cuneatis, incisiss, holosericeis.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 752. n°. 28.

*Ranunculus illyricus.* Lobel. Icon. 672. — Dod. Pempt. 428. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 4. tab. 30. fig. 46. *Medicaris.*

Ses racines sont fibreuses, entremêlées de petits tubercules courts, épais, charnus; il s'en élève des tiges hautes de six à dix pieds & plus, droites, velues, simples, & souvent ramifiées à leur partie supérieure en deux ou trois rameaux. Les feuilles radicales sont pétioolées, velues & foyeuses, particulièrement à leur face inférieure, ainsi que les pétioles, presque ternées ou divisées en trois lobes profonds, longs d'environ un pouce, chacun d'eux à trois divisions ovales ou linéaires,

Q

aiguës. Les feuilles caulinaires sont rares, moins composées, plus étroites; leurs découpures linéaires, entières.

Les fleurs sont terminales, d'une à trois, supportées par des pétioles velus, foyeux; les folioles calicinales ovales, un peu élargies, pubescentes ou presque glabres, aiguës, colorées. La corolle est assez grande, d'un beau jaune, luisante en dedans; les pétales arrondis à leur sommet, ovales, striés.

Cette plante croît en Espagne, en Italie & dans les départemens méridionaux de la France. Je n'ai pas vu ses fruits. (V. f.)

55. RENONCULE en faucille. *Ranunculus falcatus*. Linn.

*Ranunculus foliis filiformi-romefis, feminibus falcatis; seapo nudo, unifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 781. — Hort. Upf. 157. — Sauv. Monsp. 205. — Gronov. Orient. 60. — Jacq. Vind. 250. — Jacq. Austr. tab. 48. — Hossin. Germ. 197. — Roth. Germ. II. 618. — Lam. Flor. Fr. vol. 3. pag. 192. n°. 789. XXXIV. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 754. n°. 34.

*Ranunculus foliis filiformi-romefis, calicibus opericulatis*. Gerard, Flor. gall. prov. pag. 388. — Gouan, Monsp. 267.

*Ranunculus testiculatus*. Crantz, Stirp. Austr. pag. 119.

*Myosurus foliis romefis*. Hort. Cliffort. 117. — Royen, Lugd. Bat. 492.

*Melampyrum minimum luteum*. C. Bauh. Pin. 234.

*Ranunculus ceratophyllus, feminibus falcatis, in spicam odatis*. Tourn. Infl. R. Herb. 289. — Morif. Hist. 2. pag. 440. §. 4. tab. 28. fig. 22. Optimo. — Garid. 394.

*Perpusillum melampyrum luteum*. Lobel. Ic. 37. — Dalech. Hist. 1. pag. 420. Icon. Mediocris.

*Ranunculus olopecaroides, vjaga foliis*. Boccon. Sic. pag. 28. tab. 14. fig. 3.

*Cratogeomum pumilum luteum, obfistit folio, hispanicum*. Bartel. Icon. rar. 375.

*Ranunculus coronopifolius, copite olopecuri, ceratophyllus; feminibus falcatis in spicam adatis*. Magn. bor. 218. — Hort. 178.

C'est une des plus petites espèces de ce genre, remarquable par ses petites feuilles à divisions filiformes ou linéaires, & par ses fruits terminés d'une longue pointe en faucille.

Elle a des tiges simples ou plurès des hampes nues, très-grêles, pubescentes ou coroneuses, hautes d'un à deux pouces, uniflores. Les feuilles

sont toutes radicales, périodes, presque palmées, divisées en decoupures linéaires ramées, enrières, aiguës, inégales, médiocrement velues, souvent plus longues que les tiges.

Les fleurs sont petites: leur calice est composé de cinq folioles ovales, pubescentes; la corolle jaune, à peine plus longue que le calice; les pétales ovales, arrondis à leur sommet. Il leur succède des fruits disposés en un épi allongé, cylindrique, épais, pubescent. Les semences sont globuleuses, surmontées par une pointe longue, effilée, aiguë, qui se courbe en faucille en vieillissant. Les racines sont fusiformes, simples, presque linéaires, terminées à leur extrémité par une petite touffe de fibres capillaires.

Cette plante croît en Espagne, en Italie, dans les départemens méridionaux de la France, sur les pelouses; je l'ai recueillie au environs de Marseille. (V. v.)

56. RENONCULE bilobée, *Ranunculus alpestris*. Linn.

*Ranunculus foliis radicalibus, subcordatis, obtusis, tripartitis; lobis trilobatis; caulino lanceolato, integerrimo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 778. — Jacq. Austr. tab. 110. — Pall. iter 2. pag. 568. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 187. n°. 789. XV. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 736. n°. 12.

*Ranunculus uniflorus; foliis levibus, semitribolobis, rotundis serratis; caulinis lingulatis*. Haller, Helv. n°. 1167.

*Ranunculus foliis subrotundis, splendentibus, semitribolobis; petalis cordatis, albis*. Crantz, Stirp. Austr. pag. 113. n°. 7.

*Ranunculus foliis trilobis, lobis acutis, caule unifloro*. Scop. Carn. edis. 1. pag. 563. n°. 4. — Edit. 2. n°. 679.

*Ranunculus alpinus, humilis, rotundifolius; flore major & minor*. C. Bauh. Pin. 181. — Tourn. Conf. Infl. R. Herb. 290.

*Ranunculus alpinus, humilis, albus; folio subrotundo*. Seg. Veron. 1. pag. 489. tab. 12. fig. 1.

*Ranunculi montani, prima & secunda species*. Clus. Hist. 1. pag. 234. Icon. — Id. Stirp. Pann. 364. 365. Icon.

*Ranunculus albo flore minimus*. Gess. Hort. 275.

*Ranunculus montanus*. Dod. Pempt. 429. Icon.

*Ranunculus montanus rotundifolius, flore minore & major*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 31. fig. 57. 58.

C'est une petite plante dont la tige, très-simple & basse, ne s'élève jamais beaucoup au-delà de deux ou trois pouces. Elle est grêle, un peu velue,

presque nue. Les racines sont fibreuses, très-déliées, longues & roussâtres; les feuilles presque toutes radicales, pétiolées, un peu arrondies, très-lisses, presque luisantes, divisées ordinairement en trois lobes presque cunéiformes, confluent à leur base, chacun d'eux foudroyé en trois autres lobes peu profonds, ovales ou lancéolés, presque entiers à leurs bords. Les feuilles caulinaires, au nombre d'une à deux, quelquefois nulles, sont sessiles, linéaires, simples, aiguës.

Les tiges sont terminées par une seule fleur qui varie de grandeur, dont le calice est glabre, à folioles ovales, lancéolées, blanchâtres; la corolle blanche, de cinq à sept pétales en cœur, échancrées à leur sommet.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, en Autriche & sur les hautes montagnes des départements méridionaux de la France, à la Grande-Chartreuse, à Saint-Nizier, &c. (V. f. Comm. Foucault.)

57. RENONCULE glaciale. *Ranunculus glacialis*. Linn.

*Ranunculus calicibus hirsutis, caule bifloro, foliis multifidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 777. — Flor. suec. 464. 501. — Wedd. Flor. dan. tab. 19. — Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 188 n°. 789. XVIII.

*Ranunculus caule bifloro, calice hirsuto*. Flor. lapon. pag. 233. tab. 5. fig. 1.

*Ranunculus foliis ternatis, foliolis tripartito-multifidis, caulibus sessilibus, caule suberisifloro, calicibus hirsutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1320.

*Ranunculus caule suberisifloro; foliis repetito-trilobatis, pulposis; calice hirsuto*. Wu'len. in Jacq. Collect. 1. pag. 189. tab. 8 & tab. 9. fig. 1. 2. — Hohenwarth & Reiner. Iter 1. pag. 153. — Hoff. Synop. 311.

*Ranunculus calicibus hirsutis villosis, caule suberisifloro, foliis tripartitis, foliolis tripartitis, laciniis sub-trilobatis, lobis subcaucis*. Schrank, Salisb. n°. 519.

*Ranunculus foliis ternatis decompositis; foliolis carnosis, intermediis simplicibus; caule multifloro*. Vill. Dauph. vol. 3. pag. 758. n°. 13.

*Ranunculus foliis pulposis, repetito-trilobatis; calicibus villosis*. Haller, Helv. n°. 1166.

*Ranunculus montanus, purpureus; calice villosis, foliis platy. J. Bauh. Hist. 3. pag. 861. — Tourn. Inst. R. Herb. 289. — Scheuchz. Alp. 139. tab. 20. fig. 1. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 31. fig. 5. Medici.*

*Ranunculus alpinus, foliis crithmi crassifloribus, floribus albis vel carneis*. Schol. Botam. 12.

*Ranunculus alpinus, roseus, albus; calice hirsuto*. Rudd. 99.

Cette plante est remarquable par ses belles & grandes fleurs blanches, ou de couleur de chair & quelquefois un peu purpurines; par ses calices velus, par ses feuilles composées.

Ses racines sont grosses, charnues, divisées en un grand nombre de longues fibres épaisses: il s'en élève des tiges hautes de quatre à huit pouces, plus ou moins rameuses, velues, particulièrement aux divisions des rameaux; folioles, striées. Les feuilles radicales, portées sur de très-longues pétiolées, sont ternées, les pinnules pétiolées, pinnatifides, très-divisées, à découpures ovales, très-glabres, simples, un peu charnues. Les feuilles caulinaires & supérieures sont moins composées, leurs découpures linéaires plus longues. Les pétiolées engainent les tiges par une membrane velue à ses bords & à son orifice.

Les fleurs sont solitaires, terminales: leur nombre est relatif à celui des rameaux. Leur calice est chargé de poils roussâtres, courts, serrés. Les pétales ont presque toujours une teinte rougeâtre ou vineuse très-agréable; ils font de cinq à sept, larges, entiers, relevés. Les semences sont fort petites, nombreuses, réunies en une tête ovale, arrondie. Cette plante varie un peu dans ses formes & sa grandeur: d'où il résulte que les figures qu'on y rapporte, paroissent presque appartenir à des plantes différentes.

Cette espèce aime les montagnes élevées, le voisinage des neiges, les glaciers. On la trouve en Suisse, dans la Laponie & même dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Grenoble, &c. (V. f. Comm. Foucault.)

Ses racines sont très-âcres. Les paysans emploient cette plante, sous le nom de *corline* ou *caralline*, pour provoquer la sueur dans les pleurétiques & les rhumatismes: ils la prennent en décoction dans l'eau. Leur méprise, dit Villars, seroit funeste s'ils ne la prenoient étendue dans beaucoup d'eau. Ces bonnes gens avalent le poison sans le connaître, mais leur bon tempérament y résiste. On doit juger de là le cas que l'on doit faire souvent de ces remèdes vulgaires, pronés par l'ignorance, employés par le charlatanisme, & adoptés avec une confiance bien funeste.

58. RENONCULE des frimats. *Ranunculus nivalis*. Linn.

*Ranunculus foliis quinquelobis, integerrimis; caulino sessili, digitato; caule unifloro*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1321. n°. 31.

*Ranunculus (nivalis), calice hirsuto, caule unifloro, foliis radicalibus palmatis; caulinis multipartitis, sessilibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 778.



— Flor. lapon. 132. tab. 3. fig. 2. — Flor. suec. 465. 502. — Gunn. Norw. 627. — Retz. Observ. 2. pag. 19. — Swartz, Act. Stockh. 1789. pag. 47. (Excluf. *Ran. nivalis*, Villars.)

*Ranunculus laponicus*. Flor. dan. tab. 144.

8. *Ranunculus idem pygmaeus*. Flor. lapon. pag. 132. tab. 3. fig. 3.

Cette plante ne doit pas être confondue avec celle que M. Villars a décrite sous ce nom. Elle est parfaitement glabre dans toutes ses parties, excepte les calices, & ses feuilles inférieures ne font que médiocrement lobées.

Ses tiges sont grêles, hautes de quelques pouces, simples, dont les feuilles inférieures & radicales sont longuement pétiolées, alternes, très-fines; les unes presque palmées, les autres divisées médiocrement en cinq ou sept lobes courts, obtus, entiers. La forme générale de ces feuilles est arrondie & réniforme: les caulinaires ont des découpures simples, linéaires.

Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, solitaires à l'extrémité des tiges, de couleur jaunâtre. Le calice est composé de cinq folioles ovales, un peu velues; les pétales ovales, un peu lancéolés, obtus.

Cette plante croît dans les hautes montagnes de la Laponie & de la Norwège. ♀ (V. f. in herb. Besf.)

59. RENONCULE des rochers. *Ranunculus brev-nipus*. Crantz.

*Ranunculus foliis tripartitis, subula hirsuta; receptaculo lanuginoso*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 880. n° 53.

*Ranunculus alpinus, receptaculo lanuginoso*. Crantz, Stirp. Austr. pag. 115. n° 11. tab. 4. fig. 2.

Cette plante a des rapports avec le *ranunculus nivalis*. Ses tiges sont courtes, à peine rameuses, presque nues, rarement droites, velues: elle a des racines fibreuses, allongées, garnies de quelques chevelus courts & très-fins. Les feuilles radicales sont pétiolées, épaisses, velues à leur face inférieure, d'un vert foncé en dessus, profondément divisées en trois lobes, confluent à leur base, élargies vers leur sommet; chaque lobe à trois ou cinq découpures peu profondes, irrégulières, aiguës, incisées ou crénelées, ciliées à leurs bords. Les pétiolés sont très-velus, canaliculés, d'un pourpre foncé.

Il n'existe très-souvent qu'une seule fleur terminale, ou deux & trois: alors la base des pédoncles est munie d'une feuille caulinaires simple, tridentée ou presque digitée. Les folioles calicinales sont velues, colorées, concaves, caduques; la corolle jaune, luisante, tachetée à la base inté-

rieure; les fruits glabres, comprimés, terminés par une pointe recourbée, réunis en tête sur un réceptacle lanugineux.

Cette plante croît sur les hautes montagnes en Autriche & dans le Piémont. ♀

60. RENONCULE des montagnes. *Ranunculus montanus*. Willd.

*Ranunculus foliis quinquelobis, dentatis; caulino sessili-digitato; lacinis linearilanceolatis, integerrimis; caule unifloro*. Willd. Sp. c. Plant. vol. 2. pag. 1321. n° 32.

*Ranunculus (nivalis), foliis radicalibus quinque partitis, orbiculatis multifidis; caulinis palmatis, integris, sessilibus; caule unifloro*. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 742. n° 15.

*Ranunculus nivalis*. Jacq. Austr. tab. 325. 326. — Hort. Syn. 311.

*Ranunculus uniflorus; foliis glabris, reniformibus, semiquinquelobis*. Haller, Helv. n° 1168.

*Ranunculus minimus, alpinus, luteus*. J. B.uh. Hist. 3. pag. 861. fig. interior.

Il paroît, ou que l'on a confondu cette espèce avec le *ranunculus nivalis* de Laponie, ou que cette dernière présente une variété très-remarquable. Nous avons cru, d'après l'inspection des individus de ces deux plantes, devoir les distinguer, ainsi que l'a fait Willdenow.

Celle dont il est ici question diffère du *ranunculus nivalis* par ses feuilles plus divisées, plus ou moins velues, quelquefois glabres; par ses corolles plus grandes, par ses tiges quelquefois biflores. Elle se rapproche tellement du *ranunculus Monspeliensis*, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une variété.

Ses racines sont fibreuses, un peu traçantes; elles produisent une tige simple, médiocrement velue, grêle, hautes de cinq à six pouces, dont les feuilles radicales sont pétiolées, larges, profondément lobées, découpées en cinq ou trois lobes, dont les deux latéraux sont plus courts, moins profonds, un peu en coin à leur base, très-souvent glabres, presque luisantes, un peu obtuses, quelquefois un peu velues, particulièrement les pétiolés. Les feuilles caulinaires, au nombre de deux, presque opposées, sont sessiles, divisées en quelques segments linéaires.

Les fleurs sont solitaires, terminales, grandes; leur calice est velu, d'un jaune-pâle; la corolle jaune, marquée souvent d'une tache plus foncée dans le fond; les pétales ovales, arrondis ou un peu échancrés à leur sommet. Cette plante varie dans la grandeur de ses fleurs, qui quelquefois se doublent, quelquefois aussi elle porte deux ou

trois fleurs lorsqu'elle croit dans les lieux bas & les terrains gras.

On la rencontre dans les prairies élevées, parmi les pâturages des hautes montagnes, en Suisse, dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Gap, de Briançon, &c. &c. (V. f.)

61. RANONCULE de Laponie. *Ranunculus lapponicus*. Linn.

*Ranunculus foliis tripartitis, lobatis, obtusis; caule subnudo, unifloro*. Linn. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 778. — Flor. suec. 461. 503.

*Ranunculus caule unifolio, unifloro; foliis tripartitis*. Flor. lapon. pag. 251. tab. 3. fig. 4.

C'est une fort petite plante, assez distincte, glabre, dont les racines font fibreuses, fines, déliées. Les tiges, longues à peine d'un pouce, sont simples, presque nues, filiformes. Les feuilles inférieures & caulinaires sont petites, planes, élargies, pétioles, glabres, découpées en trois lobes obtus, un peu ovales; quelquefois elles ont cinq lobes, & alors les deux extérieurs font très-petits. Les fleurs font petites, terminales.

Cette plante croit sur les hautes montagnes de la Laponie. &c. (V. f. in herb. Bojc.)

62. RANONCULE hyperbottéenne. *Ranunculus hyperboreus*.

*Ranunculus foliis profunde trilobis; lobis oblongis, divaricatis; caule filiformi, repente*. Rottb. Alt. Hafn. 10. pag. 458. tab. 4. fig. 16. — Retz. Prodr. Flor. scand. edit. 691. — Æler. Flor. dan. tab. 331. — Willden. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 1321.

*Ranunculus Ammanni*. Gunn. Norv. n°. 826. (Excluso synonymo Ammanni.)

*Ranunculus foliis subrotundis, trilobis, integerrimis; caule repente*. Gmel. Sibir. 4. pag. 204. tab. 836. (Excluso synonymo Linnæi & Royenii. Willd.)

Quelques auteurs, selon Willdenow, avoient mal-à-propos confondu cette espèce avec le *ranunculus lapponicus*, dont elle diffère par ses tiges & ses feuilles: elle est aussi très-différente du *ranunculus salsiginosus*, à laquelle Gunner l'avoit rapporté.

Ses tiges font petites, grêles, rampantes, filiformes; ses feuilles pétioles, radicales, divisées profondément en trois lobes, chacun d'eux oblong, écarté, très-entier, arrondi à son sommet.

Cette plante croit au Groënland, dans l'Islande, en Norwège, en Sibérie. &c.

63. RANONCULE à grandes fleurs. *Ranunculus grandiflorus*.

*Ranunculus caule crasso, bifolio; foliis multifidis;*

*caulinis alternis, sessilibus*. Linn. Spéc. Plant. vol. 1. pag. 781. — Royen, Lugd. Bat. 492.

*Ranunculus orientalis, acroiti folio; flore luteo, maximo*. Tournef. Coroll. 20.

Ses tiges sont droites; les feuilles radicales, pétioles, assez semblables à celles de l'aconit, divisées en plusieurs découpures. Les feuilles caulinaires font sessiles, alternes, au nombre de deux seulement. Les fleurs font jaunes, remarquables par leur grandeur.

Cette plante croit dans l'Orient, où elle a été découverte par Tournefort.

64. RANONCULE septentrionale. *Ranunculus septentrionalis*.

*Ranunculus foliis membranaceis, glabris, ternatis; foliolis fastigiatis, incis, acutis; caule petiol. fere basi hirsutus, pedunculis subsifloris, calicibus reflexis*. (N.)

Ses racines font fibreuses, fasciculées, garnies de quelques chevelus très-fins; les tiges presque simples, nulles, droites, fistuleuses, velues ou pubescentes à leur partie inférieure, à peine feuillées, hautes de huit à dix pouces.

Les feuilles radicales font pétioles, minces, glabres, membraneuses, à trois folioles pétioles; la foliole supérieure à trois lobes profonds, divergens; les deux latérales souvent à deux lobes seulement, incisés, dentés, aigus; supportées par de longs pétioles grêles, chargés de poils rares, particulièrement vers leur base. Les feuilles caulinaires sont presque sessiles, ternées, à découpures plus étroites: il n'y en a ordinairement qu'une seule.

Les tiges se divisent à leur extrémité en deux pédoncules uniflores, glabres, inégaux, très-grêles, munis dans leur milieu d'une petite feuille linéaire. Les calices font glabres, colorés, garnis de quelques poils rares à leur sommet, réfléchis, très-caducs; la corolle de couleur jaune-pâle; les pétales ovales, élargis & arrondis à leur sommet; les fruits presque orbiculaires, comprimés, un peu convexes à leurs deux faces, terminés la plupart par une pointe droite, aigüe, réunis en une petite tête globuleuse.

Cette plante croit dans l'Amérique septentrionale. &c. (V. f. in herb. Lamarck.)

65. RANONCULE recourbée. *Ranunculus recurvatus*.

*Ranunculus foliis trilobis, lobis basi cuneiformibus, apice incis, acutis; caule multifloro, corollâ calicibusque recurvis*. (N.)

Ses tiges font soibles, molles, pubescentes,

médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, divisées en trois grands lobes confluent, rétrécis en coin à leur base, ovales, élargis à leur sommet, incisés, dentés, aigus, presque glabres; vertes en dessus, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles velus; les inférieures semblables aux inférieures, mais plus petites, un peu moins divisées.

Les fleurs sont axillaires & terminales, presque disposées en grappes courtes, au nombre de trois ou quatre &c. sur un pédoncule rameux, pubescent. Les pédoncules particuliers sont courts, uniflores, munis d'une petite foliole linéaire à leur base. Le calice est composé de cinq grandes folioles ovales, médiocrement velues, corollées, acuminées. La corolle m'a paru jaunâtre; les pétales ovales, obtus, plus courts que le calice, qui se réfléchit tout à fait sur la tige, ainsi que la corolle après l'épanouissement des fleurs.

Cette plante croit en Amérique, dans les environs de New-York. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

66. RENONCULE ailée. *Ranunculus pinnatus*.

*Ranunculus pubescens, foliis pinnatis, pinnis lobato-incisis, ramis diffusis, seminibus tuberculatis.* (N.)

Cette plante a des tiges divisées en rameaux diffus, étalés, velus, striés, garnis de feuilles alternes, pétioles, velues ou pubescentes, ailées, composées aux feuilles caulinaires de cinq à sept folioles opposées; les inférieures pétioles, les supérieures sessiles, les terminales souvent confluentes, divisées en lobes irréguliers, presque lancéolés, incisés, aigus.

Les fleurs sont nombreuses, étalées, portées sur des pédoncules allongés, velus, uniflores. La corolle m'a paru jaunâtre, médiocre; le calice coloré, non réfléchi; les fruits presque orbiculaires, convexes, médiocrement tuberculés à leurs deux faces, terminés par une petite pointe épaisse, presque droite, &c. réunis en une petite tête ovale, arrondie.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par M. Sonnerat. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

67. RENONCULE déchiquetée. *Ranunculus multifidus*.

*Ranunculus foliis multifidis, inferioribus pinnatis; caule multifloro, calice corollam aequante.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 102. n°. 18.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, velues, striées à une de leur face, cylindriques à l'autre; ses feuilles sont alternes, pétioles; les radicales & inférieures sont presque ailées, les supérieures partagées en découpures nombreu-

ses. La corolle est de la même grandeur que le calice; les fruits ovales, aigus, réunis en une tête ovale.

Cette plante croit dans les fossés, aux environs de la ville de Taes. (*Descript. ex Forsk.*)

68. RENONCULE vernissée. *Ranunculus nitidus*.

*Ranunculus foliis radicalibus integris, subcylindricis, nitidis; caulinis trif. seu quinquefidis, linearibus; feminibus subglobosis, glaberrimis.* (N.)

*Ranunculus (nitidus), foliis carolinensis, trifidis; laciniis obtusis.* Walter, Flor. carol. pag. 159.

Cette plante est glabre, luisante; elle a des racines fibreuses, des tiges presque fasciculées, rameuses, striées, fistuleuses, hautes de huit à dix pouces, droites, feuillées. Les feuilles caulinaires sont pétioles, entières, presque arrondies, un peu réniformes, crénelées à leurs bords; les caulinaires sessiles, presque digitées, ou divisées en trois ou cinq découpures linéaires, obtuses, entières.

Les fleurs, assez nombreuses, sont terminales, supportées par des pédoncules droits, très-glabres, inégaux. Le calice est composé de cinq folioles ovales, glabres, obtuses, point réfléchies; la corolle blanchâtre, médiocre; les fruits ovales, presque globuleux, entourés d'un léger rebord, très-glabres, obtus, réunis en une petite tête arrondie.

Cette plante croit aux lieux humides, dans la Caroline. Elle m'a été communiquée par M. Bosc. (*V. f.*)

69. RENONCULE de Maryland. *Ranunculus marylandicus*.

*Ranunculus foliis radicalibus ternatis; foliosis trilobatis, lobis acutis, incisis; caule simpliciter, subnudo; calicibus reflexis.* (N.)

Ses racines sont fibreuses; ses tiges simples, droites, pubescentes, grêles, hautes d'environ dix pieds, garnies de feuilles radicales longuement pétioles, ternées, les deux latérales opposées, pédiculées; les folioles à trois lobes confluent, lancéolés, aigus, incisés; leur face supérieure verte, l'inférieure plus pâle, un peu blanchâtre, presque glabre; les pétioles velus. Il n'existe d'autres feuilles caulinaires que celles qui se trouvent à la base des pédoncules: elles sont presque sessiles, à trois ou cinq lobes peu profonds, irréguliers, ou simplement incisés.

Les fleurs sont terminales, au nombre de deux ou trois, portées sur des pédoncules courts, à peine pubescents. Les calices sont glabres, réfléchis; la corolle assez grande, d'un blanc-jaunâtre; les pétales ovales, arrondis à leur sommet.

Cette plante croît au Maryland. *ꝥ* (V. f. in herb. Bosc.)

70. RENONCULE tomenteuse. *Ranunculus tomentosus*.

*Ranunculus foliis tomentosus, subtrilobatis; caule humilimo, villosa, subrepente, uis sex bifloro; calicibus villosissimis.* (N.)

Cette plante est petite, presque rampante, très-velue; ses racines fibreuses; ses tiges très-basses, presque couchées, élevées à leur partie supérieure, longues de deux à trois pouces, molles, couvertes de poils blanchâtres, touffus, disposés sur deux rangs. Les feuilles sont pétiolées, épaisses, romancées, la plupart à trois lobes confus ou distincts; d'autres sont simplement crénelées, arrondies, supportées par des pétioles longs & velus; la feuille caulinaire supérieure ovale, aiguë, entière, sessile.

Les tiges sont terminées par une ou deux fleurs, fourrées par des pédoncules inégaux, simples, velus sur deux rangs. Les calices sont hispides, un peu réfléchis; la corolle blanche ou un peu jaunâtre, à cinq pétales ovales, arrondis à leur sommet.

Cette plante a été recueillie par M. Bosc dans la Haute-Caroline. (V. f.)

71. RENONCULE d'Orient. *Ranunculus orientalis*. Willd.

*Ranunculus feminibus spinoso-fubulatis, recurvis; calicibus reflexis, foliis multiphis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1330. n°. 55.

*Ranunculus lesbius, paucifolia folio, flore magno.* Tournef. Coroll. 20.

Cette plante a des tiges basses, hautes de trois à quatre pouces, divisées en trois ou quatre rameaux garnis de feuilles pétiolées, plusieurs fois composées, ou plutôt formées par trois folioles petites, ailées irrégulièrement, & dont les pinnales sont linéaires, oblongues, obtusés.

Les fleurs sont situées à l'extrémité de chaque rameau, portées sur des pédoncules uniflores: leur calice est réfléchi. La corolle est plus ou moins grande, selon la grandeur de la plante; les fruits oblongs, comprimés, subulés, terminés par des pointes épineuses, écartées, recourbées en crochets, réunis en une tête arrondie.

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été découverte par Tournefort. ○

72. RENONCULE à fruits membraneux. *Ranunculus alatus*.

*Ranunculus prostratus, pubescens, minimus; foliis*

*compositis; foliis linearibus, brevibus; floribus fissilibus, subinvolucratiss; seminis alatis.* (N.)

Cette espèce est très-angulaire, & remarquable par le caractère de ses semences. Peut-être devroit-elle former un genre particulier.

C'est une petite plante pubescente, dont les racines sont dures, fibreuses, menues, & qui produisent un grand nombre de tiges racineuses, courtes, velues, étendues sur la terre, longues de deux ou trois pouces, presque dichotomes & géniculées; garnies de feuilles alternes, pétiolées, presque ailées, à pinnales opposées, au nombre de trois ou cinq, finement divisées en folioles pubescentes, courtes, entières, linéaires, aiguës; les feuilles caulinaires, semblables aux radicales.

Les fleurs sont réunies en paquets globuleux, sessiles tant aux articulations que dans les bifurcations des tiges; elles sont environnées de quelques feuilles linéaires, aiguës, en forme d'involucre. Les fruits sont ovales, comprimés, un peu convexes, chargés à leurs deux faces de très-petits tubercules, environnés latéralement d'une aile membraneuse, divisée en quatre lobes, dont deux inférieurs obtus, divergens; deux latéraux, anguleux, aigus: chacun des fruits est terminé par une pointe droite, roide, assez longue, spinuliforme. Je ne connois point la corolle.

Cette plante a été recueillie dans le Brésil par Commerçon. *ꝥ* (V. f. in herb. Lamarck & Jussieu.)

73. RENONCULE petite. *Ranunculus parvulus*. Linn.

*Ranunculus hirtus; foliis trilobis, incisfis; caule erecto, subunifloro.* Linn. Mantiss. 79. — Gmel. Iter 2. pag. 196.

*Ranunculus (parviflorus), foliis radicalibus & caulinis inferioribus trilobis, crenatis; summis trifidis, dentatis; caule bifloro, erecto.* Gouan, Monsp. 170.

*Ranunculus arvensis, parvus; folio trifido.* C. Bauh. Pin. 79. — Tournef. Inst. R. Herb. 289. — Magn. botan. 217.

*Ranunculus saxatilis, minimus, hirsutus.* C. Bauh. Pin. 132. Prodr. 56.

*Ranunculus minimus, apulus.* Column. Ephr. 1. tab. 316.

*Ranunculus parvo folio trifido.* Moiss. Oxon. Hist. 1. 5. 4. tab. 28. fig. 20. Optima.

Espèce distinguée par sa délicatesse, dont les racines n'ont que quelques fibres menues & filiformes, qui produisent une tige grêle, velue, haute de trois à quatre pouces, droite, simple, garnie de petites feuilles, dont les radicales & les supérieures sont pétiolées, un peu élargies, velues,

divisées jusque vers leur milieu en trois lobes crénelés, plus profonds aux feuil les supérieures, supportés par des pétioles filiformes, redressés, presqu'appliqués contre les tiges; les feuil les terminales ou florales fort petites, presque sessiles, à trois lobes étroits, lancéolés, entiers, inégaux, ouverts.

Les fleurs sont terminales, foliaires ou au nombre de deux, ou portées sur des pédoncules inégaux, écartés, dont l'un axillaire, l'autre terminal. Les folioles calicinales sont concaves, un peu membraneuses, velues, colorées, élargies, aiguës; la corolle jaune, un peu plus grande que le calice; les fruits peu nombreux, comprimés, presque orbiculaires, obtus, légèrement pubescens à leur contour, réunis en une petite tête globuleuse.

Cette plante varie un peu dans la forme de ses feuil les, dont les radicales sont entières, à double dentelure, &c. les caulinaires lancéolées, linéaires; les fleurs foliaires, ou au nombre de deux ou plus. Leur pédoncule est quelquefois garni d'une ou de deux petites feuil les.

On rencontre cette plante en Italie, en France, dans les environs de Montpellier. Je l'ai également recueillie dans les environs de Laon. (V. v.)

74. RENONCULE à petites fleurs. *Ranunculus parviflorus*. Linn.

*Ranunculus feminibus muricatis; foliis simplicibus, laciniatis, acutis, hirsutis; caule diffuso*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 780. — Hudl. Angl. 242. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 196. n°. 789. XLIV. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 441.

*Ranunculus hirtus, annuus; flore minimo*. Rai. Synopf. 248. tab. 12. fig. 1.

*Ranunculus hirsutus, flore omnium minimo, lateo*. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 440. §. 4. tab. 28. fig. 21.

*Ranunculus arvensis, annuus, hirsutus; flore omnium minimo*. Tournef. Inst. R. Herb. 289.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *ranunculus muricatus* : on l'en distingue à ses tiges, à ses feuil les velues & à ses petites fleurs, ainsi qu'à ses fruits, bien moins hérissés d'aspérités.

Ses racines sont fibreuses, ses tiges presque couchées, rameuses, diffuses, faibles, très-velues, garnies de feuil les longuement pétioles, médiocres, molles, velues; les inférieures divisées en trois lobes un peu arrondis, incisés à leur sommet. Les feuil les supérieures ou florales sont entières, lancéolées, aiguës.

Ses fleurs sont petites, portées sur des pédoncules unifoires, plus ou moins longs, velus, pres-

que filiformes, opposés aux feuil les, ou sortant de la bifurcation des rameaux. Les calices sont fort petits, concaves, ovales, un peu colorés; la corolle à peine plus grande que le calice; les pétales jaunes, presque elliptiques; les fruits comprimés, acuminés, médiocrement hérissés d'aspérités.

Cette plante croît en France, dans les départements méridionaux, dans les environs de Fougères, département d'Ille & Vilaine, où je l'ai recueillie; dans les environs d'Alger, &c. &c. (V. v.)

75. RENONCULE hérissée. *Ranunculus muricatus*. Linn.

*Ranunculus feminibus aculeatis; foliis simplicibus, lobatis, obtusis, glabris; caule diffuso*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 780. — Hort. Clifort. 229. — Hort. Upf. 157. — Royen, Lugd. Bat. 491. — Sauvag. Monfp. 204. — Hoffm. Germ. 195. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 195. n°. 789. XLIII. — Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 183. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 440. — Villars, Dauph. vol. 3. pag. 571. — Gouan, Monfp. 271. — Gérard, Flor. gill. prov. pag. 288. — Lam. Illustr. Gener. tab. 498. fig. 2.

*Ranunculus glabellus, diffusus; foliis simplicibus, subrotundis, tripartito-lobatis; calice reflexo; capsulis majusculis, utraque facie muricatis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 321.

*Ranunculus pulstris, echinatus*. C. Bauh. Pin. 180. — Prodr. 95. — Tournef. Inst. R. H. 286. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 818. Icon. — Gard. Aiz. 394.

*Ranunculus apulei quibusdam*. Clus. Hist. 233. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 29. fig. 25.

¶. *Idem caule erecto, ramis non diffusis*. (N.)

*Ranunculus creticus, echinatus, latifolius*. Prosp. Alp. pl. exot. pag. 263. tab. 262.

*Ranunculus echinatus, stellatus, creticus*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 29. fig. 25. — C. Bauh. Pin. 180. — Tournef. Inst. R. Herb. 286.

γ. *Ranunculus (echinatus), feminibus aculeatis; foliis glabris, superiioribus trilobis; caule erecto, simpliciter; petalis calice duplo longioribus*. Ventenat, Jard. Celf. pag. & tab. 73.

Ses tiges s'élèvent peu, & se divisent en un grand nombre de rameaux diffus, étalés, horizontaux, glabres, garnis de feuil les pétioles, glabres, dont les radicales & les inférieures sont larges, un peu arrondies, entières, ou divisées en trois lobes incisés ou dentés, obtus; les supérieures sont plus constamment trilobées; les terminales, ou entières, ou à deux & trois lobes lancéolés, d'une forme variable.

Les

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, soutenues par des pédoncules droits, striés. Leur calice est composé de cinq folioles réfléchies, aiguës; la corolle petite, de couleur jaune; les fruits comprimés, un peu divergens, ovales, oblongs, hérissés à leurs deux faces d'aspérités piquantes, terminés par une pointe dure & recourbée.

J'ai recueilli en Barbaie la variété  $\mu$ , qui parait être la même plante que celle dont Prosper Alpin a donné la figure, quoiqu'elle diffère un peu par la forme des feuilles, qui sont, dans ma plante, plus larges, moins allongées, comme tronquées à leur base, & portées sur de très-longs pétioles. Les tiges sont droites, hautes d'environ un pied; elles se divisent en rameaux ciliés, point diffus, quelquefois un peu pubescens, ainsi que les pétioles.

La plante n'en est encore qu'une variété de cette même espèce, qui n'en diffère que par sa petitesse, par ses feuilles inférieures, souvent plus arrondies & échancrées à leur base; par ses tiges très-basses, presque simples. Elle m'a été communiquée par M. Boie, qui l'a recueillie aux environs de Charles-Town, dans la Caroline.

Je pense qu'on doit aussi rapporter à la même espèce une plante du Sicile, rapportée par Commerson, & que M. Ventrat a mentionnée sous le nom de *ranunculus* (ventricosus), *feminibus aculeatis*; *foliis glabris, trilobis*; *pétioles basi ventricosi*; *caulibus patulis, sulcatis*. Jard. Cell. pag. 74.

Ces plantes croissent dans les lieux humides, en France dans les départements méridionaux, en Italie, dans la Barbarie, &c. ○ (V. v.)

76. RENONCULE des champs. *Ranunculus arvensis*. Linn.

*Ranunculus feminibus aculeatis*; *foliis superioribus decompositis, linearibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 780. — Hort. Cliff. 229. — Flor. suec. 470. — Iter. Æl. 105. — Roy. Lugd. Bat. 491. — Dalib. Paris. 166. — Æder. Flor. dan. 219. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 205. — Scop. Carn. n.º 693. — Pollich. Pal. n.º 537. — Kniph. Centur. 12. n.º 82. — Hoffm. Germ. 196. — Roth. Germ. 1. 240. II. 618. — Bulliard, Herb. tab. 117. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 195. n.º 789. XLI. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 430. — Gouan. Monsp. 167. — Villars, Dauph. vol. 2. pag. 751.

*Ranunculus feminibus aculeatis, foliis tripartitis*; *lobis longè petiolatis, bipartitis & tripartitis, acutè incisè*. Hall. Helv. n.º 1176.

*Ranunculus echinatus*. Crantz, Austr. pag. 118.

*Ranunculus arvensis, echinatus*. C. Bauh. Pin. 179. — Tournef. Inst. R. Herb. 289. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 859. Icon. — Schaw. Spec. n.º 458. — Botanique, Tome VI.

Morif. Oxon. Hist. 1. §. 4. tab. 29. fig. 23. — Gauid. Aix. pag. 394.

*Ranunculi hortensis simplicis, species prima*. Fuchs, Hist. 157. — Dalech, Hist. vol. 1. pag. 1030. Icon.

*Ranunculus arvensis*. Lobel. Ic. 665. — Gérard, Hist. 951. Icon. — Parkinson, Theatr. 328. Icon.

*Ranunculus silvestris*. Dodon. Penpt. 427. Icon.

*Ranunculus arvensis, angustifolius*. Tabern. Ic. 47.

*Ranunculus arvensis, ad quamvis speciem*. Cord. Hist. 120.

Ses racines sont fibreuses, médiocrement fasciculées; il s'en élève une tige un peu pubescente, haute de huit à dix pouces, dure, cylindrique, divisée en rameaux diffus, garnis de feuilles glabres, pétioles, presque àiles ou décomposés en larges étroites, linéaires, à deux ou trois dents, ou bien entières à leur sommet; les supérieures bien plus finement découpées, plus étroites, à peine pétioles; les découpures rapprochées & comme fasciculées.

Les fleurs, assez nombreuses, sont situées à l'extrémité de chaque rameau, portées par des pédoncules filiformes, un peu pubescens. La corolle est petite, d'un jaune-pâle; il lui succède des fruits agrégés, en tête, mais un peu écartés, presque en étoile, ovales, hérissés à leurs deux faces, & munis à leurs bords de pointes dures, piquantes, recourbées en dedans.

Cette plante croît dans les champs & aux lieux arides & stériles, en France, en Allemagne, &c. Je l'ai également rencontrée sur les côtes de l'Afrique septentrionale. ○ (V. v.)

C'est une des espèces les plus caustiques de ce genre; elle enflamme & corrode la peau; elle excite à la gorge, lorsqu'on la mâche, des cuissons violentes. Une once de son suc donne, en trois jours, la mort à un chien, dont elle corrode les intestins.

77. RENONCULE trilobée. *Ranunculus trilobus*. Desfont.

*Ranunculus caule erecto, foliis glabris, caulibus trilobis, pedunculis striatis*; *feminibus compressis, tuberculosis*. Desfont. Flor. atl. pag. 437. tab. 113.

Cette plante approche du *ranunculus parviflorus*, mais ses tiges sont droites, ses feuilles glabres, les inférieures ordinairement à trois lobes, ses fleurs plus grandes.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées; il s'en élève des tiges hautes de huit à dix pouces, glabres ou un peu velues, particulièrement vers leur base; striées, un peu rameuses; les rameaux étalés, garnis de feuilles glabres, pétioles; les radicales crénelées, presque lobées ou divisées, ainsi

que les caulinaïtes inférieures, en trois lobes profonds, cuneiformes, ou en trois folioles bien distinctes, inégalement dentées ou crenellées à leurs bords; les supérieures laciniées, à découpsures étroites, lanceolées.

Les fleurs sont terminales, portées sur des pédoncules simples, ingaux, uniflores, érales. Le calice est composé de cinq petites folioles concaves, ovales, colorées, acuminées, presque glabres. La corolle est jaune, les pétales arrondis, un peu plus longs que le calice. Les fruits sont petits, comprimés, orbiculaires, canaliculés à leur contour, tuberculés à leurs deux faces, terminés par une petite pointe recourbée, & réunis en une petite tête ovale, obtuse.

J'ai recueilli des variétés de cette plante à tige grêle très-fine, dont les feuilles, plus petites, n'étoient trilobées qu'à leur sommet, & les fleurs bien moins nombreuses.

J'ai rencontré cette plante en Barbarie, dans les prés humides des environs de la Calle. M. Desfontaines l'a également recueillie dans les mêmes contrées, proche Mayane. ♀ (V. v.)

78. RENONCULE polyphyll. *Ranunculus polyphyllus*. Willd.

*Ranunculus foliis submersis, oblongis; petiolis capillatibus, natantibus, cuneiformibus, trilobis; emersis ellipticis, caule erecto*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1331. n°. 58.

*Ranunculus polyphyllus*. Waldstein & Kitaibel. Plant. rar. Hungar.

Cette plante a des tiges longues de huit à dix pouces, rameuses à leur partie supériorité, garnies de deux sortes de feuilles, les unes entièrement submergées, très-nombreuses, longues d'un pouce, enveloppant la tige en totalité, oblongues, supportées par des pétioles longs d'un demi-pouce, & capillaires. Les feuilles supérieures sont flottantes au dessus de l'eau, petites, cuneiformes, à trois lobes très-entiers, & soutenues par un pétiole court, épais. Les rameaux s'élèvent au dessus de l'eau d'environ un pouce; ils sont garnis de feuilles elliptiques, réticulées à leurs deux extrémités, ébutes, longues de quatre à six lignes, médiocrement pétioles. Les fleurs sont jaunes & fort petites.

Cette plante croît en Hongrie, dans les eaux tranquilles. ○

79. RENONCULE à feuilles de lierre. *Ranunculus hederaceus*. Linn.

*Ranunculus foliis subrotundis, trilobis, integerrimis; caule repente*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 781. — Hort. Cliff. 231. — Roy. Lugd. Bat. 492. — Delib. Paris. 167. — Gort. Gelr. 325. — Pal.

Itin. 2. pag. 511. — Leers, Herb. n°. 431. — Pollich, Pal. n°. 538. — Reich, Flor. n°. 1100. — Dzer. Naff. pag. 195. — Diet. Flor. dan. tab. 321. — Weber. Spicil. Flor. goet. pag. 16. — Hoffm. Germ. 197. — Roth. Germ. 1. 197. II. 619. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 183. n°. 789. lit. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 442. — Curris. Lond. Icon.

*Ranunculus aquatilis, hederaceus, luteus*. C. Bauh. Pin. 180.

*Ranunculus aquatilis, hederaceus; flore albo, parvis*. Tournef. Inst. R. Herb. 286. — Shaw. Special. n°. 499.

*Ranunculus hederaceus rivularum, atrâ maculâ notatus*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 782.

*Ranunculus hederaceus*. Dalm. Hist. 1. pag. 1031. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 441. §. 4. tab. 29. fig. 29.

Cette plante diffère du *ranunculus aquatilis* par ses feuilles d'une même sorte, arrondies & à plusieurs lobes.

Ses tiges sont glabres, courtes, rampantes, radicantes à leurs articulations, longues de cinq à six pouces, rameuses, garnies de feuilles très-glabres, pétiolées, alternes, arrondies, divisées à leur contour en trois ou cinq lobes arrondis, peu profonds, entiers ou échancrés à leur sommet, ou très-rarement crenellés, larges à peine d'un demi-pouce, échancrés à leur base, quelquefois marquées d'une tache noire.

Les fleurs sont solitaires, pédonculées, opposées aux feuilles, ou axillaires; les pédoncules à peu près aussi longs que les pétioles, glabres, épais. Le calice est blanchâtre, court, à folioles ovales, aiguës, rabotées sur le pédoncule après l'épanouissement des fleurs. La corolle est blanche & non de couleur jaune, quoique Caspard Bauhin l'indique avec cette couleur, à moins que ce n'en soit une variété; les pétales presque en cœur, ovales, arrondis & non aigus; les fruits glabres, presque arrondis, obois, tidés irrégulièrement à leurs deux faces, réunis en une petite tête globuleuse.

Cette plante croît dans les lieux inondés & les mares d'eau, en France, en Allemagne, en Angleterre, &c. ♀ (V. v.)

Observations. Cette espèce & les suivantes, qui croissent dans les eaux, sont remarquables par leurs semences arrondies, point comprimées, glabres, striées transversalement, ou tidées à leurs faces, à la plupart un peu arquées, obtuses.

80. RENONCULE aquatique. *Ranunculus aquatilis*. Linn.

*Ranunculus foliis submersis, capillatibus; emersis*

*pehatis*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 781. — Flor. suec. edit. 2. n° 509. — Gmel. Sibir. 4. pag. 207. — Crantz, Austr. pag. 118. — Scap. Carn. 681. — Pollich, Pal. n° 559. — Lamarck, Flor. fr. vol. 3. pag. 184. n° 789. V. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 444.

*Ranunculus (heterophyllus), foliis submersis, capillaceis; emersis re-formis-palmatis*. Hoffm. Germ. 197. — Roth. Germ. I. pag. 240. — II. 619.

*Ranunculus fluitans, petiolis unifloris; foliis imis, ciliatis; laciniis divergentibus* Haller, Helv. n° 1. 63.

*Ranunculus foliis natantibus, petiolo-multipartitis; immersis capillaceis, nectariis tubulatis*. Neck. r. Gailob. pag. 242.

*Ranunculus foliis inferioribus, capillaceis, superioribus pehatis*. Flor. lapon. 234. — Royen, Lugd. Bat. 492.

*Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo*. C. Bauh. Pin. 180. — Tournef. Infl. R. Herb. 291. — Shaw. Specim. n° 500.

*Ranunculus aquatilis, albus, rotundifolius*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 781. Icon.

*Ranunculus aquaticus, hepaticae fidei*. Lobel. Icon. 2. pag. 35. — Idem, Obsef. 497. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 4. tab. 29. fig. 31. — Parkins, Th. rar. 12. 6.

*Ranunculus aquatilis*. Dodon. Pempt. 587. — Gerard, Hist. 829. Icon.

*Ranunculus aquatilis, albus, lata & feniculi folio, italicus*. Barrel. Icon. rar. 565. Bona.

*Ranunculus aquatilis, hepatica, fluvialis, &c.* Tabern. Icon. 54. Mala.

*Idem, foliis scilicet omnibus pehatis, summis rotundifolius seu capillaceis*. (N.)

*A. Ranunculus (aquatilis), foliis omnibus capillaceis; laciniis divergentibus*. Hoffm. Germ. 197. — Roth. Germ. I. pag. 241. — II. 620.

*Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis capillariis, laciniis divergentibus*. Haller, Helv. n° 1. 162. — Pollich, Pal. n° 559. Var. 2.

*Ranunculus aquaticus, capillaceus*. C. Bauh. Pin. 180. — Tournef. Infl. R. Herb. 291. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 4. tab. 29. fig. 31. — Desfont. Flor. atlant. L. C.

*Ranunculus aquatilis omnino*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 781. Icon.

*Ranunculus alter, aquaticus, feniculi-aceus*. Col. Ephr. I. pag. 315. tab. 316.

*Millefolium aquaticum, foliis abrotani; ranunculi flore & capitula*. C. Bauh. Pin. 141.

*Millefolium macrophyllum tertium, Rose & semine ranunculi aquatici, hepatica fidei*. Lobel. Icon. 791. — Gerard, Hist. 827.

*Millefolium aquaticum, ranunculi flore & capitula*. Parkins, Theatr. 1256. Icon.

*Feniculum aquaticum tertium*. Tabern. Icon.

*Ranunculus aquaticus, albus; feniculi folia*. Barrel. Icon. rar. tab. 566. Optima.

*Ranunculus aquatilis*. Var. 7. Linn. Spec. Plant. L. C.

*Ranunculus (capillaceus), foliis capillaceis; laciniis divergentibus, petiolis unifloris*. Thunb. Paris. 278. edit. 2. — Vaill. Paris. pag. 170.

*B. Ranunculus foliis omnibus capillaceis, circumscriptis rotandis*. Hort. Cliff. 232. — Roy. Lugd. Bat. 492. — Desfont. Flor. atlant. L. C.

*Ranunculus aquatilis*. Var. 2. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 782.

*Ranunculus foliis submersis, capillaceis*. Flor. suec. 1. n° 472. — Dalib. Paris. 168.

*Ranunculus aquatilis*. Var. 2. Roth. Germ. II. p. 620.

*Ranunculus aquaticus, albus, circinnatis, tenuissimis divisis foliis, floribus ex alis longis, pediculis innixis*. Pluken. Almag. 311. tab. 55. fig. 2.

*Millefolium aquaticum, carnatum*. C. Bauh. Pin. 141. — Idem, Prodr. 73. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 784. Icon. — Parkins, Theatr. 1257. Icon.

On seroit très-porté à croire, à la première vue, qu'il existe, dans les trois variétés que nous avons présentées de cette plante, au moins deux espèces; la première distinguée des deux autres par ses feuilles de deux sortes, &c dont les feuilles inondées sont beaucoup plus allongées. Quelques auteurs les ont en effet distinguées, mais le plus grand nombre des botanistes ne les présente que comme variétés, & l'on verra dans les observations, à la suite de cette espèce, qu'elles ne doivent pas être séparées.

La première a des tiges très-longues, fort glabres, cylindriques, égales dans toute leur longueur; fistuleuses, rameuses, produisant à leurs articulations de petites touffes de racines fibreuses & capillaires. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, glabres, de deux sortes, les unes entièrement plongées dans l'eau, à plusieurs divisions dichotomes; leurs découpures fines, capillaires; les pétioles plus longs que les feuilles, munis à leur base d'une gaine membraneuse. Les feuilles supérieures flottent au dessus de l'eau; elles sont orbiculaires, presque pétiolées, larges, divisées plus ou moins profondément en trois lobes entiers ou bien incisées, & dentées à leurs bords en dents obtuses, quelquefois à trois folioles.



Les fleurs sont latérales, mais non pas axillaires; portées sur des pédoncules glabres, simples, nus, tantôt plus longs, tantôt plus courts que les feuilles. Le calice est composé de cinq folioles ovales, concaves, un peu verdâtres, blanchâtres & membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre, ouverte; les pétales ovales, arrondis à leur sommet, marqués de jaune à leur onglet; les fruits petits, nombreux, un peu comprimés latéralement; oblongs, médiocrement arqués, ridés à leurs deux faces, réunis en une petite tête arrondie, & fixés sur un réceptacle ovale & velu.

La variété *a* est remarquable en ce que presque toutes ses feuilles sont peltées, lobées, à crénelures arrondies; quelquefois elles sont laciniées, & les lanières sont disposées circulairement en rayons divergens: quelques-unes, mais rarement, sont composées de folioles capillaires, dichotomes, courtes, pinnatifides. Cette variété m'a été communiquée par M. Desportes, qui l'a recueillie dans les environs du Mans, aux lieux aquatiques.

La plante *A* est facile à distinguer de la précédente, par ses feuilles toutes semblables, à divisions capillaires, dichotomes, écartées, plus courtes, divergentes.

Dans la variété *B* ces mêmes feuilles sont très-rapprochées des tiges, à divisions fines & courtes; à folioles nombreuses, fasciculées, arrondies à leur circonférence lorsqu'elles sont ouvertes. Elles forment des paquets courts, globuleux, épais, médiocrement pétiolés.

Ces plantes croissent dans les étangs, les mares & les rivières, en Europe & dans l'Afrique septentrionale. (P. v.)

Elles sont très-corrosives, & font élever des ampoules lorsqu'on les applique sur la peau.

*Observations.* Les seules circonstances de localité occasionnent les variétés singulières de cette espèce. Si les semences viennent à lever dans un lieu que l'eau ait presque entièrement abandonné, la plante n'aura que des feuilles élargies, peltées, lobées; si elle croît dans des eaux basses, toutes les feuilles, entièrement plongées dans l'eau, seront capillaires, & la plante n'acquerra des feuilles différentes que lorsque ses rameaux seront parvenus à la surface de l'eau; s'ils ne peuvent y atteindre, soit à raison de la profondeur des eaux ou par une crûe considérable, les feuilles seront toutes capillaires. Il sera facile de s'assurer de la fidélité de ces observations en suivant avec soin la génération & l'accroissement de ces différentes variétés dans les lieux aquatiques; elles me porteroient à croire que le *ranunculus fluitans* pourroit bien également n'être qu'une variété dépendante aussi des mêmes circonstances; mais comme elle se distingue assez bien des autres, & que je n'ai à ce sujet que des

soupons sans certitude, je n'ai pas cru devoir l'y réunir.

#### 81. RENONCULE flottante. *Ranunculus fluitans*.

*Ranunculus foliis omnibus capillacis, circumscriptis o'longis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 782. — *Æter.* Flor. dan. tab. 376. — Lamarck, 1. flor. fr. vol. 3. pag. 184. n°. 789. VI. — Royen, Lugd. Bat. 492.

*Ranunculus (fl. vivitilis). foliis omnibus dichotomo-capillacis; caule natante.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1332. n°. 61.

*Ranunculus foliis omnibus capillacis; laciniis parallelis, longissimis.* Hoffm. Germ. 197. — Roth, Germ. 1. pag. 241. — II. 621.

*Ranunculus aquatilis?* Var. *2.* Linn. L. C.

*Ranunculus peucedanifolius.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 443.

*Ranunculus fluitans, petiolis unifloris, foliis longissimis, laciniis parallelis.* Haller, Helv. n°. 1161.

*Ranunculus albus fluitans, peucedani folio.* Herm. Lugd. Bat. 517.

*Ranunculo, sive polyanthemio aquatili albo affine millefolium maritrophylton fluitans.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 782. Icon.

*Ranunculus aquatilis, albus, fluitans, peucedani folio.* Tournef. hdl. R. Herb.

*Millefolium aquaticum, foliis fenicali; ranunculi flore & capitulo.* C. Bauh. Pin. 141.

Cette espèce, quoique très-voisine du *ranunculus aquatilis*, s'en distingue néanmoins avec facilité par la longueur très-considérable de ses tiges & de ses feuilles, ces dernières étant d'ailleurs toutes semblables, à longues divisions dichotomes.

Ses tiges sont glabres, tendres, longues de trois à cinq pieds & plus, enfoncées & flottantes en touffes dans l'eau, très-rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-longues, filiformes, partagées en filaments ou en rameaux lineaires, filiformes, parallèles, dichotomes, très-longs.

Les fleurs sont solitaires, portées sur des pédoncules glabres, épais, latéraux, ordinairement munis à leur base d'une large bractée membraneuse, presque en forme de spathe. Les calices sont composés de cinq folioles glabres, concaves, ovales, verdâtres, blanches & membraneuses à leurs bords, ainsi qu'à leur face intérieure. La corolle est blanche, les pétales ovales, les fruits glabres, réunis en une tête globuleuse.

Cette plante croît dans les fleuves & les lacs, où elle forme souvent des touffes longues, très-abondantes, presque toujours submergées; les

seules fleurs flottantes à la surface de l'eau. On la trouve en Europe & dans la Barbarie. (V. v.)

## 82. RENONCULE naine. *Ranunculus pumilus*.

*Ranunculus glaber, foliis pinnatis, pinnis petiolatis; foliolis minimis, linearibus; seminibus transversariatis, caule subnullo.* (N.)

*Ranunculus (caespitosus), aquaticus, humilis; foliis tenuiter incis. Thuill. Paris. edit. 2. pag. 279. ? — Vaill. Paris. 1711.*

A. Idem, major, caulescens.

Cette espèce, par sa petitesse, approche du *ranunculus falatus*, dont elle diffère par ses feuilles glabres, par ses semences striées transversalement & obtuses; elle a de grands rapports avec la variété A du *ranunculus aquatilis*.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées, presque filiformes; ses tiges sont presque nulles; toutes les feuilles pétioles, radicales, nombreuses, en petites rosettes, ailées; à trois ou cinq pinnules soutenues par des pétioles capillaires, composées de folioles courtes, fort petites; digitées ou ternées, linéaires, obtuses.

Les fleurs sont supportées par des hampes à peine aussi longues que les feuilles, d'un à deux pouces; filiformes, très-glabres, uniflores. Le calice est composé de cinq folioles blanchâtres, réfléchies. La corolle est blanche; les pétales ovales, oblongs, arrondis à leur sommet; les fruits peu nombreux, globuleux, un peu oblongs, obtus, très-glabres, striés transversalement, formant une fort petite tête.

Cette plante m'a été communiquée par M. Bosc. On la trouve dans les marais à Fontainebleau. (V. f.)

J'ai trouvé sur les bords de l'Aisne, à Soissons, la variété A: elle est bien plus grande; elle a des riges rampantes, médiocrement relevées, garnies de feuilles caulinaires, semblables aux radicales.

\* Espèce moins connue.

\* *Ranunculus (ternatus), calicibus reflexis, foliis omnibus ternatis, foliolis trifidis, caule multifloro.* Thunb. Japon. 241.

**RENOUÉE. *Polygonum*.** Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des polygonées, qui a des rapports avec les *rumex*, & comprend des herbes ou sous-arbrisseaux tant indigènes qu'exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont entières, munies la plupart de stipules membraneuses; les fleurs disposées en panicule ou en épis, axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à cinq divisions; point de co-

rolle; de cinq à huit étamines; deux ou trois styles; une seule semence supérieure, nue, anguleuse.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, divisé profondément en cinq découpures ovales, obtuses, persistantes.

2°. Point de corolle.

3°. De cinq à huit étamines, dont les filaments sont très-courts, subulés, terminés par des anthères arrondies & pendantes.

4°. Un ovaire à trois côtés, surmonté de deux à trois styles filiformes, très-courts, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en une seule semence nue, triangulaire, aiguë, environnée par le calice persistant.

*Observations.* Ce genre a de grands rapports avec les *rumex* & les *atraxaphis*; les semences ordinairement anguleuses, & les stipules vaginales qui enveloppent les riges, les rapprochent surtout des *rumex*; mais ce dernier genre en diffère par les six divisions de son calice, par six étamines confondues & trois styles, dont les stigmates sont dichotomisés: les *atraxaphis* n'ont que deux stigmates sessiles, six étamines, un calice à quatre divisions.

Les caractères de la fructification sont très-variables dans les *polygonum*, & nous ne pouvons même en présenter aucun comme constant, si ce n'est le calice à cinq divisions. Les étamines varient de cinq à neuf, les styles de deux à trois; les semences sont à peine trigones & anguleuses dans quelques espèces.

Ces différences, qui affaiblissent si considérablement les caractères de ce genre, & le rendent si peu naturel, facilitent d'un autre côté la détermination des espèces. La forme des stipules & des bractées, ainsi que celle des semences, fournissent encore de très-bons caractères.

Ces plantes ont peu d'éclair, quelques espèces exceptées; mais la plupart sont inutiles par leurs semences farineuses & nutritives, & dont plusieurs rivalisent avec le blé: toutes sont d'une grande ressource pour les oiseaux granivores.

## ESPÈCES.

\* *Tiges ligneuses. (Atraxaphis.)*

1. **RENOUÉE en arbrisseau. *Polygonum frutescens*, Linn.**

*Polygonum foliis lanceolatis, acutis; stipulis semi-*

vaginatis, acutis; foliis calicis duobus minoribus, reflexis; caule fruticoso. (N.)

*Polygonum caule fruticoso; foliis ovato-lanceolatis, utrinque attenuatis; ochrea lanceolata, internodiis brevioribus; petalis hinc, exterioribus minoribus, reflexis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 440 n°. 1.

*Polygonum caule fruticoso, calicinis foliis duobus reflexis.* Linn. Syst. veget. pag. 376. — Hort. Ups. 91. — Willd. Illust. n°. 7. — Willden. Arbr. 226. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 176. Icon. — Linn. Ill. tab. 315. fig. 2.

*Polygonum fruticosum, floribus pentapetalis, octandris, trigynis; petalis duobus exterioribus reflexis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 60. tab. 12. fig. 2.

*Atraphaxis inermis, foliis planis.* Hort. Clifford. 138. — Royle, Lugd. Bat. 209.

*Lupatum orientale, frutex humilis; flore pulchro.* Tourn. Coroll. pag. 38.

*Lupatum dauricum, montanum, fruticosum; ramis late fissis.* Ann. Ruth. 227.

C'est un petit arbrisseau bas, presque rampant & en buisson, à rameaux diffus, étalés, glabres, cendres, garnis de feuilles alternes, opposées, glabres, fermes, presque sessiles, ovales ou lancéolées, entières ou légèrement crenelées à leurs bords, rétrécies en pétiole à leur base, aiguës & presque piquantes à leur sommet; à nervures rameuses & saillantes. Les stipules sont membraneuses, blanches, lancéolées, aiguës, vaginales, bien plus courtes que les entre-nœuds.

Les fleurs, assez nombreux, sont disposées en petites grappes axillaires: elles sont remarquables par les divisions de leur calice, dont deux plus petites sont réfléchies sur un pédoncule articulé, verdâtres dans leur milieu, membraneuses & blanchâtres à leurs bords; les trois autres redressées, pétaliformes, colorées, lavées de rouge sur un fond blanc. Elles renferment huit étamines, un pistil terminé par trois stigmates. Après la floraison, les trois grandes folioles du calice se resserrent & forment les ailes du fruit.

Cette plante croît dans la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres, plutôt comme une plante exotique, que comme un arbrisseau d'ornement. (L. v.)

2. RENOUEE à grandes fleurs. *Polygonum grandiflorum.* Willden.

*Polygonum caule fruticoso; foliis ovato-oblongis, acutis; ochrea lanceolata, internodiis longitudine; petalis aequalibus erectis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 440 n°. 2.

*Polygonum orientale, fruticosum, latifolium, minimum; flore maximo.* Tourn. Coroll. pag. 39.

Cette espèce est très-rapprochée de la précédente: peut-être n'en est-elle qu'une variété. Elle en diffère par ses fleurs plus grandes, dont toutes les folioles calicinales sont redressées, & par ses feuilles plus rapprochées.

C'est d'ailleurs un fort petit arbrisseau, assez ressemblant au *polygonum chamaeum*, haut d'environ un pied & demi, rameux, garni de feuilles alternes, médiocrement pétioles, coriaces, très-entières, ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, un peu roulées à leurs bords, aiguës à leur sommet, légèrement veinées. Les stipules sont blanches, tripartites, lancéolées, plus longues que les entre-nœuds, souvent déchiquetées à leurs bords.

Les fleurs sont aussi grandes que celles du myrte commun, pédonculeuses, axillaires, situées vers l'extrémité des rameaux. Les folioles de leur calice sont toutes redressées.

Cette plante croît dans l'Orient, où elle a été observée & recueillie par Tournefort. (L.)

3. RENOUEE polygame. *Polygonum polygamum.* Vent.

*Polygonum caule ramosissimo, foliis frutularis; calicinis laciniis, obovatis, patulis; ochreis integris.* Vent. Jard. Cels. pag. 65. Icon.

Cette espèce diffère du *polygonum frutescens*, dit M. Venterat, par sa tige extrêmement rameuse, par ses feuilles spatulées, par ses fleurs polygames.

Ses tiges sont droites, ligneuses, cylindriques, très-rameuses dans leur partie supérieure; les rameaux touffus, striés, garnis de feuilles alternes, réfléchies, en forme de spatule; glabres, d'un vert tendre. Les stipules sont glabres, brunes, fluides, évanescentes à leur sommet, tronquées à un de leurs côtés, lancéolées de l'autre.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, axillaires & terminales, formant par leur ensemble une panicule globuleuse, munies de bractées semblables aux stipules. Ces fleurs sont hermaphrodites sur certains individus, simplement femelles sur d'autres; alternes, pédicellées, d'un blanc verdâtre. Le calice est à cinq divisions profondes, ovales, renversées, concaves, pubescentes en dehors, glabres en dedans, renfermant huit étamines plus courtes que le calice; trois styles filiformes, terminés par des stigmates globuleux. Les semences sont linéaires, triangulaires, aiguës, recouvertes par les divisions du calice, dont trois sont droites & deux réfléchies.

Ce petit arbrisseau croît dans les sables arides de la Caroline; il est cultivé dans le jardin de M. Cels. (L. Descript. ex Venterat.)

4. RENOUEE SETACEE. *Polygonum setosum*. Jacq.

*Polygonum floribus olandris, trigynis, axillariibus; foliis subulato-linearibus, stipulis setaceo-lacris, caulibus suffruticosis*. Jacq. Observ. bot. 3. pag. 8. tab. 57.

*Polygonum floribus olandris, trigynis, axillariibus; foliis linearibus-subulatis; ochrea membranacea, ciliatis; caule erecto*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 450. n° 23.

*Polygonum orientale, caryophyllifolium; flore magno, albo*. Tourn. Crot. 39.

Ses tiges sont presque ligneuses, droites, divisées en rameaux alternes, garnies de feuilles très-étroites, alternes, linéaires, subulées vers leur sommet, munies à leur base de gaines membranées, déchiquetées en plusieurs lanières setacées, ciliées. Les fleurs sont axillaires & terminales, assez grandes, de couleur blanche, contenant huit étamines & trois styles.

On rencontre cette plante dans plusieurs contrées du Levant.

\* \* Tige herbacée, un seul épi.

RENOUEE BISTORTE. *Polygonum bistorta*. Linn.

*Polygonum caule simplicissimo, monostachyo; foliis ovatis, in petiolo recurvatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 516. — Mart. medic. 104. — Wed. Flor. dan. tab. 421. — Miller, Icon. tab. 66. — Blackw. tab. 254. — Pollich, Pal. tab. 382. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 40. — Ludw. Ect. tab. 31. — Kn. ph. Centur. 1. n° 65. — Hoffm. Germ. 137. — Roth. Germ. I. pag. 172. — Il. 440. — Lain. Flor. franç. vol. 3. pag. 236. n° 838. XI.

*Polygonum radice lignosa, intortâ; spica ovata, foliorum petiolis alatis*. Hall. Helv. n° 1560.

*Bistorta foliis ovato-oblongis, acuminatis*. Hist. Cliff. 150. — Hort. Upf. 95. — Roy. Lugd. Bar. 217.

*Bistorta major, radice magis intortâ*. C. Bauh. Pin. 152. — Tourn. Inst. R. Herb. 511.

*Bistorta major, rugosifloribus foliis*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 538. Icon.

*Bistorta*. Dod. Pempt. 313. Icon. — Dalechamp, Hist. 2. pag. 1285. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. f. tab. 23. fig. 2.

β. *Serpentaria mas, seu bistorta*. Fusch, 773. Icon.

*Bistorta britannica*. Lobel. Icon. 292.

*Bistorta media, folio minus rugoso*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 539. Icon.

*Bistorta*. Camer. Epitom. 685. Icon.

Vulgairement la bistorte.

Ses racines sont grosses, épaisses, allongées, fibreuses, repliées plusieurs fois sur elles-mêmes : elles produisent plusieurs tiges simples, droites, striées, fistuleuses, très-glabres, hautes d'environ un pied & plus, garnies de feuilles simples, très-glabres, dont les radicales & inférieures sont grandes, longuement pétiolées, ovales, lancéolées, entières à leurs bords, quelquefois un peu ondulées, d'un vert gai en dessus, un peu blanchâtres ou glauques à leur face inférieure, décourbées sur leur pétiole, particulièrement à la partie supérieure : les feuilles caulinaires supérieures plus petites, sessiles, acuminées, amplexicaules, échancrées en cœur à leur base. Les stipules sont roussâtres, longues d'un pouce & plus, obtuses, très-entières.

Les fleurs sont terminales, disposées en un épi dense, cylindrique, obtus, long d'environ un pouce, garni d'écaillés luitantes, rigides, setacées à leur sommet, imbriquées, situées entre chaque fleur. Celles-ci sont médiocrement pedoncules : leur calice offre cinq divisions égales, obtuses, relevées ; il renferme huit étamines.

Cette plante croît sur les montagnes, dans les prés & les pâturages, en France, en Suisse, en Allemagne. Je l'ai recueillie sur la route de Soissons à Vaubayn, dans les chemins de traverse. x (V. v.)

C'est un bon fourrage dans les terrains secs, montagneux, & qui plaît beaucoup à tous les bétails, excepté aux chevaux. Cette plante est d'ailleurs très-attringente, recommandée sur la fin des cours de ventre, dans les foiblesse scorbutiques. On la mâche pour raffermir les dents.

6. RENOUEE VIVIPARE. *Polygonum viviparum*.

*Polygonum caule simplicissimo, monostachyo; foliis lanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 516. — Flor. dan. Wed. tab. 13. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 44. tab. 7. fig. 2. — Gunn. Norweg. n° 9. — Kniph. Centur. 2. n° 61. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 236. n° 838. XII. — Hoff. Germ. 138.

*Polygonum radice lignosa, intortâ; foliis narcosis, radicalibus, ovato-lanceolatis; caulibus linearibus*. Hall. Helv. n° 1558.

*Polygonum floribus trigynis, olandris, spicatis; foliis caulibus lanceolatis, semine subrotundo*. Scop. Carn. edit. 1. pag. 422. n° 3. — Edit. 2. n° 470.

*Bistorta foliis lanceolatis*. Flor. lap. 152. — Flor. suec. 321. 340. — Hort. Cliff. 150.

*Bistorta montana, minor; radice intortâ, inodora; flosculis in spica acuminata albis, sterilibus, inferâ spica parte tuberculis profleris, turbinate, purpureis secunda*. Amman. Ruth. 169.

*Bistorta alpina, média*. Tourn. Inst. R. Herb.

fig. 11. — C. Baule. Pin. 192. — Pluken. tab. 151. fig. 2.

*Biflorta minimo alia*. J. Bauh. H. fl. 3. pag. 539. Icon.

*Biflorta minor, seu alpino*. Epitom. 634. Icon.

*Biflorta alpina, minor*. C. Bauh. Pin. 192. Amman. Ruth. 169. — Tourn. L. C.

*Biflorta alpina, minima*. Hall. Opusc. 234.

*Biflorta alpino, seu minor*. Camer. Epit. 184.

*Biflorta minimo*. J. Bauh. H. fl. 3. pag. 539. Ic.

*Biflorta minor*. Cluf. H. fl. pag. 69.

*Biflorta minor nostras*. Parkinson. — Morif. Oxon. H. fl. 2. 5. tab. 28. fig. 3 & 5.

Cette espèce est facile à distinguer de la précédente par ses épis grêles, bulbifères; par ses feuilles bien plus petites & point amplexicaules.

Ses racines sont dures, épaisses, fibreuses: il s'en élève plusieurs tiges hautes de quatre à huit pouces, filuleuses, striées, très-glabres, simples, droites, feuillées. Les feuilles caulinaires & inférieures sont pétiolées, non décurrentes, étroites, lancéolées, aiguës, glabres, marquées de stries ou de nervures courtes, qui aboutissent au contour des feuilles & les font paroître comme légèrement denticulées. Les feuilles supérieures sont sessiles, presque linéaires; les stipules toulâtées, vaginales, obtuses, entières, longues d'un pouce.

Les fleurs sont réunies en un épi grêle, lâche, terminal, long d'environ de six pouces; elles sont blanchâtres, petites, & les inférieures portent ordinairement de petites bulbes noirâtres qui deviennent très-souvent vivipares.

On trouve cette plante dans les montagnes des départements méridionaux de la France, au Puy-de-Dôme, dans la Sibérie, &c. (V. f.)

\*\*\* Examines au dessous de huit. Style bifide.  
(Perficaria.)

7. RENOUÉE de Virginie. *Polygonum virginianum*. Linn.

*Polygonum floribus pentandris, semi-digynis; corollis quadrifidis, inaequalibus; foliis ovatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 516.

*Perficaria floribus pentandris, digynis; corollâ quadrifidâ, inaequali*. Wach. Ultr. 258.

*Perficaria florum flaminibus quinis, stylo duplici; corollâ quadrifidâ, inaequali*. Hort. Cliff. 42. — Gronov. Virg. 43. — Roy. Lugd. Bat. 216.

*Polygonum (virginianum), erectum; foliis lanceolatis, sticis longissime virgatis; floribus inaequa-*

libus, pentandris, digynis. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 238.

*Perficaria frutescens, muculosa, virginiana; flore albo*. Morif. H. fl. 2. pag. 589. — Rai. H. fl. 183. — Tourn. Inst. R. Herb. 510. — Parkinson, Th. attr. 857.

8. *Perficaria frutescens, muculosa, virginiana; flore carneo*. Parkinson, Th. attr. 857. — Tourn. Inst. R. Herb. 510.

Cette espèce a des tiges droites, toides, striées, rameuses, un peu velues, surtout à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes, pétiolées, larges, ovales, acuménées, épaisses, très-entières, pubescentes à leur face inférieure, venter & rud. s à leur face supérieure, légèrement ciliées à leurs bords, longues de quatre à cinq pouces & plus, sur deux ou trois de large; supportées par dix à septioles courts, élargis à leur base, striés, pubescents. Les stipules sont vaginales, membraneuses, tronquées ou un peu arrondies à leur sommet, ciliées à leurs bords, & couvertes d'un grand nombre de poils roides & couchés.

Les fleurs sont disposées sur de très-longes épis grêles, effilés; les latéraux plus courts; le terminal très-droit, long de huit à dix pouces, garni de fleurs très-istantes, presque toutes. Leur calice est ordinairement divisé en quatre découpures ovales, inégales, blanchâtres ou couleur de chair. Les étamines sont au nombre de cinq; il n'y a que deux styles plus longs que le calice, persistans presque jusqu'à la maturité des semences, terminés par des stigmates un peu recourbés. Les semences sont ovales, roussâtres, luisantes, obtuses, un peu comprimées, point anguleuses.

Cette plante croît dans les forêts ombragées, dans la Virginie, au Canada, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

8. RENOUÉE à feuilles de patience. *Polygonum lapathifolium*. Linn.

*Polygonum floribus hexandris, digynis; stipulis mucis, pedunculis scotris, seminibus utrinque depressis*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 30.

*Polygonum floribus pentandris, semi-digynis; flaminibus corollâ regulari aequalibus*. Linn. Sp. c. Plant. vol. 1. pag. 517.

*Polygonum pensylvanicum*. Curt. Lond.

*Perficaria floribus pentandris, digynis; corollâ regulari, flaminibus aequali*. Wach. Ultr. 257.

*Perficaria florum flaminibus quinis, semi-digynis; stylo bifido, corollâ regulari aequalibus*. Hort. Cliff. 42.

*Perficaria major, lapathi foliis; calice foris purpureo*. Tourn. H. fl. R. Herb. pag. 510. — Rai. Suppl. 119.

Ses racines sont dures, un peu tortueuses, fibreuses, médiocrement ramifiées; ses tiges droites, fermes, très-lisses, divisées en rameaux érales, articulés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales ou lancéolées, grandes, assez semblables à celles de la patience ou des *phytolacca*; glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses ou aiguës à leur sommet. Les stipules sont des gaines pubescentes & ciliées.

Les fleurs sont disposées en épis grêles, un peu ramifiés, de la longueur des feuilles, situés le long des rameaux, en opposition avec les feuilles. Le calice est à cinq divisions égales, purpurines; il renferme de cinq à six étamines de la longueur du calice, & un pistil divisé en deux, ou à deux stigmates allongés. Les semences sont comprimées latéralement; les pédoncules rudes au toucher.

Cette plante se rapproche du *polygomon hydro-piper* à plus larges feuilles; elle croît en France, en Angleterre, dans les marais & les étangs. ♀

*Observations.* La figure de Lobel, 315, rapportée à cette plante, doit appartenir au *polygomon hydro-piper*. Si on l'applique à cette espèce, il faudrait également y rapporter celle de Dodonée, 607; celle de Morison, §. 5, tab. 29, fig. 6, ces trois figures, surtout les deux premières, ayant été évidemment copiées l'une sur l'autre.

### 9. RENOUÉE amphibie. *Polygonum amphibium*. Linn.

*Polygonum floribus pentandris, semidigynis; spica ovata.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 517. — *Æder*. Flor. dan. tab. 282. — Pollich, Pal. n°. 385. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 233. n°. 838. IV. — Hoffm. Germ. 138. — Roth. Germ. l. 173. — Il. 450. — Leers, Herborn. n°. 296.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis, ciliatis; spica ovatis.* Haller, Helv. n°. 1565.

*Polygonum spicis foliatis, pedunculatis; flaminibus quinque, foliis serratis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 46.

*Polygonum foliis glabris, longe petiolatis; spica subrotunda.* Moench. Hall. n°. 328. a.

*Perficaria florum flaminibus quinque, corollam superantibus; stylo bifido.* Hort. Cliffort. 41. Royen, Lugd. Bat. 216.

*Perficaria floribus pentandris, digynis; corollâ flaminibus brevioribus.* Flor. succ. 318. 341.

*Polygonum foliis petiolatis, oblongo-ovalibus, seu lanceolatis; stipulis nudis; spica terminali, erectâ, confertiflora; ovata oblongâ; florum pentandris, semidigynis.* Michx. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 140.

*Perficaria foliis folio, potamogeton angustifolium* Botanique. Tome VI.

*distâ.* Tournef. Inst. R. Herb. 509. — Rai, Hist. 184.

*Potamogeton foliis folio.* C. Bauh. Pin. 193.

*Potamogeton secundum.* Dalech. Hist. 1. pag. 1008. Icon.

*Fontinalis seu potamogeton.* Dodon. Cereal. 217.

β. *Potamogeton amphibium* (terrestre), *foliis hirsutis, subsiliatis; spica oblongâ.* Moench. Hall. n°. 328. β.

*Perficaria acida jungermanni.* Trew. Comm. Nor. 1737. tab. 5. fig. 1. 2.

*Potamogeton amphibium* (emersum), *foliis ovalis lanceolatis, erectis, minutim pubescentibus; spica oblongâ.* Michx. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 240. β.

Cette espèce, distinguée par ses épis simples, courts & ovales, & par les feuilles allongées, varie selon les lieux où elle croît, croissant tantôt dans le milieu des eaux, tantôt dans les lieux humides.

Ses racines sont fibreuses, ses tiges longues, articulées, fistuleuses, cylindriques, finies, très-glabres, quelquefois rougeâtres, ou florissantes dans l'eau, ou couchées sur la terre & rampantes. Ses feuilles sont longues, pétiolées, alternes, lancéolées, un peu aiguës, planes, lisses à leurs deux faces dans la plante aquatique, ou chargées de quelques poils dans la variété terrestre. Les stipules sont nues, membraneuses, obtuses.

Les fleurs forment des épis ferrés, longs d'environ un pouce, épais, cylindriques, garnis de bractées larges, écaillues, pointues, bordées de rose; le calice divisé jusque vers la moitié en cinq segments rapprochés, & d'un beau rouge. Il renferme cinq étamines un peu plus longues que la corolle, munies d'anthères à deux loges & de couleur de rose; l'ovaire un peu comprimé, onctueux, surmonté d'un style bifide, & de stigmates presque capités.

Cette plante croît dans les étangs, les rivières, les fosses aquatiques, &c. en Europe & dans l'Asie septentrionale. ♀ (V. v.)

Sa racine a été employée & recommandée comme dépurative & diurétique; elle est astringente. M. Willemet assure l'avoir vu réussir dans les dartres, les gales opiniâtres & les autres maladies de la peau. Les moutons, les chèvres, les chevaux & les cochons mangent cette plante, quoiqu'ils rejettent les vaches.

### 10. RENOUÉE vaginale. *Polygonum ochreatum*. Linn.

*Polygonum floribus pentandris, trigynis; foliis lanceolatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 517.

*Periscaria spicis longis, coriisoffemis; foliis ex lin-  
ari-lanceolatis; vaginis debilibus; floribus pentan-  
dis, digynis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 51. n°. 39.  
t. b. 8.

Cette plante a des tiges rameuses, des feuilles  
pétiolées, alternes, lancéolées, un peu linéaires,  
glabres à leurs deux faces, roulées à leurs bords.  
Les stipules sont vaginales, lisses, ventruës, mem-  
braneuses, entières. Les fleurs sont disposées en  
épis un peu rameux, presque en grappes, très-  
nombreux, très-nombreux : elles renferment cinq éta-  
mines & trois pistils.

Cette plante croit dans la Sibérie.

11. RENOUÉE poivre d'eau. *Polygonum hydro-  
piper.* Linn.

*Polygonum floribus hexandris, semidigynis; foliis  
lanceolatis, stipulis submuticis.* Linn. Spec. Plant.  
vol. 1. pag. 517. — Mater. medic. 104. — Blackw.  
tab. 119. — Trew. Comm. Nor. 1737. tab. 5. fig.  
7 & 8. — Pollich, Pal. n°. 384. — Ludwig, Ecl.  
tab. 168. — Hoffm. Germ. 158. — Roth, Germ.  
1. 173. — Il. 451. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag.  
234. n°. 838. VII.

*Polygonum foliis strigosis, laxis; foliis lanceola-  
tis, seminibus obtusè triangularis, vaginis debilibus.*  
Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 50.

*Polygonum floribus digynis, hexandris; foliis lan-  
ceolatis.* Scop. Carn. 1. pag. 420. n°. 1. var. A. —  
Edit. 2. n°. 467.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis; vaginis cal-  
vis, truncatis.* Haller, Helv. n°. 1554.

*Polygonum (hydropiper), stipulis laxis, glabris,  
apice ciliatis, maculatis; foliis lanceolatis, omisso  
margine, glabris; spicis filiformibus, debilibus, sub-  
cernuis; bracteis renatisculis alternis; floribus albi-  
dis, oëandris, semidigynis.* Mich. Flor. boreal-  
amet. vol. 1. pag. 238.

*Periscaria floribus hexandris, semidigynis.* Flor.  
fuec. 320. 343.

*Periscaria florum flaminibus senis; stylo bifido.*  
Hort. Cliffort. 46. — Rozen, Lugd. Bat. 216.

*Periscaria urens seu hydropiper.* C. Bauh. Pin. 101.  
— Tournef. Inst. R. Herb. 109. — Motif. Oxon.  
Hist. 2. §. 5. tab. 29. fig. 6.

*Hydropiper.* Fusch. 842.

*Periscaria acris, sive hydropiper.* J. Bauh. Hist. 3.  
pag. 780. Icon.

*Periscaria hydropiper.* Lobel. Icon. 315. — Idem,  
Obsev. 170. Icon.

*Hydropiperi.* Dodon. Pempt. pag. 607. Icon.

A. Idem, foliis angustioribus, ramis simplicibus  
virgatis, spicis minoribus, interruptis. (N.)

Vulgairement. Le poivre d'eau. Curage.

Ses racines sont fibreuses; les tiges lisses, arti-  
culées, un peu flexueuses à leurs articulations,  
cylindriques, striées, glabres, rougeâtres, ra-  
meuses, garnies de feuilles alternes, médiocrement  
pétiolées, très-glabres, point racherées,  
lancéolées, aiguës, entières, marquées de ner-  
vures latérales, simples, un peu arquées. Les sti-  
pules sont courtes, glabres ou un peu ciliées,  
tronquées à leur sommet.

Les épis sont grêles, lâches, latéraux, avillai-  
rés, simples ou un peu rameux, garnis de bractées  
écailleuses. Les calices se divisent en quatre dé-  
coupures courtes, blanchâtres ou colorées en  
rouge; ils renferment six étamines, un pistil à  
demi-bifide. Les semences sont un peu comprimées,  
médiocrement triangulaires.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le  
*polygonum periscaria*; elle en diffère par ses épis  
plus grêles, par les stipules rarement ciliées, par  
la saveur bien plus âcre & brûlante.

La plante A offre une variété très-remarquable  
de cette espèce. Ses tiges se divisent presque dès  
leur base en rameaux simples, effilés, longs d'en-  
viron un pied, glabres, d'un rouge assez vif, gar-  
nis de feuilles à peine pétiolées, plus étroites,  
plus courtes. Les stipules sont renflées, munies à  
leur orifice de quelques cils droits & fins. Les épis  
sont fort grêles, très-simples, composés de fleurs  
distantes, pédiculées, rougeâtres. Je l'ai recueillie  
dans les environs de Fougères, département de  
l'Ille & Vilaine, dans les fossés inondés.

Elle croit partout en Europe sur le bord des  
eaux, dans les fossés & les lieux humides. O  
(V. v.)

Cette même espèce, observée par Michaux en  
Amérique, est un peu différente de la nôtre : ses  
fleurs ont sept ou huit étamines & trois pistils. Les  
stipules sont ciliées & racherées à leur sommet;  
les feuilles un peu pubescentes à leurs bords.

Cette plante est détersive, astringente, âcre &  
corrosive. On s'en sert pour déterger les plaies,  
& pour rétablir le ressort des parties édemateuses.  
On l'emploie aussi intérieurement comme diuré-  
tique & antiscorbutoque, dans la bouffissure, l'hy-  
dropisie, le scorbut. Pour tempérer sa causticité  
on l'unit à l'oseille ou aux raisins secs. On s'en  
faut encore pour guérir les ulcères des chevaux.  
Elle teint en jaune. Les bestiaux n'y touchent pas.

12. RENOUÉE faux poivrier. *Polygonum hydro-  
piperoides.* Mich.

*Polygonum stipulis undique hirsutis, promissè ei-*

*liatis; foliis angusto-lanceolatis, sessilibus, minutim asperiuscule hirsutis; spicis linearibus, debilibus; bracteis subimbricatis, ciliatis; floribus obovatis, semitrigynis.* Mich. Flor. boreal.-amet. vol. 1. pag. 239.

β. *Idem, stipulis nudis, foliis glaberrimis.* (N.)

Malgré les rapports que cette plante peut avoir avec le *polygonum hydropiper*, on l'en distingue aisément à ses épis grêles & linéaires, & à ses feuilles bien plus étroites; elle n'en a point d'ailleurs l'acreté & la causticité.

Ses tiges sont droites, cylindriques, articulées, striées, un peu fistuleuses, divisées en rameaux pendans, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, glabres ou légèrement velues, étroites, lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités. Les stipules sont vaginales, un peu renflées, glabres ou velues, terminées à leur orifice par de longs cils droits, fins, subulés.

Les épis sont grêles, linéaires, terminaux ou axillaires, garnis de fleurs verdâtres ou purpurines, un peu écartées, légèrement pédonculées, munies de bractées presque imbriquées & ciliées à leurs bords. Elles contiennent sept ou huit étamines, trois styles, ou un seul style à demi divisé en trois. Les semences sont fort petites.

J'ai reçu de M. Bosc la plante β, qu'il a recueillie dans la Caroline. Elle ne diffère de la précédente que par ses stipules glabres, mais ciliées à leur orifice, & par ses feuilles parfaitement glabres. Elle offre d'ailleurs tous les autres caractères de la plante de Michaux.

Cette plante croît dans la Caroline, dans la Virginie & dans la Pensilvanie. (V. f.)

11. **RENOUÉE à tiges basses.** *Polygonum pusillum.* Lamarck.

*Polygonum foliis linearibus-lanceolatis; stipulis subciliatis, oblongis; caule basi repente.* (N.)

*Polygonum pusillum.* Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 255. n°. 838. IX.

*Polygonum (angustifolium), floribus pentandris, semiaiguis; foliis sitiformibus; foliis lanceolato-linearibus.* Roth. Germ. II. pag. 453. — Hoffm. Germ. 138.

*Polygonum (minus), floribus hexandris, submonogynis; foliis linearibus-lanceolatis, caule basi repente.* Aiton, Flor. Kew. vol. 2. pag. 31. — Curtis, Lond.

*Polygonum intermedium.* Ehrh. Herb. 94.

*Polygonum mite.* Schrank, Bav. I. pag. 668.

*Polygonum frillum.* Allion, Flor. ped. n°. 2051. tab. 67. fig. 1.

*Polygonum persicaria.* β. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 518.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis, glabris; spicis Arigosis, vaginis ciliatis.* Hall. Helv. n°. 1555.

*Persicaria minor.* C. Bauh. Pin. 101. — Tournef. Inst. R. Herb. 509. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 29. fig. 5.

*Persicaria pusilla, repens.* Lobel. Icon. 316. — Rai, Angl. 3. pag. 145.

*Persicaria angustifolia.* C. Bauh. Pin. 101. Prodr. 43. — Tournel. Inst. R. Herb. 509.

*Persicaria pumila.* Tabern. 858. Icon.

*Persicaria minor, floribus albis.* C. Bauh. Pin. 101. — Tournef. Inst. L. C.

*Persicaria pusilla Lobelii.* Dalech. Hist. 1. pag. 1041. Icon.

C'est une petite plante qui paroît bien distincte du *polygonum persicaria*, & ne doit pas lui être réunie.

Ses racines sont menues; ses tiges longues de six à huit pouces, grêles, lisses, striées, tendres, tout-à-fait couchées par terre, ou seulement à leur base; garnies de feuilles alternes, à peine pétioolées, très-étroites, linéaires, lancéolées, aiguës, longues d'un à deux pouces, très-glabres, rétrécies en pétiole à leur base, distantes, point tachetées. Les stipules sont un peu allongées, vaginales, cylindriques, garnies à leur orifice de quelques cils rares.

Les fleurs sont disposées en petits épis, courts, latéraux ou terminaux, lâches, très-grêles, presque filiformes. Ces fleurs sont distantes, blanchâtres ou purpurines; elles contiennent de cinq à six étamines, & ordinairement un seul pistil.

Cette plante croît dans les lieux humides, en France, en Suisse, en Angleterre, &c. (V. v.)

14. **RENOUÉE à feuilles étroites.** *Polygonum angustifolium.*

*Polygonum foliis angustissimis; stipulis brevissimis, nudis; spicis paucifloris, ramis divaricato-angustis.* (N.)

*Polygonum angustifolium.* Hort. Paris.

Ses tiges sont très-glabres, dures, cylindriques, point striées; elles se divisent en rameaux très-diffus, étalés, soudiées en un grand nombre d'autres fort courts & par bifurcation ouverte, garnis de feuilles éparfes, glabres, presque sessiles, très-étroites, linéaires, plus ou moins aiguës. Les stipules sont fort courtes, presque point vaginales, un peu élargies, tronquées & point ciliées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en petite



grappes courtes, latérales, presque filiformes, garnies de très-peu de fleurs, fort petites, de couleur cendrée.

Lorsque cette plante est vigoureuse, elle pousse alors plusieurs rameaux élancés, à peine bifurqués, terminés par des fleurs réunies en une petite panicule touffue, composée d'épis paniculiers, un peu rameux, tellement que ces rameaux, considérés isolément, seroient soupçonner aisément qu'ils appartiennent à une autre plante. J'étois tombé dans cette erreur : l'observation des individus vivans m'en a retiré.

J'ai observé cette plante dans l'herbier de M. Lamarck. J'ignore son lieu natal. (V. f.)

#### 15. RENOUEE à fleurs vertes. *Polygonum viridiflorum*.

*Polygonum foliis angusto-longissimis, stipulis ovato-subulatis, floribus racemosis subpendulis; altero foliario axillari, bulbifero. (N.)*

Cette plante pousse des tiges divisées en rameaux élancés, cylindriques, durs, très-glabres, garnis de feuilles longues, très-étroites, glabres à leurs deux faces, alternes, sessiles, munies à leur base de stipules ovales, verdâtres, subulées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées le long des rameaux en petites grappes courtes, un peu pendantes, plus ou moins denses. Chaque fleur est portée sur un pédoncule très-court, capillaire. Leur calice est divisé en cinq découpures droites, ovales, obtuses, vertes, membranées, & blanchâtres à leurs bords. Il existe en outre d'autres fleurs solitaires presque sessiles, situées dans l'aisselle des petits rameaux ou des feuilles, renfermées dans deux larges écailles assez semblables aux stipules, produisant une semence particulière assez grosse, qui m'a paru être une bulbe.

Je soupçonne que cette espèce croit en Amérique. (V. f. in herb. Lamarck.)

#### 16. RENOUEE persicaire. *Polygonum persicaria*. Linn.

*Polygonum floribus hexandris, digynis; spicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, stipulis ciliatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 518. — Flor. succ. 319. 342. — Pollich. Pal. n°. 385. — Wæd. Flor. dan. tab. 702. — Blackw. tab. 118. — Kniph. Cent. 4. n°. 63. — Scop. Carn. n°. 460. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 235. n°. 838. VIII.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis; spicis ovatis, vaginis ciliatis.* Hall. Helv. n°. 1557.

*Polygonum spicis densis, floribus hexandris, digynis; seminibus compressis, vaginis ciliatis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 47.

*Polygonum (persicaria), stipulis glabrisculis, apice ciliatis; foliis lanceolatis, quasi globellis; spicis confertifloris, oblongis; floribus hexandris, femi-digynis.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 259.

*Persicaria florum flaminibus senis, stylo duplici.* Hort. Cliff. 42. — Gronov. Virg. 157. — Roy. Lugd. Bat. 216.

*Persicaria mitis.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 779. Icon. — Flor. lapon. 71.

*Persicaria mitis, non maculosa.* Tournef. Inst. R. Herb. 509. — C. Bauh. Pin. 101. — Trew. Icon. in commer. not. 1737. tab. 5. fig. 3. 4. 5. 6.

*Persicaria Mathioli.* Dalech. Hist. 1. pag. 1041. Icon.

1. *Persicaria mitis, maculosa.* C. Bauh. Pin. 101. — Tournef. Inst. R. Herb. 509. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 29. fig. 2. — Lobel. Icon. 315.

*Persicaria secunda.* Tabern. Icon. 877.

*Persicaria.* Dodon. Pempt. 608. Icon.

*Persicaria mitis, cum maculis ferrugineis equinum referentibus.* Tournef. Inst. L. C.

2. *Persicaria mitis, floribus candidis.* Tournef. Inst. L. C.

3. *Polygonum (turgidum), caule erecto, glabro; stipulis apice truncato, imbricis; foliis ovato-lanceolatis, glabellis; spicis subsessilibus, turgide confertifloris; floribus hexandris, subdigynis.* Thuiller, Paris, édit. 2. pag. 199.

Ses racines sont fibreuses & blanchâtres, ses tiges droites, cylindriques, articulées, souvent couchées à leur partie inférieure, feuillées, rameuses, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales ou lanceolées, aiguës à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, mais quelquefois un peu velues en dessous & à leurs bords. Les stipules sont vaginales, un peu lâches, munies à leur orifice de quelques cils très-fins.

Les fleurs sont disposées en épis courts, très-denses, obus, de couleur rouge ou d'un blanc-falé à l'extrémité de chaque rameau. Le calice a très-ordinairement cinq divisions courtes; il renferme six étamines, deux piliils. Les semences sont petites, brunes, ovales, médiocrement triangulaires.

Cette plante varie selon son lieu natal. Ses feuilles sont plus ou moins élargies, tantôt glabres, quelquefois un peu pubescentes à leur face inférieure, marquées, dans leur milieu, d'une grande tache noire en fer à cheval, ou sans aucune tache.

La variété 3 est très-remarquable, d'abord par

son lieu natal (elle croît au milieu des moissons), &c. de plus par ses épis courts, très-gros, verdâtres; par les stipules tronquées & point ciliées; par les feuilles élargies, ovales, lancéolées. Quoique ces différences aient déterminé M. Thuillier à la distinguer comme espèce, je n'ai pas cru pouvoir la séparer des autres variétés de celle dont il est ici question. J'ai trouvé cette belle variété dans les environs de Fougères. Elle croît également à Montmorency, près des bois.

On rencontre cette plante fréquemment dans les lieux & les fossés humides; le long des chemins dans l'Europe. ○ (V. v.)

Elle passe pour astringente, vulnérinaire, détersive, antipurride, recommandée surtout extérieurement pour nettoyer les plaies & arrêter les progrès de la gangrène. Elle teint en jaune. Il n'y a que les chevaux, les chèvres & les moutons qui la mangent.

#### 17. RENOUÉE tomenteuse. *Polygonum incanum*.

*Polygonum foliis ovato-subrotundis, subtus incanum; floribus hexandris, digynis; spicis oblongis, caule procumbente.* (N.)

*Polygonum floribus hexandris, digynis; spicis oblongis; foliis oblongo-lanceolatis, subtus pubescentibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 446. n°. 14.

*Polygonum (incanum), caule procumbente, erecto, geniculato; foliis ovato-lanceolatis, subtus incanis; spicis terminalibus, axillaribusque interruptis; floribus hexandris.* Schmidt, Bohem. n°. 391.

*Polygonum tomentosum.* Schrank, Bav. pag. 669.

*Polygonum persicaria.* Var. γ. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 518.

*Polygonum foliis ovato-lanceolatis, subtus tomentosis; spicis ovatis, vaginis ciliatis.* Haller, Helv. n°. 1556.

*Persicaria folio subtus incano.* Tournef. Infl. R. Herb. 510. — Rai, Synop. 3. pag. 145.

Cette plante est suffisamment distincte du *polygonum persicaria*, pour ne pas être confondue avec cette espèce.

Ses racines sont longues, fibreuses, presque simples; elles produisent des tiges rameuses, feuillées, herbacées, glabres, cylindriques, très-souvent érigées sur la terre, ou courbées seulement à leur base; garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, un peu arrondies, obtuses, quelquefois légèrement ondulées à leurs bords. Les blanches & un peu pubescentes à leur face inférieure, vertes en dessus & marquées très-souvent d'une tache noire en fer à cheval; d'une substance tendre, herbacée. Les stipules sont membraneuses, vaginales, nues,

très-serrées contre les riges, tronquées & rarement ciliées à leur orifice.

Les fleurs ont une très-grande ressemblance avec celles du *polygonum persicaria*; mais les épis sont un peu moins denses, très-souvent inermes. Le calice est rouge ou un peu verdâtre; il renferme six étamines & un pistil bifide. Les semences sont petites, ovales, médiocrement anguleuses.

On trouve cette plante dans les lieux aquatiques, les terrains inondés, en France, en Suisse, en Allemagne. Je l'ai recueillie dans les environs de Paris, à la Garre. ○ (V. v.)

#### 18. RENOUÉE des teinturiers. *Polygonum tinctorium*. Lourei.

*Polygonum floribus hexandris, semitrigynis; spicis ramosis; foliis crassius, ovatis; stipulis membranaceis.* Lourei. Flor. coch. pag. 297.

*Polygonum (tinctorium), floribus hexandris, trigynis; spicis virgatis; stipulis glabris, arcatis, truncatis, ciliatis; foliis ovato-acutiusculis, glabris.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 31.

Ses tiges sont herbacées, cylindriques, hautes de deux pieds, nombreuses, presque droites, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres, épaisses, succulentes, ovales, très-entières, un peu aiguës à leur sommet; d'un vert gai à leurs deux faces. Les stipules sont membraneuses, vaginales, glabres, serrées contre la tige; tronquées, ciliées à leur orifice.

Les fleurs sont rougeâtres, disposées en épis longs, rameux, presque terminaux, ciliés; leur calice est partagé en cinq divisions conniventes; il renferme six étamines & un style à trois divisions.

Cette plante croît dans la Cochinchine. ♂ (Descript. ex Lourei.)

#### 19. RENOUÉE filiforme. *Polygonum filiforme*. Thunb.

*Polygonum floribus pentandris, digynis; spicis filiformibus, foliis ovatis, stipulis ciliatis.* Thunb. Flor. japon. 163.

Ses tiges sont droites, cylindriques, garnies de poils couchés, roussâtres; profondément striées, divisées en rameaux droits, alternes, velus; garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, aiguës, entières, droites, velues, ciliées à leurs bords, longues d'environ un pouce, supportées par des pétiolés dont la base est dilatée & embrasse la tige. Les stipules sont membraneuses, entières, tronquées & ciliées à leur orifice.

Les fleurs sont disposées en épis, les uns latéraux, d'autres terminaux; les premiers sont petits,

écartés inférieurement, rapprochés vers la partie supérieure. L'épi terminal est filiforme, long de six à sept pouces, un peu courbé à son sommet. Les fleurs durent assez long-tems & ne fleurissent que successivement; elles sont munies de bractées, amplexicaules, barbuës, de deux sortes; une large qui soutient trois fleurs, & deux autres petites, entières, lancéolées à chaque fleur isolément.

Le calice est glabre, divisé presque jusqu'à sa base, en quatre découpures glabres, ovales, longues d'une demi-ligne; trois supérieures, de couleur rouge; une inférieure, blanche: il y a cinq étamines, dont les filamens capillaires & blancs, sont moins longs que le calice; trois plus courts que les autres, terminés par des anthères jaunes & globuleuses. L'ovaire est supérieur, à trois côtés, surmonté de deux styles droits, blancs, subules, de la longueur des étamines; terminés par des stigmates simples, écartés, obtus.

Cette plante croît au Japon. (Descript. ex Thunb.)

20. RENOUEE barbuë. *Polygonum barbatum*. Linn.

*Polygonum floribus hexandris, trigynis; foliis virgatis; stipulis triangularibus, setaceo-ciliatis; foliis lanceolatis*. Linn. Syst. veget. pag. 377. n°. 11. — Gmel. Sibir. 3. pag. 52.

*Polygonum (barbatum), floribus hexandris, trigynis; foliis virgatis; ochreis truncatis, setaceo-ciliatis; foliis oblongis, acutis, glabrisculis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 447. n°. 16.

*Polygonum barbatum*. Thunb. Flor. japon. Var. α, β, γ. pag. 165.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, alongés, herbacés, roussâtres; garnis de feuilles pétioles, alternes, oblongues ou lancéolées, presque glabres à leurs deux faces, ainsi que sur leur pétiole; rétrécies à leur base, entières & ciliées à leurs bords; aiguës à leur sommet, longues de trois à quatre pouces, portées sur des pétioles un peu comprimés, longs d'un pouce & plus. Les stipules sont vaginales, un peu laches, hétéroïdes de quelques poils longs, terminées à leur orifice par des cils roides, subules, blanchâtres, droits, au moins aussi longs que les stipules elles-mêmes.

Les épis sont terminaux, grêles, effilés, garnis de fleurs, quelquefois un peu distantes, munies de bractées turbinées; les calices petits, un peu roussâtres. Ils contiennent six étamines & deux styles.

Cette plante croît dans les Indes & à la Chine. La figure donnée par Sloane, ainsi que celle de Rheed, ne peuvent convenir à cette espèce. La description que je viens d'en donner a été faite sur un individu provenant de l'herbier de Barmen,

étiqueté de sa propre main, & qui m'a été communiqué par M. Boïc. (V. f.)

Observations. Thunberg, dans sa Flore du Japon, distingue de cette plante trois variétés assez remarquables, & qu'il décrit ainsi:

Var. α. Ses tiges sont droites, glabres, purpurines, cylindriques, divisées en rameaux étroits & alternes, garnis de feuilles pétioles, alternes, elliptiques, entières, acuminées, ciliées à leurs bords, velues sur leur principale nervure; celle du milieu très-épaisse: les feuilles supérieures plus petites, les inférieures longues de trois pouces, supportées par des pétioles dilatés à leur base, striés, amplexicaules, très-courts. Les stipules sont vaginales, cylindriques, velues, tronquées, terminées par des cils de même longueur. Les épis terminaux, solitaires ou au nombre de deux, rarement trois; droits, filiformes, imbriqués, longs de deux à trois pouces; les bractées semblables à celles du *polygonum filiforme*.

Var. β. Ses tiges sont médiocrement cylindriques, un peu velues; ses rameaux droits, striés, alternes & velus, garnis de feuilles pétioles, elliptiques, entières, acuminées, ciliées à leurs bords, à nervures parallèles, velues sur toutes leurs nervures, longues de deux pouces & plus. Les épis sont longs d'un pouce & plus, cylindriques; terminaux, deux & plus; les semences noires, lisses, luisantes.

Var. γ. Les tiges sont foibles, droites, glabres, arrondies, divisées en rameaux filiformes, striés, étalés & glabres; les feuilles alternes, pétioles, elliptiques, glabres, entières, acuminées, ciliées à leurs bords, longues d'un pouce, couvertes d'un grand nombre de petits points blancs, supportées par des pétioles dilatés à leur base, en gaine & amplexicaules; les bractées semblables à celles du *polygonum filiforme*; les épis cylindriques, solitaires ou deux à deux, longs de six à dix pouces.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *polygonum filiforme*. Elle s'en distingue par ses fleurs à six étamines, à trois piliers; par ses fleurs elliptiques, acuminées; par ses épis plus courts, plus larges, souvent divisés en plusieurs autres épis; enfin, par les stipules longuement ciliées.

21. RENOUEE glabre. *Polygonum glabrum*. Willd.

*Polygonum floribus hexandris, digynis; foliis virgatis; ochreis truncatis, nudis; foliis lanceolatis, acuminatis, glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 447. n°. 15.

*Modolei pandu*. Tamul.

*Periscaria procumbens, origina, an, affirma*,

*non maculosus spica longiori, laxiori & graciliori.* ? Sloan. Jam. 48. Hist. 1. pag. 17. tab. 3. fig. 1.

Cette plante, selon Willdenow, se rapproche beaucoup du *polygonum barbatum* ; mais elle en diffère par toutes les parties entièrement glabres.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, roides, flexes, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, point ciliées. Les stipules sont nues, tronquées à leur sommet, très-glabres ; les fleurs réunies, en épis terminaux, grêles, effilées. Chaque fleur renferme six ou sept étamines & deux pistils.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Willden.*)

Nous présumons que cette plante, d'après la description de Willdenow, doit être rapportée à celle que nous citons de Sloane.

## 22. RENOUÉE tomenteuse. *Polygonum tomentosum.*

*Polygonum floribus hexandris, trigynis; foliis mollioribus, ovato-acuminatis; ochreis hirsutis, apice reflexis, spicis superioribus virgatis, caule villosis.* (N.)

*Polygonum (tomentosum), floribus hexandris, trigynis; spicis virgatis; ochreis truncatis, hirsutis, setoso-ciliatis; foliis ovatis, acuminatis, utrinque tomentosis.* ? Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 447. n°. 17.

*Periscaria maderaspatana, longioris folio hirsuto.* Pluken. Almag. pag. 188. tab. 210. fig. 7. *Medicaria.*

*Polygonum ocreatum.* Houttuyn. Linn. Pfl. Syst. 6. pag. 442. tab. 49. fig. 1.

β. *Idem, foliis adalioribus scabris, junioribus tantum tomentosis.* Willden. l. c.

Quoique la plante que je présente ici ait quelques caractères dont Willdenow ne parle point, j'ai cru cependant y reconnaître l'espèce qu'il appelle *polygonum tomentosum*, remarquable par les feuilles molles, tomenteuses.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, alongés, très-velus, de couleur cendrée, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, acuminées ; les supérieures un peu plus étroites, légèrement tomenteuses à leurs deux faces, velues sur leur principale nervure, ainsi que sur leur pétiole ; arrondies & un peu inégales à leur base, entières & ciliées à leurs bords, aiguës, acuminées à leur sommet. Les stipules sont vaginales, très-velues ; les inférieures tronquées, à peine ciliées à leur orifice ; les supérieures, & même le plus grand nombre, sont réfléchies en dehors à leur orifice.

Les fleurs sont disposées en épis, les uns axillaires & latéraux, plus courts que les feuilles, un peu denses, oblongs, non interrompus ; les autres terminaux, effilés, munis de bractées vaginales, ovales, concaves, velues, ainsi que les fleurs, ayant leurs bords garnis de cils très-fins, blanchâtres. Les calices sont petits & un peu roussâtres ; ils renferment six étamines & un style à trois divisions.

Je ne connois point la variété que Willdenow rapporte à cette espèce, & dont les feuilles inférieures & anciennes sont roides & non tomenteuses, les supérieures & les plus jeunes ayant seules ce dernier caractère.

Cette plante a été recueillie aux îles Philippines par Commerçon ; elle est très-distincte du *polygonum barbatum*, que j'ai vu dans l'herbier de Burman. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

## 23. RENOUÉE velue. *Polygonum hirsutum.* Walth.

*Polygonum floribus oöandris, semitrigynis; foliis sessilibus, lanceolatis, subvilliosis; spicis binatis, linearibus; caule stipulisque hirsutissimis, rasis.* (N.)

*Polygonum (hirsutum), affurgens, undique confertè promissumque pube hirsutissimo; foliis sessilibus, lanceolatis; pedunculis subterminali, elongato, pteromque distachyo; spicis linearibus; floribus approximatis, oöandris, semitrigynis.* Michaux, Flor. boreal. amer. vol. 1. pag. 239. — Walther, Flor. carol.

Cette plante se rapproche du *polygonum barbatum* ; mais elle en diffère par ses tiges extrêmement velues, par les feuilles sessiles & par le nombre de ses étamines.

Ses rameaux sont droits, roides, chargés de poils roussâtres, si nombreux & si longs qu'à peine peut-on y distinguer les stipules vaginales qu'ils couvrent en totalité. Les feuilles sont alternes, sessiles, étroites, lancéolées, longues de trois pouces, aiguës, élargies & presque à demi amplexicaules à leur base, velues à leurs deux faces, particulièrement sur la principale nervure ; un peu ciliées à leurs bords. Les stipules sont roussâtres, très-minces, très-serrées contre la tige, tronquées & terminées par des poils fins & droits, semblables à ceux qui les recouvrent.

Les rameaux sont terminés par deux longs pedoncules droits, velus, qui se divisent chacun en deux épis pedunculés, linéaires, longs d'environ deux pouces ; munis de bractées vaginales, pubescentes, presque glabres. Les calices sont courts, glabres, d'un blanc jaunâtre, contenant huit étamines & un style à demi divisé en trois.

Cette plante croît dans les lieux humides & marécageux de la Caroline inférieure ; elle m'a été communiquée par M. Boë, qui l'y a recueillie. (*V. f.*)

24. RENOUEE de Pensilvanie. *Polygonum pensilvanicum*. Linn.

*Polygonum floribus oelandris, digynis; pedunculis hispidis, foliis lanceolatis, stipulis mucicis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 519.

*Polygonum (pensilvanicum), caule tumide geniculato; stipulis glabris, natisque; foliis lanceolatis; ramulis, pedunculisque pube brevi, confertis, rigidis & apice glanduliferis asperimis; spicis oblongis, confertis; floribus roseis, majusculis, oelandris, semidigynis*. Michaux, Flor. boreal. - amer. vol. 1. pag. 240.

Cette plante a quelques rapports avec notre *polygonum serratum*; elle s'en distingue par ses fleurs presque paniculées, par ses stipules courtes & nues. Il paroît qu'elle perit par la culture une partie de ses caractères, surtout les poils courts & glanduleux dont les pédoncules sont chargés, & que je n'ai jamais pu observer sur les individus nés dans les jardins d'Europe.

Ses tiges sont droites, anguleuses, glabres, rameuses, geniculées, renflées à leurs articulations; les rameaux garnis de feuilles très-rapprochées, pétiolées, alternes, diffusées, lancéolées, étroites, acuminées, rudes à leurs bords, & quelquefois sur la principale nervure glabres à leurs deux faces, un peu rétrécies à leur base, marquées de nervures latérales fines, serrées, obliques. Les stipules sont courtes, très-glabres, membraneuses, tronquées & nues à leur orifice.

Les fleurs sont terminales & axillaires, assez grandes, pédiculées, réunies en petites grappes paniculées, un peu denses. Les pédoncules sont pubescens, chargés de poils courts, épais, glanduleux à leur sommet. Le calice est teint de rose; il renferme huit étamines & un style à demi bide.

Cette plante croît dans la Pensilvanie & dans les contrées de l'Amérique, habitée par les Illinois; dans les prairies situées sur le bord des fleuves. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

25. RENOUEE dentée en scie. *Polygonum serratum*.

*Polygonum spicis virgatis; floribus pedicellatis; foliis angustis, lanceolato-acuminatis, argute spinuloso-serratis; stipulis setaceis seu mucicis*. (N.)

*p. Idem, foliis angustioribus, stipulis longioribus, apice setaceis*.

*Belatta-modela-mucca*? Rheed, Hort. malabar. vol. 10. pag. 159, tab. 80.

Quoique cette plante paroisse se rapprocher du *polygonum pensilvanicum*, il est facile de l'en dis-

tinguer par ses épis simples, par ses feuilles finement denticulées & par les stipules.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, striés, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, alternes, peu distantes, étroites, lancéolées, rétrécies à leur base, aiguës & longuement acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, garnies à leurs bords, de dents en forme de petites épines fines, blanchâtres & piquantes, qui se retrouvent très-touvent sur la principale nervure. Les stipules sont glabres, membraneuses, roullées, inutiques ou adnées à leur sommet, souvent si rapprochées qu'elles sont presque imbriquées. Les fleurs sont terminées sur chaque rameau, & disposées en plusieurs épis grêles, effilés, munis de bractées vaginales, glabres, obtuses: chaque fleur est supportée par un pédicule capillaire, de la longueur du calice. Celui-ci est glabre & m'a paru n'avoir que quatre divisions.

La plante se diffère de la précédente par des feuilles beaucoup plus étroites, plus fermes & plus longues, couvertes à leur face supérieure de quelques petits poils courts, blancs, couchés. Leurs stipules sont très-longues, velues & ciliées à leur orifice, ainsi que les bractées. Comme d'ailleurs ces deux plantes se rapportent dans tous leurs autres caractères, je n'ai pas cru devoir les séparer.

Cette plante croît dans les Indes & aux îles Molouques. Elle a été recueillie à Madagascar par Commerçon. (V. f. in herb. Lam.)

26. RENOUEE d'Orient. *Polygonum orientale*. Linn.

*Polygonum floribus heptandris, digynis; foliis ovatis; caule erecto; stipulis hirsutis, hypocrateriformibus*. Linn. Syst. veget. 377. n°. 12. — Kniph. Centur. 4. n°. 62. (Exclus. Rheed Malab. synonymo.)

*Persicaria florum flaminibus sex, pluribus; stylo dupli.* Hort. Clifford. 42. — Hort. Upl. 96. — Royen, Lugd. Bat. 216.

*Persicaria foliis ovato-lanceolatis, acutis; floribus pentandris, caule erecto*. Miller, Dict. tab. 201.

*Persicaria orientalis, nicotiana folio; calice florum purpureo*. Tournef. Coroll. 38. — Comm. rar. 43. tab. 43.

*p. Idem, floribus albis*.

C'est une belle & grande espèce que l'on cultive dans plusieurs jardins comme plante d'ornement, & dont les semences, ainsi que celles des autres espèces de ce genre, sont très-recherchées par les petits oiseaux.

Ses tiges sont hautes de cinq à six pieds, droites, rameuses, rudes, velues, articulées, cannelées, garnies

garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-im-pies, ovales, un peu allongées, rudes, à peine pubescentes, entières ou légèrement ondulées à leurs bords, acuminées, aiguës à leur sommet, arrondies, & même un peu échancrées à leur base; médiocrement découronnées à la partie supérieure de leur pétiole, longues de six à sept pouces & plus, larges de trois, supportées par des pétioles velus, un peu comprimés. Les stipules sont vaginales, velues, tronquées à leur sommet, lâches, membraneuses.

Les fleurs sont d'un rouge vif, ainsi que les bractées; elles forment des panicules terminales, un peu pendantes, composées d'épis particuliers, denses, cylindriques, obtus, longs d'un à trois pouces. Le calice est divisé en cinq découpures ovales: il renferme six à sept étamines & deux styles. Ses semences sont très-brunes, luisantes, presque rondes, à peine anguleuses.

Les fleurs sont quelquefois entièrement blanches. La même plante dans son lieu natal, surtout dans les Indes, est beaucoup plus velue, selon Linné, que les individus cultivés dans les jardins d'Europe. Au reste, nous ne croyons pas que cette plante croisse aux Indes, surtout si Linné n'a pas eu d'autre autorité pour la croire originaire de ce pays, que la figure qu'il cite de Rheed, & qui ne me parait point du tout lui convenir.

Cette plante croît dans l'Orient & dans les Indes. Ses semences sont farineuses. (V. v.)

\*\*\* Huit étamines. Feuilles point divifées (polygona).

27. RENOUEE maritime. *Polygonum maritimum*. Linn.

*Polygonum floribus oëandris, trigynis, axillari-bus; foliis ovali-lanceolatis, fempervirentibus; caule fuffrutescente*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 519. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 332. — Kniph. Centur. 11. n°. 85. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 237. n°. 838. XIV. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 159.

*Polygonum floribus oëandris, trigynis, axillari-bus; ochreis bilobis, membranaceis; foliis ellipticis, obtusis, fubcarinatis; caule fuffrutesco*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 449. n°. 20.

*Polygonum maritimum, latifolium*. C. Bauh. Pin. 281. — Tournef. Infl. R. Herb. 510. — Schaw. Specim. n°. 490. — Zann. Ifort. tab. 229. — Matth. Comment. 677. Icon.

*Polygonum maritimum, latifolium, incanum*. Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 5. tab. 29. fig. 3.

*Polygonum maritimum, maximum*. Lobel. Icon. 419.

Botanique. Tome VI.

*Polygonum maritimum*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 376. Icon. — Carter. Epitom. 691. Icon.

*Polygonum maritimum majus*. Parkins, Theatt. 444. Icon.

5. *Polygonum maritimum latifolium, floribus albis*. C. Bauh. Pin. 281. — Tournef. Infl. R. Herb. 510.

A. Idem, *flabellis longioribus, reptantibus; foliis angustioribus, lanceolatis*. (N.)

Cette espèce, qui a des rapports avec le *polygonum aviculare*, s'en distingue dès le premier aspect, par ses stipules très-minces, d'un blanc argen-té.

Ses tiges se divisent en un grand nombre de rameaux, longs de huit à dix pouces, presque ligneux, étendus par terre, glabres, cylindriques, striés, garnis de feuilles nombreuses, alternes, presque sessiles, coriaces, un peu charnues, glauques, ovales ou elliptiques; les inférieures plus larges, quelquefois un peu réfléchies à leurs bords, persistantes, très-rapprochées. Les stipules sont membraneuses, très-minces, glabres, lâches, presque aussi longues que les entre-nœuds, un peu colorées à leur base.

Les fleurs sont réunies au nombre de deux à cinq par paquets dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est partagé en cinq découpures elliptiques, vertes dans leur milieu, blanchâtres & membraneuses à leurs bords, entièrement blanches dans la variété  $\beta$ . Les étamines sont au nombre de huit, plus courtes que le calice; le style à trois divisions.

La variété A m'a été communiquée par M. Boë, qui l'a recueillie dans la Caroline. Elle est remarquable par ses longs rameaux rampans, & par ses feuilles plus étroites, lancéolées.

Cette plante croît dans les lieux sablonneux, sur les côtes maritimes en France, en Espagne, & sur celles de la Barbarie.  $\gamma$  (V. v.)

28. RENOUEE trainasse. *Polygonum aviculare*. Linn.

*Polygonum floribus oëandris, trigynis, axillari-bus; foliis lanceolatis; caule procumbente, herbaceo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 519. — Æser. Flor. dan. 803. — Curtis. Lond. Icon. — Mart. med. 105. — Hort. Cliffort. 150. — Flor. suec. 332. 339. — Gronov. Virg. 44. — Royen, Lugd. Bat. 215. — Blackw. tab. 215. — Scop. Carn. n°. 471. — Pollich, Pal. n°. 386. — Hoffm. Germ. 139. — Roth. Germ. I. pag. 174. — II. 454. — Polret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 150. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 331. — Gérard, Em. 561. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 315. fig. 1.

*Polygonum centinodum*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 237. n°. 838. XV.

T

*Polygonum floribus subsiliariis, in alii foliorum sessilibus, flaminibus vito.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 40. n° 32.

*Polygonum procumbens, foliis linearibus, acutis; floribus subsiliariis.* Haller, Helv. n° 1560.

*Polygonum latifolium.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 510. — Motif. Oxon. Hist. 1. 5. tab. 29. fig. 1.

*Polygonum, five centinodia.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 374. Icon.

*Polygonum mas.* Fusch, Hist. 614. Icon. — Dodon. Pempt. 113. Icon. — Camer. Epit. 638. Icon. — Matth. Comment. 676. Icon. — Parkinson, Theatr. 443. Icon. — Gérard, Hist. 565. Icon.

*Polygonum mas vulgare, sanguinaria, centum-nodia.* Lobel. Icon. 419. — Idem, Observ. 228.

*Polygonum masculum.* Tragus, 391. Icon.

*Polygonum majus.* Tabern. Icon. 831 & 833.

*Polygonum.* Paull. Dan. tab. 322.

a. *Polygonum latifolium, flore candido.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. 510.

*Polygonum (aviculare), caule herbaceo, multifloro, humifuso, ramo simplici, multinodi; stipulis brevibus; foliis oblongis seu ovalibus, glabris; floribus axillaribus, subsessilibus, ostentandis trigynis.* Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 137.

Var. a. *Polygonum (angustifolium), foliis pumilis, lanceolatis-oblongis.* Mich. L. C.

Var. b. *Polygonum (latifolium), foliis lato-ovalibus, obtusis, quasi huxifolium.* Mich. L. C.

g. *Polygonum brevi, angustoque folio.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. R. Herb. 510.

*Polygonum secundum.* Tabern. Icon. 833.

7. *Polygonum oblongo, angustifolio.* C. Bauh. Pin. 181. — Tournef. Inst. 510. — Fior. lap. 153.

*Polygonum angustifolium.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 376. Icon.

*Polygonum terrium.* Tabern. Ic. 833.

2. *Polygonum angustifolium, calicibus purpurascens.* Dilleu. App. 65.

4. *Polygonum erectum, humile; foliis orbatis.* Diller. Append. 65.

3. *Polygonum erectum, majus.* Carid. Aix. pag. 374.

LA RENOUÉE. Regnault, Box. Icon.

Vulgairement renouée, trainasse, centinodie.

Rien de plus commun que cette espèce. De ses racines fibreuses il pousse un grand nombre de

tiges vertes, herbacées, glabres, articulées, un peu renflées à leurs articulations, divisées en un grand nombre de rameaux couchés ou étalés sur la terre, longs souvent d'un pied & plus, garnis de stipules courtes, vaginales, blanchâtres, membraneuses, lâches, déchiquetées ou un peu ciliées à leur orifice. Les feuilles sont alternes, presque sessiles, vertes, glabres, entières, petites, variées dans leur forme, ovales, lancéolées ou linéaires, rétrécies à leur base.

Les fleurs sont solitaires ou réunies de deux à cinq dans les aisselles des feuilles, sessiles, environnées à leur base d'une bractée vaginale. Le calice est divisé en cinq découpures ovales, concaves, ouvertes, vertes tant à leur base que dans leur milieu, blanchâtres ou rougeâtres à leur contour, renfermant huit étamines plus courtes que le calice, trois styles très-courts, terminés par autant de stigmates arrondis. Les semences sont petites, triangulaires, entièrement recouvertes par le calice.

Outre les variétés que cette plante nous offre dans la forme de ses feuilles, qui quelquefois sont ovales & un peu élargies, on en distingue encore dans le port de ses tiges & de ses rameaux. Dans la variété a, les tiges, & principalement les rameaux, sont en partie relevés, & les feuilles ovales, lancéolées.

Mais la variété ζ, mentionnée par Carid. est une des plus remarquables, & pourroit peut-être constituer une espèce. Je ne la connois pas; mais, d'après l'auteur que je viens de citer, ses tiges sont droites, hautes d'un pied & demi, très-rameuses; leurs articulations très-distantes, garnies de deux feuilles presque opposées; les bractées sont purpurines, les semences brunes & triangulaires.

Cette plante est très-commune partout dans les rhyms, les lieux incultes, & sur le bord des chemins. ○ (V. v.)

On recommande cette plante comme astringente dans les flux de ventre, les hémorrhagies, les pertes, le crachement de sang, lorsque ces accidents ne sont entretenus que par le relâchement des solides. Ses semences sont très-nourrissantes; elles sont recherchées avec avidité par les petits oiseaux.

29. RENOUÉE floette. *Polygonum tenue.* Mich.

*Polygonum annuum, pumilum; can't gracili, erecto, ramif. acutangulo; stipulis angustis vel ulosis, calicibus, apice villosis; foliis longi linearibus, striatis erectis, acuminatis; floribus in superius ramularum parte virgatis, remotis alternis, subsiliariis.* Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 238.

Cette plante est petite, & paroît se rapprocher beaucoup de quelques-unes des variétés du poly-

*gonum aviculare*, dont elle se distingue par ses feuilles longues, linéaires.

Ses tiges sont basses, rameuses, droites, très-lisses, striées & à angles tranchans, garnies de feuilles alternes, pétiolées, longues, très-étroites, linéaires, fermes, roides, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces. Les stipules sont vaginales, tubuleuses, très-ferrées contre les tiges, couleur de châtaigne, velues à leur sommet.

Les fleurs s'ont presque solitaires, fort distantes, alternes, situées vers la partie supérieure de rameaux effilés. Cette plante croît au Canada, où elle a été observée & recueillie par Michaux. ○ (*Descript. ex Mich.*)

30. RENOUÉE très-rameuse. *Polygonum ramosissimum*. Mich.

*Polygonum herbaceum, erectum, clatius, multicaule; caulibus striatis ramosissimis, multifloris; stipulis abbreviatis, marginis laceris; foliis lanceolatis; ramis interrupte multifloris; floribus triandris, trigynis*. Mich. Flor. borcal.-amer. vol. 1. pag. 238.

Cette espèce a le port du *polygonum aviculare*; mais elle en diffère par ses tiges droites, très-rameuses, & par ses fleurs à trois étamines.

Elle est herbacée; ses tiges se divisent en rameaux très-nombreux, droits, glabres, striés, garnis de feuilles alternes, petites, glabres, lancéolées. Les stipules sont courtes, déchiquetées à leur orifice. Les fleurs sont distantes & rangées le long des rameaux; elles renferment trois styles & autant d'étamines.

Cette plante croît en Amérique, dans les contrées habitées par les Illinois. (*Descript. ex Mich.*)

31. RENOUÉE géniculée. *Polygonum geniculatum*.

*Polygonum foliis lanceolatis, stipulis laceris; caule suberecto; ramis foris virgatis, geniculato-articulatis; floribus axillaribus, subsessilibus*. (N.)

Cette plante paraît avoir des rapports avec le *polygonum aviculare*; elle en est bien distincte par ses tiges presque droites, & par ses rameaux flexueux, articulés, à peine feuillés, faciles à se détacher à chaque articulation.

Les tiges sont dures, glabres, cylindriques, vertes, striées, très-rameuses, garnies de feuilles alternes, presque sessiles, lancéolées, entières, longues d'un pouce, glabres à leurs deux faces, vertes; les supérieures plus étroites. Les stipules sont blanches, très-minces, lâches, déchirées presque jusqu'à leur base, très glabres.

Les fleurs sont petites, distantes, axillaires,

presque sessiles, solitaires, ou deux, ou trois réunies dans chaque aisselle des feuilles. Les rameaux sur lesquels elles naissent, sont longs, entiers, géniculés, souvent recourbés & flexueux à chaque articulation, & se détachant très-facilement. Leurs feuilles sont très-petites, les supérieures à peine aussi longues que les fleurs. Les calices sont divisés en découpures vertes dans leur milieu, membraneuses & très-blanches à leurs bords, obtuses à leur sommet.

Cette plante croît en Italie. Elle m'a été communiquée par M. Bosc. (V. f.)

32. RENOUÉE de Bellard. *Polygonum Bellardi*. Allion.

*Polygonum erectum, floribus axillaribus, obovatis, trigynis; foliis elliptico-lanceolatis; vaginis ciliatis*. Allion, Flot. pedem. n°. 2052; tab. 90. fig. 2.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis, axillaribus; ochreis ciliatis; foliis lanceolatis, acutis; caule erecto*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 450. n°. 22.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, garnies de feuilles lancéolées, elliptiques ou aiguës, glabres à leurs deux faces, alternes, pétiolées, munies à leur base de gaines cylindriques, ciliées à leur orifice. Les fleurs sont axillaires, disposées en grappes étroites, allongées, contenant huit étamines & trois styles.

Cette plante croît dans le Piémont.

33. RENOUÉE articulée. *Polygonum articulatum*. Linn.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis; spicis articulatis, paniculatis; stipulis vaginalibus truncatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 520.

Ses racines sont petites & fibreuses. Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied, & se divisent à leur partie supérieure en rameaux alternes, subdivisés en d'autres qui forment la panicule des fleurs. Les feuilles sont linéaires, glabres, alternes; les stipules solitaires, vaginales, tronquées, entières, plus élargies à leur partie supérieure, point fendues.

Les épis sont filiformes, très-étroits, disposés en panicule, garnis de bractées imbriquées, turbinées, vaginales, tronquées du centre de chacune d'elles sort un pédoncule foliaire, capillaire, articulé à sa base, coloré, ne portant qu'une seule fleur. Le calice est de couleur incarnate, partagé en cinq découpures, contenant huit étamines & trois styles.

Cette plante croît au Canada. ○ (*Descript. ex Linn.*)



34. RENOUEE divariquée. *Polygonum divaricatum*. Linn.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis, racemosis; foliis lanceolatis; caule divaricato, petulo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 320.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis, racemoso-paniculatis; foliis lanceolatis, levibus; caule divaricato, petulo, globo*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 451. n°. 26.

*Helxine foliis lanceolatis, caule diffuso*. Hort. Upl. 96.

*Perficaria montana, foliis longioribus, angustioribus; floribus racemosis*. Amman, Ruth. 240.

*Fagopyrum orientale, ramosum & multiflorum, perficaria folio*. Tourn. Coroll. 39. — Buxb. Cent. 2. pag. 31. tab. 31.

*Polygonum spicis paniculatis*. Gmel. Sibir. 3. pag. 57. tab. 11. fig. 1.

Quoique rapprochée des deux ou trois espèces suivantes, cette plante a des caractères particuliers, faciles à distinguer, tels que des feuilles glabres, très-entières & point ciliées à leurs bords; des stipules glabres, nues à leur sommet. Ses fleurs sont disposées en une panicule très-étalée, divariquée, ainsi que les riges.

Celles-ci sont étalées, très-glabres, striées, cylindriques, géniculées, divisées en rameaux diffus, garnis de feuilles très-lisses, alternes, pétioles, étroites, lancéolées, d'un vert gai à leurs deux faces, aiguës à leurs deux extrémités, très-entières à leurs bords. Les stipules sont membraneuses, lâches, glabres, transparentes, blanchâtres, marquées de stries roussâtres, tronquées & point ciliées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes paniculées, très-diffuses, lâches, filiformes, divariquées presque par dichotomies. Les épis particuliers sont filiformes, grêles, munis de fleurs distantes, un peu jaunâtres, les uns sessiles, d'autres pédicelées, garnies à leur base de bractées fines, transparentes & blanches. Le calice est divisé en cinq découpures glabres, ovales; il renferme huit étamines & trois pistils.

Cette plante croît dans l'Orient & la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

### 35. RENOUEE raboteuse. *Polygonum scabrum*.

*Polygonum foliis lanceolatis, marginibus scabris; stipulis longè barbatis; spicis simplicibus, oblongis*. (N.)

*Polygonum divaricatum*. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 160.

An *polygonum serratum*? Linn.

Trompé par quelques rapports de cette plante avec le *polygonum divaricatum*, je l'avois rapportée à cette espèce, dans mon *Voyage en Barbarie*; mais elle en est très-différente, & s'en distingue aisément par ses stipules barbuées à leur sommet, par ses feuilles rudes à leurs bords, & par ses épis point rameux.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux à trois pieds & plus: elles sont glabres, presque fistuleuses, cannelées, anguleuses, divisées en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, étroites, lancéolées, longues de trois à cinq pouces, glabres à leurs deux faces, minces, un peu plus pâles en dessous, rudes & accrochantes à leurs bords lorsqu'on les passe entre les doigts, & paroissent finement denticulées lorsqu'on les examine à la loupe. Les stipules sont vaginales, très-minces, verdâtres, striées, terminées par de longs poils roides, subulés.

Les fleurs sont terminales, formant plusieurs épis simples, grêles, longs de deux à trois pouces, munis de bractées glabres & vaginales; chaque fleur pédonculée, d'un blanc verdâtre ou un peu lavé de rouge. Le calice est court, à cinq divisions, membraneux à ses bords, obtus. Je n'ai pas pu observer le nombre des étamines & des pistils. Les semences sont petites, triangulaires, ovales, d'un beau noir luisant, enveloppées par le calice persistant.

J'ai recueilli cette plante dans les lieux marécageux & le long des grands lacs de la Mazoule, en Barbarie. (V. v.)

### 36. RENOUEE des Alpes. *Polygonum alpinum*.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis, racemoso-paniculatis; foliis ovato-lanceolatis, glabris, marginibus ciliatis; coule ramoso, geniculis barbatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 451. n°. 27.

*Polygonum alpinum*. Allion, Pedem. n°. 249. tab. 68. fig. 1.

*Polygonum coule erecto; foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis; spicis paniculatis*. Hall. Helv. n°. 1364.

*Perficaria folio nigricante, floribus albis*. Beccen. Mus. 1. tab. 27. — Allion, Spec. Pedem. 41. tab. 8. — Tourn. Inst. R. Herb. 510.

*Perficaria altera, alpina, sessilis; foliis duobus, acutis*. Beccen. Mus. 1. pag. 108. tab. 83.

Outre sa panicule ressermée, cette plante a de plus des feuilles un peu épaisses, pubescentes ou ciliées à leurs bords, & ses articulations ou ses stipules velues, caractères qui lui sont propres & la distinguent particulièrement du *polygonum divaricatum*.

Ses racines sont un peu épaisses, à peine rameuses, garnies de quelques fibres : il s'en élève une tige droite, rameuse, point diffuse, striée, glabre, articulée, garnie de feuilles alternes, médiocrement pétioles, tantôt élargies, un peu ovales, plus souvent étroites, lancéolées, épaisses, d'un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous, presque glabres, veinées, réticulées, acuminées à leur sommet, ciliées ou pubescentes à leur contour. Les stipules sont vaginales, un peu lâches, velues à leur surface, ainsi qu'à la base des pétioles ; ciliées, assez amples, de couleur brune, membraneuses.

Les fleurs forment une panicule terminale, composée de petites grappes rameuses, un peu denses, munies de bractées vaginales, glabres, transparentes. Chaque fleur est légèrement pédiculée, blanche ou d'un blanc-jaunâtre ; le calice divisé en cinq découpures ovales, élargies, obtuses : il renferme huit étamines & trois styles.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, dans la Savoie & dans l'île de Corse. ♀ (V. f.)

### 37. RENOUEE ondulée. *Polygonum undulatum*.

*Polygonum floribus oëandris, digynis, racemoso-paniculatis; foliis lanceolatis, undulatis, superius scabris, subius pubescentibus; caule ramoso, inferius pubescente; geniculis ciliatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 451. n°. 28.

*Polygonum (undulatum), floribus oëandris, trigynis; foliis lanceolatis, acuminatis, undulatis.* Murr. Comment. Goett. 1774. pag. 34. tab. 5. (*Exclusis synonymis Bocconi & Allionii.* Willd.)

*Polygonum (sibiricum), floribus oëandris, trigynis, racemosis; foliis ovato-lanceolatis, undulatis, scabris; stipulis hirsutis.* Linn. Suppl. 228.

*Polygonum spicis paniculatis, dense confertis; floribus oëandris, trigynis; foliorum lanceolatorum vaginis hirsutis.* Gmel. vol. 3. pag. 36. tab. 10.

Cette plante a des rapports avec le *polygonum alpinum*, dont elle diffère par des caractères aisés à saisir.

Ses tiges sont rameuses, inférieurement pubescentes, géniculées, ciliées à leurs articulations, un peu velues au dessous, garnies de feuilles alternes, pétioles, étroites, lancéolées, ondulées à leurs bords, rudes à leur face supérieure, pubescentes en dessous, acuminées à leur sommet ; les stipules velues. Les fleurs sont disposées en grappes paniculées, munies de huit étamines & de trois styles.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur les montagnes entre les rochers humides. ♀

### 38. RENOUEE glanduleuse. *Polygonum glandulosum*.

*Polygonum foliis lanceolatis, glabris, margine scabris; stipulis campanulatis, subciliatis; floribus axillaribus terminalibusve, subracemosis; calicibus glandulosis.* (N.)

Cette espèce se distingue de notre *polygonum scabrum* par les calices glanduleux & par la disposition de ses fleurs.

Ses tiges sont glabres, striées, hautes d'environ deux pieds, rameuses, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétioles, lancéolées, longues de deux à trois pouces, rétrécies à leur deux extrémités, glabres à leurs deux faces, minces, presque membraneuses, rudes à leurs bords. Les stipules sont glabres, lâches, campanulées, roussâtres, tronquées à leur sommet, souvent garnies de quelques cils courts.

Les fleurs sont les unes latérales, les inférieures solitaires, axillaires, presque stériles ; les supérieures disposées en petites grappes courtes ; les autres terminales, en épis simples ou un peu ramoux ; munies de bractées semblables aux stipules, mais plus petites. Le calice est verdâtre, blanchâtre à son sommet, chargé de très-petites glandes noirâtres qu'on n'apperoit qu'avec la loupe : il se divise en cinq découpures ovales, redressées : il renferme de six à huit étamines, un style à demi-bifide, terminé par des stigmates arrondis. Les semences sont brunes, ovales, un peu comprimées, presque triangulaires, légèrement mucronées à leur sommet.

J'ai trouvé cette plante dans les lieux humides, aux environs de Fougères, département de l'Ille & Vilaine. (V. v.)

### 39. RENOUEE foyeuse. *Polygonum fericum*. Pall.

*Polygonum floribus oëandris, trigynis, racemosis; foliis ovatis, inaequali-pubescentibus; caule decumbente.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 452. n°. 291.

*Polygonum fericum.* Pallas, Iter, edit. min. 3. pag. 233.

*Polygonum foliis ovatis, hirsutis; floribus pedunculatis in spicis laxissimis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 38. tab. 9. fig. 2.

Ses tiges sont en partie rampantes, couchées, vertes ou un peu rougeâtres, plus ou moins velues, longues d'environ un demi-pied, redressées à leur partie supérieure, radicantes inférieurement à leurs articulations, munies de stipules membraneuses, pubescentes, garnies de feuilles ovales, médiocrement pétioles, velues & un peu blanchâtres à leurs deux faces, légèrement sinuées à leurs bords, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes presque simples, lâches, axillaires, composées de fleurs alternes, éparées, blanchâtres, pédiculées, com-

nant huit étamines & trois pistils, auxquels succèdent des semences nues, anguleuses.

Cette plante croît sur les bords du lac Baicale, en Sibérie.

\*\*\*\* Feuilles presqu'en cœur ou sagittées (h. ixine).

40. RENOUÉE en corymbes. *Polygonum corymbosum*. Willd.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis; pedunculis glanduloso-flosis; foliis oblongo-lanceolatis, subsessilibus; bracteis membranaceis, ciliatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 452. n°. 31.

Cette espèce se rapproche du *polygonum chinense*, mais elle en diffère par ses feuilles oblongues, lancéolées, très-peu pétiolées. Les bractées sont vaginales, membraneuses, ciliées à leurs bords; les fleurs disposées en corymbes; les pédoncules communs, garnis dans leur milieu de quelques poils glanduleux à leur sommet. Les calices renferment huit étamines, trois styles.

Cette plante croît à l'île de Java. (Description, ex Willd.)

41. RENOUÉE de la Chine. *Polygonum chinense*. Linn.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis; pedunculis scabris, foliis ovatis, bracteis cordatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 521. — Burm. Flor. ind. pag. 90. tab. 30. fig. 3. — Thunb. Flor. jap. pag. 166.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis; pedunculis scabris; foliis ovatis, petiolatis; bracteis cordatis, sessilibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 453. n°. 32.

Ses tiges sont glabres, tétragones, un peu flexueuses, sillonnées, tombantes, divisées en rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, presqu'en cœur, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues d'un pouce & demi, supportées par des pétioles courts, striés, élargis à leur base. Les stipules sont larges, bifides, membraneuses, point ciliées, à découpures lancéolées, fétacées.

Les fleurs sont terminales, paniculées, à ramifications presque trichotomes. Les pédoncules, tant communs que partiels, sont glabres, tétragones, sillonnés, quelquefois un peu rudes; ils supportent de petites têtes de fleurs. Le calice est divisé en cinq découpures blanchâtres: il contient huit étamines, dont les filaments sont aussi longs que la corolle; un style à trois divisions; les stigmates réfléchis en dehors.

Cette plante croît à la Chine & dans les Indes. Selon Thunberg, elle fournit à la teinture un beau

bleu indigo. Les Japonais font dessécher ses feuilles, les pressent & en forment des masses en gâteaux, qu'ils vendent & que l'on emploie pour teindre en bleu la soie & le coton. Ils font le même usage du *polygonum barbatum* & du *polygonum aviculare*.

42. RENOUÉE branchue. *Polygonum brachiatum*.

*Polygonum foliis ovato-acutis, basi subtruncatis; pedunculis diffuso-paniculatis, sessilibus; floribus capitis; caule erecto, superne scabro*. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 315. fig. 4.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *polygonum chinense*, dont j'en être elle n'est qu'une variété, & de laquelle elle diffère par ses feuilles bien plus larges, par ses rameaux rudes & par ses pédoncules chargés d'épines très-fines.

Ses tiges sont droites, flexueuses à leurs articulations, presque filiculeuses, rameuses, lisses à leur partie inférieure, très-souvent rudes au toucher à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, amples, ovales, aiguës, presqu'acuminées à leur sommet, élargies, presque tronquées à leur base, vertes & glabres en dessus, plus pâles & quelquefois un peu rudes à leur face inférieure; celles du bas pétiolées, les supérieures presque sessiles, les terminales amplexicaules; ces dernières accompagnent quelquefois les plus grandes feuilles à la base de leur pétiole. Les stipules sont vaginales, membraneuses, glabres, longues d'un pouce, fendues à un de leur côté, lancéolées, déchirées à leur sommet, quelquefois fendues jusqu'à leur base en deux portions écartées.

Les fleurs forment une panicle étalée, branchue, dont les rameaux sont ordinairement très-rudes au toucher; souvent opposées & presque dichotomes; les pédoncules armés d'un grand nombre de petites épines sensibles à la loupe, terminés par quelques fleurs sessiles, réunies en une petite tête, garnies de bractées membraneuses & blanchâtres; les anthères sont globuleuses, & le pistil à trois divisions filiformes.

Cette plante a été recueillie à Monte-Video par Commerçon, & dans les Indes par Sonnerat. (P. f. in herb. Lam.)

43. RENOUÉE à feuilles d'oseille. *Polygonum acetosifolium*. Vent.

*Polygonum floribus obovatis, trigynis; foliis lanceolato-hastatis, crassiusculis; caule fruticoso, volubili, glabro; fructu subbaccato*. Vent. Jard. Cels. pag. 88. Icon.

*Coccoloba sagittifolia*. Ortega. Decaf. 5. pag. 60.

Cette espèce, dit M. Ventenat, paroît tenir le

milieu entre les *coccoloba* & les *polygonum*, se rapprochant des *coccoloba* par son calice, qui devient un peu mou & prend presque le caractère de baie, mais appartenant aux *polygonum* par ses autres caractères.

Ses racines sont menues, fibreuses, & poussent beaucoup de drageons: ils s'élèvent des tiges nombreuses, volubiles, grimpantes, cylindriques, un peu anguleuses, géniculées, glabres, purpurines dans leur partie supérieure, divisées en rameaux alternes & axillaires, garnis de feuilles siliques, pétioles, en fer de pique; ondulées à leurs bords, aiguës à leur sommet, planes, un peu épaisses, d'un vert foncé, glabres, tronquées ou échancrées modérément à leur base. Les pétioles sont un peu prolongés sur les tiges ou les rameaux; les stipules vaginales, glabres, membraneuses, brunes, de la longueur des pétioles, fendues latéralement.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, solitaires, simples, peu garnies, munies de bractées vaginales, membraneuses, roussâtres, striées, chacune d'elles enveloppant trois fleurs; un peu pédonculées, blanchâtres en dessus, d'un vert pâle en dessous, ordinairement hermaphrodites, quelquefois monoïques. Le calice est partagé en cinq découpures ovales, arrondies, contenant huit étamines plus courtes que la corolle, trois stigmates très-courts, sessiles. Le fruit consiste en une semence triangulaire, dure, luisante, à angles arrondis, de couleur brune, presque entièrement recouverte par le calice, qui devient un peu mou, de couleur vineuse.

Arbrisseau originaire du Brésil, cultivé dans le jardin de M. Cels. *(Descript. ex Vent.)*

#### 44. RENOUÉE sagittée. *Polygonum sagittatum*. Linn.

*Polygonum caule retrosum aculeato; foliis sagittatis; floribus capitatis, obovatis, semitriginis.* Mich. Flor. boreal.-amér. vol. 1. pag. 241.

*Polygonum foliis sagittatis, caule aculeato.* Linn. Syst. veget. pag. 378. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 65. tab. 15. fig. 2.

*Helaine caule aculeato, foliis sagittatis.* Cronov. Virg. 44. — Cold. Nov. b. 92.

*Helaine caule medio, aculeis retrois crassiterato.* Hort. Cliff. 151. tab. 12. — Roy. Lugd. Bat. 211.

*Fagopyrio similis, angustiori folio, convolvuli modo scandens; caule spinoso densis, densis obso.* Pluk. Mss. 74. tab. 398. fig. 5.

*Planta posterior à novo Belgio.* Liët. Amer. 73. tab. 74.

C'est une plante dont les tiges sont très-douces grimpantes, géniculées, s'élevant à leurs articu-

lations, cannelées, anguleuses, garnies sur leurs angles d'épines courtes, recourbées vers la terre, & qui se retrouvent également sur les pétioles. Les feuilles sont alternes, pétioles, sagittées, lancéolées, aiguës, étroites, longues de deux ou trois pouces, glabres à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, entières, un peu tudes à leurs bords, profondément échancrées à leur base, où elles se prolongent par des oreillettes droites, ovales, oblongues; la principale nervure est épineuse. Les stipules sont membraneuses, jaunâtres, très-glabres, à demi vaginales ou fendues latéralement, jusque vers leur milieu, en deux découpures lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont terminales, réunies presque en une petite tête à l'extrémité de chaque rameau, supprimées par des pedoncules un peu en grappe, munis de bractées lancéolées, acuminées, à peine vaginales. Le calice est blanchâtre à ses bords, verdâtre ou de couleur purpurine à sa base, renfermant huit étamines, un style à demi divisé en trois.

Cette espèce se rencontre dans la Caroline, la Virginie, dans les lieux humides & découverts. Elle m'a été communiquée par M. Boë, qui l'a recueillie dans la Caroline. *(V. f.)*

#### 45. RENOUÉE à feuilles d'acum. *Polygonum aciculatum*. Linn.

*Polygonum caule retrosum aculeato, foliis hastatis, spicis paucifloris; floribus distichis, hexandris, semidignis.* Mich. Flor. boreal.-amér. vol. 1. pag. 241.

*Polygonum foliis hastatis, caule aculeato.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 521.

*Fagopyrio similis, spinosa, scandens; ori folio latiore, floridana.* Pluk. Amab. 87. tab. 398. fig. 3.

*Planta prior à novo Belgio.* Liët. Amer. 73.

Il existe beaucoup de rapports entre cette plante & le *polygonum sagittatum*; elle en diffère par ses feuilles beaucoup plus larges, hautes & non sagittées; par les fleurs spicées & non réunies en tête, par les bractées ciliées.

Ses tiges sont géniculées, striées, flexueuses, garnies sur leurs angles de petites épines blanchâtres, recourbées vers la terre, un peu plus fortes que dans le *polygonum sagittatum*, garnies de feuilles alternes, pétioles, presque semblables à celles de l'acum, ovales, lancéolées, un peu en cœur à leur base, où elles forment deux oreillettes écartées, horizontales, lancéolées, aiguës, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, garnies, particulièrement à leur face supérieure, de quelques poils rares, fins & couchés. Les pétioles sont épineux, de moitié aussi longs que les feuilles, qui ont de trois à quatre pouces. Les stipules sont vaginales,

un peu pubescentes, munies à leur sommet de quelques poils fins.

Les fleurs forment de petites grappes courtes, terminales, presqu'en épi, pauciflores, munies de bractées velues, hispides, ainsi que les pédoncules. Les calices sont rougeâtres, contenant six étamines & un style bifide.

Cette plante se trouve sur les montagnes de la Virginie, au Maryland, dans la Caroline, où elle a été recueillie par M. Bosc, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

46. *RENOUÉE* à feuilles grasses. *Polygonum crassifolium*. Murr.

*Polygonum floribus ostiandris, trigynis; foliis hastatis, carnosus*. Murr. Comment. Goett. 1774. p. 37. tab. 6.

*Polygonum (crassifolium), foliis hastatis, inferioribus ovatis, reliquis linearilanceolatis; caule decumbente, glabro*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 453. n°. 35.

Il existe quelques rapports entre cette plante & le *polygonum arifolium*; mais les tiges sont pendantes, dépourvues d'épines, garnies de feuilles hastées, grasses, épaisses, & les inférieures ovales; les autres linéaires, lancéolées. Les calices renferment huit étamines & trois styles.

On trouve cette espèce dans les lieux stériles de la Sibérie, proche Jenisseï.

47. *RENOUÉE* perfoliée. *Polygonum perfoliatum*. Linn.

*Polygonum foliis triangularibus, caule aculeato; stipulis perfoliatis-foliis, potentibus, subrotundis*. Linn. Syst. veget. pag. 378. — Burm. Ind. pag. 90. tab. 31. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 315. fig. 3.

*Fagotriticum similis, spinosa, minor, paucica*. Pluk. Almag. 87. tab. 398. fig. t. Burm.

*Truellum*.? Houttuyn. Linn. p. f. Syst. 6. p. 401. tab. 48. fig. t.

Jolie espèce des Indes, remarquable par ses stipules perfoliées & presque planes, qui est munie d'épines sur les rameaux & des pétioles; ce qui lui donne des rapports avec le *polygonum arifolium*.

Ses tiges sont anguleuses, un peu flexueuses, jaunâtres, garnies d'épines courtes, recourbées, & dont la pointe est tournée vers la terre. Les feuilles sont alternes, longuement pétiolées, minces, triangulaires, vertes à leurs deux faces, entières à leurs bords, très-glabres, quelquefois un peu échancrées à leur base, & la plupart plus larges que longues, plus courtes que leur pétiole, quelquefois presque peltées. Les stipules ne sont ni va-

ginales, ni membraneuses, mais ouvertes, perforées, vertes, arrondies, très-glabres, entières.

Les fleurs sont peu nombreuses, & forment un épi simple à l'extrémité des rameaux: leur pédoncule est un peu épineux, presque flexueux; anguleux; les bractées membraneuses & glabres; les calices à découpures obtuses, les semences ovales, un peu comprimées, à peine anguleuses.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

48. *RENOUÉE* sarrafine. *Polygonum fagopyrum*.

*Polygonum foliis cordato-fugitatis; caule erectiusculo, inermi, seminibus angulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. t. pag. 522. — Mater. medic. 105. — Knorr. Del. 2. tab. F. — Hoffm. Germ. 139. — Roth. Germ. 1. pag. 174. — Il. 456. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 239. n°. 838. XX.

*Polygonum caule erecto, foliis fugitatis, valvulis integerrimis*. Hall. Helv. n°. 1563.

*Helxine caule erectiusculo, inermi; foliis cordato-fugitatis, seminibus integerrimis*. Hort. Upf. 96.

*Helxine caule erectiusculo, inermi; foliis cordato-fugitatis*. Hort. Cliff. 151. — Flor. suec. 324. 345. — Rry. Lugd. Bat. 217.

*Erysimum cereale, folio hederaceo*. C. Bauh. P.m. 27.

*Ocymum cereale*. Tabern. Hist. 176.

*Frumentum sarracenicum*. Matth. Comment. 876. Icon. — Dalech. Hist. vol. t. pag. 383. Icon.

*Fagopyrum*. Dod. Cereal. pag. 80. Icon.

*Fagotriticum*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 993. Icon.

*Fagopyrum vulgare, erectum*. Tourn. Inst. R. Herb. 511.

*Erysimum Theophrasti*. Lobel. Icon. 63. pag. 2. — Idem. Observ. 513. Icon.

*Fagopyrum*. Dod. Pempt. 512. Icon.

*Tragopyron*. Parkinson. Theatr. Icon.

*Frumentum sarracenicum, redum; semine triangulari, nigro, majore*. Morif. Hist. 2. §. 5. tab. 29. fig. 1.

*Vulgairement* blé noir, blé de sarrafin.

Ses tiges sont droites, vertes ou rougeâtres, striées, lisses, rameuses, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles alternes, pétiolées, fagittées, d'un vert glauque ou tendre, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, échancrées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, ordinairement auis larges & même plus larges que longues; les feuilles supérieures presque sessiles; les dernières amplexicaules. Les stipules sont très-courtes,

très-courtes, glabres, membranées, divisées en deux, presque point vaginales.

Les fleurs sont axillaires & terminales, disposées par bouquets touffus à l'extrémité des tiges & des rameaux, agréablement mêlées de vert, de blanc & de rouge, garnies de bractées blanchâtres & membranées. Le calice renferme huit étamines, autant de glandes jaunâtres, situées à la base des filaments. Les semences sont d'un brun-noirâtre, triangulaires, entières sur leurs angles, soutenues à leur base par le calice persistant.

Cette plante, originaire de l'Asie, est cultivée depuis long-temps en Europe, où elle s'est naturalisée. Elle croît dans les lieux cultivés & les champs. ○ (P. v.)

Cette plante est une de ces heureuses acquisitions faites vers la fin du quinzième siècle, qui ont enrichi l'agriculture; & quoique ses semences soient inférieures à celles du froment, & même à celles de l'orge & du seigle, on en retire de très-grands avantages, en ce qu'elle croît promptement dans les plus mauvaises terres, & qu'en la semaille après la récolte du seigle on peut obtenir deux récoltes en une même année.

La farine que renferment ses semences est blanche: on en fait un pain noir, gras, humide, plus savoureux que celui de l'orge, mais lourd, indigeste, peu nourrissant. Cette farine est plus généralement employée à faire des galettes, des bouillies, que la plupart des gens de campagne, dans la ci-devant Bretagne & Normandie, préfèrent au pain de froment, & qu'ils froient de beurre & de lard. La plante, verte & sèche, fournit un très-bon fourrage à tous les bestiaux. Les semences nourrissent & même engraisent promptement la volaille; elle chauffe les poules & les fait pondre de bonne heure. Leur son est utile pour préserver de l'humidité les plantes que l'on conserve dans les serres. Toute la plante, brûlée & lessivée, fournit une grande quantité de potasse: enfoncée avant sa floraison, elle devient un très-bon engrais. Ses fleurs sont très-recherchées des abeilles, qui y recueillent la matière d'un miel peu estimé. On fait, avec sa farine, des cataplasmes émolliens & résolutifs.

#### 49. RENOUEE de Tatarie. *Polygonum tataricum*.

*Polygonum foliis cordato-fagittatis; caule inermi, erecto; seminibus subdentatis.* Linn. Spec. plant. vol. t. pag. 521.

*Helxine caule erectifusculo, inermi; foliis cordato-fagittatis, seminibus subdentatis.* Hort. Upf. 96.

*Helxine caule erecto, inermi; foliis cordato-fagittatis, seminibus angulis dentatis.* Hort. Clif. 151.

*Polygonum floribus odoratis, trigynis; seminibus Botanique. Tome VI.*

*triangulis, angulis sinuatis.* Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 64. tab. 13. fig. 1.

*Fagopyrum erectum, fructu aspero.* Amman, Ruth. 108.

*Fagopyrum erectum, fructu ex calice eminente serrato.* Hall. Gœtt.

*Fagotriticum sibiricum.* A.D. Stockhol. 1744. pag. 117. tab. 4.

*Frumentum farracenicum.* A.D. Nat. Cur. 3. p. 1.

Vulgairement farrasin ou blé noir de Tartarie.

Cette espèce diffère du *polygonum fagopyrum* par ses fleurs en épis lâches, presque simples, & par ses semences dont les ailes sont marquées chacune vers leur sommet d'une dent obtuse, en forme de lobe arrondi: on la distingue encore du *polygonum emarginatum* par le sommet aigu & prolongé des semences.

Les racines sont tortueuses, presque simples, droites, garnies de quelques fibres courtes: il s'en élève une tige creuse, droite, cylindrique, glabre, rameuse, striée, garnie de feuilles alternes, longuement pétiolées, sagittées, ordinairement plus larges que longues, échanquées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, très-glabres; minces, vertes à leurs deux faces. Les stipules sont courtes, aiguës, à peine vaginales, fendues latéralement, très-glabres.

Les fleurs sont latérales, axillaires, portées sur de longs pédoncules glabres, simples, filiformes, où elles sont réunies en épis, chacune d'elles pédonculée, pendante à l'époque de la maturité. Le calice est verdâtre, court, à cinq découpures obtuses, persistantes à la base des semences: celles-ci sont grosses, triangulaires, noirâtres, à angles saillans; ces angles se terminent en une dent ou un lobe arrondi un peu au dessous du sommet des semences. Les fleurs terminales sont disposées en petites panicules.

Cette espèce est originaire de la Tartarie. On la cultive dans les jardins. ○ (P. v.)

On regarde cette plante comme préférable au blé noir, *polygonum fagopyrum*, dont elle a toutes les propriétés: elle donne un grain plus gros, mûrit plus tôt, & supporte beaucoup mieux le froid.

#### 50. RENOUEE échancrée. *Polygonum emarginatum*.

*Polygonum foliis cordato-fagittatis; caule erecto, inermi; seminibus apice truncatis, emarginatis; alis cartilagineis.* Roth. Catal. botan. 1. pag. 48.

Je ne doute pas que la plante que je décris ici, & qui a été donnée par M. Teissier à M. Lamarck, ne soit la même que celle de Roth; à laquelle je

la rapporte. Elle a de grands rapports avec le *Polygonum sagopyrum*, mais elle en diffère par les angles saillans & la grosseur de ses semences.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, fermes, striées, un peu anguleuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, sagittées, échancrées en cœur à leur base, supportées par des pétioles longs & filiformes; les stipules sont courtes, vaginales, très-glabres, obtuses ou arrondies à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en bouquets ou en panicules denses, nombreuses à l'extrémité des rameaux. Les semences sont grosses, plus larges que longues, jaunâtres d'abord, d'un brun-noir à l'époque de la maturité, munies de trois ailes très-saillantes, coriaces, arrondies, entières, un peu échancrées au sommet, soutenues à leur base par un calice persistant, divisé en cinq découpures verdâtres à leur base, d'un rouge pourpre à leur partie supérieure.

Cette plante a été recueillie sur les confins de la Chine, en Sibérie. ○ (V.f.)

Elle offre les mêmes avantages que les deux espèces précédentes, le *Polygonum sagopyrum* & *tataricum*.

## 51. RENOUÉE liseron. *Polygonum convolvulus*. Linn.

*Polygonum foliis cordatis; caule volubili, angulato; floribus obtusis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 522. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 62. — Pall. Iter. vol. 1. pag. 39. — Pollich, Pal. n.° 387. — Hoffm. Germ. 139. — Weder. Flor. dan. tab. 744. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 174. — Il. 456.

*Polygonum caule asperiusculo, anguloso, divaricato, prostrato vel volubili; foliis oblongis, hastato-cordatis; calicibus frutisferis, apertis*. Mich. Flor. boreal. amer. vol. 1. pag. 241.

*Polygonum caule volubili, foliis sagittatis*. Hall. Helv. n.° 1561.

*Polygonum convolvulaceum*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 239. n.° 838. XIX.

*Helxine caule volubili*. Flor. lap. 154. — Flor. suec. 323. 344. — Horr. Cliff. 150. — Grenov. Virg. 157. — Roy. Lugd. Bat. 217.

*Helxine femine eriangulo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 157. Icon.

*Convolvulus minor, femine triangulo*. C. Bauh. Pin. 295.

*Volubilis nigra*. Tabern. 876. Icon.

*Sagopyrum vulgare, scandens*. Tourn. Inst. R. Herb. 511.

*Helxine cissampelos altera, atriplicis effigie*. Lob. Icon. 624.

*Convolvulum nigrum, sive helxine cissampelos*. Dod. Pempt. pag. 395. Icon. 396.

*Frumentum farracenium alterum, convolvuli modo scandens; femine triangulo, minore, nigro*. Moitil. Oxon. Hist. 2. §. 5. tab. 29. Fig. 2.

*Helxine cissampelos Dodonai*. Dalc'h. Hist. 2. pag. 124. Icon.

Cette espèce, très-voisine du *Polygonum dumerorum*, s'en distingue principalement par ses tiges fortement striées, presque anguleuses, & par ses semences non ailées.

Ses tiges sont grimpantes, s'entortillent autour des autres plantes, & se divisent en rameaux glabres, diffus, garnis de feuilles alternes, pétiolées, sagittées ou triangulaires, tronquées ou échancrées à leur base, aiguës à leur sommet, ainsi qu'aux deux angles de leur base, glabres à leurs deux faces, supportées par des pétioles filiformes, très-longues aux feuilles inférieures. Les stipules sont courtes, membraneuses, presque point vaginales.

Les fleurs sont disposées le long des rameaux, vers leur extrémité, en petites grappes très-courtes, un peu pendantes; les inférieures axillaires; les supérieures non feuillées, & dont les pédoncules sont courts, capillaires. Le calice est verdâtre, composé de cinq folioles ovales, obtuses, dont deux plus petites tombent de bonne heure, & trois autres plus grandes persistent, enveloppent la semence entièrement, mais sans y former d'aile sensible. Les anthères sont violettes ou rougeâtres; les semences ovales, un peu comprimées, triangulaires, à angles mouffes.

Cette plante croît dans les champs en Europe, en Sibérie, &c. ○ (V.v.)

Les semences ont les mêmes propriétés alimentaires que le *Polygonum sagopyrum*, mais elles sont plus petites, moins farineuses; elles sont très-recherchées des petits oiseaux: les chèvres & les vaches mangent cette plante que rejettent les chevaux & les moutons.

## 52. RENOUÉE des buissons. *Polygonum dumerorum*. Linn.

*Polygonum foliis cordatis, caule volubili, levi; floribus carinato-alatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 522. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 63. — Will. Illustr. n.° 9. — Pollich, Pal. n.° 388. — Hoffm. Germ. 139. — Weder. Flor. dan. tab. 756. — Roth. Germ. I. pag. 174. — Il. 457. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 238. n.° 838. XVIII.

*Polygonum caule volubili, foliis sagittatis, valvulis seminibus alatis*. Haller, Helv. n.° 1562.

*Polygonum scandens*. Grim. Men. in Nov. Act. A. N. C. vol. 3. pag. 308.

*Fagopyrum pralongum dumetorum*; *seminibus alatis, duplici modo dispositis*. Dillen. App. 60.

*Fagopyrum scandens, albinum dumetorum*; *seminibus tribus alis pellucidis*. Rupp. Jen. 99.

*Fagopyrum silvaticum scandens, flore foliaceo*. Pont. Anrh. 265.

*Fagopyrum majus, scandens*. Vaillant, Paris. 52.

Quoique très-tapprochée du *fagopyrum convolvulus*, cette espèce en est cependant séparée par ses tiges bien moins striées, par les angles de ses feuilles moins aigus, mais surtout par les semences ailes à leurs angles.

Ses tiges s'élèvent bien plus haut; elles sont grimpantes, très-glabres, médiocrement striées, grêles, rameuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, sagittées, triangulaires, échançrées en cœur à leur base, & munies de deux oreillettes obtuses, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, portées sur des pétioles presque filiformes. Les stipules sont courtes, membranacées, caduques, presque nulles.

Les fleurs sont placées sur de longs rameaux grêles, volubiles, à peine feuillés; les unes axillaires, d'autres terminales, p'urôt réunies en petits paquets qu'en grappes, formant presque de longs épis interrompus. Les pédoncules sont capillaires, plus longs que les fleurs: très-souvent il n'existe pas de pédoncule commun. Ces fleurs sont ou d'un blanc-falé, ou un peu verdâtres, mêlées d'une légère teinte de rouge dans leur milieu, blanchâtres à leurs bords. Le calice est divisé en cinq découpures, dont deux plus petites, caduques, trois autres larges, plus grandes, persistantes avec le fruit, formant comme trois valves saillantes & ailes à leurs angles des semences. Les anthères sont blanches; les semences ovales, aigües, d'un noir luisant lorsqu'on les dépouille du calice persistant, à trois angles tranchans.

Cette plante croit en Europe, dans les haies, les brouillailles, les lieux ombragés & dans les bois. On la trouve aux environs de Paris. (V. v.)

Elle a trop de rapports avec le *polygonum convolvulus*, pour n'en point avoir les mêmes propriétés. Ses semences sont farineuses & nourrissantes, mais trop petites pour être employées autrement qu'à nourrir la volaille & les petites oiseaux.

53. RENOUÉE à nœuds ciliés. *Polygonum cili-nod.* Mich.

*Polygonum minusissimum puberulum*; *caule anguloso, prostrato aut scandente*; *stipulis subacutis, basi extrofum serie ciliorum circumdatis*; *foliis cordatis*;

*calicibus fructiferis, apertis*. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 241.

On distingue cette espèce du *polygonum convolvulus*, avec lequel elle a beaucoup de ressemblance, par les cils qui garnissent la base des articulations, & par le duvet qui revêt presque tous les parties de cette plante.

Ses tiges sont anguleuses, pubescentes, couchées ou grimpantes, rameuses, feuillées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, sagittées, presque triangulaires, échançrées en cœur à leur base. Les stipules sont presque aigües, munies à leur base extérieurement d'un rang de poils en forme de cils. Les fleurs sont discoïques en petites grappes courtes, axillaires, situées le long des rameaux. Les calices ont deux de leurs divisions plus courtes, caliques; les trois autres, plus grandes, persistent sur le fruit, mais n'y forment pas ces ailes membranacées qu'on remarque sur le *polygonum dumetorum*.

Cette plante a été découverte par Michaux dans le Canada. (Description, ex Mich.)

54. RENOUÉE grimpante. *Polygonum scandens*. Linn.

*Polygonum foliis cordatis*; *racemo simplici, axillari*; *caule erecto, levi, scandente*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 456. n°. 42.

*Polygonum* (scandens), *glaberrimum*; *caule volubili*; *foliis sine profunde late cordatis*; *stipulis truncatis, nudis*; *floribus obovatis, trigynis*; *calicibus fructiferis, majusculis, tripteris*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 240.

*Polygonum foliis cordatis*; *caule erecto, scandente*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 522.

*Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus carinatis*. Linn. Syst. Nat. t. pag. 364.

*Fagopyrum scandens, caule rubente, semine nigro*. Gronov. Virgin. 44. — Cold. Novb. 95.

*Fagopyrum volubile, majus, virginianum*. Pluk. Almag. 143. tab. 177. fig. 7.

*Fagopyrum scandens, seu volubile, nigra, major*; *flore & fructu membranaceis, compressis*. Sloan, Jam. 46. Hist. t. pag. 138. tab. 90. fig. 1.

*Fagopyrum scandens, americanum, maximum*. Tournef. Indl. R. Herb. 511.

β. Idem, *caule subrepente, scabro*.? (N.)

Ses tiges sont droites, lisses, grimpantes, quelquefois de couleur rougeâtre, très-rameuses, fort élevées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-amplées, sagittées, triangulaires, échançrées en cœur à leur base, glabres & vertes à leurs deux faces, supportées par des pétioles longs, un peu comprimés.



Les fleurs sont disposées en grappes simples, dans l'aisselle des feuilles : trois des divisions calicinales persistent avec les fruits, & les tendent membraneux sur leurs angles. Les semences sont noires, un peu comprimées.

Cette plante croît en Amérique. 4

La plante 3, que j'ai vue dans l'herbier de M. Lamarck, a les plus grands rapports avec celle-ci. Je ne connois point sa fructification. Les tiges de ses jeunes rameaux sont tudes & acrochantes ; les anciennes sont presque lisses ; les feuilles amples, en cœur à leur base, tudes, un peu pubescentes. D'ailleurs, cette plante ne s'élève pas, mais ses tiges se traînent & se répandent au loin de tous côtés. Elle croît dans l'Amérique septentrionale. (*V. f. in herb. Lum.*)

55. RENOUÉE multiflore. *Polygonum multiflorum*. Thunb.

*Polygonum foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus paniculatis ramosis*. Thunb. Flor. japon. pag. 169.

*Polygonum foliis cordatis ; panicula divaricata, axillari ; caule erecto, angulato, scandente*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 456. n°. 43.

*Polygonum chinense*. Houttuyn. Linn. Pfl. Syst. 6. pag. 453. tab. 49. fig. 3.

Cette plante diffère du *polygonum diametorum* par ses fleurs obtuses & plus petites, par ses panicules rameuses, en grappes très-ouvertes.

Ses racines sont blanches, tubéreuses, un peu charnues ; ses tiges grimpantes, anguleuses, lisses, flexueuses, glabres & filiformes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres, entières, ovales, presque en cœur à leur base, acuminées à leur sommet ; les inférieures larges d'un pouce & demi, longues de deux pouces, souvent tronquées à leur base ; les supérieures plus petites, en cœur.

Les fleurs forment, dans les aisselles des feuilles, des grappes paniculées, très-ouvertes, dont les pédoncules communs sont divariqués, les partiels courts & capillaires, garnis de bractées ovales, aiguës, entières.

Cette plante croît au Pérou, proche Nagasaki. (*Descript. ex Thunberg.*)

Ses racines passent pour cordiales, & sont employées comme telles par les Japonais, qui les mangent crues. Elles deviennent amères lorsqu'elles sont cuites sous la cendre.

\* Espèces moins connues.

\* *Polygonum (erectum), floribus obovatis, trigynis, axillaribus ; foliis ovalibus ; caule erecto, herbaceo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 520.

\* *Polygonum (erectum), foliis seriatim*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 517.

*Polygonum folio oblongo, crenato*. Shaw. Afr. n°. 489.

Cette espèce est peut-être notre *polygonum scabrum*.

RENOUÉES ou POLYGONIÈS (Les). *Polygonaceae*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un certain nombre de genres, qui ont des rapports avec celui des renouées (*polygonum*), qui y est également renfermé.

Les plantes de cette famille ont la plupart des tiges herbacées, des feuilles alternes, toulées en dessous dans leur jeunesse, vaginales à leur base, ou des stipules en forme de gaine, situées entre les feuilles.

Le calice est d'une seule pièce ou découpé : il n'y a point de corolle. Les étamines sont en nombre défini, situées dans le fond du calice. L'ovaire est simple, supérieur, surmonté de plusieurs styles qui manquent quelquefois ; plusieurs stigmates. Une seule semence nue, ou recouverte par le calice presque supérieur. L'embriion est enveloppé d'un périsperme farineux.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont :

Les raisiniers.	<i>Coccoloba</i> .
Les atraphaxes.	<i>Atraphaxis</i> .
Les renouées.	<i>Polygonum</i> .
Les patiencees ou oseillees.	<i>Rumex</i> .
Les rhubarbes.	<i>Rheum</i> .
Les triplaris.	<i>Triplaris</i> .
Les calligones.	<i>Calligonum</i> .
Les pallases.	<i>Pallasia</i> .
Les kéniges.	<i>Kenigia</i> .

RENOUELLE. *Eriogonum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des polygonées, qui a quelques rapports avec les *polygonum*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont articulées, les feuilles presque verticillées, dépourvues de stipules vaginales ; les fleurs axillaires, fasciculées, munies à leur insertion d'un involucre commun.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six découpures, trois intérieures plus grandes ; point de corolle ; neuf étamines ; un style, trois stigmates ; une semence triangulaire, enveloppée par le calice.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice presque campanulé, divisé en six

découpures ovales, obtuses, trois intérieures, un peu plus grandes que les extérieures.

2°. Point de corolle.

3°. Neuf étamines, dont les filamens sont capillaires, un peu plus longs que le calice, terminés par des anthères courtes, ovales.

4°. Un ovaire supérieur, à trois faces, surmonté d'un style très-court, terminé par trois stigmates longs, presque filiformes.

Le fruit consiste en une semence à trois côtés, à trois angles aigus, point aillés, enveloppée par le calice persistant.

Observations. Le nom latin de ce genre est composé de deux mots grecs, *crios* (laine), laine; *gonu* (genou), genou; plante lanugineuse & articulée.

## E S P È C E.

1. RENOUELLE tomenteuse. *Eriogonum tomentosum*. Mich.

*Eriogonum erectum, paribus omnibus tomentosum; foliis ternis, canaliculatis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 246. tab. 24.

Plante dont les tiges sont droites, herbacées, géniculées, tomenteuses, ainsi que les autres parties de cette plante, divisées en rameaux ouverts, dichotomes, droits, cylindriques, garnis aux articulations de feuilles sessiles, verticillées, trois à chaque verticille, presque ternées ou connées à leur base, ovales, presque cunéiformes, pubescentes, entières à leurs bords; les feuilles radicales bien plus grandes, presque imbriquées à leur base, pétiolées, oblongues, lancéolées, simples, entières, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, veines particulièrement à leur pétiole; ces derniers élargis, en gaine à leur base, canaliculés, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont blanchâtres, placées par fascicules aux articulations supérieures, dans l'aisselle des feuilles; elles forment d'un involucre campanulé, denté à ses bords, assez semblable aux calices, mais plus grand; les pédoncules sont courts, filiformes, inégaux, uniflores; les calices divités en six découpures ovales, les trois intérieures un peu plus grandes.

Cette plante a été recueillie par Michaux dans la Caroline & la Géorgie, au milieu des forêts de pin. (*Descript. ex Mich.*)

RENVERSÉE (Feuille). *Folia reclinata*. On donne ce nom aux feuilles lorsqu'elles sont très-réfléchies, & que leur sommet est plus bas que la pointe de leur insertion.

REPLIÉS (Rameaux). *Rami inflexi*. Les rameaux

portent de nom lorsqu'étant pendans, leur extrémité se recourbe vers la tige.

RÉSÉDA. *Reseda*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, affilée à la famille des capriers, & qui a des rapports avec le *norantea* Aubl. Il renferme des herbes à feuilles alternes, quelquefois glanduleuses à leur base, entières ou divitces, & dont les fleurs sont disposées en épis terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq ou six divisions; quatre à six pétales irréguliers, franges; onze à quinze étamines; trois à cinq stigmates presque sessiles; une capsule supérieure, polysperme, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à plusieurs divisions (de quatre à six), droites, persistantes, étroites, aiguës, dont deux s'ouvrent plus que les autres.

2°. Une corolle de quatre à six pétales inégaux, les uns à trois divisions, d'autres entiers, quelquefois tous trifides; le pétale supérieur muni à sa base d'une bosse glanduleuse, pleine de liqueur miellée.

3°. De onze à quinze étamines & plus, dont les filamens sont très-courts, terminés par des anthères droites, obtuses, de la longueur de la corolle.

4°. Un ovaire presque sessile, supérieur, surmonté de trois à cinq styles quelquefois nuls, & d'autant de stigmates simples.

Le fruit consiste en une capsule anguleuse ou relevée en bosse, à une seule loge acuminée par la persistance des stigmates, s'ouvrant à son sommet, contenant plusieurs semences réniformes, attachées sur les angles intérieurs de la capsule, & dont l'embryon est recourbé sans périsperme.

Observations. Il est difficile de déterminer avec précision à quelle famille naturelle il convient de rapporter ce genre. M. Jussieu l'a placé à la suite des capriers, avec lesquels il a des rapports par la forme des semences, & surtout par leur embryon sans périsperme; mais il s'en écarte par le nombre des pétales & des stigmates.

Quant à ce genre en lui-même, il offre beaucoup de variétés dans plusieurs parties de sa fructification, dans le nombre des divisions du calice, ainsi que dans celui des pétales, des étamines & des pistils; on ne peut donc compter que sur la capsule, qui varie à la vérité par le nombre de ses

angles & un peu par sa forme, mais qui n'a constamment qu'une seule loge ouverte au sommet, & contenant des semences réniformes.

## E S P È C E S.

1. RÉSÉDA des teinturiers. *Reseda luteola*, Linn.

*Reseda foliis lanceolatis, integris, bosi utrinque unidentatis calicibus quadrifidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 643. — Syll. veget. 448. — Cæd. Flor. dan. tab. 864. — Mill. Dict. n° 8. — Neck. Dalib. pag. 210. — Pollich. Pal. n° 453. — Willd. Observ. n° 40. — Blackw. tab. 283. — Kniph. Centur. 5. n° 74. — Hoffm. Germ. 163. — Roth. Germ. 1. pag. 203. — H. 522. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 203. n° 792. II. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 373.

*Reseda foliis simplicibus, lanceolatis, integris*. Hort. Cliff. 212. — Virid. Cliff. 49. — Flor. lucc. 419. 424. — Roy. Lugd. Bat. 83. — Dalib. Paris. 160.

*Luteola herba, foliis folio*. C. Bauh. Pin. 100. — Tourn. Inst. R. Herb. 413. — Schaw. Specim. n° 394.

*Reseda foliis ellipticis, obtusè lanceolatis, undulatis; calicibus quadrifidis*. Hall. Helv. n° 1058.

*Antirrhinum*. Trag. 362. Icon.

*Lutum herba*. Dod. Pempt. 80. Icon.

*Luteola*. Lobel. Icon. 353. — Idem, Observ. 190. Icon. — Gérard, Hist. 494. Ic. — Tabern. Icon. 110.

*Pseudo-fruticum*. Camet. Epit. 356. Icon. — Matth. Comment. 442. Icon.

*Lutea vulgaris*. Parkinson, Theatr. 603. Icon.

*Lutea Plinii quibusdam*. J. Bauh. Hist. 3. p. 465. Icon.

*Herba lutea*. Dalech. Hist. 1. pag. 501. Icon. Vulgairement la gaude. Regnault, Bot. Icon. Suppl. Herbe à jaunir.

Ses tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds & plus, glabres, cannelées, divisées en rameaux longs, effilés, garnis de feuilles éparfes, glabres, sessiles, lancéolées, nombreuses, un peu étroites, très entières à leurs bords, quelquefois légèrement ondulées, surtout dans leur jeunesse, vertes à leurs deux faces, planes, nombreuses, aiguës à leur sommet, lisses, nues, à chaque côté de leur base, d'une petite dent aiguë.

Ses fleurs sont petites, d'un vert-jaunâtre, disposées à l'extrémité des rameaux en un épi fort long, nu, effilé; soutennues chacune par un petit pédoncule à peine de deux lignes de long, munies

à sa base d'une petite bractée subulée, étroite, de même longueur. Le calice est fort petit, partagé en quatre découpures persistantes, elliptiques, obtuses, les deux supérieures un peu plus grandes. La corolle est ordinairement composée de quatre pétales petits, inégaux, d'un jaune-pâle; le pétale supérieur plus grand, convexe, arrondi, onguculé à sa base, à plusieurs découpures à son sommet, recouvrant un autre pétale beaucoup plus court, entier, semblable à une petite écaille; deux autres pétales latéraux très-étroits, élargis à leur sommet, quelquefois un peu découpés à la partie antérieure, ou n'a point de pétales, ou n'en a que de très-petits, mais rarement. Il y a environ une vingtaine d'étamines dont les anthères sont jaunâtres, fort petites. L'ovaire est surmonté de trois styles persistans; la capsule un peu comprimée, à une seule loge, ridée, le divisant à son sommet en six valves, dont trois ovales & relevées, trois autres alternes, recourbées en dedans, un peu épaisses, contenant des semences fort petites, noires, très-lisses, arrondies à une de leur face, un peu échanquées. (Observ. Desfont.)

Cette plante croît partout en Europe, en Barbarie, dans les champs, sur le bord des chemins & aux lieux stériles. ☉ (V. v.)

Ses racines passent pour apéritives. Toute la plante est d'un grand usage dans la teinture; à laquelle elle fournit une belle couleur jaune. Les moutons font les feus belliaux qui la mangent.

2. RÉSÉDA blanchâtre. *Reseda canescens*, Linn.

*Reseda foliis lanceolatis, undulatis, pilosis*. Linn. Syst. veget. pag. 448. — Vahl. Symb. pl. 2. p. 52.

*Reseda (hexagyna), foliis lanceolatis, repandis, undulatis; floribus hexagynis*. Fotskh. Flor. ægypti. arab. pag. 92. n° 82.

*Reseda foliis subulatis*. Sauvag. Monsp. 48. — Mill. Dict. n° 7.

*Sesamoides flore albo, foliis canescentibus*. Tourn. Inst. R. Herb. 42.

*Sesamoides salmanticum, parvum, secundum*. Clus. Hist. 1. pag. 296. tab. 295.

*Reseda alba, minor*. C. Bauh. Pin. 100.

*Reseda foliis simplicibus, oblongis, integris*. Guett. Stamp. 1. pag. 215.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds au plus; elles sont presque droites, striées, chargées de poils blanchâtres, rameux, cylindriques, garnies de feuilles éparfes, alternes, sessiles, lancéolées, longues de deux poices environ, très-entières, un peu ondulées à leurs bords, à peine ciliées, velues sur leur principale nervure; il sort de l'aisselle des rameaux supérieurs d'autres rameaux plus tardifs.

Les fleurs sont disposées en grappes à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues chacune par un pédicule très-court, muni à sa base d'une bractée linéaire. Ces fleurs sont blanches & alternes : leur calice est composé de cinq découpures. Les étamines sont au nombre de onze à quatorze, terminées par des anthères jaunâtres : du centre de la fleur s'élèvent six ovaires supportés par un pédicule commun. Il est douteux, d'après Willdenow, que la synonymie de C. Bauhin, de Sauvage, de Clusius, &c. convienne à cette espèce. En effet, dans ces derniers auteurs, les feuilles sont linéaires, tandis que dans la nôtre elles sont lancéolées. D'ailleurs, il n'y est pas fait mention du caractère particulier de ses ovaires pédiculés.

Cette plante croît en Espagne dans les environs de Salamanque, & en Egypte. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

### 3. RÉSÉDA glauque. *Reseda glauca*. Linn.

*Reseda foliis linearibus, basi densatis; floribus teragynis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 644. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 206. n°. 792. X.

*Reseda linearis foliis*. C. Bauh. Pin. 100. Prodr. 41. — Burf. IV. 88.

*Lusola pumila, pyrenaica, linearis folio*. Tourn. Infl. R. Herb. 424.

*Reseda linearifolia, pyrenaica; glauco folio*. Pluk. Almag. 317. tab. 107. fig. 2. — Rai, Suppl. 511.

*Reseda linearis folio, glaucum, pyrenaicum; flore flumino*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 601. §. 15. tab. 1. fig. 4.

Cette plante, assez forte & très-rameuse quand elle est cultivée, offre, dans son lieu natal, une tige foible, haute d'environ un pied, cylindrique, finement striée, d'un vert glauque, très-glabre, divisée en rameaux nombreux, alongés, effilés, presque simples, garnis de feuilles sessiles, éparées, longues de deux à cinq pouces & plus, très-étroites, glauques, linéaires, glabres, pointues, munies vers leur base de quelques dents aiguës, courtes, très-blanches, qui manquent souvent sur les feuilles supérieures.

Les fleurs forment, par leur disposition, de très-longs épis lâches, effilés, interrompus, situés à l'extrémité des rameaux; chacune d'elles pédiculée. Les pétales sont blancs; les étamines jaunâtres : leur ovaire est surmonté de quatre styles écartés & droits.

Cette espèce croît dans les Pyrénées : on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

### 4. RÉSÉDA à deux pétales. *Reseda dipetala*. Ait.

*Reseda foliis linearibus, integerrimis; floribus 10-*

*tragynis, dipetalis; petalis indivis.* Ait. Hort. K. w. vol. 2. pag. 132. — Vahl. Symb. 2. pag. 51. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 878. n°. 4.

*Reseda (capensis), caule frutesco; foliis linearibus, terais, apice mucronatis*. Lum. Prodr. cap. 13.

Cette espèce a le port du *reseda sesamoides*, dont elle diffère par sa corolle, qui n'a que deux pétales, & par ses feuilles plutôt linéaires que lancéolées.

Ses tiges sont droites, un peu ligneuses, divisées en rameaux glabres, épars, cylindriques, garnis de feuilles sessiles, alternes, éparées, très-glabres, un peu épaisses, aiguës, longues de quatre à six lignes. Les fleurs sont presque sessiles, disposées en épis terminaux, interrompus : leur calice est divisé en six folioles fort petites, vertes, bordées de blanc. La corolle n'a que deux pétales contéiformes, très-entiers; l'ovaire est surmonté de quatre styles persistants; les bractées sont petites, subulées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ♂ (V. f. in herb. Lam.)

### 5. RÉSÉDA à fleurs purpurines. *Reseda purpurascens*. Linn.

*Reseda foliis linearibus, obtusis; floribus pentagynis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 644. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 878. n°. 5.

*Reseda alba, minor*. J. C. Bauh. Pinn. 100. — Rai, Hist. 1054.

*Sesamoides salmanticum, parvum, primum*. Clus. Hist. 1. pag. 296.

*Sesamoides foliis erectis; floribus ex herbaceo-purpureiscentibus*. Tourn. I fl. R. Herb. 424.

Je doute que cette espèce, qui ne m'est pas connue, soit bien distincte du *reseda sesamoides*. Je n'y vois de différence, d'après les caractères que lui donne Linné, que des feuilles épaisses, linéaires, obtuses & non lancéolées, des fleurs herbacées un peu purpurines, cinq styles : ses tiges d'ailleurs sont basses, glabres, cylindriques, un peu rameuses.

Cette plante croît en Espagne, sur les collines, dans les environs de Salamanque, ainsi qu'à Montpellier.

### 6. RÉSÉDA étoilé. *Reseda sesamoides*. Linn.

*Reseda foliis lanceolatis, integris; fructibus stellatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 644. — Gouan, Monsp. 229. n°. 2.

*Reseda stellata*. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 204. n°. 792. V.

*Sesamoides fructu stellato*. Tourn. Infl. R. Herb. 424.

*Refeda linaria folio.* C. Bauh. Prodr. 42. — Sauvag. 48.

Cette plante a des racines dures, blanchâtres, très-longues. Ses tiges se ramifient presque dès leur base en longs rameaux effilés, glabres, presque simples, de huit à quinze ponce, étalés, garnis de feuilles éparées, très-entières, étroites, linéaires, presque lancéolées, obtus, longues d'un ponce environ, vertes à leurs deux faces; les radicales ou inférieures souvent un peu plus larges & moins longues.

Les fleurs sont blanches, distantes, presque sessiles, alternes, disposées en longs épis terminaux. Les calices sont fort petits; les pétales inégalement découpés; les étamines ordinairement au nombre de douze; les capsules surmontées de quatre à cinq pointes divergentes en étoile.

Cette plante croît en France, dans les environs de Montpellier. M. Desfontes l'a également recueillie aux environs du Mans, dans les champs sablonneux. (V. f.)

#### 7. RÉSÉDA fourmeux. *Refeda fruticulosa.* Linn.

*Refeda foliis pinnatis, arce recurvatis; floribus tetragynis; calicibus quinquepartitis; pentenibus; coule basi fruticosa.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. — Jacq. Collect. 3. pag. 195. — Icon. rar. 3. tab. 474.

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *refeda*, alba & le *refeda nudata*.

Sa racine, ou plutôt la portion de la tige qui s'élève au dessus de la terre, est presque ligneuse, vivace, très-courte, deux fois aussi épaisse que le ponce; elle se divise ensuite à son sommet en plusieurs tiges ou rameaux ascendants, lisses, marqués de stries saillantes, garnis de feuilles pinnées, composées de folioles au nombre de cinq ou sept, lancéolées, décurrenles, lisses, presque ondulées à leurs bords, recourbées à leur sommet.

Les fleurs sont alternes, placées sur plusieurs épis alternes, terminaux. Leur calice est très-court, divisé en cinq folioles. Les pétales sont blancs, au nombre de cinq ou six, divisés en trois, plus grands que le calice; il y a normalement onze étamines.

Cette plante croît dans l'Espagne. (Desfontes, ex Linn.)

#### 8. RÉSÉDA blanc. *Refeda alba.* Linn.

*Refeda foliis pinnatis, floribus tetragynis, calicibus quinquepartitis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. — Hort. Ups. 149. — Mill. Dict. n°. 5. — Willch, Observ. n°. 41. — Hoffm. Germ. 163. — Roth. Germ. l. pag. 204. — Il. 521. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 206. n°. 792. lX. — Gouan, Monsp. 229. n°. 3. — Gérard, Flor. gall. prov. pag. 376. n°. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 374.

*Refeda foliis pinnatis, integerimis.* Hott. Cliff. 212.

*Refeda maxima.* C. Bauh. Pin. 100.

*Refeda foliis calcitrapa, flore albo.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 615.

*Refeda alba.* ? J. Bauh. Hist. 3. pag. 467.

*Refeda candida.* Dalech. Hist. 2. pag. 1199. Icon.

g. *Refeda minor, alba, dentatis foliis.* ? Barlet. Icon. rar. pag. 78 tab. 388.

Cette espèce est assez voisine du *refeda nudata*, mais ses feuilles sont bien moins ondulées, & les parties de la fructification un peu différentes.

Ses racines sont dures, très-glabres, d'un blanc-jaunâtre: elles produisent des tiges striées, hautes d'un à deux pieds, divisées en rameaux étalés, diffus, un peu recourbés en arc à leur partie supérieure, garnis de feuilles ailées, composées de folioles décurrenles, très-entières, lancéolées, inégales, un peu ondulées à leurs bords, très-lisses à leurs deux faces, traversées par une nervure d'un blanc-jaunâtre.

Les fleurs sont légèrement pédicelées, disposées en épis allongés; leur calice est fort petit, partagé en cinq découpures inégales, linéaires, subulées, siguées, leur corolle composée de quatre à cinq pétales de couleur blanche, inégalement laciniés, presque égaux: ils contiennent environ douze étamines & quatre styles très-courts. Les capsules sont oblongues, presque tétraèdres, rugueuses, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet & renfermant des semences brunes, réniformes.

Cette plante croît en France, dans les départements méridionaux; en Barbarie, au milieu des champs. (V. v.)

La variété g. est beaucoup plus petite, ses folioles plus étroites & un peu denticulées à leurs bords; les fleurs presque sessiles.

#### 9. RÉSÉDA ondulé. *Refeda undata.* Linn.

*Refeda foliis pinnatis, undulatis; floribus trigynis tetragynisve.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 644. — Kniph, Centur. 9. n°. 94. — Vahl. Syn. b. 2. pag. 52. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. p. 171.

*Refeda floribus trigynis tetragynisve; calicibus quinquepartitis; foliis pinnatis, undulatis.* Mill. Dict. n°. 4.

*Refeda (decussiva), foliis decussivis pinnatis, foliolis subquadratis, floribus trigynis.* Forsk. Catalog. Plant. ægypt. pag. 66.

*Refeda maxima, portera pignora arguilla.* ? Lobel. Icon. 221. — Idem, Observ. 110.

g. *Refeda*

*Refeda minor, foliis incisif.* Barrel. Icon. rar. pag. 78. tab. 187.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du *refeda alba* à feuilles plus fortement nœudées, & qui en diffère par le nombre variable des pattes de la fructification.

Ses tiges sont épaisses, fistuleuses, hautes d'un à deux pieds, striées, fortement cannelées, presque anguleuses, très-glabres, jaunâtres, rameuses, cylindriques, garnies de feuilles amples, alternes, ailées, composées de folioles alternes, confluentes à leur base, presque toutes égales, lancéolées, un peu ensiformes, aiguës à leur sommet, ondulées à leur contour; celles des feuilles supérieures presque crépues, bien plus étroites.

Les fleurs sont blanches, réunies en un épi ordinairement épais, tnuu, ovale, oblong, terminal. Les pédoncules propres sont fistiformes; ceux des fleurs inférieures, longs de cinq à six lignes, munis à leur base de bractées subulées, une fois plus courtes. Les calices sont petits, découpés en cinq folioles inégales; la corolle composée de cinq pétales assez grands, à trois divisions: elle contient dix étamines surmontées d'anthers jaunes. Le nombre des pistils varie de trois à cinq. Les capsules sont ovales, remarquables par leur grosseur.

Cette plante croît en Espagne, peut-être même dans les départements méridionaux de la France. Je l'ai également rencontrée sur les côtes de l'Afrique septentrionale. (V.v.)

La variété *s* n'a que quatre à six pouces de hauteur; ses folioles sont fort étroites, courtes, ondulées & comme denticulées à leur contour. (V.f.)

#### 10. RÉSÈDA jaune. *Refeda lutea*. Linn.

*Refeda foliis omnibus trifidis, inferioribus pinnatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. — Jacq. Flor. austr. vol. 4. tab. 353. — Bulliand. Herb. tab. 281. — Hort. Cliff. 212. — Hort. Ups. 149. — Royen, 481. — Dalib. Parif. 159. — Gort. Gelr. 310. — Mill. Dict. n°. 1 & 2. — Scop. Carn. n°. 569. — Pollich. Pal. n°. 454. — Cmel. Tub. pag. 137. — Moench. Haff. n°. 393. — Martisch. Sil. n°. 318. — Hoffm. Germ. 164. — Roth. Germ. 1. pag. 24. — Il. 524. — Lam. Flor. fr. vol. 4. p. 205. n°. 892. VII. — Gouan, Monsp. 230. n°. 4. — Gérard, Flor. gall. prov. 377. n°. 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 374.

*Refeda hexapetala, foliis pinnatis, undulatis; calice confuso.* Hall. Helv. n°. 1056.

*Refeda vulgaris.* C. Bauh. Pinn. 100. — Tourn. Inst. R. Herb. 453. — Raf. Hist. 1053.

*Refeda Plinii neotericorum; Belgis et ad peregrinam.* Botanique. Tome VI.

*italica vult eant. bri. d.* Lobel. Icon. 222. — Idem, Advetf. 76. Icon.

*Refeda vulgaris, lutea.* Dod. Icon.

*Refeda minor seu vulgaris.* Park. Theatr. 823. Icon.

*Refeda lutea.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 467. Icon. — Dalech. Hist. 2. 1199. Icon.

*s. Refeda gallica, crispia.* Boccon. Sicc. pag. 77. tab. 41. fig. 3. — Tourn. Inst. L. C.

*Refeda massifensis, foliis latioribus, crispis.* Pluk. Almag. 317. tab. 55. fig. 4.

On distingue cette espèce du *refeda phytuma* par ses feuilles pinnatifides, & du *refeda alba* par les fleurs jaunes & par des différences dans les parties de la fructification.

Ses tiges sont glabres, striées, un peu rudes, ascendantes, rameuses, hautes d'environ un pied & demi, garnies de feuilles alternes, décurrentes sur leur pétiole, ondulées; les inférieures, ou entières, ou à deux & trois divisions orbiculaires; les supérieures ailées, composées de folioles confluentes, lancéolées, en nombre variable, très-glabres, vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont pédicelées, alternes, garnies à la base de leur pédoncule d'une bractée linéaire, membraneuse, subulée, de la longueur du pédicelle, disposées en un bel épi terminal. Le calice est persistant, divisé en six découpures inégales & subulées. La corolle est jaune, composée de six pétales & quelquefois plus, dont deux supérieurs plus grands, onguiculés à leur base, en voûte, recouvrant une sorte de bouclier à demi circulaire, profondément bifides; les découpures un peu saillantes en dehors au dessous du sommet de l'onglet, quelquefois une troisième division fort petite; les deux pétales latéraux plus petits, simples, onguiculés ou bien à deux ou trois divisions; les inférieurs très-étroits, lamelleux ou nuls: ils renferment de quinze à dix-huit étamines, trois styles très-courts. La capsule est oblongue, ridée, à trois angles obtus, s'ouvrant à son sommet, dont l'orifice se roule en dedans; elle contient un grand nombre de petites semences brunes, luisantes, réniformes, attachées aux parois internes de la capsule. (Osserv. Desfont.)

Cette plante croît partout dans les terrains sablonneux, le long des chemins, sur les vieux murs, en Europe & dans la Barbacie. (V.v.)

Elle passe pour résolutive, quoique très-peu d'usage. Ses feuilles ont une saveur approchant de celle du chou.

#### 11. RÉSÈDA de la Méditerranée. *Refeda mediterranea*. Linn.

X

*Refeda foliis integris trilobisque, calicibus flore brevioribus.* Linn. Mantuff. 564. — Jacq. Collect. 1. pag. 147. — Lem. Icon. rar. 3. tab. 475. — Vahl. Symbol. 2. pag. 53.

*Refeda (tetragnyna), alba; foliis lanceolatis, repensis, interduum basi pinnatis incisus; calicis dente supremo aequali.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 92.

Ses tiges font hautes d'un pied, droites ou ascendantes, rameuses & rudes au toucher à leur partie supérieure, garnies de feuilles de deux sortes; les inférieures alternes, lanceolées, point divisées, rudes à leur face inférieure; les feuilles caulinaires & supérieures la plupart à trois divisions.

Les fleurs forment des épis terminaux. Leur calice est très-court, ouvert, à six divisions linéaires; la corolle, plus grande que le calice, blanche, composée de six pétales, dont deux supérieurs à trois divisions, ce qui du milieu plus petit; les deux latéraux partagés en deux; les inférieurs linéaires. Les étamines font d'un blanc-fale; l'ovaire terminé par trois pointes un peu plus longues que le calice: il n'y a point de style, mais trois stigmates simples.

Cette plante croit dans la Palestine. ○

## 12. RÉSÉDA calicinal. *Refeda phyteuma*. Linn.

*Refeda foliis integris trilobisque; calicibus sexpartitis, maximis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 645. Hort. Cliff. 412. — Dalib. Paris. 159. — Mill. Dict. n°. 3. — Jacq. Flor. austr. tab. 132. — Will. in nov. Act. A. N. C. tom. 4. pag. 167. — Scop. Carn. 2. n°. 570. — Gouan, Monsp. 230. n°. 5. — Gérard, Flor. gall. prov. 377. n°. 4. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 373.

*Refeda calicinalis.* Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 204. n°. 792. IV.

*Refeda foliis radicalibus, integris; caulinis integris & semitrilobis; calicibus fixis, fideis, flore superantibus.* Hall. Helv. n°. 1057.

*Refeda floribus trigynis; calicibus maximis, hexaphyllis.* Hort. Upf. 150. — Sauvag. 194.

*Refeda minor, vulgaris.* Tourn. Inst. R. Herb. 423. — Schaw. Specim. n°. 504. — Garidel, Aix. 400.

*Refeda affinis phyteuma.* C. Bauh. Pin. 100. — Prodr. 42. Icon. — Parkins. Theatr. 823. Icon. — Dalech. Hist. 2. pag. 1198. Icon.

*Ercego apula, trifida, quinquefolia.* Col. Ecphr. 167. tab. 269.

*Phyteuma.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 386. Icon. — Dalech. Hist. 2. pag. 1198. Icon.

β. *Refeda minor, vulgaris; folio minus inciso.* Tourn. Inst. R. Herb. 423. — Garid. Aix. 400.

γ. *Refeda minor, vulgaris; foliis integris.* Tourn. Inst. R. Herb. 423. — Garid. Aix. 400.

Cette espèce se distingue du *refeda lutea* par ses feuilles, les unes entières, les autres trilobées; du *refeda odorata* par ses calices plus grands que la corolle, & par les fleurs inodores.

Ses tiges font ordinairement couchées pour la plupart, médiocrement relevées, longues d'environ un pied, rameuses, striées, quelques fois relevées en angle decurrent; rudes, ternes, cylindriques, d'un vert-pâle, garnies de feuilles alternes, pétiolées, les unes entières, glabres, simples, presque ovales ou lanceolées, ou spatulées; les autres à trois lobes presque de même forme, obtuses, rétrécies en pétiole à leur base, quelquefois ondulées.

Les fleurs font pédiculées, alternes, disposées en un épi lâche, alongé à l'extrémité des rameaux, dont la partie inférieure est hérissée d'asperités par les impressions & la chute des premières fleurs. Le calice, plus long que la corolle, s'accroît encore après la floraison: il se divise en six découpures irrégales, ovales, obtuses. La corolle est composée de six pétales d'un jaune-pâle, dont quatre supérieurs, finement frangés, onguiculés & en voûte à leur base; deux inférieurs simples, très-étroits. L'ovaire est surmonté de trois styles très-courts; les anthères d'un jaune-rougeâtre. La capsule est oblongue, renflée, presque à six côtes, terminée par trois pointes, contenant des semences un peu tordées & en forme de tein.

Cette plante se rencontre dans les champs, aux lieux stériles & sablonneux, dans l'Europe & la Barbarie. ○ (V. v.)

## 13. RÉSÉDA odorant. *Phyteuma odorata*. Linn.

*Phyteuma foliis integris trilobisque, calicibus flore æquantibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 646. — Weig. Observ. Botan. pag. 30. Observ. 15. — Kniph. Cent. 10. n°. 73. — Bergeret, Phytogr. 2. pag. 237. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 376.

*Refeda foliis albis integris, aliis trilobis, calicibus exiguis.* Sauvag. 194.

*Refeda foliis integris trilobisque, floribus tetragynis.* Mill. Dict. tab. 217.

*Refeda foliis integris, floribus odoratis.* Haller, Gœtt. 95. — Zinn. Cœtt. 123.

Cette petite plante, si bien connue dans tous les jardins par l'odeur suave de ses fleurs, diffère peu du *refeda phyteuma*, commun dans les champs, mais sans odeur.

Ses tiges font un peu couchées, ascendantes, relevées, striées, glabres, verdâtres, à peine an-

guleuses, garnies quelquefois de petits poils blancs & rares, munies de feuilles ou simples ou divisées en deux ou trois lobes, tendres, vertes & glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, rétrécies en coin à leur pétiole.

Les fleurs sont pédiculées, alternes, d'un blanc-verdâtre, unies d'une petite bractée aigüe, membraneuse, au moins de deux tiers plus courte que les pédicules. Le calice est persistant, de même longueur que la corolle, divisé en six découpures linéaires, subulées. La corolle est composée ordinairement de six pétales & davantage, dont deux supérieurs, onguiculés à leur base, en voûte, recouvrant une forte d'écusson arrondi légèrement frangés à leurs bords ; les latéraux & inférieurs très-étroits. Les anthères sont grosses, d'un jaune de safran ou un peu rougeâtres ; les capsules oblongues, toruleuses, terminées à leur sommet par trois pointes courtes.

Cette plante est originaire de l'Égypte, où elle croît naturellement. M. Desfontaines l'a également rencontrée en Barbarie, dans les plaines sablonneuses, aux environs de Mascara. ○ (P. v.)

**RÉSINES.** Ce sont certaines humeurs particulières, épaisses & visqueuses, dont un grand nombre de plantes sont pourvues, qui s'écoulent ordinairement au travers de leurs pores ou par les ouvertures de leur écorce, s'épaississent à l'air, & se distinguent par différents noms, selon leur nature.

On donne à ces humeurs le nom de *résine* lorsqu'elles sont sèches, inflammables, immiscibles à l'eau, dissolubles dans les huiles & l'alcool (l'esprit-de-vin), & qui coulent fluides des arbres qui les produisent. Ces matières ne sont que des huiles devenues concrètes par le dessèchement & l'exposition à l'air.

On n'est pas d'accord sur la différence des baumes & des résines. Les uns donnent le nom de *baumes* à des substances inflammables, fluides ; il en est cependant qui sont secs. D'autres appellent ainsi les substances les plus odorantes, telles que le benjoin, le baume de térébinte ou du Pérou, le storax, &c.

Les résines diffèrent donc des baumes par leur odeur moins suave, & surtout parce qu'elles ne contiennent pas le sel acide concret & odorant que fournissent les baumes. Quoiqu'il soit fait mention des différentes espèces de résine à l'article des plantes qui les produisent, nous croyons devoir rappeler ici les principales, d'après l'exposé qu'en a fait M. Fourcroy dans les *Éléments de chimie*. Les principales espèces de résine sont donc :

1°. La résine connue sous le nom de *baume de la Merque, de Judée, d'Égypte, du grand Caire*. Il est liquide, blanc, amer, d'une odeur de citron très-forte. Il coule de l'arbre nommé *amyris opobalsamum* Linn. Cette résine liquide donne beaucoup

d'huile essentielle par la distillation : on l'emploie comme vulnéraire, incorporé avec le sucre, le jaune d'œuf, &c.

2°. La résine, *baume de copahu brun ou jaune*, qui découle de l'arbre appelé *copaifera officinalis* Linn. L'espèce commune, ainsi que celle du baume de rola, est un mélange du vrai baume de copahu & de térébenthine, suivant Cartheuser. On l'emploie dans les ulcères du poulmon & de la vessie, comme le précédent.

3°. La résine, *térébenthine de Chio*, découle d'une espèce de térébenthine. (Voyez PRISTACHIER). Elle est d'une couleur blanche ou d'un jaune tirant sur le bleu ; elle donne une huile volatile, très-fluide au bain-marie : celle qu'elle fournit à feu nu est moins fluide. La térébenthine est ensuite plus jaune : si on l'a distillée avec de l'eau, elle est blanche & soyeuse. On la nomme *térébenthine cuite*. Cette térébenthine est rare & n'est guère d'usage.

4°. La résine, *térébenthine de Venise*, ou la résine de melle, est celle qu'on emploie communément en médecine. On s'en sert dans son état naturel, ou combinée avec de l'alcali fixe.

5°. La résine de Sapin est nommée *térébenthine de Strasbourg*. On la recueille en prenant les vésicules de l'écorce du sapin, très-abondant dans les montagnes de la Suisse.

6°. La poix est le suc d'une espèce de sapin nommé *picea*. On la tire par des incisions faites à l'écorce de l'arbre. On la fond à un feu doux ; on l'exprime dans des sacs de toile ; on la reçoit dans des barils. C'est la poix de Bourgogne ou poix blanche ; mêlée avec du noir de fumée, elle donne la poix noire. Quand on la tient long-temps en fusion, elle se sèche, devient brune & forme la *colophane*. On en brûle les parties les plus grossières dans un four dont la cheminée aboutit à un petit cabinet terminé par un cône de toile. C'est dans ce cône que la fumée vient se condenser, & y former une suite fine que l'on appelle *noir de fumée*.

7°. Le *galipot* est la résine du pin qui donne les pignons doux. On entaille cet arbre vers le bas : la résine coule par ces cavités dans des auges. On continue ces incisions de bas en haut lorsque les premières ne fournissent plus rien. Quand elle coule fluide on l'appelle *galipot* ; celle qui sèche sur l'arbre en masses jaunâtres, se nomme *barras*. On fait lixivier ces sucs dans des chaudières, & quand ils sont épaissis par la chaleur, on les filtre à travers des nattes de paille : on les coule dans des moules creusés sur le sable, & on en forme des pains qu'on nomme *arcanson* ou *brui-sec*. Si on y interpose de l'eau, la matière devient blanche & forme la *résine ou poix-résine*. Les Provençaux distillent en grand le galipot ; ils en tirent une huile qu'ils appellent *huile de raze*. C'est avec le tronc & les racines de pin qu'on prépare la *goudron*, qui n'est



que l'huile empyreumatique de cette substance. On met en tas les bois de cet arbre ; on les couvre de gazon & on y met le feu : l'huile que la chaleur en dégage, ne pouvant se volatiliser à travers le gazon, se précipite dans un bûquet à l'aide d'une gouttière, & on la ramasse pour la distribuer dans le commerce sous le nom de *goudron*.

8°. La *résine sacamahaca*, la *résine élémi*, la *résine animé*, sont peu en usage. L'arbre qui donne la première n'est pas connu. L'élémi vient d'une espèce d'*amyrin*. La résine animé orientale ou copale, dont l'origine est inconnue ; l'animé occidentale ou courbaill, qui découle de l'*hymenæa*, arbre de l'Amérique méridionale, sont employées dans les vernis.

9°. Le *masif* est en larmes blanches, farineuses, d'une odeur foible. Il coule du térébinthe & du lentisque. On l'emploie comme astringent & aromatique. On le fait entrer dans des vernis siccatifs.

10°. La *fundarouque* est en larmes blanches : on la retire du genévrier entre le bois & son écorce. On l'appelle aussi *verais*, parce qu'on l'emploie beaucoup pour ces préparations. On s'en sert pour mettre en poudre sur le papier gratté, afin de l'adoucir & de l'empêcher de boire.

11°. La *résine de gayac*, qui est véritable, s'emploie contre la goutte. Elle coule du gayac par incisions. Plusieurs médecins la regardent comme une gomme-résine.

12°. Le *ladanum* ou résine d'une espèce de ciste de Candie, est noirâtre. Les paysans le recueillent avec un râteau, auquel sont attachées plusieurs lanières de cuir, qu'ils promènent sur les arbres ; ils en forment des magdaléons cylindriques, que l'on appelle *ladanum in tortis*. Il est altéré par beaucoup de sable noirâtre. On l'emploie comme astringent.

13°. Le *sang-dragon* est un suc rouge que l'on retire du *dracana draco*, & de plusieurs autres arbres analogues. Il est en pains aplatis ou arrondis, ou en petites sphères enfermées dans des feuilles de roseau & nouées comme un chapelet. On s'en sert, en médecine, comme d'un astringent.

Les *gommés-résines* sont des sucs mêlés de résine & de matière extractive, qui a été prise pour une substance gommeuse. Elles coulent par incision, & jamais naturellement, des arbres ou des plantes, sous la forme de fluides émulsifs blancs, jaunes ou rouges, qui se dessèchent plus ou moins facilement. L'eau, l'alcool, le vin, le vinaigre, ne dissolvent tous qu'une partie des gommés-résines : elles diffèrent par la proportion de résine & d'extract, & leur analyse donne des résultats très-variés. Les espèces les plus importantes à connaître sont les suivantes :

1°. L'*oliâa* est en larmes jaunes, transparentes,

d'une odeur forte, désagréable. L'arbre qui le fournit n'est pas connu : on en retire, par la distillation, un peu d'huile volatile, un esprit acide, & il laisse un charbon assez considérable dû à la partie extractive qu'il contient. On l'emploie, en médecine, pour faire des fumigations résolutive.

2°. Le *galbanum* est un suc gras, d'un jaune-brun, d'une odeur nauséabonde. Il coule en Syrie, en Arabie, au Cap de Bonne-Espérance, des incisions faites à une plante nommée *bubon galbanum*. Distillé à feu nu, il donne une huile essentielle bleue, qui devient rouge par la suite ; un esprit acide, une huile empyreumatique pesante. C'est un très-bon fondant & un puissant antispasmodique.

3°. La *scammonée* est d'un gris-noirâtre, d'une odeur forte & nauséabonde, d'une saveur amère & très-âcre. On distingue celle d'Alep, qui est la plus pure. Celle de Smyrne est pesante, noire & mêlée de corps étrangers : on l'extrait du *convolvulus scammonæa* Linn. La racine de cette plante, coupée & exprimée, fournit un suc blanc que l'on fait sécher, & qui devient noir.

La scammonée contient une quantité variée d'extract & de résine, suivant les différents échantillons ; ce qui fait qu'elle produit des effets très-différents chez divers malades. On l'emploie comme purgative. Mêlée avec un extract doux, comme celui de la réglisse, elle forme le *diagréd* ordinaire : on se sert aussi, à cet effet, du suc de coing. On l'administre ordinairement triturée avec le sucre & les amandes douces.

4°. La *gomme-gutte* est jaune, rougeâtre, sans odeur, d'une saveur fort âcre & corrosive. Elle vient de Siam, de la Chine, de l'île de Ceilan : elle est extraite d'un grand arbre peu connu, nommé dans le pays *coddam-pully* ; elle contient beaucoup de résine, qui la rend fortement purgative. On ne doit l'employer à l'intérieur qu'avec beaucoup de réserve.

5°. L'*euphorbe* est en larmes jaunes, vermineuses ou variées, sans odeur. Elle coule des incisions d'une euphorbe qui croît dans l'Éthiopie, la Libye & la Mauritanie : elle contient une résine très-âcre ; elle est si fortement purgative, qu'on la range parmi les poisons. On ne l'emploie guère qu'à l'extérieur, dans les caries.

6°. L'*assa-fœtida* est quelquefois en larmes jaunâtres, & le plus souvent en pains formés de différents morceaux agglutinés. Son odeur d'ail très-fétide & sa saveur amère & nauséabonde le font reconnaître. On le tire de la racine d'une espèce de *serula* qui croît en Perse, dans la province de Chorosan. La racine de cette plante est charnue & succulente : elle fournit, par l'expression, un suc blanc, d'une odeur affreuse, que les Indiens mangent comme assaisonnement, & qu'ils appellent

mett des dieux. On s'en sert à l'intérieur comme d'un puissant antispasmodique, & on l'applique comme discutit à l'extérieur.

7°. L'aloès est un suc rouge-foncé & même brun, d'une amertume considérable. On en distingue de trois espèces : l'aloès succotrin, l'aloès hépatique, & l'aloès caballin. Ils ne diffèrent que par la pureté. La première espèce est la plus pure. A. Juslu a vu préparer les différens aloès à Morviédre en Espagne, avec les feuilles de l'aloès commun : on y fait des incisions profondes ; on laisse couler le suc ; on le décanse de dessus sa tégule, & on l'épait au soleil ; on l'envoie dans des sacs de cuir, sous le nom d'aloès succotrin. On exprime les feuilles, & on dessèche le suc déposé par le repos : c'est l'aloès hépatique. Enfin, on exprime plus fortement les mêmes feuilles, & on en mêle le suc avec les lies des deux précédens, pour en former l'aloès caballin. Le premier aloès contient beaucoup moins de résine que les derniers, qui sont beaucoup plus purgatifs. On se sert de la première espèce, en médecine, comme d'un purgatif drastique, & on lui a reconnu la propriété d'exciter le flux menstruel chez les femmes, & le flux hémorrhoidal chez les hommes. On le recommande surtout comme un très-bon hydragogue.

8°. La myrrhe est en larmes rougeâtres, brillantes, d'une odeur forte, assez agréable, d'un saveur amère, & qui présentent dans leur fraction des lignes blanches de la forme d'un ongle. Quelques-uns de ces larmes sont entièrement gommeuses & sâdes. La myrrhe vient d'Égypte, & surtout d'Arabie, de l'ancien pays des Troglodytes. On ne connoît pas la plante qui la fournit : elle contient beaucoup plus d'extrait que de résine. On l'emploie, en médecine, comme un très-bon Romachique, comme antispasmodique & cordiale. Cartheuseur recommande aux gens de lettres qui ont l'estomac délicat, d'en mâcher, & de l'avaler délayée dans la salive. On s'en sert, en chirurgie, pour déterger les ulcères sanieus, & pour arrêter les progrès de la carie. On l'emploie en poudre ou dissoute dans l'alcool.

9°. La gomme ammoniacque est quelquefois en larmes blanches à l'intérieur, & jaunes intérieurement, souvent en masses assez semblables à celles du benjoin : leur couleur blanche & leur odeur fetide les font aisément distinguer. On soupçonne que cette gomme-résine, qui nous est apportée d'Afrique, est tirée d'une plante ombellifère, à cause des semences qui y sont mêlés. Les phénomènes de la dissolution de cette substance par l'eau & par l'alcool, & surtout son inflammabilité, la rapprochent des résino-extracts de Rouelle.

On se sert, en médecine, de la gomme ammoniacque, comme d'un très-bon fondant dans les obstructions rebelles. On la donne à la dose de quelques grains en pilules ou en émulsion ; elle

entre aussi dans la composition de plusieurs empiâtres fondans & résolusifs.

La résine élastique ou caout-chou est une de ces substances sur la nature desquelles il est difficile de prononcer. Quoique sa propriété combustible, dont on tire parti, en Amérique, pour s'éclairer, semble la rapprocher des résines, son élasticité, sa mollesse, son indissolubilité dans les menstrues qui dissolvent ordinairement ces derniers, sont autant de caractères qui l'en éloignent.

L'arbre qui la fournit (*hevea guianensis* Aubl. & peut-être plusieurs autres), croît dans plusieurs endroits de l'Amérique. On fait des incisions en large sur son écorce, & on a soin qu'elles pénètrent jusqu'au bois : on reçoit dans un vaisseau le suc blanc & plus ou moins fluide qui en découle, pour en former différens ustensiles : on l'applique par couches sur des moules ; on les laisse sécher au soleil ou au feu ; on y fait, à l'aide d'une pointe de fer, des des fins très-variés : on expose ces ustensiles à la fumée, & lorsqu'ils sont bien secs on casse les moules. Telle est la manière dont on fabrique les bouteilles & les différens ustensiles de gomme élastique, qu'on envoie en Europe. Les vases qui sont faits de cette matière, peuvent contenir de l'eau & différens fluides qui n'ont pas d'action sur elle. Si on la coupe en lanières, & qu'on applique ses bords récemment coupés, ils se rejoignent & se recollent assez bien.

Quant aux résines qu'on a cru devoir distinguer sous le nom de baumes, elles diffèrent peu des résines proprement dites ; cependant les chimistes les séparent, en ne donnant le nom de baume qu'à celles de ces substances inflammables les plus odorantes, qui peuvent communiquer à l'eau leur odeur suave, & qui surtout contiennent un sel acide, odorant & concret, qu'on peut obtenir par la sublimation ou par la déccation dans l'eau.

Les espèces de baumes les plus intéressantes peuvent se réduire aux trois suivantes :

1°. Le benjoin. On en distingue de deux sortes. Le benjoin amygdaloïde, formé de larmes blanches, semblables à des amandes liées par un suc brun ; il ressemble au nougat. Le benjoin commun est brun & sans larmes ; il répand une odeur très-suave lorsqu'on le fond ou lorsqu'on le pique avec une aiguille chaude : l'arbre qui le fournit, paroît être le *terminalia benjoin*, d'après Linné fils, & non le *laurus benjoin*, comme le croyoit son père.

Le benjoin vient du royaume de Siam & de l'île de Sumatra ; il ne donne que peu d'huile volatile, à cause de sa solidité : l'eau bouillante en extrait un sel acide, en aiguilles, dont l'odeur est forte, & qui cristallise par refroidissement. On le retire aussi par la sublimation : on le nomme alors fleurs de benjoin.

Le benjoin se dissout dans l'alcool, & sa teinture, précipitée par l'eau, constitue le lait virginal. On emploie le sel de benjoin ou l'acide benzoïque comme un bon incisiif dans les maladies piteuses des poulmon & des reins. Son huile est résolutive : on s'en sert à l'extérieur pour les membres paralytiques.

2°. Le baume de tolu, du Pérou, de Carthagène. On l'apporte ou en forme dans des cocos, ou en larmes jaunâtres, ou dans un état fluide : il coule du toluifera. On peut l'extraire des coques, en les remuant dans l'eau bouillante, qu'il rend fluides. Il vient de l'Amérique méridionale, dans un pays situé entre Carthagène & le Nom-de-Dieu, que les indigènes appellent tolu, & les Espagnols honduras. Il donne, à l'analyse, les mêmes produits que le benjoin, & surtout un sel acide concret. On l'emploie dans les maladies du poulmon : on en fait un sirop. Quelques naturalistes distinguent le baume du Pérou de celui de tolu.

3°. Le storax calamité est en larmes rouges, nettes, ou brunes & grasses. Il a une odeur très-trois : il coule du liquidambar oriental. Duhamel a vu couler de l'alibouifer un suc d'une odeur analogue. Reumann a fait l'analyse du storax calamité : il en a retiré très-peu d'huile volatile ou essentielle, un sel acide concret, une huile épaisse. Son usage est semblable à celui du benjoin : on l'emploie surtout pour les parfums. On l'envoie autrefois renfermé dans des rosteaux : aujourd'hui il nous arrive sous la forme de pains ou de masses irrégulières, brunes-rougeâtres, mêlées de quelques larmes plus claires & d'une odeur très-faible.

On ne doit pas confondre les résines avec les gommes, quoique souvent ces substances ne puissent pas se distinguer au premier aspect. (Voyez l'article GOMME.)

#### RESSERRÉE (Panicule). *Panicula coarctata*.

On désigne sous ce nom les panicules de fleurs lorsque les pedoncules qui les supportent sont rapprochés & à peu près parallèles entr'eux, au lieu d'être divergens & très-ouverts.

RESTIO. *Restio*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des juncs, qui a des rapports avec les *ericales*, & le port des scirpes, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont jonciformes, noueuses, simples ou rameuses, garnies de gaines spatulées à leurs articulations, au lieu de feuilles ; les fleurs disposées en panicule ou en épi ; les épillets garnis d'écaillés imbriquées, unilobes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques ; des épillets composés d'écaillés imbriquées, unilobes ; six pétales ; trois étamines dans les fleurs mâles & dans les fleurs femelles ; un ovaire à six

cannellures, surmonté d'un à trois styles persifans ; une capsule à six plus, polysperme.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice composé d'écaillés imbriquées, membranaceuses, ovales, unilobes, formant des épillets ovales ou oblongs.

2°. Une corolle plumeuse, composée de six pétales glabres, presque égaux ; les trois extérieurs concaves, naviculaires ; les trois intérieurs lancoles, plus minces.

3°. Trois étamines dont les filaments sont capillaires, les anthères oblongues & droites.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice & une corolle comme dans les fleurs mâles.

2°. Un ovaire supérieur, surmonté d'un à trois styles, ordinairement un seul, quelquefois deux, très-rarement trois, terminés par un stigmate plumeux, simple, plus souvent deux, rarement trois.

3°. Les fruits fort encore peu connus (selon Thunberg). Ils consistent en une capsule à six plus, surmontée par les styles convergens, à trois loges, contenant quelques semences oblongues, cylindriques, obtuses (selon Linné).

Observations. Ce genre, composé d'abord de très-peu d'espèces, a été considérablement augmenté par les découvertes modernes de plusieurs voyageurs. Koenig, Thunberg & Sonnerat en ont observé un assez grand nombre au Cap de Bonne-Espérance. Portboil nous a fait connaître les espèces de Koenig ; Thunberg a publié les siennes, & nous en avons trouvé, dans l'herbier de M. Lamarck, quelques autres espèces dont les botanistes précédents n'avoient point parlé, & qui ont été rapportées du Cap de Bonne-Espérance par M. Sonnerat.

Ce genre a de grands rapports extérieurs avec les *scirpes* ; cependant M. Jussieu a cru devoir le rapporter à la famille des juncs, ayant pour fruits une capsule à deux ou trois loges, contenant des semences obtuses, cylindriques. Ces fruits, observés seulement dans deux ou trois espèces, sont encore peu connus dans un grand nombre d'autres. Ils varient de deux à trois loges, & les stigmates sont également au nombre de deux ou trois, rarement solitaires. Il est à remarquer qu'ils sont plumeux & réfléchis, comme dans les graminées.

Les parties extérieures de la fructification ont été diversement nommées. M. Jussieu appelle *calice* les écaillés situées à la base de chaque fleur particulière, & disposées par imbrication sur les épillets, & par-là la corolle se trouve composée

de fix pétales inégaux, glumacés. C'étoit aussi l'opinion de Linnæus; mais Rottboï a donné le nom de *calice* aux trois pétales extérieurs, étant assez généralement distincts des intérieurs qui s'enveloppent: ces trois derniers forment la corolle exclusivement.

Un caractère commun à toutes les espèces de ce genre est d'avoir aux articulations des tiges & des rameaux, des gubies en forme de spathe au lieu de feuilles, ordinairement cylindriques, tubulées, sans expansion extérieure, mais terminées assez souvent par un prolongement subulé ou écarté de la tige, ou appliqué contre elle.

Quant aux caractères que fournissent les espèces, ils se tirent des tiges simples ou rameuses, cylindriques ou comprimées, ou canaliculées à une de leur face; de la forme des gaines; de la disposition des fleurs, toutes disposées en épillets (comme celles des graminées) comprimés ou cylindriques, ovales ou lancéolés, obtus ou aigus, solitaires ou réunis en épis, en grappes, en panicule.

Le *Willdenowia* (restiole), établi par Thunberg, a beaucoup de rapports avec les *restio*. Ses fleurs sont dioïques, comme dans les *restio*; mais ses fruits sont un drupe, ou plutôt une capsule dure, à une seule loge.

## ES PÈ C E S.

### \* Tiges rameuses.

#### 1. RESTIO dichotome. *Restio dichotomus*. Rottb.

*Restio scopis floriferis, longissimis; panicula filiformi, nutante, laxa; spicis oblongis, squarrosis*. Rottb. Plant. Descript. & Icon. pag. 2. n°. 1. tab. 2. fig. 1. A. B. — Idem, Program. anno 1772. pag. 10.

*Restio (vimeus), culmis simplicibus, spicis corymbosis*. Linn. Syst. veget. 738.

*Restio (thamnochortus), culmo simplicis, foliis panicula patenti; squamis lanceolatis, margine serratis*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 329. n°. 13.

Les racines sont simples, fibreuses, flexueuses: il s'en élève un grand nombre de tiges ou de chaumes de deux sortes; les unes stériles, plus courtes, un peu courbées à leur base, cylindriques, grêles, jaunâtres, glabres, dichotomes & même trichotomes, munis à la base des divisions d'écaillés cylindriques, glabres, luisantes; divisées en rameaux rachetés de brun, flexueux, réfléchis vers leur sommet, garnis de petites feuilles courtes, vaginales, brunes, coriaces, flocculeuses à leur face intérieure, dont les gaines se prolongent en une longue pointe canaliculée, subulée, recourbée en dithors.

Les tiges fertiles sont simples, droites, agré-

gées, longues d'environ un pied & demi, munies de quatre à cinq nœuds, chacun desquels est environné d'une gaine spathacée, mutique, pubescente, tomenteuse intérieurement vers son sommet: la base de ces tiges est munie d'écaillés brunes, ovales ou lancéolées.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, presque verticillée, diffuse, dont les peduncules sont plans, filiformes, inclinés, épaissis à leur sommet: ils soutiennent des épillets longs d'un demi-pouce à un pouce, oblongs, scarieux, composés d'écaillés imbriquées, lancéolées, très-aiguës, luisantes, d'un pourpre noirâtre, blanchâtres & membraneuses à leurs bords. La corolle est formée par six pétales, dont les trois extérieurs inégaux, linéaires, lancéolés, aigus; les trois intérieurs oblongs, concaves, bords d'un blanc lavé de pourpre; un des trois plus large, enveloppant les étamines. Les fleurs femelles sont connues dans des épillets comprimés, un peu plus larges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *♀ (V. f. in herb. Lam.)*

#### 2. RESTIO à longs rameaux. *Restio vimeus*. Rottb.

*Restio culmo prostrato, tereti; ramis filiformibus, secundis, ascendentibus; spicis terminalibus pluribus*. Rottb. Plant. Descript. & Icon. pag. 4. n°. 3. tab. 2. fig. 1. — Program. nostr. 1772. pag. 10.

*Restio (dichotomus), culmo dichotomo, foliis, decumbentibus; ramis teretibus, spicis solitariis alternisque*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 314. n°. 26.

*Restio (dichotomus), culmis dichotomis, spicis solitariis*. Syst. Plant. vol. 4. pag. 237.

*Schanus (capensis), culmo tereti, ramossissimo, vaginato; spicis ovatis, nudis, dichotomis, pediculis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 64.

*Restio dichotomus*. Linn. Syst. Nat. edit. 12. vol. 2. Addenda. pag. 735.

*Canna Capitis Bona - Spei, spicis juliformibus*. Scheuz. Agrostogr. 352.

*Equisetum junceum, nigredum, Capitis Bona - Spei*. Breyn. Cent. pag. 176. tab. 91. — Petiv. Gorophyl. tab. 7. fig. 5. Musc. 424.

*Juncus africanus, ligrolo culmo ad nodos involucriis nigris convolutis; panicula aruncinacée*. Pluk. Mantill. 109.

Cette plante a des tiges rameuses, cylindriques, couchées ou redressées, glabres, divisées en rameaux très-longs, filiformes, fasciculés à leur sommet, garnis de feuilles spathacées, vaginales, coriaces, striées, terminées par une pointe longue, subulée, mucronée, un peu réfléchie; celles des rameaux, fertiles, plus courtes, ovales, aiguës.

Les fleurs sont réunies en un épi solitaire, à l'extrémité des tiges, simple ou quelquefois un peu rameux à sa base, composé d'épillets au nombre de quatre ou huit environ, les uns stériles, d'autres pédicels, alternes, ovales, glabres, droits, un peu oblongs, munis d'écailles coriaces, scarieuses à leurs bords, oblongues, concaves, aiguës. La corolle est composée de six pétales, dont trois extérieurs inégaux, linéels, deux plus étroits; le troisième plus grand, élargi, presque plane; les trois intérieurs plus minces, linéaires, contenant trois filaments plus courts que la corolle, terminés par des anthères brunes & ovales.

Cette plante offre plusieurs variétés remarquables. Ses tiges & ses rameaux sont plus ou moins longues & diffuses, couchées ou redressées, filiformes ou capillaires; quelquefois les épis sont solitaires, ou bien en nombre indéterminé & alternes. Elle a des rapports avec le *restio triflorus*.

On rencontre cette espèce au Cap de Bonne-Espérance, sur les collines & au revers des montagnes. (V. f. in herb. Lam.)

### 3. *RESTIO pauciflorus*. *Restio pauciflorus*.

*Restio culmis ramosis, foliis, floriferis; spiculis conglomeratis, raris, terminalibus*. (N.)

A ne considérer que les feuilles de cette espèce, on la distingueroit difficilement du *restio dichotomo*; mais ses fleurs sont très-différentes.

Ses tiges sont cylindriques, grêles, presque pubescentes ou un peu raboteuses, feuillées, rameuses dans toute leur longueur; les rameaux alternes, grêles, un peu flexueux, munis de feuilles spatulées, membraneuses & blanchâtres à leur base, écartées de la tige & subulées à leur sommet. Les rameaux (à leur insertion) sont de plus munis de gaines ovales, membraneuses, acuminées.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en épis courts, agglomérés, formés ordinairement par deux ou trois épillets stériles (excepté quelquefois l'inférieur), ovales, obtus, d'un brun clair, luisant; munis d'écailles imbriquées, concaves, courtes, ovales, obuses; une spathe courte, élargie inférieurement à la base de chaque épillette. La corolle est composée de six pétales inégaux; deux extérieurs, naviculaires, un peu comprimés; le troisième plane; les intérieurs plus étroits, membraneux, aigus. Les étamines, au nombre de trois, ont des filaments courts & des anthères oblongues, obuses à leurs deux extrémités, saillantes latéralement hors de la corolle, marquées dans leur milieu d'une ligne purpurine, foncée, le reste d'un jaune clair de soufre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

### 4. *RESTIO paniculé*. *Restio paniculatus*.

*Restio paniculatus sesquipedali, multiflorus; spicis oblongis, ovatis; squamis ovatis, carinatis, marginibus argenteis*. Rotb. Plant. Descript. & Icon. pag. 4. n°. 4. tab. 2. fig. 3. — Idem, Programm. ann. 1772. pag. 10. n°. 4.

*Restio (paniculatus), caule dichotomo, spicis paniculatis*. Linn. Syst. veget. 738.

*Restio (paniculatus), culmo dichotomo, foliis, decumbente; ramis teretibus, spicis foliatis alternisque*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 314. n°. 25.

Ses tiges sont flexueuses, très-hautes, settes, élancées, canaliculées à une de leur face, à demi cylindriques & presque anguleuses à la face opposée, glabres, d'un jaune-verdâtre, finement ponctuées. Elles se divisent en rameaux alternes; les inférieurs solitaires; les supérieurs soudiées en deux ou trois autres filiformes plus courts, garnis à l'origine de chaque rameau de feuilles vaginales, spatulées, très-courtes, cylindriques, d'un brun-noir, terminées à l'orifice de leur gaine par une sorte de petite écaille mutique, lancéolée, munie d'une bordure blanchâtre & membraneuse, souvent déchiquetée.

Les fleurs sont disposées en une panicule alongée, reserrée, très-rameuse, longue d'un pied & demi environ, garnie d'épillets alternes, presque sessiles, ovales, oblongs, droits, d'un brun-noirâtre, composés d'écailles imbriquées, ovales, naviculaires, coriaces, entourées d'un rebord membraneux, d'un blanc-argente. Les fleurs sont dioïques. La corolle est formée par six pétales, trois extérieurs inégaux, deux concaves, comprimés; le troisième plane, oblong; les trois intérieurs lancéolés, oblongs, obtus, d'un brun-concave, plus large que les deux autres. Les filaments sont courts, membraneux; les anthères linéaires, pendantes, naviculaires, renfermées dans les pétales connexes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

### 5. *RESTIO effilé*. *Restio virgatus*. Rotb.

*Restio ramis alternis, culmo longioribus, subternis; squamis racemosis, glomeratis*. Rotb. Plant. Descript. & Icon. pag. 5. n°. 5. tab. 1. fig. 2.

*Restio (virgatus), culmo dichotomo, foliis; ramis compressis; spicis paniculatis, pendulis*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 313. n°. 24.

Cette espèce se distingue par ses rameaux stériles, dichotomes, plus longs que la tige principale, qui porte seule des fleurs en petites grappes agglomérées.

Ses tiges sont droites, cylindriques, ciliées, articulées,

articulés, de la grosseur d'une plume de cygne, planes, un peu creusés à l'endroit où s'appliquent les rameaux; de couleur grisâtre, longues de dix pouces entre chaque articulation, divisées en rameaux nombreux, alternes, la plupart plus longues que les riges; droits, presque filiformes, à demi cylindriques, très-aigus sur leurs angles, sétacés à leur sommet, stériles, dichotomes, &c. quelquefois à trois divisions; garnis de gaines coriaces, lisses, ponctuées en noir, enveloppant la base des rameaux & celle de leurs divisions; terminées par une pointe droite, subulée, presque épineuse.

Les fleurs sont disposées en petites grappes terminales, dont le rachis est plane, rameux, flexueux, soutenant des épillets conglomérés, les uns féconds, les autres pédicelés, garnis de petites bractées ovales, caduques, &c. munis d'écaillés coriaces, imbriquées, concaves, ovales, mucronées, blanchâtres & scarieuses à leurs bords. Ces fleurs sont étroites, petites, comprimées; leur corolle est composée de six pétales, dont trois extérieurs, inégaux, deux concaves, lancéolés, comprimés; le troisième plane; les trois pétales intérieurs oblongs, blanchâtres, de la longueur des pétales extérieurs, un peu plus larges que les autres, contenant les étamines. Les filaments sont membraneux, dilatés à leur base, de même longueur que la corolle, terminés par des anthères à deux loges, de forme naviculaire.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Rottb.)

#### 6. RESTIO à balais. *Restio scopæ*. Thunb.

*Restio culmo dichotomo, folioso; ramis compressis, panicula spica glomeratis*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 313. n°. 23.

Ses tiges ressemblent à celles du *restio paniculatus*; elles se divisent en rameaux de couleur brune, terminés par de petites feuilles vaginales, sétacées; celles qui revêtent les rameaux sont spatulées, brunes, droites, comprimées, sétacées.

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux en petites panicules glomerulées, garnies d'écaillés ovales, concaves, acuminées, jaunâtres, aiguës, imbriquées; les inférieures plus petites. Les autres parties de la fructification ne sont pas encore bien connues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Thunb.)

#### 7. RESTIO luisant. *Restio lucens*.

*Restio culmis subcompressis, ramis angulatis, panicula diffusâ; foliulis oblongis, luculentibus; squamis marginibus scariosis*. (N.)

Botanique. Tome VI

A. *Idem, paniculâ minore, spiculis brevioribus*. (N.)

Cette plante me paroît se rapprocher du *restio scopæ*; mais ses panicules sont amples, diffusées; les épillets oblongs, très-luisans.

Ses tiges sont glabres, comprimées, très-lisses, rameuses, articulées, munies à chacune de leurs articulations de gaines spatulées, cylindriques, alongées, terminées par un filament sétacé, ou quelquefois déchiquetées à leur sommet. Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, ample, luisante, à ramifications filiformes un peu latérales, presque verrucées; les épillets sont étroits, lancéolés, aigus, longs d'environ un demi-pouce, supportés par des pédicelles sétacés, épais insensiblement vers leur sommet, souples, très-lisses; les pédoncules communs garnis à leur base d'une spathe membraneuse, étroite, lancéolée, aiguë, d'un bleu-grisâtre. Les écaillés sont imbriquées; les unes ovales, aiguës, membraneuses, un peu blanchâtres à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

La plante A m'a offert tous les caractères principaux de la précédente; mais ses panicules sont beaucoup plus petites, &c. ses épillets bien plus courts. Peut-être est-elle une espèce distincte; mais n'ayant pas pu analyser les fleurs, je me suis borné à la mentionner ici par ses caractères les plus apparents. (V. f. in herb. Lam.)

#### 8. RESTIO verticillé. *Restio verticillaris*. Linn. f.

*Restio ramis verticillatis, articulatis; panicula compressa, coarctata*. Linn. f. Suppl. pag. 425. — Syst. veget. pag. 881. n°. 2.

*Restio ramis verticillatis, panicula compressa*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 312. n°. 22.

Cette plante a l'aspect d'un *equisetum* par la disposition de ses rameaux verticillés, très-nombreux, articulés.

Ses tiges sont droites, presque ligneuses, cylindriques, glabres, articulées, lisses, un peu striées, de la grosseur d'une plume ordinaire, hautes de quatre à six pieds, munies à chaque articulation de rameaux très-nombreux, touffus, filiformes, verticillés, très-glabres, droits, articulés, inégaux, plus longs que les entre-nœuds, simples ou dichotomes. Chaque verticille est enveloppé à sa base par une large écaille longue d'un pouce, lancéolée, aiguë, presque plane, brune en dehors, d'un blanc-argenté en dedans, membraneuse. Les rameaux sont munis à la base de chacune de leurs divisions d'une semblable écaille, mais infiniment plus petite, plane, ovale, mucronée ou sétacée à son sommet. Tous ces rameaux sont stériles.

Y

Les fleurs naissent à l'extrémité des tiges, quelques-unes dans l'aisselle des rameaux ou des verticilles : elles forment des panicules compactes, médiocrement étalées, presque verticillées, dont les ramifications sont un peu flexueuses, courtes, sétacées ; les épillets ovales, fort petits, garnis d'écaillés brunes, imbriquées, membraneuses, ovales, obtuses. La corolle est composée de six pétales presque égaux, lancéolés. Les filaments des étamines sont très-courts, terminés par des anthers ovales ; il y a de six à trois styles surmontés d'autant de stigmatés velus, sétacés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, sur le bord des ruisseaux. h (V. f. in herb. Lam.)

9. RESTIO digité. *Restio digitatus*, Thunb.

*Restio culmo dichotomo, aphylo; ramis teretibus; spicis ternis, oblongis*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 312. n°. 21.

Cette espèce nous paroît avoir de grands rapports avec le *restio triflorus*.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, dichotomes, hautes d'un pied & plus ; les rameaux comprimés, geniculés, glabres, dichotomes, florifères. Les feuilles qui garnissent les rameaux sont petites, spathacées, vaginales, glabres, lancéolées. Les fleurs forment environ trois épillets terminaux, oblongs, noirâtres, de trois ou quatre lignes, munis d'écaillés lâchement imbriquées, ovales, concaves, un peu renflées. La corolle est fort petite, composée de pétales en forme de très-petites écaillés minces, blanchâtres, renfermant trois filaments très-courts, terminés par des anthers ovales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les lieux montagneux. (Descript. ex Thunb.)

10. RESTIO comprimé. *Restio compressus*, Rottb.

*Restio culmo ramisque compressis; spicis terminalibus pluribus, alternis, distichis*. Rottb. Plant. Descript. & Icon. pag. 6. n°. 7. tab. 2. fig. 4.

Ses tiges sont droites, un peu comprimées, épaisses, d'un gris brun ou cendré, légèrement ponctuées, divisées en rameaux de même nature, garnis de feuilles vaginales, spathacées, un peu renflées, longues d'environ quatre pouces, écartées de la tige à leur sommet, terminées par une pointe recourbée ; les feuilles inférieures beaucoup plus rapprochées.

Les fleurs forment un épi à l'extrémité des tiges, composé de quelques épillets alternes, longs d'environ un demi-pouce, garnis d'écaillés lancéolées, très-aiguës, portées sur un rachis aplati, comprimé, articulé, souvent recouvert d'un duvet tomenteux, un peu rougeâtre. La corolle, dans

les fleurs mâles, est composée de six pétales ; trois extérieurs inégaux, dont deux latéraux, naviculaires, comprimés, aigus, hispides sur leur dos ; le troisième plane, linéaire, lancéolé. Les pétales intérieurs sont linéaires, oblongs ; le troisième plus large, renfermant trois étamines dont les filaments sont très-courts, les anthers linéaires, inclinées, naviculaires, marquées d'une ligne purpurine dans leur milieu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

11. RESTIO recourbé. *Restio incurvatus*, Thunb.

*Restio culmo dichotomo, aphylo, strillo; spicis imbricato-aggregatis*. Thunb. Dissert. de Rest. p. 312. n°. 20.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, presque ligneuses, striées, dichotomes, hautes de deux pieds & plus, divisées en rameaux de même forme, alternes, recourbés, garnis de gaines spathacées, ovales, acuminées. Les fleurs sont réunies en épillets sessiles, imbriqués, agrégés à l'extrémité des rameaux, munis d'écaillés glabres, ovales, acuminées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Thunb.)

12. RESTIO aggloméré. *Restio glomeratus*, Thunb.

*Restio culmo dichotomo, aphylo, levi; panicula glomerata*. Thunb. Dissert. de Rest. p. 311. n°. 19.

Ses tiges sont droites, cylindriques, lisses, dichotomes, hautes d'un pied & plus ; les rameaux semblables aux tiges. Ils se terminent par des fleurs réunies en une panicule touffue, agglomérée, composée d'épillets ovales, petits, aigus, garnis d'écaillés glabres, jaunâtres, ovales, acuminées.

Dans l'individu que j'ai vu dans l'herbier de M. Lamarck, qui me m'a offert que la comitité d'une tige fleurie, & que j'ai cru devoir rapporter à cette espèce, la panicule étoit un peu recourbée, composée de rameaux courts, verticilles, presque unilatéraux, munis à leur insertion d'une gaine courte, annulaire, cylindrique, bordée à son orifice d'un cercle blanchâtre ; les épillets nombreux, très-ferrés, d'un brun luisant.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

13. RESTIO fromenté. *Restio triticeus*, Rottb.

*Restio culmo tereti, subgeniculato, filiformi; spica compressa, flexuosa; spiculis transversis*. Rottb. Plant. Descript. & Icon. pag. 7. n°. 8. tab. 3. fig. 1.

*Restio (triticeus), culmo dichotomo, aphylo, erecto; ramis teretibus, spicis alternis*. Thunb. Dissert. de Rest. p. 311. n°. 18.

Ses tiges sont jaunâtres, cylindriques, géniculées, marquées d'un grand nombre de petits points bruns, munies de rameaux très-longs, effilés, rouspés, filiformes, presque simples ou dichotomes. Les feuilles sont vaginales, spathacées, laches, ventruës, obtuses, mucronées, enveloppant les articulations, distantes de deux à trois pouces.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en épis longs de deux pouces, dont le rachis est flexueux, geniculé, plane à un de ses côtés, épaissi à son sommet, chargé de quelques épillets alternes; écartés, sessils, oblongs, rangés à peu près comme ceux du *triticum repens*; environnés à leur base d'un involucre ovale, noirâtre, mucroné, garni d'écaillés imbriquées, concaves, coriaces, oblongues, lanceolées, tronquées à leur base, obtuses, acuminées à leur sommet.

Les filiers sont dicliques, sessiles, linéaires, recourbées. Leur corolle est composée de six pétales, trois extérieurs, inégaux, dont deux lanceolés, concaves, très-aigus; le troisième plane & oblong; les trois pétales intérieurs membraneux, oblongs; l'un d'eux plus large que les autres, contenant dans les fleurs mâles trois étamines, dont les filaments sont aussi longs que la corolle, terminés par des anthères linéaires, aiguës, naviculaires, aussi longues que les filaments. Les fleurs femelles, semblables aux fleurs mâles, n'ont point d'étamines; elles renferment un ovaire à trois côtés, de la longueur de la corolle, surmonté de trois styles réfléchis & velus.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les plaines sablonneuses. (V. f. in herb. Lam.)

#### 14. RESTIO tétragone. *Restio tetragonus*. Thunb.

*Restio culmo ramifera tetragonis, spicis alternis*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 310. n°. 17.

Espèce remarquable par ses tiges & ses rameaux à quatre angles aigus, droites, glabres, hautes de deux pieds & plus, frutescentes, divisées en rameaux alternes, fertiles, peu nombreux, droites, garnis à leurs articulations de grânes spathacées, membraneuses, aiguës, presque de la longueur des entre-nœuds.

Les épillets sont ovales, aigus, sessiles, alternes, placés à l'extrémité des tiges & des rameaux, munis d'écaillés glabres, imbriquées, ovales, brunes, aiguës, un peu plus pâles à leurs bords. La corolle est composée de six pétales lanceolés & les extérieurs plus grands, ciliés sur leur carène; les intérieurs minces, plus petits, contenant trois étamines dont les filaments sont très-courts, les anthères oblongues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Thunb.)

#### 15. RESTIO triflore. *Restio triflorus*. Linn.

*Restio culmis simplicibus; spicis alternis, sessilibus, simplicibus*. Linn. Syst. veget. pag. 382.

*Restio (et filius), culmo simpliciter, foliis; spicis alternis, sessilibus*. Thunb. Dissert. de Rest. p. 310. n°. 16.

*Restio (triflorus), culmis cæteribus, erectis; vaginis membranaceis, bifidis; spicis cylindricis, tenuibus, subternis*. Roth. Plant. Delcript. & Icon. pag. 5. n°. 2. tab. 2. fig. 2.

Cette plante a des racines fibreuses, fasciculées, d'où s'élevaient plusieurs tiges simples ou à peine rameuses, dures, cylindriques, filiformes, tachetées de brun; la plupart sont stériles, & celles-là sont en même temps très-rameuses, ayant leurs rameaux aplatis à leur côté intérieur, à angles filiformes, dichotomes, très-tousus à leur sommet & comme crépus. Les rameaux fertiles sont bien moins nombreux, droites, une fois plus longs que les autres, simples à leur partie supérieure, garnis de feuilles très-courtes, vaginales, coriaces, cylindriques, striées, mutiques; & ces du bas presque imbriquées; sur les tiges fertiles ces feuilles sont plus courtes, alternes, distantes, terminées par une membrane bifide, mucronée, subulée, réfléchie en dehors.

Les fleurs forment un épi terminal, composé de deux à cinq épillets environ, grêles, alternes, courts, cylindriques, subulés, un peu courbés; l'intérieur ordinairement plus écarté, composé d'écaillés oblongues, lanceolées, concaves, noirâtres, scarieuses, étroites, très-aiguës, presque spinuliformes à leur sommet.

Ces fleurs sont diuques; leur corolle est composée de six pétales, trois extérieurs, inégaux, dont deux comprimés, naviculaires, très-aigus; le troisième plane, très-obtus; les trois pétales intérieurs minces, linéaires, noirâtres, un peu plus larges que les autres, renfermant trois étamines dont les filaments sont planes & membraneux, les anthères petites, linéaires, saillantes au dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

#### 16. RESTIO élégant. *Restio elegans*.

*Restio ramis fasciculatis, compressis, canaliculatis; vaginis amplis, subimbricatis; paniculis laxis, thyrsoides; spathis oblongis, acuminatis; floribus elegantè variegatis*. (N.)

C'est une des plus belles espèces de ce genre, qui se rapproche, par la disposition de ses fleurs, du *restio racemosus*, très-remarquable par ses belles fleurs panachées de rouge & de blanc, & par la disposition de ses rameaux.

Ses tiges sont droites, toides, assez fortes, gla-



bres, cylindriques à un de leur côté, fortement canaliculées de l'autre, garnies de deux ou trois gaines spathacées, grandes, imbriquées à chacune de leurs articulations, & du centre desquelles sortent un grand nombre de rameaux fasciculés, qui offrent dans leurs divisions & leurs gaines les mêmes caractères que les feuilles, excepte que ces parties sont plus petites. Toutes ces gaines, tant générales que partielles, sont d'un gris-brun, ponctuées, macronées & subulées à leur sommet. Les gaines supérieures des rameaux portent souvent deux filets sétacés.

Les fleurs sont disposées en petites panicules alternes, vers la partie supérieure des tiges dont elles occupent environ huit à dix pouces; chacune d'elles sort du sein d'une spathe lincéolée, assez large, jaunâtre, ponctuée extérieurement, très-lisse & luisante en dedans, subulée à son sommet, presque aussi longue que la panicule, dont les divisions sont munies d'une autre de même forme, beaucoup plus petite, très-blanche, membraneuse. Les épillets sont luisans, composés d'écaillés imbriquées, ovales, aiguës, très-lisses, rougeâtres, bordées d'un liseret blanc, supportées par des pédicules courts, capillaires, inégaux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

17. *RESTIO* distiqué. *R. spica distichus*. Rottb.

*Restio culmo dichotomis, basi procumbentibus; spica simplici, distichâ, terminali; squamis acutissimis.* (N.)

*Restio* (distichus), *spica simplici, terminali, oblongâ, distichâ; squamis lanceolatis, acutissimis, truncatis, patentibus*. Rottb. *Plant. Descript. & Icon.* pag. 6. n°. 6. tab. 2. fig. 5. — *Idem*, *Progam.* 1772. pag. 11.

*Restio* (simplex), *culmis simplicibus, spica terminali*. Linn. *Syll. veget.* 758.

Cette espèce est distinguée du *restio simplex* de Thunberg, & en même tems caractérisée par ses épillets solitaires, terminaux.

Ses tiges sont fortement couchées à leur partie inférieure, ensuite redressées, fermes, cylindriques, jonciformes, tachetées de brun, divisées par des entre-nœuds souvent très-écartés, surtout les supérieurs. Elles se partagent en rameaux alternes, dichotomes à leur sommet, droits, alongés, munis de gaines coriaces, striées, renflées, maculées, mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité de chaque rameau en un seul épillet, rarement deux, de couleur brune, long d'environ un demi-pouce, enveloppé à sa base par une spathe très-aiguë, garnie d'écaillés alternes, glabres, lancéolées, roulées à

leurs bords, subulées, tronquées à leur base, très-alongées, en peu ouvertes, presque rangées sur deux rangs. La corolle se divise en six pétales, trois extérieurs, l'un d'eux plus grand, linéaire, obtus, comprimé, naviculaire, très-velu sur sa carène & celui du milieu naviculaire, aigu, à peine pubescent; le troisième plane, glabre, oblong, lancéolé; les trois intérieurs sont membraneux, très-minces, blanchâtres, linéaires, oblongs, de la longueur de la corolle; ils renferment trois étamines, dont les filamens sont plans, minces, plus longs que les pétales; les anthères pendantes, naviculaires, aiguës, marquées à leurs deux faces d'une ligne purpurine.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Rottb.*)

\* \* \* *Tiges simples.*

18. *RESTIO* à tige simple. *Restio simplex*. Thunb.

*Restio culmo simplici, subulato; spica alternâ, subaggregatâ; squamis ovatis*. Thunb. *Dissert. de Rest.* pag. 310. n°. 15.

D'une tige commune s'élèvent un grand nombre de tiges simples, filiformes, articulées, droites, finement striées, hautes de deux pieds environ, garnies de petites feuilles éparées, peu nombreuses; terminées par quelques épillets alternes, solitaires ou agrégés, légèrement pédonculés, garnis d'écaillés ovales, concaves, glabres, un peu cartées vers leur sommet, terminées par une pointe très-aiguë.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

*Observations.* Thunberg ne dit point si la plante que je viens de présenter d'après lui est la même que le *restio simplex* de Forster, que ce naturaliste a recueilli dans la Nouvelle-Zélande: il ne cite point de synonymie. Dans le *Syst. vegetabilium* Murray, il y a aussi un *restio simplex* qui est rapporté au *restio distichus* de Rottboll. Thunberg n'en a point parlé dans sa monographie des *restio*, & la figure que donne Rottboll de cette plante, ainsi que la description qu'il en fait, ne peut convenir à celle de Thunberg.

19. *RESTIO* frutescent. *Restio frutescens*. Thunb.

*Restio culmo simplici, solido; panicula compositâ; squamis scariosis, laccis*. Thunb. *Dissert. de Rest.* pag. 309. n°. 14.

Les tiges sont droites, glabres, frutescentes, simples ou paniculées à leur partie supérieure, hautes de trois pieds & plus, écaillues à leur base, & dont les gaines sont alternes, vaginales, brunes, laciniées, sétacées, acuminées. Les feuilles

sont éparfées dans toute la longueur des tiges & des rameaux, spathacées, subulées, alongées, écartées des tiges à leur partie supérieure.

Les fleurs sont disposées en une panicule qui prend depuis le milieu des tiges jusqu'à leur sommet, dont les ramifications ou pédoncules communs sont glabres, inégaux, comprimés; les fleurs munies de bractées scarieuses, laciniées, acuminées.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. vix florid. in herb. Lam.*)

20. RESTIO scarieux. *Restio scarifolius*. Thunb.

*Restio culmo simplici, foliis & spicaram squamis lanceolatis, scariosis*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 308. n°. 2.

*Thamnochortus scarifolius*. Berg. Plant. Cap. pag. 353. tab. 5. fig. 8.

*Tamariscus ericoides, foliis incanis, aethiopica; spicae florum longæ, spadicæ*. Pluk. Amalth. 199.

Ses tiges sont simples, cylindriques, légèrement velues, droites, un peu frutescentes, hautes d'un pied & plus, feuillées. Il sort des gaines plusieurs feuilles disposées par dichotomie, hirtorines, capillaires, accompagnées de stipules argentées & laciniées.

Les fleurs, dans les individus mâles, sont rangées en épis paniculés, oblongs, diffus : dans les individus femelles, ces épis sont en grappes ovales, presque sessiles. Les épillets sont garnis d'écaillés imbriquées, lancéolées, entièrement scarieuses, argentées, un peu plus obscures sur leur carène. La corolle est comprimée, à six pétales inégaux; deux extérieurs plus grands, naviculaires, comprimés, aigus, membraneux à leurs bords; quatre intérieurs, lancéolés. La corolle des fleurs femelles est une fois plus large; elle renferme un style terminé par un stigmate simple & pileux.

Cette plante croît sur le revers des montagnes & sur les collines, au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

21. RESTIO imbriqué. *Restio imbricatus*. Thunb.

*Restio culmo simplici, aphyllis; spica oblonga, compressa*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 304. n°. 1.

On distingue aisément cette espèce en ce que ses tiges sont terminées par un seul épi comprimé.

Il s'élève de la même racine quelques tiges simples, cylindriques, droites, articulées, hautes de deux pieds & plus, munies à leurs articulations de gaines spathacées, tronquées. Chaque tige est terminée par un épi foliaire, simple, ovale-oblong, droit, glabre, de couleur brune, comprimé, long d'un pouce environ, garni d'écaillés

imbriquées, élargies vers leur sommet, glabres, concaves, oblongues, aigues, brunes, d'une couleur plus foncée à leur partie supérieure. La corolle est comprimée, composée de six pétales inégaux; deux extérieurs, naviculaires, plus grands; quatre intérieurs, lancéolés; ils renferment un seul style terminé par deux stigmates pileux & en forme de clou.

On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

22. RESTIO vaginal. *Restio vaginatus*. Thunb.

*Restio culmo simplici, aphyllis; spicis alternis, erectis; squamis acuminatis*. Thunb. Dissert. de Rest. pag. 304. n°. 2.

Cette espèce diffère du *restio imbricatus* par ses fleurs en plusieurs épis, & du *restio aistachyos* par les écaillés larges, acuminées de ses épis.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, très-simples, hautes d'environ un pied & demi, articulées, garnies de gaines spathacées, obtuses à chaque articulation. Les fleurs sont réunies en plusieurs épillets, de deux à quatre, alternes, presque sessiles, droits, oblongs, dont le rachis est flexueux; garnis d'écaillés imbriquées, glabres, ovales, concaves, élargies, acuminées, de couleur brune, presque pâles, membraneuses & souvent déchirées à leurs bords. Ces épillets sont soutenus à leur base par une spathe roide, étroite, oblongue, lancéolée, luisante, brune en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

23. RESTIO filiforme. *Restio filiformis*.

*Restio culmis simplicibus, filiformibus, aphyllis; spiculis ovatis, alternis*. (N.)

Cette espèce approche un peu d'un *shanus* par ses caractères extérieurs.

Ses tiges sont droites, grêles, cylindriques, filiformes, très-simples, articulées, un peu raboteuses, n'ayant d'autres feuilles que des gaines spathacées à chaque articulation, très-durantes, très-petites, courtes, cylindriques, mucronées & subulées latéralement à leur sommet, fortement appliquées contre les tiges.

Les épillets, au nombre de trois ou cinq, sont pédiculés, alternes à l'extrémité des tiges; ils sortent d'une spathe courte, concave, amplexicaule, subulée, & forment presque une petite grappe droite; souvent l'épillet inférieur est sessile; les autres sont supportés par des pédoncules droits, roides, inégaux. Chaque épillet est ovale, renflé, obtus, garni d'écaillés imbriquées, assez larges, concaves, d'un brun sombre & noirâtre, mucronées à leur sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.  
(*V. f. in herb. Lam.*)

24. RESTIO à deux épillets. *Restio distachyas*. Rottb.

*Restio culmo tereti, nudo & spicis terminalibus, geminis, subtriangulis*. Rottb. Plant. Descript. & Icon. pag. 8. n°. 10. tab. 3. fig. 5.

Ses tiges sont grêles, cylindriques, nues, très-simples, hautes d'environ trois pieds, fermes, tachetées de brun, munies de quelques gaines cylindriques, striées, obtuses, un peu mucronées, très-distantes; les inférieures plus rapprochées, terminées ordinairement par deux épillets oblongs, parfois intriqués sur quatre faces, longs quelquefois d'un pouce & demi, souvent beaucoup plus courts, garnis d'écaillés coriaces, concaves, oblongues, lancéolées, aiguës, assez grandes, striées, de couleur brune, plus claire vers leur sommet.

La corolle, dans les fleurs femelles, est composée de six pétales, dont trois extérieurs; les latéraux concaves, linéaires, très-étroits, munis sur leur dos, vers leur base, d'une carène saillante; les trois pétales intérieurs linéaires, lancéolés, carénés; ils contiennent un ovaire à trois faces, un peu ridé, surmonté de deux styles membraneux à leur base.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.  
(*V. f. in herb. Lam.*)

25. RESTIO arilé. *Restio aristatus*. Thunb.

*Restio culmo simplici, aphylo; spicis terminalibus, obovatis, erectis & squamis aristatis*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 304. n°. 3.

Ses tiges sont simples, glabres, articulées, droites, presque filiformes, hautes d'un à deux pieds, munies à leurs articulations de gaines courtes, cylindriques, terminées par plusieurs épis droits, solitaires ou rapprochés deux par deux, quelquefois jusqu'au nombre de cinq; oblongs, turbinés, composés d'écaillés imbriquées, ovales, concaves, de couleur brune, glabres, aiguës, terminées par un fillet toide, étacé.

La corolle est composée de six pétales égaux, ovales, rétrécis à leur base, aiguës à leur sommet, de couleur brune, contenant trois filaments capillaires, blanchâtres, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères linéaires, brunes, marquées de stries jaunâtres. Les fleurs femelles sont pourvues d'un style court surmonté de deux stigmates plumbeux, écartés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.  
(*Descript. ex Thunb.*)

26. RESTIO raboteux. *Restio squarrosus*.

*Restio culmis simplicibus, aphyllis; spiculis terminalibus, glomeratis, subsessilibus; squamis squarrosas*. Lam. Illustr. Genet. tab. 804. fig. 1. (N.)

Cette espèce se distingue à ses épillets ovales, glomérulés à l'extrémité des tiges, la plupart filides, assez gros.

Ses tiges sont simples, droites, cylindriques, grêlées, cendrées, très-glabres, articulées, garnies à leurs articulations de gaines vaginales en peu rétilées, glabres, longues d'environ un den i-pouce, terminées par un fillet étacé, quelquefois bifide.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en plusieurs épillets au nombre de trois ou cinq, fétilés; quelquefois les inférieurs pedunculés, enveloppés à leur base par une spathe courte, très-fille, brune, luisante, coriace, aque, subulée, un peu scarieuse à ses bords. Chaque épillet est ovale, obtus, garni d'écaillés un peu rudes, subulées, roulées à leurs bords. La corolle est composée de six pétales inégaux; les deux extérieurs plus longs, naviculaires, concaves, aigus, pubescens ou un peu velus sur leur dos; les quatre intérieurs plus courts, égaux, concaves, très-aigus. Dans les fleurs mâles il y a trois étamines dont les filaments sont courts, les anthères lancéolées, oblongues, aiguës à leur sommet. La corolle, dans les fleurs femelles, est semblable à celle des fleurs mâles; elle contient un ovaire court, globuleux, un peu ovale, surmonté d'un style bifide & de deux stigmates allongés, roulés en d. hors, pubescens. Le fruit est une capsule à deux loges.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.  
(*V. f. in herb. Lam.*)

27. RESTIO à fleurs pendantes. *Restio cernuus*. Linn. f.

*Restio culmo simplici, aphylo; spicis turbinatis, pendulis*. Linn. 2. suppl. pag. 425. — Syll. veget. pag. 882. •

*Restio (cernuus), culmo simplici, aphylo; spicis turbinatis, pendulis; squamis obtusis cum acumine*. Thunb. Dissert. de Reil. pag. 305. n°. 4.

Ses tiges sont simples, filiformes, droites, glabres, articulées, hautes de deux pieds & plus, munies à leurs articulations de gaines spatheacées, oblongues, obtuses, terminées par trois, quatre & même cinq épillets pedunculés, turbinés, obtus, pendans, de la grosseur d'un pois, supportés par des pedoncules capillaires, munis d'écaillés imbriquées, arrondies, glabres, de couleur brune, obtuses, acuminées.

La corolle est composée de six pétales presque-égaux, comprimés, glabres, lancéolés, aiguës à

elle renferme trois étamines presque de la longueur de la corolle, dont les filamens sont très-courts, & les anthères linéaires & de couleur jaunâtre.

Cette plante se rapproche du *Resio umbellatus*; mais ses épillets ne sont point disposés en ombelle, & les écailles sont plus courtes, presque arrondies; elle croît sur les collines & le revers des montagnes au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

28. RESTIO ombellé. *Resio umbellatus*, Thunb.

*Resio culmo simplici, aphylo; spicis umbellatis, ovatis; squamis oblongis, obtusis*. Thunb. Dissert. de R. It. pag. 305. n°. 5.

Cette espèce a de grands rapports avec le *Resio cernuus*; elle en diffère par ses épis nombreux, ovales, disposés en ombelle, & par les écailles des épillets, oblongues, obtuses.

Ses tiges sont droites, simples, grêles, articulées, hautes d'environ deux pieds, terminées par deux ou trois épis ovales, obtus, un peu plus gros qu'un pois, disposés en une ombelle simple ou composée; supportées par des pédoncules capillaires, garnis d'écailles placées sur six rangs, concaves, oblongues, obtuses, glabres, de couleur brune, plus pâles à leurs bords. La corolle est composée de six pétales glabres, inégaux, comprimés, lancéolés, aigus, contenant trois filamens très-courts, terminés par des anthères jaunes & linéaires.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

29. RESTIO à gros épillets. *Resio spicigerus*, Thunb.

*Resio culmo simplici, aphylo; spicis oblongis, hexagonis; squamis lanceolatis, apice patulis*. Thunb. Dissert. de R. It. pag. 306. n°. 6. — Lam. Illustr. Gener. tab. 804. n°. 2.

Ses tiges sont simples, un peu frutescentes, cylindriques, articulées, droites, glabres, hautes de deux pieds & plus, garnies à chacune de leurs articulations d'une gaine cylindrique, longue d'environ un pouce, supportant depuis leur milieu jusqu'à leur sommet des épillets oblongs, disposés en ombelles presque paniculées, nombreuses, ouvertes & même un peu pendantes; chaque épillet garni d'écailles imbriquées sur six rangs, élargies à leur sommet, concaves, lancéolées, acuminées, glabres, de couleur brune; les pédoncules sont un peu flexueux, larges, glabres, à trois côtés.

La corolle est composée de six pétales comprimés, inégaux; deux extérieurs plus grands, naviculaires, ovales, lancéolés, plus courts que les

écailles ou le calice; les quatre autres intérieurs, ovales, plus petits. Dans les fleurs mâles les épillets sont plus petits, diffus, panicules, contenant trois filamens très-courts, des anthères oblongues, & de la longueur du calice.

Dans les fleurs femelles les épillets sont plus gros & presque disposés en grappe, droits, courts, obtus, presque de la grosseur du doigt, plus ou moins longs, depuis quatre à cinq lignes jusqu'à un pouce, composés d'écailles imbriquées sur six rangs, larges, lancéolées, zigzags, supportées par des pédoncules roides & glabres. La corolle est à six pétales comprimés, concaves; deux extérieurs naviculaires, plus grands; quatre intérieurs plus petits, lancéolés, renfermant un seul filet surmonté d'un stigmate simple & plumé.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

Thunberg a donné de cette espèce une figure que je ne connois pas; mais la description qu'il en a faite, convient tellement à la plante que M. Lamarck a fait graver dans les *Illustrations des Genres*, que j'ai cru ne pas devoir s'écarter des deux plants. (*V. f. in herb. Lam.*)

30. RESTIO des toits. *Resio testorum*, Linn. f.

*Resio culmo simplici, aphylo; racemo compresso, erecto*. Linn. 1. Suppl. pag. 425. — Syll. veget. pag. 582.

*Resio (testorum), culmo simplici, aphylo; spicis racemosis, subsessilibus; squamis fuscis, nitidis*. Thunb. Dissert. de R. It. pag. 307. n°. 7.

*Chondropetalum (deustum), culmo tereti, compresso, simplicissimo; spicis terminali compressis, sessilibus, fructibus insertis*. Roth. Plant. Descript. Icon. pag. 10. n°. 1. tab. 3. fig. 2.

Ses racines sont grêles, fusiformes, simples, tomenteuses; elles produisent plusieurs rejets cylindriques, horizontaux, couverts d'écailles imbriquées, ovales, brunes, luisantes, d'où s'élèvent de chaque nœud des tiges droites, fasciculées, junctiformes, presque nues, très-simples, roides, comprimées, d'un vert jaunâtre, glabres, hautes d'environ un pied & demi à trois pieds, garnies de gaines spathacées, coriaces, terminées par un filament roide, subulé; les inférieures d'un pourpre noir, luisantes, oblongues, liriées; les autres plus allongées, cylindriques, verdâtres, membraneuses à leurs bords.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en un épi droit, unilatéral, long d'un à deux pouces, muni de deux ou trois spathe distantes, plus ou moins larges, lancéolées, brunes, coriaces, terminées par une pointe très-aiguë, épineuse, contenant chacune deux épis particuliers, dont un inférieur presque filule, un autre supérieur pédiculé.

Les épillets sont ovales, petits, garnis d'écaillés imbriquées, ovales, concaves, membraneuses, ridées, presque obuses, noirâtres, comme brûlés. La corolle, dans les fleurs mâles, est composée de six pétales égaux, coriaces, cartilagineux, dont deux extérieurs ovales, concaves, aigus, qui en recouvrent un troisième plane, plus large; les trois autres très-roides, lancéolés, très-aigus, renfermant trois étamines, dont les filaments sont courts, membraneux; les anthères naviculaires, très-aiguës, de la longueur des pétales.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses, au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

On se sert de ses tiges pour couvrir les toits des chaumières.

31. RESTIO acuminé. *Restio acuminatus*. Thunb.

*Restio culmo simpliciter, aphyllis; panicula erecta; squamis aristatis*. Thunb. Differt. de Rest. pag. 307. n°. 8.

*Chondropetalum (nudum), culmo tereti; spicis cylindricis, glomeratis, nudis*. Rottb. Plant. Descr. & Icon. pag. 11. n°. 12. tab. 3. fig. 3. — Program. 1771. pag. 12.

Ses tiges sont droites, junciformes, un peu comprimées, articulées, sans aucune strie apparente; très-lisses, grisâtres, munies de gaines spatheacées, coriaces, un peu renflées, caduques, noirâtres, terminées par une pointe toide, sétacée. Les fleurs forment une petite panicule terminale, dont les pédoncules sont courts, roides, alternes, dépourvus de spathe; ce qui distingue particulièrement cette espèce du *restio victorum*.

Les épillets sont agglomérés, ovales, petits, à fleurs peu nombreuses, munis d'écaillés imbriquées, concaves, un peu arrondies, coriaces, très-noires, plus courtes que la corolle. Dans les fleurs femelles la corolle est composée de six pétales, trois extérieurs, oblongs, lancéolés, dont deux concaves, comprimés; le troisième plane, ovale, obtus: les trois pétales intérieurs une fois plus longs que les extérieurs, roides, écartés à leur sommet, lancéolés, comprimés; le troisième un peu plus court, plane, ovale, obtus, enveloppant un ovaire comprimé, à trois faces, surmonté de trois styles écartés, terminés par des stigmates plumeux.

Les fleurs mâles, d'après Thunberg, sont disposées presque en une panicule composée d'épillets denses, ovales. La corolle est composée de six pétales égaux, glabres, concaves, obtus, fort petits, renfermant trois étamines dont les filaments sont très-courts, les anthères brunes & ovales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Rottb. & Thunb.*)

32. RESTIO à petites fleurs. *Restio parviflorus*. Thunb.

*Restio culmo simpliciter, aphyllis; panicula erecta; squamis rotundatis, membranaceis*. Thunb. Differt. de Rest. pag. 307. n°. 9.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges simples, médiocrement comprimées, articulées, lisses, droites, hautes de deux à trois pieds, munies à leurs articulations de gaines cylindriques, glabres, aiguës, terminées par des panicules agglomérées, composées d'épillets petits, ovales, obtus, droits, en forme de cône, munis d'écaillés arrondies, concaves, membraneuses à leurs bords.

La corolle est composée de six pétales inégaux, oblongs, les intérieurs blanchâtres, les extérieurs fort petits, de couleur brune, contenant trois étamines dont les filaments sont très-courts, les anthères ovales, à deux lobes, de couleur brune, tayeées de jaune.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

33. RESTIO à panicules droites. *Restio erectus*. Thunb.

*Restio culmo simpliciter, aphyllis; panicula erecta, involuacrali; spathis imbricatis, lanceolatis*. Thunb. Differt. de Rest. pag. 308. n°. 10.

Ses tiges sont articulées, simples, droites, garnies à leurs articulations de gaines spatheacées, glabres, cylindriques, terminées par des fleurs disposées en petites panicules alternes, étalées, droites, au nombre de trois ou quatre, munies chacune à leur base, & à la base de chacun des pédoncules des spathe ou bractées comprimées, lancéolées, roulées à leurs bords, petites, glabres, aiguës. La corolle est composée de six pétales glabres, égaux, lancéolés, contenant trois étamines dont les filaments sont très-courts, les anthères oblongues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

34. RESTIO argenté. *Restio argenteus*. Thunb.

*Restio culmo simpliciter, aphyllis; panicula erecta; squamis lanceolatis, scariosis*. Thunb. Differt. de Rest. pag. 308. n°. 11.

Cette plante ressemble par ses tiges & les gaines qui les enveloppent, au *restio erectus*. Chacune de ces tiges est terminée par des panicules presque en grappes, ou bien ce sont autant de petites grappes réunies à chacune des articulations d'un rachis commun, composées d'épillets presque sessiles, droits, ovales, en forme de cône, garnis d'écaillés imbriquées, entièrement scarieuses, luisantes,

fantes, argentées, lancéolées, acuminées. La corolle est composée de six pétales égaux, glabres, lancéolés, acuminés, concaves.

Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Thunb.*)

35. RESTIO à grappes. *Restio racemosus*.

*Restio culmis canaliculatis; spathis majoribus, ovatis, obtusis; spica racemosa.* (N.) Lamarck, Illustr. Gener. tab. 804. fig. 4.

Cette plante a de grands rapports avec le *restio thyrsifer*, dont elle diffère par les spathes plus grandes, obtuses, & par les fleurs disposées en petites grappes rameuses.

Ses tiges sont glabres, droites, d'un gris brun, à demi cylindriques, canaliculées à une de leur face. Ce dernier caractère me porteroit à croire qu'elles sont rameuses; ce que je ne peux affirmer, n'ayant vu que l'extrémité d'une tige fleurie, sans gaine ni feuilles. Les fleurs sont disposées en un thyrs terminal, long de quatre à six pouces. Elles forment de petites grappes fasciculées, inégales, dans l'aisselle d'une spathe ample, large, presque plane, longue d'environ un pouce & demi, ovales, obtuses, d'un brun sombre & ponctuées en dehors; d'un jeune de paille & très-luisant en dedans. Les grappes sont droites, ordinairement plus courtes que les spathes, médiocrement rameuses, & dont les pédicules sont courts, filiformes, composés d'épilleurs bruns, petits, garnis d'écailles imbriquées, ovales, obtuses, un peu blanchâtres & membraneuses à leurs bords.

Les fleurs femelles ont une corolle divisée en six pétales inégaux, deux extérieurs naviculaires, très-aigus; un troisième plane, un peu plus court; les trois intérieurs plus minces, ovales, aigus. L'ovaire est terminé par trois stigmates courts, pubescens, réfléchis en dehors. Le fruit est une capsule à trois faces, à trois loges, qui renferment chacune une petite semence ovale, tronquée à son sommet.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

36. RESTIO en thyrs. *Restio thyrsifer*. Rotb.

*Restio culmis simplicibus, subnudis; spathis maximis, ovatis, subacutis; spica glomeratis, thyrsoides.* (N.)

*Restio* (thyrsifer) *culmo nudo, tereti; thyrsos oblongo, terminali; spathis alternis, maximis, in lobos divisis.* Rotb. Program. 1774. pag. 11. — Idem, Plant. Descript. & Icon. pag. 8. n. 9. tab. 3. fig. 4. — Lam. Illustr. Gener. tab. 804. fig. 3.

*Restio* (elegia), *culmis simplicibus; spica glomerata.* Botanique, Tome VI.

*ratâ; spathis partialibus, vagis, simplicibus.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 238. n. 6.

*Elegia juncæa.* Linn. Mantiff. alter. pag. 297.

Ses tiges sont droites, simples, lisses, cylindriques, hautes d'environ quatre pieds, dures, d'un brun-verdâtre, à peine articulées (excepté à leur base), dont les gaines sont coriaces, caduques, rares, lisses, brunes, un peu mucronées, dont il ne reste qu'un anneau noir, protubérant.

Les fleurs sont disposées en thyrs à la partie supérieure des tiges, sur une longueur de six à huit pouces & plus: elles forment de petits épis à peine rameux, droits, serrés, étroits, longs d'environ un pouce dans l'aisselle d'une large spathe ovale, oblongue, concave, quelquefois déchirée, & comme lobée à ses bords, presque obtuse, coriace, d'un roux-clair en dehors, d'un blanc très-luisant, argenté en dedans; scarieuse à son contour, plus longue que l'épi. Celui-ci est composé d'épilles agglomérées, fort petits, presque sessiles; chaque paquet de fleurs est muni d'une spathe particulière, petite, élargie, ovale, aiguë & même subulée à son sommet.

Les épilleurs sont composés d'écailles concaves, imbriquées, lancéolées, presque subulées; les intérieures beaucoup plus courtes. La corolle, dans les fleurs femelles, est formée par six pétales, dont trois extérieurs, deux comprimés, linéaires, lancéolés, très-aigus, concaves, carinés; le troisième plane & linéaire; les trois pétales intérieurs un peu plus courts, alternant avec les extérieurs. L'ovaire est gros, relevé en bosse, terminé par deux ou trois stigmates réfléchis en dehors, épais, velus ou pubescens. Dans les fleurs mâles les anthères, selon Linné, sont brunes, comprimées, bordées de blanc.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Lam.*)

RESTIOLE. *Willdenowia*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des junces, qui a des rapports avec les *risos*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont jonciformes, rameuses, articulées, garnies de gaines en forme de spathes aux articulations, les fleurs disposées en épis ou en panicules, composées d'écailles imbriquées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; un calice composé d'écailles imbriquées; une corolle à six pétales; trois étamines; un seul style surmonté de deux ou trois stigmates plumeux; une capsule dure, supérieure, à une seule loge.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de plusieurs valves im-

briquées, cuminées, persistantes, plus longues que le fruit.

2°. Une corolle à six pétales membraneux, égaux, ovales, un peu arrondis, rapprochés, persistants.

3°. Trois étamines dans les fleurs mâles, dont les filaments sont courts, capillaires; les anthères ovales, oblongues.

4°. Un ovaire supérieur dans les fleurs femelles, surmonté d'un seul style très-court, terminé par deux, quelquefois trois stigmates plumeux.

Les fruits sont une capsule ou une noix dure, ovale, obtuse, glabre, à une seule loge.

#### E S P È C E S.

1. RESTIOLE cylindrique. *Willdenowia teres*. Thunb.

*Willdenowia culmo, ramifera teretibus, levibus*. Thunb. Act. Stockholm. 1790. pag. 29. tab. 2. fig. *intermedia*.

Ses tiges sont droites, très-fines, cylindriques, rameuses, articulées, roides, très dures, un peu canaliculées du côté où s'appliquent les rameaux. Ceux-ci offrent le même caractère : leurs articulations sont garnies de plusieurs gaines spathacées, imbriquées, cylindriques, lisses, de couleur griffâtre, ainsi que les tiges; tronquées obliquement à leur orifice, terminées par une pointe subulée.

Les pédoncules sont roides, épais, très-simples, glabres, droits, comprimés ou triangulaires, fasciculés, terminés par un seul épillet ovale, renflé, aigu, composé de plusieurs écailles en forme de spathe, concaves, larges, ovales, glabres, d'un brun clair, coriaces, membraneuses & blanchâtres à leurs bords, terminées par une pointe subulée. La corolle est divisée en six pétales égaux, courts, ovales, arrondis & obtus à leur sommet, envivonnés à leur base extérieure par un corps presque charnu, cylindrique, divisé à son orifice en six découpures courtes, obtuses. Les étamines sont au nombre de trois; l'ovaire ovale, tronqué à son sommet, surmonté d'un style court, terminé par deux stigmates plumeux. Le fruit est une capsule ou une petite noix dure, ovale, tronquée, enveloppée par la corolle persistante, à une seule loge.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lamarck.)

2. RESTIOLE comprimée. *Willdenowia compressa*. Thunb.

*Willdenowia culmo folioso, levi; ramis compressis*. Thunb. Act. Stockholm. 1790. pag. 29. tab. 2. fig. *extrema*.

Cette espèce se distingue de la précédente, en

ce que ses tiges sont à la vérité lisses, feuillées, presque cylindriques, mais les rameaux sont comprimés. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

3. RESTIOLE striée. *Willdenowia striata*. Thunb.

*Willdenowia culmo tereti, striato*. Thunb. Act. Stockholm. 1790. pag. 29. tab. 2.

Les tiges, dans cette plante, sont cylindriques, striées, tandis qu'elles sont très-fines dans les deux espèces précédentes. Comme ces deux dernières espèces me sont entièrement inconnues, je n'ai pu les mentionner ici que d'après Thunberg. Cette dernière croît également au Cap de Bonne-Espérance.

RÉTICULAIRE. *Reticularia*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui a des rapports avec les *trichia*, & qui ressemble assez souvent à de petites moisissures. Ce sont des substances fongueuses, d'abord pulpeuses, étalées, difformes & molles, qui contiennent dans leur intérieur des cellules remplies de poussière, constituées par une sorte de réseau très-fin & de formes variées. A l'époque de leur maturité, elles produisent une poussière fine.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une substance fongueuse, sessile ou stipitée, presque ronde, renfermant des semences placées entre les fils d'un réseau très-fin.

Ce genre, établi d'abord par Bulliard, a été ensuite divisé en plusieurs autres. M. Persoon a formé, 1°. le genre *diderma*, en retranchant des réticulaires toutes les espèces qui sont placées sur une membrane commune à plusieurs individus. 2°. Le genre *spumaria*, dont les espèces ont à la vérité l'apparence de réticulaires, mais dont la pulpe cache des étuis coriaces & membraneux qui renferment les semences. 3°. Le *lycogala*, dont l'enveloppe est arrondie, membraneuse, remplie dans sa jeunesse d'une masse pulpeuse & liquide, qui se convertit en très-peu de tems en une poussière mêlée d'un petit nombre de filaments. Cette enveloppe s'ouvre d'une manière très-irrégulière, par les côtés ou à son sommet.

En conservant pour caractère essentiel aux réticulaires, les filaments en réseau qui accompagnent les semences, nous réunissons ces trois genres, & les réticulaires se trouveront bien distinguées des moisissures, qui ont un réceptacle membraneux, globuleux, d'abord aqueux & transparent, ensuite opaque & plein de poussière nue, non entre-mêlée de filaments, mais dont les globules adhèrent un peu l'un à l'autre.

Ce genre se distingue encore des *lycoperdon*, non-seulement par leur por, mais encore par la mollesse de leur chair dans leur jeunesse, dont

l'enveloppe, lorsqu'elle devient membraneuse, est très-friable à l'époque de la maturité, se crevant très-rarement au sommet, & presque toujours d'une manière irrégulière.

## E S P È C E S.

\* Point de membrane commune à plusieurs individus.

1. RÉTICULAIRE des jardins. *Reticularia hortensis*. Bull.

*Reticularia extilis filamentosa, mollis, flavescens.* (N.)

*Reticularia (hortensis), maxima, pulvinata, gossypina; seminibus inter loculos luteis & membranaceis impletis.* Bull. Herb. fr. Champ. pag. 86. tab. 424. fig. 2.

*Mucor (septicus), unguis, flavus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1656. — Flor. suec. 1117. 1285. — Edet. Flor. dan. tab. 778.

*Fuligo butyracea, erecta; cauliculis ramosis, lacinatis.* Haller, Helv. n°. 2133.

*Mucor crustaceus, ramosissimus, mollis & fuxax, crocei coloris.* Gleditz, Fung. 160. var. u.

*Spongia fuxax, mollis, fava & amana, in pulvere coriario natus.* March. Act. Gall. 1727.

*Spongia fuxax, mollis, flava, amana.* March. Act. 1727. pag. 272.

*Mucilago crustacea, alba.* Michel, Gen. 216. tab. 96. fig. 2.

*Aparicum spongiosum, nigrum, implanatum, &c.* Michel, Gen. 121. tab. 63. fig. 1.

*Agoricum album, terrestre, medullam panis refert.* Michel, Gen. 121. tab. 63. fig. 2.

*Mucilago filamentosa, ramosa.* Bonanni. 135. tab. 3.

C'est une des plus grandes espèces de ce genre. Elle est étendue, cotonneuse ou filandreuse à sa surface, d'un blanc-roussâtre dans sa jeunesse, quelquefois jaune ou rouillée. Les mailles de son réseau sont larges. Lorsqu'elle commence à paroître, elle ressemble à de l'écume pour la couleur & la consistance. Elle est très-friable lorsqu'elle est morte.

Elle croît sur les fumiers, les vieilles souches, les bois de charpente, & surtout dans les fentes chaudes, sur la tannée.

« Mille circonstances locales, dit Bulliard, font prendre à cette plante des formes & des dimensions très-différentes, de même que la plupart des espèces de ce genre. Lorsqu'elle s'attache à des végétaux vivans, elle s'en approprie les sucres ou-

tritifs & les fait périr; c'est pourquoi les jardiniers la détruisent le plus qu'ils peuvent. Elle se plaît beaucoup dans les fentes chaudes, sur des couches de lannée, & finit bientôt par s'attacher aux plantes qu'on y cultive. »

Au premier coup-d'œil on pourroit la confondre avec la réticulaire blanche; mais celle-ci a ses semences renfermées dans des étuis coriaces, & taillées en branches de corail. Ce caractère est plus que suffisant pour distinguer ces deux espèces dans leur développement complet; mais dans leur jeunesse il n'est pas apparent, & il est presque impossible de ne pas les confondre, à moins qu'on ne les compare dans leur état de dessiccation. Il existe encore beaucoup de ressemblance entre cette plante & la réticulaire charnue; mais cette dernière a la chair ferme, même dès son adolescence, tandis que l'autre n'a pas plus de consistance que de l'écume. Elle varie dans ses couleurs. Quoiqu'ordinairement d'un blanc roussâtre dans sa jeunesse, elle est quelquefois aussi d'un jaune plus ou moins foncé, ou d'un jaune tirant sur la couleur de la rouille.

2. RÉTICULAIRE charnue. *Reticularia carnosa*. Bull.

*Reticularia subdura, extilis pubescens, seminibus nigris.* (N.)

*Reticularia carnosa, pulvinata, gossypina, inter carnosa, loculosa, primâ etate firmiscula.* Bull. Herb. fr. Champ. pag. 85. tab. 424. fig. 1.

Var. 1. *Reticularia carnosa, superficie ex albo fuscante.* Bull. L. C.

Var. 2. *Reticularia carnosa, superficie primâ etate luteo-sulphurea, dein nigro fuscante.* Bull. L. C.

On distingue cette espèce à sa chair ferme, même dès sa jeunesse, qui durcit à mesure qu'elle avance en âge, en sorte qu'on peut, lorsqu'elle est vieille, la couper par tranches comme une truffe. Sa surface est pubescente, blanche ou jaunâtre dans sa jeunesse. L'intérieur est occupé par un réseau blanchâtre, dont les mailles sont remplies de semences noires.

Cette plante croît à la surface de la terre; elle pousse lentement, & vit plusieurs mois.

Bulliard distingue deux variétés de cette plante; l'une, qui est blanche à sa surface dans sa jeunesse, & qui devient ensuite brunâtre; l'autre, qui est d'abord jaune ou d'une couleur sulfurine, d'un brun noirâtre ensuite.

3. RÉTICULAIRE jaune. *Reticularia lutea*. Bull.

*Reticularia mollis, glutinosa, extilis pubescens, lutea.* (N.)

*Reticularia (lutea), pulvinata, subgossypina s. f-*  
Z. 2



*minibus in locellis membranaceis nidulantibus.* Bull. Herb. Tr. Champ. pag. 87. tab. 380.

*Fuigo* (flava), *effusa*, *subretundaque flava*; *corrice cellatolo*, *fibrosa*. Perfoon, Synops. 161. — Idem, Disp. Meth. Fung. pag. 8. — Schæff. Fung. Biv. tab. 154.

*Maor septicus*. Bolt. Fung. tab. 134.

*Lycoperdon lateum*, *gregorium*. Jacq. Misse. vol. 1. 139. tab. 8.

Cette plante se distingue à la couleur jaune de sa surface externe, & du réseau membraneux qui en garnit l'intérieur. Sa superficie est un peu cottonneuse : elle est, dans sa jeunesse, molle comme de l'écume ; elle s'attache aux doigts, & les salit comme le fuc de la chéridoine. Lorsqu'elle est vieille, elle se réduit facilement en poudre. Si poussière est d'un brun noir ; elle varie par sa forme & ses dimensions.

On la trouve sur la terre, sur les feuilles & les tiges mortes ou vivantes.

#### 4. RÉTICULAIRE rose. *Reticularia rosea*. Bull. Philom.

*Reticularia mammosa*, *subspicata*, *exilis reticulata*, *rosea*. (N.)

*Reticularia rosea*. Bulletin Philomat. n°. 14. flor. an 6. fig. 8. A. B. C. — Lam. Ill. Ganer. tab. 839. fig. t. A. B. C.

Cette plante a un aspect qui lui est particulier ; elle est d'une belle couleur rose très-vive, & se présente d'abord sous la forme de mamelons irréguliers & pulpeux, qui en très-peu de tems se réunissent en une seule masse d'une pulpe rougeâtre, enveloppée extérieurement par un filet blanc dont les mailles sont visibles à l'œil nu. Ce filet se réunit en dessous, & forme un petit pédicule qui s'implante dans les fentes du bois. On croiroit voir un morceau de glace aux fraises, enveloppé dans de la dentelle.

Cette plante croît, vers la fin du printemps, sur les vieux troncs d'arbres coupés & humides.

#### 5. RÉTICULAIRE sphéroïde. *Reticularia sphaeroidalis*. Bull.

*Reticularia minima*, *sessilis*, *suborbicularis*, *intus leucosa*. Bull. Champ. pag. 94. tab. 446. fig. 2.

*Reticularia suborbicularis*, *albicans*. Gmel. Synl. Natur. vol. 2. pag. 1472. n°. 11.

*a. Reticularia nivea*. Bull. Vat. t. L. C. — Mich. tab. 95. fig. 3.

*p. Reticularia subrosea*. Bull. Var. 2. L. C.

*Mucor globosus*, *latis coagulati condorem* & *subf-*

*tariam amulans*. Michel, Gen. 215. tab. 95. fig. 3. E.

On distingue cette plante à ses enveloppes globuleuses, filées, de la grosseur d'un grain de millet ; elles sont rapprochées & serrées les unes contre les autres, en sorte qu'elles ressemblent à un amas d'œufs d'insectes. Ces globules varient dans leur couleur ; ils sont blancs ou d'un rose tendre dans leur jeunesse, formés d'une liqueur épaisse qui s'attache aux corps voisins, & deviennent ensuite fermes & même friables.

Cette espèce croît sur les feuilles & les branches mortes.

#### 6. RÉTICULAIRE sinieuse. *Reticularia sinuosa*. Bull.

*Reticularia Laminis duabus parallelis*, *flexuosa*. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 94. tab. 446. fig. 3.

*Physarum* (bivale), *compressum*, *flexuosum*, *cinereo-albidum*, *elongato-fusiformi*, *uno latere dehiscenti*. Perfoon, Syn. 169. — Obtev. Myc. 1. pag. 6. tab. t. fig. 2.

*Trichia* (sphaerica), var. 8, *polymorpha*. Tetenpohl. in Rothii Catalog. Bot. 1. pag. 230.

Cette espèce est dépourvue de pédicule, composée de deux lames rapprochées, coriaces, parallèles, unies par un réseau filamenteux, qui renferme entre ses mailles une poussière très-fine. Ces deux lames ou valves sont blanches, sinieuses : la poussière est de couleur noire.

On rencontre cette réticulaire sur les feuilles mortes.

#### 7. RÉTICULAIRE noire. *Reticularia nigra*. Bull.

*Reticularia senescens nigra*, *feminibus nigris*. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 15.

*Reticularia papulaformis*, *biennis* ; *prima* *etate gummea*, *dein filamentosa*, *intrâ lignum & corticem efficiens*. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 88. tab. 380. fig. 2.

Cette espèce est filée, fort petite, & se présente dans sa jeunesse sous la forme de gouttes gommeuses, transparentes, d'abord d'un blanc-cendré, acquérant ensuite une couleur noire, elle forme de petites houppes velues, très-fugaces.

Cette plante croît sur les branches d'arbres garnies d'écorce, s'y implante par le moyen de petites fibres radicales ; elle vit deux ans, & la seconde année de sa vie elle fait périr ordinairement les branches sur lesquelles elle exsile.

#### 8. RÉTICULAIRE hémisphérique. *Reticularia hemisphaerica*. Bull.

*Reticularia stipite simpliciter; capitula hemisphaerico.*  
Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1471. n°. 3.

*Reticularia minima, stipitibus simplicibus, pericarpis hemisphaericis, intus loculos.* Bull. Herb. fr. Champ. pag. 93. tab. 446. fig. 1.

Cette plante a l'aspect d'une petite moisissure. On la distingue à ses pédicules simples, courts, striés, rendus à leur base. Dans les premiers instans de sa naissance elle se présente sous la forme d'une petite goutte de lait; elle acquiert ensuite une consistance plus ferme & une teinte d'abord grise, puis noirâtre. Son enveloppe, très-convexe dans la jeunesse, s'aplatit ensuite, & forme une espèce de chapeau orbiculaire; elle est pleine d'une poussière d'un brun noirâtre.

Cette plante croît sur les feuilles mortes.

9. RÉTICULAIRE épixylon. *Reticularia epixylon.* Bull.

*Reticularia annua, pubescentia, ex cinereo-nigricans, intus filamentosa, super ligula putrida nascens.* Bull. Champ. pag. 90. tab. 472. fig. 1.

*Reticularia (epixylon), pulvinata, ex cinereo-nigricans.* Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1471. n°. 7.

Cette espèce forme sur le bois de petits coussins assez larges; elle est d'abord grisâtre, unie & molle. A mesure qu'elle avance en âge elle devient d'un brun-noir, & dans son développement complet, pour peu qu'on la touche, il s'en détache une poussière noirâtre qui s'attache aux doigts comme du noir de fumée. Ses semences sont oblongues, insérées à des fibrilles élastiques, & articulées comme si elles étoient formées de petits grains enfilés les uns à la suite des autres. On pourroit la confondre avec la *réticulaire noire*; mais, outre que cette dernière est bisannuelle, elle est encore beaucoup plus petite, & ne croît que sur des branches garnies de leur écorce.

Cette espèce est annuelle: on ne la trouve que sur le bois mort, privé de son écorce.

10. RÉTICULAIRE des blés. *Reticularia segetum.*

*Reticularia fusco-nigricans, gramineum parasitica, intus filamentosa.* Bull. Champ. pag. 90. tab. 472. fig. 2.

*Uredo (segetum), pulvere copioso, nigro, in graminum spiculis, seu glumis proveniens.* Pers. Disp. Method. Fung. pag. 56. — Synops. pag. 224. n°. 27.

*Chaos ustilago.* Linn. Syst. Nat. 1326. n°. 4.

CHARBON. Tessier, *Traité des maladies des grains.* 1799. fig. a. b. c. d. 306. fig. c. d. e. f. 336. fig. c. d. f.

Vulgairement nielle ou charbon.

Les naturalistes ne sont pas d'accord entr'eux sur la nature de cette substance, qui n'est que trop souvent les semences céréales, destinées à la nourriture de l'homme & des animaux qui lui prêtent leurs forces. Liée la regarde comme un amas d'animaux microscopiques, qu'il nomme *chaos ustilago*. MM. Tessier, Duhamel & Yillet pensent que c'est le produit d'une maladie particulière aux graminées. Bulliard, si exact dans ses observations, assure que c'est une véritable plante, dans laquelle il a reconnu les caractères des *réticulaires*. Nous n'avons sur cette substance aucune observation qui nous soit particulière, & sans prétendre décider la question, nous nous bornons à présenter ici ce que Bulliard en a dit.

C'est la plus commune des espèces de ce genre: on ne la trouve jamais que sur les graminées. Ses graines sont rondes, extrêmement fines, & insérées à de petits fillets élastiques, de même que celles de toutes les autres *réticulaires* dont la substance interne est filandreuse.

« Ces graines, portées par les vents sur les épis encore dans leur fourreau, attendent que les balles de ces épis se développent; elles s'infilrent entre les valves dont les organes de la fécondation sont emoussés, pénètrent jusqu'aux grains encore tendres & mucilagineux, s'y enracinent, s'en approprient les sucs nutritifs, s'y développent, & donnent ensuite naissance à une prodigieuse quantité de graines d'un brun noirâtre, & si fines qu'elles ressemblent à du charbon réduit en poudre, d'où vient qu'on leur a donné le nom de *charbon*.

« Si un coup de vent a porté une grande quantité de graines de cette *réticulaire* sur le fourreau d'un épi, cet épi est entièrement *charbonné*. Si au contraire ces graines se sont trouvées en petite quantité, que toutes les fleurs n'en aient pas été atteintes, il n'y a alors qu'un certain nombre de grains de cet épi qui soient charbonnés. Ces grains, comme je m'en suis bien convaincu, donnent naissance à des individus aussi vigoureux que d'autres grains pris sur des épis non charbonnés: d'où l'on peut conclure, avec assez de certitude, que le charbon n'est point une maladie particulière aux graminées; que ce n'est pas non plus le produit d'un insecte, comme beaucoup d'auteurs nous l'assurent. Il n'est pas vrai que les petites graines de cette *réticulaire* se transforment en une sorte de petites anguilles. Qu'il est si se trouve des animalcules dans les infusions de ces graines, ces animalcules leur sont étrangers. Voilà ce dont je me suis bien assuré par nombre d'observations faites & répétées avec le plus grand soin, tant au microscope simple qu'au microscope composé.

« Quoique personne, ajoute Bulliard, n'ait eu, à ce que je sache, connoissance jusqu'ici de la véritable cause du charbon, on a cependant trouvé un moyen d'en préserver en grande partie les

moissons. Ce moyen est connu partout : c'est le *chaulage*, quand il est fait avec les précautions nécessaires. Mais on pourroit, je crois, rendre ce procédé plus simple, moins coûteux, plus à la portée du laboureur, & on en obtiendrait certainement le même succès : ce seroit de passer le grain destiné pour les semences dans une simple dissolution de terre glaise. Toutes les fois que, par un intermède quelconque, on donnera un lessivage aux petites graines de cette réticularia, que, devenues trop pesantes, elles ne pourrout plus être portées par les vents sur les épis aux approches de la floraison, les blés ne feront point charbonnés, pourvu toutefois que les cultivateurs d'une même contrée aient fait subir à leurs semences la même préparation. »

*Observations.* Il n'est pas très-certain que cette espèce convienne à ce genre : plusieurs auteurs doutent de l'existence des filaments qui en constituent le caractère générique, & qui paroissent appartenir aux fibres durcies de l'épiderme qui persiste en se déchirant par lambeaux. Ils l'ont placée en conséquence dans d'autres genres, avec lesquels en effet elle paroît avoir plus de rapports par ses caractères extérieurs. Elle est très-voisine des *acidium*. M. Persoon l'a rangée parmi les *uredo*. On en a distingué plusieurs variétés qui dépendent des plantes sur lesquelles se trouve cette réticularia.

\* Une membrane commune à plusieurs individus.

#### 11. RÉTICULAIRE globuleuse. *Reticularia globulosa*.

*Reticularia sessilis globosa, candida, levis.* (N.)

*Diderma* (globosa), acule, leve, globoso-hémisphérique, candidum. Persoon, Synopf. pag. 167. — Dispos. Meth. Fung. pag. 9. tab. 4. fig. 4 & 5.

Au premier aspect, on prendroit cette réticularia pour un amas d'œufs d'insectes déposés sur des feuilles. Elle se présente sous la forme de petits globules presque hémisphériques, sessiles, de couleur blanche; elle est très-commune en automne sur les feuilles tombées des hêtres.

#### 12. RÉTICULAIRE anguleuse. *Reticularia angularis*.

*Reticularia subdepressa, angularis, alba.* Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1472. n°. 12.

*Diderma* (difforme), acule, leve, difforme, candidum; cortice interiore carulescente. Pers. Dispos. Method. Fung. pag. 9. — Idem, Synopf. pag. 167. n°. 10.

Cette plante est éparse sur une membrane commune très-mince; elle a des formes extrêmement variées. En général, elle est médiocrement com-

primée, presque anguleuse, lisse, sessile, blanche en dehors, de couleur d'azur à l'intérieur de son écorce, remplie d'une poussière d'un brun obscur.

Elle croît sur les feuilles, mais plus ordinairement sur les tiges du *solanum tuberosum*.

#### 13. RÉTICULAIRE testacée. *Reticularia testacea*.

*Reticularia sessilis, subrotunda, primò incarnatè, demùm albida.* (N.)

*Diderma* (testaceum), subrotundum, hémisphérique, primò incarnatum, demùm albidum; columella rufescente-carneum. Pers. Synopf. pag. 167. n°. 8.

*Didymium* (testaceum), sessile, dimidiatum, subrotundum, carneum, peridio interiore rufescenti-carneo. Shrad. Nov. Gen. Plant. 1. pag. 25. tab. 5. fig. 1. 2.

Elle forme de petites têtes sessiles, un peu arrondies, hémisphériques, presque planes à l'une de leurs extrémités, de couleur de chair dans la première jeunesse, acquérant ensuite une couleur blanchâtre : l'intérieur est un peu roussâtre.

Cette plante croît en automne sur les branches mortes & sur les feuilles pourries.

#### 14. RÉTICULAIRE ochracée. *Reticularia ochracea*.

*Reticularia sessilis, sparsa, globosa, levis.* (N.)

*Diderma* (ochraceum), sparsum, leve, globosum, ochraceum. Pers. Synopf. pag. 166. n°. 6.

*Diderma ochraceum.* Hoffm. Flor. germ. 2. tab. 9. fig. 2. b.

Cette espèce, assez rare, croît sur les mousses dont elle enveloppe les ramifications & les folioles; elle est sessile, éparse, & forme une petite tête globuleuse, très-lisse, d'un jaune ochracé ou tirant sur la couleur de rouille.

#### 15. RÉTICULAIRE torse. *Reticularia constricta*.

*Reticularia sessilis, candida, depressa; sulcis concentricis.* (N.)

*Diderma* (constrictum), depressum, candidum; sulcis concentricis. Pers. Dispos. Method. Fung. pag. 9. — Idem, Synopf. pag. 166. n°. 7. — Hoffm. Flor. germ. 2. tab. 9. fig. 2. a.

C'est une espèce élégante & rare, qui se rencontre dans les mêmes lieux que la précédente; elle est sessile, & forme de petites têtes blanches, un peu comprimées, marquées extérieurement de stries concentriques.

#### 16. RÉTICULAIRE fleurie. *Reticularia floriforme*.

*Reticularia pediculis aggregatis; capitulis globosis, dein stellatis.* (N.)

*Diderma floriforme*, stipitatum; cortice stellatim fiss., reflexo; columellâ magnâ, obconicâ. Persoon, Synopf. 164. n°. 1.

*Spharocarpus floriformis*, subcoriaceus; stipitibus cylindraceo-elongatis, gracilibus; pericarpis luteo-flamineis, primùm globosis, demùm stellatim patentibus. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 142. tab. 371. — Shrad. Nov. Gen. Pl. pag. 25. (*Disyrium*.)

Cette plante est d'une consistance coriace, & d'un jaune terreux, très-pâle. Une membrane épaisse & visible à l'œil nu sert de base à plusieurs pédicules grêles, agrégés, lisses, cylindriques, supportant à leur sommet une petite tête lisse & globuleuse. L'écorce extérieure s'ouvre bientôt après en cinq à sept rayons inégaux, presqu'en étoile; s'étale, & laisse apercevoir un petit corps en forme de poire, obtus, ridé, persistant. Celui-ci se fend irrégulièrement, & laisse échapper la poussière qui est de couleur brune, ainsi que les filaments qui la portent.

Cette plante croît sur les bois morts.

17. RÉTICULAIRE ombiliquée. *Reticularia umbilicata*.

*Reticularia sparsa*, albicans; peridio subitè umbilicato, ruguloso; stipite brevissimo. Pers.

*Diderma umbilicatum*. Pers. Synopf. pag. 165. n°. 3.

C'est une espèce assez rare, à peine pédiculée, éparse sur une membrane commune, dont les pédicules très-courts paroissent réunis, mais réellement séparés lorsqu'on les examine avec attention. Le péricarpe est rouffâtre, un peu ombiliqué en dessous, comme ridé à sa superficie.

Cette plante croît dans les forêts, particulièrement sur les branches mortes de sapin.

18. RÉTICULAIRE fièle. *Reticularia fragilis*.

*Reticularia obovata*, fusca; cortice nitido, seminibus nigris, stipite brevissimo. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 1471.

*Diderma (vernicosum)*, stipitatum, congestum, rufescens, ovatum, nitidum; stipite brevi, laxo, albidio. Pers. Observ. Micol. 1. pag. 89. tab. 3. fig. 7. a - g. — Idem, Synopf. pag. 165. n°. 4.

*Trichia (lutea)*, aggregata, substipitata, pyriformis, cortice luteo, filamentis albidis. Trentepohl. in Rothii Catal. Bot. 1. pag. 230.

*Lycoperdon fragile*. Dickf. Plant. Cryptog. Brit. 1. pag. 25. tab. 3. fig. 5.

*Diderma (parasiticum)*, peridio subrotundo; stipite cylindrico, albo, flavescens. Var. 2. Pers. Synopf. pag. 165. n°. 4.

*Lycoperdon parasiticum*. Wither. Arrang. edit. 3. vol. 4. pag. 379.

Cette espèce paroît très-voisine du *reticularia stipitata*; elle croît en petites touffes serrées, médiocrement pédiculées, réunies à leur base par une membrane fine, blanchâtre. Les pédicules sont très-courts; leur tête presque ronde, un peu luisante, d'un jaune-brun; la poussière est noire, les filaments blanchâtres, assez fermes.

Cette plante croît en automne dans les forêts, sur les feuilles, les branches d'arbres, & plus particulièrement parmi les mousses.

19. RÉTICULAIRE rameuse. *Reticularia stipitata*.

*Reticularia pediculis ramosis, capitulis subturnatis*. (N.)

*Reticularia (stipitata)*, minima, perennis; stipitibus ramosis; pericarpis subglobosis, intus loculosus. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 89. tab. 380. fig. 5.

*Diderma (ramosum)*, 2 stipitibus ramosis, capitulis subglobosis. Pers. Synopf. 166.

On distingue cette espèce à ses pédicules rameux à leur base. Elle paroît se rapprocher un peu des *erichies*. Une membrane blanche & coriace sert de base à plusieurs corpuscules arrondis ou en forme de toupie, d'abord blancs & mucilagineux, ensuite jaunes, puis d'un gris noirâtre.

On rencontre cette plante sur les troncs d'arbres morts ou languissans.

20. RÉTICULAIRE argentée. *Reticularia argentea*.

*Reticularia sessilis, turbinata, alba, levius*. (N.)

*Lycogala (argentea)*, pubinata, subhemisphaerica, levius; colore argenteo. Pers. Synopf. pag. 157.

*Lycogala griseum majus*. Michel, Gen. pag. 216. tab. 95. fig. 1.

*Mucor lycogalus*. Bolton. Fung. tab. 135. fig. 2.

*Reticularia (lycoperdon)*, pericarpio ex albo fuscante, levius. Var. 2. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 95. tab. 476. fig. 1. a, d.

β. *Lycogala (turbinata)*, ex pallido fuscescens, turbinata, levius. Pers. Synopf. 158.

*Reticularia lycoperdon*, primâ arcte transluens, pericarpio ex subalbo fuscescente, levius. Var. 3. Bull. Champ. pag. 95. tab. 476. fig. 2.

γ. *Reticularia lycoperdon*, pericarpio ex albo, rufescente, gossypino. Var. 1. Bull. Champ. pag. 95. tab. 446. fig. 4.

Quoiqu'elle très-rapprochée du *reticularia pusillata*, cette espèce s'en distingue en ce que sa surface est lisse & non ponctue; elle est sessile ou pro-

longée à sa base en un pédicule court & épais, en forme de toupie, ou en globe aplati. Sa couleur est blanche dans sa jeunesse; elle devient rousse ou brune en vieillissant. Sa surface est peluchée dans la variété *γ*; elle commence par être pleine d'une pulpe liquide, blanche, opaque dans les variétés *α*, *γ*; transparente dans la variété *β*. Cette pulpe se convertit en une poussière d'abord grise ou rousse, & ensuite brune. Le péricarpe se creève de côté & irrégulièrement.

Cette plante croît solitaire, sur les troncs pourris, dans le courant de l'automne.

21. RÉTICULAIRE ponctuée. *Reticularia punctata*.

*Reticularia subfissilis*, *spharica*, *punctata*, *proeminentibus notata*. (N.)

*Lycogala* (*punctata*), *caespitosa*, *rotunda*, *punctata*, *subcinerea*. Pers. Synops. 158. n°. 3.

*Reticularia* (*lycoperdon*), *pericarpio cinereo*, & *scut. penicillatum punctato*. Var. 4. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 95. tab. 476. fig. 3.

Il y a beaucoup de rapports entre cette espèce & la *reticularia miniata*; elle en diffère néanmoins par la couleur & par les petits points proéminents dont l'enveloppe est chargée extérieurement. Sa forme est sphérique, presque sessile, d'une à deux lignes de diamètre, de couleur grise. Elle contient une pulpe blanchâtre, qui se change en une poussière brune. Son enveloppe vers le sommet est d'une manière assez régulière.

Cette plante croît en groupes, sur les troncs pourris, dans le courant de l'automne.

22. RÉTICULAIRE rouge. *Reticularia miniata*.

*Reticularia fissilis*, *spharica*, *purpurea*; *feminibus subrubris*. (N.)

*Lycoperdon* (*epidenrum*), *corrice farinace purpureo*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1654. — Flor. suec. 1114. 1279. — Pollich, Pal. n°. 1198. — Wedd. Flor. dan. tab. 720. — Bull. Champ. pag. 145. tab. 503.

*Lycoperdon leve, minutum, sphaericum*. Hall. Helv. n°. 2173.

*Lycoperdon sphaericum, fissile; ore in apice vel integro, vel inaequali & radiato*. Gled. Fung. 150. n°. 4.

*Lycoperdon epidendron, minutum pulverem fundens*. Buxb. Hall. 203.

*Lycoperdon sanguineum, sphaericum, primum*. Buxb. Cent. 5. pag. 15. tab. 29. fig. 2.

*Lycogala* (*miniata*), *gregaria*, *globosa*, *primo minima*, *demum fuscescente pulvere rosio*. Pers. Ob-

serv. Myc. 2. pag. 26. — Idem, Synops. pag. 158. n°. 4.

*Galepndrum epidendrum*. Wigg. Holf. pag. 108. — Mich. Gen. pag. 216. tab. 93.

*Macor frugiformis*. Schaff. Fung. tab. 193.

C'est une belle espèce, d'une couleur rouge fort agréable; elle est sessile, arrondie, un peu comprimée, d'une belle couleur orangée ou rouge dans sa jeunesse, pleine d'un suc liquide, épais & de la même couleur, qui s'altère peu à peu & devient d'un gris tirant sur le violet; elle est alors remplie d'une poussière d'un rose-lilas, très-abondante & entre-mêlée d'un petit nombre de filaments; elle se sèche à cette époque, & devient mince & friable; elle s'ouvre sur les bords ou à son sommet d'une manière peu régulière.

Cette plante ne croît que sur le bois mort; elle paraît en été & meurt en automne; elle vient ordinairement par groupes.

23. RÉTICULAIRE blanche. *Reticularia alba*. Bull.

*Reticularia mollis*, *spumosa*, *alba*; *feminibus nigris*. (N.)

*Reticularia* (*alba*), *ovata*, *alba*; *feminibus nigris*. Bull. Herb. fr. Champ. pag. 92. tab. 126.

*Spumaria* (*mucilago*), *magna*, *alba*; *peridiis internat ramifocornutis*. Pers. Synops. 163. n°. 1.

*Mucilago crustacea, alba*. Michel, Nov. Gener. Plant. tab. 96. fig. 2. — Batarra. Fung. Armen. pag. 26. tab. 40. fig. 9. h, i.

Cette plante est de couleur blanche, molle & floconneuse à l'extérieur, comme de l'écume ou de la crème fouettée; leur pulpe renferme dans son intérieur des espèces d'étais coriaces & membraneux, découpés en branches de corail, qui contiennent une poussière noirâtre. Cette plante se dessèche promptement, & se réduit alors en poudre dès qu'on la touche, & il ne reste que les étais noirs.

Elle croît sur les feuilles & les tiges mortes ou vivantes.

RETZIE. *Retzia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des lisérans, qui a des rapports avec les endracs (*hambertia*), & qui comprend des sous-arbrutaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont quaternées, presque verticillées; les fleurs garnies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle cylindrique, velue en dehors, à limbe court; cinq étamines; un style; le stigmate bifide; une capsule à deux loges polyspermes.

CARACTÈRE

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, à cinq divisions lancéolées, droites, inégales.

2°. Une *corolle* monopétale, tubulée, cylindrique, velue en dehors, dont le limbe est court, à cinq découpures ovales, obtuses, concaves, droites, très-velues à leur sommet.

3°. Cinq *étamines*, dont les filamens sont très-courts, attachés au sommet du tube, terminés par des anthères presque en cœur.

4°. Un *ovaire* supérieur, petit, conique, surmonté d'un style filiforme, plus long que la corolle, terminé par un stigmate bifide.

Le *fruit* est une capsule oblongue, aiguë, marquée de deux sillons, à deux loges, à deux valves, contenant plusieurs semences fort petites.

## E S P È C E.

1. RETZIA du Cap. *Retzia capensis*. Thunb.

*Retzia foliis quaterno-verticillatis, lanceolato-lanceolatis; floribus lateralis, subsessilibus.* (N.)

*Retzia capensis*. Thunb. Prodr. 34. — Idem, Acl. Lund. vol. 1. pag. 55. tab. 1. fig. 2. & Nov. Gener. Plant. pag. 5. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 448. tab. 103.

*Retzia spicata*. Linn. f. Suppl. 138. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 843.

C'est un petit arbrisseau d'environ quatre pieds de haut, divisé en rameaux peu nombreux, roides, courts, épais, inégaux, médiocrement velus ou pileux, garnis de feuilles nombreuses, très-rapprochées, quaternées, presque verticillées, sessiles, lancéolées, linéaires, droites, obtuses, marquées à leur face supérieure d'un sillon formé par une suite de petits points, & à leur face inférieure d'un double sillon.

Les fleurs sont latérales vers l'extrémité des rameaux, sessiles, rapprochées, droites, ordinairement cachées par les feuilles, munies de bractées lancéolées, élargies à leur base, en carène, aiguës à leur sommet, velues, plus longues que le calice. Le calice, d'un tiers au moins plus court que la corolle, est divisé à son orifice en cinq découpures droites, velues, ciliées à leurs bords. La corolle est d'un brun-roussâtre, droite, tubulée, un peu rétrécie à sa base, renflée médiocrement jusqu'à son orifice, où elle se divise en cinq découpures ovales, obtuses, velues en dehors.

Cette plante croît sur les montagnes, au Cap de Bonne-Espérance. T. (Descript. ex Linn. f. & Thunb.)

Botanique, Tome VI.

RÉUNIES (Anthères). *Anthera coalita, connata*. Lorsque l'on considère les anthères relativement à leur disposition, on dit qu'elles sont réunies ou connées. Lorsqu'elles sont tellement adhérentes, qu'elles ne composent qu'un seul corps, ou qu'elles forment par leur ensemble une sorte de gaine traversée par le pistil, comme dans toutes les fleurs composées, on les nomme aussi *syngénèses*; telles sont celles des chardons, des artichaux, &c.

Les filamens sont également réunis lorsqu'ils sont distribués en un ou plusieurs paquets, comme dans la mauve, les fleurs papilionacées, les millepertuis, &c.

RHANTÈRE ou ASPERGILLE. *Rhanterium*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a quelques rapports avec les *chrysogonum*, &c. qui comprend des sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, garnis de feuilles alternes, fort petites, & de fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Les *folioles* calicinales subulles, réfléchies; les *semences* du centre munies de quelques poils plumeux à leur sommet; celles de la circonférence nues; le réceptacle garni de paillettes.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont radiées. Elles offrent :

1°. Un *calice* commun, cylindrique, imbriqué, composé de folioles tubulées, réfléchies en dehors à leur sommet.

2°. Des fleurs radiées; celles de la circonférence composées de demi-fleurs peu nombreux, de quatre à cinq; tridentées à leur sommet, ne renfermant que des pistils; les fleurs du centre tubulées, hermaphrodites, divisées à leur sommet en cinq dents droites, aiguës.

3°. Cinq *étamines* syngénèses dans les fleurs hermaphrodites, dont les filamens sont libres, capillaires; les anthères oblongues, réunies en tube.

4°. Un *ovaire*, tant dans les fleurs femelles que dans les hermaphrodites, oblong, supérieur, surmonté d'un style filiforme, terminé par deux ligamens réfléchis.

Les *semences* sont petites, oblongues, glabres, striées; celles de la circonférence dépourvues d'aigrettes; celles du centre couronnées par quatre ou six poils plumeux &c. en forme de pinceau à leur sommet.

Le réceptacle est garni de paillettes aiguës.

Observations. Ce genre a été établi par M. Desfontaines dans sa *Flore du Mont-Atlas*. Son nom vient du mot grec *rhanterion*, en latin *aspergillum*, A 2

un asperfoit, à cause de la petite touffe de pois qui termine les filets dont les semences du centre sont couronnées, & qui forment un des caractères les plus remarquables de ce genre.

## E S P È C E S.

1. RHANTÈRE odorant. *Rhantarium farveolens*. Desfont.

*Rhantarium foliis alternis, lanceolatis, dentatis; ramulis tomentosis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 291. tab. 240.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont droites, cylindriques, raméuses, striées, hautes de deux ou trois pieds, divisées en rameaux nombreux, touffus, lisses, inégaux, diffus, presque en buisson, couverts d'un duvet blanc, tomenteux, garnis de feuilles sessiles, glabres ou tomenteuses, portées sur des inflexions lancéolées, aiguës, denticulées à leur contour; les supérieures entières, subulées, beaucoup plus petites, toutes d'une odeur très-agréable lorsqu'on les broie entre les doigts.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par des pédoncules presque filiformes, blancs, tomenteux, garnis de très-petites folioles alternes, subulées. Les calices sont jaunâtres, glabres, cylindriques, composés de petites écailles roides, glabres, imbriquées, subulées, écartées à leur sommet, médiocrement recourbées en dehors. La corolle est petite, radiée, composée à sa circonférence de quatre à cinq demi-fleurs jaunâtres, écartées, un peu plus longues que le calice, médiocrement élargis & divisés en trois petites dents à leur sommet; ils sont femelles, & renferment un style surmonté de deux stigmates. Les fleurs du centre sont jaunes, tubuleuses, divisées à leur sommet en cinq dents aiguës, hermaphrodites, contenant cinq étamines réunies par leurs anthères. Les semences sont glabres, petites, allongées, marquées de quelques stries; celles de la circonférence nues à leur sommet; celles du centre surmontées de quatre ou six pois longs, foyeux, simples, épaissis à leur sommet, & munis d'une petite touffe de pois en pinceau. Le réceptacle est garni de petites paillettes aiguës, concaves à une de leur face.

Cette plante croît dans le sable, sur les bords de la mer, proche Sfax dans le royaume de Tunis, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. Elle fleurit dans l'été. (V. f. ex D. Desfont.)

RHIZOMORPHE. *Rhizomorpha*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui a des rapports avec les *spharia*. Les plantes qui composent ce genre, se présentent sous la forme de filaments très-fins, rameux ou simples, souvent très-étendus, auxquels sont attachés en forme de tubercules des réceptacles plus ou moins globu-

leux, persistans, & qui s'ouvrent par un orifice difficile à distinguer: ils sont remplis d'une substance médullaire, velue.

Ce genre est peu distingué des *spharia*. Ces dernières ont leur réceptacle renfermé dans la substance de leurs tiges, tandis que dans les *rhizomorpha* ces mêmes réceptacles sont extérieurs & simplement adhérens à la surface des tiges.

## E S P È C E S.

1. RHIZOMORPHE sétiforme. *Rhizomorpha setiformis*. Persl.

*Rhizomorpha filiformis, subimplex, foliis piceis saharena*. Persl. Synops. pag. 705. n. 3.

*Rhizomorpha setiformis, teres, nigra, nitida, subimplex, extremitatibus divisis*. Roth. Catal. 1. pag. 235.

*Lichen (hippochridodes), filamentosus, teres, niger, apice divisus*. Willd. Berol. n. 158. — W. b. Spicil. Flor. goett. pag. 231. — Humb. Friberg. pag. 32.

*Lichen (hippochridioides), subimplex, niger, capillaris*. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1378. n. 344.

*Ufnea nigra, seta equina facie, parum ramosa*. Dill. Musc. pag. 67. tab. 13. fig. 11. B.

β. *Eadem, tuberculosa*. Roth. L. C.

*Lichen setosus, filamentosus, simplex, subcompressus, nigricans; tuberculis globosis, acuminatis, atris*. Leyll. Halens. edit. 2. n. 1171. — Roth. Flor. germ. vol. 1. pag. 515.

*Ufnea nigra, seta equina facie, parum ramosa*. Dill. Hist. Musc. pag. 67. tab. 13. fig. 11. A.

Cette plante a des ramifications presque cylindriques, fines, rameuses à leur extrémité; elle est glabre, luisante, de couleur noire, fort grêle: ses tiges sont filiformes, un peu roides, à peu près de la grosseur d'un crin de cheval; elles supportent de distance à autre de petits tubercules arrondis, noirâtres, un peu chagrinés, qui se terminent par des orifices médiocrement allongés; ils sont remplis d'une substance mucilagineuse qui renferme les semences.

Cette plante croît à l'ombre, dans les arbres creux, sur les rameaux & les feuilles mortes, dans les souterrains, &c.

Dans la plante β les ramifications sont presque simples, les tubercules un peu acuminés.

2. RHIZOMORPHE fragile. *Rhizomorpha fragilis*.

*Rhizomorpha nigra, glabra, compressa, reticulata, intus solida, alba*. Gmel. Syst. Nat. vol. 2. p. 1485.

n°. 1. — Roth. Catal. Bot. 1. pag. 232. — Decand. Bullet. philom. n°. 74. pag. 102. tab. 12. fig. 2.

*Rhizomorpha* (subcorticalis), compresso, ramosa, f. fco-nigricon inter corticem & lignum. Perf. Synopl. pag. 704. n°. 1. — Mich. Gener. Plant. 125. tab. 66. fig. 3.

*Lichen uidalus*. Humb. Fryberg. 33.

*Clavaria phosphorea*. Soweth. Fung. tab. 100. — Fior. dan. tab. 713. — Dodart. Act. Parif. 1675. vol. 10. pag. 557.

*Corallo-fungus*, niger, compressus, variè divaricatus & implexus, inter lignum & corticem. Vaill. Parif. pag. 41. n°. 9.

*Fungus niger*, compressus, variè divaricatus & implexus, &c. Rai, Synopl. 333.

§. *Eadem*, teretifcula.

*Rhizomorpha* (subterranea), longo, ramosa, teretifcula, fusca, nigra. Perf. Synopl. pag. 705. n°. 2.

*Lichen* (radiciformis), filamentosus, teres, ramossimus, glaber, radiciformis. Linn. Dissert. Musc. pag. 37. — Syll. veget. 964. n°. 118. — Web. Spicil. 182. — Humb. Fryb. pag. 34.

*Ufneo* (radiciformis). Scop. Dissert. 1. pag. 95. n°. 16. tab. 8. — Mich. Gener. Plant. 125. n°. 31.

*Rhizomorpha* (putealis), conferta, nigra, ricens, apice albicans, axillis subcompressis. Perf. Synopl. pag. 705. var. 2.

Cette espèce varie un peu dans ses formes, selon les localités & les circonstances de son accroissement; elle est noire, glabre, luisante, froide, fragile: son intérieur est blanchâtre, un peu tomenteux. Lorsqu'elle croît en liberté, ses tiges sont cylindriques; mais lorsque ces tiges végètent entre l'écorce & le bois des arbres ou dans leurs fentes, elles sont comprimées, elles se divisent en ramifications nombreuses. Ses tubercules sont, tantôt épars, tantôt agrégés ou réunis en groupes, noirs, arrondis, un peu chagrinés, remplis d'une substance gélatineuse qui renferme les semences.

Cette plante croît sur les arbres, entre leur écorce & leur bois, dans leurs fentes, quelquefois en dehors, dans les lieux souterrains & humides.

3. RHIZOMORPHE en crinière. *Rhizomorpha crinota*.

*Rhizomorpha subnigro*, ramis longissimis, valde implicatis, criniformibus. (N.)

*Hypoxylon* (Inculiferum), coulesiens, nigrum, super ramis criniformibus siccis gerens locellus. ? Bull. Champ. pag. 174. tab. 495.

Je n'ai pas osé étendre la synonymie de cette

plante. Je me suis borné à celle de Bulliard, sur laquelle néanmoins il me reste quelques doutes, ne s'étant pas assez étendu sur le port de cette espèce, qui cependant est très-remarquable.

Elle croît de préférence sur les substances animales, sur les vieux cuirs, où ses tiges se divisent en rameaux très-nombreux, fort longs, entre-mêlés, diffus, formant une sorte de crinière toisée, élevée, presque par flocons, ou plutôt semblable à un paquet de cheveux fins bien mêlés; de couleur grise, tirant un peu sur le noir; souples, assez fermes, ternes, chargés de petits globules sphériques, distans, solitaires.

Cette plante croît aussi sur les vieux bois, dans les caves & les souterrains. (V. v.)

4. RHIZOMORPHE du quinquina. *Rhizomorpha cinchona*. Roth.

*Rhizomorpha fusca*, pubescens, ramossima, oncostomifera, compressa, intus cava, nitidissima. Roth. Catal. 1. pag. 234. n°. 3. — Idem, Veget. Crypt. in usum. Anal. bot. pag. 8. tab. 1. fig. 2.

*Rhizomorpha fusca*, pubescens, reticulata, compressa, intus cava, nitidissima. Willd. Bot. ann. 1. pag. 8. tab. 1. fig. 2.

Ses tiges sont comprimées, creusées en dedans, divisées en rameaux réticulés, un peu pubescents, de couleur brune. Cette plante croît sur l'écorce du quinquina, à laquelle elle adhère très-fortement quoique sans racines apparentes.

5. RHIZOMORPHE capillaire. *Rhizomorpha capillaris*. Roth.

*Rhizomorpha crocea*, tenuissimo, pubescens, ramossimo, capillaris, subcompressa. Roth. Catalect. 1. pag. 234. n°. 3.

*Rhizomorpha crocea*, subcompressa, capillaris, pubescens. Willden. Bot. ann. 1. pag. 8. tab. 1. fig. 3.

Cette espèce est remarquable par sa couleur d'un jaune de safran. Ses tiges sont rampantes, au moins aussi fines que des cheveux, médiocrement comprimées, légèrement pubescentes, très-rameuses, luisantes, coriaces, divisées en rameaux nombreux, épais, presque fasciculés, courbés en divers sens, jaunes dans leur vieillesse, plus pâles lorsqu'ils sont jeunes.

Cette plante croît aux pieds des troncs d'arbres pourris, & sous les feuilles tombées & en décomposition.

RHIZOPHORE. *Rhizophora*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des palmiers (voyez ce mot), qui a des rapports avec les *brugiera*, & qui comprend



des abouffes exotiques à l'Europe, qui s'étendent très au loin à l'aide de leurs rameaux & branches radicales, souvent opposées, ainsi que les feuilles qui sont entières, coriaces, toutes dans leur jeunesse comme celles de figuiers, & munies de bractées caduques. Les fleurs sont supportées par des pédoncules axillaires ou terminaux, souvent dichotomes, articulés, & garnis de deux bractées. Les fruits sont pendans.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre ou huit divisions ; une corolle à quatre ou huit pétales ; des étamines en même nombre ou doubles ; un style ; deux stigmates ; une semence très-longue, charnue à sa base.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en quatre ou huit découpures oblongues, acuminées, persistantes.

2°. Une corolle composée de quatre à huit pétales oblongs, élargis à leur base, alternes avec les divisions du calice.

3°. De quatre à huit étamines, le même nombre que les pétales ou le double, dont les filamens très-courts sont insérés sur leurs onglets par païes ou simples.

4°. Un ovaire inférieur, arrondi, surmonté d'un style subulé, terminé par deux stigmates aigus.

Le fruit est inférieur ou à demi inférieur, à une seule loge, à une seule semence capsulaire, d'abord renfermée dans le disque du calice, se faisant tout ensuite par une ouverture au sommet, commençant à germer avant sa sortie, brisant ensuite ses enveloppes, & se prolongeant sous la forme d'un corps cylindrique très-long, épais à son sommet.

Observations. Ce genre offre, dans la plupart de ses espèces, des détails & des particularités très-singulières. Souvent un seul arbre peut former, en peu de tems, une forêt entière, par la propriété des rameaux de s'enfoncer dans la terre par leur sommet, d'y développer des racines, & de produire des troncs semblables à ceux auxquels ils tiennent. La truchification n'est pas moins étonnante, ainsi qu'on le verra dans le détail des espèces, & sur laquelle on peut consulter l'article PALETUVIER (vol. 4. pag. 696). Les palétuviers forment dans cet ouvrage une famille particulière, qui n'est encore composée que de deux genres, l'un desquels, le *bruguiera*, a été détaché des *rhizophora*, & que Linné avoit nommé *rhizophora gymnorhiza*.

Gærtner a formé du *rhizophora corniculata* de Linné un genre particulier sous le nom d'*agicer*, &

dont il distingue deux espèces, l'*agicer minus*, la même plante que le *rhizophora corniculata*, & l'*agicer minus*, dont Rumphius a donné la figure sous le nom d'*umbraculum maris*. (Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 124. tab. 81.)

En attendant que ce nouveau genre puisse être présenté dans le supplément de cet ouvrage, nous citerons ici son caractère essentiel, qui consiste en un calice campanulé, persistant, coriace, à demi divisé en cinq découpures ; une corolle à cinq pétales ; cinq étamines (d'après Rumphius) ; un seul style. Le fruit est une capsule arquée, à une seule loge, s'ouvrant à son côté convexe, contenant une semence de même forme. Ce genre ne paroît pas devoir appartenir à la même famille que les rhizophores.

#### ESPÈCES.

1. RHIZOPHORE manglier. *Rhizophora mangle*. Linn.

*Rhizophora foliis acutis, fructibus subulato-clavatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 634. — Lam. Illustr. Gener. tab. 396. fig. 1. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 212. tab. 45. fig. 1.

*Rhizophora pedunculata bifida, trifidaque, fructibus subulato-clavatis*. Jacq. Amer. pag. 141. tab. 89.

*Rhizophora segmentis calicem persistentibus, restis ; fructu acuminato*. Wach. Ult. 90.

*Rhizophora utrinque brachiata, foliis elliptico-ovatis, summis ramis dispositis*. Brown. Jam. 211.

*Mangle arbor pyrifolia, fructu oblongo-ovato, summis ramis radiceosa*. Pluken. Almag. 241. tab. 204. fig. 3.

*Candela americana, foliis laurinis*. Catesb. Car. 2. pag. 63. tab. 63.

*Mangle aquatica, foliis subrotundis & punctatis*. Plum. Gen. 13.

*Mangle pyrifolia, cum filiquis longis, sicut indica affinis*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 415. — Sloan. Jam. 155. Hist. 2. pag. 63. — Rai, Hist. 1772.

*Mangium calendarium*. Rumph. Amboin. 3. pag. 108. tab. 71. 72.

Peckand. Rheed, Malab. vol. 6. pag. 91. tab. 34. — Rai, Hist. 1770.

*Margue guapiriba*. Pison, Brasil. lib. 4. cap. 87.

Vulgairement manglé, manglier, palétuvier.

Cet arbre s'élève à la hauteur d'environ cinquante pieds. Son bois est blanchâtre, & rouge dans l'eau lorsqu'il y a été macéré. Son écorce est très-épaisse, de couleur brune foncée. Les rameaux forment de longs jets qui pendent jusque sur la terre, s'y attachent par des racines, & produisent de nouveaux troncs, qui continuent à se

multiplier de la même manière. Ces rameaux sont garnis de feuilles opposées, pétioles, longues de trois à six pouces, ovales, très-entières, légèrement rétrécies à leur sommet, obtuses, luisantes, coriaces, d'un vert foncé à leur face supérieure, d'un vert jaunâtre en dessous, couvertes de points noirâtres. Chaque paire de feuilles, avant son développement, est enveloppée de deux longues bractées qui durent peu, & laissent sur les tiges deux cicatrices qui alternent avec les feuilles.

Les fleurs sont axillaires, supportées par un pédoncule commun, long d'un à deux pouces, solitaire, comprimé, sillonné dans son milieu, ordinairement bifide à son sommet, terminé par deux fleurs, quelquefois trois, munies de pédoncules propres, cylindriques, longs d'environ un demi-pouce, & qui s'allongent jusqu'à la longueur de deux pouces à la maturité des fruits.

La corolle est blanche, quelquefois légèrement odorante; le calice jaunâtre; quatre pétales linéaires, lancéolés, très-velus en dedans, réfléchis entre les folioles du calice, & un peu plus courts; les filaments presque nuls; huit anthères linéaires, lancéolées, très-caduques, & qui s'ouvrent à leur base avec une forte élasticité. Une semence renfermée dans le disque du calice qui devient une sorte de capsule, épaisse, oblongue; l'embryon de cette semence est environné par un périsperme charnu, très-épais.

Dès que cette semence est parvenue à sa maturité, la germination commence aussitôt, quoique renfermée dans la capsule: la radicule en brise le sommet, se prolonge considérablement: alors la semence, entrainée par ce poids, devient pendante, finit par se détacher de la capsule, & par sa chute s'enfoncé en terre par son sommet, dans une position verticale, où elle prend peu après un développement inverse du premier.

Cet arbre croît dans les terrains marécageux, en Amérique, & sur la côte du Malabar. (V. f. in herb. Lamarck.)

Son bois est blanchâtre; il n'est guère bon qu'à brûler: l'écorce est très-propre à tanner les cuirs. On emploie les fruits aux mêmes usages. Ces arbres forment des forêts immenses, très-épaisses dans les terrains mous, incultes, inondés par les eaux de la mer. Ces forêts sont presque impénétrables; elles sont remplies d'un si grand nombre d'insectes, connus sous la dénomination vague de *mousquitos*, que les sauvages eux-mêmes peuvent à peine en supporter la piquette, mais auxquelles un Européen ne pourroit résister. Une multitude innombrable d'oiseaux, & surtout les aquatiques, y établissent leur retraite: c'est aussi le séjour d'une immense quantité de crabes, & dans les lieux que les eaux de la mer inondent fréquemment, elles y déposent beaucoup d'huîtres qui restent attar-

chées aux arbres. Ces terrains mous & inondés seroient absolument inabordables si les branches & les rameaux des arbres qui composent ces forêts, n'offroient, par leur entrelacement, leur souplesse & leur solidité, une espèce de sol assez ferme pour que les chasseurs puissent y aborder avec plus de facilité que de danger: mais les sauvages font les seuls que cette sorte de chasse puisse tenter; ils en sont bien dédommés par l'abondance du gibier de toute espèce qu'elle leur fournit.

## 2. RHIZOPHORE mucroné. *Rhizophora mucronata*.

*Rhizophora foliis ovatis, obtusis, mucronatis; racemis nutantibus, basi dichotomis.* (N.) Lam. III. Gener. tab. 396. fig. 1.

Cet arbre ou arbrisseau a des rameaux très-épais, raboteux, revêtus d'une écorce jaunâtre, couverts par les impressions des pédoncules après leur chute; garnis de feuilles nombreuses, épaisses, très-rapprochées, pétioles, glabres, coriaces, ridées & ponctuées à leur face inférieure, lisses, presque luisantes, & marquées de nervures fines, latérales à leur face supérieure, entières à leurs bords, ovales, arrondies, obtuses à leur sommet, dans le milieu duquel se trouve une pointe assez longue, roide, droite, subulée.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des rameaux, en grappes courtes, latérales, pendantes, dont les pédoncules, épais, très-glabres, sont ordinairement dichotomes à leur première division, & même à leurs autres ramifications. A la base de chacune d'elle existe une bractée courte, épaisse, à quatre ou cinq divisions ovales, aiguës. Le calice est d'une seule pièce, à quatre divisions glabres, ponctuées, courtes, obtuses, concaves. La corolle est composée de quatre pétales oblongs, concaves, obtus, ponctués extérieurement. Les étamines sont au nombre de huit; l'ovaire est ovale, à quatre faces.

Cette plante croît à l'île-de-France. (V. f. in herb. Lamarck.)

## 3. RHIZOPHORE à fruits cylindriques. *Rhizophora cylindrica*. Linn.

*Rhizophora fructibus cylindricis, obtusis.* Linn. Spec. Pl. vol. 1. pag. 635.

*Karik-candel*. Rheed, Malab. vol. 6, pag. 59. tab. 33. — Rai, Hist. 1770.

*Mangum minus*. Rumph. Amboin. 3. pag. 106. tab. 69. — Burm. Flor. ind. pag. 108.

C'est un arbrisseau qui s'élève à quinze ou dix-huit pieds, dont les rameaux sont bien moins nombreux que dans les autres espèces, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, ova-

les, entières, très-glabres, aiguës à leurs deux extrémités, & même rétrécies en un pétiole court.

Les fleurs sont latérales, presque solitaires, quelquefois deux, réunies sur un pédoncule biface. Leur corolle est blanche, ordinairement à huit pétales réfléchis. Les filaments sont cylindriques, obtus, de la longueur & de l'épaisseur du petit doigt.

Cette plante croît aux Indes, dans les lieux humides & marécageux. h

#### 4. RHIZOPHORE conjuguée. *Rhizophora conjugata*. Linn.

*Rhizophora foliis ovato-oblongis, obtusiusculis, integerrimis; calicibus sigillatis, fructibus cylindricis-subulatis*. Linn. Syst. veg. 1. pag. 442. — Flor. zeylan. 181. — Burm. Flor. ind. 108.

*Anonyma*. Herman, Pieter. 179.

C'est un arbre dont les feuilles sont pétiolées, glabres à leurs deux faces, ovales, oblongues, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont sessiles, les fruits pendans, très-longs, cylindriques, subulés.

Cette plante croît à l'île de Ceylan. h

#### 5. RHIZOPHORE candel. *Rhizophora candel*. Linn.

*Rhizophora foliis obtusis; pedunculis bigeminitis, folio longioribus; fructibus subulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 634.

*Tjessou-candel*. Rheed, Malab. vol. 6. pag. 63. tab. 35. — Rai, Hist. 179c. — Burm. Ind. 108.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur d'environ sept pieds: il se divise en rameaux garnis de feuilles opposées ou géminées, pétiolées, ovales-oblongues, entières, obtuses à leur sommet, glabres, supportées par des pédoncules plus longs que les feuilles, & ordinairement divisés en deux vers leur milieu, chaque division terminée par une feuille.

Les fleurs sont presque en grappes latérales, blanches, à cinq pétales étroits, épais, charnus, linéaires, un peu aigus, très-ouverts & même recourbés en dehors. Les filaments sont nombreux, crépus, très-fins, & même ramcux d'après la figure & la description de Rheed; les fruits subulés, assez semblables à ceux du *rhizophora mangla*.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar, dans les lieux aqueux & salés. h

**RHODIOLE.** *Rhodiola*. Genre de plantes dicotylédonées, à fleurs dioïques, de la famille des jou-

barbes, qui a des rapports avec les *coryledon* & les *sedum*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles planes, alternes, nombreuses, & dont les fleurs sont disposées en corymbes terminaux, touffus.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; un calice à quatre divisions profondes; une corolle à quatre pétales, à peine sensibles dans les fleurs femelles; huit étamines; quatre pistils; autour de corolles polyspermes, accompagnées de quatre écailles échancrées.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé profondément en quatre découpures droites, concaves, obtuses, persistantes.

2°. Une corolle à quatre pétales oblongs, obtus, droits, ouverts, caducs, une fois plus longs que le calice, à peine sensibles dans les fleurs femelles.

3°. Dans les fleurs mâles, huit étamines dont les filaments sont subulés, plus longs que la corolle, terminés par des anthères simples.

Quatre ovaires oblongs, acuminés, stériles; les styles & stigmates non développés.

4°. Dans les fleurs femelles, quatre ovaires alongés, aigus, surmontés d'autant de styles simples & droits, terminés par des stigmates obtus, environnés à leur base (dans les deux sexes) de quatre écailles glanduleuses, courtes, droites, échancrées à leur sommet.

Le fruit consiste en quatre capsules corniculées, s'ouvrant en dedans, & contenant plusieurs semences arrondies.

#### E S P È C E.

**RHODIOLE rougeâtre.** *Rhodiola rosea*. Linn.

*Rhodiola foliis sparsis, serratis; floribus roseis*. (N.)

*Rhodiola rosea*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1465. — Flor. lap. 378. — Flor. suec. 831. 912. — Mater. medic. 215. — Hort. Cliff. 470. — Roy. Lugd. Bat. 457. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 174. — Gmnn. Norv. n°. 103. — Martusch. Sil. n°. 721. — Oeder Flor. dan. tab. 183. — Blackw. tab. 386. — Kniph. Lem. 2. n°. 69. — Fabric. Hermsl. pag. 271. — Lam. Illustr. Gener. tab. 819.

*Rhodiola fluminibus corollis duplo longioribus*. Mill. Dict. n°. 1.

*Sedum sexn distinctum, foliis serratis, umbellis densissimis*. Hall. Helv. n°. 953.

*Sedum roseum*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 560.

*Rhodiola odorata*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 647. n°. 1225.

*Anacampseros radice rosam spirante, major*. Tourn. Infl. R. Herb. 264.

*Rhodia radix*, C. Bauh. Pin. 286. — Clus. Hist. 1. pag. 64. — Raf. Hist. pag. 690. — J. Buih. Hist. 3. pag. 683. Icon. medicot. — Dod. Penetr. 347. — Dalech. Hist. 1. pag. 982. Icon.

*Telephium lateum, minus; radice rosam redolente*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 468. §. 12. tab. 10. fig. 8. Bona.

*Radix rhodia mas.* Camer. Epit. 769. Icon.

Cette plante a des racines longues, épaisses, charnues, d'une odeur agréable, approchant de celle de la rose : ils en élèvent plusieurs riges simples, glabres, tendres, d'un blanc jaunâtre, hautes de six à huit pouces, cylindriques, garnies dans toute leur longueur de feuilles nombreuses, épaisses, très-rapprochées, sessiles, lancéolées, un peu élargies vers leur sommet, presque charnues, d'un vert glauque, glabres à leurs deux faces, dentées particulièrement vers leur sommet, terminées par une pointe aiguë, longues de six à huit lignes.

Les fleurs sont rougeâtres, terminales, disposées en un bouquet touffu ; presque en ombelle : ces fleurs sont dioïques, assez petites ; leur calice est quadrifide ; leur corolle composée de quatre pétales qui avortent en partie dans les fleurs femelles, tandis que les styles & stigmates avortent dans les fleurs mâles : les semelles n'ont point d'épaves ; elles produisent quatre capsules qui renferment de très-petites semences arrondies.

On trouve cette plante dans les Alpes, sur les hautes montagnes des départements méridionaux, sur les rochers & dans les lieux couverts. \* (P. f.)

Sa racine passe pour anodine & résolutive.

**RHODORE.** *Rhodora*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille des rosagées, qui a de grands rapports avec les *rhododendrons* & les *azalées*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont roulées sur elles-mêmes dans leur jeunesse, & les fleurs terminales, fasciculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, à cinq dents ; une corolle à deux pétales connivens, le supérieur profondément bilobé ; dix étamines inclues ; une capsule à cinq loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, d'une seule pièce, fort petit, divisé à son orifice en cinq dents courtes.

2°. Une corolle composée de deux pétales oblongs, connivens ; le supérieur divisé presque

jusqu'à sa base en deux découpures étroites ; l'inférieur élargi, à trois lobes à son sommet.

3°. Dix étamines dont les filaments sont inclinés sur le calice, filiformes, inégaux, un peu inclinés, presque aussi longs que la corolle, terminés par des anthères petites, à deux loges, qui s'ouvrent à leur sommet par deux pores.

4°. Un ovaire supérieur à cinq côtés arrondis, ovale, oblong, surmonté d'un style plus long que les étamines, terminé par un stigmate épais, obtus.

Le fruit est une capsule oblongue, ovale, obtuse, enveloppée à sa base par le calice persistant, à cinq loges, contenant un grand nombre de semences fort petites.

#### ES P È C E.

**RHODORE du Canada.** *Rhodora canadensis*. Linn.

*Rhodora foliis integerrimis, ellipticis, subtus pubescentibus, floribus umbellatis, terminalibus.* (N.)

*Rhodora canadensis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 561. — Lhérit. Scirp. Nov. 1. pag. 141. tab. 68. — Willd. Arb. 287. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 603. — Juss. Gener. Plant. 159. — Lam. Illustr. Genet. tab. 364. — Michaux, Flor. boreal-amér. vol. 1. pag. 259.

*Chamaerhododendros*. Duham. Sem. App. 10. tab. 27. fig. 2.

Arbrisseau qui a le port d'un *azalée*, dont le tronc est droit, cylindrique, haut d'environ deux pieds, divisé en rameaux glabres, alternes, un peu diffus, garnis de feuilles alternes, à peine pétiolées, lancéolées, presque elliptiques, la plupart aiguës à leurs deux extrémités, entières, roulées à leurs bords, glabres & luisantes à leur face supérieure, plus pâles & un peu pubescentes en dessous, roulées sur elles-mêmes dans leur jeunesse, presque sessiles ou dont les pétioles sont très-courts.

Les fleurs sont fasciculées ou presque en ombelle, à l'extrémité des branches & des rameaux, pédonculées ; leur calice est presque glabre, fort petit, à cinq dents courtes, ovales, obtuses. La corolle est grande, composée de deux pétales connivens à leur base, irréguliers, ouverts ; l'inférieur entier, oblong, élargi vers son sommet, où il se divise en trois lobes courts, obtus ; le pétale supérieur est partagé presque jusqu'à sa base en deux découpures étroites, lancéolées, obtuses.

Cette plante croît en Amérique, dans le Canada & à Terre-Neuve. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans les bosquets comme plante d'agrément. f (P. v.)

**RHOMBOIDES** (Feuilles). *Folia rhombica*, Les

feuilles prennent ce nom lorsque, considérées relativement à leurs angles, elles ont quatre côtés parallèles, formant quatre angles, dont deux aigus & deux obtus, comme on peut le voir dans le *rhennopodium vulvaria*.

**RHUBARBE.** *Rheum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des polygonées, qui a des rapports avec les *rumex*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ordinairement très-grandes, les fleurs disposées en une ample panicule, les racines épaisses, jaunâtres, douées d'une vertu purgative.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à six divisions; point de corolle; neuf étamines; trois stigmates sessiles; une semence triangulaire, membraneuse à ses angles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, rétréci à sa base, divisé à son limbe en six découpures obtuses, alternativement plus petites.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne le calice pour elle.

3°. Neuf étamines, dont les filaments sont capillaires, insérés sur le calice & de la même longueur, terminés par des anthères à deux loges, oblongues, obtuses.

4°. Un ovaire très-court, à trois côtés, surmonté de trois stigmates presque sessiles, plumeux, réfléchis.

Le fruit consiste en une semence assez grande, triangulaire, aigüe, membraneuse sur ses angles.

**Observations.** Ce genre a de grands rapports avec les *rumex*; il n'en diffère que par neuf étamines au lieu de six, par les stigmates presque sessiles, par ses semences garnies à leurs angles d'une aile membraneuse. Les espèces qui le composent, sont des plantes remarquables par leurs grandes & larges feuilles, & par leurs fleurs qui forment de amples panicules. Ces plantes sont encore intéressantes par leurs racines grosses, épaisses, & qui ont toutes la propriété de purger doucement & de fortifier l'estomac. Celle que l'on nomme *rheum palmatum*, & qui est la rhubarbe officinale, passe pour la plus efficace; les autres ne sont cependant pas à négliger.

#### E S P È C E S.

1. RHUBARBE rapontic. *Rheum rhaponticum*.

*Rheum foliis obtusis, glabris, venis subius pilosiusculis, sinu basico dilatato; petiolis supra-fuscatis,*

*marginis rotundatis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 41. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 488. n°. 1.

*Rheum foliis glabris, petiolis subsulcatis.* Mater. medic. pag. 109. — Georg. Iter 1. pag. 210. — Pallas, Iter 2. pag. 380. — Knorr, Delic. 1. tab. R. — Sabbat. Hort. 1. tab. 34. — Regn. botan. Icon.

*Rheum foliis glabris.* Linn. Hort. Upf. 98.

*Rheum.* Hort. Cliff. 155.

*Rheum foliis cordatis, specie obtusis.* Miller, Dict. n°. 1.

*Rhaponticum.* Prosp. Alp. Exot. pag. 188. tab. 187.

*Rhaponticum folio lapathi majoris glabro.* C. Bauh. Pin. 116.

*Rhabarbarum fortè Dioscoridis & antiquorum.* Tournef. Inst. R. Herb. 89.

Vulgairement rapontique, rhubarbe anglaise, rhubarbe pontique, rapontic.

Cette plante a des racines grosses, épaisses, divisées en plusieurs portions charnues, jaunes intérieurement, un peu rougeâtres en dehors: il s'en élève des tiges fortes, épaisses, lisses, striées, jaunâtres ou purpurines, divisées en quelques rameaux alternes, garnies, surtout à leur base, de feuilles amples, membraneuses, ovales, glabres, très-larges, pétiolées, entières, un peu sinuées à leurs bords, d'un vert foncé à leurs deux faces, longues souvent de deux pieds sur presque autant de large, arrondies & fortement échancrées en cœur à leur base, rétrécies, mais obtuses à leur sommet, marquées de quelques fortes nervures & de veinules jaunâtres, chargées de petits poils courts & blanchâtres. Les pétioles sont épais, assez longs, cannelés à leur face supérieure, striés en dessous, arrondis à leurs bords, point anguleux. Les feuilles caulinaires sont alternes, distantes, plus petites, peu nombreuses; les supérieures presque sessiles; les dernières amplexicaules.

Les fleurs forment de belles & grandes panicules touffues, serrées, axillaires & terminales, d'un blanc-jaunâtre, dont les pédoncules partiels sont courts, capillaires, très-serrés. Il leur succède des semences brunes, grosses, triangulaires, garnies à chaque angle d'une aile membraneuse.

Cette plante croît naturellement dans la Thrace, sur le mont Rhodope, le long du Bosphore, & dans plusieurs endroits de la Scythie. On la cultive dans les jardins de l'Europe. (V. r.)

Ses racines sont un peu âpres, astringentes, gluantes, visqueuses, moins odorantes & moins amères que celles de la vraie rhubarbe, à laquelle

on

on la substitue quelquefois, mais elle est bien moins efficace. Elle pure modérément : on la préfère même à la vraie rhubarbe, comme plus astringente, dans les cours de v-n're fereux. Dans quelques contrées les pétioles se mangent crus comme les cardes, & ses feuilles peuvent s'apprêter comme les épinards.

### 2. RHUBARBE ondulée. *Rheum undulatum*. Linn.

*Rheum foliis subvillosis, undulatis, sinu bascos dilatato; petiolis supra planis, margine acutis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 41.

*Rheum (rhabarbarum), foliis subvillosis, petiolis aequalibus.* Linn. Syst. veget. pag. 385. — Pallas, Iter 1. pag. 359. — Regn. Botan. Icon.

*Rheum (undulatum), foliis subvillosis, undulatis; petiolis aequalibus.* Linn. Spec. Plant. 531. — Amoen. Academ. vol. 3. pag. 112. tab. 4. — Miller, Dict. n°. 2. — Kniph. Cent. 2. n°. 68.

*Rheum foliis subvillosis.* Hort. Upf. 98.

*Rhabarbarum folio crispo, oblongo, undulato; fl. albis purp.* Geoffr. Mater. medic. vol. 2. pag. 125.

*Rhabarbarum sinense, folio crispo; fl. gelbis varioribus & minoribus.* Amman. Herb. 126.

*Rhabarbarum folio longiori, hirsuto, crispo; florum thyphi longiori & tenuiori.* Amm. Ruth. 9.

*Aceosa montana; folio cubitali, oblongiore, crispo; floribus subviridibus luteolis, Messerschmidii.* Amm. Ruth. 126.

Vulgairement rhubarbe de Moscovie.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente ; cependant on l'en distingue aisément par son port. Ses feuilles sont fortement ondulées, & les panicules plus étroites, plus lâches.

Ses racines sont grosses, arrondies, très-épaisses, divisées en plusieurs portions qui s'enfoncent très-profondément dans la terre, d'un jaune foncé intérieurement, d'une couleur brune à l'extérieur ; elles produisent des tiges fortes, hautes de trois à quatre pieds, anguleuses, striées, d'un brun pâle ou un peu jaunâtres, très-glabres, garnies à leur partie inférieure de très-grandes feuilles nombreuses, pétioles, la plupart étendues au loin sur la terre, ovales, presqu'épaves à leurs deux faces, très entières, ondulées & presque crépues à leurs bords, échançurées en cœur à leur base, où elles sont également élargies & arrondies, obtuses à leur sommet, longues de deux à trois pieds, traversées par des nervures fortes, rameuses, & de veinules légèrement velues en dessous. Les pétioles sont longs, comprimés, charnus, épaveux à demi cylindriques & médiocrement

Botanique. Tome VI.

brisés en dehors, planes en dedans, aigus par leurs côtés. Les feuilles caulinaires sont très-écasées, plus petites, presque sessiles, surtout les supérieures.

Les fleurs forment des panicules étroites, serrées, distantes, droites, courtes, point diffusées, situées à l'extrémité des tiges & dans l'aisselle des feuilles supérieures. Ces fleurs sont petites, d'un blanc-jaunâtre, pédiculées. Il leur succède des semences triangulaires, noires, munies sur chaque angle d'une aile membracée, assez grande, arrondie, entière.

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie, dans les environs de Moscou & dans plusieurs contrées de la Russie. Il est douteux qu'elle se trouve dans la Chine. On la cultive dans plusieurs jardins de l'Europe. (V. v.)

On a cru long-tems que cette espèce fournoit la rhubarbe en usage dans les boutiques. Il est aujourd'hui reconnu que la véritable racine de rhubarbe provient du *rheum palmatum*. Au reste, celle-ci a les mêmes propriétés, mais à un degré très-inférieur.

### 3. RHUBARBE palmée. *Rheum palmatum*. Linn.

*Rheum foliis palmatis, acuminatis, scabris, sessilibus, sinu bascos dilatato; petiolis supra obsolete salicatis, margine rotundatis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 41.

*Rheum foliis palmatis, acuminatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 531. — Idem, Fasc. 7. tab. 4. — Act. Angl. 1765. pag. 292. tab. 12. — Mart. medic. 109. — Medic. in Observ. Soc. recon. Int. 1771. pag. 324. — Miller, Dict. n°. 4. — Blackw. tab. 600. a, b. — Kniph. Cenur. 12. n°. 84. — Müller, Illustr. Icon.

*Rhubarbe.* Buon. Orient. 192. tab. 73.

Vulgairement rhubarbe de la Chine, rhubarbe officinale.

Cette espèce, intéressante par les usages habituels que l'on en fait en médecine, est aussi une des plus faciles à distinguer de ce genre par ses feuilles divisées en lobes, aigues & presque palmées.

Ses racines sont grosses, épaisses, d'un beau jaune, divisées en ramifications épaisses : il s'en élève des tiges d'une hauteur médiocre, cylindriques, un peu jaunâtres, glabres, striées, munies à leur base d'un grand nombre de feuilles pétioles, amples, divisées, jusque vers leur milieu ordinairement, en cinq ou sept segments lancéolés, aigus ; chaque segment partagé à son contour en d'autres plus courts, anguleux, acuminés. Ces feuilles sont un peu épaisses, vertes & rudes à leur face supérieure, un peu blanchâtres, pubes-

B b

centes & comme volonnées à leur face inférieure, traversées par de fortes nervures jaunâtres, supportées par de longs pétioles médiocrement filiformes, un peu aplatis à leur face supérieure, arrondis à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en panicules droites, nimbées, dont les ramifications sont presque simples, & en grappes redressées; chaque fleur soutenue par un pédoncule partiel très-fin. Ces fleurs sont d'un blanc-jaunâtre, assez petites; elles produisent des semences d'un brun-olivâtre, triangulaires, garnies sur chaque angle d'une aile membraneuse, striée, un peu échancrée au sommet: ces membranes prennent souvent une teinte rougeâtre assez vive & très-agréable.

Cette plante croît naturellement dans la Chine, le long de la grande muraille. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & ailleurs. (V. v.)

Cette espèce a été reconnue pour être celle dont les racines font si utilement employées en médecine. Ces racines ont une saveur amère & une odeur particulière un peu aromatique; elles purgent doucement, détruisent les foyers vermineux, fortifient les premières voies, corrigent les crudités acides, facilitent les digestions, suppléent à l'inertie de la bile, provoquent doucement les urines, & rétablissent les principales fonctions des viscères.

On administre ce médicament avec succès dans toutes les circonstances où il est nécessaire d'employer des purgatifs doux & fortifiants, pourvu que l'on n'ait point à craindre l'inflammation. Elle convient surtout aux hypochondriaques qui ont le ventre paresseux, dans les vices de digestions, la diarrhée, &c. On la prescrit en poudre ou en infusion, seule ou mêlée avec d'autres purgatifs. Sa dose est, en substance, depuis quelques grains jusqu'à un demi-gros, & en infusion depuis deux scrupules jusqu'à un gros & demi. Elle entre dans les pilules qui portent son nom, & dans un grand nombre de compositions pharmaceutiques. Ses principes actifs consistent en une substance volatile, qui paroît être d'une nature acide & huileuse, laquelle réside principalement dans un principe salin-gommeux très-abondant, & qui se dissipe en grande partie par une forte décoction. On prétend que ces racines contiennent du santon & de la silénite, un sulfate calcaire très-sensible dans les vieilles racines.

Michel Boyn dit, dans son livre intitulé *Flora sinensis*, que la rhubarbe naît dans toute la Chine, & qu'on la nomme *tay-huam*; ce qui signifie *iris-jaune*. Elle croît cependant plus abondamment dans les provinces de Su-Cive, Xei-Sy & Socieu, proche de la grande muraille des Chinois. La terre dans laquelle elle végète, est rouge & limoneuse. Dès que les Chinois ont tiré cette racine de la

terre, ils la nettoient, la raclent, & la coupant en morceaux qu'ils mettent d'abord sur des longues tables, & qu'ils racourcissent trois ou quatre fois le jour, l'expérience leur ayant appris que s'ils les faisoient secher en les suspendant à l'air libre, ces morceaux deviendroient trop légers, & que la rhubarbe perdrait de la vertu. Au bout de quatre jours, quand les morceaux ont déjà pris une forte de consistance, on les perce de part en part & on les enfie, ensuite on les expose au vent & à l'ombre. L'hiver est le meilleur temps pour tirer la rhubarbe de la terre, avant que les feuilles vertes commencent à pousser. Si on l'arrachoit pendant l'été ou lorsqu'elle pousse des feuilles vertes, non-seulement elle ne seroit pas mûre & n'auroit point de suc: jaune ni de veines rouges, mais elle seroit encore percussée & très-lépreuse, & par conséquent inférieure à celle qu'on retire pendant l'hiver. On prétend que la meilleure rhubarbe pour l'usage est celle qui a été gardée dix ans.

On apportoit autrefois la rhubarbe de la Chine par la Tartarie, à Ormuz & à Alep, de là à Alexandrie, & enfin à Vienne: c'étoit celle que l'on appeloit *rhubarbe du Levant*. Les Portugais l'apportoient sur leurs vaisseaux de Canton, port où se tient un marché de la Chine. Les Egyptiens l'apportoient à Alexandrie; on nous l'apporte aujourd'hui des Indes orientales. Les vaisseaux de la compagnie des Indes s'en chargent à Canton & à Ormuz.

Depuis un certain nombre d'années on a essayé avec assez de succès de la cultiver en grand en France: on peut la récolter tous les quatre ans. Ses feuilles jeunes ont une saveur assez agréable: on peut les manger cuites, préparées comme les épinards. Cette culture intéressante mérite d'être fortement encouragée; elle fourniroit un aliment nouveau & un médicament précieux, dont l'usage est si général.

#### 4. RHUBARBE compacte. *Rheum compactum*.

*Rheum foliis sublobatis, obtusissimis, lucidis, angulatis denticulatis, glaberrimis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 531.

*Rheum (compactum), foliis cordatis, glabris, marginibus sinuatis; spicis divisis, mutatis.* Mill. Dict. n°. 3. tab. 218.

Cette espèce a de grands rapports avec le *rheum tartaricum*; elle en diffère cependant d'une manière très-sensible par ses tiges très-élevées, par la disposition de ses fleurs & par ses feuilles onduleuses à leur contour.

Ses racines sont très-grosses, épaisses, divisées en plusieurs ramifications qui s'enfoncent très-profondément en terre, d'une belle couleur jaune à leur intérieur; elles produisent des tiges hautes de quatre à six pieds, d'un vert-pâle, glabres, can-

néces, médiocrement ramennées à leur partie supérieure, garnies de feuilles pétiolées, amples, ovales, coriaces, compactes, très-glabres à leurs deux faces, & même luisantes à leur face supérieure; & largies & échancrées en cœur à leur base, sinuées ou divisées à leurs bords en lobes arrondis, peu profonds, & dont le contour est cartilagineux, muni de petites dents aiguës & crenelées. Les nervures, ainsi que les veines, sont très-fortes, d'un vert-foncé; les pétioles un peu jaunâtres, lisses, à p. fine striés, planes à leur face supérieure; les feuilles caulinaires sont plus petites & scissées, de même forme que les inférieures.

Les fleurs, d'un blanc-jaunâtre, sont disposées en panicules, dont les ramifications forment presque autant d'épis ou de grappes particulières, étroites, penchées. Ces fleurs sont petites; leur calice est divisé en six découpures égales, obtuses. Les semences sont fortes, d'un brun-noirâtre, triangulaires, garnies à chacun de leurs angles d'une aile membraneuse.

Cette plante croît à la Chine & dans la Tartarie. On la cultive dans plusieurs jardins de l'Europe. ♀

On attribue à ses racines presque les mêmes vertus qu'à la rhubarbe officinale; cependant elles ne sont pas tout-à-fait aussi efficaces.

5. RHUBARBE de Tartarie. *Rheum tartaricum*. Linn. f.

*Rheum foliis cordato-ovatis, integris, planis, glaberrimis; petiolis semiteretibus, angularis; panicula fasciculata*. Linn. f. Suppl. pag. 219. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 490. n° 5.

Cette espèce, qui paroît très-voisine du *rheum compaustum*, & dont elle n'est peut-être qu'une variété, en diffère par ses tiges très-basses & par les feuilles entières & non sinuées à leurs bords.

Ses feuilles sont pétiolées, planes, très-glabres, fort amples; les radicales étendues sur la terre, ovales, en cœur, très-entières à leurs bords, marquées de nervures dilatées, supportées par des pétioles rougeâtres, à demi cylindriques, sillonnées, anguleux. Les fleurs naissent en panicules sur des tiges à peine plus longues que les feuilles; les pédoncules communs sont profondément cannelés.

Cette plante croît dans la petite Tartarie. ♀ (*Descript. ex Linn. f.*)

6. RHUBARBE pulpeuse. *Rheum sibiricum*. Linn.

*Rheum foliis obtusissimis, subvernuculosis; venis subtilis spinulosis; petiolis supra planis, margine rotundatis*. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 42.

*Rheum (sibiricum), foliis granatis, petiolis aqua-*

*l'us*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 372. — Gronov. Orient. 150. — Mill. Dict. n° 5.

*Lapathum orientale, asperum & verrucosum folio, siliis Arabibus aëlium*. Dill. Elish. pag. 191. tab. 158. fig. 192.

*Lapathum orientale, tomentosum, rotundifolium, ribes arabum aëlium*. Breyer. E. N. G. Ceutur. 7. pag. 7.

*Lapathum orientale, asperum; folio subrotundo; fructu magno, purpureo*. Pechcock. Orient. 189. tab. 84.

*Ribes arabum*. Rauwolf. Iter. 266. 282.

*Ribes arabum, foliis petasitidis*. C. Bauh. Pin. 455.

Cette espèce est particulièrement remarquable par ses racines, qui sont revêtues d'une pulpe succulente & rougeâtre.

Ses racines sont épaissies, charnues, & s'enfoncent profondément en terre; il s'en élève des tiges fortes, striées, à peine rameuses, garnies inférieurement de larges feuilles médiocrement pétiolées, couchées sur la terre, ordinairement plus larges que longues, ayant près de deux pieds de diamètre & un de longueur; leur surface est rude, presque verruqueuse, comme bouillonnée; les bords ondules & frisés; les nervures & les veines médiocrement velues à leur face inférieure par des poils courts, roides, un peu épineux; les pétioles sont planes à leur face supérieure, frisés, arrondis à leurs bords. Les fleurs sont paniculées, & produisent des semences plus grosses que dans les autres espèces, couvertes d'une chair succulente, d'un rouge foncé & d'une saveur très-altringente; ce qui leur donne l'apparence de baies; elles sont néanmoins triangulaires, & munies à leurs angles d'une aile membraneuse.

Cette plante croît naturellement sur le Mont-Liban, sur le Carmel & dans la Perse. ♀

7. RHUBARBE hybride. *Rheum hybridum*.

*Rheum foliis supra glabris, subtus pilosissimis, sublobatis, acutis, sinu bifido angustato; petiolis supra obsoletè falcatis, margine rotundatis*. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 490. n° 7.

*Rheum foliis cordatis, acuminatis, planis; radicalibus utrinque bi vel tridentatis, reliquis repandis*. Murray. Comment. Gœtt. 1779. pag. 7. tab. 1. — Comment. Gœtt. 1774. pag. 50. tab. 12.

Ses tiges sont garnies de feuilles planes, acuminées, pétiolées, glabres à leur face supérieure, un peu pileuses à leur face inférieure, rétrécies & échancrées en cœur à leur base, presque lobées à leur contour; les radicales sont munies à chaque côté de leurs bords de deux ou trois dents; les pétioles sont à demi cylindriques en dehors, un



peu plines, & marqués de quelques sillons obtus à leur face supérieure; les fleurs sont disposées en panicule.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Asie.  $\pi$

8. RHUBARBE à racines blanches. *Rheum leucorrhizum*. Pall.

*Rheum foliis transversis ovalibus, depressis; panicula semisifera, divaricata; calicis foliolis binis, multoties majoribus*. Pallas, Nov. Act. Petrop. 1792. pag. 381.

Cette espèce est parfaitement distinguée de ses congénères par plusieurs caractères qui lui sont particuliers; elle est fort petite, & ses tiges n'ont pas plus de six à sept pouces de haut; elles sont filées, & ordinairement garnies seulement de trois feuilles radicales, plus larges que longues, en ovale sur leur largeur, un peu arrondies, ayant quatre ou cinq pouces de diamètre, comprimées à leurs deux extrémités, glabres, coriaces, marquées de trois nervures principales & d'un grand nombre de veinules un peu allongées à leur base, marquées à leurs bords de très-petites dents serrées, aiguës, fortes, cartilagineuses, supportées par des pétioles fermes, lisses, succulents, comprimés.

Les fleurs sont disposées en panicule; leur pédoncule commun est cannelé; le calice a deux de ses divisions plusieurs fois plus longues que les autres.

Cette plante croît en Sibérie, dans les lieux montueux & déserts.  $\pi$  ( *Descript. ex Pall.* )

RIANE. *Riana*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des *vinetiers*, qui a des rapports avec les *poraguba* d'Aublet, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, stipulacées, & dont les fleurs sont disposées en épis terminaux & rameux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice partagé en cinq découpures; dix pétales, les extérieurs plus grands, connivens à leur base, alternes avec les intérieurs; cinq étamines; un style en masse; un stigmate obtus.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, partagé en cinq découpures ovales, aiguës.

2°. Une corolle composée de dix pétales ovales, aigus, dont cinq extérieurs plus grands, connivens à leur base; cinq intérieurs plus petits, alternant avec les extérieurs.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, insérés à la base des pétales intérieurs, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, velu, à cinq côtés, surmonté d'un style charnu, en masse, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit, d'après Jussieu, consiste en une capsule oblongue, à une seule loge, à trois valves comprimées, renfermant trois semences.

#### E S P È C E.

RIANE de la Guinée. *Riana guianensis*.

*Riana foliis oppositis, dentato-serratis; spicis terminalibus, subsimplicibus*. (N.)

*Riana guianensis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 237. tab. 94. — Jussieu, Plant. Gen. pag. 287. — Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 106. n°. 234. tab. 135. fig. 1.

C'est, dit Aublet, un arbrisseau qui s'élève à huit ou dix pieds, dont le tronc a trois ou quatre pouces de diamètre, & pousse des branches de sa base. Ces branches sont droites, rameuses, garnies de feuilles opposées, croisées, pétioles, fermes, lisses, ovales, vertes & glabres à leurs deux faces, longues de six à sept pouces, larges de deux, dentées en scie à leurs bords, terminées par une longue pointe, supportées par un pédoncule court, convexe en dessous, canaliculé en dessus, muni à sa base d'une stipule petite, ovale, aiguë, caduque.

Les fleurs sont disposées en épis à l'extrémité des branches & des rameaux, composées de fleurs alternes, pédiculées, dont le calice est divisé en cinq découpures aiguës. La corolle est blanche, ses pétales extérieurs allongés, terminés en pointe, rapprochés par leur partie inférieure en forme de grelot. Les étamines sont insérées sur les cinq pétales intérieurs. Leur filament est très-court; leurs anthères jaunes, à deux loges. L'ovaire est velu, à cinq côtés, surmonté d'un style charnu & d'un stigmate obtus & renflé. M. Jussieu a observé que les fruits étoient une capsule multiloculaire, à trois valves, renfermant chacune une semence.

Cette plante croît à la Guinée, dans les forêts d'Avoura.  $\eta$

RIBOLIER des Indes. *Embellia indica*.

*Embellia foliis alternis, ovato-sublancoatis, integris; floribus racemosis*. (N.)

*Embellia indica*. Burm. Flor. Ind. pag. 62. tab. 28. — Jussieu, Gener. Plant. pag. 427. — Lam. Illustr. Gener. tab. 133.

*Ribesoides*. Linn. Flor. zeyl. pl. obsc. pag. 190. n°. 433.

*Antidesma ghasambilla* ? Gaertn. de Frukt. & Sem. vol. 1. pag. 189. tab. 39. fig. 5.

*Grossularia zeylanica*, major, *ghasambilla* zeylanensis, Burm. Zeyl. 112.

*Ghasambilla*. Herm. Zeyl. 36.

*Embilla*. Herm. Zeyl. 11.

*Grossularia haccis oblis* ; *pediculis floriferis in summo ramo*, & *ex olis foliorum cæcutious*. t Rai, vol. 3. Dendr. pag. 27.

Arbre des Indes, sur lequel nous n'avons encore que des détails incomplets, relativement à sa fructification. Ses rameaux sont glabres, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, ovales, presque lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses ou un peu pointues à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole court.

Les fleurs sont disposées en grappes tant terminales que latérales, ces dernières sortant de l'aisselle des feuilles. Ces grappes sont composées de rameaux alternes, courts, garnis de fleurs pédicellées, dont le calice est petit, à cinq divisions. La corolle est composée de cinq pétales petits, ovales, obtus ; elle renferme cinq étamines & un pistil. Le fruit paraît être une petite baie assez semblable à celle des grossuliers. L'*Antidesma ghasambilla* de Gaertner est très-probablement la même plante que celle-ci.

Cet arbre croît à l'île de Ceilan. Jy (*V. f. in herb. Lamarck.*)

**RICCIE.** *Riccia*. Genre de plantes cryptogames, de la famille des *hépatiques*, qui a des rapports avec les *blasia*, & qui comprend des herb. tant exotiques qu'indigènes de l'Europe. Ce sont des expansions membraneuses, sans tiges, & sur la superficie desquelles la fructification est éparse.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

La fructification monoïque, quelquefois dioïque.

Les parties mâles consistent dans un cône sessile, saillant, tronqué à son sommet par lequel il s'ouvre, & laisse app. recevoir une masse de très-petits corps granuleux.

Les parties femelles sont constituées par une capsule à demi plongée dans la substance même des feuilles, à leur superficie. Cette capsule a une forme sphérique, traversée par un style filiforme, qui la fait paraître acuminée à son sommet ; elle renferme plusieurs semences hémisphériques, extrêmement petites, un peu pédicellées.

Les expansions sont planes, étendues, presque en rosette, divisées en lobes. Les fleurs femelles sont ordinairement placées vers le centre de la

superficie des feuilles, & les fleurs mâles rejetées vers les bords, ou placées dans les échancrures des lobes.

E S P È C E S.

1. *RICCIE cristalline.* *Riccia cristallina*. Linn.

*Riccia frondibus superficie papillofis*. Linn. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 163. n°. 1. — Scop. Flor. carn. pag. 116. n°. 1. — Necker, Gallob. 497. — Ad. Palat. 2. tab. 2. fig. 9. — Scholl. Barb. n°. 1015. — Pall. Iter, vol. 1. pag. 372. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 74. n°. 1272. L. — Weiss. Cryptog. pag. 328. — Roth. Flor. germ. 489. n°. 1.

*Riccia foliis aspergine cristallina perfusa, margine incrassatis*. Flor. succ. 935. 1055. — Linc. & L. 134.

*Riccia fronde reticulatâ, æquali ; lobis denticulatis, obtusis, simplicibus & cordatis*. Haller, H. L. V. 1896.

*Riccia fronde superficie papillofâ, primordialibus fecermentosis*. Necker, Method. 41.

*Riccia minima & minor, pinguis ; aspergine cristallina perfusa*. Michel, Gen. 107. tab. 57. fig. 7. 8. 3.

*Riccia* (pellucida), *fronde simplici, membranacea, tenerâ, lobatâ ; lobis obtusis, orbiculatis*. Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 96. n°. 2.

*Hepatico polystria, lobis inflatis*. Vailant, Paris. pag. 98. tab. 19. fig. 2.

*Lichen folustria, rufa folio*. Celf. Upf. 28. — Dillen, Musc. 335. tab. 78. fig. 12.

*Riccia frondibus lobatis, obtusis, emarginatis, cavernoso-punctatis*. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 430. n°. 3.

*Riccia* (cavernosa), *frondibus imbricatis, cavernoso-punctatis, obtusis*. Hoffm. Flor. deut. 2. pag. 95. n°. 4.

A. Eodem, *lobis latioribus, subpapillofis, margine crispato-nigris*. (N.)

Cette plante s'étend sur la terre, où elle forme des expansions presque orbiculaires ou en rosette, fixées en terre par quelques petites racines tomentueuses ; elles se divisent en plusieurs lobes profonds, longs de trois à quatre lignes, larges d'environ une ligne, rétrécies vers leur base, élargies à leur sommet, qui est souvent échancré en cœur. Leur substance est un peu pulpeuse, verte ; leur superficie parsemée de petits points ou tubercules blanchâtres, inégaux. Le centre est occupé par quelques petits points granuleux, arrondis, que l'on regarde comme les fleurs femelles, tandis que les fleurs mâles sont plus rapprochées des bords.

La plante A m'a été communiquée par M. Boë,

qui l'a recueillie dans la Caroline; elle approche beaucoup du *riccia cristallina*, dont peut-être elle n'est qu'une variété. Sa superficie est moins papilleuse, les lobes plus élargis, & les bords crépus & noirs.

Cette plante croît sur la terre, dans les lieux humides, au commencement du printemps. (V. v.)

#### 2. RICCIA glauque. *Riccia glauca*. Linn.

*Riccia frondibus globosis, canaliculatis, bilobis, obtusis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1605. — Leers, Herborn. pag. 255. n°. 919. — Pollich, Pal. n°. 1079. — Neck. Gallob. pag. 498. — Web. Sicil. 172. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 74. n°. 1272. II. — Flor. dan. tab. 898. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 877. fig. 4.

*Plant. fronde sulco divisi; lobis bifurcatis; lobulis lanceolatis, obtusis*. Haller, Helv. 1897.

*Riccia fronde bilobata, obtusa, superne falcata*. Necker, Method. pag. 41.

*Riccia minima, pinguis; foliis latiusculis, amplè sulcatis; & glauco virgescens*. Michel, Gen. 107. tab. 57. fig. 4.

*Hepatica palustris, bifurcata; lobis brevioribus, carinatis*. Vaill. Paris. pag. 98. tab. 19. fig. 1.

*Lichen minimus, foliis vixis, bifariam vel trifariam se dividendo progredientibus*. B. Dill. Musc. 554. tab. 78. fig. 10.

*Lichen terrestris minor, foliis raris*. Buxb. Centur. 2. pag. 10. tab. 5. fig. 5.

*Riccia ciliata*. Var.  $\phi$ . Weder. Flor. dan. l. c.

*Riccia (ciliaris), frondibus bipartitis, dichotomis, apice bifidis, concavis, lanceolatis, obtusiusculis; reticulatis submarginalibus, ciliatis*. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 432. n°. 6.

*Riccia (ciliata), frondibus bipartitis, dichotomis, margine ciliatis*. Hoffm. Deutfl. Flor. 2. p. 95. n°. 2.

*Riccia minima, glauca; segmentis angustioribus, odore gineprosus*. Michel, Gen. Plant. 107. tab. 57. fig. 5. Medicor. & matris major.

Ses expansions sont disposées en une petite rosette, étendus sur la terre; elles sont un peu épaisses, d'une couleur glauque verdâtre, divisées presque jusqu'à leur base en segments élargis, quelquefois à plusieurs lobes latéraux, portages constamment à leur sommet en deux lobes arrondis, obtus, lisses, point chargés de points, traversés par un sillon longitudinal, & presque canaliculé à leur face supérieure. Dans la plante  $\beta$ , les bords des lobes sont légèrement ciliés, plus étroits, pointus, réticulés.

On rencontre cette plante sur les terrains humides. (V. v.)

#### 3. RICCIA petite. *Riccia minima*. Linn.

*Riccia frondibus gl. bris, bipartitis, ovatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1605. — Flor. succ. 934. 1054. — Leers, Herborn. pag. 254. n°. 918. — Derr. Nass. pag. 309. — Necker, Althod. p. 45. — Web. Sicil. pag. 170. — Lam. Illustr. Gener. tab. 877. fig. 2.

*Riccia minimo, nitida; segmentis angustioribus, acutis*. Mich. Gener. 107. tab. 57. fig. 6.

*Lichen omnium minimus; foliis fissis, super terram expansis*. Dill. Musc. pag. 554. tab. 78. fig. 11.

*Riccia (minima), frondibus linearibus, subtripartitis, dichotomis, canaliculatis, acutis*. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 237. n°. 4.

*Riccia frondibus bi tripartitis, dichotomis, linearibus, canaliculatis, acutis*. Hoffm. Deutfl. Flor. 2. pag. 94. n°. 1.

*Riccia (minoriformis), frondibus multipartitis, dichotomis, acutis, reticulato-cavernosis*. Hoffm. Deutfl. Flor. 2. pag. 95. n°. 3.

Cette espèce diffère du *riccia cristallina* par l'absence des tubercules, & du *riccia glauca* par le défaut de sillon à la face supérieure des expansions; elle est d'ailleurs beaucoup plus petite que les deux que nous venons de citer.

Ses expansions sont planes, luisantes, d'un vert-pâle, portées en segments rétrécis à leur base, divisés vers leur milieu en deux ou quatre lobes très-glâtres, aigus. A l'époque de la maturité leur superficie se creuse, & laisse apercevoir de petites capités lineaires d'un brun-noirâtre.

Cette espèce croît dans les terrains inondés de l'Europe. (V. f.)

Le *riccia minoriformis* paroît être la même plante que la précédente, peut-être plus avancée en âge, & alors plus réticulée & à divisions plus nombreuses.

#### 4. RICCIA flottante. *Riccia fluitans*. Linn.

*Riccia frondibus dichotomis, lineari-filiformibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1605. — Iter Scand. 241. — Flor. succ. edit. 2. n°. 1056. — Reyg. Ged. 2. pag. 167. — Necker, Gallob. 498. — Act. Palat. 2. tab. 2. fig. 8. — Weder. Flor. dan. tab. 275. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 74. n°. 1272. III.

*Riccia frondibus repetito-dichotomis, linearibus, convexo-planis, levibus, sessilato-reticulatis, apice obtusis, bipais*. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 434. n°. 8.

*Riccia fronde dichotoma, linearis-ramosa, planis; primorialis obtusis*. Necker, Method. pag. 41.

*Riccia (fluitans), frondibus planis, dichotomis, multifidis, divaricatis, furcatis, apice obtuse, retu-*

*euloto - venosus*. Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 96. n°. 8.

*Lichenastrum aquaticum, fluviatilis, tenuifolium, furcatum*. Dil. Musc. 514. tab. 74. fig. 47.

*Fucus fontanus, pinguis, cordiculatus, viridis*. ? Vaillant, Paris. tab. 10. fig. 3.

*Hepatica palustris, dichotoma, segmentis oblongis, angustis*. Vaillant, Paris. pag. 98. tab. 19. fig. 3.

1. *Riccia (canaliculata), frondibus canaliculatis, linearimultiplicatis, dichotomis, apicatis*. Hoffm. Deut. Flor. pag. 96. n°. 9.

Cette espèce a quelquefois l'aspect d'un *conserva* ; elle est remarquable par ses divisions dichotomes, prolo gées, larges d'environ une ligne, partagées en plusieurs autres ramifications tombantes, irrégulières, la plupart touchées, obtusés à leur sommet, glabres, d'un beau vert à leurs deux faces, munies en dessous d'un assez grand nombre de petites racines extrêmement fines. Dans la plante les expansions sont plus petites, canaliculées, rampantes, moins transparentes, veinées, reticulées.

On trouve cette plante dans les mares & les fosses aquatiques. (V. v.)

*Observations*. Vaillant a observé que cette plante se trouve appliquée sur les pierres autour des mares, où elle s'attache fortement par de petites chevelus blanches ; que lorsque le terrain étoit inondé, elle s'en détachoit fort souvent, & qu'alors on la voyoit flotter sur l'eau, où ses segments étoient une fois plus larges que lorsqu'on la trouve à terre. Il nous a paru que les deux figures que nous avons citées da même auteur, pouvoient appartenir à la même plante ; mais celle de la planche 19, fig. 3, y convient mieux, quoique Linné ait cité la première exclusivement.

5. *Riccia nageante. Riccia natans*. Linn.

*Riccia frondibus obcordatis, ciliatis*. Linn. Manr. & Syst. Plant. vol. 4. pag. 521. n°. 5. — Sholl. Flor. barb. n°. 893. — Weber, Spicil. rar. 174. — N.cker, Meth. Musc. pag. 43. — Pollich, Pal. in Append. pag. 319.

*Riccia (natans), fronde obcordata, planâ, subita longis, compressis radicalibus rectis*. Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 96. n°. 10. — Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 435. n°. 9.

*Lichen parvus, vernus, cordiformis, imâ parte semibrutus, lentis palustris mudâ aquis innatus*. Dillen. Musc. 536. tab. 78. fig. 18. — Rai, Angl. 116.

*Lens palustris raris foliis, foliis cordatis*. P. v. Musc. 652.

*Riccia (capillata), fluviatilis, frondibus dichoto-*

*mis, cordatis, radicalibus serratis*. Schmid. Icon. & Anal. tab. 74.

C'est une fort petite espèce flottante, à la surface des eaux, & qui présente quelquefois l'aspect d'une lentille d'eau ; elle se divise en petites expansions presque en cœur, véritables, garnies à leurs bords, vers leur base, de très-petites racines fort courtes, qui ressemblent à des cils & rendent cette partie comme frangée.

Cette plante croît particulièrement à la surface des étangs, en Europe.

6. *Riccia tuberculée. Riccia tuberculata*.

*Riccia frondibus glabris, segmentis basi cuneiformibus, apice bilobis, superius tuberculatis*. (N.)

On distingue cette espèce à de petits tubercules arrondis, un peu comprimés, qui garnissent une partie de la superficie. Elle est petite, étalée en rosette sur la terre, divisée en segments courts, cuneiformes à leur base, élargis à leur sommet, ordinairement échancré en deux lobes obtus, arrondis.

Cette plante croît aux environs de Paris, dans les terrains humides. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

7. *Riccia fruticulente. Riccia fruticulosa*.

*Riccia frondibus compressis, ramosis, ramis erectis, furcatis, subulatis*. Wedd. Flor. dan. tab. 698. fig. 3.

Cette espèce se reconnoît en ce que ses ramifications, au lieu d'être étendues sur la terre, sont toutes relevées, & forment une sorte de petit gazon très-court, verdâtre, dont les expansions, la plupart élargies à leur base, se ramifient irrégulièrement, & sont souvent dichotomes & subulées à leur partie supérieure, glabres, comprimées.

Cette plante croît sur les débris de sapins pourris & humides, dans les forêts de la Norvège.

8. *Riccia pyramidale. Riccia pyramidata*.

*Riccia frondibus indivisis, oblongis, apice inflexo triangulariter incrassatis; caulis pyramidalis*. Willd. Botan. magif. 4. pag. 9.

*Riccia media obscurè virens, foliis altius falcatis, in superficie veluti punctatis; fructu pyramidata, glabro*. Mich. Nov. Gen. pag. 106. n°. 2. tab. 57. fig. 2. — Dillen. Musc. pag. 535. tab. 78. fig. 16.

*Riccia (pyramidata), frondibus oblongis, indivisis, apice subius triangulariter incrassatis; fructibus pyramidalis*. Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 429. n°. 2.

Cette plante forme une rosette dont les expansions, étendues sur la terre, sont entières, & se divisent vers leur sommet en dis coupures simples,

aff. z régulières, entières, ovales ou lancéolées, relevées vers leur sommet en une bosse épaisse, charnue, triangulaire, & dont les capsules sont droites, glabres, pyramidales, aiguës. La face inférieure des expansions est munie de petites racines très-courtes, de couleur brune.

Cette plante croît sur les terrains humides.

9. **RICCIE** en toile d'araignée. *Riccia arachnoidea*.

*Riccia frondibus capillareis, implexis.* M. l. c. Flor. dan. tab. 898. fig. 2.

Cette espèce, entièrement couchée sur la terre dans les terrains v. f. & où l'eau a long-temps séjourné, s'y développe en petites plaques arrondies, irrégulières, lobées, uniquement composées de ramifications capillaires, approchantes de celles des bryes, entre-mêlées sans ordre, assez semblables à des toiles d'araignées, glabres, verdâtres.

Cette plante croît dans l'Europe septentrionale, dans les marais d'eau douce.

10. **RICCIE** réticulée. *Riccia reticulata*.

*Riccia fronde diffinim, laciniosa, glabra, reticulata.* Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1335. n°. 5. — Lam. Illustr. Gen. tab. 877. fig. 1.

*Riccia major, coriandri sapore, foliorum superficie veluti tessellata; fructu jurando, aspro.* Mich. Nov. G. n. pag. 106. n°. 1. tab. 57. fig. 1. — Dill. Musc. pag. 535. tab. 78. fig. 115.

*Riccia (major), frondibus lobatis, obcordatis, obtusis, planis, fissuris.* Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 429. n°. 1.

Cette plante a presque l'aspect d'un lichen. Ses expansions sont amples, larges, divisées en lobes très-irréguliers, assez généralement rétrécis en coin à leur base, élargis considérablement vers leur sommet, une & souvent deux bilobés, ébous, entiers ou échancrés au sommet de leurs divisions, glabres, réticulés à leur superficie, d'une saveur approchant de celle de la coriandre, à capsules très-petites, arrondies.

Cette plante croît sur les terrains humides.

11. **RICCIE** veinée. *Riccia venosa*.

*Riccia frondibus dichotomis, planis, levibus, venoso-reticulatis, apice ut articulis reticulis, divaricatis.* Roth. Tentam. Flor. germ. pag. 433. n°. 7.

*Riccia (glauca), frondibus planis, divaricatis, bipartitis, dichotomis, obtusis.* Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 97. n°. 6. — Hedw. Theor. Gen. edit. 1. tab. 29. — Idem, 2. pag. 197. tab. 31.

Cette espèce diffère du *riccia major* par ses expansions plus larges, plus épaisses, point trans-

parentes, rétrécies à leur base; par ses veines & par ses divisions terminales en deux lobes.

Ses expansions sont confuses, sans ordre, souvent imbriquées, d'un vert glauque assez agréable, fortement appliquées contre la terre par de petites racines, assez semblables au *jungermannia furcata*, sans nervure longitudinale dans leur milieu, rétrécies à leur base, planes, très-fines, marquées de veines verdâtres très-fines, réticulées, plus apparentes dans l'état de fécite; les divisions des feuilles plusieurs fois dichotomes, terminées par deux lobes écartés, obtus ou tronqués.

Cette plante croît en Allemagne, sur les terres nouvellement remuées, dans les lieux humides & à l'ombre. (*Descript. ex Roth.*)

**RICCIN.** *Ricinus*. Genre de plantes dicoryllédonnes, à fl.urs incomplètes, monoïques, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les *jatropha*, qui comprend des arbres ou des herbes la plupart exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, stipulacées, souvent palmées, glanduleuses sur leur pétiole, & les fleurs disposées en un épi paniculé, les inférieures mâles, les supérieures femelles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques; dans les fleurs mâles un calice à cinq divisions; point de corolle; des filaments nombreux, rompus à leur base; dans les fleurs femelles un calice partagé en trois; un ovaire triloculaire; trois styles bifides; une capsule à trois coques, hérissée de pointes, à trois loges, contenant chacune une seule semence.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques; les fleurs mâles placées plus bas que les fleurs femelles.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq découpures ovales, concaves.

2°. Point de corolle.

3°. Un grand nombre d'étamines, dont les filaments sont filiformes, rameux, & divisés en plusieurs corps à leur partie inférieure, terminés par des anthers arrondies, à deux loges.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à trois découpures ovales, concaves, caduques.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire supérieur, ovale, couvert de pointes subulées, surmonté de trois styles écartés entr'eux, droits, hispides, terminés chacun par un stigmate binné.

Le

Le fruit est une capsule presque ronde, à trois coques réunies; marquée de trois sillons, armée de pointes, à trois loges, à trois valves, chaque loge contenant une semence solitaire, presque ovale, oblongue, luisante, convexe d'un côté, ombiliquée à son sommet.

## E S P È C E S.

1. RICIN COMMUN. *Ricinus communis*. Linn.

*Ricinus foliis peltatis, subpalmatis, serratis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1430. — Mat. medic. 208. — Ludw. Ed. tab. 7. — Gært. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 116. tab. 107. fig. 4. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 355. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 259. — Lam. Illustr. Gener. tab. 792. — Jacq. Plant. rar. Icon. Censur. 1. tab. 27.

*Ricinus foliis peltatis, serratis; petiolis glanduliferis*. Hort. Cliffort. 450. — Hort. Upl. 289. — Flor. zeylan. 339. — Philosoph. Botan. 256. — Gronov. Otient. 299.

*Ricinus vulgaris*. C. Bauh. Pin. 432. — Tournef. Inst. R. Herb. 532. tab. 307. — Schaw. Spec. n°. 511. — Miller, Dict. n°. 1. tab. 219. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 642. Icon. — Moris. Oxon. Hist. 3. §. 10. tab. 3. fig. 12.

*Ricinus*. Camer. Epitom. 959. Icon. — Dndon. Pempt. 367. Icon. — Tabern. Icon. 776. — Matth. Comment. 862. Icon. — Fusch. Hist. 340. Icon.

*Ricinus, cerva major*. Lobel. Icon. 688.

*Ricinus gallus, palma Christi*. Lobel. Observ. pag. 392. Icon.

*Ricinus Maitholi*. Dalech. Hist. 2. pag. 1630. Icon.

*Ricinus major & minor*. H. Heyfl. Œst. 8. tab. 11 & 12. fig. 1.

*Ricinus albus*. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 92. tab. 41.

*Catapucia major & minor*. Blackw. tab. 148.

*Avanacu*. Rheed, Malab. vol. 2. tab. 32.

Vulgairement le ricin. Regn. bot. Icon.

β. *Ricinus africanus, maximus; caule geniculato, ratilante*. Tournef. Inst. R. Herb. 542.

*Ricinus (africanus), foliis peltatis, serratis; lobis maximis; caule geniculato; capsulis echinatis*. Miller, Dict. n°. 5.

*Ricinus ruber*. Rumph. Amb. vol. 4. pag. 97.

γ. *Ricinus (inermis), foliis peltatis, subpalmatis, serratis; cauleque ciliatis*. Jacq. Plant. var. Icon. Centur. 1. tab. 28.

δ. *Ricinus (medicus), foliis palmatis, septembotanicis*. Tome V.

*lobis, lobis lanceolatis, infimis divaricatis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 164.

Cette plante, qui devient annuelle étant cultivée dans nos climats, quoiqu'elle soit dans son pays nata! un arbre assez fort, produit un très-bel effet par ses feuilles amples & palmées, & par ses tiges glauques, élevées, terminées par un long épi paniculé.

Ses racines sont fibreuses, & se divisent en ramifications peu nombreuses; il s'en élève une tige droite, haute de six à huit pieds, creusée, cylindrique, d'une couleur glauque, un peu purpurine, lisse, articulée, un peu striée, ramifiée, garnie de feuilles amples, palmées, alternes, pinnatolées, poirées, lisses à leurs deux faces, plus pâles en dessous, divisées à leur contour en sept ou neuf lobes lancéolés, inégaux, dentés en scie à leurs bords, aigus à leur sommet, supportées par des pétioles cylindriques, striés, glanduleux, de la longueur des feuilles, garnis à leur base d'une stipule glabre, membraneuse, concave, amplexicaule, aiguë, calquée.

Les fleurs occupent la partie supérieure des tiges & des rameaux, où elles sont disposées en un long épi rameux, composé de plusieurs petites panicules presque en ombelle, munies de bractées membraneuses, fort petites. Le calice est d'un vert glauque, petit. Les étamines ont des filaments divisés à leur base en plusieurs ramifications. Les fruits sont glauques, à trois coques réunies, garnies extérieurement de pointes subulées, molles; elles renferment des semences ombiliquées à leur sommet, & souvent marquées de taches inégales.

Cette plante, que j'ai rencontrée en Afrique, particulièrement dans les environs de Bonne, ne diffère de celle que nous cultivons que par ses tiges arborescentes, de la grosseur & de la grandeur de nos arbres fruitiers, particulièrement des pommiers. Ses fruits sont presque glabres ou bien moins garnis de pointes. C'est notre variété β. Je suis tout porté à croire que les autres espèces de ce genre, décrites dans le Dictionnaire des Jardiniers de Miller, ne sont que des variétés de la même plante, occasionnées, ou par la culture, ou par le changement de température. J'en dis autant de la variété γ, dont les fruits sont glabres, & de la plante δ, que l'on cultive en Egypte à cause de son emploi en médecine.

Cette plante croît naturellement dans les contrées méridionales de l'Europe, en Afrique & dans les deux Indes. (V. v.)

Ses semences fournissent une huile purgative, & qui est en même temps un excellent vermifuge.

2. RICIN MAPPA. *Ricinus mappa*. Linn.

*Ricinus foliis peltatis, indivisis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 194. n°. 3. — Burm. Flor. ind. 507.

C c

*Folium mappa*. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 172. tab. 108.

C'est une espèce bien distincte par ses feuilles entières & peltées.

Ses tiges s'élèvent sous la forme d'un arbrisseau médiocre ; elles sont cylindriques, droites, simples ou seulement rameuses à leur sommet, articulées, garnies de feuilles éparfes, amples, très-grandes, peltolées, glabres à leur face supérieure, lanugineuses en dessous, presque arrondies, terminées en une petite pointe à leur sommet, marquées de grosses nervures latérales. Les fleurs sont disposées en petites grappes latérales vers l'extrémité des tiges, & produisent des fruits globuleux, à trois coques presque glabres.

Cette plante croit dans les Indes, à l'île d'Amboine, sur les montagnes.  $\eta$

### 3. RICIN tanare. *Ricinus tanarius*. Linn.

*Ricinus foliis peltatis, repandis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 194. n°. 2.

*Tanarius minor*. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 190. tab. 121. — Burm. Flor. ind. 307.

Cette espèce a des rapports avec le *ricinus mappa*, mais ses feuilles sont plus ovales, finées à leurs bords.

C'est d'ailleurs un arbrisseau moins élevé, dont le tronc se divise vers son sommet en rameaux opposés, garnis de feuilles peltées, alternes, peltolées, d'une grandeur médiocre, ovales, aiguës à leur sommet, médiocrement échancrées ou sinuées à leur contour, & même un peu denticulées dans leur jeunesse, glauques à leurs deux faces, munies, à la base de leur pétiole, de deux stipules écaillieuses & dentées à leurs bords. Les fleurs sont disposées en grappes latérales, qui portent des fruits rougeâtres à l'époque de leur maturité, & chargées de pointes un peu courbées.

Cette plante croit à l'île d'Amboine, dans les campagnes & sur les bords des forêts.  $\eta$

### 4. RICIN dioïque. *Ricinus dioicus*. Forst.

*Ricinus foliis cordatis, acuminatis*. Forst. Flot. austr. pag. 67.

Cette espèce, quoiqu'elle ne nous soit pas connue, me paroît suffisamment distinguée de ses congénères par les caractères que Forst. lui assigne, & qui consistent dans des fleurs dioïques, les fleurs mâles portées sur des pieds séparés des femelles. Les feuilles font entières, en cœur, acuminées à leur sommet.

Cette plante a été découverte par Forster dans les îles de la mer du Sud.

**RICINELLE.** *Acalypha*. Genre de plantes di-

cotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les *tragia* & les *croton*, & qui comprend des herbes ou arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, stipulacées, les fleurs axillaires, disposées en épis ; les fleurs supérieures mâles, les inférieures femelles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles, un calice à trois divisions profondes ; point de corolle ; de huit à seize étamines monadelphiques à leur base. Dans les fleurs femelles, trois styles ; une capsule à trois coques, à trois loges, renfermant chacune une semence.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice à trois ; quelquefois à quatre folioles ovales, presque rondes, égales, concaves.

2°. Point de corolle.

3°. De huit à seize étamines dont les filaments sont courts, réunis à leur base en un seul paquet, terminés par des anthères arrondies.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice persistant comme celui des fleurs mâles, enveloppés à leur base par une grande bractée en cœur.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire arrondi, surmonté de trois styles qui se divisent à leur sommet en lignates rameux, au nombre de six & plus.

Le fruit est une capsule presque ronde, à trois coques séparées par trois sillons, à trois loges, chacune d'elles contenant une semence assez grande, un peu arrondie.

Observations. Ce genre est du nombre de ceux dont les limites sont peu marquées. Constitué par le nombre des étamines & les divisions des calices qui varient de quatre à huit, les *croton* n'en diffèrent qu'en ce que ces parties sont impaires, & que la plupart de leurs espèces ont une corolle qui manque fort souvent : il est aussi fort douteux que ces étamines soient constamment monadelphiques dans les *acalypha*. Les fleurs font monoïques, mais il en est aussi des dioïques. Dans les *tragia*, les calices n'ont que trois divisions, & ne renferment que trois étamines.

Les espèces qui composent ces trois genres, si peu distingués, puisqu'ils sont établis sur des parties variables, ont d'ailleurs la plupart un port assez semblable : leur fructification est disposée sur des épis plus ou moins grêles, assez semblables à des chatons qui tantôt réunissent les deux

sexes, tantôt ne portent que des fleurs toutes mâles ou toutes femelles.

Il est impossible de saisir ces différences dans les plantes sèches, & ce genre ne peut être travaillé convenablement que par ceux qui peuvent observer ces espèces vivantes. Celles que nous offrons ici comme non décrites, pourront peut-être appartenir aux *craon* ou aux *tragia*, ou à quelque autre genre voisin lorsqu'elles pourront être examinées dans un autre état que dans celui de siccité, qui nous a forcé à ne décrire que leur port, & le peu que nous avons pu sûrement observer dans les parties de leur fructification.

## E S P È C E S.

1. RICINELLE à feuilles de charme. *Acalypha carpinifolia*.

*Acalypha foliis lanceolatis, glabris, serratis, acuminatis; spicis filiformibus, axillaribus; caule arborescente.*

*Acalypha foliis oblongis, serratis; caulibus oppositis, ramis alternis; spicis masculinis, lateralibus.* Burm. Amer. pag. 165. tab. 172. fig. 1.

*Manihot ulmifolia ampliore & angustiore.* Plum. Catal. pag. 20. — Tourn. Int. R. Herb. 658.

C'est une plante ligneuse, dont les branches sont glabres, noueuses, divisées en rameaux alternes, effilés, garnis de feuilles alternes, pétioles, assez semblables à celles du charme, lancéolées, plus ou moins larges; les supérieures étroites, glabres, acuminées, dentées en scie à leurs bords, à nervures latérales, obliques. Les pétioles sont courts & droits.

Les fleurs mâles sont disposées en épis grêles, presque filiformes, latéraux, axillaires, alternes, solitaires, chargés de très-petites fleurs. Je n'ai point vu de fleurs femelles; mais Plumier dit qu'elles sont placées sur des épis solitaires, terminaux, entre deux rameaux opposés & bifurqués, tandis que les autres sont alternes. Ces fleurs sont munies de bractées palmées.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. *H (V. f. in herb. Jussieu.)*

2. RICINELLE à feuilles de tilleul. *Acalypha tiliaefolia*.

*Acalypha racemis compositis, foliis ovato-subrotundis, acuminatis, subius incano - subtomentosis; caule arborescente.* (N.)

On distingue aisément cette espèce à ses grandes & belles feuilles, blanches & tomenteuses à leur face inférieure, assez semblables à celles du tilleul.

C'est un arbre ou arbrisseau dont les rameaux

sont fort épais, cylindriques, pubescents dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, pétioles, amples, planes, ovales, presque rondes, légèrement crénelées à leur contour, acuminées à leur sommet, vertes & un peu rudes à leur face supérieure, très-blanches & pubescentes en dessous; marquées de nervures, dont les principales sont comprimées, divisées en veinules transverses, presque parallèles. Les pétioles sont presque cylindriques, striés, pubescents, au moins une fois plus courts que les feuilles, longs d'environ un pouce & demi.

Les fleurs sont réunies en petits paquets dits, globuleux sur des grappes rameuses, axillaires, amples, presque paniculées, pubescentes, d'un blanc cendré. Je n'ai point vu de bractées, d'un fruit; ce qui me fait soupçonner que ces grappes ne contenoient que des fleurs femelles.

Cette plante croît à Saint-Domingue. *H (V. f. in herb. Jussieu.)*

3. RICINELLE à feuilles d'aulne. *Acalypha alnifolia*.

*Acalypha foliis ovatis, crenatis, subtomentosis; spicis cylindricis, pedunculatis; caule fruticoso, villosa.* (N.)

C'est une plante ligneuse, dont les rameaux sont cylindriques, velus, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales, un peu arrondies, assez semblables à celles du *betula alnus*; épaisses, tomenteuses, velues, un peu blanchâtres, à nervures alternes, latérales, très-blanches. Les épis sont pédonculés, cylindriques, obovates, grêles, non interrompus, sous la forme d'un petit chaton, plus longs que les feuilles.

Je ne connois de cette espèce qu'un individu imparfait, que j'ai observé dans l'herbier de M. Lamarck. J'avois été tenté de le rapporter à *acalypha betulaefolia* de Swartz, qu'il caractérise par cette phrase: *Acalypha floribus feminis, axillaribus, sessilibus; involucri cordatis, crenatis; masculis spicatis; foliis subrotundis, crenatis, glabris.* Prodr. pag. 100.

Ici les feuilles sont glabres: dans la nôtre elles sont épaisses, tomenteuses, peut-être à cause du leur jeunesse. Je n'y ai point observé de bractées; mais il est possible que je n'y ai vu que des épis mâles. Il faudroit, pour oser prononcer affirmativement, avoir sous les yeux la plante de Swartz.

Elle croît dans les Indes occidentales. *H (V. f. in herb. Lam.)*

Observations. J'ai vu dans l'herbier de M. Jussieu une plante très-voisine de la précédente, sous le nom d'*acalypha betulaefolia*. C'est un petit arbrisseau qui se divise, un peu au dessus de sa racine, en branches droites, diffuses, presque simples.



hautes de huit à dix pouces, velues; à feuilles alternes, bianchâtres en dessous. Je ne la crois pas différente de celle que je viens de décrire.

4. RICINELLE tubulée. *Acalypha corensis*. Jacq.

*Acalypha floribus femineis terminalibus, distinctis; involucri triphyllis; spicis masculis axillaribus, involucriatis; foliis ovato-ferratis*. Jacq. Stirp. Amer. pag. 254. tab. 161.

C'est un arbrisseau haut d'environ six pieds, dont les tiges sont droites, glabres, striées, garnies de feuilles ovales, oblongues, alternes, dentées à leurs bords en dents du scie; acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, longues de deux ou trois pouces, marquées de nervures sailantes & de veines transverses, presque parallèles; supportées par des pétioles courts.

Les fleurs mâles sont disposées sur des épis droits, axillaires, solitaires, longs d'un pouce; les fleurs qu'ils supportent, munies la plupart, à leur base, d'un involucre tubulé, d'une seule pièce, entier, enveloppant assez souvent trois à quatre fleurs pédonculées; chacune de ces fleurs est munie d'un calice à trois folioles, qui renferme huit étamines. Les fleurs femelles sont réunies sur un épi séparé, terminal, épais & court, dont les bractées sont divisées en trois folioles. Leur calice est à cinq découpures profondes; il renferme trois styles bifides, perfolians. Les semences sont anguleuses.

Cette plante croît à Saint-Domingue & à la Martinique; elle est commune sur le bord des forêts. (V. f. in herb. Jussieu.)

5. RICINELLE à grandes feuilles. *Acalypha grandifolia*.

*Acalypha foliis sparsis, ovato-oblongis, asperis, sulcatis; spicis brevissimis, caule frutescente*. (N.)

6. Eadem, glabrata, foliis integris, spicis elongatis. (N.)

Cette plante paroît être un arbrisseau assez fort, à en juger par ses rameaux, qui sont ligneux, cylindriques, très-glabres, revêtus d'une écorce ridée, garnis de feuilles éparées, nombreuses, assez grandes, très-rapprochées, alternes, pétioles, presque coriaces, ovales, lancéolées, un peu rétrécies à leur base, plus larges vers leur sommet, rudes à leurs deux faces, un peu ponctuées irrégulièrement en dessous, à crénélures obtuses, peu marquées à leurs bords; obtuses à leur sommet, longues de trois à quatre pouces, larges de deux au plus, supportées par des pétioles très-courts, fines, canaliculées en dessus. Les fleurs sont glabres, disposées par petits groupes alternes sur des épis très-courts, droits, axillaires, à peine aussi longs que les pétioles. Ces fleurs n'étant pas

encore développées, je n'ai pu en distinguer les parties; je n'y ai pas vu de bractées.

Cette plante croît à l'île de Bourbon. (V. f. in herb. Lam.)

La plante & à tant de rapports avec cette espèce, que je n'ai pas cru devoir l'en séparer; elle en diffère par ses feuilles très-glabres, entières à leurs bords, & par leurs épis beaucoup plus longs. Elle a été recueillie par Commerçon à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. Jussieu.)

6. RICINELLE veinée. *Acalypha venosa*.

*Acalypha caule fruticofo; foliis ovalibus, petiolatis, integris, subtus venoso-reticulatis; corymbis pendulatis, cernuis, lateralibus*. (N.)

C'est un petit arbrisseau très-rameux, un peu velu, qui à le port d'un *succinum*, & qui acquiert, par la dessication, une couleur brune ou noirâtre.

Ses rameaux sont cylindriques, feuillés, à écorce brune, légèrement ponctueuse; velus vers leur sommet. Les feuilles sont alternes, petites, pétioles, ovales, presque en cœur, d'une couleur brune à leur face supérieure, pâles en dessous, avec des veines réticulées & noires. Les pétioles, les nervures des feuilles, les pédoncules & les calices sont fortement velus; les stipules petites, en alène ou sétacées.

Les fleurs sont disposées en corymbes latéraux, pédonculés, fort petits, inclinés, composés d'environ une dizaine de petites fleurs pédonculées. Les mâles ont leur calice cilié, & contiennent au moins six étamines, dont les filaments sont capillaires & les anthères grossies. Les capsules, situées, suivant toute apparence, sur des individus séparés, sont pédonculées, toruleuses, globuleuses, surmontées de six styles & plus, & paroissent avoir cinq loges bivalves.

Cette plante, recueillie par Commerçon à l'île de Madagascar, pairoit voisine des *croton* & même des *celestrus*. (V. f. in herb. Lam.)

7. RICINELLE à feuilles sessiles. *Acalypha sessilis*.

*Acalypha foliis oblongis, sessilibus; spicis brevissimis, axillaribus*. (N.)

Petit arbrisseau, qui forme une espèce très-distincte par ses feuilles sessiles.

Ses branches sont garnies de petits rameaux courts, diffus, cylindriques, un peu pubescents, surtout vers leur partie supérieure; garnis de feuilles alternes, assez petites, oblongues, presque linéaires, glabres, entières à leurs bords, obtuses & arrondies à leur sommet. Les fleurs mâles sont disposées en petits épis courts, latéraux, axillaires, situés vers l'extrémité des branches. Les fleurs

feuilles sont réunies en petits paquets sessiles, dans l'axille des feuil inférieures; elles sont peu nombreuses, velues, & munies à leur base de bractées pubescentes, à découpures ovales, aiguës.

Je ne connois point la patrie de cette plante, que j'ai observée dans l'herbier de M. Joubert. (V. f.)

8. RICINELLE velue. *Acalypha villosa*. Linn. f.

*Acalypha involucri femineis minimis, dentatis, villosissimis; spicis elongatis; foliis ovatis, acuminatis, serratis, petiolo longioribus*. Linn. f. Suppl. pag. 422.

*Acalypha villosa*. Jacq. Strip. Amer. pag. 254. — Jacq. Hort. Vind. vol. 3. pag. 26. tab. 47.

Ses tiges sont droites, frutescentes, foibles, un peu sarmenteuses, soutenues par les plantes qui les avoisinent, souvent hautes d'environ quinze pieds, divisées en rameaux cylindriques, velus dans leur jeunesse, glabres & ligneux en vieillissant, garnis de feuilles ovales, alternes, dentées en scie, pubescentes à leur face inférieure; longs de trois à quatre pouces, & supportés par des pétioles longs, de deux au plus.

Les épis des fleurs mâles sont épais, cylindriques, axillaires, droits, solitaires, d'environ un pouce & demi : ceux des femelles sont lâches, effilés, axillaires, sur des rameaux différens, mais sur la même plante. Leur calice est divisé en cinq découpures : il contient trois styles, divisés en deux jusqu'à leur base. Les bractées sont fort petites, dentées & velues.

Cette plante croît en Amérique, à Carthagène. (V. f. Descript. ex Jacq.)

9. RICINELLE à épis filiformes. *Acalypha filiformis*.

*Acalypha foliis ovatis, obtuse crenatis, subtus venosis; spicis alternis, filiformibus, longissimis; caule fruticoso*. (N.)

1. *Acalypha* (arborea), *involucri femineis, reniformibus, integerrimis; foliis ovato-lanceolatis, crenatis, petiolo quater aut quinque longioribus*. Com. Herb. manuf.

Ses tiges sont ligneuses & se divisent en rameaux droits, cylindriques, glabres, ridés, de couleur brune-foncée, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales, aiguës, un peu coriaces, planes, glabres ou légèrement pubescentes, surtout dans leur jeunesse; arrondies & plus larges à leur base, à crénélures obtuses, peu profondes à leur contour, marquées, surtout à leur face inférieure, de quelques nervures, dont plusieurs se dirigent vers le sommet des feuilles;

entrecoupées de veinules fines, un peu noirâtres, très-nombreuses. Les pétioles ont à peine un demi-pouce, tandis que les feuilles sont longues d'un pouce & demi ou deux pouces.

Les fleurs sont disposés sur des épis axillaires, alternes, solitaires, grêles, presque filiformes, sans bractées, supportant des petits paquets de fleurs que je soupçonne être mâles, velues, fort petites. Je connois à peine les fleurs femelles. Néanmoins plusieurs de ces épis m'ont offert à leur base deux ou trois fleurs imparfaites, à bractées presque entières, & d'autres paroissent se biter & porter des fleurs femelles séparées.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de France. (V. f. in herb. Jussieu.)

La plante 2, présentée par Commerçon sous le nom d'*acalypha arborea*, ne me paraît différer de la précédente que par les feuilles plus petites, plus étroites; c'est d'ailleurs la même organisation, les mêmes nervures. Ses épis mâles sont très-longs, filiformes. Elle croît à l'île Bourbon. (V. f. in herb. Jussieu.)

10. RICINELLE ailée. *Acalypha pinnata*.

*Acalypha foliis digito-pinnatis; foliis minimis, linearibus; caulis villosis, globulosis; caule fruticoso*. (N.)

Cette plante n'a que peu de rapports avec les *acalypha*, considérée relativement à son port & à ses feuilles ailées; mais elle y convient par les parties de sa fructification, que j'ai pu observer.

Ses tiges sont basses, un peu ligneuses, hautes de six à huit pouces & plus, médiocrement rameuses, glabres, cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétioles, presque deux fois ailées, à pinnules courtes, opposées, divisées en folioles très-petites, un peu confluentes à leur base, étroites, linéaires, glabres, presque obtuses. Je n'ai pu observer les fleurs mâles : les femelles sont disposés en petites grappes très-courtes, latérales & terminales. Les capsules sont à trois coques globuleuses, de la grosseur d'un petit pois chacune, velues, presque sessiles.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Video. (V. f. in herb. Lam.)

11. RICINELLE frutescente. *Acalypha fruticosa*. Forsk.

*Acalypha foliis ovato-acutis, brevissimis petiolatis; bracteis femineis cucullatis, serrato-dentatis; caule fruticoso*. (N.)

*Acalypha involucri femineis cordatis, crenatis; foliis ovatis, acutis, serratis*. Gmelin, Syst. Nat. vol. 2. pag. 1032.

*Acalypha frutescens*. Forskahl, Flor. ægypt.-arab. pag. 161. n° 21.

Cette plante, assez semblable à l'*acalypha virgata*, en diffère par ses tiges frutescentes. D'ailleurs, les fleurs femelles sont séparées des fleurs mâles, & forment des épis particuliers.

Ses tiges sont dures, droites, fermes, rameuses, hautes de quatre à cinq pieds, divisées en rameaux cylindriques, verdâtres & velus dans leur jeunesse, rudes & chargés de quelques verrues distantes lorsqu'elles vieillissent; garnis de feuilles alternes, à peine pétiolées, longues d'un pouce au plus, ovales, aiguës, dentées en scie à leurs bords. Les fleurs mâles sont portées sur des épis particuliers, axillaires, grêles, ferrés. Les fleurs femelles sont filiformes, munies à leur base d'une bractée concave, dentée en scie à ses bords. L'ovaire est velu.

Cette plante croît en Égypte, dans les vallées.  $\eta$

## 12. RICINELLE effilée. *Acalypha virgata*. Linn.

*Acalypha spicis femineis, involucri cordatis, serratis; masculis distans, opusculis; foliis lanceolato-ovatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 182. n° 2. — Amoen. Acad. vol. 5. pag. 410. — Miller, Dict. n° 2.

*Acalypha humilis, foliis cordatis, crenatis; spicis mixtis, alaribus & terminalibus*. Brown, Jam. 346. tab. 36. fig. 1.

$\beta$ . *Acalypha* (decidua), *involucri femineis cucullatis, serratis, deciduis; foliis lanceolato-ovatis, petiolo sesquialongioribus*. Fois. Flor. ægypt.-arab. pag. 161. n° 22.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, assez larges, lancéolées, glabres à leurs deux faces, divisées à leurs bords en dents de scie, obtuses, supportées par des pétioles longs à peine d'un demi-pouce.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, foliaires, les uns ne portant que des fleurs mâles, d'autres des fleurs femelles. Les premiers sont grêles, filiformes, nus; les autres sont garnis, dans toute leur longueur, de bractées alternes, échanquées en cœur, incisées ou dentées en scie.

Cette plante a des rapports avec l'*acalypha virginica*, dont elle diffère par ses tiges beaucoup plus hautes, & par la disposition de ses épis; elle est aussi très-voisine de l'*acalypha spiciflora* de Burm. Elle croît à la Jamaïque.

## 13. RICINELLE à longs épis. *Acalypha spiciflora*. Burm.

*Acalypha pedunculis interruptis spicatis; foliis ovo-*

*tis, supernè ovatis, denticulatis*. Burm. Flor. ind. pag. 303. tab. 61. fig. 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 789. fig. 1.

*Tithymalus porvus India orientalis, herniaria foliis, Collar-Pawly Malabarorum*. Pluk. Amalth. pag. 202. tab. 449. fig. 3.

*Acalypha erecta, virgultosa, foliis ovatis, ocaninosis atque crenatis; spicis uniformibus, alaribus*. Brown, Jam. pag. 346. tab. 36. fig. 2.

$\beta$ . *Ricinocarpus zeylanica urens, floribus ex alis spicatis*. Burm. Zeyl. pag. 205. tab. 93. fig. 1.

Il paroît que cette plante a été confondue avec l'*acalypha virginica*, avec laquelle elle convient quelquefois par quelques variétés de ses feuilles, mais dont elle est très-distincte par ses longs épis, souvent interrompus.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées ou ovales-lancéolées, rudes, comme chagrinées à leurs deux faces, marquées de plusieurs points enfoncés, irréguliers, à grosses crénelures obtuses à leurs bords, quelquefois à dents aiguës, acuminées à leur sommet ou comme rongées, à larges échancrures, supportées par des pétioles courts, cylindriques, un peu canaliculés à leur face supérieure.

Les épis me paroissent être de deux sortes: les uns femelles, plus courts, dont les fleurs sont plus rapprochées, garnis de bractées amplexicaules, concaves, crénelées, aiguës; les autres mâles, plus longs, sans bractées, où les fleurs, sessiles & distantes, forment de petits paquets interrompus. Dans la plante  $\beta$ , les feuilles sont plus ovales, plus régulièrement dentées, les épis moins longs & plus courts.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île Bourbon, &c. (*V. f. in herb. Lam.*)

## 14. RICINELLE de Virginie. *Acalypha virginica*. Linn.

*Acalypha involucri femineis cordatis, incisif; foliis ovato-lanceolatis, petiolo longioribus*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 182. n° 11. — Hort. Ups. 290. — Flor. zeyl. 342. — Mill. Dict. n° 1. — Kniph. Centr. 8. n° 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 789. fig. 2.

*Acalypha foliis ovato-lanceolatis, involucri femineis obtusis*. Hort. Cliff. 495. — Gronov. Virg. 116. 153.

*Acalypha* (virginica), *annua, puberula; foliis breviter petiolatis, sublancoolato-oblongis, serratis; involucri subsessilibus axillaribus, nervoso-plicatis, acutissimè quasi cristato-incisif*. Mich. Flor. boreal-americ. vol. 2. pag. 215.

*Mercurialis tricoccos*, *hermaphrodita*. Pluk. Phytogr. 99. fig. 4. — Herm. Lugd. Bat. 687.

*Echambulia*. Herm. Zeyl. 68.

Cette plante a le port de la pariétaire commune. Ses riges sont annuelles, ainsi que ses racines, divisées en rameaux nombreux, alternes, glabres, cylindriques, firies, garnis de feuilles alrernes, pétiolées, ovales, oblongues, quelquefois lancéolées, vertes, minces, rudes à leurs deux faces, à crénélures larges, obtuses à leurs bords, rarement aiguës, supportées par des pétioles grêles, un peu pendans, ordinairement plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en petites grappes ou épis axillaires, droits, grêles, sur lesquels les fleurs femelles, au nombre de trois ou quatre, occupent la partie inférieure, & sont enveloppées à leur base par une bractée assez grande, ovale, sessile, profondément dentée ou incisée à ses bords : les fleurs mâles sont petites, sessiles, rapprochées, verdâtres, & terminent l'épi.

Cette plante croit dans la Virginie & à l'île de Ceilan. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 15. RICINELLE des Indes. *Acalypha indica*. Linn.

*Acalypha involucris femineis cordato-subrenatis*; *foliis ovatis*, *petiolo brevioribus*. Linn. Syst. Planar. vol. 4. pag. 183. n. 3. — Flor. zeyl. 341. — Mill. Dict. n. 3.

*Mercurialis zeylanica*, *tricoccos cum acetabulis*. Herm. Lugd. Bat. 686. tab. 6. 7. — Rai, Hist. 1854. Suppl. 108.

*Cupamen*. Rheed, Malab. vol. 10. pag. 161. tab. 81. 2. — Rai, Suppl. 107.

*Acalypha* (*spicata*), *involucris femineis cucullatis, serratis*; *foliis lanceolatis*. Forsk. Flor. zeypr. arab. pag. 161. n. 23.

*Acalypha* (*supera*), *foliis ovatis*, *petiolo brevioribus*; *amentis axillaribus, masculis, flore femineo pedicellato terminatis*.? Forsk. l. c. pag. 162. n. 24.

*Willia cupamen*. Rheed, Malab. vol. 10. p. 165. tab. 83.

Cette espèce a des rapports avec l'*acalypha virginica*; elle n'en diffère que par ses feuilles plus conflamment ovales, par les bractées en cœur presque entières, & par les fleurs femelles plus nombreuses, les épis beaucoup plus longs.

Les tiges sont herbacées, droites, cylindriques, presque glabres, divisées en rameaux alternes, garnies de feuilles pétiolées, alrernes, ovales & même un peu arrondies, glabres & vertes à leurs deux faces, beaucoup plus courtes que les pétioles, finement dentées en scie à leur contour, un peu

rétrécies à leur base sur le pétiole. Les fleurs sont disposées en épis allongés, grêles, axillaires, dont la partie inférieure est munie de six à huit fleurs femelles, qui offrent à leur base des bractées amplexicaules, ovales, échançrées en cœur, presque entières ou légèrement crénelées à leurs bords, glabres, obtuses : les fleurs mâles sont très-ferrées, sessiles, grêles, & terminent l'épi.

Cette plante croit dans les Indes. On la cultive dans plusieurs jardins botaniques de l'Europe. (V. f.)

L'*acalypha spicata* de Forskhal diffère bien peu de celle-ci, & nous a paru devoir y être rapportée. Quant à l'*acalypha supera* du même auteur, ce seroit encore la même espèce si elle n'étoit depourvue de bractées ; mais Forskhal n'en a vu qu'un seul individu qui peut-être avoit perdu ses bractées, comme il le dit lui-même. Il faudroit donc revoir ces deux plantes avant de prononcer définitivement sur leur existence comme espèces distinctes.

#### 16. RICINELLE queue de renard. *Acalypha alopecuroides*. Jacq.

*Acalypha spicis solitariis, masculis lateralibus, patensissimis*; *femineis terminalibus, creatis*; *involucro setaceo, tripartito*. Jacq. Collect. vol. 3. pag. 196.

Ses racines sont composées de fibres ramuscées, d'où s'élèvent des tiges droites, hautes d'un pied & demi & plus, très-rameuses, velues, presque anguleuses à leur partie supérieure, divisées en rameaux redressés, alternes, garnis de feuilles pétiolées, alrernes, ovales, en cœur, un peu rudes, velues à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, longues d'environ trois pouces, supportées par des pétioles velus, d'un tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont monoïques, & rangées sur des épis, les uns mâles, d'autres femelles ; les mâles grêles, longs d'un pouce, latéraux & solitaires ; les épis femelles sont terminaux, droits, cylindriques : souvent du centre de leur sommet sort un pedoncule droit, filiforme, terminé par un ou deux corpuscules ovales, velus, obtus. Toutes les fleurs sont petites, nombreuses, verdâtres, munies chacune d'un involucre concave, foyeux, à trois découpures terminées par un filament long & sétacé.

Cette plante croit dans l'Amérique. (Description, ex Jacq.)

#### 17. RICINELLE de Caroline. *Acalypha caroliniana*.

*Acalypha annua, puberula*; *foliis longè petiolatis, subrhomboideo-ovalibus, serratis*; *involucris axillaribus, ampliatiss, subcampanulatis, incisus*. Michx. Flor. boreal. amer. vol. 2. pag. 216.

*Acalypha (caroliniana), spica femineis involutris, villosis, fimbriatis, crenatis; spica masculis basi involutris infertis; foliis ovatis, serratis.* Walp. Flor. carol. pag. 238.

Ses tiges sont herbacées, légèrement pubescentes, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, presque glabres, ovales, un peu rhomboidales, vertes à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, supportées par de longs pétioles.

Les fleurs sont fort petites, verdâtres, disposées en épis courts, grêles, situés dans l'aisselle des feuilles. Les fleurs femelles, qui en occupent la partie inférieure, sont munies à leur base de bractées amples, presque en cœur à leur base, concaves, presque campanulées, velues, incisées à leurs bords; souvent elles existent seules sur les rameaux des fleurs.

Cette plante croît dans la Virginie & la Floride. ○

18. RICINELLE à gros épis. *Acalypha macrostachya.*

*Acalypha foliis ovatis, serratis; spicis confertis, bracteis incisis.* (N)

Cette espèce a de grands rapports avec l'*acalypha urticifolia*; elle en diffère par ses épis femelles, munies de bractées nombreuses.

Ses tiges sont herbacées, médiocrement velues, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës, d'un vert foncé, dentées en scie à leurs bords, légèrement velues à leurs deux faces, supportées par des pétioles grêles, presque pendans, un peu plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, épais, cylindriques, à peu près de la longueur des pétioles, presque sessiles; les fleurs femelles sont nombreuses, très-ferrées, munies chacune d'une large bractée concave, amplexicaule, légèrement velue, à crénelures obtuses, légèrement ciliées à leurs bords. Les individus que j'ai observés de cette plante m'ont paru offrir quelques fleurs mâles, sans bractées, velues, fort petites à l'extrémité des épis, autant que j'ai pu en juger dans l'état de sécheresse.

Cette plante croît dans l'Amérique. ○ (*V. f. in herb. Lam.*)

19. RICINELLE à feuilles d'ortie. *Acalypha urticifolia.*

*Acalypha foliis ovato-acuminatis, longè petiolatis; spicis confertis, subsessilibus, bracteis.* (N)

Cette plante est herbacée & offre l'aspect d'une ortie, très-voisine de l'*acalypha macrostachya*;

mais ses épis ne n'ont point offert de bractées, & les feuilles sont plus larges, acuminées.

Ses tiges sont foibles, tendres, verdâtres, presque glabres, divisées en rameaux alternes, un peu diffus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, élargies, quelquefois presque arrondies, d'un vert tendre, minces, chargées de quelques poils blanchâtres, un peu ciliées à leurs bords, à crénelures obtuses, portées sur de longs pétioles grêles, pendans.

Les fleurs sont disposées en épis courts, épais, légèrement pédonculés; les inférieurs garnis de trois ou quatre fleurs; les supérieurs chargés de fleurs nombreuses & serrées, toutes femelles, sans bractées: je n'y ai point vu de fleurs mâles; ce qui me fait soupçonner qu'elles naissent sur des épis, & peut-être sur des rameaux ou des individus séparés. Ces fleurs sont velues, fort petites, sessiles: il leur succède des capsules globuleuses, de la grosseur d'une sorte tête d'épingle, à trois coques peu marquées, velues; les styles se divisent en plusieurs filamens droits, setacés, au moins une fois aussi longs que les calices.

Cette plante croît dans l'Amérique. ○ (*V. f. in herb. Lam.*)

20. RICINELLE ciliée. *Acalypha ciliata.* Forsk.

*Acalypha involutris femineis uercolatis, ciliatis; spica brevissimis; foliis ovatis, acuminatis, petiolum æquantibus.* Vahl. Symb. Bot. t. pag. 77. tab. 20. — Gmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1032. n°. 4.

*Acalypha (ciliata), involutris femineis; ciliis filiformibus, conniventibus.* Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 162. n°. 25.

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes d'un à deux pieds, herbacées, cylindriques, velues, nues à leur partie inférieure jusque vers leur moitié, garnies supérieurement de feuilles alternes, pétiolées, ovales, acuminées, la plupart aussi longues que le pétiole qui les soutient, crénelées à leurs bords, veinées, pubescentes & d'un vert pâle à leur face inférieure, vertes & munies de quelques poils courts & roides à leur face supérieure, longues de deux pouces.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires, souvent au nombre de deux dans chaque aisselle, droits, longs d'environ un pouce. Les fleurs femelles occupent la partie inférieure; elles sont enveloppées à leur base par une bractée concave, couverte, striée, munie à ses bords de cils fins, très longs: leur calice est à peine sensible. Les fleurs mâles, placées à la partie supérieure de l'épi, sont nombreuses, fort petites, un peu pédonculées: leur calice est tétragone, à quatre divisions; les anthères blanches. Le fruit est une capsule à trois loges, à trois valves monospermes.

Cette

Cette plante croît parmi les moissons, dans l'Yemen, aux pieds des montagnes. ☉

\* *Espèces incertaines ou moins connues.*

\* *Acalypha* (scabrofolia), *spicis femineis*, involucri cordatis, incisjs; foliis oblongo-lanceolatis, serratis, scabris. Swartz, Prodr. pag. 99.

\* *Acalypha* (hernandifolia), *spicis femineis longissimis*; involucri cordatis, serratis, masculis distinctis, aphyllis; foliis subcordatis, serratis; petiolis longissimis. Swartz, Prodr. pag. 99.

\* *Acalypha* (elliptica), *spicis femineis*, involucri germinibus brevioribus, dentatis, hispidis; masculis aphyllis, laxis; foliis ellipticis, acuminatis, dentatis. Swartz, Prodr. pag. 99.

\* *Acalypha* (levigata), *spicis femineis*, involucri multipartitis, masculis laxis, aphyllis; foliis ovato-ovatis, acuminatis, serrulatis, glaberrimis. Swartz, Prodr. pag. 99.

\* *Acalypha* (tomentosa), *spicis femineis terminalibus*, solitariis; involucri multipartitis, masculis erectis; foliis ovato-lanceolatis, serratis, scabris, subtus villosa-tomentosa. Swartz, Prodr. pag. 99.

\* *Acalypha* (angustifolia), *floribus femineis subsessilibus*, terminalibus; involucri serratis, masculis fissatis; foliis linearibus, serratis. Swartz, Prodr. pag. 99.

RICHARDE. *Richardia*. Genre de plantes dicotyledones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les acaïas, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges quadrangulaires, à feuilles opposées, dont les fleurs sont capitées, axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six divisions; une corolle tubulée, cylindrique, en entonnoir, à six découpures; six étamines; un style; trois stigmates; trois semences conniventes, flangues supérieurement.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à six divisions droites, acuminées, de moitié plus courtes que la corolle.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est cylindrique, & le limbe à six découpures droites, aiguës.

3°. Six étamines, dont les filaments sont très-courts, terminés par des anthères petites, un peu arrondies; placés entre les divisions du limbe de la corolle.

Botanique, Tome VI.

4°. Un ovaire inférieur, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, partagé en trois vers son sommet, & terminé par des stigmates obtus.

Le fruit consiste en trois semences arrondies d'un côté, angul. usés de l'autre, un peu relevées en bosse, élargies à leur partie supérieure.

#### ESPÈCES.

1. RICHARDE à feuilles rudes. *Richardia scabra*. Linn.

*Richardia foliis lanceolato-ovatis, subsessilibus, asperis; floribus capitato-verticillatis.* (N.)

*Richardia aspera*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 470. — Juss. Gen. Plant. pag. 198. — Lam. Illustr. Gener. tab. 254.

*Richardia*. Houfl. mill.

Cette plante a des tiges élevées, branchues, médiocrement articulées, à quatre faces, hérissées de poils roides, épars, tûchés, garnis de feuilles presque sessiles, ovales, lancéolées, très-entières à leurs bords, rudes à leur superficie, marquées de nervures alternes. Les fleurs sont réunies en petites côtes terminales, soutenues par quatre feuillets & quelquefois plus, ouvertes en étoile, alternativement plus petites, aiguës, sessiles, ciliées à leurs bords; d'autres fleurs sont aussi réunies en verticilles autour des rameaux.

Le calice est presque campanulé, au moins une fois plus court que la corolle; celle-ci est petite, monopétale; son tube s'élargit en forme d'entonnoir, & se divise à son orifice en six petites découpures courtes, presque droites, aiguës. Ses semences sont nues, au nombre de trois, rapprochées, conniventes.

Cette plante croît à la Vera-Cruz. ☿ (*Descript. ex Linn.*)

2. RICHARDE velue. *Richardia pilosa*. Ruiz & Pav.

*Richardia foliis oblongo-lanceolatis; floribus geminis, quaternisque; floribus capitato-umbellatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. tom. 3. pag. 50. tab. 279. fig. B.

C'est une plante herbacée & annuelle, fortement pileuse, dont les racines sont longues, simples, grêles, brunes, flexueuses, qui produisent des tiges presque couchées, longues d'un pied, tétragones, cannelées, divisées en rameaux étalés, diffus, les supérieurs presque dichotomes, garnis de feuilles opposées, pétiolées, assez grandes, oblongues, lancéolées, quelques-unes ovales, lancéolées, très-entières, rudes à leurs deux faces, raboteuses à leurs bords; les feuilles flo-

rales sessiles, deux par deux ou quaternées, les deux extérieures plus grandes, presque deltoïdes; les pétioles connés à leur base, longs de trois à quatre lignes; les stipules vaginales, découppés à leur sommet en filamens sétacés.

Les fleurs sont disposées en petites têtes, en forme d'ombelle sessile, enveloppées par les feuilles florales, situées à l'extrémité d'un pédoncule simple, axillaire, tétragon, de la longueur des feuilles. Leur calice est profondément divisé en six, quelquefois cinq parties vertes, aiguës, étalées. La corolle est blanche, son tube droit, son limbe à cinq ou six divisions droites, aiguës; les étamines, au nombre de six, surmontées d'anthères velues; trois stigmates capités, divergens, pileux. Le fruit se divise en trois semences en ovale renversé, tronquées, bidentées à leur base, hispides, brunes en dehors, cendrées en dedans.

Cette plante croît au Pérou, dans les environs de Lima, dans les moissons & les lieux incultes. Elle fleurit toute l'année. ☉ (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

**RICOTIE.** *Ricotia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des crucifères, qui a des rapports avec les *dentaria*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, les folioles lobées, les fleurs latérales & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice connivent; quatre pétales échancrés en cœur à leur sommet; une silique comprimée, élargie, à une seule loge, renfermant environ quatre semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles oblongues, parallèles, rapprochées, très-serrées contre la corolle, caduques.

2°. Une corolle à quatre pétales cruciformes, ongiculés, planes, ouverts, échancrés en cœur à leur sommet.

3°. Six étamines, deux un peu plus courtes, dont les filamens des quatre autres sont aussi longs que le calice, terminés par des anthères oblongues, aiguës.

4°. Un ovaire cylindrique, de la longueur des étamines, surmonté d'un stigmate aigu, presque sessile.

Le fruit est une silique ovale, lancéolée, à une seule loge, à deux valves planes, un peu élargies, comprimées, contenant trois à quatre semences comprimées, orbiculaires.

**RICOTIE d'Égypte.** *Ricotia aegyptiaca*. Linn.

*Ricotia foliis pinnatis, foliolis lobatis, siliquis pendulis.* (N.)

*Ricotia aegyptiaca*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 912. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 477. — Lam. Illustr. Gener. tab. 361.

*Cardamine foliis supra decompositis; siliquis unilocularibus, pendulis.* Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 656.

*Lunaria foliis supra decompositis; foliolis trifidis; siliquis oblongis, pendulis.* Miller, Icon. 169.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont droites, glabres, cylindriques, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire, composées de sept à neuf folioles & plus, pédiculées, opposées, élargies, presque ovales, entières à leur base, divisées à leurs bords en plusieurs lobes arrondis, glabres à leurs deux faces; les folioles, dans les feuilles supérieures, sont presque incisées ou divisées en lobes aigus.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des tiges & des rameaux, axillaires, presque latérales, solitaires, portées sur des pédoncules à peine plus longs que la corolle. Leur calice est glabre, composé de quatre folioles étroites, allongées, conniventes. La corolle est ouverte, plane à sa partie supérieure; les lames des pétales rétrécies vers les onglets, élargies à leur sommet, très-obtusées, échancrées en cœur. A l'époque de la maturité des fruits, leurs pédoncules se tordent; les siliques sont alors pendantes, comprimées, ovales, lancéolées, un peu échancrées latéralement, subulées à leur sommet par la persistance du stigmate, à une seule loge, à deux valves.

Gärtn. à figuré (Centur. 9. tab. 142. fig. 1), sous le nom de cette plante, un fruit à deux loges, que Willdenow croit être celui du *Lunaria rediviva*, ceux du *ricotia* n'ayant essentiellement qu'une seule loge, l'un des principaux caractères qui le distinguent des *lunaria*.

Cette plante croît naturellement dans l'Égypte. ☉

**RIDÈES** (Feuilles). *Rugosa folia*. Nom que l'on donne aux feuilles lorsque les portions de leur surface, renfermées dans les ramifications des nervures, sont élevées & forment des rides, ou de petites éminences très-nombreuses, comme dans la *primevère officinale*, l'*hélioïtrophe d'Europe*, &c.

**RIMBOT.** *Oncoba*. Genre de plantes dicotylédones, de la famille des lilacées, qui à quelques

rapports avec les *fueuria*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, épineux, dont les fleurs sont grandes, folitaires, terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, partagé en quatre découpures profondes ; une corolle polyptéale ; des étamines nombreuses ; une baie à plusieurs loges ; des semences nombreuses, enfoncées dans une pulpe.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, divisé en quatre découpures profondes, concaves, obtuses.

2°. Une corolle composée de onze à douze pétales ovales, les six extérieurs plus longs, les intérieurs alternes, plus petits.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont filiformes, droits, insérés sur le calice, terminés par des anthers droites, oblongues, aiguës.

4°. Un ovaire globuleux, supérieur, surmonté d'un style épais, cylindrique, plus long que les filaments, terminé par un stigmate orbiculaire, concave en dessus, divisé à ses bords en sept ou douze lobes.

Le fruit est une baie globuleuse, de la forme d'un citron, revêtu d'un épiderme mince & charnu, dont l'intérieur est occupé par une noix ligneuse, de même forme, qui ne s'ouvre pas ; marquée extérieurement de six à douze sillons, divisée intérieurement en six ou douze loges qui renferment des semences nombreuses, oblongues, comprimées, placées dans une substance pulpeuse.

#### E S P È C E S.

1. RUMBOT épineux. *Oncoba spinosa*. Forskh.

*Oncoba foliis ovato-acuminatis, serratis ; floribus solitariis, terminalibus.* (N.)

*Oncoba spinosa*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 818.

*Oncoba*. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 103. n°. 21. — Juss. Gener. Plant. pag. 292.

*Dim feu rimbot*. Adans. Herb. seneg. mff.

C'est un arbre élevé, divisé en rameaux alternes, verticilleux, épineux. Les épines sont ou folitaires, ou deux à deux dans l'aisselle des rameaux, ou terminales ; quelque-fois aussi il en existe dans l'aisselle des feuilles. Celles-ci sont alternes, médiocrement pétiolées, ovales, acuminées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords,

longues d'environ deux pouces. Les fleurs sont grandes, folitaires à l'extrémité des rameaux.

Leur calice est monophylle, plane à sa base, divisé en quatre découpures glabres, un peu arrondies, obtuses, concaves, réfléchies, blanchâtres intérieurement. La corolle est grande, blanche, ouverte, composée de onze à douze pétales légèrement denticulés, six extérieurs en ovale renversé, plus longs que le calice ; les intérieurs plus petits, inégaux entr'eux. Les filaments sont d'un jaune pâle, nombreux, occupant tout l'espace qui se trouve entre la corolle & l'ovaire ; leurs anthers sont jaunes, linéaires. L'ovaire est globuleux, sillonné longitudinalement. Il supporte un style charnu, épais, qui soutient un stigmate orbiculaire, concave à sa partie supérieure, divisé à ses bords en six ou douze lobes, munis souvent à leur extrémité d'une glande verdâtre. Leur fruit est une baie arrondie, revêtu d'un épiderme charnu, & dont la noix offeuse qu'il renferme se divise en six ou douze loges remplies d'une pulpe qui enveloppe des semences oblongues, comprimées. Les enfants les mangent.

Cet arbre croît dans l'Égypte & au Sénégal. (J. Descript. ex Forskh. & Juss.)

RINORE. *Rinorea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des vinétiers, qui a des rapports avec les *conoria* d'Aublét, qui comprend des arbrus exotiques à l'Europe, à rameaux & à feuilles alternes, stipulacées, & dont les fleurs sont disposées en grappes axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice partagé en cinq découpures ; dix pétales ; les intérieurs plus petits, opposés aux extérieurs ; cinq étamines, insérées sur les onglets des pétales ; un stigmate obtus.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, velu, partagé en cinq découpures oblongues, velues, aiguës.

2°. Une corolle composée de dix pétales ovales, oblongs, concaves ; cinq extérieurs, plus grands ; cinq intérieurs, plus petits, opposés aux extérieurs.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont courts, insérés à la base des pétales extérieurs, surmontés par des anthers sagittées, qui s'ouvrent de bas en haut.

4°. Un ovaire supérieur, agrandi, velu, surmonté d'un style velu, plus court que la corolle, & terminé par un stigmate obtus.



Le fruit n'est pas connu.

## E S P È C E.

RINORE de la Guiane. *Rinorea guianensis*.

*Rinorea foliis alternis, ovato-lanceolatis, serratis; floribus racemosis.* (N.)

*Rinorea guianensis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 235. tab. 93. — Juss. Genet. Plant. pag. 287. — Linn. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 105. n°. 2733. tab. 134.

C'est, d'après Aublet, un arbre de moyenne grandeur, dont le tronc s'élève à six ou sept pieds, sur huit pouces de diamètre. Son écorce est lisse & grisâtre, son bois blanc & peu compacte. Il produit à son sommet des branches droites, divisées en rameaux alternes, grêles & cassans, garnis de feuilles pétioles, alternes, ovales, lisses & vertes à leurs deux faces, terminées par une longue pointe, denticulées à leur contour, supportées par un pétiole court, convexe en dessous, canaliculé en dessus, accompagné à sa base de deux stipules caduques.

Les fleurs naissent en grappes longues, axillaires, latérales & terminales, dont les principales ramifications sont distantes, alternes, subdivisées en d'autres plus courtes; chaque division munie à sa base de deux petites écailles ovales. Leur calice est velu, à cinq divisions courtes, aiguës, élatiques à leur base. La corolle est blanche; elle renferme cinq étamines courtes, un ovaire arrondi, velu, surmonté d'un style également velu, & d'un stigmate obtus, arrondi.

Cette plante croît à la Guiane; elle fleurit au commencement de l'hiver.  $\text{H}$

**RIPOGONE.** *Ripogonum*. Genre de plantes unilobées, à fleurs incomplètes, de la famille des asperges, qui a des rapports avec les *callixine*, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les tiges sont rampantes, géniculées, les feuilles opposées, les fleurs disposées en grappes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Des fleurs hermaphrodites; un calice à six divisions; six étamines presque sessiles; un style; un ovaire globuleux à deux loges, à deux semences.*

## C A R A C T È R E G É N É R I Q U E.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, fort petit, divisé en six folioles droites, lancéolées, aiguës.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines, dont les filamens sont très-

courts, terminés par des anthères linéaires, quadrangulaires, droites, très-longues.

4°. Un ovaire globuleux, surmonté d'un style filiforme, de la longueur du calice, termine par un stigmate obtus.

Le fruit est une baie globuleuse, à deux loges, à deux semences hémisphériques.

## E S P È C E.

**RIPOGONE grimpanse.** *Ripogonum scandens*.

*Ripogonum foliis oppositis, ovato lanceolatis; floribus racemosis, caule scandente.* (N.)

*Ripogonum*. Forster, Gen. pag. 25. tab. 25. — Juss. Gen. Plant. pag. 41. — Forst. Manuf. 114.

*Smilax (ripogonum), caule radicante; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, quinquenerviis; floribus hermaphroditis.* Gmel. Syll. Nat. vol. 1. pag. 583. n°. 21.

Plante dont les tiges sont presque ligneuses, grimpanse, & s'élèvent quelquefois jusqu'au sommet des plus hauts arbres: elles sont très-tenaces, cylindriques, articulées, nouées à leurs articulations, chaque nœud distant d'environ un pied; divisées en branches lisses, peu nombreuses, cylindriques, d'un brun verdâtre & en rameaux très-simples, diffus, munis à leur base de deux écailles vaginales & opposées, garnies de feuilles pétioles, opposées, ovales, lancéolées, acumées, très-entières, lisses, longues de trois pouces, à cinq nervures, réticulées, soutenues par des pétioles à demi cylindriques, longs d'un demi-pouce.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, composées, longues d'un pied, divisées en ramifications opposées, étalées; chaque fleur soutenu par un pédicule court, uniflore, muni à sa base d'une glande axillaire. Les calices sont fort petits, à six divisions aiguës; point de corolle. Les étamines, presque sessiles, ont des anthères très-longues, de couleur verte. Les fruits sont de petites baies rouges, globuleuses, à deux loges, renfermant chacune une semence blanche, convexe à une de ses faces, plane de l'autre.

Cette plante croît dans les îles de la Mer Pacifique, où elle a été observée par Forster; elle est radicante à ses articulations: d'où il résulte qu'elle recouvre souvent une vaste étendue de terrain. 27 (Descript. ex Forst. Manuscript, communicatis à Jussieu.)

Observations. L'espèce suivante appartient peut-être au même genre.

*Smilax (purpurata), caule dichotomo, foliis cordato-ovatis, acuminatis, unguiculatis, integerrimis, quinquenerviis; pedunculis axillaribus, umbel-*

*liferis*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 583. n°. 12.  
— Forst. Flot. austr. pag. 70.

**RIQUEURE.** *Riqueuria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyépérales, qui comprend des arbrustes étrangers à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs disposées en épi.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un triple calice ; une corolle à quatre pétales ; une capsule à quatre loges, couronnées par les styles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice triple, persistant ; deux extérieurs d'une seule pièce, à deux découpures ; l'intérieur à deux découpures droites, concaves, arrondies.

2°. Une corolle composée de quatre pétales droits, concaves, presque ronds.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont subulés, comprimés, arrachés sur le réceptacle, terminés par des anthères ovales.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté de quatre styles courts, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est une capsule ovale, à quatre faces, à quatre loges, à quatre valves, couronnées par les styles, contenant des semences nombreuses, ovales.

#### E S P È C E.

**RIQUEURE du Pérou.** *Riqueuria avenia*, Ruiz & Pavon.

*Riqueuria foliis oblongis, aveniis ; racemis terminalibus*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 70.  
— Idem, Gener. Plant. Flor. peruv. & Chili. pag. 15.

Arbrisseau dont les tiges, élevées d'environ quinze pieds, se divisent en rameaux nus à leur partie inférieure, garnis supérieurement de feuilles opposées, pétioles, oblongues, glabres, très-entières, sans nervures. Les fleurs sont disposées en grappes courtes & terminales, soutenus par des pédicules rameux, à trois fleurs. Leur corolle est jeune, un peu charnue.

Cet arbrisseau croît au Pérou, dans les forêts, aux environs de Cinchao & du Cuchero. (Description, ex Ruiz & Pav.)

**RIVINE.** *Rivina*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des arborescentes, qui a des rapports avec les *physalaceae*, & qui comprend des herbes ou sous arbrutaux exo-

tiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, acuminées ; les fleurs disposées en épis axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre divisions ; point de corolle ; quatre ou huit étamines ; un seul style ; une baie à une seule semence rude.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice coloré, persistant, partagé en quatre découpures profondes, ovales, obtuses.

2°. Point de corolle.

3°. Quatre ou huit & même douze étamines, dont les filaments sont persistants, un peu plus courts que le calice, terminés par des anthères petites, ovales ou arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, grand, arrondi, formé d'un style court, & terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une baie globuleuse, placée sur le calice réfléchi, à une seule loge, qui ne renferme qu'une seule semence scabre & arrondie.

*Observations.* Ce genre a, par quelques-unes de ses espèces, de grands rapports avec les *physalaceae*, dont il diffère par le nombre des styles, des étamines & des semences : c'est d'ailleurs, pour le port, même disposition dans les feuilles & les fleurs.

#### E S P È C E S.

1. **RIVINE pubescente.** *Rivina humilis*. Linn.

*Rivina floribus tetrandris ; foliis ovatis, pubescentibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 323. n°. 1596. tab. 81. fig. 1.

*Rivina racemis simplicibus, floribus tetrandris, foliis pubescentibus*. Linn. Syst. veget. pag. 177. — Kniph, Centur. 2. n°. 75. — Gzertn. de Fruct. & Sem. 375. tab. 77. fig. 5.

*Piercea (tomentosa), foliis cordatis, pubescentibus*. Miller, Dict. n°. 2.

*Rivina*, Hort. Cliff. 35. — Roy. Lugd. Bat. 207.

2. *Rivina canescens*.

*Rivina humilis, racemosa ; baccis puniceis*. Plum. Gen. amer. 48.

*Solanoides americana, circea foliis canescentibus*. Tournet. Act. 1706.

*Solanum barbadosense, racemosum, minus tinctoriam*. Pluk. Almag. pag. 353. tab. 112. fig. 2.

*Amaranthus bacifer, circea foliis*. Comm. Hort. 1. pag. 127. tab. 66.

C'est une plante basse, presque ligneuse, dont les tiges sont cylindriques, cannelées, pubescentes, divisées en rameaux alternes, très-ouverts, velus, garnis de feuilles alternes, pétioles, épaisses, pubescentes & même tomenteuses, ovales, acuminées, entières à leurs bords, longues d'un à deux pouces, soutenues par des pétioles presque une fois plus courts.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges & des rameaux, en épis alternes, axillaires, peu nombreux, beaucoup plus longs que les feuilles, un peu arqués, garnis dans toute leur longueur de fleurs éparées, pédonculées, un peu pendantes, velues, dont le calice est pubescent, d'un vert-jaunâtre en dehors, un peu blanchâtre en dedans, à quatre découpures obtuses, persistantes & réfléchies à la base des fruits. Il renferme quatre étamines. Le style, d'après l'observation de M. Richard, est décourbé d'un côté sur l'ovaire, mais il aboutit au sommet, & se termine par un stigmate en plateau membraneux. Le fruit est une petite baie rouge, presque globuleuse, qui renferme une seule semence petite pubescente vue à la loupe.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de l'Amérique, à la Jamaïque, aux Antilles, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

## 2. RIVINE glabre. *Rivina levis*. Linn.

*Rivina floribus tetrandris; foliis ovatis, levibus*. Linn. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 324. n°. 1597. tab. 81. fig. 1.

*Rivina racemis simplicibus; floribus tetrandris; foliis ovatis, acuminatis, glabris, planis; caule tereti*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 694. n°. 2.

*Rivina racemis simplicibus; floribus tetrandris; foliis glabris*. Linn. Mant. 41. — Kniph, Centur. 2. n°. 74.

*Rivina (humilis), foliis ovato-lanceolatis, glabris*. Miller, Dict. n°. 1.

*Solanoides americana, circa foliis glabris*. Tourn. Act. Paris. 1766.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Rivina humilis*; mais toute la plante est glabre, les feuilles plus longuement acuminées & les épis droits.

Ses tiges sont peu élevées, droites, glabres, cylindriques, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétioles, alternes, minces, un peu rudes au toucher, ovales, acuminées, entières à leurs bords, glabres & vertes à leurs deux faces, quelquefois un peu purpurines à leur contour, marquées de nervures latérales, alternes, un peu saillantes en dessous, blanchâtres, supportées par

des pétioles d'environ deux tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment des épis axillaires, latéraux ou terminaux, droits, obliques, nus dans leur partie inférieure, garnis à leur partie supérieure de fleurs alternes, pédonculées, munies à la base de leurs pédoncules de petites bractées courtes, filiformes, caduques. Leur calice est glabre, verdâtre ou un peu rougeâtre en dehors, blanc en dedans, à quatre découpures concaves, obtuses. Les étamines sont au nombre de quatre. Les fruits sont petits, globuleux, soutenus par le calice persistant & réfléchi.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux Antilles, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

## 3. RIVINE dodécandrique. *Rivina dodecandra*.

*Rivina racemis simplicibus, corymbosis; floribus dodecandris*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 324. n°. 1599.

*Rivina (octandra), racemis simplicibus; floribus octandris, dodecandris*. Jacq. Observ. 1. pag. 6. tab. 2. — Amer. acad. 4. pag. 305. — Lœffl. Iter, 207.

*Rivina scandens, racemosa, amplioribus solanifoliis; buccis violaceis*. Plum. Gen. 48. — Amer. Icon. 241.

*Rivina sarmentosa, sarmentis crassioribus, foliis ovatis; floribus spicatis, dodecandris*. Brown, Jam. 149. tab. 23. fig. 2.

Vulgairement liane à baril.

Cette espèce a des tiges grimpantes, rampeuses, longues, flexibles, ligneuses, hautes de dix-huit à vingt pieds, garnies de feuilles nombreuses, alternes, pétioles, très-glabres, ovales, lancéolées, acuminées, entières & quelquefois denticulées ou légèrement crénelées à leurs bords; quelquefois longues d'un demi-pied, & dont les pétioles sont au moins de moitié plus courts. Les fleurs sont réunies sur une grappe droite, ordinairement terminale, à l'extrémité des jeunes rameaux, simple, glabre, sur laquelle ces fleurs sont alternes, pédicelées.

Leur calice se divise en quatre découpures ovales, obtuses, très-concaves, réfléchies, blanchâtres à l'époque de la floraison, qui acquièrent ensuite à la maturité des fruits une couleur purpurine. Les étamines sont ordinairement au nombre de douze, invariables selon Jacquin, quelquefois réduites à huit suivant d'autres botanistes. L'ovaire n'a point de style: il est surmonté par un stigmate en forme de pinceau; il lui succède une petite baie d'un pourpre foncé, de la grosseur d'un petit pois, globuleuse, pulpeuse, contenant une semence noirâtre.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, parmi les broussailles, sur le revers des montagnes. (V. f.)

Ses rameaux, souples & coriaces, servent dans certaines contrées à faire des liens & des cercles de tonneau. Les habitants de la Martinique nomment cette plante *liane à baril*.

*Observations.* Le *rivina paniculata* de Linné forme aujourd'hui un genre à part bien distinct, sous le nom de *salvadora*. (Voyez l'article SALVADORE.)

#### 4. RIVINE du Brésil. *Rivina brasiliensis*. Willd.

*Rivina racemis simplicibus, floribus tetrandris; foliis ovatis, undulato-rugosis; caule sulcato.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 695 n°. 3.

*Rivina (brasiliensis), foliis cordatis, glabris; floribus spicatis, tetrandris.* Nacca in Ultert botan. annal. 6. Stück. pag. 63.

Cette plante a de grands rapports avec le *rivina lewis*; mais elle en diffère par la grandeur, par la largeur de ses feuilles, ainsi que par leur forme; enfin, par l'époque différente de sa floraison.

Ses tiges sont presque ligneuses, droites, fort élevées, glabres, cannelées, divisées en rameaux alternes, garnies de feuilles grandes, ovales, alternes, pétiolées, glabres à leurs deux faces, médiocrement échançées en cœur à leur base, onduleuses & rugueuses. Les fleurs forment des grappes ou pluôt des épis très-simples, axillaires : chaque fleur est pédiculée, & contient quatre étamines. Les baies sont remarquables par leur grosseur.

Cette plante croît dans l'Amérique. (V.)

#### 5. RIVINE à larges feuilles. *Rivina latifolia*. Lam.

*Rivina floribus tetrandris, purpureo-fuscis; baccis fœcis; foliis lato-ovatis, levibus.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 324. n°. 1598.

Cette espèce est remarquable par ses grandes & larges feuilles, & par ses baies bien moins succulentes que dans les autres espèces.

Cette plante a des tiges fistuleuses, herbacées, verdâtres, rameuses, très-lisses, presque cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétiolées, glabres, ovales, acuminées, entières à leurs bords, très-larges, vertes à leurs deux faces, supportées par des périoles grêles, presque aussi longs que les feuilles, marquées de nervures latérales, simples, alternes.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires vers l'extrémité des rameaux, grêles, simples, un peu plus courts que les feuilles. Le calice est court, d'un pourpre brun, divisé en quatre découpures

ovales, un peu saignées. Il renferme quatre étamines, un style très-court, auquel succède une baie globuleuse, sèche ou à peine charnue.

Cette plante croît à l'île de Madagascar, où elle a été recueillie par Joseph Martin, & communiquée à M. Lamarck. (V. f. in herb. Lam.)

#### 6. RIVINE à fleurs unilatérales. *Rivina secunda*. Ruiz.

*Rivina foliis ovatis, acuminatis, obsolete denticulatis, ciliatis; racemis longis; calice bipartito, bilabiato.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 65. tab. 102. fig. 2.

Sous-arbrisseau, dont les tiges sont droites, hautes de deux pieds, glabres & cylindriques à leur partie inférieure, anguleuses, médiocrement rameuses à leur partie supérieure, légèrement pubescentes, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-entières, ovales, oblongues, acuminées, glabres à leurs deux faces, ciliées & un peu denticulées à leurs bords, supportées par des périoles canaliculés, légèrement pubescents, de couleur purpurine.

Les fleurs sont en grappes axillaires, terminales, solitaires, simples, courtes & lâches, droites & plus longues à l'époque de la fructification. Les fleurs, d'abord éparées, deviennent ensuite unilatérales. Les pédicules sont munis à leur base d'une bractée concave, subulée. Le calice est blanchâtre, à deux divisions principales, une supérieure plus courte, entière; une inférieure à trois découpures ovales, inégales; celle du milieu plus longue. Il renferme quatre filaments égaux, setacés, surmontés d'anthères ovales, setacées. L'ovaire a la forme d'une lentille, à peine pédiculé; il lui succède un petit fruit sec, noirâtre, farineux.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts des Andes; elle fleurit dans l'été. (V. Descript. ex Ruiz & Pav.)

**RIVULAIRE.** *Rivularia*. Genre de plantes acotylédones, cryptogames, de la famille des algues, qui a de grands rapports avec le *tremella* & les *alga*, & qui comprend des herbes aquatiques, d'une substance gélatineuse, un peu ferme, dont la nature, & surtout la fructification ou la propagation, est encore inconnue.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Une membrane cartilagineuse, couverte d'un enduit gélatineux, divisée en lobes de diverses formes.

*Observations.* Les rivulaires diffèrent des *tremella* ou *neotheca*, en ce que ces derniers sont composés d'une enveloppe membraneuse, remplie d'une matière gélatineuse. C'est presque le contraire dans les rivulaires. La membrane cartilagineuse est dans l'intérieur, & une substance gélatineuse la revêt

extérieurement. Elles paroissent tenir le milieu entre les *tremella* & les *alga*, mais celles-ci sont beaucoup plus fermes, & n'ont rien de gélatineux; elles diffèrent des *harrachosfermes*, genre nouveau établi par Roth, en ce que dans ces derniers la galée extérieure ne recouvre que des filaments, & non une membrane cartilagineuse.

### ESPÈCES.

#### \* Expansions presque feuillées.

1. RIVULAIRE en corne de daim. *Rivularia cornu dama*. Roth.

*Rivularia frondibus teretibus, ramosis, papillofis, glaucis; ramis divaricatis, ad diversas dilatatis; ramulis abbreviatis.* Roth, Catal. Bot. Fasc. 1. pag. 212. tab. 6. fig. 2. — Idem, Tentam. Flor. germ. pag. 544. n°. 1.

*Uva* (incrassata), gelatinosa, plana, fissato-dentata, viridis, margine incrassato. Hudf. Flor. angl. edit. 2. n°. 21. ?

*Tremella palustris, gelatinosa, dama cornuum facie.* Dillen, Hist. Musc. pag. 51. tab. 10. fig. 10.

*Conserva gelatinosa, dama cornuum representans.* Rai, Synopf. Stirp. brit. edit. 8. pag. 61. n°. 17.

Ses expansions sont un peu arrondies, glabres, rameuses, médiocrement comprimées, de la grosseur d'une plume de pigeon, rameuses, chargées de petits mamelons saillans; les ramifications courtes, glabres, presque bifurquées, luisantes, transparentes, d'un vert gai, un peu fermes, recouvertes d'une substance molle, charnue, marquée de quelques linéamens grisâtres, droits ou courbés en divers sens; les divisions très-irrégulières, un peu plus épaisses à leur sommet, imitant assez bien une corne de daim.

Cette plante croît en petites touffes dans les eaux douces, surtout à l'ombre; elle est attachée sur les pierres, & agitée par le plus léger mouvement de l'eau.

Roth rapporte à cette espèce, avec doute, le *fucus fontanus, pinguis, corniculatus, viridis*. Vaill. Botan. pag. 59. n°. 1. tab. 10. fig. 3. que nous avons cité, avec doute, au *riccia fontans*.

2. RIVULAIRE confervoides. *Rivularia confervoides*.

*Rivularia frondibus compressis, ramosis, cernitis filamentis brevibus geniculatis, cristallinis, subramosis.* Roth, Catal. Bot. Fasc. 1. pag. 213. n°. 2. tab. 6. fig. 3. — Idem, Tentam. Flor. germ. 545. n°. 2.

*Tremella palustris, gelatinosa, tenerima, musci ficiifolia facie.* Dillen, Hist. Musc. pag. 51. tab. 10. fig. 11.

*Conserva gelatinosa, tenerima & viridissima, muscum quædam ficiifolium representans.* Rai, Synopf. Stirp. britan. edit. 3. pag. 61. n°. 18.

Cette plante offre plusieurs expansions à peine longues d'un pouce, très-minces, souvent rameuses presque dès leur base, plus élargies à l'origine de leurs divisions, solides, comprimées, transparentes, chargées sur leur superficie de filaments très-fins, à peine longs d'une ligne, simples ou un peu rameux; ce qui donne à cette espèce l'apparence d'une conferve. Les ramifications sont alternes, quelquefois opposées, divariquées, toudivées, obtuses.

Cette espèce croît dans les ruisseaux, sur les pierres qu'elle recouvre d'un vert agréable.

3. RIVULAIRE à feuilles de chicorée. *Rivularia endivia*.

*Rivularia fronde suborbiculata, planiuscula, lacunosa, palmato-multifida; cernitis filamentis geniculatis, brevibus, cristallinis; ramulis teretibus, truncatis.* Roth, Nov. Plant. Spec. in 1800. 3. pag. 5. — Idem, Tentam. Flor. germ. pag. 546. n°. 3.

Cette plante forme fois les eaux de petites rêtes arrondies, élevées d'un pouce & plus, d'un vert gai; ses expansions sont siliques, sessiles, presque orbiculaires, en forme de petit bouclier à leur base; planes, lacuneuses, transparentes, rameuses; les ramifications presque palmées, à plusieurs divisions, chargées extérieurement de filaments courts, articulés, cristallins.

On trouve cette plante dans le fond des eaux, sur le bord des lacs, fixée sur des vieilles tiges, sur des chaumes de graminées à demi pourries.

4. RIVULAIRE linkie. *Rivularia linkii*. Roth.

*Rivularia frondibus tubulosis, inferni rectiusculis, superni dilatatis, ramosis, sinuatis; filis intra substantiam simplicibus, intricatis, serpentiformi-crispatis, submoniliformibus.* Roth, Beytr. Botan. 165. n°. 4.

Sa substance est molle, tendre; elle offre des expansions presque semblables à de petits tubes, un peu redressés à leur partie inférieure, dilatés vers leur sommet où ils deviennent rameux, contenant dans leur intérieur quelques fils simples, entortillés, crépus, sinués & presque en collier.

Cette plante croît dans les lieux humides & aquatiques.

#### \*\* Expansions globuleuses.

5. RIVULAIRE élégante. *Rivularia elegans*. Roth.

*Rivularia globosa, solida; filamentis intra substantiam vagis, dichotomis; ramis divaricatis; ramulis fissigatis, secundis, geniculis oscuris, articulis cylindricis.* Roth, Beytr. Botan. pag. 269. n°. 5.

Cette

Cette espèce & les suivantes ont une forme globuleuse. Celle-ci est d'une substance ferme, de la grosseur d'un grain de moutarde; on distingue dans son intérieur des filaments diffus, dichotomes, dont les divisions sont écartées entr'elles, & les dernières ramifications réunies en pyramides, & toutes portées du même côté; les articulations cylindriques.

Cette plante croît dans les fossés aquatiques, sur les feuilles mortes du *myriophyllum verticillatum*.

6. RIVULAIRE en forme de pois. *Rivularia pisiformis*, Roth.

*Rivularia globosa, solida; filamentis intra substantiam rectis, torulosis, geniculatis, à basi ramosis, concentricis; ramis ramulisque alternis, remotis, geniculis tenuissimis, contrahitis; articulis ovalibus.* Rqth. Beytr. botan. 272. n°. 6.

Substance solide, en globules arrondis: les filaments qui y sont renfermés sont droits, noueux, géniculés, rameux dès leur base, concentriques; les rameaux & leurs divisions alternent & concentriques; les articulations très-gréles, resserrées.

On trouve cette plante dans les lieux fangeux, aquatiques, sur l'*Hydrachis morsus ranae*.

7. RIVULAIRE dure. *Rivularia dura*, Roth.

*Rivularia globosa, solida, dura; filamentis intra substantiam rectis, subtorulosis, geniculatis, concentricis, inferius simplicibus, superius dichotomis; ramis parallelis, adpressis, aequalibus, sagittatis; geniculis subcontrahitis, articulis ovalibus.* Roth. Beytr. bot. pag. 273. n°. 7.

*Tremella globulosa, spherica, sparsa, superficie plana, amara viridis.* Roth. Flor. germ. vol. 3. pars 1. pag. 551. (Excluso synonymo Hedwigii.)

8. *Rivularia utriculata, filamentis intra substantiam crassius aequalibus.* Roth. L. C.

*Tremella globulosa, exigua, spherica, amara viridis; partibus fradigeris ramulosis, articulatis.* Hedw. Theor. Generat. & Fructif. edit. 2. p. 217. tab. 36. fig. 1-6.

*Tremella verrucosa, subrotunda, utriculosa, superficie rotunda lobata, fusco-viridis.* Roth. Flor. germ. vol. 3. pars 1. pag. 554. (Excluso synonymo Mischlii.)

Cette rivulaire est d'un vert-gai, distribuée sur la surface des plantes aquatiques en petits globules épars, sphériques, fermes, un peu aplatis à leur sommet, contenant des filaments droits, médiocrement noueux, géniculés, concentriques, simples à leur partie inférieure, dichotomes à leur sommet, dont les ramifications sont égales, parallèles, les nœuds très-fermés, les articulations

Botanique. Tome VI.

ovales. La variété 8 est utriculée ou verruqueuse; les filaments égaux en épaisseur dans toute leur longueur, très-rameux.

Ces plantes croissent dans les fossés inondés, sur des plantes aquatiques.

8. RIVULAIRE ridée. *Rivularia rugosa*, Roth.

*Rivularia orbicularis, convexa, rugosa, solida; filamentis intra substantiam concentricis, superius ramosis; ramis ramulisque sparsis, remotis, subparallelis; summis fasciculatis, geniculis contrahitis.* Roth. Beytr. bot. pag. 280. n°. 8.

Ses expansions ont une forme orbiculaire, convexe; elles sont fermes, ridées, & renferment dans leur substance des filaments concentriques, rameux à leur partie supérieure; les rameaux & leurs divisions sont éparés, écartés, presque parallèles, les terminales fasciculées; les nœuds resserrés.

Cette plante croît dans le fond des fossés aquatiques, sur les portions pourries des plantes; elle devient plane en se desséchant.

9. RIVULAIRE verruqueuse. *Rivularia verrucosa*, Roth.

*Rivularia hemisphaerica, verrucosa, solida, atroviridis; filis intra substantiam simplicibus, intricatis, crispatis, geniculatis.* Roth. Beytr. bot. pag. 281. n°. 9.

Cette plante est solide, verruqueuse, d'un vert-foncé, d'une forme à demi sphérique; les filaments renfermés dans sa substance sont simples, crépus, entortillés, géniculés.

Elle croît dans les fossés aquatiques, sur le conservatoire reticulata.

10. RIVULAIRE anguleuse. *Rivularia angulosa*, Roth.

*Rivularia globoso-angulosa, cava, viridi-lutescens; filis intra substantiam simplicibus, subulatis, strictissimis, geniculatis; articulo primario globoso, hyalino.* Roth. Beytr. bot. pag. 283. n°. 10.

*Tremella natans, varia, fœdè viridis; partibus frugiferis simplicibus, subulatis; globulis pellucidissimis insistentibus.* Hedwig. Theor. Generat. & Fructif. edit. 2. p. 218. tab. 36. fig. 7-10. ? — Roth. Flor. germ. vol. 3. pars 1. pag. 551.

Cette espèce forme de petits globules anguleux, d'un vert-pâle ou foncé; les filaments qu'ils renferment sont simples, roides, subulés, géniculés; la première articulation est globuleuse, transparente, un peu verdâtre.

On trouve cette plante dans les ruisseaux; elle flotte à la surface des eaux.

E c

11. REVULVAIRE tuberculeuse. *Rivalaria tuberculosa*, Roth.

*Rivalaria orbicularis*, depressa, tuberculosa, cava; filamentis intrà substantiam in orbiculos multos distributis, à centro dichotomis, ramossissimis; ramis ramulisque approximatis, parvis, spurijs; summis fasciculatis. Roth. Beytr. pag. 286. n°. 11.

Cette plante offre, sur les pierres auxquelles elle adhère dans le fond des eaux, des petites plaques orbiculaires, creuses, un peu comprimées, crustacées, tuberculeuses, carrilagineuses, d'un vert pâle, quelquefois blanchâtres, larges d'une demiligne ou d'une ligne, épaisses de deux à trois lignes, contenant des filamens roulés en plusieurs cercles, d'où ils s'échappent par bifurcation, & deviennent très-rameux : leurs ramifications sont rapprochées, étendues ; les dernières fasciculées.

Cette espèce se rencontre dans les ruisseaux, sur les pierres.

RIZ. *Oryza*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs graminées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *erharta*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont disposées en panicules touffues.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, bivalve ; uniflore ; une corolle à deux valves naviculaires ; la valve extérieure profondément striée, arisée ; deux petites écailles intérieures ; six étamines ; deux styles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice uniflore, composé de deux valves fort petites, presque égales, acuminées.

2°. Une corolle à deux valves concaves, naviculaires, égales en longueur, comprimées latéralement ; l'extérieure plus large, cannelée, anguleuse, terminée par une longue arête.

Deux petites écailles latérales, opposées, intérieures, situées à la base de l'ovaire, rétrécies inférieurement, tronquées à leur sommet, caliculées.

3°. Six étamines, dont les filamens sont capillaires, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères bifides à leur base.

4°. Un ovaire turbiné, surmonté de deux styles capillaires, réfléchis, terminés par des stigmates en masse, plumeux.

Le fruit consiste en une seule semence grande, oblongue, fusiforme, obtuse à ses deux extrémités, blanchâtre, cornée, un peu comprimée, marquée de deux stries à chacune de ses faces.

#### ESPÈCES.

RIZ cultivé. *Oryza sativa*, Linn.

*Oryza folijs arundinaceis, glaberrimis ; panicula nutante.* (N.)

*Oryza sativa*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 475. — Mill. Dict. & Illustr. Icon. — Lam. Illustr. Gener. tab. 264. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 318.

*Oryza*, Matth. Comment. 326. Icon. — C. Bauh. Pin. 24. — Idem, Theatr. 479. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 514. tab. 296. — Camer. Epit. 192. Icon. — Dod. Pempt. 509. Icon. — L'obél, Icon. 39. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 407. — Cérard, Hist. 79. Icon. — Tab. rn. Icon. 277. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 451. — Catesb. Carol. 1. pag. 14. tab. 14. — Schaw. Specim. n°. 458. — Montb. Prodr. 6. — Motif. Oxon. Hist. 5. 6. 8. tab. 7. fig. 1. — Mater. medic. 97. — Roy. Lugd. Bat. 58.

Il suffit de nommer cette précieuse graminée pour rappeler tous les avantages qu'elle nous procure, & que l'industrie a mis à profit dans tous les climats dont la température & le sol en permettent la culture.

Ses tiges sont fibreuses, capillaires, touffues ; elles produisent plusieurs chaumes droits, épais, cylindriques, hauts de trois à quatre pieds, cannelés, articulés, lisses & glabres, garnis de feuilles larges, fermes, très-longues, striées, assez semblables à celles de nos roseaux, dont les gaines sont finement striées, très-longues, cylindriques, munies à leur orifice d'une large membrane ferme, glabre, entière ou fendue en deux.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en une belle panicule un peu serrée, longue, pendante à l'époque de la maturité, & dont les ramifications ou les taches sont rudes, comprimées, anguleux, un peu flexueux ; chaque fleur supportée par un pédicule court, épais à son sommet. Les valves calicinales sont très-petites, blanchâtres, persistantes ; celles de la corolle, bien plus grandes, creuses, naviculaires, enveloppent les semences comme dans deux valves capillaires. La valve extérieure est terminée par une longue arête droite, purpurine, un peu tortueuse, & qui manque très-souvent. Les semences sont blanches, oblongues, & varient par leur forme, leur grosseur, ainsi que la plante elle-même, comme toutes nos plantes céréales, qui fournissent par la culture un grand nombre de variétés.

Cette intéressante graminée, originaire de l'Inde, se cultive dans la plupart des pays chauds, dans l'Espagne, le Piémont, &c. aux lieux humides & marécageux. Ses semences sont un des principaux alimens des Indiens, & s'Orientaux & de beaucoup d'autres peuples : il s'en fait aussi parmi nous

une très-grande conformation. On peut faire de fort bon pain avec la farine de riz, & même, préparé de plusieurs manières différentes, il tient lieu du pain de froment dans les Indes. Non-seulement les Indiens en préparent des gâteaux & de la bouillie, mais ils en obtiennent encore, par la distillation, une liqueur spiritueuse qu'ils nomment *arak*, & qu'ils chargent de sucre & de divers aromates. Cette boisson les enivre plus promptement que ne pourroit le faire le vin le plus fort; enfin, une légère décoction de riz dans l'eau fait parmi eux la base ou le véhicule le plus usité pour la plupart des médicamens.

On doit considérer le riz dans deux états différens, d'où résultent les différentes opérations dont il est susceptible. Il est, ou renfermé dans ses bales & muni de son embryon, ou dépouillé de ses bales & privé de son embryon: c'est dans ce dernier état qu'il nous parvient sous le nom de *riz de commerce*. Lorsque l'on veut employer le riz à faire du pain, il faut lui conserver son germe ou son embryon, autrement il ne pourroit point ou presque point y avoir de fermentation. Voici comme les naturels de l'Amérique font du pain excellent avec la seule farine de riz.

La première façon que l'on donne au riz, est de le réduire en farine; ce qui se fait par le moyen d'un moulin, ou à défaut de la manière suivante. On fait chauffer de l'eau dans une marmite: lorsqu'elle est prête à bouillir, on y jette du riz en grains à discrétion: on retire aussitôt le vaisseau de dessus le feu, & on laisse tremper le riz du soir au matin: le riz tombe au fond: on jette l'eau qui le surnage, & on le met égoutter sur une râble que l'on a soin auparavant de disposer en pente. Lorsqu'il est sec, on le pile, & on le réduit en une farine que l'on passe par le tamis le plus fin que l'on peut avoir.

On prend de cette farine ce que l'on juge à propos, & on la met dans le coffre qui sert ordinairement à faire le pain; en même temps on fait chauffer une quantité d'eau suffisante dans une chaudière, où l'on jette quatre jointées (les deux mains jointées) de riz en grains, que l'on fait bouillir & crever. Lorsque cette substance épaisse & gluante est un peu refroidie, on la verse sur la farine, & on pétrir le tout ensemble en y ajoutant du sel & du levain: on le couvre ensuite de linges chauds, & on laisse lever la pâte. Dans la fermentation, cette pâte, de ferme qu'elle étoit, devient liquide comme de la bouillie, & paroitroit pouvoir être utilement employée pour faire du pain; mais voici de quelle manière on s'y prend.

Pendant que la pâte lève, on a soin de faire chauffer le four, & lorsqu'il est convenablement chaud, on prend une caillerolle étamée, emmanchée dans une perche assez longue pour qu'elle puisse atteindre jusqu'au fond du four. On met un

peu d'eau dans cette caillerolle: on la remplit ensuite de pâte, & on la couvre avec quelques grandes feuilles de plantes ou de papier. Les choses ainsi disposées, on enfourne la caillerolle, & lorsqu'elle est dans le four à la place où l'on veut mettre le pain, on la renverse promptement. La chaleur du four fait la pâte, l'empêche de s'étendre, & lui conserve la forme que la caillerolle lui a donnée. Ce pain fort du four aussi jaune & aussi beau que les pâtisseries que l'on a dorées avec un jaune d'œuf. Il est d'autrui bon goût qu'appétissant à l'œil, & il se trempe dans le bouillon comme le pain de froment; mais il perd de sa qualité quand il est un peu rassis.

Les matelots indiens préparent avec le riz une espèce de mets qu'ils nomment *awols*, & dont ils se servent à la place du biscuit. Voici comme ils s'y prennent. L'on met du nelly, c'est-à-dire, du riz dépouillé de sa balle, tremper dans de l'eau déjà un peu tiédie par le feu ou par le soleil; il y reste vingt-quatre heures. On l'étend ensuite à l'ombre sur des nattes, où il doit égoutter pendant une heure ou deux: alors quelques poignées de ce *nelly* étant mises dans un vase de terre préalablement bien chauffé sur un feu ardent, on l'y remue jusqu'à ce que la chaleur du feu le fasse crever. Aussitôt il faut le rôtir, & pendant qu'il est encore chaud, il doit être pilé, non pas pour le réduire en farine, mais assez seulement pour faire détacher l'enveloppe du grain, & écaler celui-ci de façon qu'il demeure aplati. Telle est la préparation des *awols*. Une poignée mise avec du sucre dans de l'eau, dans du lait chaud ou froid, rend promptement & fournit un aliment sain.

Nous n'entrerons pas dans le détail des différentes préparations que l'on fait subir au riz de commerce: nous nous bornons à en citer quelques-unes moins connues, & qui abrègent infiniment le travail nécessaire pour le convertir en aliment. Nous avons déjà remarqué que ce riz, étant mondé & n'ayant plus de germe, ne connoit qu'une substance mucilagineuse, amilacée, & qu'il n'a voit point ou presque point de substance muqueuse fermentescible.

La première méthode fournit le moyen d'en avoir toujours de tout prêt à employer, soit dans le bouillon gras, soit dans le lait. Elle est des plus simples. On met du riz dans un sac de toile que l'on coud ensuite; on le fait crever & cuire dans l'eau. On le retire & on le laisse égoutter pendant quatre ou cinq heures, puis on ouvre le sac, & on étend le riz sur une nappe blanche ou sur une râble pour le faire sécher au même point qu'il étoit en premier lieu. Il acquiert par-là un goût plus fin & plus agréable. Lorsqu'il est bien sec, on le ramasse & on le serre; il se conserve très-long-temps. Pour en user dans le moment, il suffit de faire chauffer le bouillon ou le lait, & d'en mettre de

E e a



dans ce que l'on juge à propos, en couvrant le vase pendant un demi-quart d'heure.

Quand on veut faire cuire le riz sans aucune préparation précédente, au lieu de le faire bouillir au feu pendant plusieurs heures de suite, il suffira de le mettre dans une quantité de lait ou d'eau convenable, y ajoutant tout de suite les assaisonnemens qu'on veut y faire entrer. Dès que le riz commence à bouillir, il faut enlever le vase, le bien fermer, & le placer entre deux matelas. Il achèvera de cette manière de se cuire sans aucun autre soin. Au bout de quatre ou cinq heures, il est bon à manger & très-délicat. Quand on n'y met pas trop d'eau, ce qui est le mieux, il forme une masse solide qu'on peut presque manger comme du pain.

Enfin, on fait avec le riz une boisson que les nègres nomment *diget*. On le fait cuire dans beaucoup d'eau, & on le laisse bouillir jusqu'à ce que l'eau soit toute évaporée. Il se forme au fond du chaudron un grain qui n'est point perdu : on le mange comme des galettes. On met alors ce riz cuit dans un pot ou dans une grande cruche contenant huit pintes, mesure de Paris : on l'y met à la quantité de deux pintes ; on y ajoute quatre bonnes poignées de farine de riz, & un peu de levain, après quoi on remplit la cruche d'eau, & on la laisse ainsi trois ou quatre jours, sans y toucher ni la couvrir. Le riz fermenté, & bout comme le vin nouveau dans le tonneau. La fermentation finie, la liqueur est faite & on peut la boire ; elle a un goût agréable & sucré ; elle rassasie, conforte l'estomac & engraisse. Le marc est aigrelet & sucré ; il n'est point mauvais à manger. Lorsqu'une fois une cruche a servi à faire cette boisson, il n'est plus besoin, quand on retient, d'y mettre du levain : la première fois suffit pour toutes.

Les Turcs se parent avec le riz un mets dont ils font continuellement usage, & qu'ils appellent *pilaw*. Ils prennent du riz, & après l'avoir lavé plusieurs fois dans de l'eau, ils le font cuire avec du jus de viande, & l'assaisonnent avec du sel & du safran : c'est un mets très-vanté parmi tous les Orientaux.

Le riz est une excellente nourriture pour toutes sortes de personnes ; mais il convient plus particulièrement aux personnes qui suivent peu, aux estomacs délicats, épuisés par les maladies, & à tous ceux qui ont souffert des pertes excessives par les hémorragies ; il adoucit l'acreté du sang, & modère le cours de venue. On en fait une décoction qui est pectorale & altérante.

RIZOË à feuilles ovales. *Rizoa ovatifolia*. Cav.

*Rizoa herbacea, foliis ovatis, serratis ; floribus paniculatis, axillaribus*. Ann. de Scienc. nat. vol. 3.

pag. 131. — Cavan. Icon. Plant. 6. pag. 56. n°. 670. tab. 578.

Genre de plantes de la famille des labiées, dont on ne connoît encore qu'une seule espèce. Il a pour caractère générique :

Un calice tubulé, à cinq dents égales ; le tube de la corolle très-long, divisé à son sommet en deux lèvres égales, la supérieure tripartite, l'inférieure bispate ; quatre étamines non saillantes.

Ses tiges sont herbacées, glabres, tétragones, hautes d'un pied & demi, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles opposées, ovales, dentées en scie ; les dentelures souvent obtuses & obliques, vertes à leur face supérieure, glauques en dessous, longues de douze à quinze lignes, supportées par des pétioles à peine longs de deux.

Les fleurs sont disposées en petites panicules axillaires, opposées, solitaires ou deux à deux, ramifiées par dichotomies munies à leur base de deux petites bractées tubulées. Le calice est vert, glabre, à cinq dents égales ; la corolle d'un rose clair, longue d'un pouce, les deux lèvres très-courtes ; les filamens & les anthères couleur de rose ; les semences ovales.

Chaque fleur offre : —

1°. Un calice tubulé, strié, persistant, à cinq dents.

2°. Une corolle tubulée, dont le tube, très-long, s'élargit insensiblement, & se divise en deux lèvres très-courtes, égales ; la supérieure droite, un peu relevée, à trois divisions courtes ; l'inférieure pendante, à deux dents.

3°. Quatre étamines dont les filamens sont filiformes, plus courts que le tube, insérés sur sa base, deux plus longs, terminés par des anthères ovales.

4°. Un ovaire partagé en quatre, surmonté d'un style un peu plus long que le tube, terminé par deux stigmates sétacés, divergens.

Le fruit consiste en quatre semences nues, ovales, situées au fond du calice.

Cette plante croît au Chili, où elle fleurit vers le milieu de l'hiver. (*Descript. ex Cavan.*)

RIZOLE. *Oryzopsis*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a quelques rapports avec le riz, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles intruses, un peu piquantes, & les fleurs grandes, paniculées, toutes hermaphrodites.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux valves uniflores ; celles de la corolle environnées à leur base d'un anneau dur ; deux appendices linéaires ; trois étamines ; deux stigmates.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* bivalve, uniflore, dont les valves sont inégales, larges, ovales, concaves, un peu étendues, l'extérieure un peu plus large & plus courte que l'intérieure.

2°. Une *corolle* bivalve, entourée à sa base d'un anneau court, pubescent, barbu ; la valve extérieure coriace, terminée par une arête sétacée, l'intérieure linéaire, très étroite, enveloppée par l'extérieure.

Deux appendices linéaires, de la longueur de l'ovaire.

3°. Trois *étamines* dont les filamens sont capillaires, terminés par des anthères longues, linéaires, légèrement bifides à une de leurs extrémités, un peu barbues à l'extrémité opposée.

4°. Un *ovaire* oblong, surmonté d'un style un peu saillant, sétacé, comprimé, un peu pubescent sur ses bords, terminé par deux stigmates capillaires, légèrement pubescent & glanduleux.

Les semences....

## E S P È C E.

RIZOLE à feuilles rudes. *Oryzopsis asperifolia*.

*Oryzopsis calmo subnudo ; foliis rigidulis erectis, subpungentibus, asperis.* Mich. Fl. r. boreal.-amer. vol. 1. pag. 51. tab. 9.

Cette graminée, considérée extérieurement, a l'aspect du riz ; elle pousse des racines fibreuses, capillaires, d'où s'élèvent plusieurs chaumes assez hauts, presque nus, glabres, filuleux, articulés, garnis inférieurement de feuilles médiocrement larges, très-longues, droites, roides, rudes au toucher, très-aiguës & même un peu piquantes à leur sommet : les feuilles qui garnissent les tiges sont très-courtes, fort aiguës, à peine aussi longues que leur gaine.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, droite, peu garnie ; les pédoncules sont presque simples, longs, filiformes, épars ou alternes, uniflores. Les épillets, assez gros, ne contiennent qu'une seule fleur. Les calices sont assez grands, composés de deux valves larges, ovales, nerveuses, liriées. La corolle, à peine plus longue que le calice, est bivalve ; la valve extérieure est lisse, coriace, ovale, cylindrique, terminée par une arête droite, longue, sétacée, entièrement fermée & enveloppant la valve intérieure, qui est bien plus étroite, mince, presque linéaire : il existe encore deux autres valves en forme d'appendice, qui accompagnent l'ovaire.

Les filamens des *étamines* sont de la longueur de la corolle, & renfermés dans la valve extérieure : c'est du sommet entr'ouvert de cette dernière que sortent trois anthères longues, linéaires, pendantes, barbues à une de leurs extrémités. Le style est un peu saillant au sommet de l'ovaire, & se divise en deux stigmates glanduleux & pubescens.

Cette plante a été découverte par Michaux dans l'Amérique ; elle croît le long des montagnes qui règnent depuis la baie d'Hudson jusqu'à Québec. (*Descript. ex Mich.*)

ROBINIER. *Robinia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *pisidia* & les *caragana*, qui comprend des arbres ou arbrisseaux exotiques à l'Europe ; ailés avec une impaire, dont les folioles sont articulées & arillées à leur base, munies de stipules séparées des pétioles, & dont les fleurs sont disposées en grappes axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un *calice* fort petit, entier, tronqué ou à quatre lobes peu marqués ; des *étamines* diadelphiques ; un *stigmate* velu antérieurement ; une *gousse* oblongue, comprimée, à plusieurs semences aplaties.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, fort petit, campanulé, dont l'orifice est tronqué ou marqué de quatre lobes quelquefois peu sensibles, inégaux, souvent le supérieur bifide.

2°. Une *corolle* papilionacée, dont l'étendard est grand, presque arrondi, obtus ; les ailes ovales, oblongues, libres, munies d'un appendice tress-cout & obtus ; la *carène* presque à demi orbiculaire, obtuse, comprimée, de la longueur des ailes.

3°. Dix *étamines* diadelphiques, ascendantes, munies d'anthères arrondies.

4°. Un *ovaire* oblong, un peu comprimé, surmonté d'un style filiforme, un peu courbé à son sommet, terminé par un stigmate velu à sa partie antérieure.

Le fruit est une gousse assez grande, oblongue, comprimée, renfermant plusieurs semences aplaties.

Observations. Le genre *robinia* de Linné comprenoit des espèces qui pouvoient être aisément distribuées en deux genres, à raison de la différence que présentoient plusieurs parties de leur fructification, & même leur port extérieur. M. La-

marck a exécuté cette réforme, & a établi le genre *caragana* qui a été mentionné dans cet ouvrage, & depuis gravé dans les *Illustrations des Genres*.

Les *robinia*, tels que nous les présentons ici, diffèrent des *caragana* par leurs gouffes comprimées, ainsi que les semences qu'elles renferment; par leur stigmate velu, tandis que dans les *caragana* les gouffes sont enflées ou cylindriques, contenant des semences presque globuleuses; leur stigmate est glabre; de plus, leurs feuilles sont assez généralement ailées sans impaire, & souvent leur pétiole se prolonge & se termine par une pointe épineuse; ce qui n'a pas lieu dans les *robinia* dont les feuilles ailées se terminent par une impaire.

## E S P È C E S.

1. ROBINIER faux acacia. *Robinia pseudo-acacia*. Linn.

*Robinia racemis pedicellis unifloris, foliis imparipinnatis, stipulis spinosis*. Linn. Syst. veget. pag. 668. n°. 1. — Hort. Upf. 212. — Munting. tab. 8. — Miller, Dict. n°. 1. — Duroi, Harbk. 2. pag. 320. — Kniph. Centur. 3. n°. 76. — Willd. Arb. 298. — Wemgenh. Amer. 26. tab. 7. fig. 9. — Lam. Illustr. Genar. tab. 606. n°. 1. — Gært. de Fruct. & Sem. Plant. Centur. 9. tab. 145. fig. 2.

*Robinia aculeis geminatis*. Hort. Cliff. 354. — Gronov. Virg. 105. — Roy. Lugd. Bat. 372. — Duham. Arb. vol. 2. tab. 42.

*Robinia racemis pedicellis unifloris, foliis imparipinnatis, stipulis spinosis, leguminibus levibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1131. n°. 1.

*Acacia americana, filiquis glabra*. Rai, Hist. 1719. — Seba. Musc. t. tab. 15. fig. 1.

*Acacia affinis virginiana, spinosa; filiqua membranacea, plana*. Pluk. Almag. 9. pag. 73. tab. 4.

*Pseudo-acacia vulgaris*. Tournef. Inst. R. Herb. 649. tab. 417.

*Robinia (pseudo-acacia), stipulis spinescentibus; foliis imparipinnatis, racemis cernuis seu pendulis, calicis dentibus mutatis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 65.

C'est un grand & bel arbre, dont la cime se divise en branches diffuses & en rameaux souples, plians, allongés, de couleur brun-rouge, luisants, garnis, particulièrement dans leur jeunesse, de fortes épines à lent insertion & même à la base des pédoncules, chargés de feuilles longues, pétioles, alternes, ailées avec une impaire, composées de quinze à vingt-cinq folioles glabres, pédoncules, presque opposées, ovales, presque elliptiques, entières à leurs bords, vertes à leurs deux

faces, & dont la base est articulée avec le sommet de leur pétiole. Les épines qui accompagnent les pétioles à leur base, sont regardées par plusieurs botanistes comme des stipules.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, de belles grappes latérales, terminales, pendantes, d'une odeur très-agréable, & qui se répand au loin. Ces grappes sont simples, composées de fleurs blanches, papilionacées, soutenues par des pédoncules plus courts que la corolle, filiformes, articulés comme les pédicules des folioles. Les calices sont campaniformes, courts, à quatre dents ou lobes obtus; les gouffes planes, comprimées, oblongues, relevées en bosse, contenant des semences un peu aplaties & en forme de rein.

Cette plante croît naturellement dans l'Amérique, depuis le Canada jusque dans la Caroline. h (P. v.)

Les semences de ce bel arbre ont été apportées pour la première fois à Paris par M. Robin, où elles ont si bien réussi, qu'aujourd'hui cet arbre peut être regardé comme une acquisition assurée, & rivaliser avec plusieurs arbres de nos forêts. Il croît facilement, & pousse très-vite pendant les premières années de sa jeunesse. Ses feuilles donnent une ombre légère, peu épaisse; ses fleurs paroissent vers le milieu du printemps leur odeur approche de celle des fleurs de l'oranger; & elles passent un peu vite; & ses feuilles tombent également de bonne heure: c'est néanmoins un arbre très-agréable dans les bosquets.

Son bois est d'un jaune verdâtre, marbré, assez joli. On en fait des meubles d'agrément; il est fort dur, ne reçoit que médiocrement le poli, & se fend très-aisément. Il est aussi employé pour les pièces de construction des moulins; il résiste très-long-temps à l'action de l'air & de l'eau. Ses racines sont jaunes, douces, sucrées, pectorales, & ont la faveur de la réglisse. On fait avec ses fleurs un sirop agréable: les belliaux se nourrissent de ses jeunes pousses.

2. ROBINIER visqueux. *Robinia viscosa*. Vent.

*Robinia racemis axillaribus, ovatis, erectis; foliis imparipinnatis, ramis viscoso-glandulosis*. Venten. Jard. de Cels. pag. 4. tab. 4.

*Robinia racemis pedicellis, unifloris; foliis imparipinnatis, ramis leguminibusque glanduloso-viscosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1131. n°. 2.

*Robinia montana*. Bart.

*Robinia (viscosa), ramis, petiolis pedunculisque glanduloso-viscosis; foliis imparipinnatis; racemis axillaribus, confertis; calicibus acuminateis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 65.

Cet arbre peut rivaliser, par sa grandeur & sa

force, avec le *robinia pseudo-acacia*. Il en diffère par sa viscosité & par ses fleurs couleur de rose.

Son tronc est très-gros, revêtu d'une écorce cendrée, mué d'aiguillons dans sa jeunesse, divisé en rameaux nombreux & en branches alternes, & es-étalées, chargées d'aiguillons & de glandes visqueuses; les jeunes rameaux velus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées avec une impaire, composées de dix-neuf à vingt-une folioles alternes, presque sessiles, ovales, obtuses, entières, terminées par une petite pointe, d'un vert foncé à leur face supérieure, plus pâles en dessous, munies de quelques poils rares & couchés. La base du pétiole commun est garnie de deux aiguillons ou stipules roides, piquantes, bulbuleuses; il n'en existe qu'une à l'insertion de chaque foliole sur le pétiole commun.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, droites, solitaires, axillaires, plus courtes que les feuilles. Les pedoncules sont pubescents, glanduleux, cylindriques, articulés & renflés à leur base, divisés en peucils simples, plus courts que les fleurs, épars, garnis de bractées concaves, oblongues, acuminées, pubescentes, rougeâtres en dehors, blanches en dedans, aussi longues que les fleurs. Leur calice est rougeâtre, pubescent, tubuleux, divisé à son orifice en quatre dents aiguës, une supérieure plus large, légèrement brisée. La corolle mûre, d'une belle couleur de rose, dont tous les pétales sont onguiculés. Les filamens sont disposés en deux paquets; les anthères arrondies d'un beau jaune; l'ovaire pédiculé, pubescent, auquel succède une gousse comprimée, oblongue, relevée en bosse à ses deux faces, chargée de poils nombreux, glanduleux & rouflâtres, renfermant trois à six semences réniformes, comprimées.

Cet arbre a été découvert, par Michaux, dans la Caroline méridionale, sur les monts Alleghanis. Il est aujourd'hui cultivé dans plusieurs jardins de France, particulièrement dans celui de M. Cels. M. Ventenat est le premier qui a décrit & figuré ce bel arbre. (V. v.)

Le *robinia viscoso* a les plus grands rapports, par sa végétation, avec le *robinia pseudo-acacia*. Il croît avec la même rapidité, & son bois, qui a le même grain, se fend aussi facilement. Cet arbre est un des plus beaux que l'on puisse cultiver: la verdure foncée de son feuillage, & les grappes nombreuses de fleurs couleur de rose, dont les jeunes rameaux sont chargés, forment un contraste qui flatte agréablement la vue.

M. Vauquelin a analysé l'humour visqueux qui se trouve principalement sur l'épiderme des jeunes branches de cet arbre, & cet ar habile chimiste a reconnu qu'elle étoit un produit nouveau du règne végétal. (Pencat, l. c.)

3. ROBINIER à fleurs violettes. *Robinia violacea*. Linn.

*Robinia racemis pedicellis, unifloris; foliis imparipinnatis, caule inermi*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1044.

*Robinia racemis pedicellis, bifloris; calicibus truncatis, foliis imparipinnatis, caule inermi*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1131. n°. 3.

*Robinia inermis, pedunculis racemosis, partialibus bifloris, foliis imparipinnatis*. Jacq. Stirp. Amer. 210. tab. 77. fig. 40.

*Pseudo-acacia, floribus violaceis*. Plum. Spec. Amer. 19.

Arbrisseau de la hauteur d'environ douze pieds, dont le tronc est droit, sans épines, divisé en rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, très-nombreuses, composées de folioles au nombre de sept à onze, opposées, pétiolées, entières, ovales, obtuses, échancrées à leur sommet, luisantes, longues d'environ deux pouces.

Les grappes de fleurs sont axillaires, longues d'un demi-pied, divisées en pedoncules courts, nombreux, biflores; les fleurs sont de couleur d'un bleu-violet, comme celles de la violette odorante, dont elles ont aussi l'odeur agréable. Leur calice est campanulé, entier à ses bords, fort petit. La corolle est papilionacée; l'étendard est ample, presque rond, échancré, à peine onguiculé; les deux ailes ovales, obtuses, munies de longs ongles; la carène semblable aux ailes, les filamens diadelphes; les anthères oblongues, pendantes; les gousses oblongues, comprimées; les semences planes, réniformes.

Cette plante croît en Amérique, dans les environs de Carthégène. (V.)

4. ROBINIER hispide. *Robinia hispida*. Linn.

*Robinia racemis axillaribus; foliis imparipinnatis; caule inermi, hispido*. Linn. Syst. Plant. pag. 668. Mantiss. 101. — Duroi, Harbk. 2. pag. 325. — Willd. Arbt. 398. — Wangeh. Amer. 58.

*Robinia foliis imparipinnatis; foliolis ovatis, ramis pedunculisque hispida*. Mill. Dict. & Illustr. Icon. 163. tab. 244.

*Pseudo-acacia hispida, floribus roseis*. Catesb. Carol. 3. pag. 20. tab. 20.

*Robinia (hispida), caule subinermi, hispissimum; foliis imparipinnatis; foliolis rotundo-ovalibus, mucronatis; racemis axillaribus, calicibus acuminatis*. Mich. Flor. borel.-amer. vol. 2. pag. 63.

Cette espèce est très-distincte par ses belles & grandes fleurs, & par les poils roides dont sont garnis ses tiges & ses calices.

C'est un arbrisseau assez fort, qui s'élève depuis six à dix piéds, jusqu'à vingt & plus. Son tronc se divise en rameaux étalés, un peu pendans, rarement épineux, velus, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées de folioles alternes, pédiculées, larges, ovales ou presque rondes, presque glabres, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, obtuses à leur sommet, & souvent munies d'une petite pointe courte, articulées sur leur pédicule. Les pétioles sont un peu comprimés, très, hispides, & supportent treize à quinze folioles.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, presque simples, rapprochées, à l'extrémité des rameaux, peu pendans, garnis de belles & grandes fleurs papilionacées, de couleur de rose, quelquefois mélangées de pourpre: leur calice est ample, court, d'un brun-roussâtre, très-hispide, ainsi que les pédoncules, divisé à son orifice en cinq dents aigues, acuminées. La corolle est au moins une fois aussi grande que celle du *Robinia pseudo-acacia*; elle n'a point d'odeur.

Cet arbrisseau croît sur les hautes montagnes de la Caroline. On le cultive dans un grand nombre de jardins. Il fait l'ornement des bosquets. Ses fleurs paroissent vers le milieu du printemps. Il est plus délicat que le *Robinia pseudo-acacia*. N'en possédé des exemplaires que M. Boiss m'a communiqués, & qu'il a recueillis dans la Caroline.  $\text{H}$  (V. v.)

#### 5. ROBINIER strié. *Robinia striata*. Willd.

*Robinia racemis pedicellis unifloris; foliis imparipinnatis, subius pubescentibus; caule inermi.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1132.

C'est un arbrisseau assez élevé, qui se divise en rameaux d'un vert-pâle, verruqueux, dépourvus d'épines, garnis de feuilles longues d'un demi-pied, alternes, pétiolées, ailées avec une impaire, composées d'environ quinze à vingt-cinq folioles alongées, longues d'un pouce, arrondies à leurs deux extrémités, veinées & striées, luisantes à leur face supérieure, chargées à leur face inférieure de poils couchés, munies à leur base de stipules caduques, lancéolées.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, plus courtes que les feuilles; chaque fleur pédiculée, garnie à la base des pédicules de bractées très-courtes, subulées. Les calices sont campanulés, pubescens, ainsi que les pédoncules, divisés à leur orifice en quatre découpures, la supérieure biffée. La corolle est jaune.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique.  $\text{H}$  (Description, ex Willd.)

#### 6. ROBINIER écailléux. *Robinia squamosa*. Vahl.

*Robinia racemis pedicellis unifloris; foliis imparipinnatis; foliolis ovalibus, spinoso-mucronatis; pe-*

*tiolis inermibus.* Vahl. Symbol. vol. 3. pag. 88. tab. 69.

Arbrisseau dont les branches sont glabres, cylindriques, grises ou de couleur purpurine, nues à leur partie inférieure, feuillées supérieurement, écaillées entre les feuilles, divisées en rameaux très-courts, alternes, longs d'un pouce au plus, presque tétraègones, chargés d'écaillés imbriquées, ovales, acuminées. Les feuilles sont alternes, distantes, situées vers l'extrémité des rameaux ou à leur sommet, ordinairement au nombre de deux ou trois, toutes pétiolées, ailées avec une impaire, composées d'environ dix-neuf folioles légèrement pédiculées, alternes, longues d'environ six lignes; les supérieures plus petites, toutes ovales ou un peu arrondies, glabres & luisantes à leurs deux faces, veinées, obtuses, & dont la nervure principale se prolonge à leur sommet en une pointe épineuse. Les pétioles sont glabres, munis à leur base de deux épines roides, droites, perfoliantes.

Les fleurs sont disposées en petites grappes courtes, foliaires, axillaires, supportées par des pédoncules filiformes & pubescens, plus courts que les feuilles, garnis de quatre ou cinq fleurs distantes, dont les pédicules sont géniculés vers leur sommet, munis à leur base d'une petite bractée linéaire. Le calice est glabre, divisé à son orifice en découpures lancéolées. Les gouffes sont étroites, linéaires, comprimées, droites, aigues, presque articulées, renfermant de deux à cinq semences.

Cette plante croît en Amérique, dans l'île de Saint-Thomas.  $\text{H}$  (V. f. in herb. Juss.)

#### 7. ROBINIER à larges feuilles. *Robinia latifolia*.

*Robinia racemis pedicellis unifloris, ramis inermibus, foliis imparipinnatis, foliolis lanceolato-acuminatis.* (N.)

*Pseudo-acacia latifolia, flore roseo.* Plum. Spec. 19. — Icon. Mll. 7. tab. 146. — Surin. Herb. n°. 782.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, striés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de treize à quinze folioles grandes, lancéolées, acuminées, entières à leurs bords, très-glabres, luisantes à leur face extérieure, d'un vert foncé, plus pâles en dessous, pédiculées, opposées, à nervures latérales, simples, alternes, sailantes.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, droites, simples, dont les pédoncules parriels sont simples, fermes, courts, épais, articulés, uniflores; le calice est campanulé, court, tronqué à ses bords, la corolle est grande, de couleur de rose; les gouffes comprimées, étroites, oblongues, aigues, terminées par une pointe un peu courbée en forme de bec.

Cette

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. (V. f. in herb. Juss.)

8. ROBINIER fleuri. *Robinia florida*. Vahl.

*Robinia pedunculis simplicibus, unifloris; foliis abrupte pinnatis, petiolis stipulifère inermibus*. Vahl. Symbol. 3. pag. 89. t. b. 70. — Willd. Spec. plant. vol. 3. pag. 1134. n° 11.

Je soupçonne que cette plante doit appartenir aux *caragana*, d'après le caractère de ses feuilles ailées, sans impaire; par ses folioles mucronées, ses pétioles prolongés en forme d'épine; mais comme ses fruits ne me sont pas connus, & que d'ailleurs elle n'a point été citée à l'article *Caragane*, dans ce Dictionnaire, j'ai cru devoir la mentionner ici, d'après M. Vahl.

Cet arbrisseau est d'un aspect très-agréable, surtout à l'époque de la floraison: les rameaux sont alors tout couverts d'un grand nombre de belles & grandes fleurs purpurines qui paraissent avant les feuilles. Ses riges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, ponctués, d'un pourpre-céclité. Les feuilles sont produites par les bourgeons de l'année précédente, après la chute des fleurs, réunies au nombre de deux ou trois à chaque point d'insertion, longues de deux ou trois pouces, étées, sans impaire, composées de folioles petites, à peine longues d'un demi-pouce: les feuilles supérieures sont foliaires, alternes, plus écartées; les folioles plus grandes, pétioolées, opposées, glabres, oblongues, veinées, mucronées à leur sommet, supportées par un pétiole commun, & pourvu d'aiguillons, ainsi que les rameaux; munies à leur insertion de stipules petites, lanceolées, souples, persistantes.

Les fleurs sont réunies au nombre de quatre ou cinq à chaque bourgeon, soutenues par des pédoncules uniflores, longs de cinq à six lignes, capillaires, articules vers leur sommet. Le calice est en forme de coupe, entier à ses bords, légèrement velu étant observé à la loupe. La corolle est grande, d'une belle couleur purpurine; les pétales sont munis d'onglets de la longueur du calice.

Cette plante croît dans plusieurs îles de l'Amérique, particulièrement dans celle de Saint-Jean. (V. f. in herb. Lam.)

9. ROBINIER panococo. *Robinia panacoco*. Aubl.

*Robinia foliis tomentosis, floribus purpureo-fulgentibus*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 769. tab. 307.

*Robinia (tomenosa), racemis pedicellis, unifloris; foliis impari-pinnatis, tomentosis; caule inermi*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1134.

Cet arbre, dit Aublet, est un des plus grands & des plus gros qu'il y ait dans la Guiane. Son

Botanique. Tome VI.

tronc s'élève à soixante pieds & plus; il a environ trois pieds de diamètre, composé à sa base de sept à huit côtes réunies, tellement écartées à leur partie inférieure, qu'elles forment des cavités de six à huit pieds de profondeur, sur autant de largeur; cavités entre lesquelles se retirent les bêtes fauves. L'écorce est brune, & laisse écouler une résine rougeâtre, liquide, qui se dessèche & devient noirette. Le bois est dur, compacte, rougeâtre; il noircit en vieillissant: son obier est blanc.

Cet arbre se divise en branches très-fortes & en rameaux tortueux, tendres, moelleux, striés, couverts d'un duvet roussâtre, garnis de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées de onze à quinze folioles, sessiles, opposées, de grandeur inégale, ovales, ridées, glabres en dessus, revêtues en dessous d'un duvet cendré, entières à leurs bords, acuminées, presque mucronées à leur sommet. Les pétioles sont velus, munis à leur base de deux stipules larges, arrondies, épaisses, concaves, couvertes d'un duvet brun, caduques.

Les fleurs sont disposées en grappes simples ou en épis à l'extrémité des rameaux. Leur calice est monophylle, divisé en cinq petites dents aiguës, inégales; la corolle rougeâtre; les étamines distichées, saillantes hors de la corolle; la gousse comprimée, allongée, aiguë à ses deux extrémités, bordée, droite à un de ses bords, convexe de l'autre, contenant quatre à cinq semences vertes, anguleuses.

Cette plante croît dans l'île de Caienne. (V. f. absc. flor. in herb. J. J.)

On emploie l'écorce de cet arbre dans les tisanes sudorifiques. Son bois est regardé comme incorruptible. On s'en sert dans les constructions des bâtimens, & particulièrement pour les cases qui sont entourées de palissades, où il se conserve très-long-temps. Lorsqu'on fait quelques entailles à l'écorce de cet arbre, il en découle une liqueur balsamique & résineuse assez abondante.

Les Indiens Noiraques, venus du Para; appellent cet arbre *pato-jumbo*, nom que lui donnent les Portugais. Il est appelé *anacoco* par les Galibis, & *bois-de-ser* par les habitants européens qui sont à Cayenne. (Aublet.)

Observations. Il me paroît fort douteux que cette espèce, dont les étamines sont saillantes, les gouffes bordées à leur contour, puisse convenir parfaitement à ce genre, dont elle s'écarte encore par son port & les feuilles. J'en dirai autant du *robinia nicou*, & des autres espèces à grandes feuilles épaisses, dont les fruits ne sont pas bien connus.

Le *robinia coccinea* d'Aublet, bien évidemment

FF

d'un genre différent, a été décrit par Swartz sous le nom de *sophora monosperma*.

10. ROBINIER nicou. *Robinia nicou*. Aubl.

*Robinia floribus purpureis, spicatis; ramulis scandentibus*. Aubl. Guian. vol. 2. pag. 771. tab. 308.

*Robinia* (scandens), *racemis pedicellis, unifloris; foliis impari-pinnatis; foliis ovato-oblongis, acuminatis; ramis inermibus, scandentibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1134. n°. 9.

Arbusteau dont le tronc, de deux à trois pouces de diamètre, se divise en grosses branches sarmen-teuses, & en rameaux qui s'étendent sur les arbres voisins & en couvrent la cime. Les feuilles sont alternes, pétioles, ailées, composées d'environ sept folioles opposées, pédiculées, lisses, vertes, entières, ovales, longuement acuminées à leur sommet, très-grandes, réticulées, munies à leur base de deux petites stipules caduques.

Les fleurs sont axillaires, disposées en épis. Leur calice est d'une seule pièce, arrondi, divisé à son orifice en cinq dents inégales, aiguës. La corolle est purpurine, papilionacée; l'étendard est ample, large, droit, un peu sinué à son sommet, médiocrement encaulé; les deux ailes ouvertes, oblongues, à peine aussi longues que l'étendard; la carène composée de deux pièces plus petites, concaves. Les étamines sont didymes, les an-thères ovales, à deux loges, de couleur jaune; l'ovaire un peu arqué, auquel succède une gousse plane, oblongue, étroite, aiguë à ses deux extrémités, contenant trois ou quatre semences roussâtres, arrondies, un peu comprimées, ailes fortes.

Cette plante croît dans la Guiane, à Orapu, paroisse d'Aroura; elle fleurit & fructifie au commencement de l'été. (D. script. ex Aubl.)

Cet arbrisseau est nommé *nicou* par les Galibis, & se sert à enivrer les poissons par les habitants. Ils se servent des sarmens fendus, nouvellement coupés & mis en paquets, pour battre l'eau des ruisseaux; ce qui occasionne une espèce d'engourdissement aux poissons qui s'y trouvent; alors ceux-ci viennent au dessus de l'eau & y restent immobiles.

11. ROBINIER des haies. *Robinia sepium*.

*Robinia racemis pedicellis subfloribus; foliis impari-pinnatis, foliolis acuminatis, coule inermis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1132. n°. 6.

*Robinia inermis, pedunculis racemosis, partialibus subfloribus; foliis impari-pinnatis, pinnis ovatis, acuminatis*. Swartz, Prodr. 106.

*Robinia inermis, pedunculis racemosis, partialibus unifloris; foliis impari-pinnatis*. Jacq. Amer. 211. tab. 179. fig. 101.

C'est un arbre qui s'élève à la hauteur d'environ trente pieds, sur un tronc droit, sans aiguilles, dont le port approche de celui du *Robinia pseudo-acacia*; il se divise en rameaux entiers, très-longes, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de folioles au nombre de onze à treize; ovales, obtuses, entières, rétrécies vers leur sommet, opposées, luisantes à leurs deux faces, longues de deux pouces.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires; leur calice est campanulé, fort petit, divisé à son orifice en cinq petites dents, dont les deux supérieures sont plus rapprochées. La corolle est inodore, couleur de rose; les étamines anadelphes; les gousses glabres, bruniâtres, oblongues, planes, comprimées, obtuses, contenant plusieurs semences ovales, comprimées.

Cet arbre croît dans l'Amérique, à Carthagène. (V. f. in herb. Lam.)

On l'emploie, dans son pays natal, pour former les haies des jardins. Il croît par racines, avec beaucoup de rapidité, & résiste très-bien aux intempéries de l'air. Les naturels le nomment *raton* ou *mata-raton*.

12. ROBINIER à fleurs foyeuses. *Robinia sericea*.

*Robinia racemis pedicellis subfloribus; foliis impari-pinnatis; foliolis ovatis, subius tomentosis; corollis purpureis, calice sericeo-albis*. (N.)

C'est une belle espèce, dont les rameaux sont cylindriques, glabres, cendrés, filies, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de sept à onze folioles opposées, pédiculées, ovales, acuminées, arrondies & presque en cœur à leur base, coriaces, glabres & luisantes à leur face supérieure, pubescentes, presque tomenteuses en dessous, entières à leur contour, à nervures latérales & faillantes, supportées par des pétioles pubescents & cylindriques.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, assez nombreuses, solitaires dans chaque aisselle, vers l'extrémité des rameaux, très-fines, point rameuses, dont les pédoncules sont droits, roides, pubescents, nus dans leur partie inférieure, chargés de fleurs très-rapprochées, surtout vers le sommet; rarement solitaires, plus ordinairement deux à deux sur des pédicules courts, épars. Le calice est campanulé, tronqué à ses bords; la corolle luisante, d'un blanc-argenté & luyex extrêmement, d'une belle couleur rouge ou purpurine en dedans. Je n'ai point vu le fruit.

Cette plante croît dans l'Amérique; elle a été communiquée à M. Jussieu par M. Vahl. (V. f. in herb. Juss.)

13. ROBINIER sans épines. *Robinia mitis*. Linn.

*Robinia racemis pedicellis, ternis; foliis imparipinnatis, caule inermi.* Linn. Syst. veget. pag. 669. n°. 4.

*Cytisus foliis pinnatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 741.

C'est un arbre de moyenne grandeur, dont le port est d'un aspect fort agréable, qui s'élève sur un tronc d'une grosseur médiocre, divisé à ses sommets en rameaux touffus, sans épines, cylindriques, réunis en tête, garnis de feuilles nombreuses, alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées d'environ cinq folioles glabres, ovales, très-entières.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires & terminales, dont le péduncule commun supporte à chacune de ses dents trois fleurs pédiculées. Les calices sont campanules, tronqués à leur orifice ou marqués de dents obtuses, à peine fendibles. Les gouffes sont comprimées, ovales, sublongues, acuminées à leur sommet.

Cette plante croît naturellement dans les Indes. On la cultive dans les bosquets, où elle fleurit rarement. (V. v. *abique fore.*)

Cette espèce approcherait-elle du *galedupa indica* Lam.? Il existe beaucoup de rapports entre cette dernière plante & la figure de Pukenet, que Linné rapporte au *robinia mistis*.

#### 14. ROBINIER des marais. *Robinia uliginosa*. Roxb.

*Robinia racemis pedicellis trifloris; foliis ternatis, ovatis, acuminatis; ramis inermibus, scandentibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1133. n°. 8.

*Robinia uliginosa.* Roxburgh.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, grimpans, dépourvus d'épines, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, dont les folioles sont oblongues, acuminées, glabres à leurs deux faces, longues d'environ un pouce & demi. Les fleurs sont blanchâtres, disposées en grappes axillaires sur les vieux rameaux, longues de trois pouces environ; les pédoncules partiels supportent trois fleurs.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. *Descript. ex Willd.*)

#### 15. ROBINIER couleur de rouille. *Robinia rubiginosa*.

*Robinia racemis pedicellis distantibus, multifloris; foliis imparipinnatis; foliolis ovato-oblongis, coriaceis; ramis pedunculatisque pubescenti-rubiginosis.* (N.)

Ses rameaux sont ligneux, presque anguleux, cannelés, revêtus, particulièrement dans leur jeunesse, d'un duvet couleur de rouille; garnis de

feuilles alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de folioles au nombre de cinq à sept, épaisses, coriaces, longues d'environ trois pouces, sur deux de large; opposées, pédiculées, glabres, luisantes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, entières & un peu roulées à leurs bords, ovales, obtuses, un peu rétrécies à leur base, marquées de nervures très-saillantes, latérales, alternes, réticulées.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, étroites, fort longues, dont les pédoncules sont flûtes, anguleux, revêtus d'un duvet ferrugineux. Les ramifications sont très-courtes, fort distantes, chargées de fleurs presque filiformes, nombreuses, fasciculées, dont le calice est très-court & pubescent. Je ne vois ni la corolle ni les fruits.

Cette plante croît dans l'Amérique, à l'île de la Trinité; elle a été envoyée par M. Vahl à M. Justen, sous le nom de *robinia mollissima*. (V. f. in herb. Juss.)

#### 16. ROBINIER à feuilles de réglisse. *Robinia glycyphyllos*.

*Robinia foliis imparipinnatis; foliolis ovato-obtusis, discoloribus; legumibus linearibus, longifloris.* (N.)

On distingue aisément cette espèce à ses feuilles purpurines en dessous, & à ses gouffes longues, très-étroites.

Ses tiges sont ligneuses, glabres, cylindriques, de couleur grisâtre, sans épines, garnies de feuilles alternes, ailées avec une impaire, composées de folioles au nombre de treize à dix-neuf, opposées, pédiculées, longues de deux pouces sur un de large, ovales, obtuses, glabres, entières, d'un vert tendre, presque glauque en dessus, de couleur purpurine, plus ou moins foncée en dessous, munies, à la base des pétioles, de stipules lan-céolées, courtes, terminées en une pointe droite & roide.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en grappes alongées, simples, beaucoup plus courtes que les feuilles, munies de bractées semblables aux stipules. Les calices sont tubuleux, cylindriques, alongés, à cinq lobes peu marqués; la corolle petite & blanchâtre; les gouffes longues de deux à trois pouces, larges de deux lignes, pédiculées, comprimées, linéaires, obtuses, très-glabres, surmontées d'une portion du style persistant.

Cette plante croît à la Martinique. (V. f. in herb. Lam.)

#### 17. ROBINIER douteux. *Robinia dubia*.

*Robinia foliis abrupte pinnatis, floribus fasciculatis.* f f 2



*tis; leguminibus angustissimis, apice subcitrifolius.* (N.) Lam. illustr. Gener. tab. 606. fig. 2.

Espèce très-distincte, qui n'appartient aux *robinia* que par les gouffes comprimées, qui a d'ailleurs le port des *caragana*.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, ligneux, glabres, très-lisses, d'un blanc-cendré; les plus jeunes pubescens, garnis de feuilles alternes, ailées, sans impaire, composées de douze à seize folioles & plus, fort petites, ovales, elliptiques, légèrement pubescentes, opposées, pétiolées, munies, à la base des pétioles, de deux stipules molles, presque filiformes, aiguës.

Les fleurs sont latérales, disposées, le long des rameaux, en petites grappes courtes, par paquets. Les calices font courts, munis, à leur orifice, de cinq petites dents obtuses. La corolle est purpurine, peut-être panachée de blanc; les gouffes petites, comprimées, longues d'un pouce, larges à peine de deux lignes, linéaires, rétrécies à leur base, obtuses & munies à leur sommet du style persistant, & roulé en vrille.

Cette plante croît à la Martinique. *Th* (V. f. in herb. Lam.)

**ROCHEFORTE.** *Rochefortia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des nerpruns, qui a des rapports avec les *schrebera*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle infundibuliforme; cinq étamines; deux styles; un fruit à deux loges polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions ovales, obtuses.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est court, le limbe partagé en cinq découpures ovales, oblongues, ouvertes.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, insérés dans les plis de l'orifice du tube, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, comprimé, surmonté de deux styles tubulés, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est globuleux, à deux loges, contenant quelques semences anguleuses.

#### E S P È C E S.

1. **ROCHEFORTE** à feuilles en coin. *Rochefortia cuneata*. Swartz.

*Rochefortia foliis cuneiformibus, obovatis, integris.* Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 551.—Idem, Prodr. pag. 54.

Arbrisseau de trois à quatre pieds, dont les tiges sont fournies de branches droites, sans épines, divisées en rameaux flexueux, cylindriques, lisses, épineux, de couleur cendrée, & dont les épines sont solitaires, proche l'insertion des pétioles, trois fois plus courtes que lui. Les feuilles sont pétiolées, réunies en petits paquets alternes, ordinairement au nombre de trois; ovales, presque cuneiformes, entières, échancrées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, un peu luisantes, d'un vert foncé, plus pâles en dessous, roides & légèrement nerveuses, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont petites, d'un vert-blanchâtre, disposées en cimes plus courtes que les feuilles, terminales, quelquefois axillaires; les pédoncules presque dichotomes. Leur calice est monophyllé, à cinq divisions droites, ovales, obtuses, pubescentes. La corolle tubulée, le tube court, à cinq faces; le limbe à cinq découpures ouvertes, ovales, oblongues; cinq étamines insérées à l'orifice du tube de la corolle, surmontées d'anthères oblongues; un ovaire supérieur, velu; les stigmates velus, presque plumbeux; le fruit est presque globuleux, à deux loges, contenant plusieurs semences petites, anguleuses.

Cette plante croît sur les rochers arides, à la Jamaïque. *Th* (Descript. ex Swartz.)

2. **ROCHEFORTE** à feuilles ovales. *Rochefortia ovata*. Swartz.

*Rochefortia foliis ovatis, emarginatis.* Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 554.—Idem, Prodr. pag. 54.

C'est un petit arbrisseau, dont les rameaux sont glabres, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, alternes, entières, ovales, échancrées à leur sommet, un peu velues, longues d'un pouce, marquées de nervures & de veines, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont réunies deux à deux, en forme de petits corymbes axillaires. Leur calice est divisé, jusqu'à sa base, en cinq découpures ovales, droites, velues à leurs bords. La corolle a un tube campanulé, ouvert, de la longueur du calice; le limbe à cinq découpures oblongues, obtuses, un peu plus longues que le tube; les filaments plus courts que les découpures du limbe; les anthères grandes, oblongues, un peu pendantes; l'ovaire glabre, comprimé, arrondi; deux styles coniques, subulés, un peu écartés, terminés par des stigmates aigus.

Cette plante se rencontre dans les buissons, sur

les lieux pierreux, à la Jamaïque. *Th* (*Descript. ex Swartz.*)

**ROCOUIER.** *Bixa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des tillands, qui a des rapports avec les *Lecythis*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, stipulacées, & dont les fleurs sont disposées en une panicule terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à cinq folioles, muni de cinq tubercules à sa base extérieure; une corolle à cinq pétales; des étamines nombreuses, attachées sur le réceptacle; un style; une capsule hérissée, uniloculaire, à deux valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à cinq grandes folioles colorées, égales, ovales, obtuses; munies à leur base extérieure de cinq tubercules fort petites, semblables à un très-petit calice à cinq dents. (C'est le calice selon Linné.)

2°. Une corolle à cinq pétales (dix pétales selon Linné) égaux, alternes avec les divisions du calice, plus courts que lui, ovales, obtus.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont insérés sur le réceptacle, séparés, presque aussi longs que la corolle, terminés par des anthères droites, arrondies.

4°. Un ovaire ovale, velu, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate bifide, comprimé.

Le fruit est une capsule ovale, en cœur, un peu acuminée, médiocrement comprimée, couverte entièrement de pointes roides, à une seule loge, à deux valves, revêtues intérieurement & en totalité d'une membrane, dont le milieu sert de réceptacle aux semences, qui sont nombreuses, enveloppées d'un suc rougeâtre, turbinées, enfoncées dans une sorte de cupule pédiculaire. L'embryon est fort petit, placé dans un périsperme charnu. Le réceptacle des semences est linéaire, & non saillant & relevé.

#### E S P È C E.

**ROCOUIER d'Amérique.** *Bixa americana*.

*Bixa foliis cordato-ovatis, acuminatis, integerrimis; capsulis lappaceis.* (N.)

*Bixa* (orellana). Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 580. — Mart. Clus. 211. — Mater. medic. 135. — Royen, Lugd. Bat. 477. — Brown, Jam. 254. — Miller, Dict. — Gronov. de Fruct. & Sem. Cent. 4.

tab. 61. fig. 3. — Regnault, Botan. tab. 413. — Sonnerat, Iter, pag. 29. tab. 13. — Lam. Illust. Gen. tab. 469.

*Orellana seu orellana foliolulis lappaceis.* Pluken. Almag. 272. tab. 209. fig. 4. — Comm. Hort. 1. pag. 65. tab. 33.

*Arbor mexicana, fructu castanea, coccifera.* C. Benth. Pin. 419.

*Bixa ovidi.* Clus. Exot. 1. 3. c. 20.

*Urucu.* Sloan, Jam. 150. Hist. 2. pag. 52. tab. 181. fig. 1. — Pison, Brasil. 133.

*Mitella americana, maxima, tinctoria.* Tournef. Inst. R. Herb. 242.

*Achioti, seu medicina tingendo apta.* Hernandez, 74.

Vulgairement *rocouc*, *rocou*, *rocouit*; *amotia*, *anotta*; *achiot*; *cochenue*; *bichet*.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de douze à quinze pieds, dont le tronc est droit, & pousse vers son sommet plusieurs branches qui forment une cime presque en tête, divisées en rameaux plabres, alternes, cylindriques, garnis de feuilles pétioles, alternes ou épaisses, ovales, acuminées à leur sommet, échancrées en cœur à leur base, entières à leurs bords, glabres & d'un beau vert à leurs deux faces, marquées de nervures latérales, roussâtres, qui se fondissant en petites veines courtes; supportées par des pétioles presque aussi longs que les feuilles, munis à leur base de stipules lanceolées, aiguës, très-caduques.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une panicule peu garnie, terminale, médiocrement ramifiée; chaque fleur supportée par un pédoncule filiforme, qui s'épanouit à son sommet en cinq tubercules convexes à leur base selon M. Jussieu, & que Linné regarde comme le calice; mais ce dernier paroît plutôt devoir être confiné par les cinq pétales extérieurs, colorés & plus grands que la corolle. Celle-ci est d'un blanc-pâle, lavé de rose, inodore, à cinq pétales presque ronds. Le fruit est une capsule un peu en cœur à sa base, de forme presque conique, médiocrement comprimée, hérissée de poils roides, rougeâtres, s'ouvrant en deux valves, renfermant des semences enveloppées d'une pulpe rouge, qui colore fortement les mains de ceux qui la touchent.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. *Th* (*V. f.*)

La substance pulpeuse & rouge qui environne les semences du rocouier, est employée avec avantage par les teinturiers & les peintres. Les Américains en font usage pour colorer leur chocolat, & les naturels s'en servent pour se peindre le corps lorsqu'ils vont à la guerre. Voici de quelle manière on prépare l'extrait ou la pâte de *rocouc*.

On retire des capsules les semences & toute la matière charnue qui les environne : on les écrase avec des maringouins de bois, dans des canots, qui sont des troncs d'arbre creusés : on jette de l'eau dessus en quantité suffisante, pour que la matière y trempe : on l'y laisse pendant six jours, afin que l'eau puisse dissoudre la substance rouge qui est adhérente aux semences. On coule ensuite la liqueur dans un crêble du pays, nommé *hibichet* ou *manaret* ; puis par trois autres cribles plus fins, faits de joncs ou de grosse toile, dont les trous sont carrés : on laisse égoutter pendant vingt-quatre heures ce marc, qu'on appelle *roucou calé*, puis on le met de nouveau dans un canot qu'on a soin de couvrir, & on l'y laisse fermenter pendant huit jours, pour que ce qui reste de matière rouge colorante puisse plus aisément s'en détacher & s'extraire. Pour cela on jette un peu de nouvelle eau sur la matière ; on l'agite jusqu'à ce qu'elle commence à se gonfler & à former des bulles d'air, qui crévent à la surface. Alors on diminue le feu : on laisse refroidir le roucou jusqu'au lendemain matin ; on le tire de la chaudière, & on l'étend dans des caisses que l'on tâche de garantir de la poussière. Le roucou, séché à l'ombre par le vent, est infiniment plus coloré que celui qu'on expose au soleil. On a observé que plus on le travaille en grand, plus la couleur en est vive : travaillé en petit, il devient noir. Le roucou est pur & bien fait quand il se dissout entièrement dans l'eau, & qu'il n'y a point de corps étrangers, errans ou précipités, comme dans le *roucou gigadane*, qui est de mauvaise qualité, & plus encore celui qu'on appelle *roucou bal*, terme qui signifie la paille & le bled, parce qu'on s'en est servi de vieilles & de nouvelles graines, & qu'on y a mêlé quelquefois du rouge d'Inde.

Le roucou, pour être de bonne qualité, doit être couleur de feu, plus vit en dedans qu'en dehors, doux au toucher, d'une bonne consistance, afin qu'il soit de garde. On donne à cette pâte la forme que l'on veut, avant de l'envoyer en Europe : elle est ordinairement en pains, enveloppés dans des feuilles de baliste. A l'égard de l'eau rouillâtre, elle est propre à être jetée sur de nouvelles graines qu'on veut faire tremper.

On peut retirer du roucou une substance rouge beaucoup plus belle, en se contentant de froter seulement les grains entre les mains, dans de l'eau ; mais alors on n'en retire qu'une petite quantité d'extrait ou de tégule qui se précipite, & prend la forme d'un pain de cire. Rarement on la garde dans cet état, non-seulement parce qu'elle devient trop chère, mais parce qu'on est dans l'usage d'affaiblir son état trop vit, qui offense la vue, avec du santal en poudre : tel est le roucou que les Indiens caribbes & autres aiment avec passion. Ils le trempent dans l'huile avant que de l'employer pour se rougir le corps. Cette espèce d'encaix

ferme les pores, empêche que l'eau de la mer ne fasse des empreintes sur leur corps, fait suer les maringouins & mourir les chiques.

On fait deux récoltes de roucou par an : celle d'hiver est la plus abondante. Les ouvriers qui travaillent à préparer le roucou sont incommodés de maux de tête, qu'on attribue à l'odeur forte des semences du roucou, qui est encore exaltée davantage par les infusions & les macérations. La belle pâte de roucou devient dure en Europe & perd son odeur, qui approche de celle de la violette. Celle de Cayenne est estimée la meilleure & la mieux préparée : les teinturiers s'en servent pour mettre en première couleur les laines qu'on veut teindre en rouge, bleu, jaune, vert, &c. Il est peu de couleurs où on ne le fasse entrer. Le roucou pousse pour fortifier l'estomac & arrêter le cours de ventre. Lorsque le linge a été taché du roucou, il est très-difficile d'en effacer la tache, surtout quand il y a eu mélange d'huile. Le soleil est plus capable de l'emporter que toutes les lessives, & cette couleur est si extensible, qu'un morceau de linge taché est capable de tacher toute une lessive. Il est bon d'observer que, quand la pâte du roucou commence à fermenter, il est alors d'une puanteur insupportable. Son odeur agréable ne se fait sentir qu'après la fermentation. (Bon. Dict.)

ROSELLÉ. *Rocella*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des campanulacées, qui a des rapports avec les campanulées, & qui comprend des arbrustes ou des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles petites, alternes, dont les fleurs sont solitaires, terminales ou axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions ; une corolle infundibuliforme, attachée au sommet du calice, & dont le limbe est divisé en cinq découpures ; cinq plamens adnés à leur base ; un stigmate bifide ; une capsule inférieure, à deux loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, d'une seule pièce, turbiné, persistant, à cinq découpures lancéolées, quelquefois dentées.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme ou campanulée, dont le tube est plus long que le calice, inséré à son orifice, & le limbe partagé en cinq découpures ovales.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, dilates en forme d'aigilles à leur base, surmontés par des anthères subulées, conniventes.

4°. Un ovaire inférieur, oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux ligaments ouverts, oblongs, aplatis.

Le fruit est une capsule inférieure, cylindrique, couronnée par le calice, à deux loges, quelquefois à une seule loge, s'ouvrant à son sommet par un trou arrondi; elle renferme des semences petites, nombreuses, anguleuses.

Observations. Ce genre a été primitivement établi sur le *roella ciliata*, espèce unique. Celles que l'on y a depuis ajoutées, s'écartent plus ou moins des caractères généraux de la première, remarquable surtout par les grands découpages dentés qui couronnent le fruit. Plusieurs botanistes croient qu'il conviendrait de séparer les autres espèces de celles-ci, en les rangeant dans un genre particulier. Si l'on n'exclut d'aucune différence que dans cette forme particulière du calice, & que les autres parties de la fructification aient le même caractère, ce seroit à tort, sans doute, que l'on voudroit séparer des espèces qui ont d'ailleurs tant de ressemblance dans leur port. Leurs feuilles sont très-petites, sessiles, fermes, rapprochées, réfléchies en dehors, épaisses, quelquefois presque ombriquées, la plupart ciliées à leurs bords. Les fleurs, peu appareillées, varient par leur insertion, les unes étant terminales, cauleuses; d'autres, solitaires, axillaires.

## E S P È C E S.

1. ROELLE ciliée. *Roella ciliata*. Linn.

*Roella frutescens, foliis linearibus subulatis, ciliatis; mucrone recto; floribus terminalibus, solitariis*. Lam. Ill. Genet. vol. 2. p. 66. n°. 2576. tab. 123. fig. 1.

*Roella foliis ciliatis, mucrone erecto*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 251. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 154. tab. 31. fig. 3. — Destoutaines, Flor. atlant. vol. 1. pag. 182.

*Roella*. Horr. Cliffort. 492. tab. 35.

*Roella foliis lanceolatis, ciliatis; floribus solitariis, terminalibus*. Thunb. Bot. 18. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 9.8. n°. 1.

*Roella foliis linearibus, ciliatis, rectis; floribus sessilibus*. Bergius, Plant. pag. 41. n°. 1.

*Campanula africana, frutescens, caulescens, flore violacea*. Comm. Hort. 2. pag. 77. tab. 39.

*Acaules maritima, erica foliis hirsutis, rigidis, inflo. mucrone pungentibus*. Picken. Almag. 8. tab. 252. fig. 4.

*Campanula africana, humilis, pilosa; flore exalbidâ, lanceolata, utraque S. ba. Thunb. vol. 1. p. 23. tab. 16. fig. 5.*

Petit arbrisseau qui s'élève à peine à la hauteur

de huit à dix toises, dont les racines sont amples, flexueuses, cylindriques, garnies de fibres capillaires; les tiges courtes, droites, glabres, divisées vers leur partie supérieure en branches épaisses, touffues, qui se dividissent à leur sommet en rameaux courts, souvent prostrées, qui sont seuls munis de fleurs, parais de feuilles nombreuses, épaisses, sessiles, fort petites, étroites, linéaires, subulées, droites, très entières, un peu carénées, munies à leurs bords de crins blanchâtres.

Les fleurs sont solitaires, sessiles & terminales sur les plus jeunes rameaux, enveloppées à leur base par plusieurs feuilles semblables aux autres, mais plus grandes. Leur calice est glabre, divisé en cinq découpures grandes, lancéolées, mucronées, dentées à leurs bords, chaque dent terminée par une pointe sétacée, roide, presque épineuse. La corolle est d'un pourpre violet, inégalement colorée; son tube est épais, & son contour que le calice; son limbe partagé en cinq divisions ovales, un peu arrondies, terminées par une petite pointe obtuse. Le style est velu & de couleur purpurine vers son sommet. La capsule est presque cylindrique, couronnée par les découpures du calice; elle renferme des semences rudes, petites & anguleuses.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de l'Afrique, au Cap de Bonne-Espérance, dans l'Ethiopie & la Barbarie. (V. f. in herb. Lam.)

2. ROELLE pédonculée. *Roella pedunculata*. Berg.

*Roella foliis linearibus, ciliatis, rectis; floribus pedunculatis, germinibus longissimis*. Bergius, Plant. Capen. pag. 42. n°. 2.

Cette plante ressemble beaucoup au *roella ciliata*; peut-être n'en est-elle qu'une variété; cependant elle en diffère par son port. Ses tiges sont plus élevées, les fleurs pédonculées, les capsules bien plus longues.

Ses tiges se divisent en rameaux cylindriques, pubescents, garnis de feuilles linéaires, très-étroites, aiguës, épaisses, sessiles, nombreuses, glabres à leurs deux faces, munies vers leur base, & non dans toute leur longueur, de cils courts, épineux.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires, quelquefois au nombre de deux, dont les pédoncules sont très-longs à l'extrémité des rameaux, garnis quelquefois de deux ou trois feuilles; chaque fleur est pédiculée, munie de bractées linéaires, aiguës, subulées, ciliées. Leur calice est divisé à son orifice en cinq découpures lancéolées, aiguës, ciliées; l'ovaire est cylindrique, beaucoup plus long que le calice.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (Descript. ex Berg.)

Observations. Ce que Bergius regarde comme des pédoncules, nous paroît être le prolongement

des jeunes rameaux presque nus, & ce qu'il nomme bractées, des feuilles d'entre lesquelles sortent les fleurs. D'ailleurs, ces mêmes fleurs sont encore pédiculées, circonstance qui favorise assez mon opinion.

### 3. ROELLE filiforme. *Roella filiformis*. Lam.

*Roella fruticulosa, ramofo-paniculata; ramis filiformibus; foliis minimis, ovatis, dentatis, recurvis, accurrentibus; floribus solitariis*. Lamarck, M. Mus. Gener. vol. 2. pag. 66. n°. 2580. tab. 123. fig. 2.

*Roella (squarrosa), foliis ovatis, acutis, raris dentatis, decurrentibus, basi limbo ciliatis, reflexis*. Berg. Plant. Cap. pag. 42. n°. 3. (Non *roella squarrosa*. Linn. Suppl.)

Il ne faut point confondre cette espèce avec le *roella squarrosa* de Linne fils : ce sont deux plantes très-différentes. Celle de Linne est herbacée ; ses fleurs sont aggrégées, tandis que celle dont il est ici question a des fleurs solitaires, sessiles.

Ses tiges sont ligneuses, & se divisent en rameaux glabres, cylindriques, redressés, presque filiformes, diffus, longs d'environ un pied, subdivisés à leur partie supérieure en d'autres rameaux simples, les inférieurs plus courts, les supérieurs beaucoup plus allongés, réunis en touffe, garnis de feuilles petites, sessiles, éparées, nombreuses, ovales, aiguës, glabres à leurs deux faces, rarement dentées, longues d'une à deux lignes, recourbées en dehors, un peu décurrennes à leur base, où elles sont en même temps munies de quelques cils courts, roides. Les feuilles qui accompagnent les fleurs sont plus grandes, mais de même forme.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, situées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est turbiné, divisé en cinq découpures égales, lancéolées, ouvertes, ciliées à leurs bords, aiguës à leur sommet, persistantes. La corolle est infundibuliforme, munie d'un tube plus court que le calice, qui s'épanouit en un limbe à cinq divisions ouvertes : les filaments sont élargis, ovales, & un peu ciliés vers leur base, terminés par un petit filet filicé qui supporte des anthers cylindriques. L'ovaire est court, cylindrique, surmonté d'un style de la longueur des éminences, terminé par un stigmate à peine biffé. Il lui succède une capsule glabre, couronnée par les divisions du calice, agrandies & un peu purpurines : elle renferme environ huit semences fort petites, ovales, convexes d'un côté, concaves de l'autre, un peu rudes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lamarck & Jussieu.)

### 4. ROELLE glabre. *Roella glabra*.

*Roella foliis ovatis, integerrimis, glabris, apice recurvatis; floribus terminalibus*. (N.)

Arbrisseau dont les tiges sont dures, d'un brun foncé, divisé en rameaux courts, diffus, presque fasciculés, garnis de feuilles très-rapprochées, presque ombriquées, éparées, sessiles, fort petites, glabres, ovales, nues, très-entières, coriaces, recourbées en dessous à leur sommet, point ciliées, beaucoup plus nombreuses à l'extrémité des rameaux. Je n'ai vu que quelques fleurs incomplètes, qui m'ont paru devoir être toutes terminales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été recueillie par Sonnerat. (V. f. in herb. Jussieu.)

### 5. ROELLE à épi. *Roella spicata*. Linn. f.

*Roella fruticulosa, erecta; foliis lanceolatis, integris, ciliatis; floribus terminalibus, subsessatis*. Linn. f. Suppl. pag. 143. — Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 66. n°. 2578.

*Roella foliis lanceolatis, ciliatis; floribus terminalibus, aggregatis*. Thunb. Prodr. 38.

Cette plante a ses tiges droites, frutescentes, divisées en rameaux garnis de feuilles alternes, éparées, sessiles, lancéolées, entières, ciliées à leurs bords : les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, ramassées en une sorte d'épi.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance. (V.)

### 6. ROELLE réticulée. *Roella reticulata*. Lam.

*Roella fruticulosa, foliis stricis, ciliatis; mucrone reflexo*. Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 66. n°. 2577.

*Campanula Capitata Bona-Spei, foliis reticulatis, spinosis*. — Petiv. Musc. pag. 21. fig. 157.

Cette plante, peu connue, & dont Petiver nous a donné une mauvaise figure où l'on ne voit point de fleurs, paroît néanmoins appartenir au *roella* par son port, & le nom de *campanula* que Petiver lui a donné, indique que sa corolle ne s'éloigne pas de celle des *roella*. Ses tiges sont chargées de feuilles si nombreuses, qu'elles les recouvrent en entier ; elles sont roides, courtes, sessiles, éparées, lancéolées, fortement ciliées à leurs bords, & terminées à leur sommet par une longue pointe réfléchie en dehors, très-aiguë.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

### 7. ROELLE décurrenne. *Roella decurrens*. Lhérit.

*Roella herbacea, foliis lanceolatis, ciliatis, decurrentibus*. Lam. Ill. Gen. vol. 2. pag. 66. n°. 2582.

*Roella foliis lanceolatis, ciliatis, integerrimis, decurrentibus; floribus solitariis, terminalibus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 918. n°. 4.

*Roella*

*Roella foliis lanceolatis, ciliatis, decurrentibus.*  
 L'herit. Sertor. angl. pag. 4. tab. 6. — Aiton, Hort.  
 Kew. vol. 1. pag. 126.

Un des caractères qui distinguent au premier aspect cette espèce de ses congénères, est d'avoir ses feuilles décurrentes à leur base sur les tiges.

C'est une plante herbacée, à rameaux nombreux, droits, diffus, garnis de feuilles lancéolées, épar-  
 ses, sessiles, très-entières, ciliées à leurs bords,  
 un peu rétrécies & décurrentes à leur base, médiocrement réfléchies.

Les fleurs sont solitaires, terminales, à peine pédonculées. Leur calice est campanulé, divisé à son orifice en cinq découpures ovales, obtuses. La corolle est petite; son tube court, un peu renflé; son limbe à cinq découpures lancéolées, aiguës; les étamines dilatées & ciliées à leur base; les capsules ovales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ☉

8. ROELLE squarreuse. *Roella squarrosa*. Linn. Suppl.

*Roella herbacea, diffusa; foliis ovatis, recurvatis, dentatis; floribus terminalibus, aggregatis.* Lam. Ill. Gener. vol. 2. pag. 66. n°. 2579. — Linn. fil. Suppl. 43.

*Roella (squarrosa), foliis ovatis, dentatis, ciliatis; floribus terminalibus, aggregatis.* Thunb. Prodr. 38. (Excluse Berg. Synon.)

Ses tiges se divisent en rameaux longs, diffus, grêles, roides, herbacés, un-peu velus, presque anguleux, garnis de feuilles petites, sessiles, épar-  
 ses, ovales, recourbées, médiocrement denticulées à leurs bords, à peine ciliées. Les fleurs sont agrégées, petites, médiocrement pédiculées, terminales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle y a été recueillie par Sonnerat. (V. f. in herb. Jusieu.)

9. ROELLE mouffette. *Roella muscosa*. Linn. fil.

*Roella herbacea, diffusa; foliis ovatis, dentatis, reflexis; floribus terminalibus, solitariis.* Linn. fil. Suppl. pag. 143. — Lam. Ill. Gener. vol. 2. p. 66. n°. 2581.

*Roella foliis ovatis, dentatis, reflexis, glabris; floribus terminalibus, solitariis.* Thunb. Prodr. 38.

C'est une plante herbacée, extrêmement petite; ce qui, joint à ses feuilles courtes, lui donne l'apparence d'une mouffe. Ses tiges sont divisées en rameaux diffus, garnis de feuilles ovales, petites, glabres, légèrement dentées à leurs bords, réfléchies en dehors, & presque imbriquées. Les fleurs sont solitaires, terminales.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. ☉  
 Botanique, Tome VI.

ROIDE (Tige). *Caulis rigidus*. On donne ce nom aux tiges lorsque, toutes les fois qu'on les courbe, elles se relèvent entièrement & même avec une forte d'élasticité, comme le *carex vulpina*, &c.

ROIDES (Feuilles). *Folia rigida*. Les feuilles sont roides lorsqu'elles ont une grande fermeté, & qu'elles résistent à la flexion, comme celles du *galium uliginosum*.

ROKÉJE. *Rokejcha*. Genre de plantes dicorélydones, à fleurs complètes, polyptéales, de la famille des portulacées, qui paroît avoir des rapports avec les *trianthema*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont diffuses, dichotomes; les feuilles opposées & vaginales, les fleurs presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq découpures membraneuses; cinq pétales; dix étamines; deux styles; une capsule comprimée, uniloculaire, renfermant trois semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, à cinq découpures droites, linéaires, obtuses, membraneuses à leurs bords.

2°. Une corolle composée de cinq pétales planes, cunéiformes, obus, très-ouverts, plus grands que le calice, persistans.

3°. Dix étamines dont les filamens sont subulés, plus courts que la corolle, terminés par des an-  
 thères pendantes, arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, hémisphérique, creux à son sommet, surmonté de deux styles très-écartés, subulés, terminés par des stigmates aigus.

Le fruit est une capsule ovale, comprimée, à une seule loge, plus longue que le calice qui l'enveloppe, ainsi que la corolle desséchée : elle est surmontée de pistils stériles; elle renferme des semences fort petites, comprimées, aiguës, presque rondes.

#### ES P È C E.

ROKÉJE du désert. *Rokejcha deserti*.

*Rokejcha foliis oppositis, sessilibus, lanceolato-linearibus; floribus solitariis.* (N.)

*Rokejcha*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 90. n°. 77. — Jusieu, Gener. Plant. pag. 313.

*Rokejcha deserti*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 703.

Ses racines & la portion des tiges enfoncée dans  
 G g

la terre, sont ligneuses : il s'en élève ensuite des branches nombreuses, annuelles, dissées, dichotomes, très-rameuses, articulées, hautes d'environ un pied & demi ; chaque articulation longue d'un pouce à peu près, les supérieures graduellement plus longues. Les feuilles sont opposées aux articulations, sessiles, vaginales, longues d'un pouce, lancéolées, rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords ; les supérieures plus courtes, plus étroites, linéaires.

Les fleurs sont, les unes solitaires dans la bifurcation des rameaux, les autres terminales & deux à deux à l'extrémité de chaque rameau, supportées par des pédoncules simples, capillaires, épaissis à leur sommet. Le calice, beaucoup plus court que la corolle, est vert dans son milieu, membraneux & blanchâtre à ses bords. La corolle est grande, à cinq pétales, de couleur blanche, traversée par des lignes & des veines violettes. Les capslules ont beaucoup de ressemblance avec celles des saxifragas ; mais elles sont comprimées, plus longues que les calices.

Cette plante croît dans les plaines désertes de l'Egypte, où elle fleurit pendant tout le premier mois du printemps. ( *Descript. ex Forsk.* )

ROMARIN. *Rosmarinus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des labiées, qui a de grands rapports avec les sauges, & qui comprend des sous-arbrisseaux indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont linéaires, & les fleurs disposées par verticilles en un épi terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres, comprimé à son sommet ; une corolle à deux lèvres, la supérieure bifide ; deux filamens arqués, simples, avec une dent.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, comprimé à son sommet, à deux lèvres droites ; la supérieure entière, l'inférieure bifide.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, dont le tube est plus long que le calice, & le limbe parragé en deux lèvres ; l'inférieure réfléchie, à trois divisions inégales ; celle du milieu fort grande & concave.

3°. Deux étamines, dont les filamens sont simples, subulés, munis d'une seule dent, arqués vers la lèvre supérieure, plus longue qu'elle, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire supérieur, à quatre lobes, surmonté d'un style aussi long que les étamines, terminé par un stigmate simple, aigu.

Le fruit consiste en quatre semences nues, ovales, renfermées dans le fond du calice.

#### ES P È C E S.

1. ROMARIN officinal. *Rosmarinus officinalis*.

*Rosmarinus foliis sessilibus, linearibus, obtusis*. (N.)

*Rosmarinus foliis sessilibus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 126. n°. 1.

*Rosmarinus* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 33. Hort. Cliffort. 14. — Hort. Up. 11. — Mater. medic. pag. 39. — Roy. Lugd. Bat. 310. — Hall. H. J. v. n°. 250. — Blackwel. tab. 159. — Rivin. tab. 30. — Sibb. Hort. rom. 3. tab. 67. — Kniph. Orig. Centur. 5. tab. 76. — Ludw. Ect. tab. 196. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 281. tab. 19. — Idem. Flor. franç. vol. 2. pag. 423. n°. 457. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 59.

*Rosmarinus (latifolia), foliis linearibus, obtusis, utrinque virentibus*. Miller, Dict. n°. 2.

*Rosmarinus fruticosus, latiore folio*. C. Bauhin, Pin. 217. — Tourn. Inst. R. Herb. 195. — Shwartz. Spec. n°. 513.

*Rosmarinus coronarius, fruticosus, ignobilior*. J. Bauh. Hill. 2. pag. 25. lc.

2. *Rosmarinus hortensis, angustiore folio*. C. Bauh. Pin. 217. — Tournesf. Inst. R. Herb. 195.

*Rosmarinus (angustifolia), foliis linearibus, marginibus reflexis, subius incanis*. Miller, Dict. n°. 5.

*Rosmarinum coronarium*. Dodon. Pempt. 272.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de trois à quatre pieds, & se divise en rameaux grêles, alongés, de couleur cendrée, garnis de feuillets sessiles, nombreuses, opposées, étroites, linéaires, très-fermes, épaissies, vertes à leur face supérieure, ordinairement blanchâtres & un peu pubescentes en dessous, quelquefois vertes à leurs deux faces, roulées à leurs bords, obtuses à leur sommet, d'une odeur agréable, aromatique.

Les fleurs sont disposées en petites grappes courtes, opposées, presque verticillées dans l'aiselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux. Les pédoncules sont filiformes, pubescens, munis de bractées fort petites, caduques, souvent tomenteuses. Le calice est légèrement pubescent ; la corolle d'un bleu à e ou blanche, avec des points bleuâtres ; assez grande, inodore.

Cette plante croît naturellement dans les départemens méridionaux de la France, dans l'Espagne, l'Italie, le Levant, la Barbarie, &c. sur les collines pierreuses. ( *V. v.* )

Cet arbrisseau se cultive dans les jardins, à cause

de son odeur aromatique, ayant d'ailleurs la propriété de conserver les fleurs toute l'année. Il a été longtemps en grande réputation, & il est cité dans presque toutes nos vieilles chansons érotiques. Ses fleurs fournissent aux abeilles beaucoup de substance mielleuse; elles donnent une huile essentielle, que l'on croit pouvoir être substituée au camphre. Ses feuilles sont toniques, céphaliques, antiputrides, utiles dans les fièvres tierces. On s'en sert extérieurement, souvent bouillies dans du vin, pour fortifier les nerfs, prévenir la gangrène, rétablir la sensibilité dans les membres paralysés. C'est au romarin que l'eau de la reine de Hongrie doit ses propriétés. Cette plante entre dans plusieurs parfums, & sert d'assaisonnement à certains mets.

## 2. ROMARIN du Chili. *Rosmarinus chilensis*.

*Rosmarinus foliis petiolatis*. Molina, Chili, edit. germ. pag. 134. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 127. n°. 2.

Quoique Molina n'entre dans aucun détail sur cet arbrisseau, qu'il rapporte au romarin, il est certain qu'il est suffisamment distingué du romarin officinal par ses feuilles pétioles.

Cette plante croît au Chili.  $\text{h}$

RONABE. *Ronabea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *pueria*, & qui comprend des arbrulles exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont très-entières, les fleurs fort petites, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, à cinq dents; une corolle oblongue, presque infundibuliforme; cinq étamines courtes; une baie fort petite, non couronnée, contenant deux noyaux monospermes.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, turbiné, à cinq dents à son orifice.

2°. Une corolle monopétale, presque infundibuliforme, dont le tube est long, renflé vers son orifice, & le limbe divisé en cinq lobes ouverts, aigus.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont courts, insérés sur le tube, terminés par des anthers oblongues, à deux loges, renfermées dans le tube.

4°. Un ovaire ovale, adhérent au calice, surmonté d'un style de la longueur du tube, terminé par un stigmate à deux lames.

Le fruit est une baie fort petite, ovale, stérile,

convexe d'un côté, plane de l'autre, contenant deux noyaux monospermes.

## ESPÈCES.

1. RONABE à larges feuilles. *Ronabea latifolia*. Aublet.

*Ronabea caulibus flexuosis; foliis ovatis, acutis, viridibus & carulis variegatis; fructu nigricante, striato*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 154. tab. 59. — Lam. Illustr. Gener. tab. 166. — Juss. Gen. Plant. pag. 205. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 365.

*Phycothria (axillaris), stipulis acutis, indivisis; foliis ovatis, acutis; floribus axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 962. n°. 3.

Arbrisseau dont les tiges sont simples, noueuses, tortueuses, hautes de deux à trois pieds, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétioles, ovales, aiguës, d'un vert bleuâtre, entières à leurs bords, lisses à leurs deux faces, supportées par des pétioles courts, munis de stipules larges, aiguës.

Les fleurs naissent dans l'aisselle de chaque feuille, au nombre de deux à six, soutenues par des pédoncules très-courts, garnis à leur base de deux bractées en forme d'écailles. Le calice est d'une seule pièce, à cinq petites dents courtes. La corolle est blanche, d'une seule pièce, supérieure, insérée sur l'ovaire, autour d'un disque qui le couronne; le tube est grêle, long, partagé en cinq lobes aigus, hérissés de poils. L'ovaire se convertit en une petite baie noireâtre, cannelée, contenant deux osselets appliqués l'un contre l'autre, & contenant chacune une semence.

Cet arbrisseau croît en Guiane, dans les forêts d'Oyac, d'Orapu & de Sinémari, où il fleurit vers la fin de l'été.  $\text{h}$  (*Descript. ex Aubl.*)

2. RONABE à tige droite. *Ronabea erecta*. Aubl.

*Ronabea caulibus tenuioribus; foliis ovatis, acutis, tenuioribus; foliis minoribus, à luteo-virentibus*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 156. n°. 2.

Cette espèce, très-rapprochée de la précédente, en diffère par ses tiges grêles, hautes d'un pied & demi; elles sont garnies de feuilles opposées, médiocrement pétioles, d'un vert jaunâtre, ovales, aiguës, dont les plus grandes ont quatre pouces de long, sur un & demi de large. Les fleurs sont blanches, axillaires. Les fruits sont de petites baies noires & cannelées.

Cette plante croît dans les mêmes lieux que la précédente.  $\text{h}$  (*Descript. ex Aubl.*)

RONCE. FRANÇOISIER. *Rubus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, poly-pétales, de la famille des rosacées, qui a des rap-



ports avec les *dryas* & les *gum*, & qui comprend des herbes ou aibrilleaux, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, ordinairement très-épineux, à feuilles simples, ternées, digitées ou ailées, & dont les fleurs sont terminales ou latérales, solitaires ou paniculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; une corolle à cinq pétales insérés sur le calice; des étamines nombreuses; une baie supérieure, composée d'un grand nombre de petits grains succulents, monospermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions ouvertes, oblongues, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales insérés sur le calice, ouverts, un peu arrondis.

3°. Un très-grand nombre d'étamines, dont les filaments sont plus courts que la corolle, insérés sur le calice, terminés par des anthères comprimées, arrondies.

4°. Des ovaires nombreux, surmontés de styles très-courts, capillaires, insérés sur le côté de l'embryon, terminés par des stigmates simples, persistants.

Le fruit est une baie molle, supérieure, composée de petits grains succulents, réunis, formant une tête concave en dedans, chaque grain contenant une semence oblongue.

Observations. Nous n'avons pas cru devoir conserver comme espèce dans ce genre, le *rubus delibardus* Linn., dont il sera fait mention à l'article RONCINELLE (*delibarda*), genre établi d'abord par Linné, & que Michaux a rappelé dans sa Flore de l'Amérique septentrionale. Les ronces diffèrent des *delibarda* par leur baie succulente & par un bien plus grand nombre d'ovaires, tandis que ce dernier genre n'a que cinq à huit piliers, & que son fruit est une baie sèche.

#### E S P È C E S.

##### \* *Tiges herbacées.*

1. RONCE faux-mûrier. *Rubus chamamorus*. Linn.

*Rubus foliis simplicibus, lobatis; caule inermi, unifloro*. Linn. Syst. veg. pag. 476. n°. 19. — Flor. suec. 449. — Mater. medic. 130. — Miller, Dict. n°. 10. — Gunn. Norv. n°. 6. — Lightf. Scot. t. pag. 266. tab. 13. — Retz. Observ. t. pag. 20.

*Rubus foliis simplicibus, lobatis; caule unifloro, atroco*. Flor. suec. 413. — Spec. Plant. 494.

*Rubus caule bifolio, unifloro; foliis simplicibus.*

Floet. Japon. 208. tab. 5. fig. 1. — Hort. Cliffort. 192. — Royle, Lugd. Bat. 279.

*Rubus humilis, palustris, fructu à rubro flavescens*. Rudb. Iter, 9. Lap. 99.

*Rubus palustris, foliis ribes*. Frank. Spec. 37.

*Rubus (chamamorus), herbacea, inermis, cauliculis erectis, subsaphyris, unifloris; stipulis ovalibus, obtusis; foliis simplicibus, subreniformibus, rotundato-lobatis*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 298.

*Rubus palustris, humilis*. Tournef. Inst. R. Herb. 615.

*Chamarubus foliis ribes*. C. Bauh. Pin. 480.

*Morus norwegica*. Till. Aboens. 47. tab. 159. — Weder. Flor. dan. tab. 1.

*Chamamorus*. Clus. Hist. 1. pag. 118. Icon. — Idem, Pann. pag. 117. tab. 118. *Mediocris*. — Rai, Angl. 3. pag. 260.

Cette espèce est remarquable par ses fleurs dioïques. Cependant, d'après les observations du docteur Solander, les individus mâles & femelles, quoique sur des tiges séparées, appartiennent néanmoins à des racines communes : d'où il suit que cette plante doit être plutôt regardée comme monoïque que comme dioïque.

Ses racines sont rampantes, filiformes, très-ramifiées : il s'en élève des tiges simples, hautes de trois à cinq pouces, annuelles, sans aiguillons, chargées de poils glanduleux, munies à leur base de quelques écailles ovales, alternes, amplexicaules, purpurines, garnies de feuilles pétiolées, alternes, peu nombreuses, rarement au-delà de trois, simples, divisées en cinq ou trois lobes irréguliers, inégalement dentées en scie à leurs bords, vertes en dessus, rugueuses en dessous, chargées à leurs deux faces de poils simples ou glanduleux, plus rares à la face supérieure; munies, à la base des pétioles, de deux stipules obtuses.

Les tiges ne produisent qu'une seule fleur terminale, pedunculée, unisexuelle, dont le calice est à cinq divisions très-ouvertes; la corolle assez grande, composée de cinq pétales ovales, veinés, obtus à leur sommet; des étamines nombreuses dans les fleurs mâles, terminées par des anthères jaunâtres; un grand nombre d'ovaires dans les fleurs femelles, surmontés de styles filiformes & terminés par des stigmates obtus, & les rudiments non développés des étamines. Il leur succède une baie d'un toux clair, très-succulente, ovale, caduque.

Cette plante est très-commune dans les marais tourbeux en Suède, en Sibirie, dans le Danemark. On la rencontre également en Amérique, vers la baie d'Hudson. (V. f.)

Ses baies sont très-bonnes à manger, très-fraichissantes, humectantes; elles sont favorables aux phisiques, & surtout aux scorbutiques. Les Lapons les conservent d'une année à l'autre lorsque, fraîchement cueillies, ils ont soin de les couvrir de neige.

## 2. RONCE à feuilles coriaces. *Rubus coriaceus*.

*Rubus foliis simplicibus, coriaceis, glaberrimis, ovato-oblongis; paniculis solitariis, unifloris; caule subsimplici, subinermi.* (N.)

Ses tiges sont droites, presque simples, herbacées, rougeâtres, comprimées, très-glabres, armées seulement, à leur partie supérieure, de quelques petits aiguillons rares, garnies de feuilles distantes, alutres, pétioles, épaisses, coriaces, ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, dentées en scie à leurs bords, presque obtuses, munies de quelques petits aiguillons sur leur pétiole, ayant à leur base deux stipules ovales, dentées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées vers l'extrémité des tiges, supportées par un pédoncule simple, droit, un peu épais, armé d'aiguillons très-fins. Le calice est grand, assez ample à sa base, à cinq divisions lancéolées, acuminées, glabres, verdâtres. La corolle m'a paru jaune, les pétales arrondis, crénelés à leur sommet, plus courts que le calice.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombey. (V. f. in herb. Jussieu.)

## 3. RONCE des rochers. *Rubus saxatilis*. Linn.

*Rubus foliis ternatis, nudis; flagellis reptantibus, herbaceis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 708. — Flor. Suec. 411. 447. — Jacq. Vind. 245. — Welter. Flor. dan. tab. 134. — Mill. Dict. n.º 8. — Crantz. Austr. pag. 82. — Scop. Carn. n.º 614. — Pallas, Iter 1. pag. 72. — Willd. Atbr. 327. — Hoffm. Germ. 177. — Roth. Germ. 1. p. 220. — Il. 565. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 133. n.º 751. Il. — Gouan, Monsp. pag. 258.

*Rubus caule herbaceo; foliis glabris, ternatis; acinis paucifloris.* Hall. Helv. n.º 1111.

*Rubus caule repente, annuo; foliis ternatis.* Flor. lap. 206. — Roy. Lugd. Bat. 274.

*Rubus saxatilis, alpinus.* Clus. Pann. 115. 116. — Idem, Hist. 118.

*Chamaerubus saxatilis.* C. Bauh. Pin. 480.

*Rubus alpinus, humilis.* Tourn. Inst. R. Herb. 615. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 61. Icon.

3. *Rubus* (saxatilis canadensis), herbaceus, trifoliatus; foliis: subrhombicis, acutis, inciso-dentatis; impari petiolato, floribus subternis. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 298.

*Rubus canadensis.* Juss. Hort. Paris.

Cette espèce est très-distincte des autres, surtout par les grains peu nombreux & séparés qui composent les baies.

C'est une plante presque herbacée, dont les tiges, longues d'un à trois pieds, sont couchées, médiocrement relevées, un peu rougeâtres, pubescentes, nues ou chargées de quelques aiguillons fort petits; elles se divisent en jets rampans & en rameaux effilés, garnis de feuilles alternes, longuement pétioles, routes ternées, composées de folioles assez grandes, ovales, vertes & glabres à leurs deux faces, quelquefois un peu pubescentes particulièrement à leur base & sur les pétioles, inégalement & grossièrement dentées à leur contour; les deux folioles latérales presque sessiles, la terminale pétiole & munies sur leur pétiole & sur les nervures postérieures de quelques aiguillons extrêmement fins.

Les fleurs sont de couleur blanche, solitaires, ou plus ordinairement placées deux ou trois sur un pédoncule commun, axillaire ou latéral, opposé aux feuilles, un peu hispide, muni de petites bractées courtes à l'insertion des pédoncules particuliers, qui sont presque disposés en ombelle. Le calice est partagé en cinq découpures lancéolées, presque obuses. Les pétales sont oblongs, un peu plus grands que le calice. Les baies sont rougeâtres, composées seulement de trois ou quatre grains lisses & séparés.

Cette plante croît en Alsace, dans les départements méridionaux de la France, sur les montagnes élevées des environs de Grenoble. Elle m'a été communiquée par M. de Foucault, qui l'y a recueillie. (V. f.)

La même plante, née dans le Canada, présente quelques différences; elle est pubescente: ses feuilles sont munies à leur base de stipules ovales, lancéolées. Les fleurs, ordinairement au nombre de trois dans chaque aisselle, sont longuement pédiculées, deux réunies sur le pédoncule commun, & la troisième solitaire.

## 4. RONCE acule. *Rubus aculeatus*. Mich.

*Rubus herbaceus, pusillus; foliis omnibus subracicatis, trifoliatis; foliis sessilibus, lateralibus subtrapezoidicis; impari rhombo; flore unico, breviter pedicellato.* Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 298.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le *Rubus arcticus*, mais elle en diffère par son port & par la forme & la disposition de ses feuilles.

C'est une fort petite plante, très-basse, herbacée, presque sans tige, dont les feuilles sont presque routes radicales, divisées en trois folioles sessiles, les deux latérales ayant presque la forme

d'un trapèze, & l'impair celle d'un thombe. Elle ne produit qu'une seule fleur terminale, médiocrement pédonculée.

Cette plante a été découverte par Michaux dans les marais tourbeux de la baie d'Hudson. ? ○

5. RONCE à feuilles de bénoîte. *Rubus geoides*. Smith.

*Rubus foliis simplicibus ternatisque, obtusis, serratis, natis; foliolo impari, maximo. Smith. Icon. ined. Fasc. 1. pag. 19. tab. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 2.*

Ses tiges sont très-basses, presque rampantes, herbacées, comprimées, garnies de feuilles pétiolées, alternes, la plupart ternées, quelques-unes simples, ovales, en cœur, irrégulièrement dentées en scie à leurs bords, obtuses à leur sommet, très-glabres à leurs deux faces, veinées en dichotomies; la foliole impaire beaucoup plus grande que les deux autres, échancrée en cœur, supportée par des pétioles médiocrement velus.

Les fleurs sont solitaires, hermaphrodites, soutenues par des pétioles courts, très-épais, pubescents. La corolle est composée de cinq pétales ouverts, presque ronds.

Cette plante croît au détroit de Magellan, où elle a été recueillie par Commerçon. ? (V. f. in herb. Juss.)

Observations. Cette plante nous paroît devoir appartenir aux *aulibarda*, dont elle a le port & les caractères extérieurs; mais n'ayant pu observer toutes les parties de la fructification, je n'ai pas cru devoir la faire passer dans ce nouveau genre, jusqu'à ce qu'elle fût mieux connue.

6. RONCE à feuilles trifides. *Rubus trifidus*. Thunb.

*Rubus foliis simplicibus, inciso-trifidis, glabris; caule inermi. Thunb. pag. 217.*

Ses tiges sont droites, herbacées, un peu flexueuses, presque simples, glabres, cylindriques, de couleur purpurine, dépourvues d'aiguillons, garnies de feuilles alternes, pétiolées, simples, presque rondes, échancrées en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, presque palmées, plus ordinairement divisées en trois lobes incisés, inégalement dentés en scie.

Les fleurs sortent du même bourgeon que les feuilles; elles sont solitaires, rarement deux sur le même pédoncule. Ces pédoncules, ainsi que les pétioles, sont velus, longs de trois à quatre pouces. Le calice est blanchâtre, tomenteux; les fruits rouges, d'une saveur agréable, très-bons à manger.

Cette plante croît au Japon, dans les environs

de Quana, où elle a été découverte par Thunberg. ? (Descript. ex Thunb.)

7. RONCE étoilée. *Rubus stellatus*. Smith.

*Rubus foliis simplicibus, lobatis; caule inermi, erecto, unifloro; laciniis calicinis lanceolatis, acutis. Smith. Icon. ined. Fasc. 3. pag. 64. tab. 64.*

*Rubus foliis simplicibus, cordatis, trilobis, rugoso-venosis; caule inermi, unifloro, erecto; petalis lanceolatis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1089. n°. 28.*

Il y a des rapports assez marqués entre cette espèce & le *rubus arcticus*; mais les feuilles sont simplement lobées & non pas ternées.

Ses tiges sont droites, presque simples, sans aiguillons, courtes, pubescentes, garnies de feuilles alternes, simples, pétiolées, en forme de cœur, ridées & marquées de veines rameuses, divisées en trois lobes profonds, glabres, dentées à leur contour. Les pétioles sont velus, filiformes; les stipules glabres, ovales, aiguës. Les fleurs sont solitaires, pédonculées à l'extrémité de chaque tige. Leur calice est divisé en cinq, quelquefois six ou sept découpures pubescentes, longues, linéaires, lancéolées, aiguës. La corolle est de couleur purpurine ou rougeâtre, assez grande, composée de cinq pétales lancéolés, alternes avec les divisions du calice & en même nombre, obtus; les filaments un peu courbés; les ovaires fort petits; les styles courts.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. ?

8. RONCE du nord. *Rubus arcticus*. Linn.

*Rubus foliis ternatis; caule inermi, unifloro. Linn. Syst. veget. pag. 476. — Flor. suec. 412. 448. — Mater. medic. 130. — Miller, Dict. n°. 9. — Gmel. Sibir. 3. pag. 179. n°. 22. — Æler. Flor. dan. tab. 483. — Willd. Arbr. 327. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1088. n°. 26.*

*Rubus caule unifloro, foliis ternatis. Flor. japon. 207. tab. 5. fig. 2. — Hort. Cliff. 192. — Roy. Lugd. Bat. 274.*

*Rubus humilis, flore purpureo. Buxb. Centur. 5. pag. 13. tab. 26. Mala.*

*Rubus trifolius, humilis, non spinosus, sapore & odore fragaria; fructu rubro, polyocco. Amm. Ruth. 185.*

*Fragaria septentrionalium fruticans; bacca rubris, dulcibus, mellitis. Frank. Spec. 14.*

*Fragaria suorum fruticans. Rudb. Hort. 43.*

*Rubus humilis, fragaria folio, fructu rubro. Rudb. Iter, 9. Lap. 99.*

*Fragaria fruticans*. Radd. Catal. 17.

C'est une fort petite plante dont les racines sont rampantes, filiformes, & produisent des tiges presque simples, hautes de trois à quatre pouces, droites, filiformes, sans aiguillons, dont les rameaux rares sont courts, simples, axillaires, la plupart stériles, garnis de feuilles alternes, petites, pétiolées, ternées, & dont les folioles sont rhomboïdales, dentées en scie à leurs bords, munies à la base des pétioles de stipules ovales, entières, persistantes.

Les fleurs sont solitaires, terminales, pédonculées : leur calice est à cinq découpures droites, acuminées. La corolle est composée de cinq pétales de couleur pourpre, aussi bien que les filaments, terminés par des anthères blanchâtres. Le fruit est une baie d'un pourpre foncé, d'une saveur acide, très-agréable, & d'une odeur douce, approchant de celle des fraises.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, dans la Suède, la Sibérie, &c. ♀ (V. f. in herb. Juss.)

#### 9. RONCE pédiataire. *Rubus pedatus*. Smith.

*Rubus foliis pedato-quinatis, incisus; pedunculis filiformibus, medio bracteatis; calicibus glabrisculis*. Smith, Icon. med. Fasc. 3. pag. 64. tab. 63. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1088. n° 24.

Petite plante délicate, herbacée, assez élégante, reconnaissable à ses feuilles pédiataires.

Ses racines sont fibreuses; ses tiges grêles, rampantes, radicantes à leurs nœuds, glabres, cylindriques, sans épines, garnies de feuilles droites, pétiolées, ternées; les folioles latérales supportées par un pédicule biface, & divisées en deux lobes profonds, arrondis; chaque foliole ovale, incisée, crénelée, nue, verte à ses deux faces, un peu velue sur les nervures; les pétioles très-longs, linéaires, canaliculés, glabres, munis à leur base de deux stipules concaves, arrondies, membraneuses, obtuses.

Les fleurs sont solitaires, droites, longuement pédonculées, garnies vers leur milieu de deux bractées opposées, glabres, obtuses, arrondies, fort petites. Les calices se divisent en cinq folioles oblongues, rectilignes, glabres ou légèrement velues, quelquefois à deux ou trois dents à leur sommet. La corolle est aussi longue que le calice; les pétales ouverts, ovales, obtus; les étamines plus courtes que la corolle; les anthères petites, arrondies; les ovaires glabres, petits; les styles droits, presque de la longueur des étamines; les stigmates obtus.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. ♀ (Descript. ex Smith.)

*Observations.* Cette espèce paroît se rapprocher beaucoup des *salicoides*.

#### 10. RONCE à feuilles ovales. *Rubus obovalis*. Mich.

*Rubus frutescens, pilis rigidis, hispidualis; foliis trifoliatis, foliolis r. undato-obovalibus, pedunculis compositis multifloris*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 298.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, hérissées de poils toides, garnies de feuilles alternes, pétiolées, divisées chacune en trois folioles ovales, presque arrondies, rétrécies à leur base, élargies & obtuses à leur sommet. Les fleurs sont disposées en grappes ramifiées.

Cette plante croît dans les vallées des hautes montagnes, dans les contrées septentrionales de l'Amérique, où elle a été découverte par Michaux. ♀?

#### \* \* Tiges ligneuses.

#### 11. RONCE framboisière. *Rubus idaeus*. Linn.

*Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque; caule aculeato, petiolis canaliculatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 706. — Flor. suec. 408. 446. — Mater. medic. 130. — Crantz. Austr. pag. 81. — Willd. Atbr. 323. — Pollich, Pal. n° 488. — Scopol. Carn. 614. — Duroi, Harbk. 2. pag. 376. — Hoffm. Germ. 177. — Blachw. tab. 189. — Knorr. Del. 2. tab. R. 1. — Roth. Germ. 1. pag. 219. — Il. 562. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 135. n° 751. VI. — Wedd. Flor. dan. tab. 788. — Gérard, Hist. 1172. fig. 2.

*Rubus caule erecto, hispido; foliis ternatis*. Flor. japon. 204. — Hort. Cliff. 192. — Hort. Upf. 133. — Roy. Lugd. Bat. 273.

*Rubus caule spinoso, suberecto; foliis quinatis & ternatis, subius tomentosis; fructibus hirsutis*. Hall. Helv. n° 1108.

*Rubus idaeus spinosus*. C. Bauh. Pin. 479. — Tourn. Inst. R. Herb. 614. — Dalech. Hist. 1. pag. 123. Icon. — Lobel, Icon. 2. pag. 212. — Idem, Observ. 619. Icon.

*Rubus idaeus spinosus; fructu rubro*. Duham. Arbr. vol. 2. pag. 232. tab. 56. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 59. Icon.

*Rubus idaeus*. Dodon. Pempt. 743. Icon.

*Rubus idaeus vulgaris*. Clus. Hist. pag. 117.

*Rubus frambosianus*. Lam. Flor. franç. L. C.

Vulgairement le framboisier.

3. *Rubus idaeus, fructu albo*. C. Bauh. Pin. 479. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 232. — Tournier, Inst. R. Herb. 614.

*Rubus idaeus, spinosus; fructu albo.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 59.

*Rubus idaeus, albo fructu.* Clus. Hist. 117.

*γ. Rubus idaeus, levis.* C. Bauh. Pin. 479. — Tournef. Inst. R. Herb. 614.

*Rubus idaeus, non spinosus.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 60.

*Rubus hircinus.* Tabern. Icon. 897.

*Rubus (glaber), foliis ternatis, subulis tomentosis; caule glabro.* Miller, Dict. n.° 4.

L'odeur suave & parfumée des fruits de cette espèce, connus sous le nom de *framboises*, lui donne le premier rang parmi ses congénères, & une place distinguée dans nos jardins.

Ses tiges sont droites; hautes de cinq à six pieds, foibles, blanchâtres, divisées en rameaux grêles, effilés, presque cylindriques, légèrement striés, chargés d'aiguillons fort petits, moins piquans que dans les autres espèces, garnis de feuilles alternes, pétiolées; les inférieures ailées, composées de cinq folioles ovales, oblongues, aiguës, assez grandes, d'un vert gai à leur face supérieure, blanchâtres & même légèrement cotonneuses en dessous, irrégulièrement dentées à leurs bords, les dents un peu mucronées à leur sommet; les feuilles supérieures ternées; les pétioles presque sans aiguillons, canaliculés à leur face supérieure.

Les fleurs sont blanches, disposées en petites panicules latérales & terminales, soutenues par des pédoncules grêles, velus, un peu rameux, munis de petits aiguillons épars. Il leur succède des fruits ovales, rougeâtres, un peu pubescens, d'une odeur exquise, conservant à leur base le calice divisé en cinq découpures ouvertes, un peu réfléchies, blanchâtres, surtout à leurs bords; ovales, acuminées & subulées.

Cette espèce produit plusieurs variétés; une à fruits blancs, non moins agréables que ceux de couleur rouge; ils semblent même avoir un parfum plus délicieux: une autre dépourvue d'épines, qui s'élève moins; enfin quelques autres dont les feuilles sont panachées, les fleurs simples ou doubles.

Cette plante croît naturellement dans les lieux montagneux & pierreux des contrées méridionales de l'Europe, dans les hautes & basses Alpes, &c. (V. v.)

Les framboises sont rafraîchissantes, mais un peu ventueuses lorsqu'on en mange avec excès; elles conviennent, ainsi que leur sirop, pour calmer la soif & les ardeurs de la fièvre. On les mange crues, mêlées avec les fraises & les groseilles: on en fait des confitures agréables, des compotes, des gelées, des conserves; elles entrent dans la compo-

sition d'un grand nombre de ratafiers. Avec le sucre & l'eau, on en prépare une boisson extrêmement agréable & rafraîchissante, connue sous le nom d'eau de framboises, fort en usage dans les grandes chaleurs de l'été. Infusées dans le vin, les framboises lui communiquent un goût & une odeur délicieuse. Ce vin est cordial, stomachique, utile dans les vomissemens qui viennent de la foiblesse & de l'atonie de l'estomac. Elles donnent aussi par elles-mêmes, au moyen de la fermentation, un vin agréable. On en retire, par la distillation, une eau-de-vie très-spiritueuse.

Les racines de cette plante colorent l'eau en rouge. On attribue à ses feuilles les mêmes propriétés qu'à celles de la tonce des haies.

## 12. RONCE de Commerçon. *Rubus Commerçonii.*

*Rubus foliis septenatis quinatisve, glabris; flore magno, calicibus longe acuminatis, caule auleato.* (N.)

Cette ronce a de grands rapports avec le *rubus idaeus*; elle en diffère par ses folioles plus petites, glabres à leurs deux faces; par ses fleurs plus grandes.

Ses tiges poussent des rejets d'une longueur médiocre, prolifères, à tige glabre, cylindrique, roussâtre, un peu anguleuse, munie de quelques aiguillons rares, presque droits; garnie de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de sept, cinq ou trois folioles ovales, lancéolées, étroites, glabres à leurs deux faces, incisées, dentées à leurs bords, presque sessiles; la terminale plus grande, pétiolée, quelquefois lobée; les pétioles pubescens, cylindriques, armés de quelques aiguillons courts & foibles.

Les fleurs sont terminales ou axillaires, presque solitaires. Leur calice se divise en cinq découpures étroites, lancéolées, longuement acuminées & subulées. La corolle est blanche, se double fréquemment; les pétales, assez grands, un peu arrondis, à peine plus longs que le calice; les fruits ovales, rougeâtres, de la grosseur des framboises; les semences plus petites, d'une odeur & d'un saveur bien moins suaves.

Cette plante croît à l'île de Java, dans les lieux ombragés des montagnes. Elle a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

## 13. RONCE des haies. *Rubus fruticosus.* Linn.

*Rubus foliis quinatis-digitatis ternatisque, caule petiolisve acaulescentis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 707. — Desfont. Flot. atlant. vol. 1. pag. 407. — Miller, Dict. n.° 1. — Flor. suec. 409. 444. — Scopol. Carn. n.° 613. — Pollich, Pal. n.° 490. — Kniph, Centur. 5. n.° 77. — Willd. Achr. 326. — Miller, Illustr. Icon. — Roth. Getm. 1. 220. — Il. 564.

564. — Houtm. Germ. 177. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 134. n°. 751. V. — Idem, Illustr. Gen. tab. 441. fig. 2. — Guss. de Fruct. & Sem. Centr. 5. tab. 73. fig. 9. — Germ. Hist. 1272. fig. 1.

*Rubus caule aculeato, foliis ternatis ac quinatis.* Horr. Cliff. 192. — Gronov. Virgin. 163. — Roy. Lugd. Bar. 273.

*Rubus caule spinoso, serpente; foliis quinatis & ternatis, subulis tomentosis; baccis levibus.* Haller, Helv. n°. 1109.

*Rubus foliis quinatis & ternatis, costâ spinosâ; fructu nigro & levi.* Crantz. Austr. pag. 82. n°. 2.

*Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis.* Duroi, Harbk. 2. pag. 372.

*Rubus vulgaris, sive rubus fructu nigro.* C. Bauh. Pin. 479. — Tourn. Inst. R. Herb. 614. — Duhamel, Arb. vol. 2. pag. 232. tab. 55. — Zanich. Ist. tab. 164.

*Rubus major, fructu nigro.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 57. Icon.

*Rubus.* Lobel, Icon. 2. pag. 211. — Idem, Observ. 619. Icon. — Dodon. Pempt. 742. Icon. — Fusch, Hist. 552. Icon. — Tragus, 970. Icon. — Paul. Dan. tab. 337. — Dalech. Hist. 1. pag. 119. Icon. — Blackw. tab. 45. — Park. Theatr. 113. Icon. — Camer. Epitom. 751. Icon.

*β. Rubus vulgaris, major; fructu albo.* Rai, Angl. 3. pag. 467.

*Rubus (tomentosus), caule erecto petiolisque aculeatis; foliis ternis quinifide, subrotundo-ovalibus, subulis candidanti-tomentosis; floribus paniculatis.* Thuill. Paris, édit. 2. pag. 253. n°. 4.

*γ. Rubus flore albo, foliis laciniatis.* Mapp. Alf. 272.

*Rubus laciniatus.* Horr. Paris.

*δ. Rubus flore albo, pleno.* Magn. Hort. 175. — Tourn. Inst. R. Herb. 614.

*ε. Rubus vulgaris, sine spinis.* Magn. Hort. 175.

*Rubus vulgaris, spinis carens.* Tourn. Inst. R. Herb. 614.

*Rubus non spinosus, major; fructu nigro.* Bartel, Icon. rar. tab. 395. Ronce de Saint-François.

Vulgairement la ronce. Regn. Bot. Icon.

Plante très-connue par tous ceux qui parcourent les bois, auxquelles elle occasionne beaucoup d'incommodités, & dont elle arrête la marche par ses riges ligneuses, très-longues, sarmenteuses, plus ou moins couchées, anguleuses, garnies d'aiguillons très-forts & crochus, divisées en rameaux longs, bruns & glabres, ou un peu pubescens; blanchâtres & presque glauques, surtout dans leur

Botanique. Tome VI.

jeunesse; munis de feuilles alternes, pétiolées, composées de trois & cinq folioles, ovales, pointues, d'un vert foncé en dessus, un peu cotonneuses & blanchâtres en dessous, dentées irrégulièrement en scie à leurs bords; la foliole impaire est très-écartée des deux ou des quatre autres; les feuilles supérieures n'ont ordinairement que trois folioles: les aiguillons règnent sur les tiges, les rameaux, les pétioles, rarement sur la principale nervure des feuilles; ils y sont alors très-courts & fort petits.

Les fleurs sont blanches ou un peu rougeâtres; elles forment des grappes droites, terminales, simples ou un peu paniculées, & même disposées en bouquets. Les pédoncules, ainsi que les calices, sont blanchâtres, légèrement tomenteux; les pétales très-ouverts, un peu arrondis. Les calices se divisent en cinq découpures concaves, ovales, très-aiguës, réfléchies après la floraison, & persistantes avec les fruits. Ceux-ci sont arrondis ou un peu ovales, composés de grains succulents, d'un rouge-noirâtre très-foncé, glabres, luisants.

Cette espèce présente plusieurs variétés remarquables: souvent ses feuilles sont vertes à leurs deux faces; elles sont fort grandes dans la variété β, d'un vert-pâle ou assez clair en dessus, quelquefois presque rondes, plus ou moins romaneuses, terminées par une pointe allongée; les tiges redressées; les fruits blancs. Dans la variété γ, les folioles sont profondément découpées & pinnatifides; enfin, les fleurs le doublement assez souvent, & les aiguillons manquent sur certains individus.

Cette plante est très-commune en Europe, dans les bois, les haies, les lieux couverts. (V. v.)

Les fruits que l'on nomme dans certaines contrées mûres sauvages ou mûres de renard, ont une saveur acide assez agréable, mais fade en comparaison des véritables mûres. Ils sont astringents, diurétiques, rafraîchissants, mais sujets à donner des coliques. On s'en sert pour arrêter le cours de ventre & rappeler l'excrétion des urines. Leur sirop le prescrit en gargarisme contre l'équinancie. Ces fruits servent encore à colorer le vin muscat. L'eau distillée des fleurs est aromatique, un peu cordiale. On emploie les feuilles en décoction dans les maux de gorge: elles sont astringentes, détersives, dessicatives.

14. RONCE triviale. *Rubus trivialis.* Mich.

*Rubus sarmentoso-procumbens, stipulis subulatis; foliis 3-5-digitatis; foliolis oblongo-ovalibus, non acuminatis, subsqualiter serratis, glabriusculis; pedicellis subsulcatis, elongatis.* Michaux, Flor. bor.-amer. vol. 1. pag. 296.

*Rubus fruticosus.* Walter, Flor. carolin.

Malgré les rapports nombreux que cette plante

H h

peut avoir avec notre *rubus fruticosus*, Michaux la regarde comme devant former une espèce particulière, tant à cause de ses folioles plus allongées & non acuminées, que par la forme arrondie, presque orbiculaire des pétales.

Ses tiges sont ligneuses, couchées, diffuses, s'étendant au loin sur la terre; garnies de feuilles alternes, pétiolées, digitées, composées de cinq à trois folioles, ovales, oblongues, non acuminées, presque glabres à leurs deux faces, inégalement dentées en scie à leurs bords, soulignées par des pétiolules velus & garnis d'aiguillons, innés à leur base de stipules subulées.

Les fleurs sont placées sur des pédoncules presque solitaires, hispides, chargés d'aiguillons. La corolle est d'une grandeur médiocre, les pétales presque orbiculaires, les baies noirâtres, bonnes à manger.

Cette plante croît dans la Caroline & la Pensilvanie, où elle est très-commune. *h* (*V. f. in herb. Jussieu.*)

15. RONCE à feuilles ailées. *Rubus pinnatus*. Willden.

*Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, rugosis, utrinque glabris; caule, petiolis pedunculisque aculeatis; racemo terminali.* Willden. Spec. Plant. v. 2. pag. 1081. n.º 2.

Cette espèce paroît avoir des rapports avec le *rubus australis*; mais dans ce dernier les fleurs sont dioïques.

Celui-ci, d'après Willdenow, a des tiges ligneuses, qui se divisent en rameaux velus, de couleur verte, chargés d'aiguillons recourbés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de cinq folioles ovales, lancéolées, vertes à leurs deux faces, rugueuses, veinées, munies d'aiguillons sur leur principale nervure, à double dentelure fine à leur contour.

Les fleurs sont disposées en grappes simples à l'extrémité des rameaux; leur pédoncule est velu, considérablement chargé d'aiguillons; les calices sont également velus, divisés en cinq découpures plus longues que les pétales.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. *h* (*Descript. ex Willden.*)

16. RONCE australe. *Rubus australis*. Forst.

*Rubus fruticosus, dioïcus; foliis ternatis, quinato-pinnatisque; caule petiolisque aculeatis; racemis axillaribus, simplicibus.* Forst. Prodr. n.º 224.

Cette plante se rapproche beaucoup du *rubus pinnatus*; elle en diffère par ses fleurs dioïques & leur disposition.

C'est un arbrisseau dont les rameaux sont garnis

d'aiguillons & de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées de folioles ordinairement au nombre de cinq ou de trois, supportées par des pétiolules épineux. Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en grappes simples, latérales; elles sont dioïques.

Cette plante a été observée par Forster dans la Nouvelle-Zélande. *h*

17. RONCE sans corolle. *Rubus apetalus*.

*Rubus foliis pinnatis, subulis tomentosis; floribus racemosis, apetalis; ramis pubescentibus apetalis.* (N.)

Ses rameaux sont presque cylindriques, un peu comprimés, pubescents, armés d'aiguillons rougeâtres, munis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées de sept ou cinq folioles ovales, presque orbiculées, à peine pédonculées, glabres à leur face supérieure, blanchâtres & tomenteuses en dessous, dentées en scie à leurs bords, longues de deux à trois pouces, larges d'un pouce & demi, garnies d'aiguillons sur leur pétiole; la foliole impaire plus grande, quelquefois divisée en trois lobes.

Les fleurs sont placées en grappes courtes, touffues, droites, tant dans l'aisselle des feuilles qu'à l'extrémité des rameaux. Les pédoncules sont blanchâtres & pubescents, ainsi que les calices. Ceux-ci se divisent en cinq découpures droites, lancéolées, presque linéaires, aiguës; je n'y ai point observé de corolle. M. Petit-Hours, qui a vu fréquemment cette ronce à l'Île-de-France, m'a assuré qu'en effet il n'y avoit jamais vu de corolle. Les fruits ne contiennent qu'un petit nombre de grains.

Cette plante croît dans les plaines & sur les hauteurs de la Caferrie, à l'Île-de-France, où elle a été recueillie par Commerçon. *h* (*V. f. in herb. Jussieu.*)

18. RONCE à feuilles de frêne. *Rubus fraxinifolius*.

*Rubus foliis pinnatis; foliolis ovato-acuminatis, glabris; panicula diffusa; pedicellis filiformibus; caule vix aculeato, glaberrimo.* (N.)

Très-belle espèce, dont les rameaux sont cylindriques, luisants, très-glabres, un peu rougeâtres, à peine épineux, garnis de feuilles alternes, ailées, pétiolées, composées de sept ou cinq folioles ovales, lancéolées; presque sessiles, opposées, longues de trois à quatre pouces & plus, larges au moins d'un pouce & demi, lisses à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, incisées, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet, munies sur leur pétiole de quelques aiguillons recourbés; très-souvent la feuille supérieure est simple, les stipules sétacées.

Les fleurs forment une ample & belle panicule terminale, dont les ramifications sont munies de bractées oblongues, la plupart incisées, subulées à leur sommet. Les pédicules sont longs, filiformes, & se terminent par une seule fleur blanchâtre, dont le calice est à cinq divisions ovales, acuminées, glabres, vertes en dehors, blanchâtres en dedans, acuminées. La corolle, à peine plus longue que le calice, a ses pétales arrondis, obtus, un peu onguiculés. Les fruits sont gros, globuleux, composés de grains très-nombreux.

Cette espèce a été recueillie par Commerçon à l'île de Java. *h* (*V. f. in herb. Jussieu.*)

19. RONCE à feuilles de rosier. *Rubus rosafolius*. Smith.

*Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, utrinque viridibus; caule petiolisque aculeatis; floribus solitariis*. Smith. Icon. Falcic. 3. pag. 60. tab. 60. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1808. n°. 1.

Arbrisseau dont les tiges sont chargées d'aiguillons recourbés, divisées en rameaux garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées chacune de cinq ou trois folioles ovales, lancéolées, acuminées, vertes à leurs deux faces, un peu pileuses, supportées par des pétioles munis d'aiguillons très-courts. Les fleurs sont latérales, pédonculées, solitaires, opposées aux feuilles vers l'extrémité des rameaux. Les calices sont verdâtres, pubescents en dehors, blancs en dedans, à divisions beaucoup plus longues que la corolle, terminées par une longue pousse subulée. La corolle est blanchâtre; les pétales oblongs, obtus; les fruits ovales; les semences fort petites.

Cette plante croît à l'île Maurice. *h* (*V. f. in herb. Jussieu ex herb. Commerçon.*)

20. RONCE élançée. *Rubus strigosus*. Mich.

*Rubus inermis, rigidè hispidissimus; folioliis ternatis aut pinnato-quinis, ovalibus, basi abruptis, subitilimeis & candido-tomentosis; impari fapius subcordato*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 297.

Arbrisseau dont les tiges & les rameaux sont allongés, étiles, dépourvus d'aiguillons, mais hérissés de poils roides, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois ou cinq folioles ovales, élargies à leur base, rétrécies & insensiblement acuminées vers leur sommet, blanches & tomenteuses en dessous, marquées de nervures linéaires, dentées à leurs bords; la foliole impaire, très-souvent échancrée en cœur à sa base; les deux folioles latérales sont souvent divisées en deux autres bijuguées, portées sur un pétiole commun & non ailées. Les pétioles, les pédoncules, les nervures des feuilles, ainsi que les calices, sont couverts d'un grand nombre de poils noirs & roides.

Cette plante a été recueillie par Michaux sur les montagnes de la Pensilvanie & dans le Canada. *h*

21. RONCE velue. *Rubus villosus*. Ait.

*Rubus foliis quinatis, ellipticis, acuminatis, argutè ferratis, utrinque villosis; caulibus petiolisque aculeatis*. Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 110. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1085. n°. 14.

*Rubus pubens, hispidulus aculeatusque; foliis 3-5-digitatis, foliatis abique albedine pubentibus, stipulis setaceis, calice breviter acuminato, racemo laxo; pedicellis foliariis, longiusculis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 297.

An *rubus hispidus*? Walther, Flor. carol.

An *rubus vulpinus*? Hort. Paris.

Cet arbrisse se rapproche du *rubus hispidus* de Linné, & il est à présumer que celui qui est cité par Waltherius sous ce dernier nom, est la même plante que celle dont il est ici question.

Ses tiges sont pubescentes, ligneuses, un peu velues, armées d'aiguillons, garnies de feuilles alternes, pétioles, digitées, composées de cinq & de trois folioles ovales, elliptiques, acuminées, pubescentes & vertes à leurs deux faces, finement dentées en scie à leurs bords, munies à leur base de stipules sétacées & d'aiguillons sur leurs pétioles.

Les fleurs sont la plupart terminales, quelquefois axillaires, disposées en une grappe lâche; soutenues chacune par des pédicules allongés & solitaires. Les calices se divisent en cinq découpures ovales, médiocrement acuminées à leur sommet.

Cette plante croît dans toute l'étendue de la Caroline. *h* (*V. f. Commun. Dupuis.*)

Observations. Le *rubus vulpinus* du Jardin des Plantes de Paris ne diffère de cette espèce, à ce qu'il me paroît, que par ses feuilles glabres à leur face supérieure. Un exemplaire de la même plante, recueillie en Virginie, & qui m'a été communiquée par M. Dupuis, offre le même caractère.

22. RONCE du Canada. *Rubus canadensis*. Linn.

*Rubus foliis digitatis, densis, quinis ternatisque; caule inermi*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 707. — Mill. Icon. Illustr. tab. 223. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1085. n°. 15.

Ses tiges sont sans aiguillons, ainsi que ses rameaux de couleur pourpre, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées ou plutôt digitées, composées de folioles dont le nombre varie beaucoup; les feuilles inférieures en contiennent jusqu'à dix, les supérieures cinq ou trois; elles sont lancéolées, nues à leurs deux faces, finement dentées en scie,



muniées de stipules linéaires, presque épineuses : les pédoncules supportent des bractées lancéolées.

Cette plante croît au Canada.  $\mathfrak{H}$

23. RONCE de la Jamaïque. *Rubus jamaicensis*. Linn.

*Rubus foliis quinatis ternatisve, subtus tomentosis; caule, petiolis folisque pubescentibus, recurvato-aculeatis; paniculis diffusis.* Swartz, Obsev. pag. 205. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1084. n°. 11.

*Rubus foliis ternatis, subtus tomentosis; caule, petiolis folisque pubescentibus, recurvato-aculeatis.* Linn. Mantill. pag. 75.

*Rubus aculeatus; foliis digitato-quinatis, serratis, subtus argenteis.* Brown, Jam. 342.

*Rubus foliis longioribus, subtus molli lanugine obdatis & incanis; flore & fructu minoribus.* Sloan, Jam. 2. pag. 109. tab. 213. fig. 1. — Rai, Dendr. 76.

Ses tiges se divisent en rameaux pubescens, armés d'aiguillons forts, nombreux, recourbés, garnis de feuilles pétioles, alternes, composées de cinq ou trois folioles grandes, opposées, pétioles, ovales, oblongues, aiguës, vertes en dessus, blanches, tomenteuses & presque argentées à leur face inférieure, dentées en scie à leur contour, chargées sur leur pétiole de beaucoup d'aiguillons.

Les fleurs forment une ample panicule terminale, diffuse, dont les pédoncules & leurs ramifications sont pubescens, munis de beaucoup d'aiguillons fins, très-aigus. Le calice à ses divisions presque droites, linéaires, oblongues, obtuses. La corolle est petite; les fruits ovales, d'une grosseur médiocre.

Cette plante croît dans la Jamaïque & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale.  $\mathfrak{H}$

24. RONCE bleuâtre. *Rubus caesus*. Linn.

*Rubus foliis ternatis, subnudis, lateralibus, bilobis; caule aculeato, tereti.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 706. — Hort. Cliff. 192. — Flor. suec. 410. 445. — Roy. Lund. Bar. 275. — Mill. Dict. n°. 2. — Duroi, Harbk. 2. pag. 375. — Scop. Carn. n°. 612. — Pollich, Pal. n°. 489. — Willd. Arbr. 325. — Hoff Germ. 177. — Roth. Germ. 1. 219. — Il. 563. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 134. n°. 751. III. — Bulliard, Herb. franç. tab. 381.

*Rubus caule aculeato, prostrato; foliis ternatis.* Hall. Helv. n°. 1110.

*Rubus reversus, fructu caesio.* C. Bauh. Pin. 479. — Tourn. Inst. R. Herb. 614.

*Rubus minor, fructu caruleo.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 59. Icon.

*Rubus minor.* Dod. Pempt. 742. Icon.

Il est facile, avec un peu d'attention, de distinguer au premier aspect cette ronce de celle des haies. Ses tiges ne sont point anguleuses, & les feuilles, quoique très-souvent pubescentes en dessous, ne sont ni tomenteuses ni blanchâtres, toutes ternées & non ailées.

C'est un sous-arbrisseau dont les tiges sont longues, sarmenteuses, foibles, courbées, rongées, cylindriques; les jeunes rameaux blanchâtres, presque glauques, munis d'aiguillons assez nombreux, mais bien moins forts que ceux de la ronce des haies; garnis de feuilles alternes, pétioles, toutes ternées, composées de folioles plus ou moins larges, ovales, aiguës, minces, glabres & vertes en dessus, très-ordinairement pubescentes, douces au toucher à leur face inférieure, d'un vert plus pâle; les deux folioles latérales, sessiles ou à peine pétioles, quelquefois divisées en deux lobes, à crénelures larges, très-irrégulières.

Les fleurs sont blanches, disposées vers l'extrémité des rameaux en petites grappes presque ombellées, latérales & terminales. Les pédoncules sont droits, presque filiformes, garnis d'aiguillons très-courts; les calices verdâtres, pubescens; leurs découpures ovales, subulées, à bordure blanche; les pétales ovales, obtus, plus longs que les calices. Les fruits sont des baies bleuâtres, couvertes d'une poussière fine que le toucher fait disparaître.

Cette plante croît partout en Europe, sur le bord des chemins, dans les haies, le long des murs, &c.  $\mathfrak{H}$  ( $\mathfrak{V}$ .)

Ses fruits jouissent des mêmes propriétés que ceux de la ronce des haies; ils sont un peu plus délicats : on les mange crus ou confits : ils passent pour astringens & propres à corriger le vin. Les feuilles peuvent aussi être substituées à celles de la ronce des haies.

25. RONCE d'Occident. *Rubus occidentalis*. Linn.

*Rubus foliis ternis, subtus tomentosis; caule aculeato, petiolis teretibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 706. — Kalm. Iter 2. pag. 284. — Mill. Dict. n°. 5. — Willd. Arbr. 324.

*Rubus (occidentalis), ramis petiolisque glaucis & aculeatis; foliis trifloratis; foliolis ovalibus, promissa acuminatis, sublobatis duplicato-serratis, subtus cano-tomentosis.* Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 297.

*Rubus caule suberecto, leviter aculeato; foliis ternatis, fructu nigro.* Gronov. Virgin. 2. pag. 78.

*Rubus idaeus, fructu nigro, virginianus.* Dillen. Eltham. 327. tab. 287. hg. 319.

*Rubus americanus, major erectus; spinis rarioribus,*

*spitse caruleo*. Pluk. Almag. 315. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 233.

Il existe beaucoup de rapports entre cet arbrisseau & le *rubus idaeus*; mais celui dont il est ici question n'a que des feuilles ternées, quoique les folioles latérales soient quelquefois divisées en deux lobes profonds.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, presque droites, divisées en rameaux glabres, un peu diffus, allongés, très-ordinairement de couleur blanche, armés d'aiguillons alternes, recourbés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, composées de folioles ovales, incisées, dentées en scie à leurs bords, vertes en dessus, blanches & tomenteuses à leur face inférieure; les deux latérales presque sessiles & souvent divisées en deux lobes plus ou moins profonds; la foliole terminale pédiculée & longuement acuminée. Les pétioles sont cylindriques, plus longs que les folioles, chargés d'aiguillons recourbés.

Les fleurs sont disposées en une grappe terminale; elles produisent des fruits noirs, quelquefois rouges, d'une saveur acide, & non moins agréable que celle du framboisier ordinaire.

Cette plante croît naturellement au Canada. On la cultive dans plusieurs jardins de l'Europe. *Th* (V. f.)

#### 26. RONCE tomenteuse. *Rubus tomentosus*. Will.

*Rubus foliis ternatis, obovatis, acutis, inaequaliter dentatis, utrinque tomentosis, lateralibus subsinatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1083. n°. 7.

Cette ronce, qui paroît avoir de grands rapports avec le *rubus fruticosus*, surtout avec la variété  $\beta$ , est mentionnée par Willdenow comme une espèce qui en est distincte par les feuilles ternées, tomenteuses à leurs deux faces, & par plusieurs autres caractères qui ne permettent pas de la confondre.

Ses rameaux sont glabres, striés, armés d'aiguillons recourbés, épars, garnis de feuilles alternes, ternées, molles, tomenteuses en dessus & en dessous, composées de trois folioles ovales, aiguës, munies de grosses dents inégales, leur côté extérieur presque divisé en lobes; la foliole terminale un peu plus allongée, très-aiguë, entière à la base, toutes garnies d'aiguillons fort petits, tant sur les pétioles que sur la principale nervure. Les fleurs sont blanches, disposées en panicules à l'extrémité des rameaux; les découpures du calice sont tomenteuses & réfléchies, les pétales ovales, une fois plus longs que le calice.

Cette plante croît dans l'Allemagne & la Suisse. *Th* (Descript. ex Willden.)

#### 27. RONCE à trois folioles. *Rubus triphyllus*. Thunb.

*Rubus foliis ternatis, subtus tomentosis; foliolis ovatis, incisis, serratis; ramis, petiolis pedunculisque villosis aculeatisque*. Thunb. Flot. japon. pag. 215.

Cette plante a des tiges ligneuses, glabres, munies d'aiguillons, divisées en rameaux foibles, effilés, droits, flexueux, velus, épineux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, toutes ternées, composées de folioles ovales, presque anguleuses, glabres à leur face supérieure, blanchâtres & tomenteuses en dessous, incisées à leurs bords, ou divisées en dents fortes, larges, la plupart terminées par un poil fin.

Les fleurs sont disposées en grappes presque paniculées à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pedoncules velus, hispides, chargés d'aiguillons, ainsi que les pétioles. Les calices sont hispides & tomenteux.

Cette plante croît au Japon, où elle a été découverte par Thunberg. *Th* (Descript. ex Thunb.)

#### 28. RONCE orientale. *Rubus sanctus*. Schreb.

*Rubus foliis ternatis simplicibusque, subtus tomentosis; caule petiolisque aculeis recurvis*. Schreb. Dec. p. 15. tab. 8. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1083. n°. 9.

*Rubus creticus, triphyllus; flore parvo*. Tournef. Coroll. 42.

Cet arbrisseau a des tiges & des rameaux épineux, blanchâtres, pubescents, munis de feuilles alternes, ternées, composées de trois petites folioles inégales, sessiles, ovales, vertes en dessus, pubescentes & blanchâtres en dessous, crénelées à leurs bords; la foliole terminale plus grande, presque obtuse; supportées par des pétioles chargés de petites épines recourbées; les feuilles supérieures sont ordinairement simples.

Les fleurs sont les unes solitaires, axillaires vers l'extrémité des rameaux; les autres terminales, presque en corymbe peu garni. Le calice est blanchâtre, pubescent, à cinq folioles concaves, ovales. La corolle est blanche, fort petite.

Cette plante croît dans l'Orient & dans l'île de Crète. *Th* (V. f. in herb. Jussieu.)

#### 29. RONCE à fleurs rouges. *Rubus roseus*.

*Rubus foliis ternatis simplicibusque, maximis, glabris; stipulis magnis; floribus amplis, subsolitariis; caule, petiolis costisque aculeatis*. (N.)

Ses rameaux sont ligneux, striés, glabres, flexueux, armés d'aiguillons, garnis de feuilles alternes, pétiolées, fort grandes, simples ou plus souvent ternées; à trois folioles ovales, lancéolées, inégales, pédiculées, glabres à leurs deux faces, crénelées à leurs bords, un peu plus pâles

en dessous, éhargées d'aiguillons, tant sur leurs périoles que sur leur principale nervure; la foliole terminale plus grande, longue de quatre à cinq pouces, sur trois de large. Les stipules sont grandes, ovales, obtuses, opposées, presque à demi amplexicaules.

Les fleurs sont presque solitaires, axillaires, portées sur de longs pédoncules très-chargés d'aiguillons roufflantes, forts, recourbés. Les calices sont amples, glabres, à cinq divisions lancéolées, acuminées, obtuses, un peu ciliées à leurs bords; la corolle couleur de rose, plus courte que le calice, à cinq pétales presque ronds, onguiculés.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombey.  $\text{H}$  (V. f. in herb. Jussieu.)

30. RONCE à feuilles d'ortie. *Rubus urticifolius*.

*Rubus foliis simplicibus ternatisque; foliolis ovatis, subius sericeis, dentatis; floribus paniculatis, ramis hirsutissimis.* (N.)

Ses tiges sont divisées en rameaux droits, frutescents, presque anguleux, un peu comprimés, munis de quelques aiguillons rares, chargés de poils nombreux, roufflantes, horizontaux, garnis de feuilles alternes, pétioles; les supérieures simples, les inférieures ternées, composées de folioles ovales, presque en cœur, pédiculées, longues de quatre à cinq pouces, sur trois de large; légèrement velues en dessus, soyeuses, tomenteuses & blanchâtres en dessous, dont les périoles, très-velus & armés de quelques aiguillons, sont munis à leur base de stipules linéaires, lancéolées, quelquefois bifides à leur sommet.

Les fleurs forment une ample panicule droite, terminale, composée d'autres panicules alternes, partielles, rameuses, dont les pédoncules sont velus, roufflantes; les pédicules courts, munis à leur base de bractées velues, concaves, ovales, aiguës. Les calices sont petits, à cinq découpures ovales, d'un blanc de neige en dehors. La corolle est à peine plus longue que le calice. Les fruits sont composés de grains réunis en une petite tête globuleuse.

Cette belle espèce croît au Pérou, d'où elle a été rapportée par Dombey.  $\text{H}$  (V. f. in herb. Jussieu.)

31. RONCE de Pensylvanie. *Rubus pensylvanicus*.

*Rubus foliis ternatis; foliolis ovato-lanceolatis, subius tomentosis; calicibus iniis niveo-sericeis, ramis spinosissimis.* (N.)

Ses tiges, chargées d'aiguillons forts, assez nombreuses, ainsi que les branches, se divisent en rameaux frêles, d'un brun rougeâtre, glabres, un peu flexueux à leur partie supérieure, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, dont les fo-

lioles sont ovales, lancéolées, vertes en dessus, pubescentes & tomenteuses en dessous, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues d'un pouce & demi, sur huit à dix lignes de large, les deux latérales fissiles; la terminale périolee, un peu plus grande que les autres; les pétioles pubescens, garnis d'aiguillons.

Les fleurs sont en grappes terminales & axillaires, supportées par des pédicules velus, munis d'aiguillons & de bractées courtes, ovales, acuminées. Le calice se divise en cinq découpures ovales, obtuses, verdâtres en dehors, environnées d'un liferet blanc, garnies intérieurement d'un duvet blanc & soyeux. La corolle est blanchâtre, plus grande que le calice; les pétales ovales, presque arrondis, obtus.

Cette plante croît dans la Pensylvanie; elle a été communiquée par M. Vahl à M. Jussieu.  $\text{H}$  (V. f. in herb. Jussieu.)

32. RONCE à petites feuilles. *Rubus parvifolius*. Linn.

*Rubus foliis ternatis, subius tomentosis; caule hirsuto petiolisque aculeis recurvis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 707.

*Rubus moluccanus, parvifolius.* Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 88. tab. 47. fig. 1.

Ses tiges poussent un grand nombre de rejets diffus, érales, velus, armés d'aiguillons, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, quelquefois aussi quinées, composées de folioles ovales, lancéolées, aiguës, d'environ trois pouces de long, sur un & demi de large; vertes en dessus, tomenteuses en dessous, en dents de scie à leurs bords, acuminées à leur sommet, supportées par des pétioles munis d'aiguillons recourbés.

Les fleurs forment une panicule lâche, terminale, peu ramifiée, garnie de bractées opposées, ovales, fort petites, aiguës; chaque fleur munie d'un pédoncule assez long, filiforme. Le calice est à cinq divisions courtes, ovales, obtuses ou un peu aiguës. Les fruits globuleux, presque point odorans.

Cette plante croît à l'île d'Amboine.  $\text{H}$

Observations. Cette espèce se rapproche beaucoup du *rubus fraxinifolius*; mais les feuilles sont moins composées, les folioles plus petites, pubescentes en dessous; les aiguillons bien plus nombreux, qui se retrouvent également sur la principale nervure des folioles.

33. RONCE hispide. *Rubus hispidus*. Linn.

*Rubus foliis ternatis, nudis; caulibus petiolisque hispidissimis, strigis rigidatis.* Linn. Syst. veget. pag. 395.

*Rubus hispidus*, foliis ternatis, nudis; caulibus petiolatis hispidis. Linn. Spec. Plant. 1. pag. 493. — Miller, Dict. n.º 7.

Ses tiges se divisent en jets ou en rameaux très-longs, durs, roides, ligneux, rampans, chargés de poils droits & roides, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de folioles nues à leurs deux faces, incisées, dentées en scie à leurs bords, les deux latérales presque sessiles, glabres, la terminale pédiculée; les pétioles hérissés de poils roides, ainsi que les pécuncules.

Cette plante croît au Canada. ♀

34. RONCE odorante *Rubus odoratus*. Linn.

*Rubus foliis simplicibus, palmatis; caule inermi, multifolio, multifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 707. — Hort. Cliff. 192. — Hort. Upf. 133. — Roy. Lugd. Bat. 274. — Millet, Dict. n.º 6. & Icon. illustr. tab. 223. — Willd. Arb. 326.

*Rubus foliis quinquelobis, inaequaliter serratis; caule inermi, multifolio, multifloro*. Duroi, Harbk. pag. 379.

*Rubus odoratus*. Corn. Canad. pag. 149. tab. 150. — Duham. Arb. vol. 2. pag. 233. — Tourn. Infl. R. Herb. 614.

*Rubus (odoratus), flans, viscido-hispidus, inermis, subcorymbose multiflorus; fructu velutino; foliis simplicibus, acutè lobatis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 297.

Cette espèce, originaire du Canada, a trouvé place dans nos bosquets à raison de la beauté de ses fleurs, assez grandes, de couleur de rose, odorantes.

Ses tiges sont droites, hautes de quatre à six pieds, & se divisent en rameaux diffus, presque en buisson, dépourvus d'aiguillons, mais chargés de poils roides, nombreux, noirâtres, terminés par de petites glandes visqueuses, garnis de feuilles alternes, pétiolées, simples, très-amplées, membraneuses, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, palmées ou plutôt divisées en cinq ou trois lobes aigus, irrégulièrement dentés à leur contour; supportées par des pétioles droits, striés, velus, au moins aussi longs que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes terminaux & axillaires. Les calices sont partagés en cinq découpures ovales, aigües, terminées par une longue pointe subulée, chargées extérieurement de poils noirs, visqueux, lisses, & d'un blanc-verdâtre en dedans. La corolle est grande, d'une belle couleur rose, composée de cinq pétales ovales, presque ronds, très-ouverts. Les fruits sont globuleux, d'un noir rougeâtre, très-pubeux, presque velus.

Cet arbrisseau croît naturellement en Amérique, sur les hautes montagnes du Canada. ♀ (V. v.)

35. RONCE à feuilles d'alcée. *Rubus alceifolius*.

*Rubus foliis palmato-lobatis, superius scabris, subtus tomentosis; calicibus inflato-hirsutissimis; ramis villosis, aculeatis*. (N.)

*Rubus foliis palmato-lobatis, superius scabris, subtus tomentosis, calicibus hirsutis, floribus exalbidis*. Commerf. Herb.

Arbrisseau très-remarquable par l'ampleur & la forme de ses feuilles, par les calices renflés & très-velus.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur du *Rubus idaeus*; elles se divisent en rameaux très-velus, presque quadrangulaires, munis d'aiguillons rougeâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, simples, lobées, presque palmées, très-amplées, glabres, rudes, ridées à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, à nervures jaunâtres, réticulées, à dents aigües à leurs bords, munies d'aiguillons, tant sur leur pétiole que sur leur principale nervure.

Les fleurs sont en grappes axillaires & terminales, courtes, armées d'aiguillons, très-velues, munies de bractées divisées en filamens nombreux, capillaires, velus. Les calices sont renflés, presque globuleux, à demi divisés en cinq découpures ovales, blanches en dedans, chargées de poils roux tomenteux, épais. La corolle est blanchâtre, à cinq pétales un peu arrondis, très-caducs; des étamines & des styles nombreux.

Cette plante a été recueillie par Commerfion à l'île de Java. ♀ (V. f. in herb. Juss.)

36. RONCE des îles Moluques. *Rubus moluccanus*. Linn.

*Rubus foliis simplicibus, cordatis, sublobatis; caule aculeato, decumbente*. Linn. Spec. Plinr. vol. 1. pag. 707. — Thunb. Flor. japon. pag. 219.

*Rubus moluccanus, latifolius*. Rumph. Amb. vol. 5. pag. 88. tab. 47. fig. 2.

Cette plante a quelques rapports, surtout par ses feuilles, avec le *Rubus alceifolius*, très-différent d'ailleurs par ses autres caractères.

Elle s'élève peu, mais se divise en longs jets rampans, de couleur cendrée, très-chargés d'aiguillons, garnis de feuilles alternes, pétiolées, simples, en cœur à leur base, divisées à leur contour en plusieurs lobes arrondis, glabres, d'un vert foncé à leur face supérieure, très-rugueuses en dessous, chargées d'aiguillons sur leurs nervures, denticulées à leurs bords, longues de six à sept pouces sur presque autant de large.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, axillaires & terminales, presque nues, courtes, peu rameuses. Les calices sont divisés en cinq découpures ovales, aiguës, presque glabres; les fruits ovales, un peu comprimés, d'une odeur & d'un saveur agréables, bons à manger; mais, excepté les enfans, les habitans de l'île d'Amboine les méprisent.

Cette plante croît aux Indes, à l'île d'Amboine.  $\bar{y}$

37. RONCE microphyll. *Rubus microphyllus*, Linn. f.

*Rubus fruticosus, aculeatus, glaber; foliis simplicibus, cordatis, ovatis, obtusis, sublobatis; pedunculis solitariis, unifloris*, Linn. f. Suppl. pag. 263.

*Rubus (palmatus), foliis cordatis, palmato-trilobis, glabris; caule petiolisque aculeatis*, Thunb. Flor. japon. pag. 217.

Cette plante ne peut se confondre avec le *rubus parvifolius*, malgré les rapports qui existent entre ces deux espèces. Celle-ci s'en distingue en ce que ses feuilles ne sont point ternées, mais simplement trilobées, point tomenteuses ni blanches en dessous.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, très-glabres, munies seulement de quelques aiguillons rares, garnies de feuilles pétioles, alternes, petites, ovales, en cœur, simples, obtuses; les unes entières, d'autres divisées en trois lobes plus ou moins profonds, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, sans aiguillons sur leur pétiole.

Les fleurs sont petites, solitaires, supportées par des pédoncules simples, uniflores, dépourvus d'aiguillons. La corolle est petite, assez semblable à celle des potentilles.

Cette plante a été recueillie par Thunberg au Japon.  $\bar{y}$

38. RONCE à rameaux alongés. *Rubus elongatus*, Smirh.

*Rubus foliis simplicibus, cordatis, acuminatis, duplicato-crenatis, subtus tomentosus; caule aculeato, calicibus obtusis*, Smith, Icon. inedit. Fasc. 3. pag. 62. tab. 62. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. n° 22.

*Rubus foliis simplicibus, cordato-lobatis, crenatis; floribus albis, fructibus rubris*, Commerf. Herb.

Ses tiges sont ligneuses, rameuses, pubescentes, visqueuses, garnies d'aiguillons très-petits, munies de feuilles alternes, grandes, simples, quelquefois un peu lobées, pétiolées, en forme de cœur; verdâtres à leur face supérieure, tomenteuses, blanches ou roussâtres en dessous, acumi-

nées à leur sommet, à double crénelure à leur courrou. Les fleurs sont disposées en panicules alongées, dont les ramifications sont courtes, chargées de fleurs presque glomérulées, & dont les pédoncules partiels sont ordinairement deux à deux. Les découpures du calice sont obtuses, foyeuses; les fleurs blanches; les fruits rouges.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à l'île de Java.  $\bar{y}$  (V. f. in herb. Juss. ex Commerf.)

39. RONCE à feuilles de corète. *Rubus corchorifolius*, Linn. f.

*Rubus fruticosus, aculeatus, tomentosus; foliis simplicibus, oblongis, cordatis, serratis; pedunculis solitariis, unifloris*, Linn. f. Suppl. pag. 263. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087.

*Rubus (villosus), foliis simplicibus, cordatis, acutis, aculeatis; caule erecto petiolisque aculeatis*, Thunb. Flor. japon. pag. 218.

Arbrisseau dont les tiges sont tomenteuses, droites, armées d'aiguillons, garnies de feuilles pétioles, simples, alternes, oblongues, en forme de cœur, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet, vertes en dessus, blanches & tomenteuses à leur face inférieure, munies de quelques aiguillons sur leurs principales nervures, ainsi que sur leur pétiole.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, supportées par des pédoncules tomenteux, uniflores. Le calice est blanchâtre & coronneux; la corolle petite, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît au Japon, entre Misso & Jedo, où elle a été découverte par Thunberg.  $\bar{y}$

40. RONCE à feuilles de poirier. *Rubus pyrifolius*, Smith.

*Rubus foliis simplicibus, ovalibus, acuminatis, serratis, nudis; caule aculeato, paniculato; petalis minutis*, Smith, Icon. inedit. Fasc. 3. pag. 61. tab. 61. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1088. n° 23.

*Rubus foliis simplicissimis, ovato-lanceolatis, serratis; floribus purpureis*, Commerf. Herb.

Cette plante a des tiges ligneuses, un peu flexueuses, armées d'aiguillons courts, divisées en rameaux effilés, garnis de feuilles simples, alternes, pétioles, ovales, assez semblables à celles des poiriers, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, acuminées à leur sommet; les nervures velues sur leurs deux faces; les stipules presque nulles. Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, une panicule ample, composée de plusieurs corymbes particuliers; les bractées oblongues, pubescentes, à plusieurs divisions, très-caducues. Le calice est environ plusieurs fois plus

plus grand que la corolle, ses divisions longuement acuminées; les fleurs purpurines; les pétales petits, ovales, obtus, dentés à leur sommet; les ovaires pubescens. Les fruits sont composés de très-petits grains ovales, peu nombreux.

Cette plante croît à l'île de Java & dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Juss. ex Comers.)

41. RONCE incisée. *Rubus incisus*. Thunb.

*Rubus foliis simplicibus, cordatis, incis, glabris; caule crebulo, aculeato*. Thunb. Flor. japon. p. 217.

Ses tiges sont frutescentes, droites, glabres, de couleur purpurine, armées d'aiguillons épars, très-ouverts; divisées en rameaux de même forme, mais plus chargés d'aiguillons, garnis de feuilles presque fasciculées, pétioles, simples, ovales, presque rondes, échancrées en cœur à leur base, rarement anguleuses, incisées & même presque lobées à leur contour, dentées en scie, marquées de nervures élevées, glabres à leurs deux faces, longues d'un pouce environ, soutenues par des pétioles glabres, de même longueur que les feuilles, chargés d'aiguillons recourbés.

Les fleurs naissent solitaires dans l'aisselle des feuilles, portées par des pédoncules presque capillaires, nus ou chargés d'aiguillons, de la longueur des pétioles. Les calices sont glabres extérieurement, blancs & tomenteux en dedans.

Cette plante croît au Japon, où elle a été découverte par Thunberg. (V. f. in herb. Juss. ex Thunb.)

42. RONCE du Japon. *Rubus japonicus*. Linn. f.

*Rubus fruticosus, inermis, glaberrimus; foliis simplicibus, cordatis, oblongis, acuminatis, duplicato-serratis; pediculis foliariis, unifloris*. Linn. f. Suppl. pag. 263. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1087. n°. 20.

*Rubus foliis simplicibus, cordatis, oblongis, serratis; caule inermi, scissuricofo*. Linn. Mantiss. 245.

C'est un petit arbrisseau peu élevé, très-glabre, dépourvu d'épines, dont les tiges sont droites, lisses, anguleuses, très-peu rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, simples, ovales ou oblongues, longuement acuminées, aiguës, lisses à leurs deux faces, munies à leurs bords d'une double dentelure en dents de scie.

Les fleurs sont terminales, solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux, supportées par des pédoncules filiformes, de la longueur de la corolle. Leur calice est fort petit; la corolle assez semblable à celle du fraiser, plusieurs fois plus grande que le calice, composée de pétales blancs, arrondis.

Botanique. Tome VI.

Cette plante croît au Japon, où elle a été découverte par Thunberg. (V. f. in herb. Juss. ex Thunb.)

43. RONCE radicante. *Rubus radicans*. Cavan.

*Rubus caule prostrato, flagellis radicanibus; foliis teratis, v. latis; floribus foliariis*. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 7. n°. 455. tab. 413.

Ses tiges sont couchées, chargées d'épines courtes; elles produisent des rejets radicans, longs de deux pieds & plus. Les feuilles, réunies à chaque nœud, presque en fascicules, sont pétioles, ternées, orbiculaires, simples ou à plusieurs lobes; la foliole terminale plus grande; velues, denticulées, garnies à la base des pétioles de deux stipules lancéolées.

Les fleurs naissent du milieu des fascicules des feuilles portées sur des pédoncules simples, solitaires, velus, plus longs que les feuilles. Le calice est profondément divisé en cinq découpures dentées, velues en dessous, persistantes. La corolle est d'un rouge-pâle, composée de cinq pétales ovales. Les filaments des étamines sont nombreux, rougeâtres, plus courts que la corolle, insérés sur le calice; les anthères arrondies; les ovaires en très-grand nombre, attachés sur un réceptacle conique, surmontés d'un style capillaire & d'un stigmate simple, persistant. Il leur succède une baie ovale, succulente, petite, d'une saveur très-agréable.

Cette espèce croît au Chili dans les grandes forêts, au pied & sur les troncs pourris des arbres. (V. f. in herb. Juss. ex Cavan.)

RONCINÉES (Feuilles). *Runcinata folia*, expression par laquelle on caractérise les feuilles lorsqu'elles sont découpées latéralement en lobes profonds & distans, qui ne vont pas en diminuant vers leur base commune, comme celles de l'*erythron officinale*, &c.

RONCINELLE. *Dalibarda*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyépales, de la famille des rosacées, qui a des rapports avec les ronces, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les racines poussent des rejets rampans, à feuilles simples ou composées, & dont les fleurs sont solitaires ou presque en corymbe clair.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; des étamines nombreuses, insérées sur le calice; de cinq à huit pistils; une baie sèche.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, d'une seule pièce, à cinq découpures très-profondes, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales beaucoup plus grands que le calice, ovales, ouverts, insérés sur le calice.

3°. Des étamines très-nombreuses, dont les filaments sont détachés, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères fort petites, arrondies.

4°. De cinq à huit ovaires, surmontés de styles longs, filiformes, caducs, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une baie sèche, supérieure, composée de petits grains réunis en tête, contenant chacun une petite semence.

**Observations.** Ce genre est un démembrement de celui des ronces. Linné l'avoit d'abord établi dans une première édition de son *Species Plantarum*; il a cru ensuite devoir le supprimer pour le réunir au *rubus*. Michaux, dans la *Flore de l'Amérique septentrionale*, l'a rétabli, en y ajoutant une nouvelle espèce. On ne peut disconvenir que les *dalibarda* ne constituent réellement un genre particulier, & quoique très-rapprochés des ronces, ils s'en distinguent par des caractères qui leur sont propres. Le nombre des pistils, qui ne va guère que de cinq à huit, est bien moindre que celui des ronces; leurs baies sont sèches & non succulentes, comme celles des ronces, & ce dernier caractère établit entre ces deux genres la même différence qui existe entre les fraisières & les potentilles. D'ailleurs, les espèces connues jusqu'à présent n'ont point d'aiguillons, tandis que la plupart des ronces en sont armées. Ces considérations nous ont déterminés à conserver les *dalibarda* comme genre particulier.

#### ESPÈCES.

##### 1. RONCINELLE rampante. *Dalibarda repens*.

*Dalibarda villosa*, *stolonibus reptantibus*; *foliis simplicibus*, *cordatis*, *crenatis*; *pedunculis unifloris*.

*Dalibarda* (violacoides). Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 299. tab. 27.

*Dalibarda repens*. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 407.

*Rubus* (*dalibarda*), *foliis simplicibus*, *cordatis*, *indivisis*, *crenatis*; *scapo aphyllis*, *unifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 708. — Miller, Dict. n°. 11. — Smith, Icon. ined. Fascic. 1. pag. 20. tab. 20. — Lam. Illustr. Gener. tab. 441. fig. 3.

Cette plante a des racines rampantes, fibreuses, qui produisent de longs rejets, semblables à ceux des fraisières, dont quelques-uns sont un peu redressés, garnis de feuilles alternes, longuement pétiolées, simples, entières, ovales, un peu arrondies, aff. 2. semblables à celles de la violette odorante, et tronquées en cœur à leur base, cré-

nelées à leur contour, veinées, couvertes, à leur face supérieure, de quelques poils rares, nues en dessous, supportées par des pétioles plus longs que les feuilles, grêles, velus.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, pileux, uniflores, au moins aussi longs que les feuilles. Leur calice est divisé en cinq découpures ovales, souvent dentées à leur sommet. La corolle est blanche, composée de cinq pétales ovales, obtus; les étamines très-nombreuses, de cinq à huit ovaires, auxquels succèdent autant de semences nues, ovales.

Cette plante croît au Canada. (V. f.)

##### 2. RONCINELLE à feuilles de fraiset. *Dalibarda fragarioides*. Mich.

*Dalibarda foliis trifoliatis*; *foliolis brevibus*, *cuneatis*, *superne rotundatis*, *crenato-lobatis*, *glabrisculis*, *ciliatis*; *pedunculis multifloris*; *calicis tubo acutis obconico*, *filamentis filamentis persistens*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 300. tab. 28.

Il est très-aisé de distinguer cette espèce de la précédente, à ses feuilles ternées, semblables à celles des fraisières, & à ses fleurs disposées en corymbes lâches.

Ses tiges sont rampantes, assez fortes, prolifères, garnies de feuilles pétiolées, presque fasciculées, divisées en trois folioles feules, cunéiformes à leur base, arrondies à leur sommet, c. n. nelées & presque lobées à leur contour, vertes, presque glabres à leurs deux faces, légèrement ciliées à leurs bords, soutenues par de longs pédoncules munis, à leur base, de stipules courts, lanceolés, aiguës.

Les fleurs forment des corymbes peu garnis, axillaires, plus longs que les feuilles, dont le pédoncule commun se divise, vers son sommet, en quatre ou six ramifications alternes ou opposées, garnies, dans leur longueur & à la base des divisions, de quelques bractées lanceolées. La partie inférieure du calice est conique, entière, tubulée; il se divise à son orifice en cinq découpures lanceolées, aiguës. La corolle, beaucoup plus grande que le calice, est composée de cinq pétales ovales, ouverts, obtus. Les étamines persistent avec le fruit.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. (V. f.)

**Observations.** Le *rubus geoides* de Smith doit probablement rentrer dans ce genre; mais n'ayant pas pu observer complètement toutes les parties de la fructification, nous l'avons présenté à l'article RONCE.

**RONDACHES** (Feuilles en) ou ombiliquées. *Peltata umbilicata folia*. Les feuilles portent ce

nom lorsque leur pétiole ne s'insère point sur leurs bords, mais dans leur disque, c'est-à-dire, dans le milieu de leur face inférieure, comme dans la capucine (*tropeolum majus*).

Le stigmate porte le même nom lorsqu'il est comprimé, arrondi, un peu creusé supérieurement & en forme de plateau.

**RONDES (Feuilles).** *Rotunda folia*. Les feuilles sont ainsi nommées lorsque, considérées relativement à leur forme, elles ont une figure orbiculaire, sans aucun angle remarquable, comme celles du *soldanella alpina*.

**RONDELIER.** *Rondeletia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *posqueria*, & qui comprend des arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées & les fleurs disposées en corymbes terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle infundibuliforme, à cinq lobes ; cinq étamines non saillantes ; une capsule arrondie, couronnée, à deux loges polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, supérieur, persistant, divisé en cinq dents profondes, aiguës.

2°. Une corolle infundibuliforme, dont le tube est cylindrique, plus long que le calice, ventru à son sommet, terminé par un limbe plane, réfléchi, divisé en cinq lobes arrondis.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, presque aussi longs que la corolle, terminés par des anthères simples, non saillantes.

4°. Un ovaire inférieur, arrondi, surmonté d'un style filiforme, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit est une capsule presque ronde, en forme de baie, couronnée par les dents du calice, à deux loges, qui s'ouvrent en deux parties à leur sommet, & qui contiennent plusieurs semences.

**Observations.** Ce genre est particulièrement étalé sur ses fruits capsulaires, à deux loges, contenant plus de deux semences, la capsule étant couronnée par les dents du calice persistant. Quelquefois la partie de celui-ci, qui enveloppe l'ovaire, est ou devient pulpeuse, de sorte que le fruit, surtout dans sa jeunesse, parait être une baie & non une capsule ; ce qui a fait exclure de ce genre, par plusieurs botanistes, quelques espèces qui of-

frent ce caractère, que nous ne croyons pas suffisant pour constituer un genre particulier.

D'autres espèces n'offrent que deux semences à l'époque de la maturité ; mais il arrive, ainsi qu'on peut s'en assurer par les observations de Swartz dans sa *Flora de l'Inde occidentale*, que souvent plusieurs des semences avortent, & que deux seulement parviennent à une parfaite maturité : d'où il suit que, lorsqu'on n'a point observé les plantes vivantes, & même à différentes époques, il doit rester beaucoup d'incertitude lorsqu'elles ne présentent que deux semences. Quelquefois, à la vérité, on retrouve quelques embryons desséchés ; mais il n'est pas toujours facile de les observer, surtout dans les individus secs.

#### E S P È C E S .

##### 1. RONDELIER pileux. *Rondeletia pilosa*. Swartz.

*Rondeletia foliis ovatis, utrinque pilosis ; pedunculis axillaribus, foliis brevioribus, trifidis ; floribus tetrandris.* Swartz, Flor. Ind. occid. vol. I. p. 356. — 1.lem, Prodr. 41.

*Rondeletia (triflora), foliis lanceolato-oblongis, lineatis, subtus cespicientibus ; pedunculis axillaribus, trifloris ; floribus tetrandris.* Vahl, Symbol. 3. pag. 34. tab. 54.

Arbusteau dont les rameaux sont cylindriques, glabres à leur partie inférieure, pileux vers leur sommet, garnis de feuilles opposées, pétiolées, très-rapprochées, oblongues, lancéolées, longues de deux à trois pouces, larges au moins d'un pouce, un peu rétrécies vers leur base, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords ; à nervures simples, latérales, couvertes en dessus de quelques poils rares ; chargées en dessous, surtout dans leur jeunesse, de poils mous, longs, blanchâtres, très-nombreux. Les pétioles sont courts & velus, munis à leur base de deux stipules oblongues, acuminées, velues.

Les péduncules sont axillaires, opposés, filiformes, longs de deux pouces, chargés ordinairement de trois fleurs, supportées par des pédicules courts, velus, inégaux, munis de bractées courtes, subulées. Le calice est partagé en quatre découpures subulées, velues ; la corolle monopétale, couverte en dehors de poils gristres. Son tube est filiforme, alongé ; le limbe divisé en quatre lobes oblongs, obtus. Il n'y a que quatre étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés vers l'orifice du tube ; les anthères linéaires, non saillantes ; l'ovaire globuleux, velu, surmonté d'un style linéaire, velu à sa base, épaissi vers son sommet. La capsule est de la grosseur d'un grain de poivre, couronnée par le calice, divisée en deux loges, remplies de semences nombreuses, fort petites.



Cette plante croît dans l'Amérique, à l'île de Sainte-Croix, où elle a été recueillie par M. Welf. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

2. RONDELIER effilé. *Rondeletia virgata*, Swartz.

*Rondeletia foliis subrotundis, ramis filiformibus, patentibus; pedunculis trifidis; floribus ternis, confertis, tetranatis.* Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 354. — Idem, Prodr. 41.

C'est un arbrisseau qui s'élève à cinq ou six pieds de haut, divisé en rameaux longs, alternes, sans épines, revêtus d'une écorce glabre, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, petites, longues à peine d'un demi pouce, les unes en cœur, d'autres ovales, veinées, entières, un peu réfléchies, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, munies, à la base de leur pétiole, de stipules fort petites, aiguës.

Les fleurs offrent de petits corymbes axillaires & terminaux, sur lesquels les pédoncules sont opposés, droits, allongés, munis de quelques feuilles, à trois divisions courtes; chaque fleur est légèrement pédiculée, garnie à sa base de bractées linéaires. Le calice est à quatre folioles droites, linéaires, aiguës, persistantes; la corolle hypocratérisée, le tube filiforme, dilaté à son sommet, & à quatre lobes à son limbe; l'orifice garni d'un anneau crénelé, jaunâtre. Elle renferme quatre filaments, terminés par des antères linéaires, un style subulé, un stigmate bifide, auquel succède une capsule arrondie, revêtue d'un duvet blanchâtre, à deux loges, à deux valves, contenant des semences comprimées, fort petites, acuminées.

Cette plante croît en Amérique, sur les bords de la mer, à la Nouvelle-Espagne. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

3. RONDELIER à petites fleurs. *Rondeletia parviflora*.

*Rondeletia foliis oblongis, basi cuneatis, mucronatis, subtus pallidioribus; floribus corymbose, numerosissimis, minimis.* (N.)

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, articulés, striés, grisâtres, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, coriaces, très-glabres, oblongues, ovales, rétrécies en coin vers leur pétiole, arrondies & acuminées à leur sommet, d'un vert foncé en dessus, pâles & grisâtres en dessous, finement réticulées par des veines noires, entières à leurs bords, longues de trois à quatre pouces, larges presque de deux pouces, munies de stipules fermes, courtes, ovales, aiguës.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires, nombreux, vers l'extrémité des rameaux,

divisés en ramifications opposées, qui soutiennent un assez grand nombre de petites fleurs pédiculées, dont les calices, ainsi que les pédicules, sont d'un vert blanchâtre. Les bractées, situées à la base des corymbes, sont concaves, en forme d'écaillés, glabres en dehors, très-velues en dedans. Le fruit est une petite capsule globuleuse, divisée en deux loges.

Cette plante croît aux Antilles & à la Martinique, où elle a été recueillie par M. Richard. *h* (*V. f. in herb. Jussey.*)

4. RONDELIER d'Amérique. *Rondeletia americana*, Linn.

*Rondeletia foliis sessilibus, paniculâ dichotomâ.* Linn. Syst. veget. pag. 212. n°. 1. — Mûll. Dict. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 162. fig. 1.

*Rondeletia arborea, tini facie.* Plum. Gener. pag. 15. tab. 12. & Icon. 142. fig. 1.

C'est un arbrisseau dont les tiges droites & glabres s'élèvent à la hauteur de huit à dix pieds, & se divisent en rameaux nombreux, revêtus d'une écorce lisse & verdâtre, garnis de feuilles sessiles, opposées, oblongues, lancéolées, rétrécies à leur base, aiguës, presque acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, d'un vert luisant à leur face supérieure, plus pâles en dessous; à nervures fines, striées.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires & terminaux. Les pédoncules communs sont nus, solitaires, très-longs; ils se divisent à leur partie supérieure en rameaux opposés, à plusieurs divisions dichotomes; les dernières terminées par une fleur pédiculée: il existe de plus, à la base de chaque bifurcation, une fleur sessile, accompagnée de deux bractées opposées, ovales, aiguës. Le calice est glabre, presque campanulé, à cinq dents aiguës. La corolle est blanche, légèrement odorante, munie d'un tube au moins une fois plus long que le calice, & dont le limbe est partagé en cinq lobes arrondis. La capsule est presque globuleuse, à deux loges, couronnée par les découpures du calice agrandies.

Cette plante croît naturellement en Amérique. On la cultive dans plusieurs jardins botaniques de l'Europe. *h* (*V. f.*)

5. RONDELIER odorant. *Rondeletia odorata*, Linn.

*Rondeletia foliis petiolatis, subovatis, obtusis.* Linn. Spec. Plant. 1671. — Jacq. Amer. pag. 59. tab. 42. (In plurimis editionibus sub nomine *Rondeletia obovata*, errore typographico.)

*Rondeletia foliis subcordato-ovatis, obtusiusculis, scabris; petiolis brevissimis; pedunculis cymose, tripartitis, terminalibus.* Swartz, Observ. 67.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ six pieds, dont les tiges se divisent en rameaux diffus, presque en buisson; cylindriques, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, ovales, en cœur à leur base, obtuses, entières à leurs bords, rudes à leurs deux faces.

Les fleurs forment un bouquet terminal en cime, presque en ombelle, dont les pédoncules sont droits, très-souvent à trois divisions uniflores. Le calice est partagé en cinq divisions profondes, droites, oblongues, concaves, aiguës. La corolle est d'un beau rouge, d'un jaune-citron à l'orifice de son tube, d'une odeur très-agréable; son limbe divisé en cinq, quelquefois en six lobes courts, planes, arrondis. Le fruit est une capsule presque ronde, à deux loges, couronnée par le calice, s'ouvrant en deux valves à son sommet, renfermant un grand nombre de semences fort petites, rhomboïdales.

Cet arbrisseau croît dans l'Amérique, à la Havane, sur les rochers voisins de la mer. h

6. RONDELIER à feuilles de buis. *Rondeletia buxifolia*.

*Rondeletia foliis ovato-cuneatis, glabris; floribus axillaribus, foliatis; limbo corollae quadrifido.* (N.)

Arbrisseau dont les rameaux sont grêles, élançés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles opposées, en ovale renversé, glabres, coriaces, luisantes, rétrécies en coin à leur base, à peine pétiolées, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, entières à leurs bords, arrondies à leur sommet, très-rapprochées, longues d'un pouce & plus, larges de quatre à cinq lignes.

Les fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, presque sessiles; les calices d'un blanc-cendré en dehors, petits, ovales, d'une seule pièce, surmontés à leur orifice de quatre dents droites, filiformes, subulées; la corolle infundibuliforme, petite, longue de quatre lignes; son tube est grêle, allongé, un peu tendu vers son sommet; son limbe est plane, court, divisé en quatre lobes ovales, presque ronds. Je n'ai pas vu les étamines, mais je soupçonne, par analogie, d'après les divisions du calice & de la corolle, qu'il ne doit y en avoir que quatre.

Cette plante croît en Amérique, à Montserrat; elle a été communiquée à M. de Jussieu par M. Vahl. h (V. f. in herb. Juss.)

7. RONDELIER trifolié. *Rondeletia trifoliata*. Linn.

*Rondeletia foliis ternis, subius tomentosis; paniculis axillaribus.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 931. n.º. 3.

*Rondeletia foliis ternis.* Linn. Spec. Plant. 1671. — Jacq. Stirp. Amer. 60. tab. 43.

*Rondeletia arborescens, tincta facit.* Ehret. Piët. tab. 15.

Cet arbre s'élève à douze ou quinze pieds de haut, sur une tige droite, divisée en rameaux étalés, presque triangulaires, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, réunies au nombre de trois à chaque articulation, verruculeuses, lanceolées, aiguës, très-entières, glabres, pubescentes en dessous sur leur principale nervure, supportées par des pétioles courts & velus, munis de stipules presque rondes, alternes avec les feuilles, acuminées.

Les fleurs forment de petites panicules axillaires, latérales. Les pédoncules sont velus, inégaux, rameux; ils supportent des fleurs fort petites, inodores, rougeâtres; les unes sessiles, d'autres pédiculées. Leur calice est campanulé, court, à cinq petites dents aiguës; la corolle monopétale, munie d'un tube cylindrique, très-long, divisé à son limbe en cinq lobes oblongs, obtus, trois fois plus courts que le tube, contenant cinq étamines insérées vers le milieu du tube, terminées par des anthères linéaires, non saillantes; un ovaire environné à sa base par le calice; un style subulé; un stigmate bifide; une capsule à deux loges, couronnée par les dents du calice, qui renferme des semences solitaires, presque rondes.

Cette espèce croît à la Jamaïque, au pied des montagnes. h

8. RONDELIER à fleurs en thyrses. *Rondeletia thyrsoides*. Swartz.

*Rondeletia foliis oblongis, acutis, membranaceis, subius pubescentibus; thyrsis axillaribus.* Swartz, Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 358.

Arbrisseau de six pieds, dont les tiges sont droites, lisses, revêtues d'une écorce cendrée, divisées en rameaux allongés, étalés, glabres, presque tétragones; garnis de feuilles opposées, croisées, pétiolées, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, longues de trois pouces, entières, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, membraneuses, supportées par des pétioles linéaires, longs d'un pouce, munis à leur base de deux stipules droites, glabres, larges, ovales, aiguës.

Les fleurs sont petites, d'un blanc jaunâtre, disposées en corymbes en forme de thyrses, axillaires, opposées, oblongs, plus courts que les feuilles. Le pédoncule commun est glabre, anguleux, strié; les partiels opposés, souvent à trois divisions; munis de bractées fort petites, subulées. Le calice est fort petit, à cinq dents à son orifice; la corolle moyennement & pubescente en dehors; les capsules

rondes, de la grosseur d'un grain de coriandre, couronnée par les dents du calice, à deux loges, à deux semences.

Cet arbrisseau croît à la Jamaïque, sur les collines arides. Il fleurit au printemps; les fleurs répandent, pendant la nuit, une odeur forte, très-agréable. h

9. RONDELIER à grappes. *Rondeletia racemosa*. Swartz.

*Rondeletia foliis lanceolato-ovatis, acuminatis, utrinque glabris; stipulis ellipticis, acuminatis; racemis axillaribus, trichotomis, patulis*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 360.

*Petiole fruticosa, foliis ovatis, verticillatim ternatis; stipulis interpositis, rigidis; sustentaculis florum longis, ramosis, alaribus*. Brown, Jam. 143. tab. 2. fig. 3.

Cette espèce diffère du *Rondeletia thyrsoides* par ses grappes de fleurs étalées, par ses feuilles glabres.

Ses branches sont blanchâtres; elles se divisent en rameaux glabres, tétragones, un peu comprimés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, acuminées à leurs deux extrémités, munies à leur base de deux stipules larges, elliptiques, légèrement velues à leurs bords. Les pétioles sont glabres, longs d'un pouce.

Les fleurs forment des grappes axillaires, opposées, étalées, plus courtes que les feuilles, de la longueur des pétioles, garnies de bractées sessiles, subulées à la base des ramifications. Chaque fleur est pédiculée. Leur calice est petit, à cinq dents courtes & droites; la corolle petite, blanchâtre & soyeuse en dehors, pâle en dedans; son tube est court, cylindrique, point renflé; son limbe à cinq lobes ovales, pubescens; l'ovaire glabre, ovale; le stigmate entier, épais; la capsule à deux valves, à deux semences: il n'est pas très-certain qu'elle soit partagée en deux loges, selon Swartz.

Cette plante croît dans les forêts des hautes montagnes, à la Jamaïque. h

10. RONDELIER tomenteux. *Rondeletia tomentosa*. Swartz.

*Rondeletia foliis ovatis, acuminatis, tomentosis; pedunculis tripartitis, axillaribus, brevibus*. Swartz, Prodr. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 365. — (Confer cum *Petelia stipularis*. Linn.)

M. Swartz suppose que cette espèce pourroit bien être la même que le *Petelia stipularis* Linn., que nous avons déjà mentionnée à l'article PÉTISTE, ou peut-être encore ce *Petelia* conviendrait-il mieux avec le *Rondeletia thyrsoides*: d'où il suit que,

cette espèce de *Petelia* est regardée par M. Swartz comme un *Rondeletia*.

Celle dont il s'agit ici est un arbrisseau de trois pieds, divisé en rameaux opposés, droits, cylindriques, un peu velus à leur partie supérieure, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, acuminées à leurs deux extrémités, entières, nerveuses, d'un vert foncé, un peu velues à leur face supérieure, blanchâtres & tomenteuses en dessous, supportées par des pétioles courts & pubescens, munis à leur base de stipules ovales, pubescentes, aiguës.

Les fleurs forment de petites grappes courtes, axillaires, dont les pédoncules se divisent en trois rameaux à trois fleurs. Leur calice est fort petit, à cinq dents; la corolle petite, blanchâtre ou d'un brun jaunâtre, velue en dehors; son tube étroit, un peu plus long que le calice; son limbe à cinq découpures ovales, concaves; un style bifide; les capsules arrondies, de la grosseur d'un grain de coriandre, à deux loges, contenant des semences solitaires, hémisphériques.

Cette plante croît sur les collines pierreuses de la Jamaïque. h

11. RONDELIER à feuilles de laurier. *Rondeletia laurifolia*.

*Rondeletia foliis lanceolato-oblongis, acutis, utrinque glabris; stipulis deltoides; racemis compositis, axillaribus, erectis; tubo florum brevissimo*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 362.

*Petiole fruticosa, foliis ovatis, oppositis; stipulis rigidis, interpositis; racemis minoribus, alaribus; calice quinquefid.* Brown, Jam. 143. tab. 2. fig. 2.

Cet arbrisseau a des rameaux glabres, cylindriques, légèrement striés, un peu comprimés vers leur sommet, garnis de feuilles opposées, longues de trois à quatre pouces, entières, oblongues, lancéolées, acuminées à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles glabres, presque cylindriques, longs d'un pouce, munis de deux stipules acuminées, velues à leurs bords.

Les grappes sont opposées, axillaires, souvent aussi longues que les feuilles; garnies de fleurs petites, d'un jaune foncé, soutenues par des pédicules épars, dont les supérieurs sont souvent triflores, munis de bractées subulées. Le calice est pubescent, à cinq dents fort petites, droites, aiguës. La corolle a un tube très-court, élargi à son orifice. Le limbe est de la longueur du tube, à cinq divisions oblongues, réfléchies, tomenteuses extérieurement. Le stigmate est bifide; la capsule globuleuse, de la grosseur d'une graine de chanvre, glabre, à deux loges, à deux valves renfermant plusieurs semences membraneuses, hémisphériques.

Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les buissons. *h*

12. RONDELIER ombellé. *Rondeletia umbellata*. SWARTZ.

*Rondeletia foliis lanceolato-ovatis, acutis, subhirsutis; pedunculis axillaribus, apice trichotomis; floribus subumbellatis*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 367. — Idem, Prodr. 41.

*Petala frutescens, foliis subvillosis, ovatis, oppositis; pilulis seta terminatis, racemis alaribus*. Brown, Jam. 144. n°. 3. ?

On distingue cette espèce à ses fleurs plus grandes que dans les autres, & disposées presque en ombelle.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ deux pieds; elles se divisent en rameaux lisses, comprimés; les plus jeunes velus vers leur sommet, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, lancéolées, acuminées, entières, velues particulièrement le long de leurs nervures, soutenues par des pétioles courts, velus, munis de stipules opposées, connées, membraneuses, élargies à leur base, velues, terminées par une longue pointe sétacée.

Les fleurs forment, dans les aisselles des feuilles supérieures, des corymbes en ombelle, solitaires, opposés, plus courts que les feuilles, dont les pédoncules sont comprimés, velus, à trois divisions, à trois fleurs pédiculées en ombelle, garnies à leur base de quatre bractées linéaires, aiguës, en forme d'involucre. Les calices sont très-velus, à cinq dents linéaires; la corolle grande, relativement à celle des autres espèces; pubescente en dehors, d'un brun jaunâtre; le tube alongé, dilaté vers son orifice; le limbe divisé en cinq découpures convexes, presque rondes; le style biffé à son sommet; les capsules à deux loges, à deux valves; chaque valve divisée en deux: elles contiennent plusieurs semences, dont ordinairement deux seulement mûrissent dans chaque loge; elles sont convexes, anguleuses; les autres sont petites, planes, membraneuses.

Cet arbrisseau croît sur les rochers pierreux, le long des fleuves, à la Jamaïque. Il fleurit vers le milieu du printemps. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

13. RONDELIER blanchâtre. *Rondeletia incana*. SWARTZ.

*Rondeletia foliis ovato-lanceolatis, subtus incanis, scabris; pedunculis axillaribus, simplicibus, trifloris*. Swartz, Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 369.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de deux ou trois pieds, divisées en rameaux cylindriques, rudes, garnis de feuilles opposées, pé-

tiolées, ovales, lancéolées, entières, réticulées, glabres, un peu coriaces & luisantes à leur lace supérieure, rudes & blanchâtres en dessous, soutenues par des pétioles cylindriques, revêtus d'un duvet blanc, munis à leur base de stipules courtes, tronquées, blanchâtres & ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes très-courts, axillaires, presque en ombelles, à trois fleurs dont les pédicules sont garnis de deux bractées ovales, aiguës, concaves, tomentueuses. Le calice se divise en cinq découpures épaisses, ovales, aiguës, roides, blanchâtres & soyeuses à leurs deux faces, outre cinq autres très-petites à la base de l'ovaire, & deux folioles ovales, aiguës à la base du calice. La corolle est d'une grandeur médiocre, blanchâtre; le tube de la longueur du calice; le limbe à cinq divisions roides, ovales, convexes; l'ovaire oblong, velu, tronqué à son sommet; le style biffé; les stigmates épais; la capsule oblongue, à deux loges, perforée à son sommet, à deux valves biffées, renfermant plusieurs semences petites, oblongues, membraneuses, dont deux seulement parviennent à la maturité.

Cette espèce est rare; elle croît sur les montagnes calcaires de la Jamaïque. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

14. RONDELIER hérissé. *Rondeletia hirta*. SWARTZ.

*Rondeletia foliis oblongis, acuminatis, hirtis, rigidis, subtus nervosis; pedunculis axillaribus, trichotomis, erectis*. Swartz, Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 373.

*Rondeletia foliis petiolaris, ovato-oblongis, acutis, pilosis; paniculis trichotomis, axillaribus*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 227.

Petit arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux tétragones, lisses, cendrés, pileux dès leur jeunesse, garnis de feuilles opposées, pétioles, croisées, oblongues, entières, acuminées, hérissées de poils particulièrement sur leurs nervures, les anciennes ridées, presque glabres, plus pâles en dessous, & dont les pétioles sont courts, velus, munis à leur base de deux stipules larges, acuminées, velues.

Les fleurs forment de petits corymbes opposés, axillaires, droits, plus courts que les feuilles; à trois divisions velues, trifides. Les calices sont monophyllés, à cinq dents droites, linéaires; la corolle jaune ou roussâtre, un peu velue; le tube une fois plus long que le calice; le limbe à cinq découpures ovales, convexes; les deux stigmates droits, connivens; la capsule à deux loges, à deux valves, ne renfermant, à l'époque de la maturité, que deux semences hémisphériques.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

15. RONDELIER velu. *Rondeletia hirsuta*. Swartz.

*Rondeletia foliis oblongis, acutis, hirsutis; pedunculis axillaribus, trichotomis, laxis; floribus hirsutis.* Swartz, Prodr. pag. 41. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 371.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de cinq à six pieds : il se divise en rameaux lâches, cylindriques, un peu comprimés, rudes, pubescents dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, opposées, croisées, oblongues, élargies dans leur milieu, entières, aiguës, velues à leurs deux faces, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles courts, touffus, velus, munis de stipules opposées, ovales, lacéolées, alongées, assez larges, velues.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, presque de la longueur des feuilles ; solitaires, dont les pédoncules sont filiformes, à trois divisions trichotomes, lâches, velues, garnies à leur base de bractées fort petites, opposées, aiguës, linéaires, pubescentes. Les calices se divisent en cinq découpures velues, droites, lancéolées, aiguës. La corolle est jaunâtre, tomenteuse en dehors ; le tube de la longueur des divisions calicinales, rétréci vers son orifice ; le limbe à cinq découpures oblongues, obtus, réfléchies ; l'ovaire ovale, hérissé ; le style biffé à son sommet ; les stigmates étendus. Le fruit n'est pas encore connu.

Cette espèce croît dans les contrées méridionales de la Jamaïque, sur les montagnes ; elle fleurit au commencement de l'hiver. *h* ( *Descript.* ex Swartz. )

16. RONDELIER d'Asie. *Rondeletia asatica*. Linn.

*Rondeletia foliis oblongis, acutis; floribus corymbosis, capsulis baccatis.* (N.)

*Rondeletia foliis petiolatis, oblongis, acutis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 244. — Mill. Dict. n°. 2.

*Rondeletia foliis petiolatis.* Flor. zeyl. 80.

*Webera (corymbosa), inermis; foliis oblongis, acutis; corymbo terminali.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1224. n°. 1.

*Cupi.* Rheed, Malab. vol. 2. pag. 37. tab. 23. — Rai, Hist. 1492.

Cette espèce a été retirée de ce genre & rangée par Schreber & Willdenow dans celui des *webera*, qui est le genre *canthium* de ce Dictionnaire (voyez CANT), avec lequel en effet elle a de grands rapports par ses capsules en forme de baie, & dans lequel il eût peut-être fallu la placer.

Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres ; ses rameaux presque tétragones, friés, noueux, garnis de feuilles très-rapprochées, opposées, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéolées, ai-

guës, entières, coriaces, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, longues de quatre à cinq pouces sur deux ou trois de large, luisantes en dessus, réticulées, rétrécies en pétiole à leur base, munies de deux stipules courtes, appliquées contre les tiges ; larges, ovales, très-aiguës.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, un peu plus court que les feuilles ; trifides à sa base, dont les pédoncules droits se ramifient à leur sommet, & se terminent par des pédicules glabres, très-courts, uniflores, garnis de bractées linéaires, aiguës, quelquefois très-longues. Les calices sont courts, campanulés, à cinq divisions ovales, aiguës, très-glabres ; la corolle infundibuliforme ; le tube alongé ; le limbe à cinq lobes velus à leur base ; les antheres membraneuses à leur sommet ; le style cylindrique, strié ; le stigmate oblique, en tête de clou, divisé en dix angles presque aigus & membraneux. Les capsules sont charnues extrémitement, de la grosseur d'un pois au moins, couronnées par le calice, à deux loges, contenant des semences solitaires.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar & dans l'île de Ceylan. *h* ( *V. f. Comm. Dupuis.* )

17. RONDELIER en cime. *Rondeletia cymosa*. Willd.

*Rondeletia foliis ovatis, acuminatis; cymis axillaribus, capsulis baccatis.* (N.)

*Webera (cymosa), inermis; foliis ovatis, acuminatis; cymis multifloris, axillaribus, pedunculatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1224. n°. 2.

Cette plante, qui offre dans ses capsules en baie la même particularité que le *rondeletia asatica*, en diffère par la disposition de ses fleurs axillaires & latérales, par les pédoncules pubescents, & par les corolles une fois plus petites.

Ses branches se divisent en rameaux cylindriques, pubescents, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, très-entières, obtuses, acuminées, très-glabres, toides, luisantes à leur face supérieure, à nervures simples. Les fleurs sont disposées en cimes pédonculées, axillaires, convexes, dont les pédoncules sont pubescents, les fleurs très-nombreuses, la corolle une fois plus petite que dans l'espèce précédente ; le style beaucoup plus long que la corolle ; le stigmate en tête, à deux lobes ; les baies de la grosseur de celles du genévrier commun.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* ( *Descript. ex Willd.* )

18. RONDELIER à deux semences. *Rondeletia diflerma*. Jacq.

*Rondeletia foliis ovalibus, obtusis; racemis laxis, trifidis; capsulis pulchre saturatè obovatis.* (N.)

*Rondeletia*

*Rond. letia foliis petiolatis, ovalibus, obtusis.* Jacq. Strep. Amer. pag. 59.

Cette espèce ne convient guère à ce genre, à moins que plusieurs de ses semences n'avissent, & que deux seulement arrivent à parfaite maturité, comme il arrive dans quelques autres espèces. Une autre particularité remarquable est d'avoir autour de ses capsules une sorte d'enveloppe pulpeuse, caduque, & qui se déchire en plusieurs parties comme en autant de valves.

C'est d'ailleurs un arbrisseau droit, haut d'environ quinze pieds, rameux, garni de feuilles opposées, pétiolées, ovales, rétrécies à leur base, glabres, très-entières, variables dans leur grandeur.

Les grappes sont lâches, axillaires, composées, triânes; les pédoncules communs & partiels dichotomes, garnis de fleurs très-nombreuses, légèrement odorantes; les unes fécondes, d'autres pédonculées, d'un blanc mêlé de pourpre. Leur calice se divise en cinq folioles courtes, lancéolées, aiguës, ouvertes; le tube de la corolle fort long, cylindrique, un peu ventu vers son milieu. Le limbe se divise en cinq découpures ovales, obtuses, planes, courtes, très-ouvertes. Les filamens sont courts; les anthères linéaires, droites; le style un peu plus long que les étamines; les stigmates à deux divisions linéaires, obtuses. Le fruit est une capsule arrondie, à deux loges, à deux valves, contenant chacune une semence hémisphérique, flée, légèrement ombiliquée: une pellicule succulente enveloppe les capsules; elle se dessèche, se divise en plusieurs parties & tombe.

Cette plante croît dans les forêts & sur les rochers aux environs de Carthagène, où elle fleurit vers le milieu de l'été. (J. Descript. ex Jacq.)

Observations. Je pense que le *willdenowia Schreberi* pourroit être rapporté, comme espèce, au genre des *rondeletia*, ou bien il faudroit trancher de ce dernier toutes les espèces qui ont leur capsule pulpeuse dans leur jeunesse.

**RONDIER.** *Borassus*. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des palmiers, qui a des rapports avec les *chamærops*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont dioïques, les feuilles palmées ou en éventail, épineuses sur leur pétiole.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques; une spathe à plusieurs folioles; une corolle à trois pétales; six étamines dans les fleurs mâles; trois styles; une baie arrondie, contenant trois semences ossifères dans les fleurs femelles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont dioïques, enveloppées à leur base  
*Botanique. Tome VI.*

par une spathe universelle, divisée en plusieurs folioles.

Les fleurs mâles sont disposées sur un spadice simple ou quelquefois médiocrement divisé à sa partie supérieure, imbriqué, ayant la forme d'un chaton.

Elles offrent :

1°. Un calice.

2°. Une corolle composée de trois pétales ovales, concaves.

3°. Six étamines, dont les filamens sont épais, terminés par des anthères grosses, flées.

Les fleurs femelles sont disposées sur un spadice plus lâche & bien plus rameux que celui des fleurs mâles.

Elles offrent :

1°. Un calice à trois divisions.

2°. Une corolle composée de trois pétales courts, petits, persistans, arrondis.

3°. Un ovaire presque rond, surmonté de trois styles courts, terminés par trois stigmates simples.

Le fruit est une baie fort grande, presque ronde, fibreuse, renfermant trois semences charnues, garnies à l'extérieur de filamens nombreux, anguleux d'un côté, convexes de l'autre, & dont l'embryon est inférieur, selon Gaertner.

#### E S P È C E S.

1. **RONDIER flabelliforme.** *Borassus flabelliformis.* Linn.

*Borassus frondibus palmatis, plicatis, cucullatis; stipitibus serratis.* Linn. Syst. veget. pag. 584. — Lam. Illustr. Gener. tab. 878. — Loureiro, Flor. coch. pag. 758.

*Borassus frondibus palmatis.* Flor. zeyl. 395.

*Palma coccifera, folio plicatili, flabelliformi, mas, femina.* Rai, Hist. i. 366.

*Palma indica, tal & tasehala, fructu carnoso, dulci & eduli, patamine incluso.* Burm. Zeyl. 49.

*Ampara.* Rheed, Malab. vol. 1. pag. 13. tab. 10. Mus.

*Carimpara.* Rheed, Malab. vol. 1. pag. 11. tab. 9. Femina.

*Lontarus domestica.* Rumph. Amboin. vol. 1. pag. 45. tab. 10.

*Talghala.* Herm. Zeyl. 49.

*Lontarus.* Juss. Gener. Plant. pag. 39.

Grand & bel arbre qui s'élève à la hauteur du  
Kk

cocotier, mais dont le tronc est plus gros, cylindrique dans toute sa longueur, renflé à sa base & à son sommet, terminé par de longues feuilles palmiformes, disposées circulairement, plissées à leur centre, palmées, ouvertes en éventail, à découpures allongées, étroites, aiguës; les pétioles longs, épais, crautes, garnis des deux côtés de leurs bords de d. mis épineuses.

Les fleurs sont dioïques. Le spadice dans les deux sexes est très-simple, long, cylindrique, garni d'écaillés unifornes; chaque fleur accompagnée de six folioles imbriquées, très-obtuses, qui tiennent lieu de calice. La corolle est composée de trois pétales concaves, obtus; les fleurs mâles ont six étamines; les femelles trois styles. Le fruit est une baie ou un drupe ovale, presque aussi gros que le fruit du cocotier, lisse, un peu complaisant, d'un brun jaunâtre, à trois lobes, revêtu d'une enveloppe charnue, fibreuse, succulente, douce, odorante, renfermant trois semences osseuses, de la forme & de la grosseur d'un œuf de cane, remplies d'une moelle blanche, savoureuse, & d'une liqueur limpide.

Cette plante croît dans les Indes & sur les côtes orientales de l'Afrique. *h*

Les jeunes spadices femelles donnent par incision une liqueur dont les Indiens font un vin qu'ils nomment *suru*, & un sucre appelé *jagara*. La partie pulpeuse des fruits & la substance blanche des semences font d'une saveur agréable & bonnes à manger dans leur jeunesse.

## 2. RONDIER gomute. *Borass gomutus*. Lour.

*Borass frondibus pinnatis, subinermibus; foliis subulatis, oppositis; spadice longissimo, ramoso, pendulo.* Loureiro, Flor. cochin. pag. 759. n°. 2.

*Pelra indica, vinaria, fogerus sive gomutus.* Rumph. Ambun. vol. 1. pag. 57. tab. 13.

Cet arbre est d'une hauteur médiocre; son tronc droit, épais, égal dans toute sa longueur, scabre, hérissé, terminé par une touffe de feuilles très-longues, ailées, supportées par des pétioles longs, cylindriques, épais, à peine épineux. Les folioles sont très-nombreuses, linéaires, lancéolées, opposées, distantes, entières, d'un vert foncé, simplement plissées à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont pâles, dioïques, placées sur des spadices latéraux, pendans, rameux; chaque ramification filiforme, longue de quatre pieds, garnie de fleurs & de fruits féconds. Le calice est composé de six folioles obtuses, imbriquées; la corolle de trois pétales un peu aigus, concaves, ouvertes; plusieurs étamines. Le fruit est un drupe arrondi, à trois côtes, long d'un pouce & demi, glabre, d'un jaune foncé, renfermant trois semences osseuses, ovales, comprimées, presque anguleuses.

Les spadices sortent d'une spathe commune, lancéolée, à trois valves.

Cet arbre croît dans les forêts de la Cochinchine & à l'île d'Amboine. *h* (*Descript. ex Lour.*)

La partie supérieure du tronc de cet arbre est garnie, surtout à l'infertion des feuilles, de très-longes filaments fort tenaces, noirs ou roussâtres, avec lesquels on fabrique d'excellentes cordes, des cables très-forts, d'une longue durée, & qui ne s'allèrent point à l'eau. On obtient, en coupant les spadices dans leur jeunesse, une liqueur vineuse, très-abondante, & une d. plus agréable de toutes celles que fournissent les palmiers, d'après le rapport de Rumphius. On en retire aussi du sucre. Le tronc fournit une moelle très-alimentaire, que les Natives du pays mangent en place de pain. Les noix des jeunes drupes, apprêtées avec du sucre, font d'une saveur agréable, qu'ils font rechercher par les personnes les plus délicates de la Cochinchine; mais, au rapport de Loureiro, l'écorce extérieure & pulpeuse de ces mêmes drupes est si malsaine, qu'elle occasionne, lorsqu'on la touche sans précaution, des démangeaisons insupportables, des douleurs violentes & difficiles à apaiser.

## 3. RONDIER des toches. *Borass caudata*. Lour.

*Borass frondibus pinnatis, inermibus; foliis cuneiformibus, pinnatis.* Loureiro, Flor. cochin. pag. 760. n°. 3.

*Pinanga saxatilis, origi formis.* Rumph. Amboin. vol. 1. pag. 42. tab. 7.

Arbusteau dont la tige ne s'élève qu'à la hauteur de sept à huit pieds, épaisse d'environ un pouce, divisée en rameaux très-approchés, terminée à son sommet par des feuilles longues, ailées avec une impaire, sans aiguillons sur leur pétiole, composées de folioles cuneiformes, un peu plissées, denticulées & comme mordues, très-irrégulières à leur sommet, tantôt arrondies, tantôt tronquées obliquement, d'autrefois lancéolées ou à plusieurs lobes.

Les fleurs sont dioïques; leur régime ou spadice simple, allongé, droit, latéral, un peu au-dessous des feuilles. Les fleurs mâles ont un calice à trois folioles; il est, dans les femelles, à six folioles obtuses, imbriquées. La corolle a trois pétales ovales, recourbés dans les deux sexes. Les étamines sont au nombre de quinze à trente; les filaments courts, les anthères oblongues. Le stigmate est grand, fessile, à trois cotés. Le fruit est un drupe arrondi, long d'un demi-pouce, renfermant trois noix ovales.

Cette plante croît dans les Indes sur les rochers, & dans les forêts de la Cochinchine. *h* (*Descript. ex Lour.*)

*Observations.* Cette plante, dit L'ourcio, convient parfaitement à la figure citée de Rumphius, quart à la tige & les feuilles; mais le régime est rameux, les folioles fétilles, tandis que dans la plante dont il s'agit ici, ces folioles sont rétrécies en queue à leur base.

#### 4. RONDIER tuniqué. *Borassus tunicata*. Lour.

*Borassus frondibus palmatis, plicatis, incurvibus; drapum cordis multiplici.* Loureiro, Flor. cochina. pag. 760. n°. 4.

Arbre très-élevé, dont la tige est droite, égale dans toute sa longueur, épaisse, terminée par de grandes feuilles palmées, placées circulairement, soutenus par des pétioles sans épines. Les fleurs ne sont pas encore connues; mais toutes les autres parties de la fructification & le port de cette plante ne permettent pas de la rapporter à un autre genre qu'à celui-ci.

Le fruit est un drupe presque arrondi, grand, à trois semences. L'enveloppe extérieure du drupe est épaisse, lisse, succulente, brune ou purpurine, à plusieurs couches ou lames, recouvrant huit à dix écailles intérieures. Le dedans des semences est rempli d'une moelle blanche, bonne à manger, semblable à celle du cocotier.

Cette plante croît dans les Indes, vers les confins des royaumes de Decan & de Guzarate. (J. *Discript. ex Lour.*)

**RONGÈES** (Feuilles). *Rosa folia*. Si l'on considère les feuilles relativement à leur bordure, on les nomme *rongées* lorsqu'étant sinuées, leurs échancrures ou lunules en ont d'autres plus petites & inégales entre elles, comme celles de l'*Hyoscyamus aureus*.

**ROPOURIER.** *Ropourea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, dont la famille n'est pas encore bien connue, qui comprennent des arbrutes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont ailées, verticillées; les folioles alternes avec une impaire; les fleurs axillaires, fétilles, glomérulées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle monopétale, en roue, à cinq lobes; cinq étamines; un style; trois ou quatre stigmates; une baie velue, à quatre loges polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, d'une seule pièce, profondément divisé en cinq découpures arrondies.

2°. Une corolle monopétale, en roue, dont le

tube est très-court, & le limbe partagé en cinq lobes arrondis, velus extérieurement.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont velus, attachés sur la corolle, alternes avec les lobes du limbe, terminés par des anthères à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, velu, surmonté d'un style filiforme, terminé par trois ou quatre stigmates oblongs, saigus.

Le fruit est une baie grosse, ovale, velue, divisée en quatre loges qui contiennent des semences nombreuses dans une pulpe visqueuse, douce & jaunâtre.

#### E S P È C E.

**ROPOURIER de la Guinée.** *Ropourea guianensis*. Aubl.

*Ropourea foliis verticillatis, impari-pinnatis; foliis alternis; floribus glomeratis, axillaribus, sessilibus.* (N.)

*Ropourea guianensis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 198. tab. 78. — Lamarck, Illustr. Gener. vol. 2. pag. 47. n°. 2481. tab. 121. — Jusseau, Gener. Plant. pag. 421.

*Cumex guianensis*. Gmel. Syst. Nar. vol. 1. pag. 403. — Schreb. Plant. Gener. n°. 367.

*Cumex fraxinea*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1117.

Arbrutau élevé de douze à quinze pieds, dont les tiges sont noueuses, cylindriques, de trois à quatre pouces de diamètre, simples, articulées, très-lingues, garnies à chaque articulation de feuilles verticillées, ailées avec une impaire, composées de folioles alternes, nombreuses, fétilles, ovales, lancéolées, obtuses, mucronées, vertes à leurs deux faces, longues de huit à dix pouces, sur trois de large & traversées dans leur longueur par une côte saillante qui se divise en nervures latérales, simples, alternes, un peu arquées, dont l'intervalle est rempli par des veines très-fines, en zig-zag; chacune des folioles accompagnée à sa base d'une petite stipule en forme d'épine.

Les fleurs sont également axillaires, fétilles, petites, dont le calice est partagé en cinq lobes arrondis. La corolle est monopétale, en roue, roussâtre en dehors, blanchâtre en dedans de poils roux; les filaments des étamines velus; l'ovaire chargé de poils roux, qui se convertit en une baie jaune, charnue, de la grosseur d'un œuf de poule, remplie d'une pulpe douce que les Créoles & les Coufaris fument avec plaisir. Il arrive souvent qu'une des quatre loges avorte, & disparaît par l'agrandissement des autres.

Cette plante croît en Guinée, dans les bois de K k 2



Caux. Il fleurit & fructifie au commencement de l'hiver.  $\bar{h}$

Les Créoles le nomment *bois gaulete*, & les Cnuffaris, une des nations de la Guiane, l'appellent *atroposara*.

Les habitants & les Nègres emploient la tige de cet arbrisseau dans la construction des murs de maisons, qui sont faites de lattes entrelacées en forme de claie, & que l'on couvre de terre mêlée & pétiée avec de la boue de vache. (*Aublet*.)

**ROQUETTE.** *Eruca*. M. Lamarck avoit consacré ce nom pour former un genre particulier de l'*erysimum barbarea* Linn. & le séparé de la plupart des autres *erysimum*, surtout de l'*erysimum officinale*, les principaux caractères génériques n'étant point les mêmes dans ces deux plantes. Ce savant auteur a fait de très-bonnes observations à ce sujet, dont nous profiterons; mais nous n'avons pas cru pouvoir appliquer le mot *roquette* à l'*erysimum barbarea*, ce mot étant trop généralement employé pour une autre plante presque potagère, que l'on cultive dans les jardins, que Linné a nommée *brassica eruca*, & que M. Lamarck lui-même a décrit à l'article CROU, & qu'il appelle *roquette cultivée*. (*Voyez* le mot *VELAR*.)

**RORIDULE.** *Roridula*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, dont la famille n'est pas encore bien connue, qui paroit se rapprocher de celle des capriets, & avoir des rapports avec les *drosera*. Il comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont entières, sessiles, éparées ou fasciculées, ciliées & glanduleuses; les fleurs disposées en grappes terminales, peu garnies.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales; cinq étamines, antières prolongées à leur base, au dessous de l'insertion du filament, en un tubercule scroiforme; une capsule à trois loges, à trois valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, inférieur, composé de cinq folioles ouvertes, lancéolées.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, égaux, plus grands que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont subulés, alternes avec les pétales, courts, opposés aux divisions du calice, terminés par des antières droites, oblongues, s'ouvrant au sommet par deux pores, se prolongeant à leur base, au dessous de l'insertion du filament, en un tubercule scroiforme.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, oblong, aigu, surmonté d'un style simple, terminé par un stigmate pelté, presqu'à trois lobes.

Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, arrondie, à trois faces, à trois loges, à trois valves, ayant leurs cloisons opposées aux valves, contenant des semences foliaires, ovales, ridées, anguleuses à un de leurs côtés, attachées à un réceptacle central vers sa partie supérieure, lisse & à trois côtés.

#### ES P È C E.

**RORIDULE dentée.** *Roridula dentata*. Linn.

*Roridula foliis lineari-lanceolatis, ciliato-ventralis, sessilibus; ciliis inaequalibus, glandulosis, viscosis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 121. n°. 2771. tab. 141. fig. 1.

*Roridula dentata*. Linn. Syst. veget. pag. 244. — Juss. Gener. Plant. pag. 426.

*Irion verticillatum*. Burm. Prodr. 6.

Cette plante a le port d'un *drosera*, quoiquo très-différente dans sa fructification.

C'est un petit arbruste rameux, haut de deux ou trois pieds, à rameaux glabres, alternes, presque simples, garnis de feuilles lineaires, lancéolées, aiguës, très-étroites, sessiles; les inférieures, éparées; les supérieures, réunies en fascicules vers l'extrémité des rameaux, munies de leurs bords de dents formées par des cils roides, droits, glanduleux, inégaux, visqueux.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles supérieures & à l'extrémité des rameaux, en grappes bien plus longues que les feuilles, lâches, pauciflores. Les pédoncules se divisent en quelques ramifications simples, uniflores; ils sont chargés de poils visqueux & glanduleux, semblables aux cils des feuilles, qui recouvrent également les calices à leur extérieur: il existe souvent à la base de chaque ramification une petite bractée très-caduque. Les pétales sont ovales, obtus à leur sommet, un peu rétrécis à leur base, plus longs que le calice: la capsule est ovale, acuminée.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (*V. f. in herb. Juss. & Lam.*)

*Observations.* Le *Roridula muscipula*, Gaertn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 208. tab. 61. fig. 8, & Lam. Illustr. Gen. tab. 141. fig. 2, paroît bien peu distincte de la précédente. Les divisions de ses calices sont plus étroites, presque linéaires; les pétales plus allongés, aigus & non obtus; les capsules très-acuminées, & les semences ovales, ridées.

**ROSACÉE** (Corolle). *Rosa* corollis. Oen

donne à la corolle le nom de rosacée. Elle est composée de cinq pétales réguliers, égaux ; ils sont quelquefois plus nombreux, par la grande facilité de la plupart des fleurs de cette torie à multiplier leurs pétales. Les pruniers, les rosiers, &c.

**ROSACÉES (L. 25).** *Rosacea*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un très-grand nombre de genres qui ont beaucoup de rapports avec celui du rosier, qui y est compris.

Les plantes renfermées dans cette famille sont des arbrisseaux, des arbres ; d'autres ont des tiges herbacées, garnies de feuilles alternes, munies de stipules simples ou composées.

La calice est supérieur & tubulé, ou inférieur, urcéolé, en roue, souvent divisé à son orifice en plusieurs découpures, presque toujours persistant. La corolle est polyptalée, composée ordinairement de cinq pétales insérés à l'orifice du calice, alternes avec les divisions : quelquefois la corolle manque. Les étamines sont en nombre défini, quelquefois en nombre défini, ayant la même insertion que les pétales.

L'ovaire est tantôt simple & inférieur, chargé de styles & de stigmates nombreux ; tantôt supérieur, simple, surmonté d'un seul ou de plusieurs styles : les styles sont toujours latéraux, insérés sur le côté des ovaires.

Le fruit varie dans ses formes : dans les uns c'est une pomme inférieure ; à plusieurs loges, ou bien il a la forme d'un pot : il n'est inférieur qu'en apparence, contient les semences & se ressert à son orifice. Dans d'autres les péricarpes n'ont qu'une seule loge à plusieurs semences, ou les semences sont solitaires, sans autre péricarpe que l'enveloppe qui leur est particulière : elles sont définies ou indéfinies, supérieures, placées sur un réceptacle commun. Dans quelques autres, le fruit est une seule capsule supérieure ; à une seule loge ou à deux semences nues, ou bien revêtues d'une enveloppe drupacée. La cicatrice des semences est placée latéralement un peu au dessous du sommet ; elle reçoit un pédicule ou un cordon ombilical, attaché par sa base au fond du péricarpe. L'embryon est droit, sans périsperme.

Les principaux genres renfermés dans cette famille sont les suivants :

1. Ovaire simple, inférieur, à plusieurs styles ; pomme à plusieurs loges, ombilicée, & couronnée par les divisions du calice. Arbres ou arbrisseaux. Les POMMIERS. (*Pomacea*.)

Les pommiers..... *Malus*.  
Les poiriers..... *Pyrus*.  
Les coignassiers..... *Cydonia*. *Pyrus*.

Les néfliers..... *Mespilus*.  
Les alniers..... *Crataegus*.  
Les sorbiers..... *Sorbus*.

2. Ovaires en nombre indéfini, presque inférieurs, renfermés dans un calice urcéolé, & ressert à son ouverture ; chaque ovaire muni d'un style ; autant de semences que d'ovaires. Arbrisseaux. Les ROSIERS. (*Rosa*.)

Les rosiers..... *Rosa*.

3. Ovaires en nombre défini ; plusieurs, très-rarement un seul, presque inférieurs, renfermés dans un calice ressert à son orifice ; autant de styles & de semences que d'ovaires. Plantes la plupart herbacées, souvent privées de corolle ; étamines droites dans un grand nombre. Sixes séparés dans quelques-unes. Les IMPRENNELLES. (*Sanguifera*.)

Les pimprenelles..... *Poterium*.  
Les sanguisorbes..... *Sanguifera*.  
Les ancillres..... *Ancistrum*.  
Les acénas..... *Acana*.  
Les aigre-moines..... *Agrimonia*.  
Les neurades..... *Neurada*.  
Les cliforttes..... *Clifortia*.  
Les alchimilles..... *Alchimilla*.  
Les percepiers..... *Aphanes*. *Alchimilla*.  
Les libballies..... *Stobadica*.

4. Plusieurs ovaires en nombre indéfini, réellement supérieurs, insérés sur un réceptacle commun ; chaque ovaire muni d'un style ; autant de semences, ou nues, ou quelquefois en forme de baie. Plantes herbacées ; quelques arbrisseaux. Les POTENTILLES. (*Potentilla*.)

Les tormentilles..... *Tormentilla*.  
Les potentilles..... *Potentilla*.  
Les fraisières..... *Fragaria*.  
Les comarètes..... *Comarum*.  
Les béroites..... *Germ*.  
Les driades..... *Dryas*.  
Les tonces..... *Rubus*.

5. Plusieurs ovaires supérieurs, en nombre défini, surmontés chacun d'un seul style ; autant de capsules, à une ou à plusieurs semences. Les FILIPENDULES. (*Spiraea*.)

Les spirées ou filipendules..... *Spiraea*.  
Les surianes..... *Suriana*.  
Les tétracères..... *Tetracera*.

6. Un seul ovaire supérieur ; un seul style ; les fruits à une seule loge, contenant une ou plusieurs semences. Arbres ou arbrisseaux, souvent dépourvus de corolle. Les PROCKIES. (*Prockia*.)

Les tigrés..... *Tigrea*.  
Les delimes..... *Delima*.  
Les prockias..... *Prockia*.  
Les hirtelles..... *Hirtella*.

7. Un *sest oval* & *supérieur* ; un *sest* *style*. Une *noix* à *une* ou à *deux* *semences*, *nues*, *plus* *souvent* *arapées*. LES AMYGDALÉES. (*Amygdala*.)

Les <i>licanias</i> .....	<i>Licania</i> .
Les <i>grangers</i> .....	<i>Grangeria</i> .
Les <i>icaquiers</i> .....	<i>Corysolanus</i> .
Les <i>pruniers</i> .....	<i>Prunus</i> .
Les <i>cerisiers</i> .....	<i>Ceris</i> .
Les <i>abricotiers</i> .....	<i>Amenica</i> .
Les <i>amandiers</i> .....	<i>Amygdalus</i> .
Les <i>pêcheurs</i> .....	<i>Peach</i> .
Les <i>moquilles</i> .....	<i>Moquilla</i> .
Les <i>coupeis</i> .....	<i>Coupi</i> .
Les <i>coujis</i> .....	<i>Couji</i> .
Les <i>parinaris</i> .....	<i>Parinarium</i> .

#### 8. Genres très-voisins des rosacées.

Les <i>p'inia</i> .....	<i>Pinia</i> .
Les <i>calicantes</i> .....	<i>Calycanthus</i> .
Les <i>lufies</i> .....	<i>Lufia</i> .
Les <i>blacouris</i> .....	<i>Blakwellia</i> .
Les <i>acomas</i> .....	<i>Himalium</i> .
Les <i>napimoga</i> s.....	<i>Napimoga</i> .

ROSAGE. *Rhododendron*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des rosagées, & qui comprend avec les *azéla*s & les *kalou*s, & qui comprend des arbustes exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les f. les sont entières, les fleurs axillaires ou terminales, en épis ou en corymbes, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un *calice* partagé en cinq découpures ; une *corolle* presqu'infundibuliforme, dont le limbe est partagé en cinq lobes ; dix étamines recourbées ; une capsule à cinq loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, persistant, divisé en cinq découpures.

2°. Une *corolle* monopétale, presqu'infundibuliforme ou en roue, dont le tube est court, le limbe ouvert, à cinq lobes arrondis.

3°. Dix *étamines* dont les filaments sont presque de la longueur de la corolle, filiformes, courbés, terminés par des anthères ovales.

4°. Un *ovaire* obtus, à cinq côtés, surmonté d'un style filiforme, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate obtus.

Le *fruit* consiste en une capsule ovale, presque anguleuse, à cinq lobes, contenant des semences nombreuses & fort petites.

Observations. Quoiqu'en général les rosagées diffèrent des *azéla*s par la grandeur de leurs fleurs, la différence essentielle entre ces deux genres consiste presque uniquement dans le nombre des étamines. Un grand nombre d'espèces parmi les rosagées est remarquable par les bourgeons composés d'échelles imbriquées, qui souvent persistent à la base des pédoncules.

#### E S P È C E S.

1. ROSAGE ferrugineux. *Rhododendron ferrugineum*. Linn.

*Rhododendron foliis glabris, subius seprosis ; corollis infundibuliformibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 363. — Mill. Dict. n°. 2. — Jacq. Observ. 1. pag. 26. tab. 16. — Idem, Flor. austr. tab. 255. — Scop. Carr. n°. 479. — Willd. Arbr. 248. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 419. n°. 266. — Gérard, Flor. gallo-prov. pag. 418. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 160. n°. 1. tab. 61.

*Rhododendron foliis ellipticis, glabris, subius rubiginosis*. Haller, Helv. n°. 1015.

*Azela maculis ferrugineis, foliis adpersis ; floribus decandris*. Lemon. — Sauv. Monip. 67.

*Ledum alpinum, foliis ferrea rubigine nigricantibus*. C. Bauh. Pin. 468. — Rai, Hist. 1005.

*Montana allobrogum, lentisefolia*. Lobel, Icon. 365. — Idem, Adverf. pag. 115. Icon.

*Evonymus Theophrasti*. Dalech. Hist. 1. p. 271.

*Chamaerhodendron alpina, glabra*. Tournef. Inst. R. Herb. 604.

*Nerium alpinum quibusdam, aliis ledum glabrum*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 21. Icon.

Arbuste difforme, qui s'élève à peine à la hauteur de deux ou trois pieds, dont les rameaux sont difformes, tortus, noueux, très-irréguliers, cylindriques, de couleur gristâtre, garnis de feuilles éparées, médiocrement pétiolées, très-rapprochées, ovales, oblongues, dures, coriaces, vertes & lisses à leur face supérieure, rouilles ou de couleur ferrugineuse, & ponctuées en dessous ; entières & un peu roulées à leurs bords, rétrécies en pétiole à leur base, souvent obulées à leur sommet.

Les fleurs sont réunies en bouquets à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules simples, uniflores, cylindriques, inégaux. Le calice est court, un peu pileux à ses bords. La corolle un peu courbée, rougeâtre, d'une odeur désagréable, infundibuliforme, quelquefois ponctuée en dehors ; les deux divisions inférieures de son limbe plus étroites que les autres. La capsule est petite, ovale, obtuse, contenant des semences rouilleuses.

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, sur les montagnes des départements méridionaux de la France. Quelquefois elle varie à fleurs blanches. *H* (*V. v.*)

Quelques auteurs ont avancé que cet arbrisseau étoit si ténuel aux brebis & surtout aux chèvres, qu'elles peussent lorsqu'elles en avoient mangé les feuilles.

2. ROSAGE à longues capsules. *Rhododendron minus*. Mich.

*Rhododendron foliis ovali-lanceolatis, utrinque sessile, acutis, foliis ferrugineo-punctatis; floribus brevissimis pedicellatis, infundibulo-campanulatis; capsulis elongatis*. Mich. Flor. boreal.-amur. vol. 1. pag. 258.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *Rhododendron ferrugineum*; elle en diffère par la longueur de ses capsules, & par sa grandeur.

C'est un arbrisseau d'une humeur médiocre, rameux, garni de feuilles épaisses, à peine pétiolées, ovales, lancéolées, entières à leurs bords, pointues à leur sommet, rétrécies insensiblement en pétiole à leur base, de couleur verte en dessus, brunes, de couleur de rouille & ponctuées à leur face inférieure.

Les fleurs sont ramassées en bouquets à l'extrémité des tiges & des rameaux. Les pédoncules sont très-courts; la corolle campanulée, presque en forme d'entonnoir; les capsules plus longues que dans la plupart des autres espèces.

Cette plante croît sur les montagnes de la haute Caroline, vers la source du fleuve de Savannah. Elle a été découverte par Michaux. *H*

3. ROSAGE de Russie. *Rhododendron dauricum*. Linn.

*Rhododendron foliis glabris, punctatis, nudis; corollis rotatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 562. — Pall. Flor. ross. 1. pag. 47. tab. 52.

*Rhododendron (dauricum), foliis glabris, utrinque natis; petiulis longissimis; corollis violaceis; foliis amplioribus, rotatis*. Andr. Reposit. Botan. pag. 4. tab. 4.

*Andromeda foliis ovatis, utrinque punctatis*. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 124. n°. 10.

*Chamaerhodendron folio glabro, majusculo; amplo flore roseo*. Aum. Ruth. 181. tab. 27.

Cet arbrisseau a ses tiges nues à leur partie inférieure, prolixe, divisée en rameaux garnis, particulièrement vers leur sommet, de feuilles alternes, pétiolées, ovales, oblongues, glabres à leur face supérieure, de couleur de rouille en dessous, couvertes à leurs deux faces d'un grand

nombre de petits points, supportées par de longs pédoncules.

Les fleurs sont grandes, de couleur violette, terminales, presque en bouquets; munies de pédoncules simples, plus longs que les feuilles. Leur calice est partagé en cinq découpures. La corolle ample, campanulée, presque en roue; les étamines ouvertes, écartées, de la longueur de la corolle; le style rougeâtre; la capsule ovale, obtuse.

Cette plante croît dans la Sibirie & la Russie. *H* (*V. f. in herb. Juss.*)

4. ROSAGE du Kamtchatka. *Rhododendron camtschaticum*. Pallas.

*Rhododendron foliis ellipticis, nervosis; corollis rotatis, calicibus foliaceis*. Pall. Flor. ross. 1. pag. 48. tab. 33.

*Rhododendron foliis obovatis, acutis, ciliatis, nudis, corollis rotatis, pediculis acutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 604. n°. 3.

*Chamaerhodendron berberis folio; flore amplo, roseo*. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 126. n°. 13.

Cette plante paroît se rapprocher du *Rhododendron hirsutum*, dont elle diffère par ses belles & grandes fleurs couleur de rose.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles épaisses, pétiolées, petites, assez sensibiles à celles de l'épine-vinette, vertes à leurs deux faces, glabres, entières à leurs bords, ciliées, marquées de veines très-fines, sans nervures saillantes.

Les fleurs sont terminales, pédonculées, presque solitaires, d'une belle couleur de rose, campanulées, presque en roue, à peu près aussi grandes que celles du *Rhododendron ponticum*. Leur tube est très-court; le limbe divisé en cinq découpures ovales, aiguës; quelquefois les calices sont foliacés.

Cette plante croît dans la Sibirie & au Kamtchatka sur les montagnes. *H*

5. ROSAGE velu. *Rhododendron hirsutum*. Linn.

*Rhododendron foliis ellipticis, acuminatis, ciliatis, subhis punctatis; corollis infundibuliformibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 604. n°. 4.

*Rhododendron foliis ellipticis, nudis; corollis infundibuliformibus*. Linn. — Muhl. Dict. n°. 1. — Jacq. Flor. austr. tab. 98. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 480.

*Rhododendron foliis ovatis, ciliatis, subhis punctatis*. Haller, Helv. n°. 1016.

*Ledum alpinum, hirsutum*. C. Bauh. Pin. 468. — Rai, Hist. 1009.

*Chamaerhododendron alpinum*, Willd. f. Tourn. Inf. R. Herb. 604.

*Nerium alpinum quibsfidem, aliis ledum hisatum*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 21. Icon. 22.

*Ledum alpinum*. Clus. Hist. 1. pag. 82. Icon. — Idem, Pann. pag. 73. tab. 74.

*Balsamum alpinum Gesneri*. Lobel, Icon. 468. — Idem, Observ. pag. 199. Icon.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur d'environ deux pieds au plus; il se divise en rameaux courts, cylindriques, revêtus d'une écorce d'un brun clair, & garnis de feuilles ovales, elliptiques, assez petites, presque sessiles, entières, pourlues de un peu velues à leur face inférieure, munies à leurs bords de cils fins, rouffâtres, à peine aiguës à leur sommet, longues de cinq à six lignes, larges de trois.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, des corymbes d'un aspect agréable. Les pédoncules sont simples, filiformes, inégaux, plus longs que les feuilles, uniflores; le calice est court, à cinq dents; la corolle en forme d'entonnoir, dont le tube a près d'un demi-pouce de long; le limbe campanulé, peu ouvert, divisé en cinq découpures courtes, obtuses, d'un beau rouge en dehors & pourlues très-souvent par des points argentés; d'un rouge plus clair en dedans. Les capsules sont un peu inclinées, petites, ovales, à cinq loges remplies de semences fort petites.

Cette plante croit en Suisse, dans les Alpes & sur les hautes montagnes de l'Allemagne. *h* (*V. f.*)

6. ROSAGE FAUX CISTE. *Rhododendron chamaecistus*. Linn.

*Rhododendron foliis ellipticis, acutiusculis, glandulosis, nudis; corollis rotatis, petalis oblongis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 605. n°. 5. — Syst. veget. pag. 405. n°. 5.

*Rhododendron foliis ciliatis, corollis rotatis*. Jacq. Flor. austr. tab. 217. — Scopol. Carn. edit. 1. n°. 481.

*Ledum foliis ferrugineis ad margines ciliis inflat pilosis, flore purpureo*. Mich. G. uel. 225. tab. 106.

*Chamaecistus hispida*. C. Bauh. Pin. 466.

*Chamaecistus quartus*. Clus. Pann. pag. 65. Ic. 64. pag. 19. — Rai, Hist. 1005.

*Cistus chamaerhododendron foliis confertis, ferreis rubiginis nientibus, marginibus pilosis*. Pluken. Aimag. 106. tab. 23. fig. 4.

*Chamaecistus ciliatus*. Clusius. Hist. 1. pag. 76. Icon.

Cette espèce a l'aspect d'un ciste. C'est un petit arbrisseau qui se divise en rameaux diffus, non-très, nombreux, glabres, cylindriques, garnis de feuilles nombreuses, épaisses, alternes, presque sessiles, petites, elliptiques ou ovales, allongées, un peu aiguës à leur sommet, créées à leur base en un pétiole très-court, luisantes & d'un vert foncé à leur face supérieure, un peu rouffâtres en dessous, entières & munies à leurs bords de cils glanuleux.

Les fleurs sont presque solitaires à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules simples. Le calice se partage en cinq découpures lancéolées, aiguës, réfléchies après la floraison; la corolle purpurine, d'une grandeur médiocre, en roue: son tube est très-court; son limbe ouvert, à cinq lobes obtus, arrondis. Les filamens sont presque droits, plus courts que la corolle, terminés par des anthers noires; le style allongé, de couleur purpurine à sa partie supérieure; la capsule ovale, à cinq côtes, orbule, contenant des semences fort petites, jaunâtres.

Cette plante n'est pas commune; elle croit dans les Alpes par le mont Baldo, sur les montagnes de l'Autriche & de la Carniole. *h*

7. ROSAGE DU CAUCASE. *Rhododendron caucasicum*. Pall.

*Rhododendron foliis scabris, subius ferrugineo-tomentosis; umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis subrotatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 605. n°. 6.

*Rhododendron (caucasicum), foliis ovatis, scabris, margine inflexis, vixis, bracteis elongatis*. Pall. Flor. ross. 1. pag. 46. tab. 31.

Cette plante diffère bien peu du *Rhododendron chrysanthum*, dont elle n'est peut-être qu'une variété; elle s'en distingue particulièrement par sa corolle blanche ou rougeâtre, & par les feuilles tomenteuses à leur face inférieure.

Ses tiges sont peu élevées; elles se divisent en rameaux diffus, épars, très-iréguliers, garnis de feuilles médiocrement pétioles, alternes, nombreuses, ovales, oblongues, rudes au toucher, vertes en dessus, tomenteuses & de couleur de rouille à leur face inférieure, entières & roulées à leurs bords, marquées de veinules en réseau. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en un corymbe plus long que les feuilles. Les pédoncules sont simples, presque égaux, munis à leur base de bractées oblongues. La corolle est blanche, quelquefois d'un rouge clair, en roue, à peine tubulée: son limbe est ample, plane, divisé en cinq grands lobes arrondis.

Cet arbrisseau croît sur les montagnes les plus élevées du Caucase, dans la région des neiges. *h*

8. ROSAGE

8. ROSAGE à fleurs jaunes. *Rhododendron chrysanthum*. Linn. f.

*Rhododendron foliis oblongis, scabris, subtus discoloribus, glabris; umbellis terminalibus, corollis rotatis; petalis obovatis, irregularibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 205. n° 7.

*Rhododendron (chrysanthum), foliis oblongis, impunctatis, supra scabris, venosis; corollis rotatis, irregularibus; gemma foris ferrugineo-tomentosa*. Linn. f. Suppl. pag. 237.

*Rhododendron foliis ovatis, scabris, margine reflexis, subtus glabris; umbellis terminalibus; corollis furvis, irregularibus*. Pallas, Flor. ross. 1. pag. 44. tab. 30.

*Rhododendron chrysanthum*. Pallas, Iter 3. p. 369. Append. 724. n° 87. tab. N. F. 1. 2. — Koëpin. Monogr.

*Rhododendron aureum*. Georg. Iter, pag. 214.

*Andromeda foliis ovatis, utrinque venosis; corollis campanulatis, obliquis*. Gmel. Sibir. 4. pag. 121. tab. 54.

Perir arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux nombreux & diffus, revêtus d'une écorce glabre, de couleur brune, garnis de feuilles alternes, éparées, médiocrement pétioles, oblongues, ridées, ovales, quelquefois rétrécies à leurs deux extrémités, vertes en dessus, beaucoup plus pâles & roussâtres en dessous, entières & un peu roulées à leurs bords, marquées de nervures réticulées.

Les rameaux sont garnis dans toute leur longueur, de stipules en forme d'écailles roussâtres ou couleur de rouille. C'est d'entre ces écailles supérieures que sortent des pédoncules simples, uniflores, disposés en corymbes terminaux. La corolle est grande, campanulée, presque en roue, d'une belle couleur jaune. Les capsules sont ovales, inclinées sur leur pédoncule.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de la Sibirie, ainsi que sur les bords du lac Baïkal & dans le Kamtchatka. Th (V. f. in herb. Juss. absque floribus.)

Les feuilles de cette plante s'emploient avec succès contre les douleurs de sciartique. Ce fait a été certifié à M. de Jusieu par M. Charpentier, résidant à Pétersbourg, & qui en a lui-même éprouvé les bons effets.

9. ROSAGE du Pont. *Rhododendron ponticum*. Linn.

*Rhododendron foliis oblongis, glabris, utrinque concoloribus; corymbis terminalibus, corollis campanulato-rotatis, petalis lanceolatis*. Willd. Arbr. 235. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 606. n° 8. Botanique. Tome VI.

*Rhododendron foliis nitidis, lanceolatis, utrinque glabris; racemis terminalibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 562. — Jacq. Icon. rar. 1. tab. 73. — Pallas, Flor. ross. 1. pag. 43. tab. 29.

*Chamaerhododendron pontica, maxima; foliis laurocerasi*. Tourn. Coroll. 42. — Iter, vol. 2. pag. 99.

Arbrisseau fort recherché à cause de la beauté de son feuillage & de la grandeur des fleurs, qui s'élève peu & produit un bel effet dans les bosquets.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de trois pieds environ, divisées en rameaux droits, glabres, cylindriques, dont l'écorce est rougeâtre, particulièrement sur les anciens rameaux; verdâtre sur les plus jeunes, ridée & lisse; garnis de feuilles éparées, médiocrement pétioles, glabres, oblongues, lancéolées, très-fermes, coriaces, persistantes, longues de quatre à cinq pouces sur au moins deux de large, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur base, glabres, lisses, presque luisantes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles courts, épais, à demi cylindriques.

Les fleurs sont réunies en une grappe ou en un bouquet fort ample à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues par des pédoncules inégaux, nus, alternes, cylindriques, uniflores. Le calice est court, presque campanulé; les dents sont petites, aiguës; la corolle campanulée, de la grandeur de celle du laurier-rose, d'une belle couleur purpurine, divisée à son limbe en cinq découpures profondes, oblongues, obtuses. Les étamines sont arquées, de la longueur de la corolle; les anthères grosses, un peu rougeâtres; le style très-long, persistant sur le jeune fruit; la capsule ovale, obtuse.

Cet arbrisseau croît naturellement dans le Levant & à Gibraltar, dans les lieux ombragés, un peu humides. On le cultive dans les jardins de l'Europe. Th (V. v.)

Observations. Il a de grands rapports avec le *Rhododendron maximum*. Ce dernier en diffère par les divisions de la corolle, plus courtes, presque arrondies; par les feuilles roussâtres en dessous. Schreber observe qu'il ne diffère guère de l'*Azara pontica* que par le nombre de ses étamines.

10. ROSAGE à grandes fleurs. *Rhododendron maximum*. Linn.

*Rhododendron foliis oblongis, glabris, subtus discoloribus; umbellis terminalibus, corollis rotatis, petalis subrotundis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 607. n° 9. — Idem, Arbr. 286.

*Rhododendron foliis nitidis, ovalibus, obtusis, venosis; margine acuto, reflexo; pedunculis unifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 563. — Trew. Lhret. tab. 66. — Wagh. Amer. pag. 63. tab. 23. fig. 49.

— Lam. Ill. Gener. tab. 364. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 4. tab. 63. fig. 6.

*Ledum lauræceris* folio. Amoen. Academ. vol. 2. pag. 200. — *Rhododendron maximum*. 201. edit. 3.

*Kalmia foliis lanceolato-ovatis*, nitidis, subius ferrugineis; corymbis terminalibus. Miller, Dict. tab. 229.

*Chamaerhododendros lauri folio*, semper virens; floribus ballatis, corymbosis. Catesb. Carol. 3. pag. 17. tab. 17. fig. 2.

*Rhododendron (maximum)*, arborefcens; foliis subcuneatis, oblongis, abruptè acuminatis, crassius coriaceis, glabris, calicis laciniis ovalibus, obtusis; corollâ campanulata. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 259.

*Azalea floribus pulcherrimis*, speciosis, rubris; foliis oblongo-lanceolatis; petiolis aënois crassius, semper virentibus. Clayton, Mff. Linn.

Ce bel arbrisseau se rapproche beaucoup du *rhododendron ponticum* : on l'en distingue à ses feuilles d'une couleur plus foncée & plus terreuse en dessous, & aux divisions de la corolle, plus courtes, plus arrondies.

Ses tiges sont fortes, divisées en rameaux alternes, droits, cylindriques, garnis de feuilles éparées, alternes, pétioles, coriaces, ovales, oblongues, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, médiocrement rétrécies à leur base, glabres, vertes, luisantes à leur face supérieure, d'une couleur plus foncée, presque ferrugineuse en dessous, finement réticulées, un peu toulées à leurs bords, supportées par des pétioles courts, verdâtres.

Les fleurs sont disposées en un beau corymbe à l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules presque aussi longs que les feuilles, filiformes, munis à leur base d'écaillés lancéolées, aiguës. Le calice est court, à cinq divisions ovales, presque obtuses. La corolle d'une belle couleur pourpre, campanulée, presque en roue. Son tube est large, très-court; son limbe très-large, divisé en cinq divisions arrondies, très-obtuses, réticulées; la division inférieure souvent maculée à sa base. La capsule est ovale, obtuse, à cinq côtés, surmontée dans sa jeunesse du style recourbé, s'ouvrant par son sommet en cinq loges.

Cet arbrisseau croît dans la Virginie, dans la Haute-Caroline & la Nouvelle-Angleterre aux lieux montagneux. *h* (V. f.)

11. ROSAGE du Catawba. *Rhododendron catawbiense*. Mich.

*Rhododendron foliis brevi-ovalibus*, utrinque rotundato-obtusis; corollâ campanulata; calicis laciniis, angustis-oblongis. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 258.

Il existe de grands rapports entre cette espèce & le *rhododendron maximum* : elle en diffère par la forme un peu différente de ses feuilles, & par les divisions de son calice.

C'est un arbrisseau de hauteur médiocre, glabre, qui se divise en rameaux droits, cylindriques, garnis de feuilles éparées, médiocrement pétioles, courtes, ovales, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, arrondies & obtuses à leurs deux extrémités. Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, inégaux. Le calice est presque campanulé, court, divisé à son orifice en cinq découpures étroites, oblongues. La corolle est ample, campanulée, assez semblable à celle du *rhododendron maximum*.

Cet arbrisseau croît sur les hautes montagnes de la Caroline septentrionale, proche la source du fleuve *Catawba*, où il a été découvert par Michaux. *h*

12. ROSAGE à feuilles ponctuées. *Rhododendron punctatum*.

*Rhododendron foliis oblongis*, glabris, subius resinosis-punctatis; umbellis terminalibus; corollis infundibuliformibus. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 607. n°. 10. — Ventenat, Jard. de Cels, pag. 15. tab. 15.

*Rhododendron punctatum*. Donn. Ind. Hort. Cantabr. 49.

Cet arbrisseau a beaucoup de ressemblance avec le *rhododendron maximum* : il s'en distingue par ses corolles infundibuliformes, & par les points résineux qui recouvrent les feuilles en partie.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de trois à quatre pieds, divisées en rameaux allongés, presque simples, glanduleux, garnis de feuilles éparées, alternes, médiocrement pétioles, oblongues, lancéolées, glabres, entières à leurs bords, munies à leur face inférieure & surtout le long de leur principale nervure de petites glandes résineuses. Les fleurs sont réunies en un corymbe presque en ombelle à l'extrémité des rameaux. Le calice est fort petit, à cinq divisions ovales, obtuses, droites, glanduleuses. La corolle est en forme d'entonnoir, glanduleuse en dehors, à cinq angles; son limbe à cinq découpures ovales, obtuses, couleur de chair, inodore; la capsule oblongue, à cinq côtés, couleur de rouille, à cinq loges & à cinq valves, renfermant des semences linéaires, oblongues, glabres, aiguës, d'un brun foncé.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. *h* (V. f.)

Elle fleurit vers la fin de l'hiver, conserve son feuillage tout l'hiver; elle a été découverte par Michaux, à la source de la rivette de Savannah,

& se cultive en pleine terre dans le jardin de M. Cels.

13. ROSAGE à feuilles linéaires. *Rhododendron linearifolium*.

*Rhododendron foliis sessilibus, angusto-linearibus, subtus ferrugineo-pubescentibus; ramis supernè rubiginoso-tomentosis. (N.)*

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, effilés, revêtus d'une écorce griseâtre à leur partie inférieure, chargés à leur partie supérieure d'un duvet tomenteux, épais, couleur de rouille, garnis de feuilles éparées, filiformes, nombreuses, coriaces, étroites, linéaires, obtuses, longues d'environ un pouce, sur deux à trois lignes de large; glabres, ridées & d'un vert foncé à leur face supérieure, pubescentes & ferrugineuses en dessous, roulées à leurs bords.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux en un corymbe presque ombellé. Les pédoncules sont presque égaux, longs de plus d'un pouce, pubescents, filiformes, un peu inclinés, uniflores; les calices velus, fort petits, obtus. La corolle ne m'est pas connue. Les capsules sont ovales, obtuses, presque tronquées à leur sommet, pubescentes, à cinq faces peu marquées.

Cette plante croît dans les Indes; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (P. f.)

Nota. Il est possible que cette espèce appartienne aux *azalea*, n'ayant pas pu observer avec exactitude le nombre des étamines.

ROSAGES (Les). *Rhododendra*. Famille de plantes ainsi nommée, parce qu'elle renferme plusieurs genres qui ont beaucoup de rapports avec celui des rosages (*rhododendron*), qui y est compris.

Les plantes qui composent cette famille sont des arbrisseaux ou arbrutes dont les feuilles sont simples, alternes, quelquefois opposées, roulées sur elles-mêmes avant leur développement dans un grand nombre.

Le calice est persistant, à plusieurs divisions. La corolle insérée au fond du calice, monopétale & lobée, ou presque polyptéale par les divisions très-profondes de son limbe. Les étamines sont séparées, en nombre défini, insérées sur la corolle quand celle-ci est monopétale, ou attachées au fond du calice dans les corolles presque polyptéales. L'ovaire est supérieur, à plusieurs loges, à plusieurs valves, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate simple, quelquefois capité.

Le fruit est une capsule supérieure, à plusieurs loges, à plusieurs valves, chacune des valves repliée intérieurement sur ses bords, formant autant de loges dans lesquelles sont renfermées plusieurs

semences attachées à un réceptacle central. Ces semences sont très petites.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont :

1. Corolle monopétale.

Les kalmies. .... *Kalmia*.  
Les rosages. .... *Rhododendron*.  
Les azalées. .... *Azalea*.

2. Corolle presque polyptéale.

Les rhodores. .... *Rhodora*.  
Les lèdes. .... *Ledum*.  
Les bésares. .... *Besleria*.  
Les itées. .... *Itea*.

ROSEAU. *Arundo*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *saccharum*, & qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les chaumes sont la plupart fort élevés, épais; les feuilles larges; les fleurs disposées en une ample panicule munie de poils touffus.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice nu, bivalve, contenant une ou plusieurs fleurs environnées de poils à leur extérieur.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à une ou plusieurs fleurs, composé de deux valves nues, inégales, oblongues, aiguës, sans arête.

2°. Une corolle composée de deux valves, de la longueur de celles du calice, oblongues, acuminées, environnées à leur base de poils nombreux, au moins aussi longs que les fleurs.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, surmontés d'anthères bifides à leurs deux extrémités.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, muni de deux styles capillaires, velus, réfléchis, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en une seule semence oblongue, acuminée, enveloppée par les valves adhérentes de la corolle, & garnie de longs poils à sa base.

Observations. Ce genre, qui paroît d'abord très-facile à distinguer tant par les poils qui enveloppent à la base les valves de la corolle, que par le port de la plupart des espèces, offre ensuite de grandes difficultés lorsqu'il s'agit d'y rapporter des espèces qui diffèrent des autres, les unes par les proportions de la grandeur de quelques-unes de



leurs parties, les autres par le nombre des fleurs de chaque épillet.

Il est bien certain que le type de ce genre a été l'*Arundo donax*, *phragmites*, &c. dont les calices sont multiflores, & les poils des fleurs longs & abondans : il s'est ensuite présenté quelques autres espèces à une, deux ou trois fleurs, & dont les poils étoient moins longs. Il n'y avoit point de raison suffisante pour les séparer des *arundo*. 1°. Le nombre des fleurs n'offroit point un caractère assez constant, puisqu'elles varient dans les espèces citées plus haut ; qu'il n'y a très-souvent que deux à trois fleurs à chaque épillet dans l'*arundo phragmites*, &c. 2°. La longueur ou la brièveté des poils ne pouvoit pas non plus fournir un caractère générique. D'ailleurs, la plupart de ces espèces avoient le port des autres roseaux, des chaumes élevés, de larges feuilles, une ample panicule, &c.

Enfin il s'est présenté des espèces beaucoup plus petites, qui avoient presque le port des *agrostis* ; de fort petites fleurs, qui en effet le rapportoient à ce genre lorsque leur calice étoit uniflore, ou bien à celui des *aira* lorsqu'il étoit biflore, mais qui s'en distinguoient par les poils de la corolle plus ou moins longs.

Il s'élève ici une nouvelle difficulté. Nous trouvons dans les *aira*, les *agrostis* & même dans les *poa* plusieurs espèces également munies de poils à la base extérieure de leur calice. Ces poils, si est vrai, sont très-courts : ce n'est qu'un léger duvet, qui n'est souvent visible qu'à la loupe. Il n'en est pas moins vrai qu'alors la différence entre ces genres, toutes choses égales d'ailleurs, n'existe pour plusieurs espèces que dans la longueur respective de ces poils.

Quelques auteurs ont établi le genre *calamagrostis* intermédiaire entre les *arundo* & les *agrostis*, & qui a reçu quelques-unes de ces espèces. Malgré cela il reste encore bien des difficultés, & il faudroit peut-être un autre genre pour y placer les espèces biflores, & qui seroit mitoyen entre les *arundo* & les *aira* ; d'un autre côté, j'ai dit plus haut que plusieurs espèces varioient de deux à cinq fleurs.

Linné & d'autres auteurs après lui avoient rangé le bambou parmi les *arundo* ; mais il a été reconnu depuis que cette belle graminée devoit former un genre à part, ayant six étamines. MM. Jussieu & Lamarck en ont fait le genre *nostus* ; Retzius, celui de *bambos* ; Schreiber & Willdenow, celui de *bambusa*.

Il étoit assez convenable d'adopter, pour le nom français de ce genre, celui de *bambou* ; mais ne pouvant plus y revenir, & pour ne pas laisser en arrière un genre aussi intéressant, nous le dédions à l'article VOULOU, mot également em-

ployé pour désigner une espèce de bambou qui croit en Amérique. D'ailleurs, le nom de *bambou* est lui-même une expression très-générale, qui s'applique à plusieurs plantes certainement de genres différens, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre en lisant dans Rumphius & dans Rheed les descriptions que ces deux auteurs ont données de diverses plantes qui portent le nom de *bambou*. (Voyez VOULOU.)

## E S P È C E S.

1. ROSEAU à quenouille. *Arundo donax*. Linn.

*Arundo calicibus subquinqüefloris, longitudine fasciculorum ; panicula oblonga, diffusâ, luteo-purpurascente.* Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 196. n°. 1084.

*Arundo calicibus quinqüefloris, panicula diffusâ, culmo fruticoso.* Linn. Syst. vi. get. 106.

*Arundo calicibus trifloris, panicula diffusâ.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 120. — Roy. Lugd. Bat. 66. — Mill. Dict. n°. 2. — Scop. Carn. 2. n°. 127. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 616. n°. 1183. V1. — Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 103. — Desfont. Flor. arant. vol. 1. pag. 106. — Gérard, Flor. gall.-prov. pag. 105. n°. 5.

*Arundo sativa.* Virid. Cliff. 7. — Hort. Cliff. 16.

*Arundo caule lignoso, geniculato ; foliis latissimis, locustis trifloris.* Haller, Helv. n°. 1516.

*Arundo sativa, qua donax Dioscoridis & Theophrasti.* C. Bauh. Pin. 17. — Theatr. 271. Icon. — Tournef. Inst. R. Herb. 526. — Scheuch. Gram. 159. tab. 3. fig. 14. a, b, c. — Mont. Prodr. 31. tab. A. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 5.

*Arundo domestica.* Matth. Comment. 137. Icon.

*Arundo maxima & hortensis.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 486.

*Arundo donax sativa, sive cypria.* Lobel, Icon. 51. — Idem, Observ. pag. 28. Icon. — Dodon. Pempt. 602. Icon.

*Arundo domestica.* Tabern. Icon. 253.

*Arundo palustris Matthioli.* Dalech. Hist. 1. pag. 1000. Icon.

3. *Arundo indica, leconica, versicolor.* Motif. Oxon. Hist. 3. pag. 219. §. 8. tab. 8. fig. 9.

*Arundo versicolor.* Miller, Dict. n°. 3.

Ce roseau est sans contredit un des plus beaux & des plus utiles que l'on connoisse. Il doit ce double avantage à la hauteur, à la dureté & à la légèreté de ses chaumes, ainsi qu'à la grandeur & à la couleur presque argentée de ses panicules.

Ses racines sont grosses, longues, charnues.

blanchâtres, très-épaisses : elles s'enfoncent assez profondément & s'étalent au loin ; elles ont une saveur agréable & douce, & poussent plusieurs tiges hautes de huit à neuf pieds, plus grosses que le pouce ; fortes, presque ligneuses, articulées, fistuleuses, très-lisses, d'un blanc jaunâtre, garnies de feuilles peu distantes, disposées sur deux rangs, très-longues, larges au moins de deux pouces ; d'une couleur glauque, très-lisses, striées, un peu réfléchies, planes, fermes, épaisses, point rudes à leurs bords. L'orifice de leur gaine est nu, marque souvent d'une tache rouilâtre : souvent ces feuilles sont agréablement panachées en rubans.

Les fleurs forment une ample & belle panicule terminale, droite, touffue, dont les ramifications, disposées par verticilles paniculées, sont rudes, verdâtres, anguleuses, ainsi que les rachis. Les fleurs sont très-nombreuses : leur calice contient de trois à cinq fleurs ; ses valves sont presque égales, allongées, aiguës, aussi longues que l'épillet ; celles de la cotolle velues, oblongues, acuminées.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, en Espagne, en Italie, sur les côtes de Barbarie, &c. (V. v.)

Ces roseaux, qui croît naturellement dans les contrées méridionales, se cultive dans plusieurs autres à raison des avantages qu'on en retire ; & quoiqu'il ne fleurisse point partout, il produit du moins, par ses drageons, des chumes très-forts, que l'on emploie à faire des treillages d'espaliers qui durent fort long-temps, ou des échafes pour enclore les champs. Ces roseaux sont encore d'un grand usage pour la pêche. En Guiane on les emploie pour lasser les toits, pour palissader & fermer les cases : les plus petits servent à faire des fêches.

Enfin ces roseaux fournissent particulièrement de fort jolies quenouilles, & des cannes aussi légères qu'élégantes, que l'on enjolie en les environnant avec des découpages de papier ou des feuilles de perli : on expose alors ces cannes à la fumée ; les parties découvertes se noircissent, les autres restent blanches. On en fait encore des étuis à cure-dents, des chalumeaux, des hanches de hautbois, de musette, & plusieurs autres petits instruments.

Ses racines sont douces, sucrées : on en mange les jeunes pousses ; elles passent pour diurétiques, & on attribue à toute la plante les mêmes vertus qu'au roseau à balais.

## 2. ROSEAU à balais. *Arundo phragmites*.

*Arundo calicibus subquingefloris, flosculis brevioribus ; paniculâ laxâ, spadicæo fuscâ.* Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 196. n°. 1083, tab. 46.

*Arundo calicibus quingefloris, paniculâ laxâ.* Linn.

Spec. Plant. vol. 1. pag. 120. — Roy. Lugd. Bat. 66. — Gronov. Virgin. 137. — Polich, Pal. n°. 127. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 125. — Leers, Herborn. n°. 94. tab. 7. fig. 1. — Hoffm. Germ. 40. — Roth. Germ. I. pag. 90. — Il. pag. 147. — Desfontaines, Flor. atlant. vol. 1. pag. 107. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 615. n°. 1183, V. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 103.

*Arundo paniculâ laxâ, flosculis quinis.* Flor. succ. 99. 105.

*Arundo foliis secantibus ; locustis trifloris, paggosis, muicis.* Haller, Helv. n°. 1515.

*Arundo vulgaris, five phragmites.* Dioscoridis. C. Bauh. Pin. 17. — Theatr. 269. Icon. — Tournef. Inst. R. Herb. 526. — Scheuz. Gram. 161. tab. 3. fig. 14. d. — Moët. Prodr. 32. tab. B.

*Arundo paniculâ laxâ, calicibus subbifloris.* Sauv. Monsp. 38.

*Harundo.* Trag. Hist. 674.

*Calamos, arundo vallatoria, five phragmites.* Lob. Icon. 51. — Idem, Obs. pag. 28. Icon. — Dalech. Hist. 1. pag. 1000. Icon.

*Arundo phragmites.* Dodon. Pempt. 602.

*Arundo palustris, canna sepiarid.* Tabern. Icon. 254.

*Arundo palustris.* Camet. Epitom. 73. Icon.

*Arundo vulgaris, palustris.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 485. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 218. §. 8. tab. 8. fig. 1.

*p. Arundo media, vulgaris ; foliis & culmo in summo fusiforme corpus componentibus.* Scheuz. Gram. pag. 162.

Cette plante a des racines longues, rampantes, d'où s'élèvent des tiges droites, fermes, d'un blanc verdâtre ; hautes de quatre à six pieds, garnies de feuilles très-longues, larges d'un pouce, d'un vert glauque ; striées & glabres à leurs deux faces, très-finement denticulées & coupantes à leurs bords ; munies, à l'ouverture de leur gaine, de poils longs, blancs & très-fins. Les jeunes tiges sont ordinairement terminées par une feuille non développée, toulée en forme de cône très-pointu.

Les fleurs forment une panicule ample, touffue, longue de huit à dix poices, droite ou un peu courbée, d'un bleu noirâtre, dont les ramifications sont filiformes, rudes, anguleuses, à plusieurs divisions ; le rachis également anguleux ; les épillets très-nombreux, presque filiformes, très-aigus. Le nombre des fleurs qui les composent, varie de trois à cinq ; les valves calicinales sont inégales, marquées de trois nervures, l'intérieure une fois plus longue que l'extérieure. La corolle

est enveloppée à sa base d'une touffe de poils d'un blanc griffâtre, aussi longue au moins que les valves, & qui n'est bien apparente qu'après la floraison.

Cette plante est très-commune sur les bords des rivières, des étangs, & dans tous les lieux aquatiques, en Europe, en Afrique, &c. (V. v.)

Les chaumes de cette plante sont employés pour couvrir les cabanes, & pour faire le fond des maisons en terre grasse. La panicule teint en vert. On s'en sert aussi pour faire des petits balais d'appartement. Ses racines sont douces & passent pour dépuratives, diurétiques, emménagogues. Les chèvres & les chevaux mangent les feuilles, que l'on peut substituer au foin dans les années sèches; elles forment aussi une bonne litière.

### 3. ROSEAU à fleurs de serouque. *Arundo setacea*.

*Arundo foliis asperis, striatis; floribus paniculatis; spiculis compressis, subquadrifloris; glumis mucronatis.* Desfont. Floer. atlant. vol. 1. pag. 108. tab. 34.

*Arundo (mauritanica), calicibus trifloris; panicula elongata; foliis angustis, involuto-juncis.* Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 105.

*Arundo (tenax), calicibus bifloris; panicula laxa; foliis involutis, subulatis.* Vahl. Symb. 2. pag. 25.

*Arundo (biflora), calicibus bifloris, spiculis brevioribus, panicula elongata, foliis asperis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1085.

*Gramen avenaceum, lignosum, silvaticum.* Tourn. Inst. R. Herb. 526. — Idem, Vaill. Herb. juxta Desfont.

C'est une fort belle espèce, dont les tiges sont dures, cylindriques, lisses, droites, hautes de trois à quatre pieds, articulées, garnies de feuilles dans presque toute leur longueur; les inférieures nombreuses, en gazon épais, presque aussi longues que les chaumes, larges d'environ un demi-pouce, très-fermes, glabres & striées à leur face extérieure, très-rudes & finement denticulées à leurs bords, roulées sur elles-mêmes en forme de jonc, subulées & très-aiguës à leur sommet; les feuilles supérieures sont plus longues que la panicule, munies à l'orifice de leur gaine d'une large membrane entière ou déchirée à ses bords.

Les fleurs sont disposées en une panicule ample, lâche, longue d'environ un pied, presque unilatérale. Le rachis est droit, rude, anguleux; les pédoncules presque verticillés, nombreux, inégaux, rudes, flexueux, filiformes, rameux vers leur sommet, un peu pendans; ils supportent des épillets assez semblables à ceux des fetuques, comprimés, très-aigus, pédiculés. Leur calice est composé de

deux valves inégales, concaves, coriaces, la plus longue très-acuminée; elles renferment depuis deux jusqu'à cinq fleurs, mais plus ordinairement il n'y en a que trois. Les valves de la corolle sont inégales; l'intérieure plus petite; l'extérieure en carene, zigzag, allongée, revêtue extérieurement d'une touffe de poils blanchâtres, très-fins, une fois plus courts que la corolle. Les semences sont oblongues, presque cylindriques.

J'ai recueilli cette plante sur les collines sablonneuses de la Barbarie, parmi les broussailles, dans le royaume d'Alger, dans les contrées habitées par les Zulmis. Elle a été également observée par MM. Desfontaines & Vahl. (V. v.)

Les Arabes se servent de ses feuilles pour faire des corbeilles & autres ouvrages en ce genre; ils en font aussi des cordes après les avoir fait macérer dans l'eau.

### 4. ROSEAU distique. *Arundo bifaria*. Retz.

*Arundo calmo erecto, foliis bifariis, panicula coarctata, calicibus trifloris.* Retz. Observe. 4. pag. 22. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 197. n°. 1090.

Ses chaumes sont droits, feuillés, de la grosseur du petit doigt; les feuilles rapprochées, disposées sur deux rangs opposés, planes, très-ouvertes, larges d'un pouce, longues de six à sept pouces.

Les fleurs forment une panicule droite & serrée: leur calice composé de deux valves aiguës, membraneuses, à trois nervures; la valve extérieure plus étroite, un peu plus longue, contenant trois fleurs dont la valve extérieure est allongée, presque aîlée, ventrue, lanugineuse à sa base; l'intérieure une fois plus courte, transparente, nue, échancrée. Les anthères sont jaunes; les stamens barbus, d'un vert d'azur; souvent la troisième fleur avorte.

Cette espèce croît dans les Indes orientales, sur le bord des étangs & des fosses humides. (Description, ex Retz.)

Les habitants du Malabar la nomment *nona coll*; ils s'en servent pour couvrir leurs cabanes.

### 5. ROSEAU à fleurs d'aira. *Arundo oïroïdes*.

*Arundo calicibus bifloris; panicula molli, subcoarctata, incurva; foliis planis, scobris.* (N.)

Ses chaumes sont droits, glabres, cylindriques, grêles, hauts de dix à douze pouces, garnis de feuilles planes, glabres, striées, larges d'une à deux lignes, rudes au toucher, presque aussi longues que les chaumes, munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane courte, rouffâtre.

La panicule est médiocrement serrée, molle, un peu courbée, longue de quatre à cinq pouces,

ayant ses ramifications presque verticillées, courtes, filiformes, un peu tudes, garnies d'épillets pédiculés, étroits, aigus. La bale calicinale est à deux valves inégales, glabres, étroites; l'extérieure très-aiguë, à deux fleurs; les valves de la corolle aussi longues que le calice, membraneuses, étroites, enveloppées par une petite touffe de poils du la même longueur que les valves.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, où elle a été recueillie par Michaux. (*V. f. in herb. Juss.*)

#### 6. ROSEAU du Bengale. *Arundo bengalensis*. Retz.

*Arundo calicibus bifloris, panicula erecta pedicellis trifloris*. Retz. Observ. v. pag. 20. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 455. n° 4.

Ses tiges sont hautes, épaisses, fistuleuses, garnies dans presque toute leur longueur de feuilles glabres, longues de deux pieds & plus, larges d'environ deux pouces.

Les fleurs sont disposées en une ample panicule droite, très-rameuse, longue de deux pieds; les pédoncules sont inégaux, à demi verticillés, rameux. Les épillets qui garnissent la partie inférieure de la panicule, sont situés trois ensemble à chaque ramification, un stérile, les deux autres pédiculés; les épillets supérieurs sont solitaires. Les valves calicinales sont inégales, subulées, nues, biflores. L'une de ces deux fleurs est stérile; l'autre un peu pédiculée, un peu plus longue que le calice; leurs valves sont linéaires, étroites, presque transparentes, marquées de trois nervures, & environnées à leur base d'une touffe de poils.

Cette plante croît au Bengale. (*Descript. ex Retz.*)

#### 7. ROSEAU vert jaunâtre. *Arundo viridi-flavescens*.

*Arundo calicibus subulatis; panicula longâ, cœcostata; spiculis acutis*. (N.)

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'un pied environ, un peu coudées à leur base; elles sont glabres, droites, fermes, grêles, cylindriques, garnies de feuilles presque planes, étroites, plus courtes que les chaumes, un peu tudes, glabres, fortement litées sur leur gaine, dont l'orifice est muni d'une petite membrane blanchâtre, courte, obtuse.

La panicule est longue de six à huit pouces, d'un vert jaunâtre, presque reserrée en épi, luisante. Les pédoncules sont capillaires, presque verticillés, un peu flexueux; les épillets nombreux, très-étroits; les calices à deux valves aiguës, inégales, renfermant une ou deux fleurs plus courtes que le

calice, revêtues en dehors d'un duvet fin, blanchâtre, plus court que les valves calicinales.

Cette plante croît à Monte-Video, où elle a été recueillie par Commerçon. (*V. f. in herb. Juss.*)

#### 8. ROSEAU à petites fleurs. *Arundo micrantha*. Lam.

*Arundo calicibus unifloris, acuminatis; panicula erecta, densa, flavescens; vaginis ore pilosis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 196. n° 1087.

*Arundo (mauritanica), culmo fruticoso, floribus paniculatis, calicibus uni ad trifloris, gluma exteriori subaristata*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 106. non *arundo mauritanica*. Poirer, Voyag.

*Arundo rheni bononiensis* Plin. Zan. Hist. 61. — Montg. Prod. 32. tab. D. F.

Ce roseau a des rapports avec l'*arundo donax* z il en diffère par ses tiges plus grêles, par les feuilles deux & trois fois plus étroites, & par les épillets bien plus petits.

Ses chaumes sont droits, lisses, articulés, durs, presque ligneux, garnis de feuilles glabres, litées, rapprochées entre elles, fort longues, roides, planes, aiguës, étroites, à peine denticulées sur leurs bords. Les panicules sont fort amples, longues, garnies de fleurs nombreuses. Les pédoncules sont anguleux, point rudes au toucher, verdâtres, flexueux, divisés en rameaux chargés de pédoncules partiels, filiformes, presque verticillés, redressés, ramifiés vers leur sommet, supportant des épillets, les uns pédiculés, d'autres sessiles, très-grêles, subulés, fort aigus; les deux valves calicinales sont étroites, égales, plus longues que la corolle, aiguës, contenant d'une à trois fleurs. Les valves de la corolle sont minces, transparentes; l'extérieure un peu plus longue, acuminée ou terminée par une arête courte & droite.

Cette plante a été observée par M. Desfontaines dans le royaume d'Alger. Les Arabes s'en servent pour enclore leurs jardins. (*V. f. in herb. Desf.*)

#### 9. ROSEAU karka. *Arundo karka*. Retz.

*Arundo calicibus unifloris, nudis; infloresc. subulato, intus lanato, multo brevioribus; panicula secundâ, nutante*. Retz. Observ. 4. pag. 21. — Lam. Illustr. vol. 1. pag. 190. n° 1091.

Cette espèce a des chaumes fort élevés, fistuleux, un peu plus étroits que le petit doigt, garnis de feuilles très-longues, rudes au toucher, larges d'un travers de doigt.

La panicule est longue d'un pied au moins, reserrée, presque unilatérale, penchée, dont le rachis est sillonné & anguleux, les pédoncules à demi verticillés, alongés, point articulés, supportant à l'extrémité de leurs divisions des épillets épars,

donne les pédicules longs, capillaires, subulés. Le calice est unidore, linéaire, ayant les valves striées, nues, inégales, plus courtes que la balle de la corolle. Celle-ci est linéaire, subulée, une fois plus grande que le calice : les valves sont striées, presque égales, roulées sur elles-mêmes, environnées à leur base d'une touffe de poils de la longueur de la corolle.

On rencontre cette plante dans les Indes orientales. (*Descript. ex Retz.*)

Ses chaumes sont employés à la couverture des maisons par les Indiens. Ils jugent aussi de la direction des vents par celle des panicules de cette plante.

10. ROSEAU plumeux. *Arundo calamagrostis*. Linn.

*Arundo calicibus unifloris, glumis subulato-fetaceis; panicula oblonga, contracta, lobata, à virgâ nigrescente.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 196. n°. 1286.

*Arundo calicibus unifloris, levibus; corollis lanuginosis, culmo ramoso.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 121. — Flor. lap. 42. — Flor. suec. 100. 107. — Oeder. Flor. dan. tab. 280. — Pollich, Pall. n°. 128. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 126. — Pall. Iter 1. pag. 62. — Hoffm. Germ. 47. — Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 614. n°. 1183. 11.

*Arundo locustis unifloris, papposis, muticis; panicula alternè contracta.* Hall. Helv. n°. 1519.

*Calamagrostis lanceolata.* Roth. Germ. I. pag. 34. — Idem, 2. pag. 90.

*Gramen arundinaceum, panicula molli spadiceâ, majus.* C. Bauh. Pin. 7. — Theatr. 64. — Scheuch. Gram. 122. tab. 3. fig. 3. — Prodr. 21. tab. 5.

*Gramen plumosum Lobellii, spicâ candidâ & serici modo lucens.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 476. Icon.

*Gramen paniculatum, arundinaceum; panicula densâ, spadiceâ.* Tourn. Inst. R. Herb. 523.

*Gramen tomentosum & acerosum, calamagrostis quorundam, & vulgi gramen plumosum.* Lobel, Icon. 6.

Ses racines se divisent en fibres menues, rameuses & blanchâtres : ils s'en élève plusieurs tiges droites, médiocres, lisses, articulées, hautes de trois à quatre pieds, quelquefois rameuses à leur base, garnies de feuilles longues, étroites, larges de deux à trois lignes, glabres à leurs deux faces, sèches, rouges lorsqu'on les glisse entre les doigts, planes, presques d'un vert glauque, finement striées, particulièrement à leur face inférieure ; munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane un peu roussâtre, entière ou laciniée.

La panicule est droite, alongée, étroite, ressemblant, longue de six à dix pouces, interrompue,

composée de rameaux disposés presque latéralement par verticilles. Les rachis sont un peu flexueux, rudes, anguleux ; les fleurs, panachées dans leur jeunesse de vert & d'un violet noirâtre, acquièrent en vieillissant une couleur jaunâtre. Les épillets sont fort étroits, aigus, à une seule fleur. Les poils abondans qui garnissent extérieurement la corolle après la floraison, sont à peine sensibles avant cette époque.

Cette plante croît dans les bois, dans les prés humides & ombragés, en Europe, en Sibérie. & (V. v.)

Cette graminée passe pour un très-bon pâturage dans les terrains un peu humides. Les vaches & les chèvres la mangent.

11. ROSEAU des bois. *Arundo epigejos*. Linn.

*Arundo calicibus unifloris, panicula erectâ, foliis subius glabris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 120. — Hoffm. Germ. 40. — Scopol. Carn. 87. — Gérard, Flor. gall.-prov. pag. 104. n°. 2.

*Arundo panicula coarctatâ, erectâ, integrâ; foliis inferius glabris.* Flor. suec. 101. 106.

*Arundo locustis unifloris, sericeis, muticis; panicula stridâ.* Haller, Helv. n°. 1520.

*Gramen arundinaceum, paniculatum, montanum; panicula spadiceo-viridi, semine papposo.* Scheuch, Gram. 124.

*Calamagrostis epigejos.* Roth. Germ. I. pag. 34. — Idem, 2. pag. 91.

*Arundo calamagrostis, (var. β minor).* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1086. — Idem, Flor. franç. vol. 3. pag. 614. n°. 1183. 11.

A peine cette espèce est-elle distinguée de l'*arundo calamagrostis*, dont elle ne paroît être qu'une simple variété; aussi quelques botanistes, particulièrement M. Lamarck, l'ont regardée comme telle. Elle offre cependant quelques différences qui confirment, si toutefois elles sont constantes, l'opinion de ceux qui en ont formé une espèce. Ces différences consistent dans ses tiges plus basses, dans ses feuilles un peu velues à leur face supérieure, enfin dans la panicule moins interrompue que celle de l'*arundo calamagrostis*.

Ses racines sont fibreuses, & produisent des tiges droites, simples, hautes d'un pied & demi ou deux pieds au plus, articulées, glabres, garnies de feuilles planes, longues, étroites, striées & glabres à leur face inférieure, légèrement velues à leur face supérieure. Les panicules sont étroites, presque en forme d'épi, droites, point interrompues, composées de verticilles dont les rameaux sont inégaux, capillaires, presque unilatéraux. Les épillets sont très-aigus, uniflores, verdâtres

verdâtres dans leur jeunesse, d'un jaune laisfant & foyeux après la floraison.

Cette plante croit dans les bois & sur les collines arides de l'Europe.  $\gamma$  (V. v.)

12. ROSEAU des sables. *Arundo arenaria*. Linn.

*Arundo callicibus unifloris; panicula spicata; foliis erectis, glaucis, involutis, mucronato-pungentibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 196. n°. 1089.

*Arundo callicibus unifloris; foliis involutis, mucronato-pungentibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 121. — Eder. Flor. dan. tab. 917. — Viborg. Plant. Aren. 4. tab. 1. — Hoffm. Germ. 41. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 104. — Gerard. Flor. gall.-prov. pag. 104. n°. 1. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 615. n°. 1183. III. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 106.

*Gramen spicatum secalinum, maritimum, maximum; spica longior*. Tourn. Inst. R. Herb. 118. — Scheuch. Gram. 138. tab. 3. fig. 8. A. B. C.

*Gramen spartum, spicatum; foliis mucronatis, longioribus, vel spica feculind.* C. Bauh. Pin. 5. — Theatr. 67. Icon.

*Spartum herba; maritimum*. Clus. Hist. 2. pag. 221. Icon.

*Spartum spicatum, pungens oceanicum*. J. Bauh. Hilt. 2. pag. 511. Icon.

*Gramen spartum, junceifolium, non aristatum; spica feculind.* Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 180. 11. 8. tab. 4. fig. 16. Bona.

*Spartum nostras & spartum tertium Clusii*. Lobel, Icon. 89. — Idem, Observ. 45. Icon.

*Spartum tertium Clusii*. Dalech. Hist. 1. pag. 178. Icon.

*Calamagrostis arenaria*. Roth. Germ. vol. 1. 34. vol. 2. 93.

*Arundo foliorum lateribus convolutis, acuminis pungentis*. Linn. Flor. lapon. 43. Flor. fucc. 102. 108. — Iter, Scan. 336.

Ses racines sont très-longues, rampantes, géniculées; elles poussent des tiges droites, simples, cylindriques, hautes de trois à quatre pieds, dures, articulées à des distances éloignées, garnies à leur base de feuilles nombreuses, presque fasciculées, d'un vert glauque ou blanchâtre, roides, striées, très-longues, roulées à leurs bords en feuilles de jonc, très-aiguës, piquantes, munies à l'orifice de leurs gaines d'une membrane assez longue, entière ou bifide.

Les fleurs forment une panicule terminale, qui se présente extérieurement sous la forme d'un épi cylindrique, très-ferré, long de huit à dix pouces, composé de petits rameaux courts, appliqués contre

le rachis. Les valves calicinales sont unifoires, glabres, oblongues, presque égales, grandes, membraneuses à leurs bords; celles de la corolle aussi longues que le calice, enveloppées à leur base d'une touffe de poils de moitié plus courte que les valves; les semences sont grêles & allongées.

Cette plante croit dans le sable sur les côtes maritimes, en France, en Espagne, en Italie, sur les côtes de Barbarie. On la rencontre aussi en Amétique.  $\gamma$  (V. v.)

La propriété admirable de ce roseau, de pouvoir croître dans les sables les plus stériles, d'en fixer la mobilité par ses racines, devoit fixer l'attention des cultivateurs. En multipliant cette plante dans les terrains arides & sablonneux, on les convertirait, au bout d'un certain nombre d'années, en une terre ferme & solide. C'est un des grands moyens qu'emploie la nature pour fertiliser les contrées incultes & couvertes de sables; mais les yeux de la plupart des hommes sont fermés sur cette merveilleuse opération.

13. ROSEAU panaché. *Arundo bicolor*. Poir.

*Arundo panicula angusta, erecta; callicibus subunifloris; foliis glabris, convolutis*. Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 104.

*Arundo (bicolor), panicula coarctata, elongata; calice bifido; flosculo altero sterili, glumis subaristatis*. Leston. Flor. atlant. vol. 1. pag. 107. tab. 33.

*Arundo callicibus unifloris, ore scariosis; panicula angusta, erecta; foliis glabris, convolutis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 196. n°. 1088.

Ce roseau se distingue à ses panicules longues, serrées, panachées de vert, de blanc, & même un peu purpurines.

Ses racines sont dures, épaisses, presque ligneuses: il s'en élève des tiges droites, fermes, verdâtres, fistuleuses, articulées, noueuses à leur base, hautes d'environ deux pieds & demi, garnies de feuilles glabres, d'un vert glauque, striées, roides, denticulées & coupantes à leurs bords, roulées en forme de jonc, larges de deux à trois lignes, subulées, aiguës à leur sommet, munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane blanchâtre, entière ou déchirée.

Les panicules sont étroites, serrées, longues d'un pied; les pédoncules sont filiformes, droits, anguleux, rudes au toucher, ainsi que le rachis; à demi verticillés, inégaux, médiocrement ramifiés vers leur sommet; soutenant des épillets pédiculés, oblongs, cylindriques, aigus, de couleur violette, verdâtre, purpurine; panachés de blanc. Les valves calicinales sont glabres, presque égales, canaliculées, membraneuses, blanchâtres à leurs bords, très-aiguës & même terminées par

une arête courte, de la longueur de la corolle, contenant deux fleurs, dont les valves ressemblent à celles du calice; environnées à leur base de poils courts: souvent l'une de ces deux fleurs avorte.

J'ai trouvé cette plante dans la Barbarie, proche la Calle, sur des collines sablonneuses & couvertes de broussailles. (V. v.)

14. ROSEAU à panicule roide. *Arundo stricta*. Roth.

*Arundo calicibus unifloris; petalis lanceolatis, glabris, exterioris; aristâ dorsali erectâ & panicula coarctata, spiciformi; calmo simpliciter.* Timm. in literis. — Roth. Nev. Beytr. pag. 118. n°. 50.

Cette espèce tient presque le milieu entre l'*Arundo epigeios* & l'*Arundo calamagrostis*. Elle diffère du premier par sa corolle aristée; du second, par ses chaumes simples, à panicule plus roide; par le pétale extérieur, aussi long que le calice, & par ses touffes de poils plus courtes.

Ses chaumes sont droits, simples, terminés par une panicule en forme d'épi, tres-fermé, roide, droite, garnie de fleurs dont les calices sont bivalves, uniflores; les valves de la corolle inégales, l'extérieure aussi longue que le calice, munie sur le dos d'une arête droite; la valve intérieure plus courte & mutique.

Cette plante croît en Allemagne, dans les environs de Meckelbourg. (Descript. ex Roth.)

15. ROSEAU du Canada. *Arundo canadensis*. Michx.

*Arundo culmis foliisque levibus, angustis; panicula oblonga; glumis puberulis, lanceolatis, unifloris; foris alterâ valvâ dorso aristatâ.* Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 73.

Cette espèce a le port de l'*Arundo calamagrostis*, mais plus petite; & quoiqu'elle lui ressemble par le plus grand nombre de ses caractères, elle en diffère néanmoins par l'arête placée sur le dos de la valve extérieure de la corolle.

Ses tiges sont droites, lisses, grêles, articulées, garnies de feuilles petites, glabres, étroites, striées, acuminées, bien plus courtes que les chaumes, munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane aiguë, lancéolée; les gaines courtes, glabres, un peu lâches. Les fleurs sont petites, disposées en une panicule oblongue, étalée, dont les rameaux sont presque verticillés, courts, rameux vers leur partie supérieure; les pédicules filiformes, flexueux, supportant des épillets légèrement pubescens; les valves calicinales lancéolées, étroites, aiguës, ne contenant qu'une seule fleur dont les valves sont inégales; l'une d'elles munie d'une arête sur le dos, enveloppées à leur base d'une touffe de poils courts, lanugineux.

Cette plante a été découverte par Michx. dans le Canada. (V. f. in herb. Jusieu.)

Observations. Je joins ici quelques autres espèces de roseau qui croissent au Chili, cités par Molina, mais sur lesquelles il nous donne peu de détails.

1°. Le ROSEAU rugi. *Arundo rugi*.

*Arundo calicibus trifloris; foliis subulatis, glabris.* Molin. Hist. du Chili, édit. franç. pag. 125. — Edit. ital. pag. 154.

Il est à peu près de la grosseur de notre roseau à balai, qui croît également au Chili. Ses feuilles sont subulées; ses calices renferment trois fleurs. Il se plaît particulièrement aux pieds des Andes, y parvient souvent à vingt pieds de hauteur, mais vers la mer il est beaucoup plus petit, & atteint à peine à douze pieds.

2°. Le ROSEAU quila. *Arundo quila*.

*Arundo calicibus trifloris; foliis ensiformibus, serratis.* Molin. Hist. Nat. du Chili, édit. franç. pag. 125. — Edit. ital. pag. 154.

Ses chaumes sont trois & quatre fois plus gros que ceux du roseau rugi: ses jets sont éloignés les uns des autres d'environ un pied; ils sont garnis de feuilles ensiformes, denticulées à leurs bords. Chaque balle calicinale contient trois fleurs.

3°. Le ROSEAU de Valdivia. *Arundo valdivia*.

*Arundo calicibus trifloris; foliis subulatis, pubescentibus.* Molin. Hist. Nat. du Chili, édit. franç. pag. 125. — Edit. ital. pag. 155.

Ce roseau porte dans le pays le nom de *valdivia*, parce qu'il croît dans les environs de cette ville. Les nœuds de ses chaumes sont couleur d'orange, très-rapprochés & se touchent presque; ils soutiennent des feuilles pubescentes, subulées, & les bales calicinales renferment trois fleurs.

Les paysans se servent de ce roseau pour faire des cages & autres petits ouvrages. On l'emploie encore pour les haies, & quelquefois pour couvrir les maisons. Lorsqu'il n'est pas trop exposé à l'humidité, il se conserve pendant assez long-temps. Les Araucques en font usage pour leurs lances.

\* Autres espèces moins connues.

\* *Arundo (conspicua), calicibus unifloris; panicula laxâ, erecto-patente; petali exterioris aristâ, reflexâ, longissimâ.* Forster, Prodr. n°. 48.

Espèce remarquable par une très-longue arête recourbée, qui termine la valve extérieure de la corolle. Les panicules sont lâches, droites, étalées. Les calices à une seule fleur.

\* *Arundo* (gigantea), *calicibus quinque ad decem foris*; *panicula laxa, foliis saepe setosis*. Walter, Flor. carolin. pag. 81.

\* *Arundo* (tecta), *culmis testis, stipulis intermedia persantibus, foliis saepe setosis*. Flor. carolin. pag. 81.

**ROSIFER. Rosa.** Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des rosacées, qui a des rapports avec les *forbas*, & qui comprend des arbrisseaux, les uns exotiques, les autres indigènes de l'Europe, dont les tiges sont très-souvent armées d'aiguillons, les feuilles ailées avec une impaire, munies de grandes stipules à leur base; les fleurs solitaires ou en corymbe, la plupart grandes, belles, d'une odeur très-agréable.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice charnu, persistant, rétréci à son orifice, divisé en cinq découpures souvent pinnatifides; cinq pétales insérés sur le calice; des étamines nombreuses; des semences nombreuses, hispides, renfermées dans le calice converti en baie.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, dont le tube venu se rétrécit à son orifice, & se divise alors en cinq découpures concaves, longues, étroites, lancéolées, dont, dans quelques espèces, deux découpures alternes sont appendiculées à leur base, de chaque côté; deux autres alternes, sans appendices; la cinquième appendiculée d'un seul côté; quelquefois les découpures alternes, pinnatifides.

2°. Une *corolle* composée de cinq pétales en cœur renversés, de la longueur du calice, insérés à son orifice.

3°. Un très-grand nombre d'*étamines*, dont les filaments sont très-courts, capillaires, terminés par des anthères à trois fices.

4°. Des *ovaires* nombreux, situés dans le fond du calice, surmontés d'autant de styles très-courts, velus, rétrécis à l'orifice du calice, attachés au côté de l'ovaire, terminés par des stigmates obtus.

Le *fruit* est une baie charnue, turbinée, colorée, molle, à une seule loge, couronnée par les restes des découpures du calice, dont le tube s'est converti en une enveloppe fucculente.

Les semences sont nombreuses, oblongues, hispides, attachées aux parois internes du calice.

*Observations.* Les roses, l'une des productions les plus brillantes du règne végétal, chantées par les poètes de toutes les nations, de tous les âges,

cueillies par les mains de la beauté, dont elle est l'emblème, sont produites par des arbrisseaux, la plupart hérissés d'épines ou d'aiguillons; ils constituent un genre nombreux, dans lequel il est très-difficile de tracer la limite des espèces. La culture, qui s'est emparée avec empressement de cette belle fleur, y a opéré de si nombreuses variétés, qui, dans le passage de l'une à l'autre, se rapprochent par des nuances si insensibles, qu'il est presque impossible de leur assigner des caractères constants. Ces plantes ont d'ailleurs reçu de la Nature une telle facilité pour se prêter aux soins de la culture & pour affecter des formes, des couleurs si variées, que les individus qui naissent naturellement dans les champs, sont eux-mêmes sujets à beaucoup de mutations dépendantes du sol, de l'exposition, &c.

Ce n'est pas seulement en doublant les pétales de leurs fleurs que ces plantes varient; elles affectent encore beaucoup d'autres changements dans la forme, la disposition, l'élevation de leurs tiges, de leurs rameaux; dans la grandeur de leurs feuilles, dans le nombre & la position de leurs aiguillons, tellement qu'il se traduit rigoureusement à un petit nombre d'espèces bien distinctes, qui sont le type des nombreuses variétés obtenues par la culture, & même de celles qui existent dans la Nature. Mais si l'on s'agit de rapporter ces variétés aux espèces qui les ont produites, la difficulté est encore plus grande.

On s'est attaché, pour pénétrer dans ce labyrinthe, à saisir les caractères les moins variables. On a cru les reconnoître particulièrement, 1°. dans la disposition & la forme des aiguillons, qui tantôt recouvrent toutes les parties de ces arbrisseaux, tantôt ne se montrent constamment que sur quelques-unes; 2°. dans les poils roides, glanduleux; dans leur absence totale ou partielle; 3°. dans la forme des ovaires globuleux ou ovales. Ce dernier caractère, dont Linné a fait une grande division, est très-peu constant, & ne peut qu'induire en erreur & embarrasser singulièrement tous ceux qui n'ont pas fait une étude particulière de ce genre. Dans un grand nombre d'individus, ces ovaires varient de forme selon leur âge, & souvent selon les individus. D'ailleurs, cette division éloigne les unes des autres des espèces très-rapprochées, & qui pourroient même n'être regardées que comme variétés. Nous n'avons pu admettre cette division, qui nous a en conséquence paru contredire le rapport naturel des espèces.

Nous devons remarquer que la partie à laquelle Linné a donné le nom d'*ovaire*, est la base concave, tubulée du calice, qui renferme en grand nombre les véritables ovaires. Nous n'avons conservé cette dénomination dans la description des espèces, que pour ne point être en opposition



avec le plus grand nombre des botanistes, qui ont employé l'expression d'*ovaire* dans le sens adopté par Linné.

## E S P È C E S.

1. ROSIER à feuilles simples. *Rosa simplicifolia*.

*Rosa foliis simplicibus, subsessilibus; pedunculis aculeatis, germinibus globosis; aculeis caulinis, subgeminatis, recurvis.* (N.) — Judieu, Plant. Genér. pag. 452. Append.

*Rosa (berberifolia), germinibus globosis pedunculisque aculeatis; caule aculeis subgeminatis, uncinatis; foliis simplicibus, subsessilibus.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1063. n°. 1.

*Rosa (berberifolia), spinis recurvatis; foliis simplicibus, sessilibus, spina gemina interjectis.* Pall. Nov. Act. Petrop. 10. pag. 379. tab. 10. fig. 5.

*Rosa (simplicifolia), foliis simplicibus.* Salisb. Prod. Stirp. Hort. ad Chappel Ailerton. pag. 359.

Parmi les espèces nombreuses de ce genre, il n'en est aucune plus remarquable que celle-ci, par ses feuilles simples, presque sessiles.

Ses rameaux sont diffus, pubescens, munis de forts aiguillons courbés en forme d'hameçon, réunis presque deux à deux à la base des pétioles ou à l'insertion des jeunes rameaux. Les feuilles sont alternes, à peine pétiolées, très-simples; assez semblables, pour la forme & la grandeur, à celles de l'épine-vinette; ovales, vertes, un peu glauques, dentées à leur contour.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des jeunes rameaux, supportées par des pédoncules courts, simples, pubescens, chargés de quelques aiguillons. Le calice à toutes ses divisions simples, nues, lancéolées, acuminées. La corolle est composée de cinq pétales ovales, de couleur jaune, marqués ordinairement d'une tache d'un rouge vif à leur base : les fruits sont globuleux, armés de nombreux aiguillons.

Cette singulière espèce croît dans les contrées septentrionales de la Perse, où elle a été découverte par Michaux. (V. f.)

2. ROSIER à cent feuilles. *Rosa centifolia*. Linn.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispida; caule hispido, aculeato; petalis inermibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Mater. med. pag. 128. — Miller, Dict. n°. 14. — Kniph. Centur. 1. n°. 75. — Knorr. Del. 1. tab. R. — Regnault, Botan. Icon. — Willd. Arb. 315. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1071. n°. 15.

*Rosa caule aculeato, pedunculis hispida; calicibus semipinnatis, glabris.* Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 91.

*Rosa calicibus semipinnatis, germinibus ovatis pedunculisque hispida; caule hispido, aculeato; petalis glandulosis, foliolis ovatis, serratis, subulis pilosis.* Duroi, Haubk. 2. pag. 367.

*Rosa multiplex, media.* Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. — Duham. Arb. vol. 2. n°. 15.

*Rosa centifolia, batavica, altera.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 38.

*Rosa centifolia, batavica, secunda.* Clus. Hist. 1. pag. 114.

3. *Rosa maxima, multiplex.* Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 481.

*Rosa hollandica, rubella, plena, quibusdam centifolia, spinoso frutice.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 37. 1c.

*Rosa centifolia, batavica.* Clus. Hist. 113.

*Rosa maxima.* Hort. Paris.

Vulgairement rose de Hollande.

4. *Rosa (belgica), caule aculeato, foliis subulis hispida; calicibus semipinnatis, villosis.* Mill. Dict. n°. 17.

*Rosa belgica sive vitrea, flore rubicante.* Rea. Flor.

5. *Rosa foliolis subrotundis, crenatis.* (N.)

6. *Rosa foliis bipinnatis, foliolis subrotundis, crenatis.*

7. *Rosa (bifeta), foliis subpubescentibus, floribus rubris & albis; germinibus infundibuliformibus.* (N.)

Vulgairement rosier de tous les mois.

8. *Rosa (caryophylla), petalis minoribus, longe unguiculatis; apice crenato-dissiduis.* (N.)

Ce rosier est un des plus connus & des plus généralement cultivés : c'est lui qui fournit ces belles roses remarquables par leur forme arrondie & globuleuse, par le grand nombre de leurs pétales, par le parfum exquis qu'elles répandent, & par cette teinte légère de rouge qui réjouit l'œil sans le fatiguer. Le type de ce rosier, dont les variétés sont innombrables, est à peine connu. Comme les fleurs sont constamment stériles par la transformation des organes de la fructification en pétales, on ne la connoît point dans son état naturel : j'en ai cependant vu un individu à fleurs simples chez M. Dupont, que ce savant & habile cultivateur de rosiers avoit obtenu de semences fournies par un rosier à feuilles semi-doubles : il n'offroit d'autre différence avec ceux à fleurs doubles, que dans ses pétales, réduits au nombre de cinq. C'étoit d'ailleurs la même forme, la même couleur, les mêmes caractères dans les autres parties. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce rosier ne s'est

pas encore retrouvé dans la Nature, du moins à ma connoissance, & malgré les recherches de tous les botanistes.

Il me paroît très-probable qu'il doit son existence à une des espèces sauvages que nous connoissons, & quoique le rosier à fleurs simples dont je viens de parler, ne puisse se rapporter à aucune d'elles, il est à croire que, malgré sa simplicité, il a conservé les nuances de notre rosier cultivé. L'espèce dont il se rapproche le plus est le *rosa gallica*, qui en est peut-être le type primitif.

Le rosier à cent feuilles, ainsi nommé à cause du grand nombre de ses pétales, est un arbrisseau assez fort, plus ou moins élevé, dont les tiges se divisent en rameaux nombreux, verdâtres; hérissées de poils toides, un peu glanduleux, & d'aiguillons très-aigus, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de sept ou cinq folioles assez grandes, ovales, obtuses, d'un vert foncé à leur face supérieure, plus pâles, presque blanchâtres, glabres ou légèrement pubescentes en dessous, à nervures rameuses, fortement crénelées à leurs bords; les crénelures terminées par une petite pointe aiguë, presque piquante. Les pétioles sont hispides, rudes, glanduleux, dépourvus d'aiguillons, munis à leur base d'une aile en forme de stipule, longue, chargée, bise à son sommet, finement denticulée à ses bords.

Les fleurs sont presque terminales, ordinairement rapprochées & un peu fasciculées, presque en ombelle, supportées par des pétiololes cylindriques, très-hérissées, ainsi que les ovaires. La corolle est d'un rouge-tendre, blanche dans plusieurs variétés; les pétales concaves, presque arrondies, légèrement échancrées à leur sommet, d'un blanc-jaunâtre à leur ongle; les ovaires ovales, épais; les calices rudes, à cinq découpures concaves, vertes en dehors, blanchâtres en dedans, dont trois pinnatifides, foliacées; deux alternes, entières, terminées par un prolongement étroit, linéaire.

La rose de Hollande, *β*, ne me paroît être qu'une variété de cette même plante: ses folioles sont moins amples, plutôt dentées en scie que crénelées, à crénelures bien moins profondes; les ovaires gros & coniques; les fleurs d'un rouge moins clair. Les autres caractères sont communs aux deux plantes.

Dans la variété *γ*, connue sous le nom de *rose belgeque*, les feuilles sont velues en dessous, légèrement dentées en scie à leurs bords; les pédonculaires & les calices velus, sans aiguillons; les ovaires gros, ovales; les fleurs très-peu odorantes, d'une couleur de chair pâle, ou d'un rouge un peu foncé.

La variété *δ* est remarquable par ses folioles plus petites, presque arrondies, fortement cré-

lées; elle produit assez évidemment une autre variété encore plus remarquable, *ε*, dont les feuilles sont deux fois ailées, composées de folioles également arrondies, obtuses. J'ai vu ces deux dernières variétés dans le jardin de M. Dupont.

La plante *ζ*, connue sous le nom de *rosier de tous les mois*, parce qu'elle fleurit deux fois l'année, au printemps & vers l'automne, & que ses fleurs, en se succédant, laissent peu d'intervalle entre ces deux floraisons, doit être également considérée comme une variété du *rosa centifolia*; cependant cet arbrisseau a un port qui lui est particulier; il forme presque toujours un buisson touffu; ses rameaux sont diffus, presque tortueux; les feuilles pubescentes, à crénelures plus fines; les ovaires sont très-longs, & ont presque la forme d'un entonnoir: il offre d'ailleurs tous les autres caractères de la rose à cent feuilles. C'est le type d'un très-grand nombre de variétés, remarquables en ce qu'elles conservent également l'avantage de fleurir deux fois l'année. Les fleurs sont rouges, d'un rouge tendre, d'un blanc lavé de rouge ou tout-à-fait blanche, d'une odeur très-agréable.

La variété *η* est fort singulière, & mérite d'être remarquée; elle s'élève peu: ses fleurs sont petites, au moins de moitié moins grandes que celles du rosier à cent feuilles. Les pétales approchent de ceux de l'œillet; ils sont petits, très-étroits, longuement onguiculés à leur base, élargis à leur partie supérieure, incisés, crénelés à leur sommet, d'ailleurs très-irréguliers entr'eux. Ces fleurs participent encore à l'odeur suave de l'œillet. M. Dupont cultive cette jolie variété.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les variétés infinies du rosier à cent feuilles, qu'il seroit difficile de bien caractériser, & dont les nuances insensibles se perdent les unes dans les autres.

Le lieu natal de ce beau rosier nous est encore inconnu. Quelques naturalistes le soupçonnent originaire de la Perse ou de quelque autre contrée de l'Asie; mais il n'y a pas encore été découvert. *Th* (*P. v.*)

Ses fleurs sont employées aux mêmes usages que celles du *rosa gallica*.

### 3. ROSEA DE PROVINS. *Rosa gallica*.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque hispidis; caule petiolisque hispidis, aculeatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Cmel. Tab. pag. 148. — Blackw. tab. 82. — Régn. Botan. Icon. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 218. — Il. 359. — Willd. Arb. 315. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1071. n°. 16. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 130. n°. 750. X.

*Rosa (gallica), caule subinermi; foliis quinis*

*subtus villosis; calicis foliolis indivisis.* Mill. Dict. n°. 20.

*Rosa calicibus semipinnatis; germinibus ovatis pedunculisque hispida; petiolisque hispidis-aculeatis; foliis ovatis; subtus villosis.* DuRoi, Harbk. 2. pag. 363.

*Rosa (austriaca), germinibus ovatis pedunculisque hispida; petiolis mediisque caule aculeatis.* Crantz. Austr. pag. 86.

*Rosa rubra, simplex.* Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 481.

*Rosa rubra, flore simplicis ferè.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 34. Icon.

a. *Rosa (provincialis), germinibus subrotundis; pedunculis petiolisque hispidis; aculeis ramorum sparsis, subreflexis; foliis ovatis, subtus villosis; serratis glandulosis.* Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 204. — Willd. Arb. 314. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1070. n°. 14.

*Rosa (provincialis), calicibus semipinnatis, germinibus globosis; pedunculis petiolisque hispidis; foliis ovato-acuminatis, subtus villosis; serratis glandulosis.* Duhartk. 2. pag. 349.

*Rosa provincialis major, flore pleno, ruberrimo.* Bozih, Ind. Afr. 2. pag. 252.

*Rosa rubra multiplex.* Tourn. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 481.

*Rosa milesa, flore rubro, pleno.* Eyfeler.

*Rosa (provincialis), caule petiolisque aculeatis; foliis subtus villosis, calicibus semipinnatis, hispida.* Miller, Dict. n°. 18.

*Rosa rubra, flore valde pleno & semipleno.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 34. Icon.

*Rosa saturnia rubens.* C. Bauh. Pin. 481. — Tourn. Inst. 637.

b. *Rosa gallica (vericolor).*

*Rosa vericolor.* Tourn. Inst. R. Herb. — C. Bauh. Pin. 481.

*Rosa praeefina, variegata, plena.* Miller, Icon. tab. 221. fig. 2.

*Rosa praeefina, alba & vericolor.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 37.

*Rosa vericolor.* Clus. Hist. 114. Icon.

*Rosa rubra, pallidior.* C. Bauh. Pin. 481. — Tournef. Inst. R. Herb. 637.

*Rosa holosericea?* Lob. 2. Icon. 207.

γ. *Rosa remota.* Hort. Paris.

*Rosa (provincialis), foliis floribusque duplo minoribus.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1071. n°. 14. Var. β.

*Rosa provincialis, varietas.* Curt. Mag. 407.

Vulgairement rose de Champagne.

δ. *Rosa (pumila), germinibus ovatis pedunculisque hispida; petiolis cauleque aculeato; foliis subtus glauca, serratis glandulosis, fructibus pyriformibus.* Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206.

*Rosa germinibus ovatis, petiolis pedunculisque hispida; caule superne aculeatissimo.* Linn. f. Suppl. 262. — Jacq. Austr. 2. pag. 59. tab. 198. — All. Pedem. n°. 1802.

*Rosa V I pumila.* Clus. Hist. 1. pag. 117.

*Rosa pumila pannonica, flore rubella.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 35. Icon.

*Rosa silvestris, pumila, rubens.* Tournef. Inst. R. Herb. 638.

ι. *Rosa burgundica.* Hort. Paris. — Dutand, Flot. de Bourg. vol. 1. pag. 196. n°. 497.

*Rosa pumila, foliis pubescentibus; floribus planis, rubro, albo variegatis.* (N.)

*Rosa (parvifolia), germinibus ovatis, subglabris; pedunculis glandulosis; petiolis cauleque tenuissimè aculeatis; foliolis rugosis, glandulosis, subtus villosis; ovatis, glandulosis ferratis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1078. n°. 33.

*Rosa (parvifolia), aculeis rectis, minutis; foliis rugosis, glandulosis, junctis villosis; petiolis aculeatis, pedunculis glandulosis, calicis tubo ovato medio sculo.* Ehrh. Beitr. 6. pag. 97.

Vulgairement roset de Bourgogne, roses pompons.

La culture a tellement varié cette espèce, originaire d'Europe, qu'il est très-difficile de la suivre dans ses nombreuses variétés, & de ne pas en regarder quelques-unes comme des espèces distinctes, quoique peut-être elles lui doivent leur origine. J'ai essayé d'y rapporter plusieurs roses regardées comme différens, & qui me paroissent avoir conservé, sous leurs formes variables, les principaux caractères de l'espèce primitive, qui pourroit bien elle-même n'être qu'une variété du *rosa centifolia*, de laquelle elle se rapproche beaucoup, & dont nous ne connoissons pas l'origine ni le lieu natal.

Celle-ci se distingue par ses folioles plus ou moins velues ou pubescentes, surtout vers les bords, & dont les crénelures sont ordinairement glanduleuses; par ses tiges munies d'aiguillons; par ses pedoncules hérissés, un peu glanduleux, & chargés plus ou moins d'aiguillons fins, & ainsi que les petioles.

La plante α, qui renferme dans ses variétés les roses connues sous le nom de roses de Provins, a des tiges vertes ou un peu rougeâtres, rameuses, diffusées, hautes de trois à quatre pieds, chargées

d'aiguillons épars, persistans ou caducs, plus ou moins nombreux, garnies de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de cinq ou sept folioles ovales ou un peu arrondies, surtout les intérieures; vertes, glabres à leur face supérieure, pubescentes ou légèrement tomenteuses ou presque glabres en dessous, nerveuses, velues sur leurs nervures, un peu ciliées ou lanugineuses à leurs bords, dentées en scie à leur contour; la plupart des dentelures glanduleuses; les glandes sessiles, supportées par des pétioles velus, munis de quelques aiguillons rares & de bractées élargies, denticulées.

Les fleurs sont solitaires, latérales ou terminales, soutenues par des pédoncules longs, plus ou moins hispides, glanduleux & munis d'aiguillons. Les calices sont presque glabres ou un peu glanduleux, à cinq découpures alternativement pinnatifides. La corolle est ample, d'un rouge-foncé, quelquefois tirant sur le brun; les pétales légèrement échanchés à leur sommet, un peu crénelés, d'une couleur plus claire vers leurs ongles; les pistils velus; l'ovaire ovale ou un peu arrondi, légèrement hispide.

Cette plante se multiplie aisément, & fournit ces belles variétés à fleurs doubles, très-odorantes, & dont les pétales, enveloppés l'un par l'autre, forment une tête épaisse, rousue, arrondie, d'un rouge-vif. Les ovaires sont plus arrondis que dans l'espèce simple; les feuilles plus amples, velues en dessous; les pétioles hispides, ainsi que les pédoncules.

Cette même plante prend dans la variété *γ* à fleurs simples ou doubles, une belle couleur panachée de rouge & de blanc, ou d'un rouge-pâle, ou d'un blanc tacheté de pourpre. Les tiges sont armées d'aiguillons recourbés; les rameaux plus hispides, surtout vers leur extrémité; les folioles épaisses, blanchâtres & tomenteuses en dessous, d'un beau vert gai à leur face supérieure; les ovaires épais, ovales, presque tronqués à leur sommet, plus ou moins hispides; les corolles amples; les styles lanugineux.

Peut-être faudroit-il y rapporter comme variété le rosier de la Belgique, décrit dans Miller sous le nom de *Rosa* (belgica), *sauze aculeato, foliis subtus hirsutis; calicibus semipinnatis, villosis*. Dict. n°. 17. Ses tiges s'élèvent à trois pieds de haut, chargées d'aiguillons: les feuilles sont composées de cinq ou sept folioles ovales, velues en dessous, les pédoncules & les ovaires velus, mais sans aiguillons; les fleurs doubles, couleur de chair, peu odorantes, très-nombreuses.

On obtient, de cette même espèce, des variétés beaucoup plus petites & presque naines, très-agréables par l'abondance & les couleurs des fleurs. Une des plus remarquables est celle connue vul-

gairement sous le nom de *rose de Champagne*, variété *γ*, dont les fleurs sont doubles ou semidoubles, au moins une & deux fois plus petites, d'un rouge-foncé, tachetées de jaune à leur base. Elle s'élève à peine à un pied de haut. Les tiges sont de couleur verte ou cendrée, armées d'aiguillons courts; elles se divisent en branches nombreuses, diffusées, en buisson, mais courtes, munies de quelques petites aiguillons presque glabres, même à leur sommet, garnies néanmoins de quelques poils glanduleux. Les ovaires sont un peu globuleux, presque glabres; les calices à découpures entières ou médiocrement pinnatifides. Les folioles sont petites, ovales, blanchâtres ou un peu glauques en dessous, à peine pubescentes; les pétioles légèrement velus, ainsi que les bords des feuilles; les dentelures glanduleuses.

Le *rosa pumila* de Linné fils & d'Aiton m'a paru trop voisin de cette variété pour ne point l'y rapporter. Sa tige s'élève peu: les folioles sont glauques en dessous; les dentelures glanduleuses; les tiges & rameaux armés de beaucoup d'aiguillons, ainsi que les pétioles; les ovaires ovales, hispides, ainsi que les pédoncules, & les fleurs petites, d'un beau rouge-foncé.

Enfin la variété *ε*, si connue sous le nom de *roses pompons, rosier de Bourgogne*, ne peut que difficilement se séparer de cette espèce. Les tiges sont un peu rougeâtres, munies de petits aiguillons épars, peu élevés; les folioles petites, presque glabres; les pétioles & les nervures velues; les dentelures un peu glanduleuses; les pédoncules très hispides, glanduleux, ainsi que les ovaires; les calices à cinq découpures, dont les prolongemens sont un peu pinnatifides. Les fleurs forment de jolis bouquets, mélangés de rose & de blanc; elles sont nombreuses, petites, médiocrement odorantes: les fleurs simples sont ordinairement rouges. Il croît sur les montagnes de la ci-devant Bourgogne. La rose pomponne n'en est probablement qu'une variété à fleurs doubles.

Cette espèce croit naturellement en Europe, dans les contrées méridionales. Ses variétés sont la plupart cultivées dans tous les jardins. *Th. (F. v.)*

Les roses de Provins passent pour être toniques, astringentes, crânielles, fortifiantes, détertives. On en prépare un sirop, une conserve, une poudre que l'on emploie avec quelque succès dans les indigestions, le vomissement, les hémorragies, la diarrhée. Ces fleurs ont plus d'efficacité étant infusées dans le vinaigre ou le vin. On s'en sert communément dans les fomentations astringentes & résolatives, surtout pour les contusions de la tête, les foulures des parties tendineuses, les pertes de sang, les migraines violentes. L'onguent ou pomade de roses s'applique sur les lèvres pour en guérir les gerçures.

4. ROSIER turbiné. *Rosa turbinata*. Aiton.

*Rosa germinibus turbinatis pedunculisque pilosis; petiolis villosis; aculeis sparsis, recurvis.* Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1073. n°. 20.

*Rosa (campanulata), caule aculeis recurvis, foliis villosis, petiolis aculeatis, pedunculis hispida, calice hispido, tubo campaniformi.* E. Hth. Beitr. 6. p. 97.

*Rosa inapertis floribus, alabastro crassiore, Francofurtensis quibusdam.* Tourn. Infl. R. Herb. 639.

*Rosa francofurtana.* Munch. Haufv. 5. pag. 24.

Vulgairement roses à gros cul.

Cette espèce se distingue assez aisément à la grosseur & à la forme de ses ovaires, qui sont très-épais & turbinés.

Ses riges s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq pieds; elles se divisent en rameaux glabres, cylindriques, verdâtres ou cendrés, armés d'aiguillons épars & recourbés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de sept à cinq folioles ovales, opposées, presque sessiles, vertes en dessus, blanchâtres & pubescentes en dessous, assez régulièrement dentées en scie à leur contour, supportées par des pétioles velus, dépourvus ordinairement d'aiguillons, garnis à leur base d'une large bractée denticulée, pubescente en dessous.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules solitaires, axillaires, rapprochés, hérissés de petits aiguillons & de poils roides, courts, tubercules. La corolle est d'un rouge-foncé, ample, médiocrement odorante; le calice un peu hispide; les divisions subulées, entières, blanchâtres en dedans. Les ovaires sont également hispides, surtout à leur base; épais, turbinés, élargis lorsqu'en cloche; quelquefois de couleur purpure.

On soupçonne cette plante originaire de l'Allemagne. Nous ne la connaissons guère qu'à fleurs doubles, qui quelquefois ne s'épanouissent point par le trop grand nombre de pétales. h (V. v.)

5. ROSIER canelle. *Rosa cinnamomea*. Linn.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis spicularibus, petiolis fimbriatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Miller, Dict. n°. 21. — Lours, Herborn. pag. 119. n°. 391. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 217. — Il. 554. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1065.

*Rosa callicibus integris; germinibus globosis pedunculisque glabris, caule aculeis spicularibus, petiolis villosis; foliis; foliolis sabrocaïnais, villosis.* Dutoi, Harbk. 2. pag. 348.

*Rosa (collincola), foliolis ovalibus, obtusis, pubescentibus, glanduleis, subhis cineris petiolis sub-*

*aculeatis; pedunculis subfoliatis, glaberrimis; germinibus globosis, glaberrimis; lacinis calicinis subulatis, apice sept foliaceis, pubescentibus, erectis.* E. Hth. Beitr. 2. pag. 70.

*Rosa (maialis), germinibus globosis; pedunculis petiolisque inermibus; caule aculeis geminis, axillaris; callicibus integris, fistulatis.* Herm. Differt. de rosa, pag. 8. n°. 3. — Retz. Obsevat. 3. pag. 55.

*Rosa (fecundissima), germinibus globosis pedunculisque glabris; caule petiolisque aculeatis; axillaris ovato-oblongis, foliis villosis.* Roth. Germ. vol. 1. pag. 218. — Il. 557. — Dur. Harbk. 2. pag. 343.

*Rosa minor, rubello flore, qua vulgo à mense maio, majulis dicitur.* Tournef. Infl. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483. — Rupp. Jen. 139.

*Rosa odore cinnamomi, simplex.* Tournef. L. C. — C. Bauh. Pin. 438. — Duham. Arbr. vol. 2. n°. 33.

*Rosa cinnamomea, floribus subrubenis, spinosa.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 39. Icon.

*Rosa saxatilis, flore ruberrimo.* Cam. Epit. 99.

*Rosa provincialis minor.* Tabern. Icon. 1085.

*Rosa de canelle.* Lobel, 2. Icon. 209.

6. *Rosa (fluvialis), germinibus globosis; pedunculisque petiolisque inermibus; caule aculeis sparsis; foliolis ovatis, acutis; callicibus linearibus, incis.* Retz. Prodr. Scand. edit. 2. n°. 619. — Cæder, Flor. dan. tab. 868.

7. *Rosa odore cinnamomi, flore pleno.* Tourn. Infl. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483.

*Rosa minor, rubello, multiplicato flore, asperis spinis armata.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 38. Icon.

*Rosa cinnamomea, flore pleno.* Clus. Hist. 115. & Pann. 109. tab. 110.

8. *Rosa (maialis).* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 400. — Regnier, Act. Soc. Lausan. 1. pag. 68. tab. 4.

On a donné à cette espèce le nom de *rose canelle*, probablement à cause de la couleur de ses riges, qui approche un peu de celle de la canelle. Elles sent d'un brun-jaunâtre luisant, très-lisses, hautes de cinq à six pieds, droites, cylindriques, divisées en rameaux effilés, très-glabres, peu garnis d'aiguillons; ils sont droits, blanchâtres, finissant deux par deux à la base de chaque rameau & des stipules; ils manquent quelquefois.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées de sept ou cinq folioles opposées ou alternes, ovales ou plus souvent oblongues, molles, très-douces au toucher, d'un vert-tendre en dessous,

dessus, pubescentes, un peu blanchâtres en dessous; rétrécies à leur base, aiguës ou obtuses à leur sommet, assez régulièrement dentées en scie à leur contour, supportées par des pétiolos pubescens, nus, ou quelquefois munis de quelques petits aiguillons courts, droits, très-fins, & de stipules étroites, alongées.

Les fleurs sont d'une grandeur médiocre, supportées par des pédoncules axillaires, presque solitaires, lisses, sans aiguillons. Les calices se divisent en cinq découpures longues, subulées à leur sommet, entières, un peu velues. La corolle est d'un rouge plus ou moins foncé, très-odorante; les ovaires presque globuleux, très-glabres, sans aiguillons.

Cette plante fournit plusieurs variétés par ses feuilles plus larges & un peu arrondies, surtout par la grande facilité de ses fleurs à devenir doubles, très-riche en cause de l'odeur suave qu'elles répandent. On ne doit pas la confondre avec le rosier des Alpes, auquel j'ai vu donner aussi le nom de *rosier canelle* à cause de la couleur de ses tiges.

La variété d'est peut-être une espèce distincte. Ses tiges sont hautes d'environ trois pieds, rameuses, garnies d'aiguillons épars & recourbés; les feuilles composées de cinq folioles ovales, dentées en scie, tantôt arrondies, tantôt acuminées à leur sommet. Les fleurs sont en petit nombre, terminales, supportées par des pédoncules courts, enveloppées à leur base par la stipule du pétiole. Les ovaires sont ovales, lisses, ainsi que les calices. Ceux-ci ont leurs découpures barbues à leurs bords, & souvent feuillées à leur sommet. Les pétales sont rouges, échançrés en cœur, de la grandeur de ceux du rosier des Alpes. M. Desfontaines a recueilli cette plante sur le mont Atlas.

Cette espèce croît naturellement en Allemagne & dans les contrées méridionales de l'Europe. On la cultive dans tous les jardins. (V. v.)

#### 6. ROSIER du Kamtschatka. *Rosa kamtschatica*. Vent.

*Rosa germinibus ovatis subglobosis pedunculisque glabris; caule aculeatissimo, hirsuto; petiolis fuscinervis, foliis obovatis.* Ventenat, Jard. de Cels. pag. 67. tab. 67.

Cet arbrisseau a des rapports avec le *rosa cinnamomea*: il en diffère par les tiges de couleur cendrée, hérissées d'aiguillons nombreux, couvertes de poils courts & ferrés; par ses folioles ovales, renversées, presque toujours tronquées à leur sommet, pubescentes en dessous.

Ses tiges sont droites, extrêmement rameuses, velues, hautes d'environ deux pieds, armées d'aiguillons très-rapprochés, d'un blanc-cendré, sub-

Botanique, Tome VI.

bulés; quelques-uns plus courts, surmontés d'une glande purpurine. Les feuilles sont alérnes, ailées avec une impaire, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, composées de sept à onze folioles opposées, presque sessiles, en ovale renversé, tronquées à leur sommet, entières à leur partie inférieure, dentées en scie à leur partie supérieure, chaque dent munie d'une très-petite glande purpurine; glabres en dessus, pubescentes en dessous, particulièrement sur leurs nervures; longues d'un pouce & plus sur un demi-pouce de large; leurs pétioles parsemés de quelques aiguillons rates, munis de stipules oblongues, très-obtus, ciliées & glanduleuses à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires, terminales, portées sur des pédoncules glabres, de couleur purpurine, courts, environ de la longueur des folioles. Le calice se divise en cinq folioles lancéolées, rétrécies dans leur partie moyenne, entières, pubescentes en dehors, parsemées de glandes peu apparentes, blanches & tomentueuses en dedans, terminées par un prolongement lineaire, entier, subulés.

La corolle est d'un rose-foncé, d'une odeur très-agréable, à cinq pétales ouverts, en cœur renversé, surmontés dans leur échançrure d'une petite pointe courte. Les ovaires sont glabres, globuleux; les étamines plus courtes que les pétales; les filaments subulés, d'un rose-pâle; les anthères droites, ovales, obtuses, d'un jaune-doré; les styles courts, velus à leur base sur un seul côté; les stigmates élargis. Les fruits sont de la grosseur & de la couleur d'une petite cerise, renfermant des semences glabres, ovales, osseuses, d'un gris jaunâtre.

Cet arbrisseau croît naturellement au Kamtschatka; il est cultivé depuis plusieurs années dans le jardin de M. Cels, où il passe l'hiver en pleine terre, & fleurit vers la fin du printemps. Ventenat. (V. f.)

#### 7. ROSIER des Alpes. *Rosa alpina*. Linn.

*Rosa germinibus ovatis, glabris; pedunculis petiolisque hispida, caule inermi.* Linn. Syst. veger. pag. 474. n°. 15. — Gmel. Sibir. 3. pag. 177. — Jacq. Flor. austr. tab. 279. — Willd. Arbr. 320. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. vol. II. pag. 559. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1075. n°. 26. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 132. n°. 750. XIII.

*Rosa inermis, foliis septenis, glabris; calicis segmentis indivisis.* Hall. Helv. n°. 1107.

*Rosa (inermis), germinibus ovatis; caule pedunculisque glabris, inermibus; petiolis fuscis.* Turri. Diet. Aët. pag. 128.

*Rosa (inermis), caule inermi; pedunculis hispida, calicis foliolis indivisis, fructibus oblongis.* Mill. Dict. n°. 6.

N n

*Rosa (rupellris)*, *germinibus glabris*, *pedunculis hispids*, *caule petiolisque inermibus*. Crantz. Ault. pag. 85. n°. 6.

*Rosa campestris*, *spinis carens*, *biflora*. Tourn. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 484.

*Rosa rubella flore simplicis*, *non spinosa*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 39. Icon.

*Rosa non spinosa*. Hall. Opusc. 218.

*Rosa sine spinis*. Clus. Pann. pag. 109. tab. 188. Vulgairement rose sans épines.

*R. Rosa (pyrenaica)*, *germinibus ovatis pedunculisque hispids*, *coloratis*; *petiolis hispido-aeuleis*, *calicibus obovatis foliosis*. Gouan. Illustr. pag. 31. tab. 19.

*Rosa hispida*. Krock. Silf. n°. 783.

*R. Rosa (lagenaria)*, *germinibus oblongis*, *collo attenuatis*; *foliis novenis*, *ellipticis*, *serratis*; *fructibus subcorymbosis*, *pendulis*. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 353.

*Rosa germinibus obovatis*, *glabris*; *pedunculis petiolisque glanduloso-hispids*; *caule inermi*; *foliis ovatis*, *glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1075. n°. 25.

Cet arbrisseau est presque dépourvu d'aiguillons dans toutes les parties : c'est un des caractères qui le font reconnaître, surtout parmi les roses indigènes de l'Europe.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds : elles sont glabres, cylindriques, verdâtres ; elles prennent en vieillissant une couleur brune jaunâtre un peu luisante, assez semblable à celle du rosier canelle ; elles se divisent en rameaux diffus, nombreux, garnis de feuilles alternes, ailées, composées de sept à neuf folioles glabres, ovales, vertes à leurs deux faces ; les dernières plus allongées, presque lancéolées, dentées en scie à leur contour ; les dentelures très-aiguës, supportées par des pétioles glabres ou un peu hispides, munis à leur base de stipules élargies, denticulées, blanches à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires ou quelquefois deux ensemble, latérales, terminales, axillaires, soutenues par des pédoncules glabres ou légèrement hispides, droits, cylindriques, munis à leur base de larges bractées lisses, ovales, semblables aux folioles. Le calice est partagé en cinq découpures un peu hispides sur leurs bords, entières, linéaires ou un peu spatulées à leur prolongement. La corolle est composée de cinq pétales d'un rouge foncé, mais très-vif ; blanchâtres à leur base, échancrés à leur sommet. L'ovaire est presque globuleux ou bien plus ou moins allongé, glabre, verdâtre ; les filaments courts, très-nom-

breux ; les anthères jaunes & petites, les styles pubescens.

Les pétioles, les pédoncules & les calices sont quelquefois parfaitement glabres, mais plus souvent ils sont, ou pubescens, ou hérissés de poils courts, plus ou moins nombreux ; quelquefois à peine sensibles, rarement glanduleux.

Dans la variété  $\gamma$  les ovaires sont ovales, hispides, colorés, ainsi que les pédoncules. Les calices ont leurs découpures feuillées, pinnatifides ; les pétioles sont velus & armés de quelques petits aiguillons.

La plante  $\gamma$  est remarquable par la forme allongée de ses ovaires, fortement rétrécis à leur partie supérieure. Ils sont glabres, mais les pédoncules & les pétioles sont hispides & glanduleux ; les folioles glabres & ovales, les tiges sans aiguillons ; les fruits presque disposés en cime, pendans sur leur pédoncule. Ce dernier caractère établit un grand rapport entre cette variété & le *rosa pendulina*, qui n'en est peut-être elle-même qu'une autre variété.

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées ; dans les départemens méridionaux de la France.  $\gamma$  (V. v.)

8. ROSIER à feuilles rougeâtres. *Rosa rubrifolia*. Vill.

*Rosa petiolis spinosis*; *foliis 7-9 glabris*, *acutis*; *germinibus umbellatis*, *glabris*; *calicibus foliatis*. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 349.

*Rosa (rubrifolia)*, *germinibus ovatis pedunculisque glabris*, *glaucescentibus*; *petiolis aculeis*; *caule aculeis sparsis*, *uncinatis*; *foliis oblongis*, *argutis serratis*, *glabris*; *floribus subcorymbosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1075. n°. 24.

*Rosa glauca*. Hort. Paris.

Cette espèce a un port remarquable & qui la rend très-distincte : presque toutes les parties sont glauques, & ses folioles ont une teinte rougeâtre.

Ses tiges s'élèvent à deux & trois pieds de haut ; elles se divisent en rameaux étalés, glabres, cylindriques, d'un pourpre foncé ou bleuâtre, garnis d'aiguillons épars, crochus, munis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de sept ou neuf folioles glabres à leurs deux faces, ovales, ou ovales oblongues, obtuses ou acuminées, minces, un peu molles, dentées en scie à leurs bords ; les dentelures presque droites, très-aiguës, d'un vert tendre & glauque, marquées de nervures & de veines d'un rouge-brun, qui se répand souvent sur une grande portion des folioles. Les pétioles sont glabres, quelquefois rougeâtres, armés de petits aiguillons recourbés, munis à leur base d'une stipule purpurine.

Les fleurs sont presque disposées en ombelle à l'extrémité des rameaux, enveloppées à leur base par deux grandes bractées ovales, opposées, dentées, finement acuminées; supportées par des pédoncules courts, très-glabres, sans aiguillons, de couleur glauque ou purpurine. Le calice est un peu coloré, glabre, à cinq découpures entières, ou un peu pinnatifides, blanchâtres & pubescentes en dedans, munies à leurs bords de quelques poils courts, glanduleux. La corolle est rouge, tachetée de blanc à sa base; les ovaires glabres, ovales, glauques ou colorés.

Cette plante croît naturellement sur les montagnes des environs de Grenoble, en Allemagne & dans la Suisse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.  $\gamma$  (V. v.)

9. ROSIER à fleurs pendantes. *Rosa pendulina*. Linn.

*Rosa inermis, germinibus oblongis; pedunculis petiolisque hispida, caule ramisque glabris, fructibus pendulis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 208. — Willden. Arb. 122. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1076. n° 23.

*Rosa germinibus ovatis, glabris; pedunculis cauleque hispida, petiolis inermibus, fructibus pendulis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 705. — Duroi, Harb. 2. pag. 371.

*Rosa sanguisorba majoris folio; fructu longo, pendulo*. Dillen. Eltham. pag. 325. tab. 245. fig. 37.

*Rosa (virginiana), inermis; foliis pinnatis, foliolis ovatis, serratis, utrinque glabris; calicis foliolis indivisis*. Miller, Dict. n° 10.

*Rosa silvestris, virginiana; pimpinella majoris foliis*. Rai, Hist.

Il existe de si grands rapports entre cette espèce & le *rosa alpina*, surtout avec la variété  $\gamma$ , qu'il n'y a guère que la qualité d'étrangère qui ait pu la faire considérer comme une espèce particulière; cependant il est possible qu'elle ait perdu dans nos jardins quelques-uns des caractères qui lui sont particuliers. Ceux que nous lui connoissons consistent dans ses fleurs pendans, dans les pédoncules hispides & glanduleux, ainsi que ses pétioles; dans ses folioles glauques ou un peu blanchâtres à leur face inférieure.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, rougeâtres, striées, dépourvues d'aiguillons, divisées en rameaux distichs, pendans, garnis de feuilles pétioles, alternes, composées de neuf ou sept folioles opposées, ovales, obtuses, quelquefois presque arrondies, longues d'un pouce & plus, glabres, d'un beau vert-gai à leur face supérieure, plus pâles, presque glauques ou un peu blanchâtres en dessous, dentées en scie à leurs bords; les dentelures très-aiguës, supportées par

des pétioles légèrement hispides, presque glabres, sans aiguillons, munis à leur base de stipules glabres, élargies vers leur sommet, denticulées à leurs bords.

Les fleurs sont axillaires, latérales, solitaires, soutenues par des pédoncules simples, longs, pendans, surtout à l'époque de la maturité; hispides & glanduleux. Le calice est divisé en cinq découpures entières, glabres extérieurement, vertes ou colorées, blanches & tomenteuses en dedans & à leurs bords. La corolle est composée de cinq pétales d'un rouge-foncé, blancs vers leurs ongles, échancrés à leur sommet. L'ovaire est ovale, glabre, souvent coloré. Les fruits sont allongés, pendans. Les étamines très-nombreuses; les filamens subulés, un peu élargis à leur base; les styles très-courts, pubescens.

Cette plante croît naturellement dans les contrées septentrionales de l'Amérique, dans la Virginie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans quelques autres; mais elle est peu recherchée, ses fleurs étant ordinairement simples & presque sans odeur.  $\gamma$  (V. v.)

10. ROSIER fleuri. *Rosa semperflorens*.

*Rosa germinibus oblongis pedunculisque hispida; caule petiolisque aculeato-hispida; foliis subternatis, aculeatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1078. n° 34.

*Rosa (semperflorens), caule aculeato; foliis subternis pedunculisque subunifloris, aculeatis, hispida; calicis foliolis integris*. Curt. Mag. 234.

*Rosa (linica), germinibus subglobosis, glabris; pedunculis aculeatis, hispida; caule petiolisque aculeatis; calicis foliolis lanceolatis, subpetiolatis*. Linn. Syst. veget. 394.?

*Rosa (diversifolia), germinibus ovali-oblongis; caule petiolisque aculeatis; foliis ternatis pinnatifide, subius glauca*. Venten. Jard. de Cels, pag. 33. tab. 33.

*R. Rosa (chinensis), germinibus ovatis pedunculisque glabris; petiolis cauleque aculeatis; foliolis ovato-lanceolatis, subternatis, serratis, glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1078.

*Rosa (chinensis), germinibus ovatis; pedunculis foliolisque utrinque glabris; ramis petiolisque aculeatis*. Jacq. Obierv. 3. pag. 7. tab. 55.

Ce rosier est remarquable par deux caractères bien prononcés, dont l'un est de produire des fleurs sans interruption pendant toute l'année, la mauvaise saison exceptée; l'autre d'avoir la plupart de ses feuilles ternées ou quinquées, mais dont les deux folioles inférieures sont beaucoup plus petites que les trois autres.

Ses tiges sont vertes, ainsi que les rameaux, N n 2



armées d'aiguillons crochus plus ou moins nombreux, garnies de feuilles alternes, composées de cinq à trois folioles pédiculées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, verres, presque luisantes en dessus, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous, simplement dentées en scie à leurs bords; les dentelures ordinairement courtes, aiguës; la foliole terminale plus grande, longuement pétiolée; les pétioles médiocrement hispides; les stipules manées de cils glanduleux.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires, portées sur des pédoncules droits, épais, cylindriques, hispides ou légèrement aiguillonnées. Les calices sont à cinq folioles ovales, aiguës, acuminées, rarement pinnées, plus ou moins hispides & munis d'aiguillons, quelquefois presque glabres. La corolle est composée de cinq pétales légèrement échancrés à leur sommet, d'un rouge-tendre; elle se double aisément, & devient quelquefois blanche. Les ovaires sont oblongs, glabres ou un peu hispides; les styles capillaires, tortueux; les stamens tubulés, tronqués obliquement à leur sommet, rouges ou blanchâtres.

La plante se ne me paroît pas pouvoir former une espèce distincte, ne différant de la précédente que par ses ovaires & ses pédoncules glabres, caractère que j'ai remarqué sur des individus qui en présentent de glabres & d'hispides.

Cette plante croît en Chine; elle est cultivée dans plusieurs jardins particuliers de Paris. *Th* (V. v.)

#### II. ROSIER à feuilles ternées. *Rosa ternata*.

*Rosa foliis ternatis; foliolis ovato-lanceolatis, lucidis, glaberrimis; caule petiolisque aculeatis, aculeis recurvis, ramis virgatis.* (N.)

Quoique ce rosier soit cultivé, depuis un assez grand nombre d'années, dans quelques jardins de Paris, particulièrement dans celui de M. Dupont, qui s'en livre avec succès à la culture & à l'étude de ce beau genre, il n'a pas encore été possible d'en obtenir des fleurs.

C'est un arbrisseau très-fort, dont les tiges se divisent en longs rameaux diffus, glabres, élançés, de couleur brune-foncée, armés d'aiguillons épais, recourbés, distans, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles pédiculées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, luisantes & comme vernissées à leur face supérieure, d'un vert un peu plus pâle en dessous, dentées en scie à leurs bords; la foliole terminale plus allongée, presque acuminée, plus longuement pétiolée, hérissée sur la principale nervure.

Les pétioles sont longs, fermes, glabres, armés de petits aiguillons fins & droits; les plus anciens

plus forts se recourbent. Les stipules sont très-courtes, fort étroites; elles se divisent presque à leur base en deux découpures étroites, linéaires ou lancéolées, aiguës, denticulées à leurs bords; les dentelures presque épineuses.

Cet arbrisseau est originaire de la Chine, & cultivé dans plusieurs jardins de Paris. *Th* (V. v.)

#### 12. ROSIER mouffeux. *Rosa muscosa*.

*Rosa germinibus ovatis; calicibus, pedunculis, petiolis ramulisque hispidis, glanduloso-viscosis; spinis ramorum sparsis, rectis.* Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 207. — Willd. Arb. 318. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1074.

*Rosa (muscosa), calicibus semipinnatis; germinibus ovatis; pedunculis foliorumque serratis, hispidulo-viscidis; caule petiolisque aculeatis; foliolis ovatis, serratis, glabris.* Dutoit, Harbk. 2. pag. 368. — Curt. Mag. 69.

*Rosa rubra, plena, spinosissima; pedunculo muscoso.* Miller, Icon. 148. tab. 221. fig. 1.

*Rosa provincialis, spinosissima; pedunculo muscoso.* Hort. Angl. 66. tab. 18.

Ce rosier a de si grands rapports avec le *rosa canisfolia*, que l'on soupçonne, avec assez de raison, qu'il pourroit bien lui devoir son origine. Néanmoins Miller pense qu'il doit former une espèce différente, peut-être comme hybride, vu la difficulté que l'on éprouve à le cultiver, tandis que le rosier de Provins vient avec une grande facilité. Il est d'ailleurs très-remarquable par les glandes nombreuses qui le recouvrent, & dont les pédicules rameux & enroulés le font paroître comme couvert d'une mousse fine sur ses pédoncules & ses calices, ceux-ci ayant d'ailleurs des découpures fines & approchantes des petites feuilles de certains *hypnum*.

Ses tiges se divisent en rameaux diffus, fortement armés d'épines brunes, droites, épaisses, chargés, particulièrement dans leur jeunesse, de poils glanduleux & visqueux, garnis de feuilles alternes, ailées, composées de folioles ovales, dentées en scie inégalement sur un double rang; les dentelures intérieures très-fines, glanduleuses, ainsi que les pétioles qui sont encore munis de quelques aiguillons.

Les fleurs sont presque solitaires, pédonculées, de couleur rouge, presque toujours doubles; les ovaires ovales; les calices pinnés, chargés, ainsi que les pédoncules, d'aspérités & de poils nombreux, ramifiés, glanduleux, touffus.

On ignore l'origine de cette plante, qui paroît être un produit de la culture. *Th* (V. v.)

#### 13. ROSIER très-épineux. *Rosa spinosissima*. Linn.

*Rosa germinibus globosis, glabris; pedunculis hispida; caule petiolisque aculeatissimis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 705. — Pollich, Pal. n. 487. — Scholl. Barb. n. 407. — Mill. Dict. n. 2. — Leers, Herborn. pag. 120. n. 384. — Grimm. Flor. isen. Nov. Act. A. N. C. tom. 3. Append. pag. 323. — Hoffm. Germ. 176. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 217. — Il. 556. — Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 483. n. 750. XII. var. β.

*Rosa spinis rectis, confertis; foliis novenis, glabris; pinnis & petiolis fassispinis.* Haller, Helv. n. 1106.

*Rosa germinibus globosis, glabris; pedunculis, caule petiolisque aculeis confertis.* Crataz. Austr. pag. 84.

*Rosa calicibus integris; germinibus globosis, glabris; pedunculis hispida; caule petiolisque aculeatissimis; foliis lanceolato-ovatis, serratis, glabris.* Durot, Harbk. 2. pag. 339.

*Rosa caule petiolisque aculeatis, calicibus foliolis inaequalibus.* Linn. Flor. luc. 407. 442.

*Rosa campestris spinosissima; flore albo,odoro.* Tournef. Inst. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483.

*Rosa dunensis.* Dodon. Pempt. 187.

*Rosa humilis, spinosissima; foliis pimpinella glabris, flore albo.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 40. Icon.

*Rosa campestris, odora.* Clus. Hist. 1. pag. 116. Icon. — Idem, Stirp. Pann. p. 112. tab. 111. et 4.

β. *Rosa (pimpinellifolia), germinibus globosis pedunculisque glabris; caule aculeis sparsis, rectis; petiolis scabris, foliolis obtusis.* Linn. Spec. Plant. 703. — Pall. Iter 2. pag. 317. — Hoffm. Germ. 176. — Willd. Arbr. 308. — Retz. Observ. 4. pag. 27. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 131. n. 750.

*Rosa humilis, spinosissima; flore rubro.* Tournef. Inst. R. Herb. 638. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 41.

*Cynorrhodon polyacanthos.* Dalech. Hist. 1. pag. 127. Icon.

γ. *Rosa (scotica), caule petiolisque aculeatis; foliis pinnatis, foliolis apice incisifs, finibus globosis.* Miller, Dict. n. 5.

*Rosa pimpinella minor, scotica; flore livido rubene.* Miller, Dict. edit. 1.

J'ai cru devoir réunir ces deux espèces de Linné, trop rapprochées pour être séparées, & dont les différences ne consistent que dans leur proportion de grandeur, toutes deux fort petites, la plante β étant encore davantage. Les pédoncules glabres ou hispides se trouvent quelquefois sur le même individu, & les fleurs blanches ou teintes de rose sont communes aux deux plantes.

Les tiges s'élèvent de deux à trois pieds; quel-

quefois elles ont à peine un pied; elles sont rougâtres ou brunes, très-rameuses, armées d'un très-grand nombre d'aiguillons droits, inégaux, fort rapprochés, fins, aigus. Les feuilles sont nombreuses, alternes, composées de sept à onze folioles assez semblables à celles de la pimpinelle, fort petites, ovales, arrondies, d'un vert-gai, glabres à leurs deux faces, un peu plus pâtes & agréablement veinées en dessous, dentées en scie à leur contour, opposées, pédoncules, soutenues par des pétioles munis de très-petits aiguillons & de stipules très-courtes, médiocrement élargies, denticulées à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, portées sur des pédoncules simples, armés ordinairement de petits aiguillons courts. Le calice est glabre, à cinq découpures étroites, allongées, simples, ou quelquefois un peu pinnatifides ou incisées vers leur sommet. La corolle est blanche, souvent tachetée de jaune à sa base; les pétales ovales, échaucrés en cœur à leur sommet; les ovaires globuleux, lisses, petits.

Dans la variété β, les tiges sont moins élevées; les feuilles un peu plus petites, plus arrondies; les pédoncules plus courts, pourvus d'aiguillons; les corolles d'une légère couleur rose sur un fond blanchâtre.

La variété γ est encore plus petite; elle s'élève à peine d'un demi-pied. Ses folioles sont très-petites; les pédoncules courts, glabres, épais; les divisions du calice entières; la corolle blanche ou lavée de rose; les fruits arrondis, d'un pourpre foncé, presque noir. Elle est connue sous le nom de *rosier d'Écosse*.

Ces plantes croissent en Europe, dans l'Allemagne, la Suisse, la France. La variété β se rencontre dans nos départements méridionaux sur les rochers incultes; la variété γ est originaire d'Écosse. On les cultive toutes trois au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

#### 14. ROSIER VELU. *Rosa villosa*. Linn.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque hispida; caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 724. — Mill. Dict. n. 3. — Leers, Herborn. n. 385. — Poll. Pal. n. 483. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 217. — Il. 556. — Retz. Observ. 1. pag. 19.

*Rosa eglanteria.* Var. β. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 131. n. 750. XI.

*Rosa spinis rectis; foliis novenis, tomentosis; pinnis rotundis, spinosis.* Haller, Helv. n. 1105.

*Rosa calicibus semipinnatis; germinibus globosis pedunculisque hispida; caule petiolisque aculeatis;*

*foliolis ovatis, tomentosis.* Dutoi, Harbk. 2. pag. 341.

*Rosa foliis utrinque villis, fructu spinoso.* Linn. Flor. suec. 2. pag. 1295.

*Rosa flosifolia, pomifera, major.* Tournef. Infl. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 484. — Duhamel, Arbr. vol. 2. n° 42.

*Rosa flosifolia, pomifera.* Dalech. Hist. 1. pag. 127. Icon. — Lobel, Icon. 2. pag. 211.

β. *Rosa* (mollissima), *germinibus subglobosis, glabris pedunculisque hispida; caule petiolisque aculeatis, foliis tomentosis.* Willd. Prodr. 1. n° 1237.

Ce rosier a de grands rapports avec le *rosa canina*; il n'en parait cependant suffisamment distinct pour ne point être confondu comme variété avec cette dernière espèce. Ses fruits sont plus arrondis; ses pédoncules & ses ovaires chargés de poils glanduleux & d'aiguillons fins très-nombreux; ses feuilles molles & tomenteuses ou pubescentes.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds; elles sont dures, glabres, divisées en rameaux cylindriques, grêles, munis d'aiguillons épars, recourbés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailes, composées de cinq ou sept folioles d'une grandeur médiocre, ovales, molles, douces au toucher, vertes & pubescentes à leur face supérieure, presque tomenteuses & blanchâtres en dessous, à double denrclure à leurs bords, supportées par des pétioles velus, chargés de quelques petits aiguillons courts & de stipules médiocrement élargies.

Les fleurs sont presque solitaires, latérales ou terminales, soutenues par des pédoncules très-hérissés & glanduleux. Les calices sont pubescens, chargés de petites glandes, divisés en cinq découpures ovales, prolongées à leur sommet en une longue pointe linéaire, quelquefois un peu pinnatifide. La corolle est ordinairement simple, à cinq pétales d'un rouge-foncé, blanchâtres vers leur base, avec une tache jaunâtre à leur onglet; les ovaires globuleux ou un peu ovales, très-hérissés de poils glanduleux; les fruits gros, arrondis; ils perdent souvent une partie de leurs poils.

Dans la variété β, les folioles sont beaucoup plus épaisses, plus molles, comme drapées, & les ovaires sont très-souvent dépourvus de poils glanduleux.

Cet arbrisseau croît en Europe dans les terrains secs & pierreux, & dans les bois. ♀ (V. v.)

15. ROSIER HISPIDE. *Rosa hispida*. Hort. Paris.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque hispida-*

*aculeatis; foliis ovatis, subulis albedo-tomentosis; caule aculeis sparsis, floribus solitariis.* (N.)

*Rosa pomospinosa, folio hispida.* ? J. Bauh. Hist. 2. pag. 38. Icon.

Ses tiges sont hautes de quatre à cinq pieds, munies de rameaux nombreux, diffus, glabres, noueux, cylindriques, armés d'aiguillons épars, d'un blanc jaunâtre, droits, aigus, munis de feuilles alternes, composées de sept folioles ovales, opposées, sessiles, crénelées à leurs bords; les crénelures finement denticulées, verres, glabres à leur face supérieure, légèrement tomenteuses & blanchâtres en dessous, (supportées par des pétioles velus, munis de quelques petits aiguillons rares & de stipules courtes, bifides à leur sommet, presque entières à leurs bords.

Les fleurs sont latérales, axillaires, presque frutitères, soutenues par des pédoncules médiocres, droits, très-hérissés de pointes glanduleuses. Les calices sont divisés en cinq découpures allongées, spatulées vers leur sommet, glanduleuses, blanchâtres en dedans & à leurs bords. La corolle est d'un rouge-tendre; les pétales échancrés en cœur à leur sommet; les ovaires globuleux, chargés, ainsi que les fruits, d'un grand nombre d'aiguillons fins, très-piquants, jaunâtres. Les fruits sont fort gros, globuleux, un peu ovales, d'un rouge noirâtre, remplis de semences jaunâtres & velues.

J'ignore le lieu natal de cette plante, que l'on cultive depuis bien des années au Jardin des Plantes de Paris & ailleurs. Ses fleurs sont simples. ♀ (V. v.)

16. ROSIER ÉGLANTIER. *Rosa rubiginosa*. Linn.

*Rosa germinibus globosis aculeatisque, aculeis recurvis, foliis subulis rubiginosis.* Linn. Mant. 564. — Jacq. Austr. 1. pag. 31. tab. 50. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. Germ. 1. pag. 218. — Il. 558. — Kerz. Observ. 1. pag. 20.

*Rosa* (rubiginosa), *germinibus ovatis pedunculisque hispida; petiolis cauleque aculeatis; aculeis recurvis; foliis ovatis, subulis glanduloso-pilosis.* Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 206. — Willd. Arbr. 317. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1073. n° 21.

*Rosa eglanteria*, var. n. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 131. n° 750. XI.

*Rosa caule aculeis sparsis, recurvisculis; foliis pinnatis, subulis glanduloso-hispidis, rubiginosis; foliis ovatis, duplicato-serratis; petiolis aculeatis; pedunculis glanduloso-hispidis; germinibus ovatis, subhispidis; foliolis calicinis semipinnatis.* Eht. Beitr. 4. pag. 22.

*Rosa* (eglanteria), *calicibus semipinnatis; ger-*

*minibus globosis, glabris; pedunculis petiolisque hispids, glandulosis; caule aculeis sparsis, curvis; foliis subrotundis, serratis glandulosis.* Duroi, Harbk. 2. pag. 336.

*Rosa eglanteria.* Herm. Dissert. de rosâ. pag. 17. n°. 12. — Gouan, Hort. Monip. 245.

*Rosa suavisolia.* Lightfoot, Scot. 262. — Cæder. Flor. dan. tab. 870.

*Rosa silvestris, odorata; flore multiplici.* ? Lobel, Icon. 210.

*Rosa spinis aduncis, foliis subius rubiginosis.* Hall. Helv. n°. 1103.

*Rosa silvestris, foliis odoratis.* Tourn. Inst. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 483.

*Rosa silvestris.* Dod. Pempt. 186. Icon.

*Rosa foliis odoratis, eglanteria dicta.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 41. Icon.

*Rosa eglanteria.* Tabern. Icon. 1087.

*R. rubiginosa (canadensis), foliis rotundioribus, floribus subumbellatis.* (N.)

Il me semble qu'on a souvent confondu, dans la synonymie, cette espèce avec le *rosa lutea*, & peut-être avec le *rosa canina*, qui ont en effet beaucoup de rapports entr'elles. Elle diffère du *rosa canina* en ce que celle-ci a ses folioles plus nuançées, glabres, point odorantes; ses fleurs blanches ou teintées de rose, ses pédoncules & ses ovaires presque glabres. Elle se distingue du *rosa lutea* par ses fl. très rouges, point fécondes; par ses folioles ordinairement roussâtres, très-glanduleuses; par ses aiguillons recourbés. Au reste, il ne seroit pas impossible que ces trois espèces ne soient des variétés de la même, & que celle dont il s'agit ici n'en soit le type. Je la regarde comme le véritable églantier, différente encore du *rosa villosa*, celle-ci n'ayant point les feuilles odorantes ni glanduleuses, mais sèches, molles & presque lanugineuses, & dont les aiguillons sont droits.

Les tiges de cet arbrisseau sont hautes de trois à quatre pieds, glabres, verdâtres, rameuses, armées de forts aiguillons souvent un peu rouges ou jaunâtres, épais, recourbés, & garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de sept ou cinq folioles assez petites, d'une odeur agréable, approchant un peu de celle d'une pomme de reinette, mais plus pénétrante; ovales, un peu arrondies, épaisses, un peu visqueuses, vertes & presque glabres à leur face supérieure, un peu velues ou pubescentes en dessous, très-souvent de couleur roussâtre & chargées d'un grand nombre de glandes veinées, réticulées, dentées en scie & très-glanduleuses à leurs bords, ainsi que les stipules, qui sont larges, bifides à leur sommet. Les pétioles sont munis de petits aiguillons & de beaucoup de glandes pédicelées.

Les fleurs sont presque solitaires, axillaires, latérales ou terminales, soutenues par des pédoncules droits, cylindriques, hérissées de petits aiguillons & de poils glanduleux, ainsi que les ovaires & les calices. Ceux-ci se divisent en cinq découpures à demi pinnatifides. La corolle est composée de cinq pétales échancrés en cœur à leur sommet, d'un rose-tendre, plus pâles & un peu blanchâtres à leur base. Les ovaires sont ovales, presque ronds; les fruits d'un rouge de corail, ovales, obtus, presque glabres.

La variété  $\beta$ , originaire du Canada, ne diffère de la précédente que par ses feuilles plus arrondies, & par ses fleurs presque disposées en ombelle à l'extrémité des rameaux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres.

Ce rosier croît naturellement dans presque toutes les contrées de l'Europe septentrionale, parmi les buissons, dans les haies, aux lieux incultes. (V. v.)

Les fruits de l'églantier ont une saveur douce, mêlée d'une agréable acidité. Les poils qui environnent les semences s'en séparent aisément, s'attachent aux doigts lorsqu'on y touche, pénétrant la peau & y occasionnent des démangeaisons très-importunes.

Il croît souvent, sur les branches & les rameaux de cet arbrisseau, une espèce d'éponge velue, de la grosseur d'une petite poignée ou d'une grosse noix, légère, de couleur rousse, d'une odeur acide assez agréable, pénétrante; on la nomme *lédiguar* ou *éponge d'églantier*; elle est environnée d'un grand nombre de filaments allongés, touffus, entre-mêlés; l'intérieur est dur, presque ligneux. C'est une tumeur occasionnée par la piqûre d'un insecte ailé (le *cynips rosa* Linn., le *diptère du lédiguar* Geoffr.), qui, avec l'aiguillon dont l'extrémité de son ventre est armé, perce le bouton d'où les feuilles doivent sortir, y dépose ses œufs, dont les larves font nichées dans autant de petites cellules dans l'intérieur de cette tumeur. On a rangé cette production au nombre des remèdes utiles, & qui peuvent être employés avec succès dans les diarrhées, les dysenteries, la difficulté d'uriner. On prétend que, réduite en charbon & en poudre, c'est un spécifique contre les goîtres; qu'il suffit d'en mettre tous les soirs en se couchant une pincée sous la langue.

Les fleurs de l'églantier sont purgatives, mais son syrop est astringent. La conserve qu'on prépare avec les fruits, est d'un doux aigrelet, agréable au goût, excellent astringent, bon dans le cours de ventre, pour modérer l'ardeur de la bile & adoucir l'acreté de l'urine.

17. ROSIER des chiens. *Rosa canina*. Linn.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque glabris;*

*caule petiolisque aculeatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 704. — Mater. medic. 129. — Pollich, Pal. n°. 186. — Wedd. Flor. dan. tab. 555. — Ludw. Ed. tab. 70. — Blackw. tab. 8. — Kniph. Cent. 7. n°. 76. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 218. — Il. 160. — Willd. Arb. 321. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1077. n°. 31.

*Rosa spinis adunatis, foliis septenis, calicibus tomentosis, segmentis planatis & semipinnatis, tubis brevissimis*. Hall. Helv. n°. 1101.

*Rosa sepium*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 129. n°. 750. VI.

*Rosa caule aculeato, petiolis inermibus, calicibus semipinnatis*. Flor. Suec. 406. 441.

*Rosa calicibus semipinnatis, villosis; germinibus ovatis pedunculisque glabris; petiolis subhispidis; foliis ovatis, mucronatis*. Duroi, Harbk. 2. pag. 359.

*Rosa filifolia, vulgaris; flore odorato, incarnato*. Tourn. Int. R. Herb. 648. — C. Bauh. Pin. 483.

*Rosa canina vulgò d'âne*. Dod. Pempt. 187.

*Rosa filifolia, alba, cum rubore; folio glabro*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 45. Icon.

*Rosa filifolia*. Tabern. Ic. 88. Icon.

*Rosa canina, odorata & filifolia*.? Lobel, Ic. 2. pag. 210.

Vulgairement roses de chien, roses cochonnières, cynomhodone.

1. *Rosa (sepium), elatior; ramis undique aculeis, recurvis, armatis; foliis plerumque septenis, parvulis, ovatis, acutis, subvis ut petiolus, glandulis confertis; fructibus oblongo-ovatis, pedunculisque glabris*. Thuill. Flor. parif. edit. 1. pag. 252. n°. 8.

2. *Rosa (umbellata), germinibus ovatis, glabris, capitatis, subumbellatis; caule aculeato*. Leyt. Flor. Hall. 435. — Leers, Herborn. pag. 119. n°. 380.

3. *Rosa (dumetorum), ramis glabris, aculeis, infra folia geminis, validis, uncinatis; foliis pubescentibus; petiolo minuto passim aculeato; foliis subbiloculato-ovalibus, quinque ad septem; fructibus globosis pedunculisque glabris*. Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 250.

Cer arbrisseau, dont les fleurs sont ordinairement rougeâtres, très-rarement tout-à-fait blanches, se distingue, par ce premier caractère, du *rosa arvensis*, avec lequel il a beaucoup de rapports. D'ailleurs, ses ovaires sent bien plus allongés, glabres, ainsi que ses pédoncules, tandis que dans le rosier des champs les ovaires sont presque globuleux & les pédoncules hispides. Ce dernier a ses folioles d'un vert-obscur; elles sont plus claires, presque luisantes dans le nôtre, qui fournit à la vérité plusieurs variétés par lesquelles ces deux es-

pèces semblent se confondre, & qui ont peut-être un type commun; ce qui a occasionné l'établissement de quelques espèces nouvelles, que nous croyons devoir rapporter à celle-ci, & qu'on pourroit peut-être réunir également au rosier des champs. En suivant ce grand nombre de variétés, on les verroit aussi se rapprocher du *rosa rubiginosa*; mais leurs feuilles ne sont ni odorantes ni rouillâtres en dessous, & très-peu glanduleuses.

Ses tiges sont hautes de quatre à cinq pieds, très-rameuses, diffuses, en buisson, lisses, verdâtres; les rameaux allongés, foibles, quelquefois presque sarmenteux, armés d'aiguillons assez forts, épars, dits, crochus, garnis de feuilles alernes, pétiolées, composées de sept ou cinq folioles assez petites, ovales, souvent acuminées à leur sommet, minces, glabres, d'un vert presque luisant à leur face supérieure, un peu blanchâtres ou cendrées en dessous, finement réticulées, à dentelures presque simples, très-aiguës, presque point glanduleuses; les pétioles légèrement pubescents, munis de quelques aiguillons rares; les stipules un peu mucronees.

Les fleurs sont solitaires, latérales, axillaires, presque terminales, supportées par des pédoncules grêles, glabres, sans aiguillons. Les calices sont un peu velus, divisés en cinq découpures presque pinnatifides, ciliées à leurs bords. La corolle est blanche & toujours un peu rougeâtre, surtout dans la jeunesse; les pétales en cœur, échancrés à leur sommet; les ovaires ovales, oblongs, étroits, glabres, verdâtres; deux bractées à la base des fleurs, opposées & ciliées à leurs bords.

Dans la variété 1 les tiges s'élèvent davantage, & parviennent à la hauteur de huit à neuf pieds. Les feuilles sont, ainsi que les pétioles, plus abondamment fournies de glandes. Les pédoncules sont glabres ou un peu glanduleux.

La plante 2 est remarquable en ce que ses fleurs se portent particulièrement vers l'extrémité des rameaux; y forment, par leur réunion, une sorte d'ombelle. Les folioles sont glanduleuses, & les pétioles un peu vixueux; les pédoncules hérissés de quelques aiguillons droits; les ovaires presque globuleux. Ces caractères rapprochent beaucoup cette plante du *rosa rubiginosa*.

Dans la variété 3 les aiguillons sont crochus, réunis deux par deux vers la base de chaque feuille. Celles-ci sont un peu pubescentes, ovales; les fruits globuleux, glabres, ainsi que les ovaires; les fleurs d'un blanc-rose.

Cette plante & la plupart de ses variétés se rencontrent dans les bois, les buissons, les haies de contrées septentrionales de l'Europe. (V. v.)

Ses racines ont été long-tems regardées comme un spécifique contre la morsure des chiens enragés, remède

remède abandonné, ainsi que beaucoup d'autres. Il paroît que ses fleurs peuvent être substituées à celles de l'églantier, & qu'elles en ont les propriétés astringentes, &c.

### 18. ROSIER des coteaux. *Rosa collina*. Jacq.

*Rosa germinibus ovatis, subglabris; pedunculis petiolisque glanduloso-hirsutis, caule aculeato*. Jacq. Flor. austr. 2, tab. 197. — Murr. Syst. veget. edit. 14. pag. 474. — Hott. Synops. 280. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1078. n° 32.

Cet arbrisseau ne m'est point assez connu pour décider s'il ne seroit pas une variété du *rosa canina*, avec lequel il paroît avoir beaucoup de rapports : il en diffère par ses ovaires, qui ne sont point parfaitement glabres; par ses pédoncules hérissés & glanduleux. Ses tiges & les rameaux sont armés d'aiguillons; les pétioles chargés de poils roides, glanduleux; les folioles velues en dessous, les ovaires ovales.

Cette plante croît sur les collines de l'Autriche. ♀

### 19. ROSIER jaune de soufre. *Rosa sulphurea*.

*Rosa germinibus globosis, petiolis cauleque aculeatis; aculeis caulinis duplicibus, majoribus minoribusque numerosis; foliis ovalibus*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 201. — Willd. Arbr. 305. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1065. n° 3.

*Rosa (glaucochylla), foliis obovatis, simpliciter serratis, glandulosis, pubescentibus, glaucis; petiolis aculeatis; stipulis laceratis, serratis, serraturis glandulosis; pedunculis glabris; germinibus hemisphaericis, glandulosis; lacinis calicinis semipinnatis, glanduliferis*. Ehrh. Beitr. 2. pag. 69.

*Rosa lutea, multiplex*. Tournef. Inst. R. Heeb. 648. — C. Bauh. Pin. 483. — Dahm. Arbr. vol. 2. n° 37. — Hort. angl. pag. 66. tab. 18. — Knorr. Del. 1. tab. R. — Duroi, Harbk. 2. pag. 346.

*Rosa lutea, flore plena*. J. Bauh. Hist. 2. p. 48.

*Rosa flava, plena*. Clus. Hist. 114.

*Rosa flava, pleno flore*. Clus. Cur. Post. 6.

Il y a de tels rapports entre cette espèce & le *rosa lutea*, que l'une paroît presque devoir son origine à l'autre; cependant elles diffèrent en ce que celle dont il est ici question n'a point ses feuilles odorantes, qu'elles ont des folioles glauques & minces, & que les fleurs, qui se doublent aisément, sont d'un jaune de soufre.

Cette plante s'élève peu : ses rameaux sont armés d'aiguillons très-inégaux, les uns longs, droits, subulés, fins, jaunâtres, les autres très-courts, plus fins, très-nombreux. On en distingue encore d'un peu plus grands, légèrement courbés.

Botanique. Tome VI.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées de neuf ou sept folioles ovales, quelquefois un peu arrondies, petites, glabres à leurs deux faces ou un peu pubescentes; d'un vert-tendre en dessus, d'un vert-glauque, un peu jaunâtre en dessous, dentées irrégulièrement à leurs bords, les dentelures très-aiguës. Les pétioles sont glabres, armés d'aiguillons, munis à leur base de stipules très-étroites, presque filiformes, qui s'épanouissent à leur sommet en deux petites folioles linéaires, denticulées, écartées, quelquefois un peu glanduleuses.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, latérales & terminales, supportées par des pédoncules glabres. La corolle est ordinairement double ou semidouble, d'un jaune de soufre; les découpures du calice à demi pinnatifides, un peu glanduleuses, ainsi que les ovaires, dont la forme est globuleuse.

Ce rosier croît naturellement dans le Levant. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

### 20. ROSIER à fleurs jaunes. *Rosa lutea*.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris, calicibus petiolisque spinulosis, aculeis ramorum relictis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 200. — Willden. Arbr. 303. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. p. 1064. n° 2.

*Rosa (eglanteria), germinibus globosis pedunculisque glabris; caule aculeis sparsis, relictis; petiolis scabris, foliis acutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 703. — Scholl. Barb. n° 399. — Mench. Hall. n° 418. — Kniph. Centur. 7. n° 77. — Leyf. Hall. n° 489. — Hoffm. Germ. 174. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 217. — Il. pag. 553. — Retz. Observ. 1. pag. 20.

*Rosa (lutea), caule aculeato, foliis pinnatis; foliis ovatis, serratis, utrinque glabris; pedunculis brevissimis*. Miller, Dict. n° 11. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 132. n° 750. XIV.

*Rosa (lutea), calicibus semipinnatis, germinibus globosis pedunculisque glabris; foliis ovatis, glabris, serratis, serraturis petiolisque villosis, glandulosis; caule aculeato*. Duroi, Harbk. 2. pag. 344.

*Rosa (chlorophylla), foliis obovatis, dupliciter serratis, glandulosis, glutineis; nitide virantibus; petiolis aculeatis, stipulis serraturis glandulosis; pedunculis glabris; germinibus subglobosis, glabris; lacinis calicinis semipinnatis, glanduliferis*. Ehrh. Beitr. 2. pag. 69.

*Rosa fetida*. Allion, Flor. pedem. n° 1792.

*Rosa lutea, simplex*. Tournef. Inst. R. Heeb. — C. Bauh. Pin. 483. — Dahm. Arbr. vol. 2. pag. 222. n° 36. — Bcyl. Eyth. Vern. 6. tab. 5. fig. 1.

60

*Rosa lucia*. Dalech. Hist. vol. 1. pag. 126. Ic. — Label, pars 2. lc. 209. — Tabern. Hist. 1495. Ic. — J. Bauh. Hist. vol. 2. pag. 47. Ic.

β. *Rosa bicolor*. Jacq. Hort. 1. pag. 1. tab. 1 & 3. pag. 1.

*Rosa* (punicea), *calicibus integris, germinibus globosis, glandulosis; pedunculis glabris; foliis ovatis, glabris, serratis; serraturis petiolisque glandulosis, floribus bicoloribus*. Duroi, Habb. 2. pag. 347.

*Rosa punicea*. Coton. canad. 11.

*Rosa silvestris, austriaca, flore paniceo*. Patkins, Theatr. 1019.

Valgairement rose capucine.

Ceroyer, dont les fleurs, par leurs belles couleurs variées, d'un jaune plus ou moins clair ou d'une couleur ponceau foncé, de dommagent de l'odeur désagréable, conserve, au milieu de ses variétés, des caractères qui le font aisément distinguer. Ces caractères consistent dans l'odeur de punaise qui s'exhale des corolles, tandis que les feuilles ont un peu froissées en ont une agréable & balsamique; de plus, les aiguillons des tiges sont droits & soibles; les pédoncules, ainsi que les ovaires, sont glabres; les folioles du calice munies de quelques aiguillons soibles & rates, ainsi que les pétioles. Il ne doit pas être confondu avec le *rosa rubiginosa*, dont les fleurs sont d'un rouge-tendre, point fetides, quoique très-rapproché par l'odeur & la forme de ses feuilles.

Ses tiges s'élèvent de trois à six pieds; elles sont verdâtres ou brunes, glabres, garnies d'aiguillons assez petits & de rameaux diffus, nombreux, chargés de feuilles alternes, ailées, un peu glutineuses, pétioles, composées de cinq ou sept folioles, & même davantage; petites, ovales, presque sessiles, obtuses à leurs deux extrémités, bordées de dentelures aiguës, inégales, la plupart terminées par une petite glande blanchâtre, visqueuse; elles sont glabres, un peu luisantes & d'un vert-foncé en dessus, un peu plus claires en dessous; les stipules très-finement dentées & glanduleuses, biffes à leur sommet.

Les fleurs sont foliaires, latérales ou terminales, portées sur des pédoncules simples, glabres, nus; les ovaires sont globuleux, très-glabres; les calices à cinq folioles allongées, tubulées, rarement pinnatifides, armées extérieurement de quelques petits aiguillons droits & fins, & de glandes pédicelées; vertes extérieurement, blanchâtres & presque tomenteuses en dedans.

La corolle est grande, à cinq pétales larges, ovales, presque ronds, échantrés en cœur à leur sommet, d'une belle couleur jaune plus ou moins foncée, pourpre ou d'une couleur ponceau en dedans, jaune en dehors, quelquefois panachée

par ces deux couleurs. Les styles sont très-velus, les stigmates d'un pourpre foncé, les anthères lancéolées, bifides à leur base. Ces fleurs, ordinairement simples, se doublent quelquefois.

Cet arbrisseau croit en Angleterre, en Allemagne, en France, dans les départements méridionaux. Je l'ai aussi recueilli à Soissons, dans les haies. Vaillant l'indique aux environs de Paris. (V. v.)

21. ROSIER élégant. *Rosa blanda*. Aiton.

*Rosa germinibus globosis; glabris; caulibus adnatis pedunculisque levibus, inermibus*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 202.

Ses tiges, dans leur jeunesse on à la première année de leur naissance, sont armées d'aiguillons soibles, presque droits, un peu recourbés à leur sommet; ils les perdent bientôt avec l'âge, & deviennent liles, divisées en rameaux cylindriques, nus, luisants, de couleur rougeâtre, garnis de feuilles alternes, ailées, composées ordinairement de sept folioles obliques, rétrécies à leur base, presque cuneiformes, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles & un peu blanchâtres en dessous, inégalement & floement dentées en scie à leurs bords. Les pétioles sont glabres, munis d'une ou de deux petites épines. La corolle est blanche, à cinq pétales échantrés à leur sommet, un peu rétrécis à leur base; l'ovaire glabre, globuleux, surmonté de folioles calcinales, entières, tubulées, très-longues, blanches en dedans & à leurs bords.

Cette plante est originaire de Terre-Neuve & de la baie d'Hudson. (V. f.)

22. ROSIER multiflore. *Rosa multiflora*. Thunb.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque inermibus, villosis; caule petiolisque adnatis*. Thunb. Flot. japon. pag. 214.

On distingue cette espèce par ses fleurs petites, paniculées, soutenues par des pédoncules velus, sans aiguillons.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont droites, divisées en rameaux cylindriques, glabres, droits, de couleur purpurine, munis d'aiguillons épars & recourbés, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de folioles opposées, quelquefois alternes, sessiles, ovales, dentées en scie à leurs bords, vertes & glabres en dessus, pâles & velues à leur face inférieure, dont les pétioles sont également velus; garnis d'aiguillons épars, recourbés, fort petits.

Les fleurs sont terminales, disposées en une panicule étalée & ramifiée; les pédoncules communs & partiels sont velus, dépourvus d'aiguillons. Le calice est tout couvert de poils blancs,

épals, particulièrement sur les bords de ses découpures. La corolle est blanche, de la grandeur de celle de la rose; et les fruits ovales, velus, sans aiguillons.

Cette plante se rencontre au Japon, où elle a été observée par Thunberg. (Descript. ex Thunb.)

### 23. ROSE musquée. *Rosa moschata*. Desf.

*Rosa foliolis quinis, ovatis, serratis, acutis, levibus; floribus corymbois, calicibus albis; laetis inisitis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 450.

*Rosa (moschata), germinibus ovatis pedunculisque villosis, caule petiolisque aculeatis; foliis alongis, acuminatis, glabris; paniculis multifloris*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 207. — Willd. Arb. 819. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1074. n.º 23.

*Rosa calicibus semipinnatis, glandulosis; germinibus ovatis pedunculisque hispides, caule petiolisque aculeatis; foliis ovatis, acuminatis, glabris; stratis corymbois*. ? Duroi, Harbk. 2. pag. 365.

*Rosa (oposifolium), caulibus erectis; foliis ellipticis, acuminatis, glabris; cossis pubescentes, petiolis aculeatis, corymbis multifloris, pedunculis hispides; germinibus ovatis, hispides; lucinis calicibus semipinnatis, subglandulosis, hispides, longitudine petalorum; stylis pubescentibus, longitudine filamentum*. ? Ehrh. Beitr. 2. pag. 72.

*Rosa moschata, simplicis flore*. Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482.

*Rosa moschata minor, flore simplicis*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 45. Icon. 46.

*Rosa moschata alba*. Tabern. Icon. 1086.

*Rosa moschata major*. Tournef. Inst. R. Herb. 637. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 45.

*Rosa moschata major speciosissima*. Lobel. 2. Icon. 208.

7. *Rosa moschata, flore pleno*. Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482.

*Rosa moschata minor, flore plena*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 47. Icon.

*Rosa moschata, alba, multiplex*. Tabern. Icon. 1086.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de six à huit pieds; elles sont, ainsi que les rameaux, armées de forts aiguillons écartés, recrochés; les feuilles sont alternes, ailées, composées ordinairement de cinq folioles ovales, lisses à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, supportées par des pétioles pubescents, ordinairement munis d'aiguillons épais.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en co-

rymbes touffus, qui se divisent en pédoncules très-courts, hispides, ainsi que les calices, qui sont partagés en cinq découpures entières, lanceolées, acuminées, pubescentes intérieurement. La corolle est blanche, de la grandeur de celle du *rosa canina*; les pétales ovales; les fruits ovales.

Cette plante croît en Barbarie, particulièrement dans le royaume de Tunis, parmi les haies. (V. f.)

Les Tunisiens cultivent ce rosier en grand. Ils retirent de ses pétales une huile essentielle très-odorante, connue sous le nom d'essence de *rosa*, & dont le parfum est un des plus agréables que l'on connoisse. Cette essence est très-chère, vu la très-petite quantité que ces fleurs en fournissent.

Il est très-probable qu'il faut rapporter à cette plante plusieurs variétés, qu'on en distingue par la grandeur des individus & par leurs fleurs presque doubles ou semi-doubles. Elles ont aussi quelques rapports avec le *rosa alba*.

### 24. ROSIER à fleurs blanches. *Rosa alba*. Linn.

*Rosa germinibus ovato-oblongis, subhispides; pedunculis hispides; petiolis pubescentibus, subaculeatis; caule aculeato*. (N.)

*Rosa germinibus ovatis, glabris; pedunculis hispides, caule petiolisque aculeatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 705. — Mater. medic. 120. — Miller, Dict. n.º 16. — Crantz. Austr. pag. 85. n.º 5. — Knorr. Del. 1. tab. R. 6. — Roth. Germ. vol. I. pag. 219. — H. 561. — Rerz. 3. pag. 34. — Hoffm. Germ. 176. — Willden. Arb. 322. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1080. n.º 39. — Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 130. n.º 759. IX.

*Rosa caule aculeato, pedunculis hispides; calicibus semipinnatis, glabris*. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 492.

*Rosa calicibus semipinnatis, germinibus ovatis, glabris; pedunculis hispides; caule petiolisque villosis, aculeatis; foliis ovatis, subhis villosis*. Duroi, Harbk. 2. pag. 361.

*Rosa alba, vulgaris, major*. Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. — Duhamel, Arbr. n.º 16.

*Rosa alba*. Tabern. Icon. 1083.

*Rosa sativa prima*. Dodon. Pempt. 186. Icon.

8. *Rosa alba, flore pleno*. Tournef. Inst. R. Herb. 637. — Efl. Vern. 6. tab. 3. fig. 1. — Blackw. tab. 73. — Kniph. Centur. 3. n.º 76.

*Rosa candida, plena & semiplena*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 44. Icon. Mala.

9. *Eadem, flore rubella*. (N.)

*Rosa (damascena), calicibus semipinnatis; ger-*



*minibus ovatis*, tug'dis, p'uncu'isq'ue hisp'idis ; *caule petiolisq'ue acutis* ; *foliis ovatis*, acum'is, *subtus villosis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 205. — Duroi, Harbk. 2. pag. 369. — Willd. Arb. 316. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1072. n°. 16. — Retz. Observ. 3. pag. 33.

*Rosa damascena*. Dalech. Hist. 1. pag. 125. Icon.

On distingue cette espèce à ses pédoncules hérissés de petits aiguillons fins, ainsi que les calices, & même très-souvent les ovaires ; à ses pétioles pubescens : ses fleurs sont blanches, quelquefois légèrement teintées de rose dans la variété *γ*.

Ses tiges sont hautes de trois à quatre pieds, chargées de rameaux nombreux, diffus, garnis d'aiguillons, & munis de feuilles alternes, ailées, composées de cinq à sept folioles ovales, quelquefois un peu arrondies, glabres à leurs deux faces, vertes & sombres en dessus, un peu blanchâtres en dessous, portées sur des pétioles pubescens, ainsi que la principale nervure, & munies de quelques petits aiguillons très-rarement.

Les fleurs sont solitaires ou presque fasciculées, latérales & terminales, supportées par des pédoncules simples, longs, cylindriques, chargés d'aiguillons fins, droits, inégaux, très-nombreux, beaucoup plus rares, & même presque nuls sur les ovaires ; plus fins, plus nombreux sur les calices où ils ne sont plus que des poils roides, glanduleux. L'ovaire est ovale, plus ou moins allongé ; les divisions du calice hispides & un peu pinnatifides. La corolle est blanche, grande, d'une odeur peu agréable ; les pétales échancrés en cœur à leur sommet.

Ces fleurs se doublent aisément, & fournissent la variété *β* des jardins, qui en fournit beaucoup d'autres dont le passage est insensible, & qui diffèrent, soit par le nombre & la grandeur de leurs pétales, soit par la petitesse des arbrisseaux.

Celle que l'on nomme vulgairement rose de damas, var. *γ*, ne me paroît pas devoir être séparée de celle-ci, quoique ses pétales prennent quelquefois une légère teinte rougeâtre, & que ses folioles soient velues en dessous, plus allongées, acuminées, & ses ovaires plus gros & comme renflés.

Cette espèce croît naturellement dans les contrées méridionales de l'Europe, aux lieux incultes & un peu couverts : on la cultive dans quelques jardins. *γ* (V. v.)

25. ROSIER des champs. *Rosa arvensis*. Linn.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque glabris*, *caule petiolisque aculeatis*, *floribus cymosis*. Linn. Mant. 245. — Hudf. Angl. 192. — Scholl. Barb. n°. 400. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. 1.

pag. 217. — Il. 554. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 129. n°. 75. Vil.

*Rosa germinibus subglobosis, glabris ; pedunculis hisp'idis*, *caule repente petiolisque aculeatis*, *floribus subsolitariis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1066. n°. 6.

*Rosa* (heryorodon), *caulibus pl'urisque repensibus ; aculeis sparsis, recurvis ; foliis ternatis, ovatis, glabris ; petiolis acutis, pauculis hisp'idis ; germinibus jug' oppositis, glabris ; segmentis calicinis subpinnatifidis ; stylis po'efcentibus, longitudine flaminum*. Ehrh. Beitr. 2. pag. 71.

*Rosa* (silvestris), *germinibus ovatis, glabris ; pedunculis scabris ; calicis foliolis ovatis, subtegris tenuique mucrone terminatis ; stylis elongatis, caule petiolisque aculeatis*. Roth. Catal. 1. pag. 59. — Herm. Dissert. de rosa, pag. 18. n°. 5. — Poilich, Pal. n°. 485.

*Rosa si'enis recurvis ; foliis glabris, septenis ; calicibus tomentosis, segmentis subpinnatis ; tubis longis, barbatis*. f. Haller, Heiv. n°. 1102.

*Rosa spinosissima*. Wedd. Flor. dan. tab. 398.

*Rosa arvensis, candida*. Tournef. Inst. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 484.

*Rosa silvestris altera, minor ; flore albo*. Rai, Angl. 3. pag. 455.

*Rosa silvestris, folio glabro, flore planè albo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 44. Icon.

*Rosa silvestris, quarta species*. Trag. 988.

*β. Rosa campistris, repens, alba*. Tournef. Inst. R. Herb. 638. — C. Bauh. Pin. 484.

*Cynosbatus, sive cynorrhodon*. Cord. in Diosc. 19.

Souvent cette espèce a des tiges presque rampantes, très-ramulées, longues de trois à quatre pieds : ses rameaux sont fermes, durs, bleuâtres, ou de couleur pourpre foncée, glabres, cylindriques, armés d'aiguillons forts, recourbés, très-aigus, épars, garnis de feuilles alternes, ailées, composées de sept ou cinq folioles ovales, d'un vert-obscur en dessus, un peu plus pâles & plus claires en dessous, glabres, quelquefois un peu arrondies, crénelées à leur contour, obtuses à leurs deux extrémités ; supportées par des pétioles glabres, munis de quelques aiguillons courts, & à leur base d'une bractée élargie, entière ou finement denticulée vers son sommet.

Les fleurs sont parfaitement blanches, supportées par des pédoncules médiocres, solitaires, souvent rapprochés en cime, légèrement hispides ou presque nus, selon l'âge & les variétés. Le calice est presque glabre, ses divisions simples ou un peu pinnatifides vers leur sommet, vertes ou purpurines. La corolle est assez grande ; les pétales.

échancrés à leur sommet. L'ovaire un peu globuleux ou allongé, glabre; les styles pubescents, de la longueur des étamines.

Cette plante croît presque partout en Europe, dans les haies, sur le bord des chemins & aux lieux incultes. (V. v.)

*Observations.* Cette plante varie par ses aiguillons plus ou moins nombreux, par ses feuilles plus petites, un peu arrondies, par ses pédoncules presque glabres, par ses corolles moins amples, & par ses calices à découpures entières & sans prolongement.

26. *ROSIER toujours vert. Rosa sempervirens.* Linn.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque hispida, caule petiolisque aculeatis, floribus subumbellatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 5. pag. 704. — Miller, Dict. n° 9. — Hoffm. Germ. 176. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 218. — II. 556.

*Rosa caule aculeato; foliis quinis, glabris, perennantibus.* Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 92.

*Rosa (sempervirens), germinibus ovatis, calicibus pedunculisque hispitis, caule petiolisque aculeatis, floribus subumbellatis; bracteis lanceolatis, reflexis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 205. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1072. n° 18.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque hispitis, caule petiolisque aculeatis; foliis lanceolatis, subcarneosis & exnatis.* Duroi, Harbk. 2. pag. 338.

*Rosa sempervirens Jungermanni.* Clus. Hist. 2. Append. alter. — Dillen, Elth. 326. tab. 246. fig. 318.

*Rosa moschata, sempervirens.* Tournef. Inst. R. Herb. 637. — C. Bauh. Pin. 482. — Duham. Arb. vol. 2. n° 22.

*Rosa sempervirens Clusii.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 48. Abique Icon.

*Rosa sempervirens, flore prorsus nivei candoris.* Clus. Hist. Append.

g. *Rosa (scandens), caule aculeato; foliis perennantibus, lucidis; flore odorato.* Miller, Dict. n° 8.

*Rosa silvestris Dumetorum, scandens, sempervirens; myrtilifolio lucido; flore albo, odorato; fructu parvo, rotundo & hispido.* Michx. Catal. Plant. Ag. Flor.

Un des principaux caractères de ce rosier, qui a d'ailleurs beaucoup de rapports avec le *rosa moschata*, est de conserver ses feuilles vertes toute l'année.

Ses riges s'élèvent à la hauteur de quatre à cinq pieds; elles se divisent en rameaux diffus, cylindriques, glabres, revêtus d'une écorce vert &

armés d'aiguillons très-forts, blanchâtres, recourbés. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées ordinairement de cinq folioles épaisses, luisantes, très-glabres, ovales, lancéolées, acuminées, légèrement dentées en scie à leurs bords, persistantes, portées par des pétioles glabres, munis de quelques aiguillons & de stipules médiocrement élargies, denticulées à leur contour.

Les fleurs sont terminales, réunies presque en ombelle, soutenues par des pédoncules hispides, ainsi que les calices. Les bractées sont linéaires, lancéolées, étroites, acuminées; elles forment une sorte d'involucre commun à la base des pédoncules. Les folioles calicinales sont ovales, oblongues, hérissées, entières, subulées à leur sommet, blanchâtres à leurs bords. Les corolles sont blanches, très-odorantes, musquées, à cinq pétales un peu échancrés en cœur; elles deviennent quelquefois doubles par la culture. Les ovaires sont ovales ou un peu globuleux, rudes, hispides.

Cette plante croît naturellement en Espagne, dans quelques contrées de l'Allemagne & de la France. Je l'ai rencontrée dans les environs de Marseille, sur les bords de l'Uveaune. On la cultive dans les bosquets, où ses feuilles persistantes procurent toute l'année une verdure agréable. Ses fleurs paroissent vers le commencement de l'été & se succèdent jusque dans l'automne. (V. v.)

La plante g, originaire d'Italie, croît dans les bois aux environs de Florence. Ses tiges rampent sur la terre lorsqu'elles ne sont pas soutenues; étant fixées à un soutien, elles s'élèvent à la hauteur de douze & quatorze pieds, armées d'épines courtes & rougeâtres. Les folioles sont petites, ovales, acuminées, d'un vert-luisant, persistantes. Les fleurs sont blanches, petites, musquées, & se succèdent pendant plusieurs mois. Dans les jardins d'Angleterre elle ne fleurit qu'au commencement de l'été.

Malgré la différence de port que présente cette plante, elle possède tellement tous les caractères du *rosa sempervirens*, que je n'ai pu me déterminer à l'en séparer.

27. *ROSIER des montagnes. Rosa montana.* Villars.

*Rosa germinibus oblongis pedunculisque hispitis, petiolis aculeatis, caule aculeis stipularibus uncinatis; foliis glabris, obovatis, glanuloso-ferratis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1076. n° 29.

*Rosa (montana), petiolis aculeatis; foliis oppositis, saurundis; germinibus hispitis; calicibus pifilisque persistantibus, villosis.* Vill. Dauph. vol. 3. pag. 547.

Cette espèce, rapprochée du rosier à fleurs blanc-

ches & de celui des champs, offre des différences suffisantes pour qu'on puisse l'en distinguer, quoiqu'il soit difficile d'adhérer positivement qu'il n'en est point une variété. Ses feuilles sont entièrement glabres, presque orbiculaires; les vraies hispides: toutes les parties de cette plante, plus ou moins glanduleuses, en établissent les principaux caractères, qui ne se rencontrent point dans le *rosa alba* ni dans le *rosa arvensis*.

Ses tiges sont glabres, rameuses; les rameaux cylindriques, armés ordinairement de deux aiguillons crochus un peu au dessous de l'insertion des feuilles. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées de sept ou cinq folioles un peu ovales ou arrondies, rétrécies à leur base, très-glabres, plus pâles à leur face inférieure, doublées de dents en scie; les dentelures glanduleuses; les pétioles munis de poils glanduleux & de quelques aiguillons, particulièrement à leur partie inférieure.

Les fleurs sont solitaires, suppurées par des pédoncules hispides, dépourvus d'aiguillons; les ovaires oblongs, également hispides; les pétales blancs, échancrés en cœur à leur sommet; les étamines velus, ainsi que les pistils qui persistent avec eux.

Cet arbrisseau croît dans la Suisse & sur les montagnes des environs de Grenoble. *h* (*V. f.*)

28. ROSIER à feuilles luisantes. *Rosa lucida*, Ehrh.

*Rosa germinibus depressis - globosis pedunculisque subhispidis; petiolis glabris, subaculeatis; caule glabro, aculeis stipularibus rectis; foliis oblongo-ovatis, nitidis, glabris; floribus subgeminatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1068. n. 10. — Idem, Arbr. 410.

*Rosa (lucida), foliis pinnatis; foliolis ovato-lanceolatis, obtusiusculis, grossis serratis, glaberrimis, nitidis; petiolis subaculeatis, glabris; corymbis paucifloris, pedunculis subhispidis; germinibus depressis-globosis, subhispidis; foliolis calicinis integris.* Ehrh. Beitr. 4. pag. 11.

*Rosa carolina fragrans, foliis medio tenus serratis.* Dill. Eltham. 325. tab. 245. fig. 316.

*Rosa finica.* Hort. Paris.

Il paroît que cette espèce avoit d'abord été confondue avec le *rosa caroliniana*, dont cependant elle est fort distincte, tant par ses feuilles, que par la disposition de ses fleurs & la forme de ses ovaires.

Ses tiges sont glabres, hautes de quatre à cinq pieds, & se divisent en rameaux diffus, garnis d'aiguillons droits & stipulaires; munies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles

oblongues, presque elliptiques, glabres à leurs deux faces, luisantes, à grosses crénelures à leurs bords, entières vers leur base, suppurées par des pétioles glabres, munis de quelques aiguillons raes.

Les fleurs sont adnantes, réunies deux ou trois en forme de corymbe lâche, souvent par des pédoncules inégaux, simples, légèrement hispides. Le calice à toutes les découpures entières, linéolées, acuminées, quelquefois pinnatifides. La corolle, d'un rouge tendre ou fané, à cinq pétales larges, échancrés à l'ur sommet. Les ovaires font globuleux, gros, comprimés à leur sommet, couverts de quelques poils roides & courts.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique; les fleurs se doublent très-facilement. *h* (*V. v. in hort. Dupont.*)

29. ROSIER de Caroline. *Rosa caroliniana*, Linn.

*Rosa germinibus globosis, hispidis; pedunculis subhispidis, caule aculeis stipularibus, petiolis aculeatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 703. — Wangenh. Amer. 112. tab. 35. fig. 71.

*Rosa foliis serratis, medio tenus integerrimis.* Linn. Spec. Plant. pag. 492.

*Rosa (carolina), germinibus globosis pedunculisque subhispidis, petiolis pilosis subaculeatis, caule glabro, aculeis stipularibus subuncinatis, foliolis oblongo-lanceolatis, floribus corymbosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1069. n. 11. — Idem, Arbr. 311.

*Rosa germinibus globosis pedunculisque hispidis, petiolis aculeatis, caule glabro, aculeis stipularibus, foliis glabris.* Vait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 203.

*Rosa (caroliniana), pumila; caule levi; aculeis stipularibus binis, acicularibus, patulis; petiolis aculeatis; foliolis ovalibus lanceolatis; fructibus globosis, hispidis.* Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 295.

*Rosa (corymbosa), foliis pinnatis; foliolis ovato-lanceolatis, acutis, argente serratis, subtus pubescentibus, glaucis; petiolis subaculeatis, pilosis; corymbis multifloris, planis; pedunculis pubescentibus, apice subhispidis; germinibus globosis, subhispidis; foliolis calicinis integris.* Ehrh. Beitr. 4. pag. 21.

*Rosa (virginiana), calicibus integris, petalis longioribus; germinibus globosis, hispidis; pedunculis glabris; petiolis carinatis, villosis; foliolis ovatis, glabris; floribus umbellatis.* Duroi, Harbk. 2. pag. 333.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, composé de rameaux diffus & nombreux, dont les tiges sont lisses, cylindriques, striées, garnies de feuilles alternes, pétiolées, composées d'environ sept folioles ovales, oblongues, à peine d'un pouce de long; glabres à leurs deux faces,

vertes en dessus, plus pâles & un peu glauques en dessous, finement denticulées à leurs bords, obtuses ou aiguës à leur sommet. Les périoles sont à peine pubescentes, munis d'aiguillons fins, courts, aciculés, outre deux aiguillons plus forts, d'un jaune-clair, un peu courbés vers leur sommet, situés à l'insertion des jeunes rameaux. Les stipules sont étroites, allongées, décurrentes, légèrement bifides à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en corymbes, presque en ombelles à l'extrémité des rameaux. Les pédoncules, dépourvus d'aiguillons, sont chargés, surtout à leur partie supérieure, de poils courts, nombreux, glanduleux, ainsi que les ovaires; les divisions du calice entières, hispides, largement acuminées. La corolle est rougeâtre, à peine plus longue que le calice; les pétales en cœur renversé; les fruits hispides & globuleux.

Cette plante croît dans la Géorgie, la Caroline & la Virginie, dans les lieux aquatiques; elle m'a été communiquée par M. Bosc. *h* (V. f.)

30. ROSIER à calice cilié. *Rosa fetigera*. Mich.

*Rosa ramis glabra, gemino-oculeatis; foliis 3-5-foliatis; petiolo nervoque oculatis; calicis globosis locinatis, subgeminatis fetigeris*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 293.

Var. *p. Eadem, elatior, locinatis subius puberulis, locinatis calicinis, variis fetigeris*. Mich. L. C.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, munis de deux aiguillons stipulaires à la base des feuilles & de quelques autres beaucoup plus rares, épars le long des branches, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de trois à cinq folioles glabres, acuminées, dont les périoles, ainsi que la principale nervure des folioles, sont chargés de quelques petits aiguillons. Le calice est globuleux; il se divise en cinq découpures allongées, dont les bords sont garnis de cils longs, setacés, nombreux, disposés comme les barbes d'une plume.

La plante offre une variété assez remarquable. Les branches & les rameaux sont beaucoup plus étalés; les aiguillons dispersés sans ordre; les folioles légèrement pubescentes, particulièrement le long de leurs nervures, & les découpures du calice bien moins chargées de cils à leurs bords.

Ces plantes ont été observées par Michaux dans la Caroline inférieure. *h* (Descript. ex Mich.)

31. ROSIER à feuilles lisses. *Rosa levigata*.

*Rosa glaberrima, subgeminatis aculeata; foliis 3-5-foliatis, subnerviis; stipulis angustis, mucronibus subulatis; calice ovato, promissis hispido-finis; locinatis integris*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 295.

Toutes les parties de cette plante sont glabres: ses rameaux sont munis d'aiguillons épars, ordinairement rapprochés deux par deux; durs, recourbés, foliaires à la base des périoles. Les feuilles sont alternes, ailées, composées de folioles très-lisses, ovales, lancéolées, presque sans nervures sensibles, au nombre de trois à cinq; pourvues de bractées étroites, divisées à leur sommet en deux pointes subulées & mucronées. Le calice est ovale, chargé sur son tube d'épines longues, étroites, divisé à son orifice en cinq découpures lanceolées, acuminées, entières à leurs bords.

Cette plante a été recueillie par Michaux dans la nouvelle Géorgie en Amérique. *h* (Descript. ex Mich.)

32. ROSIER de Pensilvanie. *Rosa pensilvanica*. Mich.

*Rosa caule glabro, possum uncinulis germinatis; foliolis 5-7 oblongo-ovalibus, subius furcatis; fructu depressio, globofo*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 296.

Arbrisseau dont les tiges sont glabres, & se divisent en rameaux munis de petits aiguillons un peu recourbés, & rapprochés deux par deux; garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées de cinq à sept folioles ovales, oblongues, vertes à leur face supérieure, légèrement blanchâtres en dessous, & dont les périoles font quelquefois chargés de quelques aiguillons épars très-courts. Les fruits sont globuleux, un peu comprimés à leurs deux extrémités.

Cette plante croît en Amérique, dans les lieux marécageux de la Pensilvanie & de la Nouvelle-Angleterre, où elle a été découverte par Michaux. *h* (Descript. ex Mich.)

33. ROSIER à feuilles ridées. *Rosa rugosa*. Thunb.

*Rosa germinibus globosis, glabris; pedunculis caule petiolisque oculatis; foliis subius tomentosis*. Thunb. Flor. japon. pag. 213.

Arbrisseau peu élevé, dont les rameaux sont cylindriques, légèrement tomenteux, chargés d'aiguillons nombreux, très-rapprochés, ouverts, de couleur blanchâtre; les uns très-forts, d'autres plus petits. Les feuilles sont alternes, ailées avec une impaire, composées la plupart de neuf folioles niales, obtuses, terminées par une pointe particulière, dentées en scie à leurs bords, ridées à leurs deux faces, vertes en dessus, tomenteuses & veinées en dessous; longues d'un pouce, supportées par un pétiole pubescent, armé d'aiguillons épars, ouverts, blanchâtres.

Les fleurs ont un calice velu en dehors, tomenteux en dedans de ses découpures. Les fruits sont glabres & globuleux.

Cette plante croît au Japon. Ses feuilles ridées & mucronées, ses aiguillons extrêmement nombreux, la distinguent des autres espèces. *h* (*Descr. ex Thunb.*)

34. ROSIER à longues feuilles. *Rosa longifolia*. Willden.

*Rosa germinibus ovatis, glabris; pedunculis glandulosis-fubaculeatis, caule subinermi, petiolis aculeatis; foliis glabris, ovatis, acuminatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1079. n°. 37.

Cette espèce, très-voisine du *rosa indica*, en diffère par ses folioles plus allongées, glabres à leurs deux faces, & par les pédoncules glanduleux.

Ses tiges sont glabres, fortes, sans épines, munies de rameaux longs d'un pied, nus, garnis de feuilles alternes, ailées, composées de cinq folioles ovales, acuminées, longues d'un pouce & demi à deux pouces, l'impair plus allongée, glabres tant en dessus qu'en dessous, en dents de scie écartées, supportées par des pétioles chargés de poils épars, glanduleux, & pourvus d'un ou deux aiguillons recourbés.

Les fleurs sont presques disposées en corymbes, soutenues par des pédoncules hérissés à leur partie supérieure de poils nombreux, glanduleux, & rarement de quelques petits aiguillons. Les divisions du calice sont acuminées, foliacées, dentées, glabres à l'extérieur, tomenteuses en dedans. La corolle est aussi grande que celle du *rosa canina*; les fruits glabres, ovales.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. *h* (*Descr. ex Willd.*)

35. ROSIER des Indes. *Rosa indica*. Linn.

*Rosa germinibus ovatis pedunculisque glabris, caule subinermi, petiolis aculeatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 705. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1079. n°. 36.

*Rosa subinermis, foliis quinis, subtus tomentosis; impari majori, stipulis obsoletis.* Linn. Spec. Plant. pag. 402.

*Rosa chensun glabra, juniperi fructu.* Petiv. Gaz. pag. 57. tab. 35. fig. 11.

On distingue cette espèce du *rosa longifolia*, dont elle est très-rapprochée, à ses folioles plus courtes, tomenteuses en dessous, & à ses pédoncules glabres.

Ses rameaux sont ordinairement dépourvus d'aiguillons; quelquefois cependant on y trouve une ou deux épines courtes, très-fines, proche les feuilles ou sur les pétioles. Les feuilles sont alternes, pétioles, ailées, composées de cinq folioles glabres en dessus, tomenteuses à leur face inférieure, dentées en scie à leurs bords; la fo-

liole terminale, du double plus grande que les autres.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules simples, nus, allongés; leur calice est lisse & incisé à ses découpures; les fruits ovales, de la grosseur de ceux du *forbus aucuparia*.

Cette espèce croît à la Chine. *h* (*Descr. ex Linn.*)

36. ROSIER bractéolé. *Rosa bracteata*. Vent.

*Rosa germinibus obovatis, pedunculis bracteatis ramulisque villosis, caule petiolisque aculeatis; foliis glabris, subrotundis, crenatis, subaculeatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1079. n°. 38.

*Rosa (bracteata), germinibus pyriformibus, sericeis, bracteatis; caule sericeo, aculeato; foliis pinnatis, aculeatis; foliis ovatis, crenatis, glabris, subaculeatis; floribus solitariis.* Wendl. Observat. pag. 50.

*Rosa aculeata, foliis obovatis, floribus bracteatis, laciniis calicinis nudis; petalis obovatis, mucronatis.* Vent. Jard. de Cels, pag. 28. tab. 28.

Petit arbrisseau remarquable par les bractées qui forment presqu'un second calice autour de les fleurs, & par les pétioles surmontés d'une petite pointe dans leur échancre.

Ses tiges sont velues, chargées d'aiguillons droits, solitaires, épars; ses feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de cinq ou sept folioles elliptiques, presqu'arrondies, un peu coriaces, glabres à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure, crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet; leur pétiole muni de quelques aiguillons crochus, ainsi que la principale nervure des feuilles; les stipules adhérentes à la base du pétiole, divisées en deux lobes linéaires, pointus.

Les fleurs sont terminales, solitaires, très-odorantes, supportées par un pédoncule très-court. Le calice se divise en cinq folioles entières, ovales, lancéolées, acuminées, velues & foveuses; la corolle d'un beau blanc, jaunâtre par la dessiccation; les pétales en cœur, mucronés dans leur échancre; l'ovaire ovale, pyriforme, couvert de poils couchés & soyeux, enveloppé à sa base de six ou huit bractées lancéolées, foveuses & velues, concaves, découpées, frangées à leur bord supérieur, souvent terminées par une foliole ovale; les anthères d'un jaune-doré, vacillantes; les styles latéraux, capillaires, verdâtres; les stigmates ciliés, évasés en coupe, d'un violet-pourpre.

Cette plante croît en Chine, d'où elle a été rapportée par le lord Macartney. *h* (*V. v.*)

37. ROSIER à petites fleurs. *Rosa parvifolia*.

*Rosa germinibus depresso-globosis pedunculisque hispidis;*

*hispidis*; *petiolis pubescentibus*, *subaculeatis*; *caule glabro*; *aculeis stipularibus*, *reclis*; *foliis ellipticis*, *floribus subgeminatis*. Willd. Arb. 309. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 1068.

*Rosa* (parviflora), *caule aculeis reclis*, *stipularibus*; *foliis pinnatis*; *foliolis elliptico-lanceolatis*, *simpliciter serratis*, *glabris*; *petiolis subaculeatis*, *stipulis serratis*, *pedunculis hispidis*; *germinibus globosis*, *hispidis*; *foliolis calicinis*, *hispidis*. Ehrh. Beitr. 4. pag. 21.

*Rosa* (carolina), *calicibus subinægris*, *petalis longioribus*; *germinibus globosis*, *hispidis*; *aculeis stipularibus* *geminis*; *foliolis ovatis*, *acutis*, *medio serratis*, *subtus albicantibus*; *floribus pleno*. Wangerh. Amer. pag. 113.

*Rosa humilis*. Marsh. Arb. 285.

Peut-être cette plante n'est-elle qu'une variété intermédiaire entre le *rosa lucida* & le *rosa caroliniana*, avec lesquels elle a de grands rapports, & dont elle diffère par ses tiges plus basses, par ses pétioles pileux à leur partie supérieure, & par ses fleurs geminées; elle n'a point les feuilles luisantes & les pétioles glabres du *rosa lucida*, ni les fleurs en corymbes, les feuilles épaisses & les folioles lancéolées du *rosa caroliniana*.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux pieds environ, & se divisent en rameaux glabres, armés à la base des feuilles de deux aiguillons droits, aigus, & de feuilles pétioles, alternes, ailées, composées de folioles glabres, ovales ou elliptiques, un peu blanchâtres en dessous, dentées en scie à leurs bords, supportées par des pétioles pubescents vers leur partie supérieure, quelquefois munis d'aiguillons rares & fort petits, & de stipules dentées en scie.

Les fleurs sont axillaires, latérales, ordinairement deux à deux, soutenues par des pédoncules légèrement hispides, ainsi que les divisions du calice, qui sont entières & plus longues que les pétales. La corolle est rougeâtre, petite; les ovaires globuleux, hispides, légèrement comprimés.

Cet arbrisseau croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique. Ses fleurs se doublent aisément. ♀ (V. f.)

**ROSINAIRE.** *Arundinaria*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec le *arundo*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, qui ont le port des roseaux, les fleurs polygames, disposées en panicules, & les épillets composés d'un grand nombre de fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs polygames; des épillets à fleurs nombreuses. Botanique. Tome VI.

brefues; trois étamines; trois stigmates en pinceau; un ovaire accompagné de deux appendices lancéolés.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont mâles ou hermaphrodites.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de deux valves courtes, inégales, renfermant de cinq à douze fleurs.

2°. Une corolle à deux valves presque égales, mutiques; la valve extérieure oblongue, lancéolée, très-aiguë; l'intérieure un peu plus petite.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, pendans, terminés par des anthères linéaires, légèrement bifides à leurs deux extrémités.

Un ovaire stérile dans les fleurs mâles, accompagné de deux appendices latéraux, planes, larges, lancéolés, aigus, de la longueur de l'ovaire, & qui existe également dans les fleurs mâles & dans les fleurs hermaphrodites.

4°. Dans les fleurs hermaphrodites, un ovaire oblong, surmonté de trois stigmates presque filiformes, oblongs, en forme de pinceau, divisés en un grand nombre de filaments sétacés.

Les semences sont grosses, oblongues, presque ovales, nues, marquées d'un sillon sur leur dos.

#### E S P È C E.

**ROSINAIRE à gros fruits.** *Arundinaria macrostema*.

*Arundinaria altissima*, *glabra*, *foliis lineari-lanceolatis*, *subdistichis*. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 74.

C'est une plante dont les cannes s'élèvent très-haut & ont le port du bambou; ils sont droits, articulés, très-glabres, garnis de feuilles linéaires, étroites, lisses, lancéolées, disposées sur deux rangs opposés. La panicule est ample, terminale, assez semblable à celle des roseaux, rameuse, composée d'épillets de cinq à douze fleurs, dont les deux valves calicinales sont courtes & inégales; celles de la corolle, beaucoup plus grandes, sont mutiques; l'extérieure très-aiguë, lancéolée, un peu arrondie, convexe extérieurement; l'intérieure canaliculée en dehors.

Outre ces deux valves, il en existe encore deux autres intérieures, qu'on peut regarder comme deux appendices qui accompagnent l'ovaire, tant dans les fleurs mâles que dans les fleurs hermaphrodites. Les stigmates, au nombre de trois, sont presque sessiles, divisés en filaments nombreux, très-longs, sétacés, réunis en pinceau: il leur succède des semences grosses, ovales, oblongues, presque cylindriques, un peu arquées; elles se

P p

détachent de leurs valves, & conservent à leur sommet les vestiges des stigmates.

Cette plante a été observée par Michaux sur les bords du Mississipi; dans la Caroline & la Floride, où elle fleurit au commencement du printemps.

**ROSSOLIS.** *Drosera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des caprires, qui a des rapports avec les *roridula*, & qui comprend des herbes, les unes indigènes, les autres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, la plupart radicales, chargées de cils glanduleux, munies, à la base de leur pétiole, d'un appendice cilié. Les fleurs sont disposées en épi terminal.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures profondes; cinq pétales; une capsule à une loge, s'ouvrant en cinq valves à son sommet, contenant plusieurs semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, persistant, divisé en cinq découpures profondes, droites, aiguës.

2°. Une corolle à cinq pétales persistants, ovales, obtus, un peu plus longs que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont subulés, de la longueur du calice, terminés par des anthères fort petites, droites, ovales.

4°. Un ovaire supérieur, presque globuleux, surmonté de cinq styles simples, aussi longs que les filamens, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule presque ovale; à une seule loge, un peu anguleuse, s'ouvrant en cinq valves à son sommet, & renfermant plusieurs semences fort petites, presque ovales.

*Observations.* Les espèces contenues dans ce genre sont toutes remarquables par un port qui leur est particulier, & qui le rendent très-naturel, malgré quelques différences dans le nombre des parties de la fructification, surtout dans celui des étamines & des styles.

Toutes ces plantes sont petites, herbacées, la plupart glabrescentes, chargées, particulièrement sur leurs feuilles, de poils glanduleux, plongées dans la rosée, dont elles paroissent plus couvertes que les autres plantes, croissant de préférence dans les lieux humides, marécageux. Les fleurs sont peu nombreuses; elles forment ou un épi simple, ou de petites grappes à peine rameuses à l'extrémité des tiges, qui sont ou nues ou feuillées, simples, rarement rameuses.

Le *roridula* paroîtroit, d'après son port, ne de-

voir former qu'un même genre avec celui-ci; mais, outre qu'il n'a qu'un seul style, les capsules sont à trois loges & à trois valves; ce qui le distingue des *drosera*, qui ont encore des rapports, mais plus éloignés, avec le *dionaea*.

Roth prétend qu'on peut observer dans les *drosera* d'Europe le même phénomène que présente le *dionaea muscipula*. Si un petit insecte vient à se poser sur les feuilles, les poils glanduleux qui les environnent à leur contour, éprouvent une sorte d'irritabilité, se replient sur la feuille, retiennent l'insecte, qui se trouve ensuite entièrement incarcéré par la feuille elle-même, qui se ferme.

#### ESPÈCES.

1. **ROSSOLIS à fleur radicale.** *Drosera acutis.* Linn.

*Drosera flore radicali, scapo solitario, foliis oblongis.* Linn. f. Suppl. pag. 188.

*Drosera flore radicali, solitario.* Thunb. Prodr. 57 & Dissert. botan. de drof. pag. 46. n°. 1.

C'est une des espèces les plus remarquables de ce genre, & une des plus petites; elle n'a ni tige ni hampe, mais elle pousse plusieurs feuilles radicales, sessiles, entières, ovales, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, presque disposées en rosette.

Elles renferment dans leur centre une seule fleur, sessile ou supportée par un pédicule très-court. La corolle est blanche, composée de cinq pétales ouverts; elle contient cinq étamines, autant de styles courts, filiformes, très-ouverts, blanchâtres, quelquefois bifides, terminés par des stigmates à deux divisions ou plumbeux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

2. **ROSSOLIS à longues feuilles.** *Drosera longifolia.* Linn.

*Drosera scapis radialis, foliis ovali-oblongis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 403. — Flor. japon. 110. — Flor. suc. 155. 174. — Rny. Lugd. Bat. 417. — Poilich, Pal. n°. 325. — Hoffm. Germ. 115. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 62. n°. 700. — Roth, Germ. l. p. 140. — Hb. 375. — Petiv. Herb. tab. 63. fig. 11 & 12. — Gärtn. de Fruct. & Sem. Centur. 4. tab. 61. fig. 2. — Lam. Illust. Gener. tab. 220. n°. 2.

*Drosera (longifolia), scapis radialis, brevibus; foliis cuneato-obovatis.* Michx. Flor. boreal. amer. vol. 1. pag. 186.

*Rorella foliis ellipticis, caule nudo, pauciflora.* Haller, Helv. n°. 833.

*Ros folis major, seu longifolia.* Barrel, Ic. rar. 251. n°. 41.

*Ros folia, folio oblongo.* Tournef. Inst. R. Herb. 245. — C. Bauh. Pin. 357. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 620. §. 15. tab. 4. fig. 1.

*Ros folia.* Dodon. Pempt. 474. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 767. 1c. interior. — Dalech. Hist. 2. pag. 1212. 1c.

*Salsifera seu sponfa folia, seu ros folia, seu rorella.* Thal. Herc. 116. tab. 9. fig. 2.

*Rorida seu ros folia, & Drofion recentiorum.* Lobel, 1c. 811.

a. *Drofera* (anglica), *fuspis radicatiss, foliis sub lanceolatis, capsula quadrivalvi.* Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 515. n°. 5. — Berneal. Nat. Hist. of Gr. Britain. 2. pag. 103. *An varietas?*

*Ros folia, folio oblongo, maximum.* Tourn. Inst. R. Herb. 245.

*Ros folia major, longiore folio & erectiore.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 620. §. 15. tab. 4.

*Rorella longifolia, maxima.* Rai, Synopf. 227.

g. *Ros folia, folio oblongo, perennis.* Tourn. Inst. R. Herb. 245.

*Rorella longifolia, perennis.* Rai, Synopf. 227.

Cette plante, qu'on pourroit regarder au premier aspect comme une variété du *drofera rotundifolia*, en est cependant bien distincte par ses feuilles rétrécies & allongées en pétiole à leur base.

Ses racines sont divisées en plusieurs fibres diffuses, de couleur noirâtre, d'où s'élèvent plusieurs hampes nues, droites, glabres, cylindriques, basses, un peu plus longues que les feuilles : celles-ci sont toutes radicales, pétioles, ovales, oblongues, arrondies à leur sommet, rétrécies en pointe à leur base, striées à leurs deux faces, garnies à leurs bords de longs cils droits, inégaux, glanduleux à leur sommet. Les pétioles sont très-longs, glabres, filiformes, redressés.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, des petites grappes simples, presque unilatérales : souvent aussi ces grappes sont divisées en deux ou trois ramifications alternes ou presque en ombelle. Chaque fleur est pédiculaire, munie d'un calice à cinq divisions aiguës, & d'une corolle blanche à cinq pétales ovales, obtus, un peu recourbés en dedans, à leur sommet. Les capsules sont petites, pyriformes, un peu acuminées à leur sommet, glabres, unifolaires.

Cette espèce fournit quelques variétés, qui ne diffèrent entr'elles que par les feuilles plus grandes & les hampes plus élevées. Willdenow remarque que les individus qui croissent dans les lieux humides ont une tunique particulière, & que ceux qu'on recueille dans les endroits secs en sont privés ; mais que leurs semences, vues à la loupe,

sont un peu tuberculées. Je soupçonne le *drofera anglica* Gm. une variété de cette même espèce.

Cette plante croît en Europe, dans l'Amérique, au Canada, dans les lieux humides. (V. v.) Elle a les mêmes propriétés que le *drofera rotundifolia* ; elle n'est pas moins nuisible aux troupeaux, surtout aux moutons.

3. ROSSOLIS à hampes capillaires. *Drofera capillaris.*

*Drofera scopis radicata, capillaribus, paucifloris, globis ; foliis spatulatis, petiolatis.* (N.)

Cette espèce doit être distinguée du *drofera longifolia*, quoiqu'elle en soit très-voisine. Ses racines sont grêles, fibreuses, de couleur brune foncée ; elles produisent des feuilles toutes radicales, pétioles, presque couchées & disposées en rosette, petites, spatulées, velues, un peu transparentes, garnies à leurs bords de cils glanduleux ; les pétioles sont comprimés, assez longs, velus, élargis insensiblement à leur partie supérieure.

Du centre des feuilles s'élève une hampe droite, simple, haute de huit à neuf pouces, très-glabre, rougeâtre, presque aussi fine qu'un cheveu, terminée par un épi court de fleurs droites, petites, presque sessiles, alternes, très-glabres, unilatérales. Leur calice est divisé en cinq découpures linéaires, obtuses, une fois plus courtes que la corolle.

Cette plante croît à la Caroline ; elle m'a été communiquée par M. Bosc, qui en a fait la découverte. (V. f.)

4. ROSSOLIS à feuilles rondes. *Drofera rotundifolia.* Linn.

*Drofera scopis radicata, foliis orbiculatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 402. — Flor. lapon. 109. — Flor. suec. 357. 273. — Mater. medic. 91. — Gronov. Virg. 35. — Royen, Lugd. Bat. 120. — Blackw. tab. 433. — Pollich, Pal. n°. 322. — Hoffm. Germ. 113. — Roth, Germ. 1. 142. — II. 373. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 61. n°. 700. — Petiv. Herb. tab. 65. fig. 10. — Lam. Ill. Gen. tab. 220. n°. 1.

*Drofera* (rotundifolia), *scopis radicata, elongata ; foliis rotundato-auratis.* Michaux, Flor. boreal-amér. vol. 1. pag. 186.

*Drofera scapo simplici ; foliis petiolatis, subrotundis.* Thunb. Dissert. de drof. pag. 477. n°. 3.

*Rorella foliis petiolatis, subrotundis ; caule nudo, pauciflora.* Haller, Helv. n°. 834.

*Ros folia, folio subrotundo.* Tourn. Inst. R. Herb. 245. — C. Bauh. Pin. 357. — Barrel. 1c. tar. 251. n°. 1.



*Rorida seu rorifolia major*, Lobel, Icon. 811. — Idem, Oberv. 472. lc.

*Rorifolia foliis circinnata rotundatis*, J. Bauh. Hist. 3. pag. 761. lc. exter.

*Salsifera seu rorifolia*, Thal. Hetc. tab. 9. fig. 1.

*a. Rorifolia foliis rotundo, perennis*, Tournef. Inst. R. Herb. 245.

*Rorella rotundifolia, perennis*, Rai, Synopf. 127.

Malgré ses rapports avec le *drosera longifolia*, cette espèce en est évidemment distincte par la forme constante de ses feuilles arrondies.

Ses racines sont menues, fibreuses, noirâtres; elles produisent un assez grand nombre de feuilles toutes radicales, petites, arrondies, orbiculaires, à peine rétrécies à leur base, visqueuses, garnies particulièrement à leurs bords, de cils ou poils rougeâtres, droits, inégaux, glanduleux. Les pédoncules sont longs, médiocrement velus.

De leur centre s'élèvent une ou quelques hampe droites, simples, glabres, cylindriques, beaucoup plus longues que les feuilles, hautes de cinq à six pouces, terminées par un épi ou une grappe de fleurs simples ou bifiées. Les fleurs sont blanches, presque unilatérales, médiocrement pédonculées, & dont les pédoncules sont redressés après la floraison. Le calice est partagé en cinq divisions ovales, un peu aiguës. La corolle est petite, à peine plus longue que le calice, à cinq pétales ovales, renfermant cinq étamines, & n'ayant fort souvent que trois styles, dont les stigmates sont un peu globuleux. La capsule est ovale & contient des semences fort petites, tuberculées étant vues à la loupe.

Cette espèce croît dans les lieux humides & marécageux, en Europe & dans l'Amérique. ○ (P. v.)

Cette plante est astringente, amère, un peu âcre, légèrement acide & même caustique, plus nuisible qu'utile; elle est funeste aux moutons qui en mangent.

5. ROSSOLIS à feuilles en coin. *Drosera cuneifolia*, Linn. f.

*Drosera scapis radiceatis, foliis cuneato-rotundatis*, Linn. f. Suppl. 188.

*Drosera scapis radiceatis calceibuscus hirsutis, foliis obovato-cuneiformibus*, Willden. vol. 1. pag. 1544. n°. 3.

*Drosera scapo subdiviso; foliis sessilibus, oblongis*, Thunb. Dissert. de dros. pag. 406. n°. 2.

*Drosera foliis radicalibus, ovatis; floribus racemosis*, Thunb. Prodr. pag. 57.

*n. Eadem, scapo brevissimo, pollicari; floribus bi-*

*nis, corollis albis*, Thunberg, Dissert. de dros. pag. 406.

*p. Eadem, scapo longissimo, spithameo; floribus racemosis, pluribus; corollis purpureis*, Thunb. l. c.

*y. Eadem, scapo mediocri, palmari; floribus racemosis, pluribus; corollis albis*, Thunb. l. c.

Cette plante, très-voisine du *drosera rotundifolia*, en diffère par ses feuilles sessiles, rétrécies en coin à leur base.

Ses racines sont filiformes; elles produisent plusieurs feuilles radicales, sessiles, presque disposées par imbrication; les inférieures plus petites, presque ovales, très-obtuses, toutes rétrécies en pétiole, & cunéiformes à leur base; munies de cils rougeâtres, longues de huit à dix lignes. Du centre de ces feuilles s'élèvent d'une à trois ou quatre hampe droites, simples, filiformes, striées, raides, velues, longues d'un à six pouces.

Les fleurs sont disposées en une petite grappe presque unilatérale, au nombre de trois à sept & plus, supportées par des pédicules simples, pendans, courts, quelquefois biflores. Les calices sont velus, la corolle blanche ou rougeâtre, d'où il résulte quelques variétés de couleur, ainsi que pour la grandeur de cette plante.

Elle croît sur les coteaux, au Cap de Bonne-Espérance, non loin de la ville.

6. ROSSOLIS de Burman. *Drosera Burmanni*, Vahl.

*Drosera scapis radiceatis calceibuscus glabris; foliis spatulatis, sessilibus*, Vahl. Symbol. 3. pag. 50. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1544. n°. 4.

*Drosera rotundifolia*, Linn. Flor. zeyl. 120. — Loureiro, Flor. cochinch. pag. 232.

*Ros folis, foliis ad radiceem in orbem dispositis*, Burm. Zeyl. pag. 207. tab. 94. fig. 2.

*Ros folis reylanica, foliis rotundis, in orbem expansis, villosis*, Herm. Mus. zeyl. 18.

Cette espèce diffère du *drosera cuneifolia* par les feuilles plus étroites, par ses fleurs plus petites, par les hampe plus courtes, parfaitement glabres, ainsi que le calice.

Ses racines sont fibreuses, fort menues; elles produisent plusieurs feuilles étendues sur la terre en rosette, sessiles, spatulées, un peu étroites, arrondies à leur partie supérieure, marquées de trois nervures très-velues, ciliées à leurs bords. De leur milieu s'élève une hampe haute de trois à quatre pouces, grêle, simple, glabre, supportant à son extrémité quatre à dix fleurs disposées en épi ou en une grappe simple, droite; chaque fleur médiocrement pédonculée & presque unilatérale, dont le calice est glabre, à cinq divisions

aiguës. Quelquefois, après la floraison de la première hampe, il en pousse une seconde, plus courte.

On rencontre cette plante dans les terrains humides, à l'île de Ceilan & à la Cochinchine.

7. *ROSSOLIS* du Cap. *Drosera capensis*.

*Drosera scapo diviso, foliis petiolatis, ensiformibus*. Thunb. Dissert. de drof. pag. 406. n°. 5.

*Drosera scapis radicatis, foliis lanceolatis, subulis febris*. Berg. Plant. cap. pag. 81.

*Drosera caule erecto, bifido; foliis lanceolatis*. Thunb. Prodr. pag. 57.

*Drosera foliis ad radicem longissimis, floribus spicatis*. Burm. Afric. pag. 209. tab. 75. fig. 1.

*Ros folis africanus, foliis praelongis; caule nudo, altissimo*. Rai, Suppl. §15.

*Ros folis africanus, folio lato, longo*. Herm. Afric. 19.

Ses racines sont fibreuses, profondes; elles produisent un grand nombre de filaments contournés en spirale. Les feuilles, toures radicales ou inférieures, sont longuement pétiolées, étroites, linéaires, presque ensiformes, obtuses, longues d'un à deux pouces & plus, chargées en dessous de petits tubercules rudes, & à leurs bords de cils glanduleux; soutenues par des pétioles pubescens, au moins aussi longs que les feuilles.

Il s'élève de leur milieu une ou plusieurs hampe droites, comprimées, anguleuses, un peu flexueuses, velues, quelquefois divisées en deux à leur sommet, hautes de six à huit pouces, terminées par un épi de fleurs nombreuses, unilatérales, pédiculées, dont le calice est velu, à cinq découpures obtuses, peu profondes; la corolle d'une couleur violette très-agréable.

Cette plante croît sur les montagnes, au Cap de Bonne-Espérance.

8. *ROSSOLIS* à fleurs de ciste. *Drosera cistiflora*. Linn.

*Drosera caule simpliciter, foliis; foliis lanceolatis*. Linn. Amoen. Acad. vol. 6. Afr. 7. — Syst. veget. pag. 251. — Thunb. Prodr. 57.

*Drosera caule simpliciter, foliis lanceolatis*. Thunb. Dissert. de drof. pag. 407. n°. 6.

*Drosera foliis ad caulem oblongis, alternis; flore amplo, purpureo*. Burm. Afric. pag. 210. tab. 75. fig. 2.

*Ros folis, folio angusto, flore amplo*. Breyn. Prodr. 3. tab. 22. fig. 2.

*Ros folis africanus, cisti flore albo, caule folioso*. Rai, Suppl. §15.

α. *Eodem, flore albo, minori, basi maculato*. Thunb. Dissert. de drof. pag. 408.

β. *Eodem, flore rubro, majori, basi viridescensulco*. Thunb. l. c.

Cette espèce se distingue par la grandeur de ses fleurs, assez semblables à celles des cistes.

Ses racines sont fusiformes ou presque fasciculées; elles produisent des tiges droites, simples, feuillées, hautes de huit à dix pouces, chargées de poils courts, visqueux; garnies de feuilles lancéolées, les radicales presque verticillées, les autres alternes, sessiles, ouvertes, très-entières, longues au moins d'un pouce, marquées en dessus d'un sillon longitudinal, & en dessous d'une côte relevée; couvertes de poils terminés par une glande rouillâtre, glutineuse.

Les fleurs sont terminales, solitaires ou bien au nombre de deux ou trois au plus, surportées par des pédoncules simples, droits, velus. Le calice est divisé en cinq découpures velues, ovales, obtuses, concaves, beaucoup plus courtes que la corolle: celle-ci est composée de cinq pétales larges, ovales, concaves, obtus, ruvets, échancreés à leur sommet, un peu rétrécis & ongiculés à leur base, tachetés vers leur insertion; ils renferment cinq filaments linéaires, de couleur noire, de la longueur du calice, terminés par des anthères droites, bifides à leur base, ovales, jaunâtres. Le nombre des styles varie de cinq à six, plus longs que les étamines, de couleur brune, plus pâles vers leur sommet, insérés autour du sommet de l'ovaire, & non à sa pointe: ils sont surmontés de stigmates plusieurs fois dichotomes, capillaires.

L'ovaire se convertit en une capsule ovale, aiguë, à cinq faces, glabre, marquée de trois sillons, brune, à trois valves, à une seule loge. La corolle varie dans sa couleur & ses proportions: elle est blanche & plus petite, tachetée à sa base dans la variété α; elle est plus grande, de couleur rouge, marquée à sa base d'une tache d'un brun verdâtre dans la variété β.

Cette espèce croît dans les Indes & au Cap de Bonne-Espérance, sur les collines & dans les plaines sablonneuses.

9. *ROSSOLIS* des Indes. *Drosera indica*. Linn.

*Drosera caule ramoso, foliis; foliis linearibus*. Linn. Syst. veget. pag. 304. — Flor. zeylan. 121.

*Drosera caule simpliciter, foliis linearifloribus*. Thunb. Dissert. de drof. pag. 7. n°. 7.

*Ros folis ramosus, caule folioso*. Burm. Zeyl. pag. 207. tab. 94. fig. 1.

*Ros folis zeylanicus, ramosus, foliis toridis, pennatis*. Muf. Zeyl. pag. 63.

*Araca-pada*. Rheed, Malab. vol. 10. pag. 37. tab. 20.

C'est une petite plante élégante par sa délicatesse, la finesse de ses feuilles, dont les tiges sont herbacées, droites, grêles, presque simples ou bifides, à peine rameuses, hautes de six pouces, garnies, dans toute leur longueur, de feuilles alternes, longues, sessiles, linéaires, presque filiformes, garnies, depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, de cils roides, assez longs; ce qui leur donne l'aspect de barbes de plumes.

Les fleurs sont disposées en petites grappes latérales, axillaires, dont le pédoncule commun est velu, ordinairement plus long que les feuilles, quelquefois ne contenant qu'une seule fleur, mais garni plus ordinairement de deux à quatre &c plus, ayant chacune un pédoncule propre, capillaire, réséchi. La corolle est petite, composée de cinq pétales étroits, lancéolés, obtus.

Cette plante croît dans les Indes &c à l'île de Ceylan.

10. *ROSSOLIS peltat.* *Drosera peltata*. Thunb.

*Drosera caule simplicis; foliis peltatis, orbiculatis.* Thunb. Dissert. de drof. pag. 408. n°. 8.

*Drosera caule subramoso; foliis triangularibus, longe petiolatis, peltatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1546. n°. 9.

*Drosera peltata*. Smith, in litt.

Espèce très-distincte par la forme de ses feuilles, dont les tiges sont longues, flexueuses, droites, filiformes, simples ou médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, petites, pétiolées, peltées, presque triangulaires ou arrondies, supportées par des pétioles capillaires, plus longs que les feuilles. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une grappe longue, presque en forme d'ombelle, quelquefois prolifère.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.

11. *ROSSOLIS* de Portugal. *Drosera lusitanica*. Linn.

*Drosera scopis radicans, foliis subulatis, subciliatis, convexis; floribus decandris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 403. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1545. n°. 7.

*Drosera caule ramoso, foliis ensiformibus, ramis unifloris.* Thunberg, Dissert. de drof. pag. 408. n°. 9.

*Rosfolis lusitanicus, foliis asphodeli minoris.* Tourn. Inst. R. Herb. 245. — Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 620. §. 15. tab. 4. fig. 4. — Pluken. Almag. 323. tab. 117. fig. 2. — Raf. Suppl. 551.

On distingue cette espèce à ses feuilles sessiles,

allongées; à ses tiges presque simples, feuillées, eile a de plus dix étamines.

Ses racines sont fibreuses, droites, capillaires: il s'en élève une tige droite, presque simple, quelquefois divisée vers son sommet. Les feuilles radicales sont sessiles, assez nombreuses, presque fasciculées, étroites, allongées, très-entières, tubulées à leur sommet, approchantes de celles des graminées, chargées de poils droits, glanduleux; les feuilles caulinaires sont alternes, sessiles, petites, ovales, lancéolées, aiguës, peu nombreuses.

Les tiges sont terminées par quelques fleurs solitaires, pédonculées, dont la corolle renferme ordinairement dix étamines: la capsule est une fois plus longue que la corolle.

Cette plante croît naturellement en Portugal.

**ROTALE.** *Rotala*. Genre de plantes dicotylédones, à fl. urs incomplètes, affilié à la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les *frankenia*, qui paroît aussi très-voisin des *isardia*: il comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les rameaux sont articulés, les feuilles verticillées, les fleurs fort petites, sessiles, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à trois dents; point de corolle; trois étamines; un style, trois stigmates; une capsule à trois loges, polyspermes, renfermées dans le calice.

C A R A C T È R E G É N É R I Q U E .

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, persistant, membraneux, à trois dents.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, de la longueur du calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un style filiforme, terminé par un stigmate à trois divisions.

Le fruit consiste en une capsule ovale, presque à trois côtés, à trois loges, à trois valves, renfermée dans le calice, &c contenant des semences nombreuses, arrondies.

E S P È C E .

**ROTALE verticillé.** *Rotala verticillaris*. Linn.

*Rotala foliis floribusque verticillatis; ramis articulatis, inferioribus oppositis.* (N.)

*Rotala verticillaris*. Linn. Mantiff. 175. — Willd.

Spec. Plant. vol. 2. pag. 189. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. n°. 435. — Juss. Plant. Gen. pag. 303.

Plante herbacée, dont les racines sont simples, rampantes : il s'en élève des tiges redressées, petites, hautes de deux à trois pouces, cylindriques, lisses, articulées, divisées en rameaux toides, très-simples ; les inférieurs, opposés, les supérieurs, alternes, rares, portages par articulations cylindriques aux rameaux inférieurs, tétragones aux supérieurs, garnis de feuilles sessiles, ouvertes, linéaires, très-lisses, un peu canelées, aiguës à leur sommet, disposées par verticilles écartés, ordinairement au nombre de quatre à chaque verticille, quelquefois de cinq à huit.

Les fleurs sont fort petites, sessiles, placées par verticilles, une à une, dans chacune des aisselles des feuilles. Le calice est tubulé, à trois dents à son orifice : il enveloppe en totalité la capsule, avec laquelle il persiste : les semences sont de la grosseur d'un grain de moutarde.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ○ (Descript. ex Linn.)

ROTANG. *Calamus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des palmiers, qui a des rapports avec les tagouiers (*Jagus*), & qui comprend des arbrustes exotiques de l'Europe, ramifiés, dont les feuilles ailées sont supportées par un pétiole épineux ; les fleurs disposées sur des spadices ou régimes grêles, axillaires, rameux, garnis d'écaillés imbriquées, uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six folioles, les trois extérieures très-courtes ; point de corolle ; six étamines ; un ovaire, un style trifide ; trois stigmates ; un fruit globuleux, uniloculaire, couvert d'écaillés imbriquées au sommet vers la base ; l'embryon inférieur ; fleurs quelques fois monoïques.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, à six folioles inégales ; trois extérieures plus courtes ; plus larges ; trois intérieures plus étroites, plus longues, acuminées, prises quelquefois pour la corolle.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines (souvent séparées des pistils), dont les filaments sont capillaires, plus longs que le calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style cylindrique, filiforme, en spirale, trifide, terminé par trois stigmates simples.

Le fruit est globuleux : c'est d'abord une sorte

de baie pulpeuse, qui se dessèche en mûrissant. Ce fruit est revêtu d'écaillés rhomboïdales, luisantes, membraneuses, imbriquées du sommet vers la base, à une seule loge, renfermant une, quelquefois deux ou trois semences charnues, globuleuses ; l'embryon inférieur.

Nota. La division du style, les trois stigmates, font soupçonner qu'il doit y avoir constamment trois embryons, dont deux avortent, un seul parvenant à une parfaite maturité.

Observations. Les espèces continues dans ce genre sont toutes infiniment utiles par les usages auxquels on les emploie. Les unes servent à fabriquer des cordages, des cables d'une force supérieure, toutes sortes de liens ; d'autres se fendent par petites lanières pour faire de très-jolis meubles, particulièrement des sièges, des diéiers de chaises & de fauteuils : quelques-unes, dont les tiges sont extrêmement flexibles & minces, tournissent ces petites badines propres à battre les habits. Celles qui ont une consistance plus ferme & des jets ou des articulations très-distantes, nous donnent ces cannes élégantes connues sous le nom de joncs. Les Hollandais en font un commerce considérable.

#### E S P È C E S.

1. ROTANG à piques. *Calamus petraeus*. Lour.

*Calamus caudice densissime aculeato, aculeis erectis, frondibus erectis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 202. n°. 1.

*Calamus (petraeus), caule crassissimo, sulcato ; spinis longis, erectis*. Lour. Flor. cochinch. pag. 260.

*Arundo zeylanica, spinosissima, major ; frutibus rotundis, scabris, acatis*. Burm. Zeyl. 36. — Flor. zeyl. 468.

*Typha-stylis*. Rheed, Malab. vol. 12. pag. 121. tab. 64.

*Palmi juncus calapparius*. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 97. tab. 51.

*Calamus rotang*. Var. a. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Espèce qui se distingue à ses hautes tiges, à ses aiguillons droits & non recourbés.

C'est un très-bel arbre, qui s'élève à la hauteur de cent pieds & plus, dont le tronc est au moins de la grosseur du bras, divisé par articulations cylindriques, inégales, sillonnées, maculées, longues d'environ un pied & très-velu vers son sommet ; terminé par des feuilles en touffes, alternes, ailées, composées de folioles eniformes, longues, étroites, aiguës, chargées d'aiguillons nombreux, droits, alongés, très-aigus.

Le régime ou spadice est presque droit, médiocrement tameux. Les fleurs ont un calice partagé en six découpures; point de corolle; six étamines; un style tufide, & un fruit un peu ovale, acuminé.

Cette plante croît dans l'Inde & à la Cochinchine. On s'en sert pour la fabrique des longues piquets. *h* (*Descript. ex Lour.*)

### 2. ROTANG à cordes. *Calamus rudentum*. Lour.

*Calamus aculeis caudicis reflexis; spadice divaricato, recto*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 6.

*Calamus caule longissima, aequali; spinis inversis*. Lour. Flor. cochinch. pag. 26. n°. 2.

*Palmi juncus albus*. Rumph. Amboin. pag. 102. tab. 53.

*Calamus rotang*, var. *γ*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Les tiges de cette espèce sont les plus longues connues; elles s'élèvent à l'aide des arbres, d'après le rapport de Rumphius, & passent souvent d'un arbre à un autre, & acquièrent par-là une longueur indéterminée, que Loureiro estime à cinq cents pieds & plus. Elles n'ont guère plus d'un pouce d'épaisseur, égales, très-craques, d'un blanc-cendré, divisées en articulations cylindriques, presque égales, longues d'un pied & demi.

Les feuilles sont longues, ailées, réfléchies, terminées par le pétiole commun, considérablement prolongé en un filament nu, pendant, chargé d'aiguillons. Les folioles sont courtes, étroites, très-aiguës, velues, terminées par un filet droit, sétacé, munies sur leur pétiole & vers le sommet des tiges d'aiguillons recourbés. Les spadices ou régimes sont amples, étalés en une panicule lâche, ramifiée, supportant des fleurs nombreuses, presque sessiles, auxquelles succèdent des fruits fort petits, imbriqués du sommet à la base.

C'est une des espèces les plus communes, & répandues dans toutes les contrées de l'Inde, particulièrement sur les rivages sablonneux de la mer. *h*

On s'en sert, au rapport de Loureiro, pour fabriquer des cables, pour traîner des fardeaux très-pesants, & pour lier les éléphants indomptés.

### 3. ROTANG à cannes. *Calamus filipianum*. Lour.

*Calamus articulis caudicis longissimis, subulatis, nitidis; aculeis frondis recurvis; spadice crasso, ramulis brevibus*. (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 770. fig. 1.

*Calamus articulis longissimis, subulatis, nitidis*. Lour. Flor. cochinch. pag. 260. n°. 3.

*Arundo rotang dicta*. Pison. Mantiff. 188. Icon.

*Calamus rotang*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 202.

*Arundo nucifera, rotang dicta; fructu spadiceo coloris, stritis purpureis venis; tessellato*. Plum. Almag. pag. 53. tab. 106. fig. 1. 2.

*Arundo zeylanica spinosissima, major; fructibus rotundis, scabris, acidis*. Burm. Zeyl. 36. — Flor. zeyland. 468.

*Kata-tsurel*. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 123. tab. 65.

J'ai cru devoir rapporter à cette espèce une partie de la synonymie que Linné rapporte au *calamus rotang*; cependant il est possible qu'elle ne convienne pas entièrement à la plante présentée ici par Loureiro, qu'il nous donne pour celle que l'on apporte en Europe, & dont on fait des cannes d'autant plus élégantes, que les articulations des tiges sont très-longues, & fournissent d'un seul jet une longueur de trois pieds & plus. Ces tiges sont d'ailleurs très-lisses, luisantes, rouffâtres, marquées souvent de taches noires; leurs articulations sont subulées, inégales. Les feuilles n'ont qu'une grandeur médiocre, ailées, composées de folioles ensiformes, très-aiguës, velues en dessous, garnies, ainsi que les pétioles, d'aiguillons courts, recourbés.

Les spadices sont divisés en rameaux courts, médiocrement garnis de fleurs un peu ramassées, dont le calice est à six folioles égales; six étamines; le ligamate trifide; les fruits globuleux, d'une grosseur médiocre, d'un jaune-clair, luisans, revêtues d'écaillés courtes, membraneuses, contenant une seule semence globuleuse.

Cette plante croît dans l'Inde & à la Cochinchine. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

### 4. ROTANG à meubles. *Calamus verus*. Lour.

*Calamus aculeis caudicis, hirsutissimis; spadice erecta, tribus foliolis calceinis longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 2.

*Calamus frondibus longissimis; spinis confertis, longis; spadice brevi, caralla tripetalâ*. Lour. Flor. cochinch. pag. 261. n°. 4.

*Palmijuncus verus*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 105. tab. 54.

*Calamus rotang*, var. *δ*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Cette espèce ne pousse qu'une seule tige des mêmes racines, caractère qui paroît lui être particulier. Cette tige s'élève à plus de cent pieds; elle est d'un brun-jaunâtre, très-flexible, égale, de la grosseur du doigt, composée de très-longues articulations cylindriques, presque égales; terminée

pat

par des feuilles longues, ailées, composées de folioles ovales, lancéolées, étroites, très-aiguës, alternes, à trois nervures principales, garnies, ainsi que les pétioles, d'aiguillons droits, nombreux.

Les spadices forment une grappe courte, droite, rameuse, qui sort d'une spathe oblongue, couverte d'aiguillons. Le calice est divisé en six folioles inégales; trois extérieures très-courtes; trois intérieures plus longues, blanchâtres, périaliformes, ouvertes, aiguës. Le fruit est de couleur brune & d'une grosseur médiocre. Cette plante est commune dans les Indes; elle croît sur les montagnes & dans les plaines, au milieu des forêts. *h* (*Descript. ex Lour.*)

Ses tiges, fendues en lanières, servent à faire des cordages & même des cables. On en fabrique aussi plusieurs ustensiles & des meubles très-agréables.

5. ROTANG à fleurs secondaires. *Calamus secundiflorus*. Beauvois.

*Calamus frondibus pinnatis, flexilibus, reflexis, basi gibbosis, margine cultratis; foliolis marginatis spissius.*

*Calamus secundiflorus*. Paliss. Beauv. tab. 9. 10.

Cet arbruste, dit M. Beauvois, a des feuilles longues, pinnées, flexibles, renversées, nues à leur sommet, garnies seulement de distance en distance de deux épines larges, opposées, renversées, presque triangulaires à l'extérieur, planes ou un peu creuses en dedans, coupantes à leurs bords, obovées, relevées en bosse à leur base; les folioles épineuses à leurs bords.

Les fleurs ont un calice à trois divisions extérieures, courtes & imbriquées, en forme d'écaillés; trois intérieures plus longues; les filaments des étamines élargis à leur base; le stigmate capité, presque trifide; les fruits médiocrement globuleux, couverts d'écaillés luisantes & imbriquées; les semences lisses & ovales.

Cet arbruste croît en Afrique, dans le royaume de Benin, sur les bords de la rivière qui conduit à Agaron. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

M. Beauvois ajoute qu'à l'aide des fortes épines qui garnissent l'extrémité des feuilles, cet arbruste s'accroche à tous les corps environnans; les feuilles mêmes, qui pendent jusqu'à terre, s'enroûtillent entr'elles de manière que chaque arbruste forme à lui seul un buisson impenétrable à toute espèce de gros animaux.

Les fruits sont trop petits pour avoir attiré l'attention des naturels du pays; mais je soupçonne qu'on en pourroit extraire, comme du *raphia*, soit du tronc de l'arbre, soit de ses fruits, une

Botanique. Tome VI.

liqueur utile & agréable. Cette particularité sembla commune à plusieurs palmiers & à toutes les espèces de rotang, qui, selon Rumphius, ont une limphe abondante, limpide & bonne à boire.

Dans un pays plus policé, où l'inégalité des fortunes & des conditions donne lieu aux vols & à d'autres crimes qui en émanent, cet arbruste pourroit être employé utilement, ou verr ou sec, à former des haies & des entourages propres à garantir les plantations & les habitations; mais à Oware & à Benin, où les propriétés sont mieux respectées entr'eux, & se trouvent plus en sûreté sous la garde de la confiance publique, on n'en fait aucun usage; il ne sert que dans les forêts, de barrières & de remparts naturels aux thermes, aux fourmis, aux guêpes & à d'autres petits animaux qui se réfugient sous son impenétrable & bienfaisant ombrage, pour échapper à leurs nombreux ennemis. J'ai vu plusieurs fois, sous les arbres, des édifices de thermes tellement couverts de leurs feuilles entrelacées, que le plus petit oiseau n'auroit pu y pénétrer qu'avec la plus grande difficulté. (*Comm. Beauv.*)

6. ROTANG amer. *Calamus amarus*. Lour.

*Calamus spinis cœnertis, brevibus; foliolis linearibus, spadicebus remotis, spathis partialibus*. Lour. Flor. cochinch. pag. 261. n°. 5.

Ses tiges sont longues d'environ soixante pieds, de l'épaisseur du doigt; dures, lisses, de couleur pâle, divisées en articulations allongées, cylindriques, presque égales. Les feuilles sont longues, ailées, garnies d'épines courtes, très-rapprochées; les folioles linéaires, lancéolées; les régimes ou spadices presque terminaux, disposés en plusieurs épis distans les uns des autres, munis chacun de spathes partielles. Les fleurs ont un calice à six folioles; point de corolle; un style à trois divisions; un fruit à une seule semence, revêtu d'écaillés imbriquées.

Cette plante a été observée par Loureiro dans les forêts de la Cochinchine. *h* (*Descript. ex Lour.*)

On l'emploie aux mêmes usages que le *calamus verus*: sa durée est plus longue.

7. ROTANG sang de dragon. *Calamus draco*. Willd.

*Calamus aculeis caudicis, adpressis, frondium patentibus; spadice erecto*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 3.

*Palmijuncus draco*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 114. tab. 58. fig. 1.

*Calamus rotang*, var. 3. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Ses tiges sont cylindriques, articulées, armées

Q q

d'aiguillons droits, appliqués contre les tiges ; elles distillent une sorte de gomme rougeâtre, à laquelle on a donné, comme à beaucoup d'autres, le nom de *sang de dragon*. Les articulations sont longues de deux & trois pieds, au moins de la grosseur du doigt, d'un jaune plus ou moins clair, inégales. Les feuilles sont ailées, garnies le long de leurs pétioles d'aiguillons droits, ouverts, aigus. Les folioles sont alternes, linéaires, aigues, munies de quelques poils rares, rétrécies à leur base.

Les spadices sont droits, rameux, composés de petites grappes courtes, qui supportent des fruits ovales, de la grosseur d'une noisette, terminés par une pointe obtuse, contenant une seule semence lisse, ovale.

Cette plante croît dans les Indes orientales. On fait, avec les jets de ses tiges, de très-belles cannes, & l'on profite de la grosseur inégale de quelques-unes de ses articulations pour y former des poignées.

#### 8. ROTANG noir. *Calamus niger*. Willd.

*Calamus aculeis caudicis & frondium horizontalibus ; spadice cordato*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 4.

*Palmijuncus niger*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 101. tab. 52.

*Calamus rotang*, var.  $\beta$ . Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Ses tiges sont épaisses, d'abord de couleur verdâtre, armées d'aiguillons souples, d'un brun-noirâtre, horizontaux, qui entrent facilement dans la peau, se rompent & y causent des douleurs aiguës. Les feuilles sont très-longues, alternes, terminales, ailées, composées de folioles alternes, étroites, rétrécies presque en pétiole à leur base, très-aigues, munies sur leur pétiole d'aiguillons semblables à ceux des tiges.

Les spadices sont axillaires, pendans, en grappes touffues, serrées, chargées de fruits, petits, globuleux, de la grosseur à peine d'un très-petit pois, supportés par des pédicules courts, sétacés.

Cette plante croît sur les rivages de l'Inde orientale.  $\text{h}$

Elle est peu en usage, ne pouvant que difficilement se réduire en filasse. Ses tiges sont trop irrégulières pour les employer aux mêmes usages que les autres espèces.

#### 9. ROTANG osier. *Calamus viminalis*. Willd.

*Calamus aculeis caudicis patentibus, frondium distantibus, reflexis ; spadice nutante*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 203. n°. 5.

*Palmijuncus viminalis*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 106. tab. 53.

*Calamus rotang*, var.  $\alpha$ . Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Ce rotang a un aspect différent du *calamus equifris*, quoiqu'il paroisse y avoir beaucoup de rapports.

Ses tiges sont de la grosseur d'une plume d'oie, divisées en articulations longues d'un pied & plus à la partie inférieure, plus rapprochées vers le sommet, où elles sont munies d'aiguillons droits, horizontaux, très-fins. Les feuilles sont alternes, distantes, ailées, composées de folioles étroites, longues, aigues, & dont les aiguillons sont recourbés ; les pétioles se prolongent au-delà des folioles.

Les spadices sont axillaires, pendans, rameux, en grappes médiocrement étalées, garnies de fleurs médiocrement pédonculées, presque opposées. Elles produisent des fruits fort petits, revêtus d'écaillés imbriquées.

Cette plante croît à Java & aux îles Célèbes, dans les forêts humides.

Ses tiges servent à faire tous les ouvrages que l'on fabrique avec l'osier : divisées en lanières, on en fait quantité d'autres petits ouvrages agréables.

#### 10. ROTANG à fouets. *Calamus equifris*. Willd.

*Calamus aculeis caudicis erecto-patentibus, frondium uncinatis ; foliis ellipticis, utrinque attenuatis ; spadice erecto*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 204. n°. 7.

*Palmijuncus equifris*. Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 110. tab. 56. & tab. 57. fig. 1.

*Calamus rotang*, var.  $\gamma$ . Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

Ses tiges sont grêles, très-souples, composées d'articulations courtes, égales, lisses, garnies vers leur sommet de feuilles alternes, ailées, munies d'aiguillons recourbés en hampeçon, tandis que ceux du sommet des tiges sont droits. Les folioles sont lanceolées, elliptiques, rétrécies à leurs deux extrémités, alternes, longues de huit à dix pouces. Les pétioles communs se terminent par un prolongement très-long, nu, muni d'aiguillons. Les spadices sont droits ; les fruits arrondis, fort petits, à peine de la grosseur d'un pois.

Cette plante croît à l'île d'Amboine, sur les rochers humides.  $\text{h}$

Les tiges servent de fouet pour les chevaux. Ils sont, pour cet objet, d'un usage général dans l'Inde.

#### 11. ROTANG dioïque. *Calamus dioicus*. Lour.

*Calamus caule tenuissimo, frondibus & spinis bre-*

*vioribus*, flore dioico. Lour. Flor. cochinch. pag. 262. n°. 6.

Cette espèce, d'après Loureiro, se rapproche beaucoup du *palmijuncus squeris* & du *palmijuncus viminalis* de Rumphius, que nous avons mentionnés dans les deux espèces précédentes. Peut-être n'est-ce qu'une variété de l'une des deux, ou une espèce intermédiaire. En attendant de nouvelles observations, Loureiro nous en présente les détails suivans :

Ses tiges sont grêles, à peine de la grosseur d'une plume d'oie, hautes de vingt pieds, égales, très-flexibles, luisantes, d'un jaune-pâle, divisées en articulations longues d'un pied, garnies à leur sommet de feuilles ailées, plus courtes que celles des autres espèces de ce genre, ainsi que leurs aiguillons. Les fleurs sont dioïques. Le calice est à six divisions inégales; trois extérieures très-courtes; trois intérieures plus longues, pétali-formes, blanches, ovales, lancéolées, striées; six étamines; un style triède; un fruit écailleux, à une seule semence.

Cette plante croît dans les forêts de la Cochinchine, le long des rivières & des fleuves. ○ (Descript. ex Lour.)

On se sert de ses tiges pour plusieurs petits meubles élégans, ainsi que pour faire des panniers, des corbeilles, &c.

## 12. ROTANG ZALAC. *Calamus zalacca*. Gærtn.

*Calamus aculeis patentibus, spadice radicali*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 204. n°. 8.

*Calamus zalacca*. Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 2. pag. 267. tab. 139. fig. 1. — Lam. Illustr. Gen. tab. 770. fig. 2.

*Fructus baly infusa pyramidalis, asper*. J. Bauh. Illustr. 1. pag. 401. Icon.

*Calamus rotang*, var. 1. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 93.

*Zalacca*, seu *rotang zalacca*. Rumph. Amb. vol. 5. pag. 113. tab. 57. fig. 2.

Cette espèce n'a point de tiges : ses feuilles naissent en touffe du collet des racines; elles sont longues de dix à douze pieds, ailées, & les folioles allongées, aiguës; les pétioles garnis d'aiguillons très-forts, droits, nombreux, ouverts. Les spadices forment de petites grappes presque radicales; elles produisent des fruits assez gros, turbinés, à une seule loge, dont l'enveloppe, d'abord pulpeuse, est composée d'écaillés imbriquées, roussâtres, un peu bombées. Ce fruit renferme ordinairement trois semences, dont deux avortent; la troisième est presque globuleuse, convexe d'un côté, anguleuse de l'autre.

On trouve cette plante dans les Indes orientales, à Java, &c. ○

Ses fruits ont une saveur acide agréable & très-rafraichissante, qui les fait rechercher.

**ROTHER. *Rothia*.** Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, floiculées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *ethulia*, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, pinnatifides, & dont les fleurs sont terminales, disposées en corymbe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à folioles membranées, presque égales, colorées à leur partie supérieure; des fleurons hermaphrodites; le réceptacle nu; les semences couronnées par plusieurs poils scarieuses.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes composées de fleurons fertiles, hermaphrodites.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, presque simple, composé d'environ dix folioles presque égales, disposées sur deux rangs, lâches, ovales, membranées, colorées à leur partie supérieure.

2°. Une corolle entièrement composée de fleurons fertiles, hermaphrodites, égaux, nombreux.

Chaque fleuron est droit, infundibuliforme, un peu hispide, muni d'un tube cylindrique, dilaté à sa base, & d'un limbe campanulé, à cinq découpures réfléchies en dehors.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filamens sont courts, capillaires, terminés par des anthères réunies en cylindre, striées, plus longues que le fleuron.

4°. Un ovaire inférieur, turbiné, en cône renversé, presque triangulaire, un peu velu, presque frangé à son sommet par plusieurs petites dents courtes, surmonté d'un style filiforme, aussi long que les étamines, terminé par deux stigmates sail-lans, linéaires-oblongs, roulés en dehors.

Les semences sont nues, solitaires, ovales ou en cône renversé, couronnées par un seul rang de poils courts, membranés, scarieuses, presque ovales, obtusés, légèrement denticulés.

Le réceptacle est nu, plane, légèrement convexe.

Observations. Ce genre a été consacré, par M. Lamarck, à M. Roth, savant botaniste allemand. L'héritier, & après lui Michaux, lui ont donné le nom d'*Hymenopappus*.



**ROTIE** de Caroline. *Rothia carolinensis*. Lam.

*Rothia foliis profunde pinnatifidis, subius candidantibus*. (N.) Lam. Journ. d'Hist. nat. vol. 1. pag. 16. tab. 1. — Idem, Illustr. Gener. tab. 667.

*Hymenopappus* (scabiosæus), *candicans-lanuginosus* / *foliis profunde pinnatifidis*. Mich. Flor. bor-amer. vol. 2. pag. 104. — Lhérit. Icon.

C'est une plante herbacée, d'un aspect assez agréable, élégante dans son port & son feuillage, mais dont les fleurs ont peu d'éclat malgré leur grandeur. Elle ressemble extérieurement à certaines scabieuses : son calice a beaucoup de rapports avec celui des scabieuses, mais la fructification la rapproche bien davantage des *ethulia*.

Ses tiges sont droites, herbacées, un peu anguleuses, hautes d'un pied & plus, glabres à leur partie inférieure, légèrement tomenteuses & blanchâtres vers leur sommet, divisées en rameaux lâches, disposés presque en corymbe, garnis de feuilles alternes, profondément pinnatifides, à découpages linéaires, obtusés, la plupart un peu incisées ou munies de quelques dents rares & inégales, verdâtres à leur face supérieure, légèrement cœonueuses & blanchâtres en dessous : les feuilles inférieures pétiolées, plus grandes que les autres, quelquefois opposées ; les supérieures plus petites, sessiles, rares ou distantes les unes des autres.

Les fleurs sont disposées en un corymbe lâche ; elles sont terminales, assez grandes, droites, pédonculées, d'un blanc-pâle, & ressemblent en quelque sorte à celles de certaines scabieuses ; orbiculaires, médiocrement convexes, & ont huit à dix lignes de diamètre. Leur calice commun est presque simple, composé de neuf ou dix folioles planes, ovées, verdâtres vers leur base, blanches & membraneuses à leur sommet, un peu lâches & comme imbriquées par les côtes, se recouvrant latéralement les unes les autres.

Cette plante a été découverte par Michaux dans la Caroline septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle fleurit vers la fin de l'été. (V. v.)

**ROTBOLLE.** *Rotbolla*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, qui a des rapports avec les *agilops*, qui comprend des herbes exotiques & indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis ; les épillets alternes, sessiles, placées dans les cavités d'un rachis articulé. Quelques espèces arborescentes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice univalve, entier ou à deux divisions, renfermant une ou deux fleurs ; trois étamines ; deux styles ; un rachis articulé, flexueux.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à une seule valve ovale, oblongue, plane, cartilagineuse, simple ou partagée en deux.

Le rachis est linéaire, un peu flexueux, articulé, offrant des cavités oblongues au dessus des articulations, & dans lesquelles sont placées des fleurs solitaires ou plusieurs ensemble.

2°. Une corolle bivalve, dont les valves sont lancéolées, membraneuses, aiguës, plus courtes que le calice.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont capillaires, terminés par des anthères linéaires, bidentés à leurs deux extrémités.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, linéaire, surmonté de deux styles filiformes, terminés par des stigmates plumeux ou en forme de pinceau.

Les semences sont oblongues, linéaires, nues, contenues dans les cavités de chaque articulation. Elles ne tombent point, malgré leur maturité, jusqu'à ce que le rachis se détache par articulations.

*Observations.* Les principaux caractères sur lesquels ce genre est appuyé, consistent dans la disposition des fleurs rangées le long d'un rachis subulé, articulé, ayant à chaque articulation une excavation assez profonde, dans laquelle les fleurs sont quelquefois tellement enfoncées, surtout avant leur épanouissement, qu'on les aperçoit à peine. Ces fleurs ou plutôt ces épillets sont sessiles ; le calice est tantôt à une seule valve, simple ou bifide, tantôt à deux valves, contenant une, plus souvent deux fleurs, toutes deux sessiles, ou l'une d'elles pédiculée, quelquefois hermaphrodites, mais plus ordinairement une des deux stérile.

Le rachis est nu, quelquefois velu à la base des articulations. Quelques espèces ont une des valves de leur corolle surmontée d'une arête. Les épis sont simples, fasciculés dans quelques espèces ; les épillets alternes, solitaires, ordinairement tournés du même côté.

#### E S P È C E S.

1. **ROTBOLLE courbée.** *Rotbolla incurvata*. Linn. f.

*Rotbolla fried tereri, subulata, glauca ; glumâ calicinis subulata, asprella, bifurcata*. Linn. f. Suppl. 114. — Wedd. Flor. dan. tab. 938. — Cavan. Icon. n°. 235. tab. 213. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag.

204. n°. 1129. tab. 48. fig. 2. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 210.

*Rotbolla* (incurvata), *spica tereti*, *subulatâ*, *incurvatâ*; *glumâ calicinâ bivalvi*, *subulatâ*, *adpressâ*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 463. n°. 1.

*Rotbolla* (incurvata), *spica tereti*, *subulatâ*; *glumâ calicinâ subulatâ*, *adpressâ*, *bipartitâ*. Smith. Flor. britan. vol. 1. pag. 151.

*Rotbolla spica tereti*, *subulatâ*, *subarcuatâ*; *glumâ calicinâ subulatâ*, *adpressâ*, *bipartitâ*. Roth, Nev. Beitr. pag. 120. n°. 1.

*Ægilops* (incurvata), *spica subulatâ*, *mutiâ*, *levi*, *incurvâ*; *calicibus unifloris*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1490.

*Nardus spica subulatâ*, *diffichâ*. Royen, Lugd. Bat. 58.

*Gramen loliaceum maritimum*; *spiculis articulatis*. Tournef. Inst. R. Herb. 517. — Motif. Oxon. Hist. 3. 8. tab. 2. fig. 8. — Monti. Prodr. 43. tab. 29. — Scheuch. Gram. 43.

*Gramen myuros erectum*, *minimum*, *arundinaceum*. Boccon. Mus. tab. 59.

*Gramen loliaceum junceum minus*. Barrel. Icon. rar. tab. 6.

*Gramen loliaceum spica articulata, erecta*. Tourn. Inst. R. Herb. 517.

*Gramen parvum spicarum loco ferens caules erumpentes alternatim acutis glumis, velatis dentatis*. Triumf. 64.

*Phœnix acerofa, aculeata*. Park. Theatr. 1146.

Ses racines sont fibreuses, menues, capillaires : il s'en élève plusieurs tiges noueuses, geniculées, grêles, un peu couchées à leur base, glabres, hautes de huit à dix pouces & plus, articulées, garnies de feuilles planes, glabres, étroites, larges d'environ une ligne, bien plus courtes que les chaumes ; les supérieures à peine plus longues que les entre-nœuds, munies à leur orifice d'une membrane très-courte, tronquée.

Les épis sont presque filiformes, longs d'environ six pouces, subulés, arqués : leur rachis est articulé, noueux, flexueux, strié, marqué d'enfoncements alternes, dans chacun desquels est placé un épillet sessile, solitaire, dont le calice est à une seule valve coriace, subulée, acuminée, fendue en deux parties jusqu'à sa base, renfermant deux fleurs. La corolle est composée de deux valves membraneuses, presque obtuses, plus courtes que le calice. Souvent une des fleurs avorte. Dans la variété *g*, les épillets sont droits, allongés : elle s'observe souvent sur le même pied.

Cette plante croît dans les provinces méridio-

nales de l'Europe, en Barbarie, dans les lieux voisins de la mer. ☉ (V. v.)

Observations. J'ai vu, dans l'herbier de M. de Jussieu, plusieurs individus de cette même plante assez remarquables. Leur chaume avoit à peine un pouce de haut ; les épis étoient courts, fortement arqués, subulés, cylindriques, beaucoup plus gros & plus courts que dans l'espèce que je viens de décrire.

## 2. ROTBOLLE biflore. *Rotbolla biflora*. Spreng.

*Rotbolla spica tereti*, *subulatâ*, *erectâ*; *calicibus bifloris*, *bivalvibus*; *glumis obtusis, adpressis, marginis scariosis*. Roth, Nev. Beitr. pag. 121. n°. 3.

*Rotbolla salina*; *spica tereti*, *striatâ*, *subulatâ*; *calicibus bivalvibus, obtusis, scariosis*. Spreng. Erlt. Nach. 1801. pag. 34. n°. 45.

Cette espèce tient le milieu entre le *rotbolla incurvata* & le *rotbolla filiformis*, très-distincte de l'un & de l'autre.

Ses chaumes sont foibles, longs d'un pied & plus, filiformes, rameux, coulés à leurs articulations, garnis de feuilles linéaires, striées, un peu rudes, mucronées ; leur gaine rude au toucher, munie à son orifice d'une membrane très-mince, courte, tronquée.

L'épi est cylindrique, long de trois à quatre pouces, droit, roide. Les calices sont biflores, à deux valves égales, obtuses, serrées, roides, munies à leurs bords d'une membrane blanche, scarieuse. Les deux fleurs sont hermaphrodites, sessiles ; une plus tardive & un peu plus petite, à deux valves égales, cornues, membraneuses, très-blanches ; l'extérieure obtuse ; l'intérieure acuminée.

Cette plante croît dans la Hongrie. (Description ex Roth.)

## 3. ROTBOLLE filiforme. *Rotbolla filiformis*. Roth.

*Rotbolla spica tereti*, *subulatâ*, *subcompressâ*, *erectâ*; *glumâ calicinâ bivalvi, ensiformi, patente*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 464. n°. 2.

*Rotbolla* (filiformis), *spica filiformi*, *tereti*, *subcompressâ*, *subulatâ*; *glumâ calicinâ ensiformi, adpressâ, bipartitâ*. Roth, Catal. botan. 1. pag. 21.

*Rotbolla spica tereti*, *subulatâ*, *subcompressâ*, *erectâ*; *glumâ calicinâ obtusâ, ensiformi, adpressâ, bipartitâ*. Roth, Nev. Beitr. n°. 2. pag. 120. & pag. 119.

*Gramen loliaceum, minimum*; *spicis gracilibus, reflexis*. Monti. Gram. 43. fig. 30.

*Gramen junceum, nodosum, minimum, capillare*. Barrel. Icon. rar. n°. 1164. tab. 117. fig. 1.

Cette espèce, qu'on pourroit prendre pour une variété plus petite que le *rotbolla incurvata*, en a été distinguée à cause des proportions différentes des parties de la fructification & de ses feuilles.

Ses racines sont menues, fibreuses; ses chaumes très-grêles, peu élevés, presque fasciculés, droits, d'une couleur purpurine-foncée; ses feuilles au moins trois fois plus petites que celles du *rotbolla incurvata*, très-étroites, plus acuminées, canaliculées, d'un vert plus foncé, rugées au toucher & fortement striées, munies à l'orifice de leur gaine d'une membrane longue, obtuse, presque tronquée.

Les fleurs sont disposées en un épi filiforme, cylindrique, subulé, droit, un peu comprimé, composé d'épillets très-rapprochés; la valve calicinale, partagée en deux découpures, courte, presque obtuse, point acuminée, contenant d'une à deux fleurs, dont la corolle est à peine plus courte que le calice, à deux valves membraneuses.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. ♀

4. ROTBOLLE cylindrique. *Rotbolla cylindrica*. Willd.

*Rotbolla spica tereti, subulata, erecta; glumâ calicid univalvi*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 464. n°. 3. (Excluse synonym. Linn. & Poir.)

*Gramen loliaceum, spica articulata, erecta*. Mont. Gram. 43. fig. 18.

*Gramen loliaceum, junceum, majus*. Barrel. Icon. var. n°. 1162. tab. 5.

β. *Gramen loliaceum, junceum, minus*. Barrel. Icon. 6.

Cette espèce a des rapports avec le *rotbolla incurvata*; elle en diffère par ses épis plus grêles, plus redressés, & surtout par la valve calicinale, d'une seule pièce.

Ses racines sont blanchâtres, touffues, fibreuses, garnies d'un grand nombre de chevelus. Il s'en élève des chaumes en gazon épais, un peu courbés, cylindriques, glabres, de cinq à six pouces de haut, munis à leur base de feuilles courtes, filiformes, longues d'environ deux à trois pouces; les caulinaires beaucoup plus petites, aiguës; les articulations très-rapprochées. Les épis sont simples, droits, cylindriques, subulés à leur sommet, ordinairement plus longs que les chaumes, chargés dans toute leur longueur de fleurs appliquées contre un rachis articulé. Le calice n'a qu'une seule valve entière. La plante est dans toutes ses parties d'un vert glauque.

On trouve cette espèce dans les provinces méridionales de l'Europe, sur les montagnes, dans les terrains arides. ♀? (V. f. in herb. Jussieu.)

La variété β a ses épis plus roides, plus grêles; les feuilles très-fines. Elle croît en Espagne. (V. f. in herb. Lamarck.)

5. ROTBOLLE stolonifère. *Rotbolla stolonifera*.

*Rotbolla culmis repentibus, articulatis stoloniferis; spica brevibus, subincurvatis; calice bivalvi, bifido; glumis calicinis valde inaequalibus*. (N.)

Cette graminée est remarquable par ses chaumes entièrement couchés, très-longs, traçans, stolonifères, dont les articulations nombreuses produisent des racines & des touffes de feuilles imbriquées à leur base, courtes, d'une largeur monodique, glabres, aiguës, plissées en deux; les caulinaires un peu roulées à leurs bords.

Il s'élève de leur milieu des chaumes particuliers très-courts, d'un à deux pouces, fermes, comprimés, presque anguleux, terminés par un épi court, presque plane, dont le rachis, articulé, un peu flexueux, anguleux, est garni à sa face extérieure & dans chacune de ses cavités, d'épillets alternes, sessiles, enfoncés, composés d'un calice à deux valves minces, transparentes, blanchâtres, l'extérieure très-courte, presque ronde, l'intérieure lancéolée, obtuse, contenant deux fleurs sessiles, inégales; une plus grande fertile, hermaphrodite; une un peu plus petite, que je soupçonne stérile; toutes deux munies de deux valves dures, coriaces, concaves, lisses, aiguës.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco. (V. v. in herb. Lamarck.)

6. ROTBOLLE lisse. *Rotbolla levis*. Retz.

*Rotbolla pedunculis longissimis; spica strobiliformi binatis, lateralibus; calicibus ovatis, impunctatis, levibus*. Retz. Observ. 3. pag. 11.

Ses chaumes sont ascendants, feuillés seulement jusqu'à la seconde ou à la troisième articulation; les autres garnies seulement de gaines d'où sortent trois ou quatre pédoncules longs de plus d'un pied. Les articulations inférieures sont à demi cylindriques, presque triangulaires; les supérieures arrondies; les feuilles courtes, carénées, munies de poils à l'orifice de leur gaine.

Les épis sont simples, droits, articulés, garnis à chaque articulation de deux épillets latéraux, alternes. La valve extérieure du calice est oblique, ovale, cartilagineuse, parfaitement lisse; l'intérieure de même longueur, très-mince, membraneuse, ainsi que celles de la corolle.

Cette plante a été recueillie à Tranquebare par Koenig. (Descript. ex Retz.)

Elle nous paroît avoir de grands rapports avec notre *rotbolla tripartita*.

7. ROTBOLLE hérissée. *Rotbolla muricata*. Retz.

*Rotbolla spica teretibus, pluribus, longè pedunculatis; calicibus ciliato-acuteatis, neutris bifidis*. Retz. Observ. 3. pag. 12.

*Ægilops (muricata), spica muticis, pluribus, longè pedunculatis; calicibus ciliato-acuteatis*. Retz. Observ. 2. pag. 27.

Ses chaumes sont anguleux, garnis de feuilles ciliées à l'orifice de leur gaine. Les épis sont cylindriques, presque fasciculés, portés sur de longs pédoncules. Les calices sont rous légèrement pubescens, bifides dans les fleurs stériles & à peine ciliés; plus larges dans les fleurs hermaphrodites, scarieux à leur sommet, munis de cils roides à leurs bords.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Retz.*)

8. ROTBOLLE sanguine. *Rotbolla sanguinea*. Retz.

*Rotbolla panicula spica aristatis, alternis, simplicibus, pedunculatis; florum bracteis lateralibus, ciliatis*. Retz. Observ. 3. pag. 25. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 467. n° 16.

Cette plante a l'aspect d'un *andropogon*. Ses chaumes sont à demi cylindriques, feuilles, articulées; les articulations supérieures garnies seulement de gaines dilatées, desquelles sort un épi filiforme, porté sur un pédoncule renfermé dans la gaine, & composé d'épailleurs fétilles, alternes, situés dans les excavations du rachis.

Le calice est uniflore, formé de deux valves obliques, latérales: l'extérieure subulée, à demi cylindrique, cartilagineuse; l'intérieure très-mince, blanche, marquée de stries rougeâtres. La corolle, de la longueur du calice, a sa valve extérieure couleur de sang; l'intérieure fendue jusqu'à sa base, blanche, traversée par des lignes sanguinolentes, légèrement ciliée, munie à sa base d'une longue arête tortueuse. Les anthères & les stigmates sont couleur de sang.

On aperçoit extérieurement une troisième valve calicinale ou une bractée linéaire, cartilagineuse, presque aristée, ciliée à un de ses côtés, de sorte qu'en la considérant comme une valve calicinale, & la valve fendue de la corolle comme deux valves, les calices & les corolles seront composés de trois valves inégales.

Cette espèce croît à la Chine, où elle a été recueillie par Bladh. (*Descript. ex Retz.*)

9. ROTBOLLE élevée. *Rotbolla exaltata*. Linn. f.

*Rotbolla spica tereti, filiformi, undique flosculosa; glumis ovatis, obtusis; vaginis punctato-hirsutis*.

Linn. f. Suppl. 114. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 205. n° 1132.

Graminée dont les chaumes sont très-élevés, pleins, solides, & dont les feuilles ont leur gaine filonnée, ponctuee; les points faillans, surmontés d'un poil fin; les autres parties hispides. Les épis sont terminaux, foliaires, cylindriques, filiformes, longs d'environ trois pouces, munis de fleurs sur toute leur face; les valves calicinales sont ovales, obruées.

Cette plante croît dans les Indes. (*Descript. ex Linn. f.*)

10. ROTBOLLE à corymbes. *Rotbolla corymbosa*. Linn. f.

*Rotbolla spica aggregatis, lateralibus, filiformibus; flosculis bifariis patentibus, foliis basi ciliatis*. Linn. f. Suppl. pag. 114. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 205. n° 1131.

*Rotboellia (punctata), spica teretibus, pluribus, fasciculatis, subsessilibus; flosculis solitariis, alternis; calicibus punctatis*. Retz. Observ. 3. pag. 12.

*Ægilops (exaltata), spica filiformibus, muticis, corymbosis*. Linn. Mant. 575. — Retz. Observ. 2. pag. 27.

Ses chaumes sont droits, roides, cylindriques, presque dépourvus de feuilles, excepté à leur base, où elles sont ciliées à leur partie inférieure; lisses, étroites, presque longues d'un pied. Les épis sont roides, terminaux, d'environ deux pouces de long; ils sortent plusieurs ensemble des gaines supérieures presque en corymbes, composés d'épillets alternes, foliaires. Les calices sont ovales, obrués, striés & ponctués, à une seule valve, souvent biflore; l'une des fleurs mâle, l'autre hermaphrodite, plus courtes que le calice.

Cette plante croît dans les Indes, sur la côte du Malabar, le long des fossés. (*Descript. ex Retz. & Linn.*)

11. ROTBOLLE fasciculée. *Rotbolla fasciculata*. Desfont.

*Rotboellia spica axillaribus, aggregatis, arcuatis; floribus quadrifariam dispositis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 110. tab. 36.

*Rotbolla (altissima), spica tereti-subulatis, subsessiculatis*. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 105.

*Rotbolla (fasciculara), spica tereti-subulatis, subsessiculatis; calicis glumâ bipartita, culmo geniculis creberrimis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 204. n° 1130.

C'est une très-belle espèce qui se distingue aisément à ses épis fasciculés dans les aisselles des feuilles, & à ses chaumes très-élevés.

Ses racines sont fibreuses, d'un blanc-jaunâtre ; elles pouillent plusieurs tiges droites, souvent rameuses à leur base, hautes de deux à quatre pieds, très-lisses, noueuses, un peu flexueuses à leur partie inférieure, médiocrement comprimées, anguleuses, cannelées & presque canaliculées ; garnies de feuilles glabres, loupes, lisses, larges d'environ deux lignes, munies de gaines lâches, un peu plus courtes que les entre-nœuds, presque nues à leur orifice.

De l'aisselle des feuilles supérieures sortent depuis deux jusqu'à six épis environ, fasciculés, pédonculés, longs de quatre à cinq pouces, glabres, un peu arqués, le long desquels les fleurs sont disposées sur quatre rangs, très-serrées & appliquées fortement contre un rachis quadrangulaire, articulé, à quatre sillons profonds. Les pédoncules sont comprimés, canaliculés, appliqués contre les chaumes, munis chacun à leur base d'une gaine membraneuse. Le calice est composé d'une seule valve dure, coriace, ovale, un peu aiguë, uniflore. La corolle est plus courte, à deux valves minces, membraneuses, renfermant trois étamines, deux styles barbus, auxquels succèdent des semences étroites, oblongues.

Nous avons recueilli, M. Desfontaines & moi, cette graminée dans les lieux marécageux & sur le bord des lacs, aux environs du Bastion-de-France, sur les côtes de Barbarie. 2 (V. v.)

11. ROTBOLLE à une étamine. *Rotbolla monandra*. Cavan.

*Rotbolla culmo erecto ; floribus distichis, spicatis*. Cavan. Icon. Plant. vol. 1. pag. 27. n°. 4. tab. 29. fig. 1.

*Gramen exile, arundinaceum, minimum, acuminatum reflexo*. Scheuchz. Gram. 41. tab. 1. fig. 7. K.

*Rotbolla spica tereti, subulata, erecta ; glumâ calicind, univalvi, indivisa, minuta ; spiculis aristatis*. Roth. Nev. Beitr. pag. 122. n°. 4.

Cette plante a de grands rapports avec les *cinna*, & s'écarte des *rotbolla* par le nombre des étamines & par l'arête des valves de la corolle.

Ses racines sont rousses, capillaires ; elles produisent plusieurs chaumes grêles, hauts d'environ un demi-pied, munis vers leur base de trois nœuds rougeâtres, un peu coudés ; garnis de feuilles courtes, très-étroites, filiformes ; les caulinaires sétacées, longues d'environ un pouce & demi.

Les épis sont très-grêles, composés de fleurs alternes, solitaires ou deux à deux, l'une sessile, l'autre pédiculée, toutes placées dans les excavations du rachis. Le calice n'a qu'une seule valve, courte, rougeâtre, ovale, aiguë, à deux fleurs. Les valves de la corolle sont presque inégales, glabres, oblongues, carénées, aiguës ; l'extérieure

terminée par une arête droite, aussi longue que la valve. Les fleurs ne contiennent qu'une seule étamine, dont le filament est velu à sa base ; l'anthère oblongue, à quatre sillons, d'un noir pourpre, profondément bifide après la fécondation ; l'ovaire surmonté de deux styles, dont les stigmates sont réfléchis & plumeux.

Cette plante croît en Espagne, dans les environs de Madrid. ☉ (V. f. in herb. Juss.)

13. ROTBOLLE pileuse. *Rotbolla pilosa*. Willd.

*Rotbolla spica simplici, subulata ; foliis pilosis brevioribus, culmo foliorum vaginis tecto*. Willden. Spec. Plant. t. pag. 465.

Cette plante, dont Willdenow le premier nous a donné connoissance, est, d'après cet auteur, la plus petite de son genre ; à peine a-t-elle plus d'un pouce de haut. Ses chaumes sont simples, entièrement recouverts par les gaines des feuilles qui s'élèvent de leur base. Ces feuilles sont linéaires, canaliculées, plus longues que le reste de la plante, couvertes de poils épars & longs. Les chaumes se terminent par un épi simple, solitaire, subulé.

Cette plante croît au Malabar. (Descript. ex Willd.)

14. ROTBOLLE foyeuse. *Rotbolla hirsuta*. Vahl.

*Rotbolla spica subulata, hirsuta ; spiculis hermaphroditis, patentibus ; sterilibus pedicellatis, adpressis*. Vahl. Symbol. 1. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 465. n°. 9.

*Triticum agiloides*. Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 29. n°. 94.

C'est une des plus belles espèces de ce genre, remarquable par le duvet long, abondant, argenté & foyeux, dont les épis sont garnis dans toute leur longueur.

Ses chaumes sont roides, durs, rameux, hauts d'un pied & plus, un peu flexueux vers leur base, très-lisses, garnis de feuilles roides, roulées à leurs bords, très-aiguës, presque piquantes, un peu arquées en dehors, d'un vert-pâle & glauque, jaunâtres vers leur sommet, longues de deux à trois pouces ; les supérieures & terminales beaucoup plus longues, ayant leurs gaines un peu lâches, cylindriques, lisses, munies à leur orifice d'une petite touffe de poils foyeux, très-fins.

Les épis sont droits, solitaires, subulés, longs de trois à quatre pouces ; leur rachis est flexueux, articulé, convexe d'un côté, concave de l'autre ; garni à ses articulations d'une longue touffe de poils épais, mous, luisants, foyeux, d'un beau blanc, au moins aussi longs que les fleurs. Les épillets sont ordinairement deux à deux, l'un pédiculé & appliqué contre chacune des articulations du rachis, l'autre écarté & sessile. Le calice est composé de deux

deux valves inégales; l'extérieure plane, ovale, acuminée, garnie de très-longs poils; l'intérieure carence, aiguë, pileuse sur la carence & à son sommet, renfermant deux fleurs, une mâle, l'autre hermaphrodite, dont les valves sont lancéolées, transparentes; les anthères linéaires, les stigmates en forme de pinceau. L'épillet pédonculé est stérile; les valves lancéolées, inégales, ciliées, entières.

Cette plante croit en Egypte; elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Delille. *(V. f. in herb. Lam.)*

15. ROTTBOLLE velue. *Rottbolla villosa.*

*Rottbolla foliis margine scabris; glumâ calicinâ bivalvis, bifidâ; flosculis sterilibus pedicellatis; fertilibus sessilibus, aristatis; rachis basi articulorum villosa. (N.)*

Belle espèce qui a quelques rapports avec le *rottbolla hirsuta*, mais qui en est très-distincte par les arêtes de ses valves, par ses feuilles planes, & par les poils du rachis, bien plus courts. Ses racines sont fibreuses, fasciculées, flexueuses; les chaumes grêles, longs d'un à deux pieds, lisses, cylindriques, rameux, garnis presque dans toute leur longueur de feuilles planes, étroites, aiguës, glabres, striées, larges d'une ligne environ, rudes à leurs bords; les gaines longues, étroites, munies à leur orifice d'une petite membrane au peu brune, courte, obtuse, bifide à son sommet.

Les épis sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, longs de trois à quatre pouces, grêles; les épillets alternes, à deux fleurs; l'une stérile, pédicellée, appliquée contre le rachis; l'autre hermaphrodite, sessile, écartée. Le calice a deux valves ovales, presque égales, roides; l'extérieure ouverte, un peu aiguë; la fleur fertile, à deux valves inégales; l'extérieure surmontée d'une longue arête flexueuse; l'intérieure très-mince, blanche, transparente; les semences étroites, allongées, presque cylindriques; la fleur stérile plus longue, pédicellée, velue sur le pédicelle, sans arête. Le rachis est garni à la base de chacune de ses articulations d'une petite touffe de poils blancs & foyeux.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par Comberlon. *(V. f. in herb. Juss.)*

16. ROTTBOLLE du Bengale. *Rottbolla cymbachne.*

*Rottbolla spica geminis, dimidiatis; foliorum vaginis ciliatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 465. n° 10.*

*Cymbachne ciliata. Retz. Observ. 6. pag. 36.*

Graminée à plusieurs chaumes grêles, simples ou rameux, tantôt garnis d'une seule feuille caulinaire, tantôt nus. Les feuilles radicales sont courtes, petites, munies sur les bords & à l'orifice

Botanique, Tome VI.

de leur gaine de cils longs & blanchâtres. Les chaumes se terminent par des épis linéaires, longs d'un pouce & demi, larges d'une ligne, dont le rachis est linéaire, membraneux, à trois séries longitudinales; articulé, flexueux & concave extérieurement à chaque articulation, composé de fleurs mâles ou hermaphrodites. Dans les fleurs mâles le calice est bifore, à deux valves serrées contre le rachis; l'extérieure linéaire, obtuse, ciliée sur le dos; l'intérieure à demi ovale, aiguë, striée, comprimée, colorée, ailée sur le dos, enveloppant une corolle bivalve, plus courte que le calice; les anthères sont noires; le style simple, terminé par deux stigmates noirâtres & barbus. Dans les fleurs femelles le calice n'a qu'une seule valve ovale, légèrement bifide à son sommet, ciliée à ses bords; il n'y a point de corolle; le pistil est le même que dans les fleurs mâles, mais les stigmates paroissent plus longs.

Cette espèce vient du Bengale, où elle a été recueillie par Koenig. *(Descript. ex Retz.)*

17. ROTTBOLLE fromentacée. *Rottbolla dimidiata. Linn. f.*

*Rottbolla spica subcompressa, secundâ; flosculis ad sinus rachearum aggregatis; folio obtuso, plano. Lam. Ill. Genet. vol. 1. pag. 205. n° 1133. tab. 48. fig. 1. 2.*

*Rottbolla spica dimidiata, compressa, lineari, latera exteriori aggregato-flosculosa, interiori levi, nudo. Linn. f. Suppl. 114.*

*Rottbolla spica dimidiata, compressa, lineari. Thunb. Prodr. 23.*

*Rottbolla (dimidiata), radice repente, culmis decumbentibus, vaginis compressis, foliis obtusis, spica solitaria, rachis lineari-flexuosa, hinc tantum forvato-floridâ. Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 60.*

*Panicum dimidiatum. Syst. veget. edit. 13. pag. 90. — Burm. Flor. ind. tab. 8. fig. 3.*

Cette espèce, par la disposition de ses fleurs réunies plusieurs ensemble à chaque articulation du rachis, paroît appartenir plutôt aux *panicum* qu'aux *rottbolla*. Linné l'avoit en effet placée d'abord dans les *panicum*, & M. Lamarck se proposoit également de le faire, cette plante offrant d'ailleurs la troisième valve calicinale qui constitue en partie le caractère des *panicum*. Je ne la présente ici que parce qu'elle a été oubliée dans l'article PANIC.

Ses racines sont rampantes, fibreuses; les chaumes en partie couchés à leurs articulations inférieures, garnis de feuilles glabres, courtes, planes, presque obtuses, dont les gaines sont comprimées, striées. Les fleurs forment un épi droit, solitaire, terminal, dont le rachis est articulé, un peu

R r

flexueux. Les épillets sont agrégés, sessiles, situés d'un seul côté : le côté opposé est presque plane, sans enfoncements. La baie calicinale est bise, munie à sa base d'une autre valve très-petite. La corolle est un peu plus courte que le calice.

Cette plante croît aux Indes, dans les sables sur le bord de la mer : on la rencontre également en Amérique, dans la Caroline & la Floride. (V. f.)

18. ROTTBOLE tripartite. *Rottbolla tripartita* Lam.

*Rottbolla spica compressa, secundâ; foliis ad finem rachis solitariis; folio acuto, convolutis.* Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 205. n°. 1134. tab. 48. fig. 1. B.

*Rottboellia (compressa), spica compressa, subulata; glomâ calicinâ lanceolata, planâ, indivisa.* ? Linn. f. Suppl. pag. 114.

*Rottboellia (compressa), spica compressa, pluribus, fasciculatis, pedunculatis; calicibus acutis.* ? Retz. Observ. 3. pag. 12.

*Rottboellia tranchelli.* Gmel. Hyf. Nat. vol. 1. pag. 197. n°. 7.

Cette plante ne peut pas plus rester parmi les rottboellies que l'espèce précédente; elle a le port d'un *tripacum*; mais les caractères de la fructification la rapprochent davantage des *panicum*, parmi lesquels M. Lamarck se proposoit de la ranger.

Ses chaumes ne s'élèvent qu'à une hauteur médiocre; ils sont, dans toute leur longueur, garnis de feuilles médiocres, larges de deux lignes, planes, quelquefois plissées ou un peu roulées à leurs bords, surtout les supérieures; presque disposées sur deux rangs, aiguës à leur sommet. L'épi est droit, épais, un peu comprimé, simple ou plusieurs ensemble, subulé, composé de fleurs presque unilatérales, sessiles, solitaires dans les excavations du rachis. Le calice est composé de deux valves aiguës, &c d'une troisième à leur base, fort petite. Cette plante paroit être la même que le *rottboellia compressa* de Linné, quoique ce dernier auteur n'ait reconnu qu'une seule valve au calice.

Cette espèce a été recueillie à Sierra-Leona par M. Smeathman; celle de Linné croît dans les Indes. (V. f. in herb. Lamarck & Jussieu.)

\* Espèces moins connues.

\* *Rottbolla (coelrachis), spica tereti, unilaterali; foliis geminis, altero pedicellato, calice bivalvi.* Forster. Prodr. n°. 49.

\* *Rottbolla (repens), spica tereti, subulata; glomâ calicinâ univalvi, indivisa.* Forster. Prodr. n°. 151.

ROUE (Corolle en). *Rosata corolla.*

Lorsque la corolle monopétale régulière est aplatie supérieurement, qu'elle n'a point de tube bien sensible, & qu'elle se divise en plusieurs découpures planes, lancéolées, aiguës, elle prend alors le nom de corolle en roue, assez semblable à une molette d'éperon: telle est celle de la bourrache, des molènes, des lysimachies, &c.

ROUGO de Madagascar ou HARUNGAN. *Harungana madagascariensis.* Lam.

*Harungana foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, oppositis; floribus laxè paniculatis, terminalibus.* (N.) Lam. III. Gener. tab. 645.

Genre de plantes dicotylédones, établi par M. Lamarck, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des millepertuis, qui a des rapports avec les *hypericum*, &c qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont entières, opposées, les fleurs disposées en une panicule terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles; cinq pétales; des étamines réunies en plusieurs paquets; cinq styles; une baie globuleuse à cinq loges, renfermant chacune une ou deux semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé profondément en cinq folioles égales, lancéolées, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle à cinq pétales, un peu plus longs que le calice, oblongs, rétrécis à leur base.

3°. Des étamines en nombre indéfini, dont les filamens sont réunis par leur base en cinq paquets séparés, plus longs que la corolle, terminés par des anthères petites, globuleuses.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté de cinq styles rapprochés, terminés par autant de stigmates simples.

Le fruit consiste en une baie arrondie, surmontée souvent d'une petite pointe; à cinq loges, contenant chacune une ou deux semences oblongues, fort petites.

C'est un arbre ou arbrisseau dont les rameaux sont droits, un peu comprimés, pubescens, garnis de feuilles opposées, pétiolées, très-entières, ovales-oblongues ou lancéolées, rétrécies, aiguës à leur sommet, arrondies à leur base, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes en dessus, un peu jaunâtres en dessous, longues de cinq à six pouces sur deux & demi de large, marquées de nervures latérales simples, alternes, saillantes.

Les pétioles sont droits, roides, un peu comprimés, pubescens, longs d'un pouce, presque connés à leur base. Il sort souvent de leurs aisselles de nouvelles feuilles également opposées, & qui se croissent avec les premières.

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux une belle panicule droite, ramifiée presque par bifurcation, dont les rameaux sont roides, pubescens, rousfrâtes, un peu striés, terminés par de petites touffes de fleurs ramassées & pédiculees. Le calice est glabre, petit, à cinq découpures aiguës. La corolle d'un blanc-jaunâtre; les pétales légèrement ciliés à leurs bords; les étamines plus longues que la corolle. Les fruits sont de petites baies fuculentes, d'un rouge-vif, de la grosseur d'un grain de poivre, soutenues à leur base par le calice persistant, divisées intérieurement en cinq loges, renfermant une ou deux semences très-petites.

Cette plante a été recueillie à l'île de Madagascar, d'abord par Commerson, & ensuite par Joseph Martin, qui en a communiqué des exemplaires à M. Lamarck. (V. f. in herb. Lam.)

**ROUHAMON.** *Rouhamon*. Aubl. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des apocinées, qui a des rapports avec les *Stychnos*, dont il ne diffère que par le nombre des parties de la fructification, qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, à fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle courte, partagée en quatre découpures; une corolle infundibuliforme, à quatre divisions; velue en dedans; quatre étamines; un pistil; une capsule à une seule loge, à deux semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice très-court, d'une seule pièce, partagé en quatre découpures aiguës, muni de deux petites écailles à sa base.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le tube est cylindrique; le limbe velu en dedans, à quatre divisions pointues.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont capillaires, velus à leur base, attachés au tube de la corolle, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, velu, surmonté d'un style simple, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule orbiculaire, à une seule loge, munie d'une écorce cassante, contenant deux semences à demi orbiculaires, planes d'un côté, convexes de l'autre.

#### ESPECES.

**ROUHAMON de la Guiane.** *Rouhamon guianensis*. Aubl.

*Rouhamon foliis ovatis, subsessilibus, oppositis; floribus axillaribus, romis cirrhosis.* (N.)

*Rouhamon guianensis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 93. tab. 36. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 322. n°. 1594. tab. 81.

*Lasiosoma cirrhosa*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 624. — Schreb. Gener. Plant. n°. 180.

g. *Idem*. foliis majoribus, non cirrhosis; flore minore. (N.)

Cet arbrisseau, dit Aublet, pousse de sa racine un tronc de sept à huit pieds de hauteur, sur fix à sept pouces de diamètre. Son écorce est grisâtre, inégale & raboteuse; son bois blanchâtre. Les rameaux sont opposés, couverts d'un duvet rousfrâtre; se répandent sur les arbres voisins, & s'y accrochent à l'aide de vrilles axillaires simples, en forme de crochets. Les feuilles sont opposées, médiocrement pétiolées, ovales, lisses, entières, terminées en pointe, d'un vert-pâle, marquées en dessous de trois nervures longitudinales, faillantes; les deux latérales arquées & conniventes à leurs deux extrémités; longues d'un à deux pouces sur six lignes de large, supportées par des pétioles très-courts, pubescens.

Les fleurs naissent par petits bouquets dans l'aisselle des feuilles, soutenues par un pédoncule court, garni à sa base de deux petites bractées opposées. Ces fleurs sont deux à deux, opposées, souvent presque sessiles. Leur calice est d'une seule pièce, divisé en quatre parties aiguës; la corolle monopétale, de couleur blanche, partagée à l'orifice du tube en quatre lobes aigus, couverts de poils blanchâtres intérieurement; quatre étamines dont les filaments sont garnis à leur base de poils blancs, surmontés d'anthères oblongues, jaunâtres, à deux loges. Le fruit est une capsule jaune, cassante, à une seule loge, qui renferme deux semences arrondies, convexes d'un côté, aplaties de l'autre.

Cet arbrisseau croît dans la Guiane, sur les bords de la rivière de Sinémari, à quarante lieues de son embouchure. Il fleurit dans l'automne. Les Galibis le nomment *Roukahamon*. (J)

On trouve, ajoute Aublet, une variété de cet arbrisseau, qui diffère par ses branches & ses rameaux point pubescens, par ses feuilles vertes & plus grandes, par ses fleurs & ses fruits plus petits, & d'ailleurs dépourvu de vrilles. Ses branches sont droites & croissent en buisson. Cette variété croît dans le même lieu, & porte le même nom.

*Observations.* Cette variété nous paroît avoir



des caractères suffisans pour pouvoir être distinguée comme espèce. P.

**ROULÉES (Feuilles).** *Convoluta folia*. Les feuilles sont roulées sur elles-mêmes, de deux manières assez importantes à considérer.

Les unes sont toulées en dehors (*revoluta*) lorsqu'elles sont roulées sur elles-mêmes extérieurement en forme de spirales, ou lorsqu'elles sont simplement roulées en leurs bords de dessus en dessous, comme dans le *teucrium supinum*, &c.

Les autres sont roulées en dedans (*involuta*) lorsqu'elles sont roulées sur elles-mêmes intérieurement de dessous en dessus, & qu'elles forment une sorte de spirale aux dépens de leur longueur ou de leur largeur.

Les vrilles ou mains (*cirrhii*) prennent la même dénomination dans le même sens. Elles sont :

Roulées en dedans (*convoluta*) lorsque les spirales se roulent de dessous en dessus ;

Roulées en dehors (*revoluta*) lorsque leurs spirales se roulent de dessus en dessous.

**ROUPALE.** *Roupala*. Aubl. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, polypétales, de la famille des protées, qui a des rapports avec les *brabeum*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, simples ou ailées ; les fleurs disposées en épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle partagée en quatre pétales concaves à leur partie supérieure ; point de calice ; quatre étamines attachées dans la cavité des pétales ; un péricarpe uniloculaire, à une seule semence.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une corolle composée de quatre pétales adhérens par leur base, linéaires, spatulés, obtus, creusés intérieurement à leur partie supérieure, flammifères, caducs.

2°. Point de calice, à moins qu'on ne regarde la corolle comme tel.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont très-courts, attachés aux pétales, surmontés d'anthères oblongues, contenues dans la cavité des pétales lorsque la fleur est fermée, droites dans la corolle ouverte.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, velu, surmonté d'un style filiforme, un peu en massue à son sommet, terminé par un stigmate presque ovale.

Le fruit, encore peu connu, n'a qu'une seule loge qui contient une seule semence.

#### ESPÈCES.

1. **ROUPALE de montagne.** *Roupala montana*. Aubl.

*Roupala foliis simplicibus, ovatis, acuminatis, complicato-canaliculatis; racemis longis, axillaribus.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. p. 243. n°. 128. tab. 55.

*Roupala montana*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 83. tab. 32. — Juss. Gener. Plant. pag. 79.

*Rupala (montana), foliis ovatis, petiolatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 536. n°. 1.

*Rupala montana*. Vahl. Symbol. 3. pag. 20.

C'est un arbrisseau qui s'élève à sept ou huit pieds de haut, dont le tronc est revêtu d'une écorce blanchâtre, ridée ; le bois est blanc : il s'en exhale une odeur forte & fétide lorsqu'on le coupe. Ses branches se divisent en rameaux glabres, cylindriques, de couleur brune, tuberculés & sans feuilles dans leur vieillesse ; garnis, lorsqu'ils sont jeunes, de feuilles alternes, pétioles, lisses, vertes, fermes, longues de quatre à cinq pouces, ovales, elliptiques, très-entières, longuement acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles allongés, renflés à leur base.

Les fleurs forment des grappes presque solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, dont le pédoncule commun est long de trois ou quatre pouces, couvert de poils d'un brun-noirâtre. Ces fleurs sont deux à deux, pédicellées, alternes ; elles n'ont point de calice. La corolle est partagée jusqu'à sa base en quatre découpures longues, étroites, réunies inférieurement en un tube filiforme, velues & jaunâtres en dessous, blanchâtres en dessus, munies à la base de l'ovaire de petits points glanduleux. Les filamens des étamines sont très-courts ; leurs anthères renfermées, avant la fécondation, dans la cavité supérieure des découpures. L'ovaire est velu, allongé ; le style de couleur verte, renflé à son sommet.

Cette plante croît à la Guiane, sur le sommet de la montagne Serpent ; elle fleurit vers le milieu de l'été. Th (V. f. in herb. Lam.)

2. **ROUPALE à feuilles sessiles.** *Roupala sessilifolia*. Rich.

*Roupala foliis ad summities congestis, sessilibus, cuneato-oblongis.* Rich. A&C. Soc. Hist. Nat. Paris. 1. pag. 106.

*Rupala (sessilifolia), foliis cuneato-oblongis, sessilibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 537. n°. 2.

Ses rameaux sont cylindriques, ligneux, revêtus d'une écorce griseâtre, glabre, striée ; les feuilles

alternés, presque opposées, ramassées à l'extrémité des rameaux, sessiles, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures rameuses & conniventes, rétrécies en coin à leur base, élargies vers leur sommet, acuminées, entières à leurs bords, longues de huit à dix pouces sur au moins trois pouces de large.

Les fleurs forment une panicule ample, terminale, dont les ramifications sont opposées, presque verticillées, au nombre de trois ou quatre à chaque articulation ; très-étalées, ouvertes en angles droits, rendues à leur insertion, soutenant chacune à leur partie supérieure un long épi de fleurs pédicelées, éparses, nombreuses. Les pétales sont réunis en un tube allongé ; les ovaires pubescents.

Cette plante croît à Cayenne & dans les contrées méridionales de l'Amérique. *Th* ( *V. f. in herb. Lam.* )

### 3. ROUPALE à feuilles ailées. *Roupala pinnata*. Lam.

*Roupala foliis pinnatis, subtijugis; foliolis ovatis; racemis brevissimis tomentosis, subterminalibus.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 243. n°. 1282.

Espèce très-remarquable par ses feuilles ailées, très coriaces.

Ses rameaux sont droits, cylindriques, de couleur roussâtre, glabres, friles, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées d'environ six folioles ovales, opposées, pétioles, épaisses, très-coriaces, entières, rétrécies à leur base, acuminées à leur sommet, très-luisantes & glabres à leur face supérieure, un peu plus pâles en dessous, marquées de nervures rameuses, dont l'intervalle est occupé par des veines en réseau.

Les fleurs sont disposées en épis simples, axillaires & terminaux, légèrement pubescents, plus courts que les feuilles ; le pédoncule commun nu inférieurement, soutenant vers sa partie supérieure des fleurs pédicelées, presque fasciculées en verticilles ; les pétales sont longs, étroits, linéaires, spatulés à leur sommet.

Cette plante croît à la Guiane, où elle a été recueillie par M. Richard. *Th* ( *V. f. in herb. Lam.* )

**ROURELLE.** *Rourea*. Aubl. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des terebinthacées, qui a des rapports avec les grateliers ( *castia* ), & qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les branches & les rameaux sont farmenteux & tortueux ; les feuilles ailées avec une impaire, munies de deux stipules à leur base ; les fleurs disposées en panicules axillaires & terminales, garnies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice à cinq divisions ; cinq pétales ; dix étamines ; cinq styles ; un drupe à une seule semence, revêtu d'une enveloppe fragile.*

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, supérieur, d'une seule pièce, divisé en cinq découpures concaves, presque rondes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs, un peu arrondis, insérés sur le receptacle.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont filiformes, un peu plus longs que les pétales, terminés par des anthères petites, arrondies à deux loges.

4°. Un ovaire presque rond, supérieur, surmonté de cinq styles presque de la longueur des étamines, terminés par autant de stigmates oblongs, épais, filonnés.

Le fruit est un drupe noirâtre, ovale, à une seule loge, renfermant une seule semence revêtu d'une enveloppe fragile.

### E S P È C E.

**ROURELLE frutescente.** *Rourea frutescens*. Aubl.

*Rourea foliis imparipinnatis, quadrijugis, subtis tomentosis ; panicula foliis multo brevior.* (N.)

*Rourea frutescens*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 467. tab. 187. — Juss. Gener. Plant. pag. 369.

*Robergia frutescens*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 752. — Schreb. Gener. Plant. n°. 787.

Le tronc de cet arbrisseau a quatre ou cinq pieds de haut ; il est tortueux ; son écorce est roussâtre, & son bois dur, compacte & blanchâtre. Il produit des branches tortueuses & rameuses, qui se répandent sur les arbres voisins ; garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées avec une impaire, composées de sept à neuf folioles inégales, opposées, ovales, lisses, très-entières, vertes en dessus, revêtuées en dessous d'un duvet court & blanchâtre, munies à la base du pétiole commun de deux stipules caduques & coriaces.

Les fleurs sont disposées en panicules axillaires ou terminales, médiocrement étalées, plus courtes que les feuilles. Le calice est divisé en cinq folioles verdâtres, fermes & velues. La corolle est blanche, à cinq pétales arrondis, d'une odeur très-agréable, plus douce que celle du lilas. L'ovaire se convertit en un drupe noirâtre, contenant une seule semence verdâtre.

Cet arbrisseau croît dans les forêts de la Guiane.

sur la paroisse d'Aroua. *Th* (Descript. ex Aubl.)  
Il fleurit & fructifie vers le milieu de l'été.

**ROUSSEAU.** *Rouffea*. Smith. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, régulières, en forme de cloche, & qui comprend des arbutus exotiques à l'Europe, dont les tiges sont grimpantes, les rameaux charnus, les feuilles opposées, les fleurs solitaires, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice partagé en quatre découpures ; une corolle campanulée, à quatre divisions ; quatre étamines ; un style ; une baie supérieure, pyramidale, à quatre angles, contenant des semences nombreuses.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, partagé en quatre découpures très-profondes, linéaires, aiguës, réfléchies.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, dont le tube est ventru à la base, & la partie supérieure divisée en quatre découpures linéaires, aiguës, roulées en dehors.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont linéaires, dilatés, comprimés, droits, une fois plus longs que la corolle, terminés par des anthers petites & sagittées.

4°. Un ovaire supérieur, pyramidal, à quatre faces, se terminant en un style épais, persistant, surmonté d'un stigmate obtus, infundibuliforme.

Le fruit est une baie pyramidale, à quatre faces, à une seule loge, revêtue d'une écorce dure, contenant un grand nombre de semences lenticulaires, placées dans une substance pulpeuse.

*Observations.* Ce genre a été consacré à la mémoire de Jean-Jacques Rousseau, qui a prouvé, par ses Lettres sur la botanique & par plusieurs autres morceaux de ses ouvrages, que cette belle partie de l'Histoire naturelle en seroit aussi la plus séduisante, la plus aimable, routes les fois que ceux qui la professent, éviteroient de masquer ses charmes par une foule d'expressions barbares, désagréables à l'oreille, aussi difficiles à prononcer qu'à retenir.

#### E S P È C E.

**ROUSSEAU** à feuilles simples. *Rouffea simplex*. Smith.

*Rouffea foliis petiolatis, obovatis, dentatis ; pedunculis unifloris, axillaribus.* (N.)

*Rouffea simplex*. Smith, Icon. inedit. 1. pag. 6.

tab. 6. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 305 ; n°. 1539. tab. 75. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 607.

Arbrisseau qui se divise en rameaux noueux, épais, charnus, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, acuminées, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, munies à leur contour de dents irrégulières, distantes, supportées par des pétioles médiocres, canaliculés à leur face supérieure, ayant à leur base deux stipules aiguës & membraneuses.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux ; assez grandes, charnues, fourrées par des pédoncules courts, réfléchis, munis à leur base de bractées presque imbriquées, membraneuses, aiguës, semblables aux stipules. Leur calice est glabre, à quatre divisions réfléchies en dehors ; la corolle campanulée, ridée & légèrement pubescente en dehors, divisée jusqu'à sa moitié en quatre découpures aiguës, rabattues en dehors. Les étamines sont allongées avec les divisions de la corolle ; leurs filaments élargis ; l'ovaire glabre, pyramidal, surmonté d'un style persistant, auquel succède une baie de même forme.

Cette plante a été recueillie par Commerçon dans l'île Maurice. *Th* (V. f. in herb. Juss.)

**ROUVET.** *Ostrya*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioïques, de la famille des chalcids, qui a des rapports avec les *thesium*, & qui comprend des arbutus exotiques ou indigènes de l'Europe, à feuilles simples, presque linéaires ; à fleurs disposées en petites grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans

Des fleurs dioïques ; un calice coloré, à trois découpures ; point de corolle ; trois étamines insérées sur le calice ; un style ; trois stigmates ; une baie globuleuse renfermant un noyau osseux.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

\* Dans les fleurs mâles.

1°. Un calice coloré, d'une seule pièce, presque turbiné, à trois divisions égales, ouvertes, ovales, aiguës.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés sur le calice, terminés par des anthers arrondies, fort petites.

\* Dans les fleurs femelles.

1°. Un calice comme dans les fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire inférieur, turbiné, surmonté d'un style de la longueur des étamines, terminé par un stigmate à trois divisions ouvertes.

Le fruit consiste en une baie inférieure, arrondie, ombiliquée, dont l'intérieur est occupé par un noyau globuleux, dur, osseux.

### ES PÈ C E S.

1. ROUVET à fleurs blanches. *Ostrya alba*. Linn.

*Ostrya foliis linearibus, sparsis; racemulis axillaribus.* (N.)

*Ostrya* (alba), *foliis linearibus*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 95. n°. 1.

*Ostrya*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1450. — Roy. Lugd. Bat. 202. — Sauvag. Monsp. 56. — Gouan, Monsp. 502. — Gerard, Flor. gall.-prov. pag. 451. — Gronov. Orient. 308. — Mill. Dict. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1215. — Lam. Illustr. Gener. tab. 802. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 362. — Poiret, Voy. en Haïb. 162. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 241. n°. 257.

*Ostrya foliis linearibus, acutis*. Loefl. Iter, 169.

*Cassa poetica monspeliensium*. Tournef. Inst. R. Herb. 664. tab. 488. — Sh. w. Specim. n°. 117.

*Ostrya frutescens bacifera*. C. Bauh. Pin. 212.

*Cassa poetica monspeliensium, an Theophrasti*. Lob. Icon. 433. — Idem, Advef. 185. Icon.

*Cassa monspeliensium*. Camer. Epit. 26. Icon.

*Cassa guersmadii*. Cluf. Hist. 91. Icon. (Exclud. synon. Alpin. exot.)

*Cassa Monspeliensis aëda*. Gefn. Epit. 50.

*Cassa poetica*. Zanich. Ist. tab. 83.

*Cassa ligustica maritima*. Dalech. Hist. 2. pag. 1385. Icon.

β. *Esadem*, caule altiore, subarborescente. (N.) Desfont. l. c.

C'est un arbrisseau d'environ deux pieds de haut, dont les tiges sont très rameuses, noirâtres, striées, cylindriques; & les rameaux épars, alternes, effilés, droits, roides, garnis de feuilles épaisses, alternes, presque sessiles, étroites, oblongues, linéaires, de couleur glauque, glabres, entières, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont petites, blanchâtres ou un peu brunes, très-nombreuses, disposées en très-petites grappes dans l'aisselle des feuilles & à l'extrémité des rameaux. Leur calice se divise en trois petites découpures ovales, aiguës; souvent les fleurs fe-

melles offrent les rudimens des étamines. Les fruits sont de petites baies globuleuses, de la grosseur d'un grain de poivre, d'abord de couleur noire, puis rouges en mûrissant; elles sont presque sèches, ombiliquées, remplies par un noyau sphérique.

La variété β se rencontre dans la Barbarie. Son tronc est presque de la grosseur du bras, & s'élève à six ou huit pieds de haut. D'ailleurs, elle ne diffère en rien de la plante d'Europe.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, particulièrement vers les côtes maritimes. On la trouve dans les départemens méridionaux de la France. h (V. v.)

2. ROUVET du Japon. *Ostrya japonica*. Thunb.

*Ostrya foliis ovatis, serigeris*. Thunb. Flor. jap. pag. 31.

Espèce remarquable par la situation de ses fleurs, placées vers le milieu de la face supérieure des feuilles. Ses tiges sont ligneuses, tuberculées, hautes de cinq à six pieds; elles se divisent en rameaux alternes, cylindriques, souples, glabres, droits, garnis de feuilles alternes, plus nombreuses vers le sommet des rameaux, pétioles, ovales, acuminées, à petites dents serrées, glabres à leurs deux faces, plus pâles en dessous, longues d'un pouce & plus, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont situées, en petites ombelles, sur le milieu de la principale nervure des feuillés; elles sont dioïques. Chaque ombelle est simple, composée d'environ huit fleurs sans involucre, supportées par des pédoncules capillaires, inégaux, glabres, longs d'une ligne. Leur calice se divise en trois découpures glabres, ovales, concaves; les trois filamens, insérés entre chaque découpure, plus courts que le calice.

Cette plante a été découverte au Japon par Thunberg. h (Descript. ex Thunb.)

ROXBURGE élégante. *Roxburgia gloriosoides*. Roxb. Corom. 1. pag. 29. tab. 32.

Plante très-singulière, qui consiste à elle seule un genre particulier, qui paroît tenir le milieu entre les lilacées & les aéliacées, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à quatre folioles; une corolle à quatre pétales, soutenant, dans leur milieu, quatre folioles lanceolées, conniventes, à la base de chacune desquelles pend une anthère double; une capsule à une seule loge, à deux valves, polysperme; les semences inférées sur un réceptacle fongueux.

Ses racines sont tubéreuses, fusiformes, un peu fasciculées: il s'en élève une tige herbacée, gramin-

panne, glabre, filonnée, divisée en rameaux alternes, garnis de feuilles les unes alternes, d'autres opposées, pétiolées, ovales, en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, glabres, très-entières, délicates, marquées de neuf à onze nervures longitudinales, arquées de quatre à six pouces de long, sur trois ou quatre de large.

Les fleurs sont axillaires, supportées sur des pédoncules simples jusque vers leur milieu, divisées ensuite en deux parties soutenant chacune un fleur; à la base de la dichotomie deux bractées opposées, petites, ovales, aiguës.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles plus longues que la corolle, lancéolées, acuminées, roulées en dehors à leur base, de couleur jaunâtre.

2°. Une corolle composée de quatre pétales droits, de couleur purpurine, longs, étroits, lancéolés, acuminés, soutenant chacun, vers leur milieu, une petite foliole lancéolée, aiguë, un peu élançante en cœur à sa base, formant par leur rapprochement une sorte de tube.

3°. Huit étamines, dont les anthères sont sessiles, pendantes deux par deux à la base de chaque foliole qu'on pourrait peut-être regarder comme les filaments élargis, & qui ont cela de particulier, qu'ils tiennent aux pétales par leur sommet, & qu'ils sont libres à leur base.

4°. Un ovaire supérieur, globuleux, surmonté d'un stigmate sessile, court, aigu.

Le fruit est une capsule un peu comprimée, ovale, à une seule loge, à deux valves, renfermant, sur un réceptacle spongieux, huit à dix semences dans le centre de la capsule, cylindriques, striées, oblongues, médiocrement pédiculées; les pédicules chargés de petites vésicules transparentes, très-nombreuses.

Cette plante croît dans les vallées des montagnes, au Comorand. (Description ex Roxb.)

ROYENE. *Royena*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des plauquinières, qui a des rapports avec les *diospyros*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples, alternes; les fleurs axillaires, très-souvent solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice urcéolé, à cinq divisions; une corolle urcéolée, à cinq lobes réfléchis; dix étamines; deux styles; une capsule à une seule loge, à quatre valves.

CHARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, urcéolé, à cinq divisions persistantes.

2°. Une corolle monopétale, urcéolée, attachée au fond du calice, dont le tube est de la même longueur que le calice; le limbe à cinq lobes courts, ovales, réfléchis en dehors.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés sur la corolle, terminés par des anthères oblongues, aiguës, droites, à deux lobes, de la longueur du tube de la corolle.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, terminé par deux styles un peu plus longs que les étamines, & par autant de stigmates simples.

Le fruit est une capsule ovale, supérieure, marquée de quatre sillons, à une seule loge, s'ouvrant en quatre valves, renfermant quatre noyaux oblongs, triangulaires, revêtus d'une enveloppe particulière.

Observations. Les étamines avortent dans certaines fleurs, & cependant leurs ovaires sont fertiles; ce qui rend ces espèces presque monoïques.

Ce genre a aussi des rapports avec le *mabolo* (*cavanilla* Lam.), genre établi par M. Lamarck (*Encyclopédie*, vol. 3. pag. 663), dont Gartner a figuré le fruit sous le nom d'*Eubryopteris*, vol. 1. tab. 39, mais qui se trouve mal placé & renversé du haut en bas, tellement que Gartner a cru que le calice étoit supérieur & couronnoit le fruit, tandis qu'il est réellement inférieur, persistant, comme dans toutes les plantes de la famille des plauquinières. Cette même plante est figurée, avec tous ses détails, dans un ouvrage anglais publié par les soins de M. Banks.

Le *paniffé kamaram*, Rheed, Malab. 3. tab. 41, paroît être une autre espèce de *mabolo*.

J'ai vu, dans l'herbier de M. Lamarck, un nouveau genre de plantes très-voisin de celui-ci & des *diospyros*, étiquetée de la main de M. Vahl sous le nom de *fercola*. Il m'a paru ne différer des *royena* que par ses calices entiers, à trois lobes peu sensibles. La corolle est composée de trois pétales oblongs, obtus, presque connivens. Le nombre des étamines n'est pas connu: il n'y a qu'un pistil, dont l'ovaire est supérieur, globuleux, un peu velu, surmonté d'un style simple, plus court que la corolle, terminé par un stigmate légèrement bifide. Le fruit est une capsule ou une baie sèche, globuleuse, à une seule loge.

La plante dont il est ici question a des feuilles coriaces, glabres, alternes, pétiolées, assez semblables à celles du buis, ovales, obtuses. Les fleurs sont axillaires, presque sessiles, solitaires (polygames?). Elle me paroît avoir de très-grands rapports avec le *pisonia* (*buxifolia*) *inermis*, *corollis trifidis*, *hirsutis*; *foliis subsessilibus*, *reticulatis*, *obovatis*. Rotb. Nov. Act. Dan. 2. pag. 536. tab. 4. fig.

fig. 2, & que nous n'avons pas mentionnée au genre *pifonia*, ne jugeant pas qu'elle puisse lui appartenir. Peut-être pourroit-on aussi la rapporter à l'*hyghthanda*. Linn. Flot. zeylan. pag. 322. n°. 430.

## E S P È C E S.

1. ROYÈNE à feuilles luisantes. *Royena lucida*. Linn.

*Royena foliis splendens, ovatis, acutis, subtus pubescentibus*. (N.)

*Royena foliis ovatis, scabrisculis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 304. n°. 1. — Hort. Clifort, 149. — Royen, Lugd. Bat. 411. — Miller, Dict. n°. 1. — Kniph. Centur. 10. n°. 74. — Lam. Ill. Gener. tab. 370. fig. 1.

*Royena foliis ovatis, villosis*. Thunb. Prodr. 80.

*Staphylocladum africanum, sempervirens; foliis splendens*. Commel. Hort. 1. pag. 187. tab. 96.

*Staphylocladum africanum, folio singulari, lucido*. Herm. Paradis. 232. tab. 232.

*Pistaria africana*. Pluken. Almag. 298. tab. 63. fig. 4. & tab. 317. fig. 5.

Arbrisseau dont les tiges, d'une grosseur médiocre, s'élèvent à la hauteur de six à huit pieds & plus, & se divisent en rameaux épars, irréguliers, alternes, cylindriques, lisses, d'un gris-noirâtre; pubescens & roussâtres dans leur jeunesse, garnis de feuilles persistantes, alternes, légèrement pétiolées, luisantes, coriaces, ovales, très-entières, un peu aiguës à leur sommet, d'un vert-foncé & un peu rudes en dessus, plus pâles & pubescentes à leur face inférieure, tout-à-fait glabres & luisantes dans leur vieillesse, légèrement ciliées à leurs bords, longues d'un à deux pouces au plus; les pétioles longs d'environ deux lignes, cylindriques, velus.

Les fleurs sont solitaires, pédonculées, situées dans l'aisselle des feuilles ou un peu au dessus, vers l'extrémité des rameaux. Leur pédoncule est ordinairement plus court que les feuilles, un peu pendante, garni dans sa longueur de quelques petites bractées lancéolées, aiguës. La corolle se divise à son limbe en cinq lobes ouverts, arrondis. Le fruit est une capsule globuleuse, soutenue à sa base par le calice persistant.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

2. ROYÈNE velue. *Royena villosa*. Linn.

*Royena foliis cordatis, oblongis, subtus tomentosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 568.

*Royena fabra*. Burm. Prodr. 15.

*Botanique. Tome VI.*

Cette espèce a de très-grands rapports avec la *royena lucida*. On l'en distingue par les feuilles en cœur, plus allongées, plus grandes, constamment velues, & par les deux bractées qui accompagnent le calice.

Ses tiges se divisent en rameaux épars, velus, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, elliptiques ou oblongues, échancrées en cœur à leur base, très-entières, obtuses à leur sommet, tomenteux à leur face inférieure, supportées par des pétioles très-courts, velus. Les fleurs sont solitaires, pendantes, axillaires, soutenues par des pédoncules velus, de la longueur des fleurs. Le calice est accompagné à sa base de deux bractées opposées, caduques, plus grandes que lui.

On trouve cet arbrisseau au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lamarck.)

3. ROYÈNE hérissée. *Royena hirsuta*. Linn.

*Royena foliis lanceolato-oblongis, hirsutis, subtus nervoso-rugosis*. (N.)

*Royena foliis lanceolatis, hirsutis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 305. n°. 4. — Royen, Lugd. Bat. 441. — Miller, Dict. n°. 3. — Thunb. Prodr. 80. — Jacq. Collect. Suppl. 110. tab. 13. fig. 1. — Lamarck, Ill. Gener. tab. 370. fig. 2.

*Royena (hirsuta), foliis oblongo-lanceolatis, villosissimis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 632. n°. 5.

*Arbutus, foliis lanceolatis, integerrimis, hirsutis*. Hort. Clifort, 163.

*Staphylocladum africanum, folio lanuginoso, rosmarini latiore*. Benth. Lugd. Bat. 2. pag. 235.

Ses tiges sont fortes, revêtues d'une écorce grise, hautes de sept à huit pieds, divisées en rameaux diffus, alternes, pubescens, raboteux, cylindriques, velus dans leur jeunesse, garnis de feuilles nombreuses, très-rapprochées, alternes, éparées, presque sessiles, oblongues, lancéolées, un peu molles, pubescentes & légèrement velues à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses, rétrécies à leur base en un pétiole très-court, ridées & à nervures saillantes en dessous; longues d'environ un pouce, sur trois à quatre lignes de large; caduques, restant par leur chute & l'impression de leur attache les rameaux très-raboteux.

Les fleurs sont petites, solitaires, de couleur pourpre-pâle, portées sur des pédoncules courts, filiformes, un peu pendans, situés dans l'aisselle des feuilles ou un peu au dessus vers l'extrémité des rameaux. Le calice est presque campanulé, à cinq dents ovales, presque obtuses; le tube de la corolle est un peu plus long que le calice, & se divise à son limbe en cinq petits lobes obtus, réfléchis en dehors.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. v.)

4. ROYÈNE à feuilles en coin. *Royena cuneata*.

*Royena foliis subcuneato-oblongis, pubescentibus, acutis; caule furcilloso.* (N.)

Cette espèce, quoique très-voisine du *royena hispidata*, s'en distingue aisément par ses feuilles plus petites, pubescentes & non velues, sans rides ni nervures à ses deux faces.

Ses branches sont longues, effilées, médiocrement velues, d'un gris cendré, chargées de rameaux courts, alternes, presque tomenteux, garnis de feuilles nombreuses, éparpillées, petites, longues à peine d'un demi-pouce, presque sessiles, oblongues, entières, rétrécies en coin à leur base, obtuses & arrondies à leur sommet, légèrement pubescentes & un peu cendrées à leur face inférieure, presque glabres en dessus.

Les fleurs sont foliaires, presque axillaires, soutenues par des pédoncules simples, à peine aussi longs que les fleurs; pubescents, réfléchis. Leur calice est blanchâtre, à cinq divisions courtes, profondes, lancéolées, aiguës; la corolle d'un pourpre-foncé, urcéolée, à cinq lobes réfléchis, obtus.

Cette plante croît dans les Indes. *h* (V. f. in herb. Lamarck.)

5. ROYÈNE à feuilles glabres. *Royena glabra*. Linn.

*Royena foliis lanceolatis, glabris.* Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 304. n°. 3. — Royen, Lugd. Bat. 441. — Miliet, Dict. n°. 2. — Berg. Plant. cap. pag. 144.

*Royena foliis oblongis, acutis, glabris, planis.* Thunb. Prodr. 80.

*Royena foliis lanceolatis.* Hort. Clifffort, 140.

*Vitis idaa aethiopica, buxi minoris folio; floribus albis.* Commel. Hort. 1. pag. 125. tab. 65.

*Vitis idaa aethiopica, myrti foliis; floculis dependentibus.* Pluken. Almag. 391. tab. 321. fig. 4.

C'est un arbrisseau de cinq à six pieds de hauteur, dont les tiges sont droites, les rameaux foibles, épars, effilés, de couleur cendrée ou brune, velus, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, de la même forme & grandeur que celles du buis; ovales, oblongues, aiguës, glabres à leurs deux faces, un peu ridées en dessous; les supérieures un peu pubescentes en dessous, persistantes.

Les fleurs sont blanchâtres, assez nombreuses, axillaires, soutenues par des pédoncules simples, foliaires, très-courts, pendans, quelquefois bi-

flores, un peu velus. Leur calice est velu, à cinq découpures lancéolées, subulées, droites, aiguës; la corolle presque campanulée; son tube légèrement anguleux, plus court que le calice; son limbe à cinq découpures ouvertes, ovales, oblongues, un peu obtuses. Les fruits font de petites baies arrondies, de couleur purpurine. Bergius a observé, dans les fleurs de cette plante, de petites glandes disposées en anneau autour de l'ovaire.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h* (V. f.)

6. ROYÈNE à fleurs polyandriques. *Royena polyandra*. Linn. f.

*Royena foliis ellipticis; floribus polyandris, polygamis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 76.

*Royena foliis ovatis, subius tomentosis; flaminibus plurimis.* Linn. f. Suppl. pag. 240. — Thunb. Prodr. 80.

Cette espèce est un arbrisseau dont les rameaux sont garnis de feuilles alternes, ovales ou elliptiques, entières à leurs bords, tomenteux à leur face inférieure, glabres en dessus. Les fleurs s'écartent beaucoup des autres espèces de ce genre par le nombre de leurs étamines au-delà de dix, & en ce qu'elles sont en outre polygames, les unes étant hermaphrodites, d'autres n'ayant qu'un seul sexe.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

7. ROYÈNE pâle. *Royena pallens*. Thunb.

*Royena foliis oblongo-obovatis, obtusis, glabris.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 632. n°. 3.

*Royena foliis oblongis, obtusis, glabris, margine revolutis.* Thunb. Prodr. 80.

Ses feuilles sont alternes, oblongues, en ovale renversé, glabres à leurs deux faces, entières à leur contour, obtuses à leur sommet, un peu roulées à leurs bords. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

8. ROYÈNE à feuilles étroites. *Royena angustifolia*. Willden.

*Royena foliis lanceolatis, acutis, subius pilosifluculis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 633. n°. 7.

Cette espèce, présentée par Willdenow, se distingue, d'après ce même auteur, de toutes les autres par ses feuilles lancéolées, très-étroites, aiguës à leurs deux extrémités, glabres en dessus, garnies de quelques poils à leur face inférieure. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

RUBANEAU. *Sparganium*. Genre de plantes monocotylédones ou unilobes, à fleurs incomplètes, monoïques, de la famille des massettes.

qui a des rapports avec les *typha*, & qui comprend des herbes aquatiques, indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont réunies en plusieurs paquets globuleux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Les fleurs disposées en chatons arrondis ; les fleurs mâles supérieures ; point de corolle ; un calice à trois folioles ; trois étamines ; les fleurs femelles inférieures ; un style ; deux stigmates ; un drupe sec, monosperme, à une seule loge.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques, toutes réunies en paquets globuleux & distincts.

Les fleurs mâles sont supérieures. Elles offrent :

1°. Un calice à trois folioles linéaires, caduc.

2°. Point de corolle.

3°. Trois étamines, dont les filamens sont capillaires, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères oblongues.

Les fleurs femelles inférieures. Elles offrent :

1°. Un calice comme dans les fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style court, subulé, terminé par deux stigmates aigus, persistans.

Le fruit consiste en petits drupes supérieurs, secs, agrégés, rufines, anguleux à leur base, acuminés à leur sommet, à une seule loge, à une seule semence dure, oblongue, anguleuse.

Observations. Les espèces qui composent ce genre, & dont on n'en connoît encore que deux, ont un port très-remarquable par la disposition des parties de leur fructification. Les fleurs mâles & les fleurs femelles sont distinctes, mais réunies sur le même individu. Les premières forment des petites boules supérieures, munies d'un grand nombre d'étamines saillantes. Les secondes présentent des paquets sphériques plus gros, toujours situés au dessous des fleurs mâles, dont les fruits sont ovales, agrégés ; hérissés de pointes droites, subulées, réfulsantes des styles persistans.

#### ESPÈCES.

1. RUBANEAU à feuilles droites. *Sparganium erectum*. Linn.

*Sparganium foliis erectis, triquetris*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 178. — Flor. lap. 345. — Flor. suec. 770. 831. — Hort. Cliff. 439. — Roy. Lugd. Bat. 73. — Gronov. Virg. 114. — Gmel. Sibir. t.

pag. 144. — Scop. Carn. 2. n°. 1146. — Curtis, Lond. Icon. — Leers, Herborn. pag. 209. n°. 726. tab. 13. fig. 11. — Pollich, Pal. n°. 872. — Martiusch. Sil. n°. 675. — Dext. Nass. pag. 223. — Kniph. Cent. n°. 95. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 75. tab. 19. fig. 4. — Lam. Illustr. Genet. tab. 748. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 334. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 167. n°. 144. l. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 253.

*Sparganium caule folisque erectis*. Haller, Helv. n°. 1303.

*Sparganium ramosum*. C. Bauh. Pin. 15. — Idem, Theatr. Bot. pag. 223. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 531. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 13. fig. 1.

*Sparganium & butomus Theophrasti*. Lobel, Icon. 80. — Idem, Observ. pag. 41. Icon.

*Sparganium*. Camer. Epit. 732. Icon. — Matth. Comm. 702. Icon.

*Platanaria butomon*. Dod. Pempt. 601. Icon.

*Sparganium quibusdam*. J. Bauh. Hist. vol. 2. pag. 541. Icon. Male.

2. *Sparganium non ramosum*. C. Bauh. Pin. 15. — Idem, Theatr. Bot. 231. — Tourn. Inst. R. Herb. 531.

*Platanaria altera*. Dod. Pempt. 601. Icon.

*Sparganium alterum*. Lobel, Icon. 80. — Idem, Observ. pag. 41. Icon. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 541. Icon. — Dalech. Hist. vol. 1. pag. 1019. Icon.

*Sparganium (simplex), foliis basi triangularibus, lateralibus planis ; pedunculis simplicibus*. Curtis, Flor. Lond.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de trois à quatre pieds, rameuses à leur partie supérieure, glabres, roides, dures, garnies de feuilles longues, glabres, sessiles, presque entières, un peu obliques ; les inférieures aussi longues que les tiges, triangulaires particulièrement à leur base, planes & retrécies vers leur sommet.

Les fleurs sont disposées sur les rameaux en paquets globuleux, sessiles, épais, très-ferrés : les supérieurs ne contiennent que des fleurs mâles, les inférieurs des fleurs femelles. Le calice, pour chaque fleur, est composé de trois folioles droites, quelquefois un peu élargies, bifides ou trifides à leur sommet. Les étamines sont plus longues que le calice ; le stigmate quelquefois bifide ou marqué d'un filon longitudinal. Le fruit est sec, & contient une semence dure, anguleuse.

La variété 2 est un peu moins élevée. Ses riges sont simples, terminées par des paquets de fleurs sessiles ; le paquet inférieur ordinairement pédon-



culé, terminal, foliata. Les feuilles sont moins triangulaires, presque planes. Curtis la regarde comme une espèce distinguée de la première.

Cette espèce croît sur le bord des eaux, dans les étangs & les rivières, particulièrement dans les régions septentrionales de l'Europe. Je l'ai également observée en Barbarie. (P. v.)

Cette plante passe pour astringente, & ses racines sont recommandées comme sudorifiques. On se servoit autrefois de ses feuilles, en place de bandes, pour emmailloter les enfans. Les chevaux, les cochons, & quelquefois les vaches, mangent ses feuilles; mais les chèvres & les moutons n'en veulent pas.

#### 2. RUBANEAU flottant. *Spartanium natans*. Linn.

*Spartanium foliis decumbentibus, planis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1178. — Welter. Flor. dan. tab. 260. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 334. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 168. n°. 144. II. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 253. — Pollich, Pal. n°. 873.

*Spartanium foliis natantibus, plano-convexis*. Flor. lap. 345. — Flor. succ. 771. 832.

*Spartanium foliis planis, mollioribus, decumbentibus*. Hall. Helv. n°. 1304.

*Spartanium non ramosum, minus*. Dill. Giff. 130. Spec. 58.

*Spartanium minimum*. Rai, Hist. 1910. Angl. 3. pag. 437. — C. Bauh. Pin. 15. — Prodr. 24. — Tourn. Inst. R. Herb. 531. — J. Bauh. Hill. 2. pag. 541. *Aliske lione*.

Cette espèce, souple & molle dans toutes ses parties, se distingue aisément de la précédente. Ses racines sont fibreuses, menues, capillaires; ses tiges grêles, presque filiformes, ordinairement simples, glabres, hautes d'environ un pied, garnies dans toute leur longueur de feuilles vaginales à leur base, étroites, linéaires, planes ou légèrement concaves, larges à peine de deux lignes, longues de six ou huit pouces, lisses, obtuses à leur sommet, ordinairement flottantes à la surface des eaux, quelquefois redressées.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en petites têtes sphériques, sessiles, peu nombreuses, de la grosseur d'un pois : souvent il n'y a qu'une ou deux têtes de fleurs mâles, & deux ou trois de fleurs femelles : ces dernières occupent toujours la partie inférieure; celle du bas est très-souvent pédonculée, & fort de la gaine d'une feuille.

Cette plante, plus rare que la précédente, croît dans les mares & les fossés aquatiques, en Europe & dans la Barbarie, où je l'ai recueillie. (P. v.)

Liné a observé que dans les eaux profondes, & selon les localités, cette espèce parvenoit à la hauteur de huit à dix pieds, qu'elle avoit un *faucis* différent qui pouvoit la faire prendre pour une autre espèce.

On lui attribue les mêmes propriétés qu'à *Spartanium erectum*.

**RUBÉOLE.** *Sherardia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des tubiacées, qui a de grands rapports avec les *asperula*, & qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont entières, petites, verticillées; les fleurs terminales, quelquefois axillaires, réunies en une sorte d'ombelle, environnées d'un involucre en étoile.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice supérieur à quatre dents; une corolle infundibuliforme, à quatre lobes; le fruit composé de deux semences couronnées par les dents du calice.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, persistant, divisé en quatre, quelquefois cinq dents courtes, aigues.

2°. Une corolle monopétale, en entonnoir, dont le tube est cylindrique, alongé; le limbe plane, divisé en quatre lobes un peu aigus.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont courts, filiformes, insérés vers l'orifice du tube, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire inférieur, oblong, partagé en deux, surmonté d'un style filiforme, bifide à la partie supérieure, terminée par deux stigmates capités.

Le fruit est une capsule oblongue, contenant deux semences rapprochées, alongées, convexes d'un côté, planes de l'autre, couronnées chacune par deux dents calicinales.

*Observations.* Ce genre, très-voisin des *galium* & des *asperula*, diffère du premier par ses corolles tubulées, infundibuliformes, tandis qu'elles sont planes, presque sans tube dans les *galium*. Il diffère des *asperula*, avec lesquels il a encore plus de rapports par ses semences couronnées par les dents du calice; & de plus, ses fleurs sont sessiles ou presque sessiles, la plupart environnées d'un involucre composé de plusieurs folioles ouvertes en étoile.

Aux premières espèces connues de ce genre on en a ajouté quelques autres qui n'ont pas rigoureusement tous les caractères du genre, mais qui s'écartent encore plus des autres genres.

1. RUBÉOLE des champs. *Sherardia arvensis*. Lam.

*Sherardia foliis omnibus verticillatis, subfenis; floribus fasciculato-umbellatis, terminalibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 267. n°. 1399. tab. 61.

*Sherardia foliis omnibus verticillatis, floribus terminalibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. — Oeder. Flor. dan. tab. 419. — Pollich, Pal. 124. — Hoffm. Germ. 47. — Roth, Germ. I. pag. 68. — II. 191. — Curtis, Flor. Lond. Icon. — Gaym. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 110. tab. 24. fig. 2. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 169. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 126. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 373. n°. 952.

*Sherardia foliis fenis, lanceolatis; floribus sessilibus, umbellatis*. Hall. Helv. n°. 734.

*Sherardia*. Dill. Gener. 96. — Hort. Clif. 33. — Flor. suec. 113. 120. — Roy. Lugd. Bat. 257. Dalb. Paris. 46.

*Aparine punctata, supina; flore caruleo*. Tourn. Infl. R. Herb. 114. — Gärdel, Aix, 35.

*Rubeola arvensis, repens, carulea*. C. Bauh Pin. 334. — Prodt. 145.

*Rubia parva, flore caruleo, se spargens*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 719. Icon. Inferior.

β. *Eudem, foliis minoribus, subovatis, valde approximatis; caule superno hirsuto*. (N.)

Cette plante a presque le port de l'*Asperula arvensis*; mais, outre qu'elle en diffère par ses semences couronnées, on l'en distingue encore par ses feuilles plus larges, moins allongées, & en ce que ses involucre ne sont point chargés de ces poils longs & blanchâtres dont sont pourvus ceux de l'*Asperula arvensis*.

Ses racines sont courtes, un peu dures, presque simples, munies de quelques fibres: il en sort plusieurs tiges allongées, rameuses, couchées par terre, rudes sur leurs angles, velues à leur partie supérieure, grêles, articulées, dont les articulations sont plus ou moins distantes; chacune d'elles garnie de feuilles sessiles, verticillées, au nombre de cinq à six; lancéolées, fermes, un peu rudes, légèrement ciliées à leurs bords, très-aiguës, presque piquantes à leur sommet, hérissées de quelques poils roides.

Les fleurs sont de couleur bleuâtre ou purpurine, sessiles, terminales, réunies à l'extrémité des rameaux en forme d'une petite ombelle, environnées d'un involucre composé de plusieurs folioles semblables aux teuilles & disposées en étroit, plus longues que la corolle. Ses semences sont

dures, renfermées dans le calice persistant, & couronnées par ses dents.

La variété β est remarquable par ses feuilles plus courtes, ovales, rétrécies en pétiole à leur base, mucronées, très-rudes, fortement ciliées. Les verticilles sont tellement rapprochés, que l'intervalle de l'un à l'autre est souvent plus court que les feuilles: les rameaux sont aussi plus velus.

Cette plante croît en Europe, en Barbarie, dans les lieux arides & incultes. (V. v.)

2. RUBÉOLE des murs. *Sherardia muralis*. Linn.

*Sherardia foliis floralibus binis, oppositis; binis floribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. n°. 1400. pag. 267.

*Gallium foliis fenis linearibus, ramis simplicibus; fructibus hispids, subsessilibus*. Gerard, Flot. gall. prov. pag. 227. — Allion, Flor. pedem. n°. 31. tab. 77. fig. 1.

*Asperula verticillata, luteola*. C. Bauh. Pin. 334.

*Asperula verticillata, muralis, minima*. Column. Ecphr. 301. tab. 300.

*Aparine minima*. Allion, Niczenf. 4.

*Gallium minimum, seminibus oblongis*. Buxb. Centur. 2. pag. 31. tab. 30. fig. 2.

Cette plante n'appartient que médiocrement à ce genre; elle a le port d'un *Valantia*, presque la corolle d'un *Gallium* par son tube court, & ses semences sont à peine couronnées.

Elle est fort petite: ses tiges sont presque couchées, quadrangulaires, à peine rameuses, garnies de feuilles verticillées, ovales, lancéolées, au nombre de six aux verticilles inférieurs, & de quatre à ceux du milieu; enfin, de deux seulement aux verticilles supérieurs.

Entre ces deux dernières feuilles naissent deux fleurs opposées, médiocrement pédiculées; leur calice est court, divisé en quatre dents fort petites; la corolle d'un blanc-pale, plane, à peine tubulée. Les fruits sont oblongs, hispides; les semences un peu arquées, presque point couronnées.

Cette espèce croît dans les départements méridionaux de la France, en Italie, à Constantinople, sur les vieux murs & les rochers arides. (V. f.)

3. RUBÉOLE frutescente. *Sherardia frutescens*. Linn.

*Sherardia foliis quaternis, aequalibus; caule frutesco, floribus axillaribus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 268. n°. 1402.

*Sherardia foliis quaternis, aequalibus; caule fruti-*

cofo. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. — Swartz, Obferv. 46.

Arbrisseau nouveau, scabre, rude, inégal, dont les rameaux sont médiocrement tétragones, les feuilles verticillées, quaternées, égales, étroites, lancéolées, très-entières, glabres, roulées à leurs bords, un peu plus longues que les entre-nœuds, séparées à leur base par des stipules très-courtes, tubulées.

Les fleurs sont opposées, sessiles, axillaires. Leur calice est composé de quatre folioles lancéolées, persistantes, adnées avec l'ovaire. La corolle est blanche, infundibuliforme, de la longueur de l'ovaire; son limbe divisé en quatre découpures; les anthères oblongues; le fruit composé de deux coques.

Cette espèce croît dans l'île de l'Ascension.  $\eta$

Observations. Cette plante s'écarte beaucoup, par son fruit, du caractère particulier à celui de ce genre. Swartz la regarde comme devant tenir le milieu entre les *Spermacoe* & d'oia.

#### 4. RUBIOLÉ féide. *Sherardia feida*. Lam.

*Sherardia foliis oppositis, linearilanceolatis; caule fruticoso; cimis corymbosis, terminalibus*. Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 267. n°. 1401.

*Asperula* (calabrica), *foliis quaternis, oblongis, obtusis, levibus*. Linn. f. Suppl. pag. 120. — Lam. Dict. vol. 1. pag. 299. n°. 8. — Lhéritier, Stirp. pag. 67. tab. 32.

*Pavetta feidifima*. Cyrill. Plant. tar. tab. 1.

Cette plante a déjà été présentée dans cet ouvrage sous le nom d'*asperula* de Calabre. De nouvelles observations ont depuis déterminé M. Lamarck à la ranger parmi les *Sherardia*, dans ses illustrations.

Nous ajouterons à la description qui en a déjà été présentée, que les feuilles sont plus souvent opposées que quaternées, linéaires, lancéolées; les fleurs sont disposées en cimes corymbiformes; à l'extrémité des tiges; les fruits sont de petites baies oblongues, rougeâtres, peu succulentes, se divisant en deux, & couronnées par les dents du calice.

Cette plante croît dans le Levant & la Calabre.  $\eta$

RUBIACÉES (Les). *Rubiaceae*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un grand nombre de genres qui ont des rapports naturels avec celui des gatenées (*rubia*), qui s'y trouve également compris.

Les plantes renfermées dans cette famille sont des arbres, des arbrisseaux ou des herbes dont les

feuilles sont, dans quelques-uns, verticillées, dans le plus grand nombre opposées, presque jamais alternes, ayant leurs pétioles réunis par leurs bases, par le moyen d'une stipule simple ou quelquefois par une gaine ciliée.

Le calice est supérieur, d'une seule pièce, simple, quelquefois entier, bien plus souvent divisé à son orifice. La corolle est régulière, monopétale, souvent tubulée, découpée à son limbe; elle renferme des étamines en nombre défini, de quatre à cinq & quelquefois davantage; insérées sur le tube de la corolle, alternes avec les divisions du limbe & en nombre égal. L'ovaire est inférieurement, surmonté d'un, quelquefois de deux styles, terminés par un ou deux stigmates.

Le fruit est tantôt composé de deux coques, chacune d'elles monospermes; & les ne s'ouvrent pas, & ces semences produisent des-poutures de pétiocarpe; tantôt elles ont une seule coque capsulaire ou en baie, souvent à deux loges, renfermant une ou plusieurs semences, quelquefois à une seule ou à plus de deux loges, couronnées par les découpures persistantes du calice ou sans couronnement.

L'embryon est grêle, oblong, enveloppé latéralement d'un grand persipisme corné.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont les suivants :

1. Fruit à deux coques, à deux semences; étamines très-souvent au nombre de quatre; feuilles la plupart verticillées; tige presque toujours herbacée.

Les rubérols.....	<i>Sherardia</i> .
Les asperules.....	<i>Asperula</i> .
Les gailliers.....	<i>Gallium</i> .
Les crucianelles.....	<i>Crucianella</i> .
Les valances ou croisettes.....	<i>Valantia</i> .
Les garances.....	<i>Rubia</i> .
Les anthospermes.....	<i>Anthospermum</i> .

2. Fruit à deux coques, à deux semences; quatre étamines, quelquefois cinq ou six. Feuilles très-souvent opposées, réunies par leurs bases, par le moyen d'une gaine ciliée; tige ordinairement herbacée.

Les houstones.....	<i>Houstonia</i> .
Les knoxes.....	<i>Knoxia</i> .
Les spermacocés.....	<i>Spermacoe</i> .
Les diodes.....	<i>Diodya</i> .
Les galopines.....	<i>Galopina</i> .
Les richardes.....	<i>Richardia</i> .
Les phyllis.....	<i>Phyllis</i> .

3. Fruit à une seule coque, à deux loges; plusieurs semences; quatre étamines. Feuilles opposées; tige herbacée ou ligneuse.

Les hédysotes.....	<i>Hedysotis</i> .
Les oldenlandes.....	<i>Oldenlandia</i> .

Les carphales.....	<i>Carphalea</i> .
Les coccoipiles.....	<i>Coccoipilum</i> .
Les gomozes.....	<i>Gomozia</i> .
Les nacibes.....	<i>Nacibea</i> .
Les tontanes.....	<i>Tontanea</i> .
Les pécies.....	<i>Pecies</i> .
Les fernels.....	<i>Fernelia</i> .
Les caresbées.....	<i>Caresbaa</i> .

4. Fruit à une seule coque, à deux loges; plusieurs semences; cinq étamines. Feuilles opposées; tige aisément ligneuse.

Les gratgals.....	<i>Rindia</i> .
Les bellones.....	<i>Bellonia</i> .
Les virectas.....	<i>Viridita</i> .
Les macrocnemes.....	<i>Macrocnemum</i> .
Les bertières.....	<i>Bertiera</i> .
Les dentellas.....	<i>Dentella</i> .
Les mussendes.....	<i>Mussenda</i> .
Les quinquinas.....	<i>Cinchona</i> .
Les tocoyenes.....	<i>Tocoyena</i> .
Les posoquétres.....	<i>Posoqueria</i> .
Les rondellets.....	<i>Rondeletia</i> .
Les genipayers.....	<i>Genipa</i> .
Les gardènes.....	<i>Gardenia</i> .
Les portlandes.....	<i>Portlandia</i> .

5. Fruit à une seule coque, à deux loges, renfermant plusieurs semences; six étamines & plus. Feuilles opposées. Arbres ou arbrutes.

Les coutarés.....	<i>Coutarea</i> .
Les hillies.....	<i>Hillia</i> .
Les duroies.....	<i>Duraia</i> .

6. Fruit à une seule coque, à deux loges, à deux semences; quatre étamines. Feuilles opposées. Tige presque toujours ligneuse.

Les chomèles.....	<i>Chomelia</i> .
Les pavettes.....	<i>Pavetta</i> .
Les ixores.....	<i>Ixora</i> .
Les couffarés.....	<i>Couffarea</i> .
Les malanes.....	<i>Malanea</i> .
Les antires.....	<i>Antirea</i> .

7. Fruit à une seule coque, à deux loges, à deux semences; cinq étamines. Feuilles opposées. Arbres ou arbrutes.

Les chimarrhis.....	<i>Chimarrhis</i> .
Les ciocoques.....	<i>Chiococa</i> .
Les pycnophres.....	<i>Pycnophra</i> .
Les caféiers.....	<i>Coffea</i> .
Les cantis.....	<i>Canthium</i> .
Les ronabes.....	<i>Ranabea</i> .
Les pédries.....	<i>Paderia</i> .
Les coprosma.....	<i>Coprosma</i> .
Les simires.....	<i>Simira</i> .

8. Fruit à une seule coque, à plusieurs loges, une semence dans chaque loge; quatre ou cinq étamines & plus. Feuilles opposées. Tige souvent ligneuse.

Les aziers.....	<i>Nonatelia</i> .
Les laugiers.....	<i>Laugieria</i> .
Les myonimes.....	<i>Myonima</i> .
Les pyrolires.....	<i>Pyroliaria</i> .
Les vanguiers.....	<i>Vangueria</i> .
Les rategals.....	<i>Masthiola</i> .
Les guettardes.....	<i>Guettardia</i> .

9. Fruit à une seule coque, à plusieurs loges; plusieurs semences dans chaque loge; cinq étamines & plus. Feuilles la plupart opposées. Tiges ligneuses ou herbacées.

Les hamélies.....	<i>Hamelia</i> .
Les patimes.....	<i>Patima</i> .
Les sabices.....	<i>Sabicea</i> .

10. Fleurs agrégées sur un réceptacle commun, ou rarement jointes ensemble. Feuilles opposées. Arbres ou arbrutes. Tiges quelquefois herbacées.

Les mitchelles.....	<i>Mitchella</i> .
Les canéphores.....	<i>Canephora</i> .
Les patabées.....	<i>Pataia</i> .
Les évés.....	<i>Evea</i> .
Les tapogomes.....	<i>Tapogomea</i> .
Les morindes. Royoc.....	<i>Morinda</i> .
Les naclées.....	<i>Namelia</i> .
Les céphalantes.....	<i>Cephalanthus</i> .

11. Genres appartenant aux rubiacées, mais dans la fructification n'est pas encore suffisamment connue.

Les serilles.....	<i>Serilla</i> .
Les pagamés.....	<i>Pagamea</i> .
Les farameis.....	<i>Faramea</i> .
Les hydrophilacées.....	<i>Hydrophilax</i> .

**RUDÉQUE.** *Rudbeckia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les *Helianthemum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, rarement opposées, rudes, entières ou laciniées; les fleurs terminales, souvent remarquables par la longueur de la languette des demi-fleurons.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un réceptacle conique, chargé de paillettes; des fleurs radiées; les demi-fleurons stériles; les semences couronnées d'une membrane à quatre dents; les étamines du calice disposées sur deux rangs.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, composé de folioles disposées sur deux rangs, planes, d'une largeur moyenne, ordinairement fix à chaque rang.

2°. Une corolle radiée; des fleurons très-nombreux, hermaphrodites, rubulés, infundibuliformes, dont le limbe est terminé par cinq dents;

disposés sur un disque conique; des *semi-fleurs* femelles, stériles, terminées par une languette plane, lancéolée, pendante, à deux ou trois dents.

3°. Cinq *filamines* syngénèses, dont les filaments sont capillaires, très-courts; les anthères cylindriques, réunies en tube.

4°. Un *ovaire* supérieur, à quatre faces, surmonté d'un style filiforme, de la longueur du pétales, terminé par un stigmate à deux divisions réfléchies en dehors.

Dans les *semi-fleurs* de la circonférence, un *ovaire* fort petit, stérile, sans style ni stigmate.

Le fruit consiste en plusieurs semences solitaires, oblongues, terminées à leur sommet par une membrane à quatre dents, insérées sur un réceptacle conique, garni de paillettes, plus long que le calice; les paillettes de la longueur des semences, droites, concaves, canaliculées, caduques.

## E S P È C E S.

1. *Rudbeckia laciniata*. *Rudbeckia laciniata*. Linn.

*Rudbeckia caule levii, glabro; foliis subpinnato-laciniatis, segmentis ovali-lanceolatis, disco sphaeroides, corollis laxiusculis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 144.

*Rudbeckia foliis compositis, laciniatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 887. — Virid. Cliff. 88. — Hort. Cliff. 430. — Hort. Upf. 269. — Roy. Lugd. Bat. 181. — Gronov. Virgin. 129. — Kunth, Centur. 4. n°. 69.

*Chrysanthemum americanum*, perenne; foliis minus diffusis. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 22. §. 6. tab. 6. fig. 53. (Exclud. fig. 54.)

*Doronicum americanum, laciniato folio*. C. Bauh. Pin. 516.

*Aconitum helianthemum canadense*. Cor. Canad. pag. 178. tab. 179.

*Corona foliis, foliis amplioribus, laciniatis*. ? Tourn. Inst. R. Herb. 490.

*R. Rudbeckia (quinata), foliis omnibus quinatis, ovatis dentatis, exterioribus trilobatis*. Miller, Dict. n°. 5.

D'une racine dure, coriace, fibreuse s'élèvent des tiges droites, hautes de cinq à six pieds, lisses, glabres, striées, rameuses, surtout à leur partie supérieure; garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, laciniées, presque ailées; les découpures ovales, lancéolées, médiocrement élargies, d'un vert-foncé & souvent marquées de points rudes & blanchâtres, comme dans la plupart des borra-

ginées; plus pâles en dessous; les lobes ou les découpures très-irréguliers.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un corymbe lâche, supportées par de longs pédoncules. Les *semi-fleurs* sont jaunes, allongées, pendans, presque entières à leur sommet; les *fleurs* d'un jaune-pâle, très-courts; les folioles calicinales linéaires, un peu aiguës; les semences brunes, quadrangulaires, surmontées de quatre petites dents; les paillettes obtuses, membranées, de la longueur des semences; le réceptacle conique.

Cette plante se rencontre dans la Virginie, la Caroline & au Canada. (V. f.)

La plante à me paroît tenir le milieu entre cette espèce & le *Rudbeckia pinnata*. Ses feuilles ont leurs découpures plus étroites, souvent au nombre de cinq, très-aiguës; les dentelures plus fines; les fleurs moins grandes; les *semi-fleurs* étroits. Elle croît dans les mêmes contrées.

2. *Rudbeckia à feuilles ailées*. *Rudbeckia pinnata*. Mich.

*Rudbeckia caule anguloso pubente; foliis laciniato-pinnatis, segmentis lanceolatis, aiso oblongiusculis ovatois, corollis densis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 144.

*Chrysanthemum americanum*, perenne; foliis divisis, dilutius viridibus, majus. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 22. §. 6. tab. 6. fig. 54.

*Rudbeckia (pinnata), foliis radicalibus pinnatis, caulibus lobatis, summis indivisis, flosculis atropurpureis; receptaculo elongato, seminibus nudis*. Vent. Jard. de Cels, pag. 71. tab. 71.

M. Ventenat est le premier qui nous a donné la description de cette plante, qu'on auroit pu confondre avec le *Rudbeckia laciniata* de Linné, d'autant que cet auteur, en citant deux figures de Morifon, dont une appartient évidemment à cette espèce, sembloit les avoir réunies.

Ses tiges sont droites, ainsi que les rameaux, longues de six à huit pieds, rudes, cannelées, hérissées de poils courts, durs & couchés, garnies de feuilles dont la forme varie selon leur position. Les radicales sont longuement pétiolées, ailées avec une impaire, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, composées de folioles rudes, décurrentes, lancéolées, aiguës, médiocrement dentées; les feuilles caulinaires alternes, très-ouvertes, moins composées, presque sessiles; les supérieures entières, lancéolées, sessiles.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, formant, par leur réunion, un corymbe lâche; les *semi-fleurs* d'un beau jaune-doré, allongés, pendans, terminés par deux ou trois dents;

dents ; les fleurons du centre d'un pourpre-foncé ; le calice composé de folioles lancéolées, presque égales, aiguës, disposées par deux rangs ; les semences noires, sans rebord membraneux, d'une odeur de citron très-agréable, insérées sur un réceptacle cylindrique, pyramidal à son sommet, garni de paillettes spatulées, pubescentes à leur sommet, blanchâtres, purpurines sur leurs bords.

Cette belle espèce a été recueillie par Michaux dans le pays des Illinois. On la cultive dans plusieurs jardins. (V. v.)

3. RUBÉQUE digitée. *Rudbeckia digitata*. Ait.

*Rudbeckia foliis inferioribus compositis ; caulibus quinatis ternatisque, juncis simplicibus*. Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 251. — Mill. Dict. n°. 6.

*Obeliscotheca petalis florum perangustis, longis ; foliis digitatis ; caule glabro, ferrugineo*. Amm.

Ses rameaux sont grêles, lisses, anguleux, garnis de feuilles alternes ; les inférieures ou radicales, composées, pétiolées, presque ailées ; les caulinaires sessiles, divisées en cinq folioles glabres, entières, lancéolées, presque orbiculées ; les supérieures ternées ou simples. Les fleurs terminales, réunies en corymbe, supportées par des pédoncules presque filiformes ; les demi-fleurons linéaires, entiers, presque obtus.

Cette plante croît dans l'Amérique. (V. f. in herb. Justif.)

4. RUBÉQUE trilobée. *Rudbeckia triloba*.

*Rudbeckia foliis spatulatis, inferioribus trilobis, superioribus indivisis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 887. n°. 2. — Hort. Upf. 269. — Miller, Dict. n°. 3.

*Rudbeckia (triloba), hirsuta ; foliis inferioribus tripartitis, superioribus indivisis, lato-lanceolatis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 144.

*Rudbeckia foliis trilobis*. Gronov. Virg. 130.

*Chrysanthemum cannabinum, virginianum, hirsutum ; aisco magno, petalis aureis radiato*. Pluk. Almag. pag. 100. tab. 22. fig. 2.

*Chrysanthemum majus, virginianum ; foliis laciniatis & hirsutis, umbone nigricante*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 19. n°. 37.

a. *Eadem, foliis hirsutis, manifestis dentatis ; calice reflexo*. Mich. L. c.

b. *Eadem, foliis submentostis, calice incumbente*. Mich. L. c.

On distingue aisément cette espèce à ses feuilles divisées en trois lobes, & à ses demi-fleurons jaunes, à peine réfléchis, un peu élargis.

Ses racines sont composées d'un grand nombre Botanique. Tome VI.

de fibres, & produisent des tiges droites, hautes de deux ou trois pieds & plus, lisses, cannelées, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, rudes, vertes à leurs deux faces, variables dans leur forme ; les inférieures partagées en trois lobes ovales, acuminés, entiers à leurs bords, quelquefois munis de quelques dents rares, très-écartées, aiguës ; dans d'autres ces dents un peu plus marquées remplacent les lobes. Les feuilles supérieures sont entières, ovales, presque sessiles, acuminées ; les nervures varient également dans leur disposition.

Les fleurs sont terminales, & forment, par l'ensemble des rameaux nombreux, une panicule ou une sorte de corymbe étalé. Le centre est d'un brun presque noir ; la circonférence d'un beau jaune. Les demi-fleurons, à peine pendans ou réfléchis, sont oblongs, bifides ou quelquefois trifides à leur sommet, marqués de lignes noires, très-fines.

On en distingue deux variétés remarquables. Dans la première, a, les feuilles sont légèrement hérissées & les calices réfléchis ; c'est celle dont je viens de parler. Dans la seconde, b, les mêmes feuilles sont légèrement tomentueuses en dessous, & le calice est à peine réfléchi.

Ces plantes croissent en Amérique ; la première dans la Virginie & sur les hautes montagnes de la Caroline ; la seconde dans les contrées des Illinois. La variété a se cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

5. RUBÉQUE purpurine. *Rudbeckia purpurea*.

*Rudbeckia foliis lanceolato-ovatis, alternis, indivisis ; radiis petalis bifidis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 888. n°. 4. — Gronov. Virg. 130. — Miller, Dict. n°. 2. Icon. tab. 224. fig. 1.

*Rudbeckia (purpurea), foliis alternis, ovali-lanceolatis, utrinque acuminatis, rariter serratis ; radiis longissimis, dependentibus, bifidis, purpureis*. Mich. Flor. boreal-amer. vol. 2. pag. 143.

*Chrysanthemum americanum, doronicifolium ; flore perfecti coloris ; umbone magno, prominente, ex auro-purpureo-viridi, & auro fulgense*. Pluk. Almag. pag. 90. tab. 21. fig. 1. — Catesb. Carol. 2. pag. 59. tab. 59.

*Dracunculus virginianus, latifolius ; petalis florum longissimis, purpurascens*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 42. §. 6. tab. 9. fig. 1. — Rai, Suppl. 218.

*Bobartia*. Petiv. MuC. — Amm. Herb. 473.

C'est une très-belle espèce, remarquable par ses demi-fleurons longs, pendans, d'une belle couleur purpurine, un peu verdâtre.

Ses racines sont longues, fibreuses ; il s'en élève des tiges droites, médiocrement rameuses, hautes

de quatre à cinq pieds, lisses, glabres, presque cylindriques, cannelées, médiocrement anguleuses. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, lancéolées; les inférieures ou radicales larges, longuement pétiolées, un peu décurremtes à la partie supérieure de leur pétiole; les caulinaires plus étroites, lancéolées, acuminées, rudes à leurs deux faces, fermes, marquées de trois à cinq nervures presque longitudinales, dentées à leur contour, acuminées à leur sommet; les supérieures presque sessiles, rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont terminales, grandes, solitaires, presque globuleuses; le calice ample, glabre, composé de folioles lancéolées, aiguës, plus courtes que les fleurs. Les fleurons du centre sont petits, peu apparents; les demi-fleurons de la circonférence pendans, de couleur pourpre, étroits, longs au moins de trois pouces, bifides à leur sommet; les écailles du réceptacle larges, imbriquées, ovales, acuminées, très-caduques, presque aussi longues que les fleurons du centre.

Cette plante croît dans la Caroline & la Virginie, la Floride, dans les lieux montueux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans tous ceux des curieux. (V. v.)

6. RUDBECKIE amplexicaule. *Rudbeckia amplexicaulis*. Cavan.

*Rudbeckia foliis ovato-lanceolatis, amplexicaulis, laxi serratis; radii petalis ovatis, apice trilobis, intermedio minori.* (N.) — Lam. Illustr. Gen. tab. 705. fig. 2. — Bosc. Act. Soc. Paris. Natur.

*Rudbeckia (amplexicaulis), foliis alternis, ovato-lanceolatis, cordatis, subpetiolatis.* Cavan. Icon. Plant. 3. pag. 27. n°. 275. tab. 252.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou trois pieds, sur une tige herbacée, un peu filuleuse, médiocrement rameuse, verte, cannelée, glabre, presque anguleuse, garnie de feuilles sessiles, amplexicaules, amples, ovales en cœur ou lancéolées, ciliées, vertes à leurs deux faces, à dentelures lâches à leur contour, aiguës, marquées de nervures latérales, ramifiées à leur sommet.

Ses fleurs sont terminales ou axillaires, solitaires, portées sur de longs pedoncules nus, striés, uniflores. Les calices sont glabres, composés de folioles étroites, linéaires ou lancéolées, aiguës, d'environ plus courtes que les pétales; les demi-fleurons de la circonférence larges, ovales, linéaires dans quelques individus, d'un beau jaune, longs d'un pouce & plus, réfléchis, divisés à leur sommet en trois lobes inégaux; le lobe du milieu plus court que les deux autres; les fleurons du centre courts, d'un pourpre-noirâtre; le réceptacle conique, obtus, garni de paillettes planes, mucro-

nées, ciliées & pubescentes à leur sommet; les semences à peine dentées.

Cette plante, originaire d'Amérique, est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. RUDBECKIE hétérisée. *Rudbeckia hirta*. Linn.

*Rudbeckia foliis indivisis, spatulato-ovatis, triplicinerviis; radii petalis emarginatis.* Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 887. n°. 3. — Gronov. Virgin. 131. — Miller, Dict. n°. 1. — Kniph. Centur. 2. n°. 77. — Knorr. Del. 1. tab. F. 1.

*Rudbeckia (hirta), tota hirsutissima; caulibus virgatis, rariter ramosis, unifloris; pedunculo nudo; foliis ovali-lanceolatis, leviter serratis; infimis spatulato-ovalibus; calicis foliolis linearibus.* Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143.

*Rudbeckia ramis indivisis, unifloris; foliis ovato-lanceolatis, hirta.* Buttn. Cunon. 227.

*Rudbeckia foliis lanceolato-ovatis, alternis, indivisis; petalis radii integris.* Gronov. Virgin. 1. pag. 181.

*Obeliscotheca integrifolia, radio aureo, umbone atrovirente.* Dill. Eitrh. pag. 295. tab. 218. fig. 285.

*Chrysanthemum helveticum, umbone floris grandifolius, prominent.* Pluken. Almag. pag. 99. tab. 242. fig. 2. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 23. — Rai, Suppl. 210.

8. *Rudbeckia (chrysomela), caule hispido; ramis virgatis elongatis, unifloris; foliis alternis, sessilibus, ovali-lanceolatis, utrinque hispidis; calice foliaceo radios saturate aureos subnante, disco hemispharico, atro-purpureo.* Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 143.

Cette espèce est facile à reconnaître par les poils roides qui garnissent toutes les parties, & par ses feuilles lancéolées, entières.

Ses tiges sont roides, cannelées, presque anguleuses, très-rudes, velues, divisées vers leur partie supérieure en rameaux simples, longs, effilés, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, lancéolées, rudes, herissées de poils roides, très-courts; médiocrement dentées à leurs bords, aiguës ou un peu obtuses, marquées la plupart de trois nervures longitudinales; les supérieures à peine rétrécies à leur base; les inférieures pétiolées, plus larges, ovales, spatulées.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux; les folioles calicinales presque égales, linéaires, un peu obtuses, de la longueur des demi-fleurons, rudes, ciliées. Les fleurons sont très-courts, d'un pourpre-noirâtre; les demi-fleurons point réfléchis, linéaires, longs à peine d'un pouce, d'un jaune plus foncé à leur partie inférieure, bifides à leur sommet.

Cette espèce se rencontre dans la Virginie, la Caroline & la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

Michaux a remarqué que cette plante, dans son pays natal, étoit beaucoup plus petite, moins composée, à peine rameuse.

La plante  $\beta$ , que je ne connois pas, m'a paru, d'après les caractères que Michaux lui attribue, si peu différente de la précédente, que j'ai cru devoir l'y réunir comme une simple variété; ses tiges sont plus rameuses; les feuilles ovales, lancéolées, sessiles, hispides à leurs deux faces; le calice foliacé, de la longueur des demi-fleurs; le disque hémisphérique, d'un pourpre-noir. Cette plante croît dans la Pensylvanie & la Caroline.

8. RUDBIQUE spatulée. *Rudbeckia spatulata*. Mich.

*Rudbeckia parvula*, minutè pubescens; caulibus gracilibus, unifloris; foliis parvulis, alternis, spatulato-obovatis, integris; calice patulo, radiis stridentibus. Mich. Flor. boreal.-amot. vol. 2. pag. 144.

Cette plante est fort petite; ses tiges grêles, délicates, pubescentes, garnies de feuillets alternes, ovales, presque spatulés, légèrement pubescentes, vertes à leurs deux faces, emières à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, terminales, pédonculées. Leur calice est composé de folioles élargies, ouvertes; les demi-fleurs de la circonférence terminés par trois dents.

Cette plante a été recueillie par Michaux sur les montagnes de la Caroline. (Descript. ex Mich.)

9. RUDBIQUE luisante. *Rudbeckia fulgida*. Aiton.

*Rudbeckia foliis oblongo-lanceolatis, denticulatis, hispidis, basi angustatis, succordatis; receptaculo hemisphaerico; paleis lanceolatis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 151.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, effilés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, oblongues, chargées de poils couchés & courts, denticulés à leurs bords, un peu échancrés en cœur à leur base, quelquefois rétrécies en pétiole, un peu luisantes, médiocrement aiguës. Les fleurs ont un réceptacle hémisphérique, chargé de paillettes lancéolées.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale.

10. RUDBIQUE à feuilles opposées. *Rudbeckia oppositifolia*.

*Rudbeckia foliis oppositis, lanceolato-obovatis, serratis; radii petalis oppositis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 888. n.°. f. — Gronov. Virgin. 131.

On ne connoit jusqu'à présent que cette espèce & le *Rudbeckia angustifolia* dont les feuilles sont opposées: dans celle-ci ses feuilles sont ovales, linéolées, dentées en scie, tandis qu'elles sont simples & linéaires dans la suivante. Les fleurs ont leur calice très-court, composé de folioles ovales. Les demi-fleurs de la circonférence sont très-longues, de couleur jaune, bifides à leur sommet, ainsi que les fleurs du centre. Ces derniers sont placés sur un disque convexe.

Cette plante croît dans la Virginie.

11. RUDBIQUE à feuilles étroites. *Rudbeckia angustifolia*. Linn.

*Rudbeckia foliis oppositis, linearibus, integerrimis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 888. n.°. 6.

*Coreopsis foliis linearibus, integerrimis*. Gronov. Virgin. 131. — Miller, Dict. n.°. 7. Icon. tab. 224. fig. 2.

Il manque à cette espèce un des principaux caractères de ce genre (elle n'est pas la seule), celui d'avoir les semences couronnées d'une membrane à quatre dents; mais comme d'ailleurs elle conserve ceux qui appartiennent au calice & à la corolle, il nous paroît plus convenable de lui conserver la place que Linné lui a donnée.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds; elles sont garnies de feuilles opposées, linéaires, étroites, linéaires, très-entières, rétrécies en pétiole à leur base; les fleurs sont terminales. Les demi-fleurs de la circonférence sont de couleur jaune, allongées, ordinairement au nombre de douze; les fleurs du centre un peu vengues à leur base, d'un pourpre-noirâtre. Les folioles extérieures du calice élargies & subulées; les intérieures plus étroites, resserrées, obuses; les semences nues à leur sommet.

Cette plante croît dans la Virginie. (V. f. in herb. Jussieu.)

RUDES (Feuilles). *Scabra, aspera folia*. Les feuilles, considérées quant à leur superficie, sont rudes lorsqu'elles ont leur surface parsemée d'aspérités ou de petits tubercules qui sont fort souvent sensibles à l'œil, ou qui se font sentir lorsqu'on glisse les feuilles entre les doigts; quelquefois même elles s'accrochent aux étoffes: telles sont celles du grateron (*galium aparine*).

Les tiges portent le même nom lorsque leur superficie est chargée d'éminences ou de points rudes & saillans.

RUDOLPHIE. *Rudolphia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a des rapports avec les *cratrina*, & qui comprend des arbres exotiques à



l'Europe, dont les feuilles sont simples ou ternées, alternes; les fleurs disposées en grappes latérales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres; l'étendard de la corolle très-long, lancéolé; des gouffes applaties, à une seule ou à plusieurs semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, tubulé, d'une seule pièce, divisé à son orifice en deux lèvres courtes, inégales.

2°. Une corolle papillonacée, à cinq pétales irréguliers, dont l'étendard est droit, lancéolé, très-long, réfléchi à ses bords; les deux ailes petites, presque ovales; la carène composée de deux pièces, de la longueur des ailes.

3°. Dix étamines diadelphes, dont les filaments inégaux sont réunis en une gaine à leur partie inférieure, terminés par des anthètes droites, sagittées.

4°. Un ovaire supérieur, médiocrement pédonculé, surmonté d'un style à peu près aussi long que les étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une gouffe plus ou moins allongée, comprimée, applatie, à une seule loge, renfermant une ou plusieurs semences.

Observations. Ce genre, établi par Willdenow, est en partie un démembrement de celui des *erythrina* de Linné : la forme des gouffes en fait le caractère & la différence. Cylindriques & noueuses dans les *erythrina*, elles sont applaties & comprimées dans les *rudolphia* : tous deux se rapprochent par la longueur remarquable de l'étendard.

J'ai cru devoir réunir à ce nouveau genre celui de *butea*, créé par Roxburg : ce dernier ne diffère des *rudolphia* qu'en ce que ses gouffes ne contiennent qu'une seule semence. D'après ces nouvelles considérations, je suis forcé de rappeler ici quelques espèces déjà mentionnées dans cet ouvrage, au mot ERYTHRINE, telles que l'*erythrina planifolia* & l'*erythrina monosperma*.

#### E S P È C E S.

1. *RUDOLPHIA* grimpante. *Rudolphia scandens*. Willd.

*Rudolphia foliis cordatis, ovatis, acuminatis, subspectatis*. Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. pag. 452. — Idem, Spec. Plant. vol. 3. pag. 918. n°. 1.

Arbrisseau dont les tiges sont dépourvues d'épi-

nes, revêtues d'une écorce noire, vatreuse & pubescentes dans leur jeunesse, grimpantes, s'enrouillant autour des arbres, divisées en rameaux alternes, souples, volubiles, garnis de feuilles simples, alternes, pétiolées, roides, presque peltées, ovales, échancrées en cœur à leur base, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, luisantes à leur face supérieure, pubescentes dans leur jeunesse; les pétioles à deux articulations, canaliculés entre chacune d'elles.

Les fleurs sont disposées en grappes éparées, latérales, trois fois plus longues que les feuilles, supportées par des pédoncules ternés. Le calice est court, à deux lèvres obtuses; la corolle d'une belle couleur écarlate; les gouffes planes, renfermant plusieurs semences.

Cette plante croît dans l'Amérique, à Porto-Ricco, sur les montagnes élevées. (J. Descript. ex Willd.)

2. *RUDOLPHIA* peltée. *Rudolphia peltata*. Willd.

*Rudolphia foliis subcordatis, oblongo-lanceolatis, peltatis*. Willd. Nov. Act. Soc. Nat. Scrut. Berol. 3. pag. 453. — Idem, Spec. Plant. vol. 3. pag. 918. n°. 2.

*Erythrina planifolia*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 993. — Lam. Encycl. botan. vol. 2. pag. 392. n°. 7.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles peltées, oblongues, lancéolées, & par ses pédoncules, qui parviennent souvent à un pied & demi de longueur, & se terminent par une petite grappe courte de fleurs écarlates. Nous renvoyons, pour la description des autres parties, à l'article de cet ouvrage, cité plus haut.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue. (J.)

3. *RUDOLPHIA* élégante. *Rudolphia superba*.

*Rudolphia ramulis glabris; foliis obovato-sub-rundis, obtusis*. Roxb.

*Butea superba*. Roxburg, Coromand. 1. pag. 23. tab. 22. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 917. n°. 2.

C'est un arbre dont les rameaux sont glabres, grimpans, & se répandent sur les arbres qui les avoient; ils sont garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de folioles trois fois plus grandes que celles du *rudolphia frondosa*, longues d'un pied, ovales, quelquefois un peu arrondies, très-entières, rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet.

Les fleurs forment des grappes amples, très-agréables, dont les pédoncules patitis sont courts ou alternes. Leur calice est presque campanulé, fort court, à deux lèvres, à cinq petites dents

inégales; la corolle est papilionacée, d'une belle couleur pourpre, écarlate; l'étendard très-long, lancéolé; les gousses longues, comprimées, membraneuses, ne contenant qu'une seule semence, tournée vers leur extrémité.

Cette plante croît dans l'Inde, sur les montagnes du Coromandel. *H*

#### 4. RUDOLPHE touffue. *Rudolphia frondosa*.

*Rudolphia ramulis pubescentibus; foliis subrotundis, emarginatis*. Roxb.

*Beta frondosa*. Roxburg. Corom. 1. pag. 21. tab. 21. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 917. n°. 1.

*Erythrina monosperma*. Lam. Encycl. bot. vol. 2. pag. 391. n°. 5.

Cette espèce diffère du *rudolphia superba* par ses folioles bien plus petites, plus arrondies, souvent échancrées à leur sommet, à peine rétrécies à leur base; par ses rameaux pubescens & par ses grappes de fleurs plus courtes, moins étalées. On peut consulter, pour les autres parties, l'article de cet ouvrage cité plus haut.

Cette plante croît au Malabar & au Coromandel, dans les lieux montagneux. *H*

RUE. *Ruta*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptéralées, de la famille des rutacées, qui a des rapports avec les *peganum* & les *zygophyllum*, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux, la plupart indigènes de l'Europe, à feuilles d'une odeur forte, composées, quelquefois simples, & dont les fleurs sont disposées en corymbes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre ou cinq découpures; quatre ou cinq pétales; huit à dix étamines; plusieurs pores nébulaires à la base de l'ovaire; une capsule à quatre ou cinq lobes; & autant de valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, persistant, à quatre ou cinq divisions.

2°. Une corolle à quatre ou cinq pétales ouverts, presque ovales, concaves, rétrécis à leur base.

3°. Huit ou dix étamines, dont les filaments sont très-ouverts, subulés, de la longueur de la corolle, un peu élargis à leur base, terminés par des antères droites, très-courtes.

4°. Un ovaire supérieur, relevé en bosse, marqué de huit à dix pores à sa base, remplis d'une

liqueur mielleuse, surmonté d'un style droit, subulé, terminé par un stigmate simple.

Le fruit consiste en une capsule en bosse, à quatre ou cinq lobes, à quatre ou cinq loges, s'ouvrant en cinq valves à leur sommet, contenant plusieurs semences réniformes, anguleuses, scarées.

Observations. Le plus grand nombre des espèces qui composent ce genre, sont remarquables par l'odeur forte & fétide qu'elles répandent. Leurs fleurs varient dans le nombre de leurs parties; souvent elles perdent la cinquième. Ce genre n'en paraît pas moins naturel, quoique très-lié à celui des *peganum*, surtout par les espèces à feuilles simples; ils pourroient même être réunis sans inconvénient, quoique les hermaphrodites (*peganum*) diffèrent des rues par un plus grand nombre d'étamines & par leur capsule à trois loges, au lieu de quatre ou cinq.

#### ESPÈCES.

##### 1. RUE fétide. *Ruta graveolens*. Linn.

*Ruta foliis supradecompositis, foliis ovato-lanceolatis, petalis integerrimis*. (N.)

*Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 548. — Hort. Cliffort. 145. — Hort. Upfal. 102. — Mar. méd. 113. — Royen, Lugd. Bat. 461. — Scop. Carn. n°. 477. — Ludw. Ectr. 110. — Blackw. tab. 7. Kniph. Centur. 3. n°. 79. — Willd. Arbr. 336. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 527. n°. 551. 1.

*Ruta foliis supradecompositis; foliis oblongis, terminali obovato; petalis integerrimis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 541. n°. 1.

*Ruta foliis duplicato-pinnatis, lobulis ovatis*. Haller, Helv. n°. 1003.

*Ruta silvestris major*. Tourn. Inst. R. Herb. 257. — C. Bauh. Pin. 336. — Moris. Hist. 2. pag. 507. f. 5. tab. 14. fig. 3. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 240. tab. 61. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 199. 1c.

*Ruta silvestris, graveolens*. Dodon. Pempt. 119. Icon.

*Ruta silvestris Matthioli*. Dalech. Hist. 1. p. 972. Icon.

*Ruta silvestris montana*. Lobel, Ic. 253. — Idem, Observ. 506. 1c.

2. *Ruta hortensis, latifolia*. C. Bauh. Pin. 336. — Tourn. Inst. R. Herb. 257. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 240. tab. 61.

*Ruta sativa vel hortensis*. J. Bauh. Hist. 3. p. 197. Icon.

*Ruta graveolens, hortensis*. Dodon. Pempt. 119.

*Ruta hartenfis*. Lobel. Ic. 2. 51. — Id. Observ. 506. Ic. — Morif. Hist. 2. 5. 5. tab. 14. fig. 1.

*Ruta sativa*. Dalech. Hist. 1. pag. 972. Ic.

*Ruta* (hortensis), *foliis decompositis, floribus albis, staminibus corollâ longioribus*. Mill. Dict. n° 1.

*R. Ruta hortensis, latifolia, arbuscula similis*. Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 260. — C. Bauh. Pin. 336. — Tourn. Inf. R. Herb. 257.

*Ruta africana, maxima*. Swartz, Hort. 24.

Ses tiges sont droites, cylindriques, fermes, dures, légèrement striées, hautes de deux ou trois pieds, de couleur cendrée ou verdâtre, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, d'un vert glauque, deux fois ailées, composées de folioles un peu épaisses & charnues, ovales, un peu lanceolées, étroites, obtuses, à peine rétrécies à leur base, quelquefois un peu decurrentes, surtout les folioles supérieures, petites, variables par leur grandeur.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, dont les principales ramifications sont courtes, épaisses, coides, aciculaires; les autres s'approchantes. Le calice est glabre, verdâtre, fort petit, à cinq découpures obtuses; la corolle jaune, à cinq pétales dans les fleurs supérieures, quatre seulement dans les fleurs inférieures & latérales, dans lesquelles il manque également une des parties de la fructification. Ces pétales sont ovales, concaves, un peu courbés en dedans à leur sommet, glabres, très-entiers; l'ovaire est marqué de deux sillons disposés en croix; la capsule globuleuse, à quatre ou cinq lobes, qui s'écartent à leur sommet en autant de valves.

La plante se acquit par la culture des différences remarquables. Ses tiges sont plus élevées, glauques; les feuilles plus amples; les folioles plus larges, confluentes cuneiformes à leur base. Elle parvient quelquefois à la hauteur d'un petit arbrisseau; les tiges sont alors très-fortes & persistantes.

Cette plante croît sur les montagnes & dans les lieux stériles des départements méridionaux de la France, en Italie, en Espagne, &c. (V. v.)

La rue a une odeur très-forte, des plus désagréables; une saveur âcre & amère. C'est un puissant emménagogue, propre à rétablir les excréments, surtout celle des règles, pour lesquelles on prend les feuilles en infusion; elle est encore vermifuge, sudorifique, antiseptique. On l'emploie à l'extérieur comme détergent & rubéfiant. On se sert de l'huile dans laquelle cette plante a infusé, pour calmer le bourdonnement des oreilles. Malgré sa faveur désagréable & son odeur rebuante, les Romains la faisaient entrer comme assaisonne-

ment dans plusieurs de leurs alimens. Quelques peuples d'Europe en font encore usage. Les maréchaux l'emploient fréquemment dans les remèdes qu'ils administrent aux chevaux.

On a prétendu, & c'est encore une opinion populaire, qu'elle occasionnoit l'avortement.

## 2. RUE des montagnes. *Ruta montana*.

*Ruta foliis supra decompositis, foliolis amplexibus linearibus, petalis integerrimis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 543. n° 2. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 528. n° 551. 11.

*Ruta* (montana), *foliis supra decompositis, linearibus linearibus, petalis imberbibus*. Ait. Hort. K. w. vol. 2. pag. 57.

*Ruta* (montana), *foliis bipinnatis, linearibus; floribus spicatis, secundis; spicis divaricato-corymbose*. Læf. lt. 40.

*Ruta* (legitima), *foliolis linearibus, acutis; petalis cretatis, imberbibus*. Jacq. Ic. rar. 1. tab. 76. — Idem. Collect. 1. pag. 74.

*Ruta* (legitima), *foliolis linearibus, acutis; petalis adanco-rostratis, imberbibus; stipulis tripartitis, aristatis*. Allion. Pedem. n° 1023.

*Ruta* (silvestris), *foliis inferioribus decompositis, summis quinquefoliis trifidiisque*. Miller, Dict. n° 3.

*Ruta* (tenusifolia), *foliis multifariis decompositis, foliolis linearibus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 336.

*Ruta foliis duplicato-pinnatis, linearibus, lanceolatis*. Haller, Helv. n° 1004.

*Ruta silvestris, minor*. C. Bauh. Pin. 336. — Tourn. Inf. R. Herb. 257. — Shaw. Spec. n° 520. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 207. Ic. — Morif. Oxon. Hist. 2. 5. 5. tab. 14. fig. 4.

*Ruta minor*. Tabern. Ic. 134.

*Ruta montana*. Clus. Hist. 2. pag. 136. Icon. — Parkins, Theatr. 154. Ic.

*Ruta silvestris, tenuisifolia*. Matth. Comment. 541. Icon.

*Ruta silvestris, minima*. Dodon. Pempt. 120. Ic. — Gérard, Hist. 1255. Ic.

*Ruta silvestris*. Camer. Epit. 495. Ic. — Lobel, Ic. 2. pag. 54. — Dalech. Hist. 1. pag. 973. Ic.

*Ruta graveolens*, var. *2*. Linn.

Cette espèce, très-différente de la précédente, quoique Linné l'ait d'abord réunie, s'en distingue à ses folioles très-aiguës, linéaires, & à ses fleurs plus petites, d'un jaune-verdâtre.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, très-finement striées, hautes d'un à deux pieds, très-ra-

meuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, deux fois ailées, composées de folioles très-petites, étroites, linéaires, aiguës, glabres à leurs deux faces, d'un vert-pâle; la foliole terminale un peu plus large que les autres, & obtuse; les suivantes simplement ailées.

Les fleurs présentent un corymbe terminal, composé presque d'épis particuliers, unilatéraux, sur lesquels les fleurs sont alternes, pédiculées, unies: chacune à leur base de bractées longues, linéaires. Le calice est glabre, ainsi que la corolle; les pétales relevés, très-peu ouverts, nus, concaves; les étamines un peu plus longues que la corolle.

Cette espèce croît en Espagne, en Portugal, dans la Barbarie, sur les collines arides. On la rencontre également dans les départements méridionaux de la France. (V. v.)

Son odeur est des plus fortes, & au moins aussi pénétrante que celle de l'espèce précédente. On lui attribue les mêmes propriétés. Elle acquiert, par la culture, un développement & un *facies* qui la rendent presque méconnaissable. Ses folioles sont bien plus nombreuses & plus longues; ses fleurs forment une panicule très-étalée.

### 3. RUE d'Orient. *Ruta chalepensis*. Linn.

*Ruta foliis suprà decompositis, petalis ciliatis*. Linn. Mantiss. 69. — Lam. Illustr. Gener. tab. 345. fig. 1.

*Ruta foliis suprà decompositis, oblongis, terminali obovato; petalis ciliato-dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 543. n°. 3.

a. *Ruta chalepensis, latifolia; petalis villis scatenibus*. Tourn. Infl. R. Herb. 257.

b. *Ruta chalepensis, angustifolia; petalis villis, scatenibus*. Moris. Hist. 2. pag. 508. § 5. tab. 35. fig. 8.

*Ruta (chalepensis), foliis decompositis, floribus decandris, petalis ciliatis*. Mill. Dict. n°. 5.

Les principaux caractères qui distinguent cette espèce du *ruta graveolens*, consistent dans les lobes de la capsule, rapprochés & non séparés; dans les pétales dentés & ciliés à leurs bords.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, dures, glabres, hautes de trois à quatre pieds, d'un vert glauque, garnies de feuilles amples, alternes, pétiolées, deux fois ailées avec une impaire, composées de folioles nombreuses, glauques, cunéiformes, obtuses, quelquefois presque linéaires. Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des tiges & des rameaux. Leur calice est court, glabre, à cinq divisions ovales, aiguës; la corolle jaune, à cinq pétales concaves, ovales, ondulés, denticulés & ciliés à leurs bords; les

étamines très-ouvertes; la capsule presque ovale, à quatre lobes réunis, obtus ou un peu aigus.

La variété *b* diffère de la précédente par ses feuilles plus étroites, par les pétales dont les onglets sont plus étroits, plus alongés; quelquefois les cils manquent.

Cette plante croît dans l'Orient & l'Arabie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle a une odeur très-fétide, insupportable. Ses propriétés sont les mêmes que celles du *ruta graveolens*. (V. v.)

### 4. RUE ailée. *Ruta pinnata*. Linn. f.

*Ruta foliis pinnatis, trijugis; foliolis lanceolatis, impari serratis; petalis planis, lacunculatis*. Linn. f. Suppl. 232.

*Ruta (pinnata), foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, basi attenuatis, serrato-crenatis; petalis integerrimis*. Ait. Hort. Kew. 2. p. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 544. n°. 4.

Cette plante a ses feuilles ailées avec impaire, composées de trois paires de folioles lancéolées, rétrécies insensiblement à leur base, crénelées ou dentées en scie; les folioles latérales opposées, linéaires, quelquefois entières, légèrement crénelées ou ponctuées; l'impair presque ovale, plus fortement dentée; les pétales planes, entiers ou légèrement crénelés.

Cette plante croît aux îles Canaries, sur les rochers. (V.)

### 5. RUE de Padoue. *Ruta patavina*. Linn.

*Ruta foliis ternatis, sessilibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 549. — Mill. Dict. n°. 8.

*Ruta foliis ternatis, sessilibus, linearibus, integerrimis, basi attenuatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 544. n°. 5.

*Pseudo-ruta patavina, trifolia; floribus luteis, umbellatis*. Michel, Genet. 22. tab. 19.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles un peu velues, quelquefois réunies au nombre de trois à chaque point d'insertion, & presque verticillées, mais plus souvent alternes.

Ses tiges sont droites, cylindriques, point rameuses, velues, verdâtres, garnies de feuilles presque sessiles, lancéolées ou linéaires, verdâtres, légèrement velues ou pubescentes à leurs deux faces, rétrécies en pétiole à leur base, aiguës, quelquefois obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, dont les pédoncules sont simples, pubescents, divisés à leur sommet en d'autres pédoncules courts, inégaux, partiels, uniflores, munis de bractées courtes, linéaires, aiguës. Le calice est à cinq

divisions courtes, très-étroites, un peu velues; la corolle d'un jaune-pâle; chaque pétale obtus, ovale, plane, entier, marqué dans son milieu d'une nervure verdâtre.

Cette plante croît dans les environs de Padoue & en Espagne; elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Cavanilles. (*V. f. in herb. Lam.*)

6. RUE à feuilles de lin. *Ruta linifolia*, Linn.

*Ruta foliis simplicibus, indivisis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 549. — Mill. Dict. n°. 6. — Lam. Illustr. Plant. tab. 345. fig. 2. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 336.

*Ruta foliis simplicibus, foliariis*. Hort. Clifflort. 146.

*Ruta foliis simplicibus, lanceolatis, glabris; filamentis ciliatis; caule simpliciter, herbaceo*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 544. n°. 6.

*Ruta silvestris, linifolia, hispanica*. Boccon, Mus. tab. 73. — Tourn. Inst. R. Herb. 257. — Barrel, Icon. rar. tab. 1186.

*Ruta orientalis, linaria folio; flore parvo*. Tourn. Coroll. 19. — Buxbaume, Cent. 2. pag. 30. tab. 28. fig. 1.

Espèce très-distincte par ses feuilles simples, linéaires, & par les filaments ciliés à leur base.

Ses tiges sont droites, glabres, herbacées, cylindriques, hautes d'environ un pied & demi, simples ou un peu rameuses, garnies de feuilles presque sessiles, alternes, éparées, très-simples, glabres, entières, un peu épaisses, linéaires, lancéolées, aiguës ou obtuses, quelquefois presque rondes, comme dans la variété  $\beta$ ; rétrécies en pétiole à leur base, longues à peine d'un demi-pouce, les inférieures plus petites.

Les fleurs sont disposées en corymbes terminaux médiocrement étalés, munies de bractées foliacées, linéaires, lancéolées; les rameaux latéraux, assez souvent dichotomes; une fleur solitaire & sessile dans la dichotomie. Le calice est entier, divisé en cinq dents un peu aiguës; la corolle jaune, à cinq pétales ovales, concaves, très-entiers, point rétrécis à leurs onglets, obtus; dix étamines, dont les filaments sont ciliés à leur base; l'ovaire environné de cinq tubercules velus.

Cette plante croît en Espagne. M. Desfontaines l'a également recueillie dans le royaume de Tunis. (*V. f.*)

7. RUE de Buxbaume. *Ruta Buxbaumii*.

*Ruta foliis lanceolatis, integris, petiolatis, utrinque acutis; caule suffruticoso*. (N.)

*Ruta montana, foliis integris, subrotundis*. Buxb. Cent. 2. pag. 30. tab. 28. fig. 2.

Malgré les rapports de cette plante avec la *ruta linifolia*, elle m'en paroît bien distincte par la forme & la grandeur de ses feuilles.

Ses tiges sont presque ligneuses, dures, noueuses, striées, cylindriques, glabres, verdâtres ou glauques, tortueuses à leur partie supérieure, ainsi que les rameaux souvent aplatis, situés vers l'extrémité des tiges, desquelles ils s'écartent à leur base en formant un arc remarquable. Les feuilles sont éparées, alternes, pétioles, simples, entières, lancéolées, longues au moins de deux pouces, larges d'un demi-pouce, rétrécies à leurs deux extrémités, glabres, vertes à leur face supérieure, d'un vert-jaunâtre en dessous. Celles qui naissent sur les nouvelles tiges qui paroissent en automne, sont beaucoup plus petites & presque rondes.

Les fleurs sont disposées par petits paquets à l'extrémité des rameaux sur une panicule étalée, dont les ramifications sont glabres, nues, peu nombreuses, étalées. Les capsules sont jaunâtres, divisées en cinq, quelquefois six loges & autant de valves, qui ne renferment ordinairement qu'une seule semence.

Cette plante croît en Afrique; elle a été communiquée par M. Vahl à M. Lamarck. (*V. f. in herb. Lam.*)

8. RUE frutescente. *Ruta fruticulosa*. Labill.

*Ruta foliis integris, sessilibus, ovato-lanceolatis ramisque pilosis*. Labill. Flor. syr. Dec. 2. pag. 13. tab. 4.

*Ruta foliis simplicibus, lineari-spathulatis, pubescentibus; filamentis lanatis; caule ramoso, fruticosa*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 545. n°. 7.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du *ruta linariaefolia*, dont elle diffère néanmoins par ses tiges frutescentes & rameuses, par ses feuilles velues ainsi que les rameaux, & par ses fleurs plus petites.

Ses tiges n'ont que sept à huit pouces de haut; elles sont très-rameuses à leur partie inférieure; les rameaux sont cylindriques, pileux, garnis de feuilles simples, alternes, sessiles, entières, ovales-lancéolées; les supérieures plus petites & ovales.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes terminaux. Leur calice est fort petit, persistant, velu, à cinq dents obtuses. La corolle est composée de cinq pétales entiers, sessiles, ovales, un peu concaves, de couleur jaunâtre. Les filaments sont lanugineux & dilatés à leur base, plus courts que les pétales; les anthères jaunes, marquées de quatre sillons; l'ovaire pileux, à cinq lobes en bosse; le style une fois plus long que les étamines, la capsule pileuse, à cinq lobes émoussées; les semences réniformes.

Cette

Cette plante a été recueillie par M. Labillardière, dans la Syrie, aux environs de Damas. 7

### 9. RUE tuberculée. *Ruta tuberculata*. Forsk.

*Ruta foliis linearilanceolatis, margine involutis; caulis, foliis subius capsulisque tuberculatis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 85. n°. 64.

Les points tuberculeux dont la plupart des organes de cette plante sont chargés, la distinguent particulièrement du *ruta linearifolia* & du *ruta seffifolia*. Il nous resteroit à savoir si les filaments de ses étamines sont velus à leur base comme dans ces dernières. Forskhal, qui le premier nous l'a fait connoître, n'en dit rien.

Ses tiges sont droites, diffusées, hautes d'un pied, presque herbacées, vertes ou rougeâtres, rudes, chargées de points saillans, garnies de feuilles alternes, sessiles, très-simples, linéaires, lancéolées, vertes, quelquefois rougeâtres, longues d'un pouce, ponctuées & pileuses à leur face supérieure, tuberculées en dessous, planes, un peu roulées à leurs bords, retirées en pétiole à leur base.

Les fleurs forment de petits corymbes terminaux médiocrement rameux, dichotomes, chaque fleur pédiculée, une solitaire & sessile dans chaque dichotomie. Les pétales sont jaunes, concaves, ondulés; l'ovaire chargé de tubercules; la capsule également tuberculée, à cinq lobes, à cinq loges, souvent deux semences dans chaque loge.

Cette plante croît dans les lieux déserts de l'Arabie. (Description. ex Forsk.)

Son odeur est la même que celle du *ruta graveolens*. Les Arabes en expriment le suc dans l'eau, & s'en lavent la tête pour faire croître leurs cheveux & les rendre plus longs; quelques tribus du désert y attachent un grand prix.

**RUELLIE ou CRUSTOLLE.** *Ruellia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, irrégulières, de la famille des acanthées, qui a des rapports avec les *barleria*, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les fleurs axillaires & terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle presque campanulée, divisée à son limbe en cinq lobes inégaux; quatre étamines didymes, rapprochées deux par deux; une capsule, dont les deux valves se séparent à l'aide de dents élastiques.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:  
Botanique. Tome VI.

1°. Un calice persistant, d'une seule pièce, à cinq divisions linéaires, droites, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, dont l'orifice est large, ouvert; le limbe étendu, à cinq lobes obtus, inégaux; les deux supérieurs plus fortement réfléchis.

3°. Quatre étamines didymes, situées vers l'orifice du tube, dont les filaments sont filiformes, surmontés d'anthères rapprochées par paires & saillantes hors du tube.

4°. Un ovaire arrondi, muni d'un style filiforme, de la longueur des étamines; surmonté d'un stigmate bifide, aigu.

Le fruit est une capsule cylindrique, aiguë à ses deux extrémités, de la longueur du calice, à deux valves, à deux loges s'ouvrant avec élasticité par le moyen des dents de la cloison, contenant quelques semences comprimées, un peu arrondies.

*Observations.* Ce genre diffère des *barleria* par les dents élastiques insérées sur la cloison des capsules, & par ses semences assez généralement plus nombreuses: il a aussi de très-grands rapports avec les *justicia*, mais ces derniers n'ont que deux étamines. A la vérité, dans plusieurs espèces de ce genre, les capsules s'ouvrent avec élasticité, mais c'est par le moyen d'une languette particulière. Les *dianthera* sont dans le même cas, & si peu distincts des *justicia*, que M. Lamarck les a réunis.

### ESPÈCES.

#### 1. RUELLIE pyramidale. *Ruellia blechum*. Linn.

*Ruellia foliis ovatis, integerrimis; spicis ovatis; bracteis interioribus geminis; floribus binis, sessilibus*. Linn. Syst. veget. pag. 175. n°. 1. — Auncen. Acad. vol. 5. pag. 400.

*Ruellia (blechum), foliis ovatis, serrato-dentatis, hirsutiusculis; spicis ovatis; bracteis interioribus geminis; floribus ternis, sessilibus*. Swartz, Observ. 243. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 362. n°. 1.

*Barleria pyramidata, flore caruleo*. Plum. Gen. 31. Icon. 42. fig. 3.

*Blechum foliis oblongo-ovatis; spicis crassis, foliatis, conico-quadratis, subhirsutis*. Brown, Jam. 161.

*Brunella elatior, flore albo*. Sloan, Jam. 65. Hist. 1. pag. 173. tab. 109. fig. 1.

Ses tiges sont herbacées, droites, lisses, hautes d'un pied, rameuses, striées, à quatre faces, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, acuminées, un peu velues, légèrement dentées en scie à leurs bords ou presque entières.

Les fleurs forment, par leur ensemble, une sorte de pyramide ou d'épi terminal, conique, à quatre faces, long d'un pouce, muni de bractées imbriquées, en forme de cœur, à la base desquelles sont situées deux autres bractées plus petites, d'entre lesquelles s'élèvent deux ou trois fleurs presque sessiles, d'un bleu très-clair, quelquefois blanchâtres.

Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les broussailles & dans les pâturages. ☉

2. RUELLIE en épi. *Ruellia blechoides*. Swartz.

*Ruellia foliis oblongis, subdentatis, glabris; spicis ovatis; floribus bracteis longioribus*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1068. — Idem, Prodr. 94. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 362. n° 2.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la précédente. M. Swartz, qui la regarde comme une espèce distincte, présume que Linné les a confondues, & que la description qu'il donne du *ruellia blechum* se rapporte davantage à cette espèce, qui diffère de la précédente par les feuilles oblongues, entières ou à peine dentées; par ses fleurs disposées en épis ovales, velus, point tétragones; par ses corolles blanches, plus longues que les bractées; enfin c'est une plante dont les tiges sont presque frutescentes & non herbacées.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les contrées occidentales, au milieu des forêts des lieux montagneux. h

3. RUELLIE bruyante. *Ruellia strepens*. Linn.

*Ruellia foliis petiolatis; pedunculis trifloris, brevibus*. Linn. Mant. 422. — Syst. veget. 575.

*Ruellia foliis petiolatis, ovatis, integerrimis; pedunculis trifloris, brevissimis; caule erecto*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 363. n° 5. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 4. tab. 54. fig. 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 550. fig. 2.

*Ruellia foliis petiolatis; floribus verticillatis, subsessilibus*. Hort. Upf. 178. — Mill. Dict. n° 2.

*Ruellia foliis petiolatis; fructu sessili, consereto*. Hort. Cliff. 218. — Gronov. Virg. 73. — Royen, Lugd. Bat. 291.

*Ruellia strepens, capitulis compositis*. Dill. Eltham. 300. tab. 249. fig. 321. — Sabb. Hort. 2. tab. 92.

*Ruellia (strepens), erecta vel assurgens, hirsuta; foliis in petiolum angustatis vel ovali-lanceolatis; fasciculis axillaribus, subsessilibus, subsuperioribus; calicibus hispidis*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 24.

Ses tiges sont carrées, hautes d'environ deux pieds, marquées d'un sillon à chaque face, un peu velues à leurs angles, divisées en rameaux oppo-

sés, glabres, ouverts, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, entières à leurs bords ou légèrement sinués, glabres, vertes à leurs deux faces, à peine sensiblement ciliées, longues d'un à deux pouces.

Les fleurs sont axillaires, portées sur des pédoncules latéraux, opposés, courts, terminés ordinairement chacun par trois fleurs garnies de bractées opposées, lancéolées, étroites. Le calice se divise en cinq découpures très-étroites, glabres ou hispides, persistantes, aiguës, de la longueur des capsules. La corolle est d'un jaune-pâle, teinte de bleu à l'orifice de son tube qui s'élargit considérablement; elle ne dure que quelques heures. Il lui succède des capsules oblongues, presque cylindriques, étroites, aiguës à leurs deux extrémités.

Cette plante croît naturellement dans la Virginie & la Caroline. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

4. RUELLIE à feuilles ovales. *Ruellia ovata*, Cavan.

*Ruellia foliis ovatis, villosis, ciliatis; floribus axillaribus, ternis, subsessilibus; bracteis linearibus, acutis*. Cavan. Icon. Plant. 3. pag. 28. tab. 254.

*Ruellia (ovata), foliis sessilibus, oblongis, integerrimis, utrinque acuminatis, villosis; floribus ternis, subsessilibus; bracteis linearibus, acutis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 363. n° 4.

Ses tiges sont presque herbacées, ascendantes, divisées en rameaux tétragones, opposés, garnis de feuilles sessiles, opposées, oblongues ou ovales, très-entières, acuminées à leurs deux extrémités, velues, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont opposées, situées dans l'aisselle des feuilles, presque sessiles ou supportées par des pédoncules très-courts, à trois fleurs. Le calice se divise en cinq découpures lancéolées, acuminées. La corolle est grande, d'un bleu-foncé; les capsules oblongues, lancéolées, obtuses, plus courtes que les calices; chaque pédoncule accompagné à la base de deux bractées lancéolées, acuminées.

Cette plante croît au Mexique. x

5. RUELLIE à feuilles étroites. *Ruellia angustifolia*. Swartz.

*Ruellia foliis lineari-lanceolatis; spicis oblongis; bracteis ovatis, hirsutis*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1070. — Idem, Prodr. 93. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 363. n° 3.

Plante herbacée, dont les tiges sont hautes d'un pied & plus, rameuses, glabres, quadrangulaires, geniculées, divisées en rameaux tétragones, op-

posés, g'niculés à l'insertion des pétioles, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, opposées, linéaires, lancéolées, étroites, droites, entières, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis allongés, terminaux, garnis de bractées sessiles, alternes, médiocrement écartées les unes des autres, point imbriquées, ovales, acuminées, velues à leur face inférieure, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont presque solitaires entre chacune des bractées, petites, sessiles; la corolle de couleur bleue; les capsules glabres, oblongues, acuminées.

Cette plante croît dans les contrées occidentales de l'Amérique. (*Descript. ex Smutg.*)

#### 6. RUELLIE étalée. *Ruellia patula*. Jacq.

*Ruellia frutescens, villosa, v'fosa; foliis ovatis, integrissimis; floribus axillaribus, aggregatis*. Jacq. Icon. rar. 1. tab. 119. — Idem, Muc. 2. pag. 338.

*Ruellia foliis petiolatis, ovatis, obtusissimis, integrissimis, pubescentibus; floribus ternis, subsessilibus; caule erecto, divaricato*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 364. n°. 5.

Cette plante a des tiges frutescentes, droites, divisées en rameaux très-étalés, quadrangulaires, velus, visqueux, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, pubescentes à leurs deux faces, un peu visqueuses.

Les fleurs sont agrégées, quelquefois solitaires dans l'aisselle des feuilles, médiocrement pédonculées, ordinairement réunies au nombre de trois sur chaque pédoncule. Leur calice est divisé en cinq découpures aiguës, velues ou pubescentes. La corolle est grande, ample, d'une couleur violette peu foncée; les capsules ovales, beaucoup plus longues que le calice qui persiste avec elles.

Cette plante croît dans les Indes occidentales. (*V. f. in herb. Lam.*)

#### 7. RUELLIE à feuilles d'anérine. *Ruellia chenopodiifolia*.

*Ruellia foliis ovato-subrotundis, pubescentibus; floribus verticillatis, sessilibus*. (N.)

*Gratiola aënis, nudoraspata, digitatis amula, folio chenopodi; capsulis in verticillis positis*. Pluk. Phytog. tab. 193. fig. 3.

Cette plante est très-voisine du *ruellia patula* de Jacquin; mais elle en diffère par ses tiges herbacées; par son odeur forte & désagréable; par ses fleurs sessiles & plus nombreuses, presque verticillées.

Ses tiges sont pubescentes, médiocrement tétragones, divisées en rameaux opposés, très-ouverts,

garnis de feuilles opposées, pétiolées, molles, verdâtres, ovales, presque rondes, obtuses, entières à leurs bords, légèrement pubescentes à leurs deux faces, longues de plus d'un pouce; celles des jeunes rameaux axillaires, ovales, bien plus petites. Les pétioles sont velus, longs d'un demi-pouce.

Les fleurs sont disposées en verticilles dans l'aisselle des feuilles, au nombre de quatre à six dans chaque aisselle opposée. Leur calice est divisé en cinq découpures droites, courtes, linéaires, un peu aiguës, pubescentes; la corolle blanche ou jaunâtre, à peine longue d'un demi-pouce; les capsules glabres, un peu renflées dans leur milieu, contenant des semences orbiculaires, comprimées, d'un brun-noirâtre, environnées d'un boarcelet blanchâtre.

Cette plante croît à la Guadeloupe. (*V. f. in herb. Lam.*) Elle a une odeur forte, désagréable, qui approche un peu de celle de la sauge.

#### 8. RUELLIE pâle. *Ruellia pallida*. Vahl.

*Ruellia foliis petiolatis, ovatis, undulato-crenatis, margine scabris; floribus axillaribus, solitariis, sessilibus*. Vahl, Symbol. 2. pag. 72.

*Ruellia (strepens), flore magno, violaceo; foliis obtusis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 114. n°. 49.

D'après l'observation de M. Vahl, cette espèce que Forskhal avoit confondue avec le *ruellia strepens* de Linné, en est très-distincte par ses pédoncules simples & unifoires; par la couleur violette des corolles.

Les tiges ne sont que médiocrement quadrangulaires, marquées à chacune de leurs faces d'un sillon profond, presque glabres, divisées en rameaux opposés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, oblongues, glabres, un peu rudes au toucher, d'un vert-pâle à leurs deux faces, ondulées & crénelées à leurs bords, obtuses à leur sommet, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont axillaires, opposées, supportées par des pédoncules très-courts, simples, solitaires, uniflores; munies à la base du calice de deux bractées plus longues que lui, lancéolées, ciliées à leurs bords. La corolle est grande, de couleur violette, renflée, très-ouverte à l'orifice du tube, longue d'un pouce, trois fois plus grande que le calice. Le stigmate est divisé en deux découpures planes, presque linéaires.

Cette plante croît dans les plaines de l'Arabie heureuse.

#### 9. RUELLIE ventrue. *Ruellia ventricosa*.

*Ruellia foliis lanceolatis, acuminatis, glabris; pedunculis longissimis, subdichotomis; tubo apice ventricosa*. (N.)



Ses rameaux sont glabres, presque cylindriques, très-lisses, articulés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, lancéolées, glabres à leurs deux faces, longues de trois pouces environ, sur un & plus de large; entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, marquées de nervures fines, saillantes, latérales.

Les fleurs sont portées sur des pédoncules solitaires, axillaires, latéraux, simples ou divisés à leur sommet en deux pédicules très-courts, inégaux, munis de bractées fort petites, étroites. Le calice se divise en cinq découpures droites, velues, lancéolées; la corolle m'a paru jaunâtre: son tube, de la longueur du calice, est considérablement renflé, & presque long d'un pouce à son orifice, ayant la forme d'une vessie ovale, resserrée à son ouverture, dont les divisions du limbe sont rapprochées, conniventes, inégales. Les anthères sont un peu saillantes; le style plus long que la corolle.

Cette plante croît à Cayenne, où elle a été recueillie par M. Leblond. ? ( *V. f. in herb. Lamarck.* )

#### 10. RUELLIE à fleurs rouges. *Ruellia rubra*. Aubl.

*Ruellia foliis ovato-oblongis, acutis; pedunculis axillaribus, longis, multifloris.* Aublet, Guian. vol. 1. pag. 666. tab. 270.

*Ruellia foliis petiolatis, oblongis, acuminatis; pedunculis multifloris, subcorymbosis; corolla limbo frimato.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 366. n.º 12.

Ses tiges sont hautes de quatre à cinq pieds, droites, articulées, divisées en rameaux quadrangulaires, glabres, cannelés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, acuminées à leur sommet, à peine dentées ou entières à leurs bords, longues au moins de six pouces sur deux de large, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont axillaires, latérales, disposées presque en corymbes ou en panicules, portées sur un pédoncule commun très-long, dichotomes à sa partie supérieure, n'ayant ensuite que quelques ramifications courtes, munies de bractées linéaires, aiguës. Leur calice est glabre, divisé en cinq découpures filiformes, plus courtes que la corolle. Celle-ci est rougeâtre, longue d'un pouce & demi, renflée à son limbe, divisée en cinq lobes inégaux, légèrement frangés. L'ovaire est un peu périculé, oblong. Il lui succède une capsule glabre, oblongue, quelquefois un peu resserrée dans son milieu, contenant des semences comprimées, bordées d'une membrane courte.

Cette plante croît à Cayenne. ? ( *V. f. in herb. Lamarck.* )

#### 11. RUELLIE violette. *Ruellia violacea*. Aubl.

*Ruellia floribus solitariis, alternatim axillaribus, longo pedunculo infidentibus; foliis tomentosis, ovato-oblongis.* Aublet, Guian. vol. 2. pag. 668. tab. 271.

*Ruellia foliis petiolatis, oblongis, acutis, densatis, tomentosis; pedunculis unifloris, elongatis; foliis brevioribus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 365. n.º 11.

Cette plante a des racines ligneuses, tortueuses, munies de tubercules longs, gros & rameux. Elle produit plusieurs tiges hautes d'un pied, légèrement velues, quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, légèrement pétiolées, ovales, velues, terminées en pointe, marquées dans leur longueur d'une nervure saillante, dentées ou légèrement sinuées à leurs bords.

Les fleurs naissent alternativement dans chaque aisselle des feuilles supérieures: elles sont supportées par de longs pédoncules simples, ordinairement solitaires, munis à leur sommet de deux bractées oblongues, étroites, aiguës. Leur calice se divise en cinq découpures étroites, longues, pointues. La corolle est de couleur violette; son tube allongé, un peu courbé dans son milieu, & son limbe évasé en cinq lobes arrondis. Les capsules sont un peu comprimées, échancrées dans leur milieu, contenant quatre semences comprimées, arrondies.

Cette plante croît dans la Guiane, dans les Savannes qui sont au bas de la montagne de Courou. ? ( *Desfont. ex Aublet.* )

#### 12. RUELLIE à grandes fleurs. *Ruellia grandiflora*.

*Ruellia foliis ovatis, petiolatis, glabris; pedunculis dichotomis, corollis purpureis.* (N.)

Cette plante approche du *ruellia violacea*; mais ses feuilles sont plus courtes, glabres, ovales: elle en est particulièrement distinguée par ses fleurs plus grandes, & par ses capsules presque à quatre loges, qui renferment des semences nombreuses.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, médiocrement tétragones, articulées, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, obtuses, glabres à leurs deux faces, minces, longues de deux pouces, larges d'un pouce & plus, retrécies & un peu decurrentes à leur base, légèrement sinuées à leur contour, à nervures latérales, à peine saillantes.

Les fleurs sont axillaires, supportées par des pédoncules plus longs que les feuilles, dichotomes à leur sommet; chaque rameau terminé ordinairement par deux fleurs à peine pédiculées, munies de stigmates linéaires, subulées. Le calice est divisé en cinq découpures pubescentes, très-longues,

subulées. La corolle est de couleur purpurine, longue d'un pouce & demi & plus : son tube est droit, élargi considérablement vers son orifice ; le limbe ample, à cinq grands lobes inégaux, arrondis, un peu échancrés. Les capsules cylindriques, longues de plus d'un pouce, presqu'à quatre loges, à deux valves ; chaque valve marquée extérieurement d'une nervure longitudinale qui répond à la cloison intérieure. Les femences sont comprimées, arrondies, blanchâtres & pubescentes dans leur jeunesse.

Cette plante croît à la Guadeloupe, où elle a été recueillie par M. Badier. ( *V. f. in herb. Lam.* )

### 13. RUELLIE de Madère. *Ruellia madurensis*.

*Ruellia foliis pubescenti-incanis, ovatis, dentatis; apice subtruncatis, floribus solitariis; ramis albicantibus, diffusiformibus.* (N.)

*Justicia* (madurensis), *frutescens, foliis ovatis, obtusis, dentatis; floribus axillaribus, solitariis.* Burm. Flor. ind. pag. 9. tab. 4. fig. 3.

*Adhatoda madurensis, frutescens, fompfianchi folio, caule argenteo.* Petiv. Cataph. tab. 2. hg. 8.

An *ruellia* (littoralis), *frutescens, cona; foliis cuneiformibus, serratis, retusis, glabris; floribus axillaribus, solitariis, subsessilibus* Linn. f. Suppl. pag. 289.

Cette plante, dont la corolle contient quatre étamines, ne peut appartenir aux *justicia* ; elle a d'ailleurs tous les caractères des *ruellia*, & se distingue des autres espèces par ses feuilles perites, blanchâtres, presque tomenteuses, & par ses fleurs solitaires.

Ses tiges sont presque tétragones, torseuses, noueuses, divisées en rameaux diffus, un peu pubescents, d'un blanc-cendré, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, blanchâtres, un peu épaisses, légèrement pubescentes, petites, ovales, aiguës à leur base, souvent tronquées à leur sommet, quelquefois arrondies ou échancrées, ou un peu acuminées, crénelées ou denticulées à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, à peine pédonculées, munies de deux bractées caduques. Le calice est presque glabre, cylindrique, à cinq découpures droites, lancéolées, aussi longues que les capsules qu'elles enveloppent & avec lesquelles elles persistent. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, longue d'un pouce au plus, très élargie à son orifice ; elle se divise à son limbe en cinq lobes obtus, presque égaux. Les capsules sont fusiformes, rétrécies & obtuses à leurs deux extrémités.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Madère. ( *V. f. in herb. Lamarck.* )

### 14. RUELLIE blanche. *Ruellia laevis*. Cavan.

*Ruellia caule herbaceo, tomentoso, lanato; foliis ovatis, subcuneatis, ciliatis; floribus axillaribus, nudis.* Cavan. Icon. Plant. vol. 3. pag. 28. tab. 255.

*Ruellia foliis petiolatis, oblongo-ovatis, ciliatis, subcuneatis; pedunculis brevissimis, striatis; caule villosissimo, erecto.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 365. n°. 9.

Ses tiges sont droites, herbacées, rameuses, tomenteuses & lanugineuses ; quelquefois munies seulement à leur partie supérieure de poils droits, blanchâtres, très-épais, articulés ; garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, rétrécies presqu'en coin à leur base ou un peu décurrentes sur leur pétiole ; à dents obtuses & légèrement ciliées à leur contour, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont opposées, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules très-courts, ordinairement munis de bractées ; celle du milieu dépourvue de bractées, les deux latérales garnies sous leur calice de deux bractées lancéolées. La corolle est grande, d'abord d'un violet clair, qui passe insensiblement à celle d'un blanc de lait ; elle est quelquefois constamment blanche. Les capsules sont linéaires, aiguës, plus longues que les calices.

Cette plante croît naturellement au Mexique. 4

### 15. RUELLIE clandestine. *Ruellia clandestina*.

*Ruellia foliis petiolatis; pedunculis longis, subdivisis, nudis.* Linn. Syst. veget. pag. 575. n°. 4. — Hort. Upf. 179. — Mill. Dict. n°. 3. — Gouan, Illustr. 39.

*Ruellia foliis sessilibus, pedunculis trifloris.* Hort. Chiff. 308. — Roy. Lugd. Bat. 291.

*Ruellia* (clandestina), *foliis petiolatis, oblongis, obtusis, basi attenuatis, subdentatis; pedunculis trifloris, foliis brevioribus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 363. n°. 10.

*Ruellia capsulis teretibus.* Dill. Eltham. pag. 328. tab. 248. fig. 320.

Ses racines sont composées de plusieurs fibres charnues, garnies de filaments très-déliés ; elles produisent des tiges herbacées, peu élevées, presque couchées sur la terre, longues de six à huit pouces, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, glabres, oblongues, rétrécies & presque décurrentes à leur base, légèrement denticulées à leur contour, obtuses à leur sommet, longues d'environ deux pouces sur un pouce & plus de large.

Les fleurs sont opposées, axillaires, soutenues par des pédoncules allongés, plus courts que les feuilles, dépourvus de bractées, divisés à leur sommet en deux ou trois autres très-courts, uni-

flores. Les calices sont partagés très-profondément en cinq segments très-étroits, acuminés, plus longs que la corolle dans les premières fleurs, plus courts dans celles qui leur succèdent. La corolle, d'une grandeur médiocre, est de couleur purpurine, de peu de durée; il lui succède des capsules glabres, cylindriques, longues d'un pouce, renfermant des semences arrondies & comprimées.

Cette plante croît dans l'Amérique, aux Barbades, & dans l'île de Sainte-Croix. 4

16. RUELLIE à grandes feuilles. *Ruellia macrophylla*. Vahl.

*Ruellia foliis ovato-lanceolatis, acuminatis, integerrimis; pedunculis elongatis, viscosis*. Vahl, Symb. 2. pag. 72. tab. 59.

Cette espèce, distinguée par ses grandes feuilles acuminées & par ses pédoncules très-longs & biflores, a des tiges pubescentes, quadrangulaires, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétioles, longues de six à sept pouces, ovales-lancéolées, très-entières, acuminées, décurrentes sur leur pétiole, vertes en dessus, plus pâles en dessous, chargées à leurs deux faces de poils rares & courts; leurs pétioles pubescents, longs d'environ un pouce & demi.

Les fleurs sont axillaires, supportées par des pédoncules simples, opposés, cylindriques, pubescents, de la longueur des feuilles; divisés à leur sommet en deux autres partiels, uniflores, longs d'un demi-pouce, munis à leur base de deux bractées opposées, ciliées, lancéolées, plus longues que ces pédoncules, & deux autres sous le calice & de la même longueur que lui. Les calices sont glabres, à cinq découpures lancéolées, presque égales. La corolle est longue d'un demi-pouce, glabre, très-étroite à sa base, renflée à l'orifice du tube, divisée à son limbe en cinq lobes entiers; les deux supérieurs arrondis; les trois inférieurs ovales, un peu plus courts; les filaments de la longueur de la corolle; le style plus long que les étamines.

Cette plante croît à Sainte-Marthe en Amérique. (*Descript. ex Vahl.*)

17. RUELLIE mouchetée. *Ruellia guttata*. Forsk.

*Ruellia foliis ovato-lanceolatis; flore albo, guttato*. Forsk. Flor. ægypt.-atab. pag. 114. n°. 50.

*Ruellia (guttata), foliis ovato-lanceolatis, marginibus scabris, undulatis; spicis terminalibus, imbricatis*. Vahl. Symbol. 2. pag. 72. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 366. n°. 14.

Petit arbrisseau, dont les tiges sont munies de rameaux opposés, diffus, droits, pubescents, tétragones, à angles mousses, cannelés, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, lancéolées,

pubescentes, scabres, un peu dentées ou ondulées à leurs bords, inportées par des pétioles longs d'un demi-pouce, planes en dessus.

Les fleurs forment des épis imbriqués, terminaux, garnis de bractées ternées, plus longues que le calice; les deux latérales convexes, plus larges; celle du milieu plane, plus allongée; toutes lancéolées, scabres, ciliées. La corolle est blanche, longue d'environ un pouce; son limbe large d'un demi-pouce, à cinq lobes; les deux inférieurs relevés, en forme de voûte & recourbés en dedans; l'orifice du tube marqué de taches oblongues, d'un vert-pâle.

Cette plante croît sur le mont Chadra, dans l'Arabie heureuse. 5

18. RUELLIE imbriquée. *Ruellia imbricata*. Forsk.

*Ruellia floribus in axillis supremis congestis, secundis sessilibus; bracteis obliquis, subrotundis*. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 113. n°. 47.

*Ruellia (imbricata), foliis petiolatis, ovatis, undulato-crenatis, opposito minore; spicis imbricatis, secundis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 366. n°. 15.

*Ruellia (dorsiflora), decumbens, foliis oppositis; bracteis late cordatis, ciliatis*. Retz. Obscrv. 6. pag. 31.

C'est une plante dont les rameaux sont foibles, pendans, presque couchés, allongés, quadrangulaires, velus, articulés; les articulations distantes les unes des autres d'environ trois pouces, garnies de feuilles opposées, pétioles, ovales-lancéolées, ondulées, crénelées à leurs bords, aiguës à leur sommet; à chaque paire des feuilles supérieures, l'une des deux plus petite.

Les fleurs sont axillaires, sessiles, réunies au nombre de trois à cinq dans chaque aisselle; munies de deux bractées, l'une oblique, arrondie; l'autre plus étroite: ces fleurs forment, par leur ensemble, une sorte d'épi unilatéral & terminal à l'extrémité des rameaux. Le calice, presque à deux lèvres, se divise en cinq découpures; la supérieure, plus large que les autres, est plane, ovale, obtuse; les quatre autres linéaires, lancéolées. La corolle est blanche, plus longue que le calice; son limbe se divise en cinq lobes ovales, les supérieurs plus étroits & plus courts. Les capsul. s. sont linéaires, aiguës, comprimées, à deux valves; elles renferment des semences arrondies.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse, dans les Indes orientales & à l'île-Bourbon. Ses fleurs ne s'épanouissent que pendant la nuit. 6

19. RUELLIE arislée. *Ruellia aristata*. Vahl.

*Ruellia foliis ovatis, subaristatis; capitula*

*terminali; calceibus bracteisque nervosis, aristatis; caule fruticoso.* Vahl. Symbol. 2. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 367. n°. 16.

Ses tiges sont frutescentes, rameuses, tétragones, garnies de feuilles opposées, pétiolées, petites, ovales, très entières, un peu épaissies, sans nervures apparentes, obtuses, blanchâtres à leur face inférieure, longues d'environ un demi-pouce.

Les fleurs forment une petite tête terminale, hémisphérique, environnée à sa base de quelques folioles oblongues; les fleurs munies de trois bractées lancéolées, membraneuses, nerveuses, terminées par des cils assez roides, alongées, en forme d'arête. La corolle est velue extérieurement.

Cette plante croît naturellement dans l'Arabie heureuse. 1) (*Descript. ex Vahl.*)

## 20. RUELLIE en voûte. *Ruellia intrusa*. Forsk.

*Ruellia foliis petiolatis, ovatis, pilosis; floribus spicatis, secundis.* Vahl. Symbol. 1. pag. 45. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 367. n°. 17.

*Ruellia corolla laciniâ intrusa, forniciatâ.* Forsk. Flot. ægypt.-arab. pag. 113. n°. 48.

Cette espèce a beaucoup de rapports, par sa corolle, avec la *ruellia guttata*; mais ses fleurs sont plus grandes, marquées à l'orifice de leur tube de points violets, & non de taches alongées.

Ses tiges sont herbacées, un peu pendantes, divisées en rameaux à quatre faces, droits, opposés, velus, articulés; les articulations renflées à leur base & distantes d'environ deux pouces, garnies de feuilles pétiolées, opposées, ovales, très-entières, aiguës, pileuses, longues d'un pouce & plus, un peu en cœur à leur base, soutenues par des pétioles courts & planes.

Les fleurs forment un épi terminal, long de deux pouces, dont les pédoncules sont axillaires, solitaires, alternes, rarement opposés, unilatéraux, droits, divisés en pédicules courts, uniflores; chaque fleur munie de deux bractées sétacées. Le calice est partagé en cinq découpures lancéolées, subulées, velues. La corolle est violette, mêlée de blanc, pubescente en dehors: son limbe se divise en cinq découpures, dont quatre égales, ovales, ouvertes; la cinquième en forme de voûte, recourbée en dedans vers l'orifice du tube, marquée de points violets sur un fond blanchâtre. Les capsules sont aiguës à leur sommet, subulées, élastiques.

Cette plante croît sur les montagnes les plus élevées de l'Arabie heureuse. 2)

## 21. RUELLIE paniculée. *Ruellia paniculata*. Linn.

*Ruellia foliis integerrimis; pedunculis dichotomis, lateralibus; calceibus sessilibus, laciniâ supremâ ma-*

*jore.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 885. — Mill. Dict. n°. 5. — Swartz, Observ. 244.

*Ruellia pedunculis multifloris, dichotomis; folio longioribus.* Hort. Cliff. 313. — Roy. Lugd. Bat. 292.

*Speculum Veneris majus, impatiens.* Sloan, Jam. 59. — Hill. 1. pag. 158. tab. 100. fig. 2. — Rai, Suppl. 389.

Cette plante s'élève à la hauteur de trois à quatre pieds: ses rameaux sont tressés & non ouverts, opposés, garnis de feuilles opposées, très-entières, ovales, oblongues, un peu rudes au toucher, soutenues par des pétioles velus. Celles des tiges qui tombent pendant la floraison, sont plus grandes que celles qui leur succèdent: les portions de leur pétiole, qui restent après leur chute, sont paroître les branches comme épineuses.

Les fleurs présentent, par leur ensemble, une sorte de panicule terminale. Leurs pédoncules sont opposés, dichotomes, de la longueur des pétioles; les bractées lancéolées, de la longueur des pédoncules. La corolle est petite, purpurine, de peu de durée, peu renflée à son orifice, mais divisée en deux lèvres, dont la supérieure est biffée, l'inférieure à trois divisions égales.

Cette espèce croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, sur les collines arides. 3) (*V. f. in herb. Lam.*)

## 22. RUELLIE tubéreuse. *Ruellia tuberosa*. Linn.

*Ruellia foliis ovato-ovatis, crenatis; pedunculis tripartitis, caule simplici.* Swartz, Observ. 245. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 368. n°. 19.

*Ruellia foliis ovatis, crenatis; pedunculis unifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 885. — Mill. Dict. n°. 1.

*Ruellia capsulis angulosis.* Dill. Elithm. 328.

*Ruellia humilis, flore caruleo, aschodeli radice.* Plum. Gen. 12.

*Gentianella flore caruleo, integro; vaseculo feminali ex humis contra impatiens.* Sloan, Jam. 52. Hill. 1. pag. 149. tab. 95. fig. 1. — Rai, Suppl. 370.

Ses racines sont composées de plusieurs tubercules charnus qui s'enfoncent profondément dans la terre: il s'en élève des tiges herbacées, quadrangulaires, hautes de huit à dix pouces & plus, hispides, garnies de poils blanchâtres & roides vers leur extrémité, peu rameuses, munies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, crenellées à leurs bords, un peu rétrécies en coin à leur base, presque glabres ou légèrement ciliées, particulièrement sur leur pétiole.

Les fleurs sont axillaires, portées sur de très-longes pédoncules de deux à trois pouces, qui se

divisent à leur extrémité en deux ou trois autres peduncules partiels, longs d'un demi-pouce, uniflores ou biflores, munis à leur base de deux bractées oppoées, lancéolées, aiguës. Le calice se partage en cinq segments alongés, subulés; la corolle est d'un bleu-tendre, de courte durée; le tube s'élargit à son orifice en forme de cloche, & le limbe est divisé en cinq lobes inégaux, larges, étendus. Les capules sont presque coniques, longues de plus d'un pouce: dès que l'on y touche, même légèrement, elles lancent leurs semences avec élasticité à une assez grande distance.

Cette plante croît à la Jamaïque dans les forêts. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

### 23. RUELLIE à deux fleurs. *Ruellia biflora*.

*Ruellia foliis lanceolato-ovatis; floribus geminis; calicis laciniis subulatis, subulatis.* (N.)

*Ruellia* (biflora), *floribus geminis, sessilibus*. ? Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 586.

*Ruellia minor folio, floribus gemellis.* Dillen. Eltham. 331.

La plante dont je vais donner la description me paroit devoir le rapporter à l'espèce que je cite de Linné; mais le peu qu'il en dit ne suffit pas pour m'en rendre très-certain.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, tétragones, glabres, articulés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, un peu oblongues, entières, obovées, glabres à leurs deux faces, d'un vert-tendre, marquées de quelques nervures obliques, latérales, longues d'environ un demi-pouce, supportées par des pétioles d'une à deux lignes.

Les fleurs sont axillaires, opposées, réunies, dans chaque aisselle, d'une à deux, presque sessiles. Leur calice est glabre, divisé très-profondément en cinq découpures très-étroites, subulées, & paroissent même terminées par une arête fine & roide; aussi longues que les capules. Celles-ci sont glabres, cylindriques, aiguës à leurs deux extrémités, longues de trois à quatre lignes; elles renferment des semences blanchâtres, comprimées, arrondies. Je ne connois point la corolle.

Cette espèce a été recueillie par M. Bosc dans la Caroline. Il a bien voulu nous en communiquer un exemplaire. ♀? (V. f.)

### 24. RUELLIE crépue. *Ruellia crispata*. Linn.

*Ruellia foliis subrenatis, lanceolato-ovatis; capitulis ovatis, foliosis, hispida; caule repente.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 586. — Osberk. Iter, 240. — Miller, Dict. n°. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 368. n°. 22.

*Achrasa luyanaensis, spica planá.* Petiv. Gazoph. tab. 73. fig. 6.?

Ses racines sont ligneuses & rampantes; elles produisent des tiges également rampantes, longues de trois à quatre pouces, très-simples, articulées, cylindriques, garnies de feuilles ovales-lancéolées, médiocrement pétiolées, chargées de quelques poils rares, & dont les bords sont un peu recourbés, crépus, ondulés ou crénelés.

Les fleurs forment, dans chaque aisselle des feuilles, de petites éées ovales, solitaires, latérales, environnées de feuilles imbriquées, ovales, acuminées, rudes, pileuses, entre lesquelles chacune des fleurs est située. Leur calice est partagé en cinq découpures velues, linéaires; la corolle est de couleur jaune.

On trouve cette plante dans les Indes orientales. ♀ (Descript. ex Linn.)

### 25. RUELLIE fasciculée. *Ruellia fasciculata*. Vahl.

*Ruellia foliis petiolatis, oblongis, dentatis; petiolis alatis; floribus aggregatis, terminalibus lateralibusque.* Vahl, Symb. 3. pag. 82. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 369.

*Ruellia decumbens, foliis lanceolatis, petiolatis, dentatis, oppositis, altero minore; floribus fasciculatis.* Reiz. Observ. botan. 4. pag. 28.

Cette plante a des tiges grêles, menues, à quatre faces, en partie couchées sur la terre, divisées en rameaux opposés, glabres, foibles, garnis de feuilles pétiolées, opposées, oblongues, lancéolées, nues à leurs deux faces, dentées à leur contour, un peu décurrentes sur leur pétiole: à chaque paire de feuilles, l'une des deux plus petite que l'autre.

Les fleurs sont réunies par fascicules dans chaque aisselle des feuilles supérieures; elles sont munies de bractées ovales, entières, à trois nervures, un peu pileuses.

Cette plante croît dans les forêts, à l'île de Ceilan, proche les eaux thermales de Trinque-malle.

### 26. RUELLIE à feuilles molles. *Ruellia mollifolia*. Vahl.

*Ruellia foliis petiolatis, lato-lanceolatis, integerrimis, mollissimis; floribus fasciculatis.* Vahl, Symb. 3. pag. 82. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 369. n°. 24.

On distingue facilement cette espèce de toutes ses congénères, en ce que toutes ses parties, & principalement ses feuilles, sont souples, molles, velues.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, rameuses, presque

presque tomenteuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, lancéolées, très-entières, velues, verdâtres, longues de trois à quatre pouces & plus, larges au moins d'un pouce, insensiblement rétrécies vers leur sommet, soutenues par des pétioles revêtus de poils cendrés. Les fleurs sont réunies, dans l'aisselle des feuilles, en saïcules pédonculées.

Cette plante croît à l'île de Madagascar. (Description, ex Vahl.)

27. RUELLIE ondulée. *Ruellia undulata*. Vahl.

*Ruellia foliis petiolatis, oblongis, undulatis; capitulis axillaribus, sessilibus; caule erecto*. Vahl, Symb. 3. pag. 82.

Cette espèce a des tiges droites, herbacées, quadrangulaires, divisées en rameaux glabres, opposés, geniculés; les articulations épaisses, pileuses, ciliées, munies de feuilles pétiolées, opposées, oblongues, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur base, obtuses à leur sommet, ondulées à leurs bords. Les fleurs sont réunies en petites têtes sessiles, alternes dans l'aisselle des feuilles, longues d'environ six lignes. La corolle est glabre, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît naturellement dans les Indes orientales. (Description, ex Vahl.)

28. RUELLIE à collerette. *Ruellia involucreta*. Vahl.

*Ruellia foliis lanceolatis, integerrimis, glabris; capitulis terminalibus, involucreatis, pilosis*. Vahl, Symb. 3. pag. 83. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 370. n°. 26.

On distingue cette espèce à ses fleurs en tête terminale, munies à leur base de bractées disposées en forme d'involucre ou de collerette.

Ses tiges sont quadrangulaires, divisées en rameaux opposés, geniculés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, très-entières, longues d'environ neuf pouces sur un pouce de large, vertes en dessus, plus pâles en dessous, un peu obtuses, rétrécies à leurs deux extrémités. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une petite tête imbriquée, de la grosseur d'une noisette, médiocrement pédonculées. Sous chaque tête se trouvent quatre bractées ovales, aiguës, pileuses & ciliées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Description, ex Vahl.)

29. RUELLIE sinuée. *Ruellia repanda*. Linn.

*Ruellia foliis lanceolatis, obtusè dentatis, petiolatis; caule repente*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 886. — Burm. Flor. ind. tab. 40. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 370. n°. 27.

Botanique. Tome VI.

*Prunella molucca*. Rumph. Amb. vol. 6. pag. 30. tab. 15. fig. B.

C'est une plante rampante, dont les tiges sont herbacées, filiformes, lisses, articulées, garnies de feuilles opposées, pétiolées, en forme de lance, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, presque sinuées ou munies à leurs bords de dents inégales & obtuses. Les fleurs sont médiocrement pédonculées, opposées, situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en épis garnis de bractées courtes & linéaires. Les calices sont divisés en cinq découpures très-étroites, pileuses, aristées.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Java. ☉ ?

30. RUELLIE en masque. *Ruellia ringens*. Linn.

*Ruellia foliis oblongis, integerrimis; floribus solitariis, sessilibus; caule procumbente*. Linn. Syst. veg. pag. 575. n°. 12. — Osbeck. Iter, 229. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 370. n°. 28.

*Ruellia foliis ovatis, integerrimis; floribus solitariis, sessilibus; caule procumbente*. Flor. zeyl. pag. 106. n°. 234.

*Lychnis articulata, repens; folio vinca pervinea*. Burm. Zeyl. 144.

*Upulali*. Rheed, Malab. vol. 9. p. 125. tab. 64.

*Purucwal*. Herm. Zeyl. 13.

Espèce dont les tiges sont presque couchées, rameuses, articulées, longues de sept à huit pouces, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales ou lancéolées, très-entières, glabres à leurs deux faces, un peu obtuses à leur sommet, entières ou légèrement sinuées à leurs bords.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, quelquefois alternes dans chaque aisselle des feuilles, munies à leur base de deux bractées sessiles, plus courtes que le calice. Ce dernier se divise en cinq découpures terminées par des filaments étacés, un peu velus.

Cette plante croît dans les Indes orientales & au Malabar.

31. RUELLIE rampante. *Ruellia repens*. Linn.

*Ruellia foliis lanceolatis, acuminatis, integerrimis; floribus sessilibus; bracteis petiolatis, calice longioribus, caule repente*. Linn. Syst. veget. pag. 576. n°. 14. — Mantiss. 89. — Burm. Flor. ind. pag. 135. tab. 41. fig. 1. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 371. n°. 30.

Cette plante a des tiges rampantes, herbacées, rameuses, médiocrement tétragones, longues de huit à neuf pouces, garnies de feuilles opposées, pétiolées, en forme de lance; acuminées à leur sommet, entières à leur contour. Les fleurs sont

X x

solitaires, latérales, sessiles, munies à leur base de deux bractées opposées, pétiolées, elliptiques, plus longues que le calice.

Cette plante croît naturellement dans les Indes orientales.

32. RUELLIE pileuse. *Ruellia pilosa*. Linn. f.

*Ruellia foliis oppositis, ovatis, integris, ciliatis; floribus terminalibus, foliatis*. Linn. f. Suppl. pag. 290. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 371. n°. 32.

Ses rameaux sont garnis de feuilles opposées, ovales, entières, ciliées à leur contour; ses fleurs sont terminales, solitaires dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

33. RUELLIE couchée. *Ruellia depressa*. Linn. f.

*Ruellia foliis oppositis, petiolatis, obovatis, integris; caule arcte depressa*. Linn. f. Suppl. pag. 290. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372. n°. 34.

Cette espèce est remarquable, & parfaitement distincte par ses tiges couchées & fortement appliquées contre la terre; elles sont garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, rétrécies à leur base, entières à leurs bords.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

34. RUELLIE à fleurs écarlates. *Ruellia coccinea*. Vahl.

*Ruellia floribus axillaribus terminalibusque, subsolitariis, sessilibus; foliis ovatis, dentatis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 83. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 370. n°. 29.

*Barleria (coccinea)*, *inermis, foliis ovatis, denticulatis, petiolatis*. Linn. Spec. vol. 2. pag. 888. — Miller, Dict. n°. 4. — Lamarck, Encycl. vol. 1. pag. 380. n°. 8.

*Barleria folani folio, flore coccinea*. Plum. Gener. 31. — Burm. Amer. tab. 43. fig. 1.

Cette espèce a déjà été présentée à l'article *barleriè*, genre auquel Linné l'avoit d'abord rapportée; mais depuis il a été reconnu que ses capsules avoient le caractère particulier des *ruellia*. Voyez l'article cité.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique.

35. RUELLIE des marais. *Ruellia uliginosa*. Linn. f.

*Ruellia diffusa, hirsuta; foliis sessilibus, oblongis, integris; floribus terminalibus, tetragonis*. Linn. f. Suppl. 290. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 371. n°. 31.

C'est une petite plante, dont les rameaux sont diffus, tétragones, velus, garnis de feuilles opposées, sessiles, oblongues, entières à leurs bords, velues à leurs deux faces. Les fleurs sont disposées en épi terminaux, à quatre fleurs.

Elle croît dans les Indes, à Tranquebar, dans les rivières, où elle est fort commune. Elle fleurit vers le milieu de l'hiver.

36. RUELLIE en cœur. *Ruellia cordifolia*. Vahl.

*Ruellia foliis cordato-ovatis, sessilibus, subtus tomentoso-incanis; floribus subspicatis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 84. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372. n°. 35.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, les rameaux opposés, articulés, presque dichotomes à leur partie supérieure, à quatre angles peu marqués, garnis de feuilles sessiles, opposées, ovales, en cœur, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, longues de trois à quatre lignes, vertes & nervuées à leur face supérieure, marquées de lignes blanchâtres, pileuses, sensibles à la loupe, blanches & tomenteuses en dessous.

Les fleurs sont disposées en un épi court, terminal, composé de quatre à six fleurs, opposées, écartées, très-souvent alternes, munies d'une bractée linéaire, de la longueur du calice. Le tube de la corolle est filiforme, plus long que le calice.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. *(Descript. ex Vahl.)*

37. RUELLIE à fleurs unilatérales. *Ruellia secundata*. Vahl.

*Ruellia floribus subcordato-ovatis, integerrimis, villosis; racemis axillaribus, secundis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 84. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372. n°. 36.

Cette espèce a des rapports avec la *ruellia intrusa*, dont elle diffère particulièrement par ses corolles plus grandes, de couleur jaune; par les découpures arrondies de leur limbe, & par la disposition des fleurs en grappes.

Ses tiges, ainsi que ses rameaux, sont pubescentes, quadrangulaires, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque en cœur, très-entières, obtuses ou un peu acuminées à leur sommet, longues d'environ un pouce, blanchâtres & pubescentes surtout dans leur jeunesse, supportées par des pétioles très-ouverts, beaucoup plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, terminales, longues d'environ six à sept pouces; les pédoncules partiels sont courts, écartés les uns des autres, munis de bractées sétacées, plus

courtes qu'eux. Les calices sont divisés en cinq découpures étroites, velues, persistantes. La corolle est glabre, de couleur jaune, longue d'environ un pouce, divisée à son limbe en cinq découpures arrondies, presque égales. L'ovaire est blanchâtre & velu.

Cette plante croit dans les Indes orientales. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

38. RUELLIE du Japon. *Ruellia japonica*. Thunb.

*Ruellia foliis ellipticis; floribus spicatis; bracteis oblongis, obtusis*. Thunb. Flor. japon. pag. 254. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 372. n°. 38.

*Ruellia repanda à japonica*. Houttuyn. Linn. p. 84. f. Syst. 8. pag. 171. tab. 59. fig. 9.

Ses tiges sont droites, herbacées, à quatre faces, de couleur brune-foncée, garnies de feuilles opposées, à peine pétiolées, elliptiques, très-entières à leurs bords, un peu obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, veinées, longues de cinq à six lignes; les supérieures insensiblement plus petites.

Les fleurs sont disposées en plusieurs épis alternes, situés à l'extrémité des tiges & des rameaux, longs d'environ trois pouces, glabres; munies de bractées oblongues, obtuses, entières, étalées, imbriquées, de la longueur du tube de la corolle. Le calice se divise en cinq découpures étroites. La corolle est campanulée, de couleur jaune; son limbe partagé en cinq lobes égaux.

Cette plante croît naturellement au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

39. RUELLIE queue de renard. *Ruellia atropurpurea*. Vahl.

*Ruellia foliis ovatis, glabris, obscurè repandis; flosculis terminalibus, pilosis; caule repente*. Vahl. Eglog. 2. pag. 49. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 373. n°. 39.

Ses tiges sont rampantes, herbacées, rameuses, médiocrement tétragones, presque glabres, garnies de feuilles opposées, pétiolées, glabres, ovales, longues d'un pouce & un peu plus, un peu rétrécies vers leur base, aiguës à leur sommet, légèrement sinuées à leur contour, à nervures peu sensibles.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en épis pédonculés, velus, imbriqués, à peine d'un pouce de long, de la grosseur d'une plume de cygne; chaque fleur munie à la base de son calice de deux bractées subulées. Le calice se divise en cinq découpures, dont quatre sont subulées, la cinquième un peu plus longue que les autres, linéaire, lancéolée, aristée, légèrement veinée; toutes pâles, membraneuses, ciliées,

marquées de trois lignes, plus colorées que les autres.

Cette plante croît naturellement au Montserrat & à Porto-Ricco. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

40. RUELLIE barbe. *Ruellia barbata*. Vahl.

*Ruellia foliis lanceolatis, integerrimis; floribus verticillatis, calicibus acutis, bracteis oblongis, caule erecto*. Vahl. Symbol. 3. pag. 83. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 373. n°. 40.

Cette plante a des tiges, droites herbacées, à quatre faces, articulées; les articulations un peu plus épaisses à leur partie supérieure; elles se divisent en rameaux peu nombreux, courts, alternes, garnis de feuilles sessiles, lancéolées, longues de deux pouces, quelquefois plus petites, entières à leurs bords, un peu obtuses à leur sommet, légèrement rétrécies vers leur base; les plus jeunes pileuses, particulièrement vers leurs bords.

Les fleurs sont axillaires, sessiles, disposées par verticilles, trois environ dans chaque aisselle opposée; munies de bractées oblongues, obtuses, rétrécies à leur base. Le calice est pubescent à son extérieur, divisé en cinq découpures aiguës. La corolle se divise à son limbe presque en deux lèvres; la supérieure entière, comprimée, lancéolée, obtuse; l'inférieure recouverte en dessus de longs poils, divisée en trois découpures linéaires, obtuses. Les anthères sont munies à leur base d'une double arête.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Vahl.*)

41. RUELLIE à feuilles de saule. *Ruellia salicifolia*. Vahl.

*Ruellia foliis lanceolatis, integerrimis; floribus verticillatis, calicibus aristatis, bracteis lanceolatis, caule erecto*. Vahl. Symbol. 3. pag. 84. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 374. n°. 41.

Cette espèce a de grands rapports avec la *ruellia barbata*; elle en diffère par ses tiges presque simples, par ses feuilles beaucoup plus allongées, par la forme de ses bractées, par ses calices glabres, ciliés & non pubescens.

Ses tiges sont droites, à quatre faces, articulées, à peine rameuses; garnies de feuilles opposées, lancéolées, assez semblables à celles du saule; rétrécies & aiguës à leurs deux extrémités, marquées à leurs deux faces de lignes composées de poils très-fins & courts, vertes en dessus, d'un vert plus pâle en dessous; toutes longues au moins de deux pouces.

Les fleurs sont disposées en verticilles, dans l'aisselle des feuilles; munies de bractées linéaires, lancéolées, aiguës, point rétrécies à leur base.



Le calice est court, divisé en cinq découpures glabres, ciliées à leurs bords, terminées par un filament en forme d'arête, persistantes même après la chute des capsules.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Vahl.*)

42. RUELLIE odorante. *Ruellia balsamea*. Linn. f.

*Ruellia erecta, glabra; foliis petiolatis, lanceolatis, serratis; verticillis sessilibus*. Linn. f. Suppl. pag. 289. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 373. n°. 41.

Ses tiges sont droites, à quatre faces, glabres, charnues, articulées, colorées, rameuses, garnies de feuilles pétiolées, opposées, lancéolées ou oblongues, larges, étendues, glabres, glabres à leurs deux faces, finement dentées en scie à leurs bords.

Les fleurs sont disposées par verticilles sessiles dans l'aisselle des feuilles, munies de bractées très-entières, souvent ciliées. Le calice se divise en cinq découpures irrégulières, dont quatre lancéolées, la cinquième plus large. La corolle est jaune, tubulée, en masque; les anthères bleuâtres, le style velu.

Cette plante est très-commune aux Indes, dans les rivières, surtout après la récolte du riz. Elle répand une forte odeur de terébinthe. ( *Descript. ex Linn. f.* )

43. RUELLIE à longues fleurs. *Ruellia longiflora*. Vahl.

*Ruellia foliis ovatis, integerrimis; floribus axillaribus, solitariis, longissimis; caule fruticoso*. Vahl, Symbol. 1. pag. 45. tab. 15. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 374. n°. 43.

*Camellia (grandiflora), foliis petiolatis, cordatis, obtusis, integris; raris corolla quadri-pollinari*. Forskhal, Flor. ægypt. arab. pag. 126. n°. 99.

Malgré les rapports de cette plante avec le *barleria grandiflora*, elle ne peut être confondue avec elle. Outre le caractère de ses capsules munies de dents élatiques, elle n'a ni les feuilles molles & foveuques, ni les bractées glabres, sessiles, réticulées & scarieuses du *barleria grandiflora*.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont hautes d'environ un pied & demi, divisées en rameaux diffus, étalés, presque cylindriques; hérissées de poils courts, roides, blanchâtres, ouverts, très-nombreux, munis d'articulations longues d'un pouce, un peu renflées à leur partie supérieure; garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque en cœur, très-entières; longues d'un pouce & plus, médiocrement veinées, obtuses à leur sommet, insipides & tuberculées à leurs deux faces,

soutenues par des pétioles cylindriques, velus, longs d'un demi-pouce.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, sessiles, situées vers l'extrémité des rameaux, munies de deux bractées opposées. Le calice renflé, long d'environ un pouce, est marqué de cinq angles, divisé en cinq découpures conniventes, lancéolées. La corolle est blanche, son tube cylindrique, long de quatre pouces; le limbe large d'un pouce, à cinq lobes presque égaux; les anthères sont blanches, droites, linéaires, biffées à leur base; les capsules ovales; à quatre sillons, à deux loges, chaque loge contenant quatre semences réniformes.

Cet arbrisseau croît dans l'Arabie heureuse, sur les montagnes, dans les environs de l'Acès. ( )

44. RUELLIE irrégulière. *Ruellia difformis*. Linn. fil.

*Ruellia diffusa; hirsuta; foliis linearibus, dentato-sinuatis, integris; floribus verticillatis, axillaribus*. Linn. f. Suppl. pag. 289. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 374. n°. 44.

*Nir-schalli*. Rheed, Malab. vol. 2. pag. 89. tab. 46. *An varietas?*

Cette plante a des tiges diffuses, rameuses, hérissées de poils roides, garnies de feuilles opposées, très-varieuses dans leur forme, lancéolées ou linéaires, étroites; les unes entières; d'autres dentées en scie ou presque incisées, sinuées plus ou moins profondément. Les fleurs sont disposées, par verticilles opposés, dans les aisselles des feuilles.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Linn. f.*)

45. RUELLIE radicante. *Ruellia humifusa*. Mich.

*Ruellia glabriscula, caule diffusè ramoso, humiftrato & raicante; foliis in petiolum longiusculè angustatis, ovalibus, obtusis; floribus subsessilibus, capsulis linearibus*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 23.

Ses tiges sont diffuses, rameuses, presque glabres, étendues & couchées sur la terre, radicales à leurs articulations, garnies de feuilles opposées, ovales, étroites, obtuses à leur sommet, retécées à leur base en un pétiole alongé. Les fleurs sont presque sessiles dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît sur les confins de la Nouvelle-Géorgie & de la Floride.

46. RUELLIE à feuilles oblongues. *Ruellia oblongifolia*. Mich.

*Ruellia affurgens, tota minutim densèque pubens;*

*foliis erectis, subsessilibus, obovati-oblongis; floribus subsolitariis.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 24.

Cette plante a ses tiges redressées, rameuses, un peu pubescentes, garnies de feuilles droites, opposées, presque sessiles, ovales, oblongues, presque pubescentes. Ses fleurs sont solitaires, insérées dans l'aisselle des feuilles supérieures.

Telle est la description que Michaux donne d'une plante que je crois avoir reconnue dans l'herbier de M. Lamarck, à laquelle conviennent parfaitement les caractères que Michaux lui attribue, & qui a de plus les fleurs solitaires, presque sessiles, droites, axillaires, jaunâtres, plus longues que les feuilles, munies à leur base de deux bractées étroites, allongées, lancéolées. Le calice est pubescent, divisé en cinq découpures ciliées à leurs bords, terminées par un long filament en forme d'arête, un peu velu. Cette espèce a été rapportée de la Caroline par Frazer.

La première a été recueillie par Michaux en Amérique, dans la Nouvelle-Géorgie. (*Descript. ex Mich.*)

#### 47. RUELLIE tentaculée. *Ruellia tentaculata.*

*Ruellia foliis obovatis, verticillis obvallatis; spinis inermibus, bifurcatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 886. — Amœn. Acad. vol. 4. pag. 320.

*Euphorbia acinos.* Pluk. Phyt. tab. 297. fig. 7.

Ses tiges sont lisses, herbacées, à quatre faces, divisées en rameaux courts, garnis de feuilles pétiolées, ovales, entières, découronnées sur leur pétiole, ovales, un peu aiguës. Les fleurs sont disposées en verticilles dans l'aisselle des feuilles, environnées d'épines molles, filiformes, droites, velues, une fois plus longues que les fleurs, divisées à leur sommet en deux pointes aiguës. Les feuilles qui accompagnent les verticilles sont petites, sessiles, presque rondes, tandis que celles des tiges sont amples, longues de deux pouces, larges au moins d'un pouce & demi. Je soupçonne que Linné n'a vu que celles des verticilles.

Cette plante croît dans les Indes. (*V. f. in herb. Lem.*)

#### 48. RUELLIE couchée. *Ruellia prostrata.*

*Ruellia herbacea, pubescens; foliis ovatis, crenatis, subvillosis; floribus axillaribus, subsolitariis; caule prostrato.* (N.)

Ses tiges sont tout-à-fait couchées sur la terre, grêles, herbacées, pubescentes, articulées, radicantes à leurs articulations, d'où sortent de longues fibres simples, filiformes. Les rameaux sont médiocrement redressés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, courtes, à peine longues

d'un pouce sur huit à dix lignes de large; un peu molles, vertes à leur face supérieure, plus pales & un peu blanchâtres en dessous, légèrement velues ou munies, surtout à leur face inférieure, de quelques poils courts & rares. Les fleurs sont axillaires, presque solitaires dans chaque aisselle, médiocrement pedoncules; les calices sont courts, velus.

Cette plante croît dans l'Inde; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (*V. f.*)

#### 49. RUELLIE des rochers. *Ruellia rupestris.* Swartz.

*Ruellia acaulis, foliis oblongis, crenatis, repandis; petiolis longissimis, scapis multifloris.* Swartz, Prodr. 93. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1071. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 375. n°. 45.

*An gerardia (tuberosa), foliis subovatis, tomentosis, repandis, longitudo caulis? Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 848. — Willd. l. c.*

Willdenow soupçonne que cette plante pourroit bien être le *gerardia tuberosa* de Linné, dont la fructification n'est pas encore bien connue. Au reste, cette espèce & la suivante, *Ruellia scabrofa*, ont un port qui leur est particulier; elles s'écartent des autres espèces de ce genre par leur corolle inégale & en forme de soucoupe.

Les feuilles naissent du collet de la racine; elles sont oblongues, presque ovales, un peu tomenteuses, crénelées ou finées à leurs bords, supportées par de très-longs pétioles. De leur centre s'élève une tige nue ou une hampe terminée par plusieurs fleurs, dont la corolle est en forme de soucoupe.

Cette plante croît en Amérique, dans la Nouvelle-Espagne, sur les fentes des rochers, aux lieux déserts, le long des rivières. &

#### 50. RUELLIE à feuilles rudes. *Ruellia scabrofa.* Swartz.

*Ruellia acaulis, foliis ovatis, subrepandis, coriaceis, glabris, subius scabris; scapis multifloris.* Sw. Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 1074. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 375. n°. 46.

Cette espèce, comme nous l'avons observé ci-dessus, ne convient qu'imparfaitement à ce genre, duquel il faudra peut-être l'exclure lorsque la fructification sera mieux connue. Ses feuilles sont toutes radicales, ovales, coriaces, un peu finées à leurs bords, glabres à leur face supérieure, rudes au toucher à leur face inférieure: il s'élève de leur centre une hampe nue, qui supporte plusieurs fleurs dont la corolle est hypocratéiforme.

Cette espèce croît dans les lieux pierreux & ombragés de la Nouvelle-Espagne. &

§1. *RUELLIE* variable. *Ruellia varians*, Vent.

*Ruellia foliis lanceolato-ovatis, subrepandis, acuminatis, glabris; pedunculis terminalibus, paucifloris; bracteis imbricatis, inequalibus*, Vent. Hort. Cels, pag. 46. tab. 46.

*Eranthemum pulchellum*, Andrew. the Botan. repository. pl. 88.

Ses racines produisent des tiges droites, géniculées, renflées aux articulations, cylindriques, divisées en rameaux opposés, glabres, tétragones, garnis de feuilles opposées, pétiolées, réfléchies, ovales, lancéolées, crénelées à leur base, légèrement ondulées, veinées, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles réunis à leur base, dilatés à leur partie supérieure.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues par des pédoncules très-courts, ordinairement triflores, munis de bractées de couleur purpurine, imbriquées, lancéolées, aiguës, inégales; les extérieures légèrement crénelées. Le calice est divisé en cinq, quelquefois quatre ou six découpures, semblables aux bractées intérieures. La corolle est d'un bleu d'azur, en forme d'entonnoir, insérée sous l'ovaire: son tube est grêle, médiocrement dilaté, un peu courbé, d'un rose-tendre, trois fois plus long que le calice; le limbe ouvert, à cinq, quelquefois quatre ou six lobes ovales, obtus, presque égaux. Les étamines sont attachées à l'orifice de la corolle, ordinairement au nombre de quatre, dont deux fertiles & deux stériles; quelquefois cinq ou six, supportant des anthères droites, échancrées à leur base.

L'ovaire est oblong, verdâtre, libre; le style filiforme, de la longueur des étamines fertiles, de couleur purpurine; le stigmate à deux divisions aiguës, roulées en dehors. Le fruit est une capsule oblongue, anguleuse, presque tétragone, aiguë à son sommet, rétrécie à sa base, divisée en deux loges, s'ouvrant, avec élasticité, en deux valves; munie en dedans de cloisons opposées aux valves, adhérentes le long de leur partie moyenne, se divisant, au même instant qu'elles, en deux portions égales, & munies chacune de deux filaments aigus. Les semences sont foliaires, ovales, comprimées, de couleur brune, situées dans les aisselles des filaments crochus.

Cet arbrisseau est originaire du Coromandel. Il est cultivé dans le jardin de M. Cels. f. (Description.)

Espèces moins connues.

\* *Ruellia (fragrans), foliis sessilibus, oblongis, obtusè serratis; floribus axillariis, solitariis, sessilibus*, Forst. Prodr. n°. 243.

\* *Ruellia (repans), foliis petiolatis, ovatis, obtusè serratis; pedunculis terminalibus, subspicatis*, Forst. Prodr. n°. 242.

\* *Ruellia (antipodæ), foliis mucronato-serratis; caule repente; floribus subspicatis, terminalibus, quinque ternisve*, Linn. Mantill. pag. 422. — Rumph. Amb. 5. tab. 170. fig. 2.

Cette espèce n'a point du tout le caractère essentiel de ce genre; elle ne renferme que deux étamines, & les capsules sont dépourvues de dents élastiques. Elle paraît avoir de grands rapports avec les *gratiola*. Willdenow, dans son *Species plantarum*, l'a présentée sous le nom de *gratiola veroniciifolia*, d'après Retzius.

\* D'après de nouvelles observations de M. Lamarck, le *justicia parvifolia* (Encycl. botan.) doit être placé parmi les *ruellia*, la corolle ayant quatre étamines. Voyez, pour la description, l'article CARMENTINE à petites feuilles, vol. 1. pag. 627. n°. 10.

**RUIZE.** *Ruizia*. Geste de plantes dicotylédones, à fleurs polypétales, de la famille des malvacées, qui a de grands rapports avec les *pentapètes*, & qui comprend des atriflexes exoriques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, entières ou lobées; les fleurs disposées en corymbes terminaux ou solitaires.

Le caractère essentiel de ce geste est d'avoir :

Un double calice, l'extérieur à trois folioles caduques, l'intérieur monophylle, persistant; le tube des étamines très-court; toutes les étamines fertiles; dix styles; des semences triangulaires.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double; l'extérieur à trois folioles ovales, aiguës, concaves, très-caduques; l'intérieur monophylle, profondément partagé en cinq découpures lancéolées.

2°. Une corolle de cinq pétales ouverts, oblongs, en forme de faux, entiers, arrondis à leur sommet, rétrécis à leur base, insérés sur le tube des étamines.

3°. De trente à quarante étamines, dont les filaments, plus courts que la corolle, sont réunis à leur base par un tube très-court, terminé par des anthères oblongues, inclinées.

4°. Un ovaire globuleux, supérieur, à dix filons, surmonté de dix styles très-courts, épais, terminés par des stigmates simples.

Le fruit consiste en dix capsules disposées circulairement: ces capsules sont arrondies extérieurement, comprimées latéralement, anguleuses à

leur bord intérieur, à une seule loge, contenant deux semences à trois côtés; l'extérieur arrondi.

*Observations.* Ce genre ne diffère des pentapétées que par les éramines plus nombreuses & par les dix styles, au lieu d'un seul à cinq divisions. Les autres caractères sont communs aux deux genres, qui rigoureusement pourroient être réunis par ceux qui craignent, avec assez de raison, la trop grande multiplicité des genres.

Je ne serois pas très-éloigné de soupçonner que les trois espèces qui composent ce genre, ne sont peut-être que des variétés de la même, leurs différences principales n'existant que dans la forme des feuilles qui sont très-variables.

## E S P È C E S.

1. RUIZE à feuilles en cœur. *Ruizia cordata*. Cavan.

*Ruizia foliis cordatis, oblongo-acuminatis, sinuato-crenatis, incanis, sub æst. farinaceis.* Cavan. Dissert. botan. 3. pag. 117. n°. 169. tab. 36. fig. 2.

*Ruizia foliis cordato-lanceolatis, repandis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 798.

*Konigia foliis subcordatis, crenato-sinuatis, incanis, fuscis tomentosis; floribus decagynis.* Commerf. Mss. Cod. 2. pag. 89.

*Konigia foliis cordato-sinuatis, crenatis, utrinque incanis; floribus decasyllis.* Commerf. ubi supra figurat.

Vulgairement bois de senteur blanc.

Ses tiges sont frutescentes & rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-nombreuses, en cœur, ovales, acuminées, crénelées, sinuées, plus longues que leur pétiole, blanchâtres, presque pulvérulentes en dessous, munies à leur base de stipules subulées, blanchâtres, pulvérulentes, caduques.

Les fleurs sont disposées en corymbes presque ombellés, axillaires & terminaux; chaque fleur munie d'un pédoncule propre. Le calice est tomenteux; l'extérieur à trois folioles ovales, aiguës, concaves, très-caduques; l'intérieur à cinq découpures profondes, lancéolées, réfléchies à la maturité des fruits. La corolle a cinq pétales d'abord d'un jaune-clair, puis d'un jaune de soufre plus foncé, très-ouverts, presque arrondis, en forme de saulx, un peu roulés à leur sommet, plus courts que le calice. Les éramines plus courtes que la corolle; les anthères blanchâtres, oblongues; l'ovaire globuleux, velu; les styles touffus, plus courts que les éramines.

Cette plante a été recueillie par Commerfion à l'Île-Bourbon, proche le bourg Saint-Denis, où

elle fleurit vers la fin de l'hiver. (V. f. in herb. Jussieu.)

2. RUIZE lobé. *Ruizia lobata*. Cavan.

*Ruizia foliis cordatis, crenatis, tri seu quinquelobatis, oblongis; lobo medio productiore, acuminato.* Cavan. Dissert. bot. 3. pag. 118. n°. 170. tab. 36. fig. 1.

*Ruizia foliis cordatis, quinquelobis, crenatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 798. n°. 2.

*Konigia foliis superioribus cordatis, inaequaliter crenatis; inferioribus trilobis & quinquelobis, lobo medio productiore.* Commerf. Mss. Codic. 2. pag. 15. Figurat.

*Konigia floribus decagynis; calice exteriori triphylo, deciduo, interiori quinquedartito; foliis oblonge cordatis, margine crenato-suberosi, basi obtusè quinqueangulatis, subius incanis.* Commerf. ubi supra.

Il existe de si grands rapports entre cette espèce & la précédente, qu'il est difficile de s'assurer qu'elle n'en soit pas une variété; elle en diffère à la vérité par les feuilles lobées, mais quelquefois elle en a d'entières, parfaitement semblables à celles du *ruizia cordata*; & d'ailleurs, dans ce genre comme dans la plupart des autres malvacées, la forme des feuilles est très-variable.

C'est un très-joli arbrisseau qui s'élève à cinq ou six pieds, dont les tiges sont revêtues d'une écorce cendrée, & qui se divisent en rameaux étalés, fragiles, qui acquièrent par la vieillesse une consistance ligneuse & une grosseur presque égale à celle de la cuisse. Les feuilles sont situées à l'extrémité des rameaux, très-rapprochées, alternes, pétiolées, en cœur, glabres en dessus, tomenteuses en dessous, inégalement sinuées & crénelées à leur contour, à cinq ou trois angles & quelquefois plus; portées sur de longs pétioles garnis à leur base de stipules droites, subulées, blanchâtres, caduques.

La disposition des fleurs & les autres parties de la fructification ressemblent parfaitement à celles du *ruizia cordata*, excepté les pétales un peu plus grands & plus longs que les calices. Le nombre des styles varie au dessous de dix, d'après la remarque de Commerfion.

Cette espèce a été recueillie à l'Île-Bourbon, au promontoire de Saint-Bernard, dans les environs du bourg Saint-Denis; elle fleurit vers le milieu de l'hiver. (V. f. in herb. Juss.)

3. RUIZE variable. *Ruizia variabilis*. Jacq.

*Ruizia foliis ramorum florentium palmatis, fleritum digitatis.* Jacq. Hort. Schoebb. 3. pag. 24. tab. 295. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 798. n°. 3.

*Ruizia (palmata), foliis utrinque incanis, pal-*

*maits, incisifs, quinquepartitis; lobis acuminatis, f-nutato-crenatis, medio productiore.* Cavan. Dissert. bot. 3. pag. 119. n°. 171. tab. 37. fig. 1.

*Konigia foliis utrinque incanis, palmatis, incisifs.* Commerf. Mff. Cod. 2. pag. 89. *Figurat.*

*Ruizia (laciniosa), foliis usque ad petiolum laciniosis; laciniosis septem angustissimis, linearibus, pinnatis; pinnulis decurrentibus.* Cavan. Dissert. bot. 3. pag. 119. n°. 172. tab. 37. fig. 2.

*Konigia foliis multipartitis; laciniosis linearibus, subarvisis.* Commerf. Mff. Cod. 2. pag. 16.

*Vulgairement bois de senteur galeux, ou bois de senteur bleu.*

M. Cavanilles, d'après Commerfon, avoit fait deux espèces de cette plante, d'après la forme variée de ses feuilles. Jacquin a observé que ses feuilles étoient palmées sur les rameaux fertiles ou portant des fleurs, lacinieuses sur les rameaux stériles : opinion qui se trouve en effet confirmée en quelque sorte par le silence de Commerfon sur les fleurs du *ruizia laciniosa*, dont il n'existe que des feuilles dans son herbier.

C'est un arbrisseau très-agréable, peu élevé, dont les rameaux sont diffus, les uns stériles, d'autres fertiles. Les feuilles, sur les premiers, sont éparées, nombreuses, alternes, longuement pétiolées, plus longues néanmoins que leur pétiole; divisées très-profondément en cinq ou sept découpures, celle du milieu très-longue, les autres linéaires, aiguës, pinnatifides. Les feuilles, sur les seconds, sont palmées, incisées, à cinq lobes profonds, crénelés, incisifs, toutes blanchâtres, pubescentes en dessous, munies à la base de leur pétiole de stipules étroites, presque capillaires, velues.

Les fleurs sont disposées en corymbes axillaires & terminaux, soutenues par des pédoncules tomenteux, presque lanugineux, divisés en pédoncules partiels, peu nombreux, presque en ombelle; garnis à la base des divisions de petites bractées étroites, lancéolées, aiguës. La corolle est jaune, & semblable, ainsi que les autres parties de la fructification, à l'espèce précédente.

Cette plante a été recueillie par Commerfon à l'île-Bourbon. (V. f. in herb. Juss.)

**RUMPH.** *Rumphia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des térébenthacées, qui a des rapports avec les camelées (*caecurum*), & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont simples & les fleurs disposées en grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice à trois divisions; trois pétales; trois étamines; un style; un drupe à trois loges.*

# CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à trois divisions droites, persistantes.

2°. Une corolle composée de trois pétales égaux, oblongs, obtus.

3°. Trois étamines, dont les filamens sont subulés, de la longueur des pétales, terminés par des anthères fort petites.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style subule, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate à trois corés.

Le fruit est un drupe coriace, turbiné, marqué de trois sillons, contenant une noix à trois loges & des semences solitaires.

## ESPÈCE.

**RUMPH.** à feuilles de tilleul. *Rumphia tiliaefolia*.

*Rumphia pubescens, foliis ovato-cordatis, crenatis, acuminatis; racemis axillaribus.* (N.) Lajn. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 96. n°. 418. tab. 25.

*Rumphia amboinensis.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 92. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 187. — Juss. Plant. Gener. pag. 370.

*Myxa pyramidalis, officulo trispermo.* Rai, Hist. 156.

*Tienc-tani.* Rheed, Malab. vol. 4. pag. 25. tab. 11.

C'est un grand arbre des Indes, revêtu d'une écorce cendrée, dont les branches & les rameaux sont diffus, étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, simples, ovales, assez semblables à celles du tilleul, échancrées en cœur à leur base, rudes au toucher, velues, crénelées à leur contour en dens courtes, droites, aiguës, acuminées à leur sommet, marquées de nervures latérales qui se ramifient en un réseau fin; les pétioles plus courts que les feuilles, presque cylindriques, pubescens.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, situées vers l'extrémité des rameaux, peu garnies, plus longues que les feuilles; les pédoncules & leurs divisions velus ou pubescens; les calices velus, courts, à trois divisions ovales, aiguës; les pétales oblongs, un peu sinués à leurs bords; l'ovaire hispide, presque rond ou turbiné, saillant hors du calice. Le fruit est un drupe en forme de poire, obtus & surmonté très-souvent à son sommet d'une portion du style persistant, marqué de trois sillons, hispide, renfermant une noix presque ovale,

ovale, à trois loges, dans chacune desquelles est placée une semence un peu comprimée.

Cette plante croît dans les Indes, au Malabar, &c. *(V. f. in herb. Juss.)*

**RUPINIE.** *Rupinia*. Genre de plantes cryptogames, établi par Linné fils, qui paroit devoir être réuni aux *murchensia*, & qui exigeroit un nouvel examen. Linné lui assigne pour caractère essentiel :

*Des anthères subulées; un ovaire ovale, fixé à l'extrémité des feuilles; plusieurs styles; une capsule à une seule loge polysperme.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles sont séparées des femelles.

Les fleurs mâles ont :

1°. Point de calice ni de corolle.

2°. Plusieurs étamines dépourvues de filamens, dont les anthères sont droites, subulées, comprimées.

Les fleurs femelles ont :

1°. Quelques filamens droits, subulés, qui enveloppent l'ovaire, d'après Forster, & qui tiennent lieu de calice.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire globuleux, surmonté de plusieurs styles très-courts, cylindriques, tronqués.

Le fruit est une capsule presque globuleuse, à une seule loge, contenant plusieurs semences.

*Observations.* Ce genre se réduit à une seule espèce. Il avoit d'abord été établi par Forster sous le nom d'*aytonia*. Les filamens qui entourent l'ovaire, & que Linné fils n'a pu apercevoir, n'appartiendroient-ils pas aux étamines?

#### E S P È C E.

**RUPINIE lichénoïde.** *Rupinia lichenoides*. Linn. f. Suppl. pag. 69 & 452.

*Aytonia rupestris*. Forst. Gener. nov. n°. 74.

Cette plante a beaucoup de ressemblance, par son feuillage, aux *targionia*. Ses expansions sont linéaires, obtuses, entières, longues de six à huit lignes, presque imbriquées, noires en dessous : celles qui portent les parties femelles de la fructification, sont garnies à leurs bords de petits tubercules rougeâtres; elles sont d'un vert-blanchâtre en dessus, chargées à leur disque de poils droits, subulés, blanchâtres, que Forster a regardés comme des anthères.

Cette plante croît sur les rochers de l'Amérique méridionale. (*Descript. ex Linn. f.*)

*Botanique. Tome VI.*

**RUPPIE.** *Ruppia*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des narades, qui a de grands rapports avec les *potamogeton*, & qui comprend des herbes aquatiques, indigènes de l'Europe, capillaires, rameuses, à feuilles de graminées, & dont les fleurs sont disposées en épis courts, soutenus par de longs pédoncules filiformes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice à deux valves caduques; point de corolle; quatre étamines; quatre ovaires presque sessiles; quatre semences pédonculées.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice bivalve, caduc, à folioles ovales, concaves, opposées.

2°. Point de corolle.

3°. Quatre étamines, point de filamens; des anthères sessiles, égales, arrondies, à deux lobes.

4°. Quatre ovaires supérieurs, presque sessiles, ovales, coniques, connexes, sans styles, surmontés par des stigmates obtus.

Le fruit consiste en quatre semences nues, ovales, coniques, un peu obliques, pédonculées, chaque pédoncule filiforme, plus long que le fruit.

*Observations.* Les ruppies ont le port des potamogetons; ils en diffèrent par leur calice à deux folioles, & par leurs fruits pédonculés.

#### E S P È C E.

**RUPPIE maritime.** *Ruppia maritima*. Linn.

*Ruppia foliis graminibus, vaginantibus; caulibus alternis, floralibus suboppositis.* (N.)

*Ruppia maritima*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 184. — Lamack. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 359. n°. 1745. tab. 90. — Idem, Flor. franc. vol. 3. pag. 540. n°. 1153. — Juslieu, Gen. Plant. pag. 19.

*Ruppia*. Hort. Cliffort. 436. — Iter. Wgoth. 186. — Flor. succ. 2. n°. 154. — Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 416. — Weder, Flor. dan. tab. 364. — Pallas, Iter 1. pag. 431. — Roth, Germ. 1. pag. 75. — II. pag. 208. — Hoffm. Germ. 59.

*Corallina fenicula folio longiore.* Tournef. Inst. R. Herb. 571.

*Buccoferrus maritima, foliis acutissimis.* Mich. Gen. 71. tab. 35.

*Potamogeton maritimum, graminibus longioribus foliis, fructu fere umbellato.* Rai, Angl. 3. pag. 134. tab. 6. fig. 1.

*Gramen maritimum, fluitans, cornutum.* C. Baub. Pin. 3. — Prodr. 17.

Y y

*Fucus folliculaceus*, fenéuli folio longiore. C. Buh. Pin. 365.

*Fucus saralaceus*. Lobel, Icon. pag. 2. 255. — Idem, Observ. pag. 653. Icon.

*Fucus ferulaceus Lobelii*. Dalech. Hist. 2. pag. 1373.

C'est une plante aquatique, dont les tiges sont grêles, herbacées, glabres, molles, très-rameuses, garnies de feuilles allongées, assez semblables à celles des graminées, étroites, linéaires, aiguës, sessiles, renflées & vaginales à leur base, glabres à leurs deux faces, alternes sur les rameaux, presque opposées à l'infertion des pédoncules.

Les fleurs sont disposées en épis solitaires, terminaux, pédonculés, simples ou dichotomes : ces fleurs sont presque sessiles jusqu'à l'époque de la fécondation : alors le pédoncule commun se courbe un peu, & les fruits murs sont supportés chacun par de longs pédoncules particuliers, filiformes, écartés.

Cette plante croît dans les étangs, sur les bords de la mer. ○ (P. v.)

RUSSELIE. *Russelia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monopétales, irrégulières, de la famille des pédiculières, qui a des rapports avec les *Soparia*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, les rameaux pendans & sarmenteux, les fleurs pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle à deux lèvres, dont le tube est très-long ; quatre étamines didynames ; un stigmate globuleux ; une capsule à une loge, bivalve, subulée par le style persistant.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, d'une seule pièce, divisé en découpures sétacées à leur sommet.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, tubulée, dont le tube est très-long, presque cylindrique, velu intérieurement à son orifice ; le limbe ouvert en deux lèvres, la supérieure échancrée ; l'inférieure plus longue, partagée en trois lobes.

3°. Quatre étamines didynames, insérées sur le tube, dont les filaments sont filiformes, terminés par des anthères non saillantes.

4°. Un ovaire supérieur, surmonté d'un style acuminé, terminé par un stigmate globuleux.

Le fruit, encore peu connu, est une capsule à une loge, à deux valves, terminée par une por-

tion du style subulé, persistant ; cette capsule renferme plusieurs semences.

#### E S P È C E.

RUSSELIE sarmenteuse. *Russelia sarmentosa*. Jacq.

*Russelia foliis ovatis, dentatis, supernè hirsutis ; pedunculis trifloris, axillaribus.* (N.)

*Russelia sarmentosa*. Jacq. Stirp. Amer. pag. 178. tab. 113. — Lamarck, Illustr. Gener. tab. 539. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 344. — Jusieu, Plant. Gener. pag. 118.

C'est un arbrisseau à tiges grimpantes, sarmenteuses, dont les rameaux sont pendans ; glabres, tétragones, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur contour, velues à leur face supérieure, glabres en dessous, marquées de nervures latérales presque simples, supportées par des pétioles courts, presque nuls aux feuilles supérieures.

Les fleurs sont axillaires, soutenues par des pédoncules solitaires, plus courts que les feuilles, qui se divisent, à leur sommet, en deux ou trois autres pédoncules partiels, munis à leur base de bractées courtes, ovales, aiguës. Les calices sont petits, d'une seule pièce, partagés en cinq dents profondes, terminées par un filet sétacé. La corolle est rougeâtre, tubulée, presque cylindrique ; son tube un peu élargi & renflé insensiblement vers son orifice qui est velu intérieurement. Le limbe est court, partagé en deux lèvres, la supérieure plus courte, bifide ; l'inférieure à trois lobes un peu réfléchis en dehors.

Cette plante croît en Amérique, dans les forêts épaisses, aux environs de la Havane. ♀

RUTACÉES (Les). *Rutaceæ*. Famille de plantes ainsi nommées, parce qu'elle renferme un grand nombre de genres qui ont des rapports naturels avec celui des rues, *ruta*, qui s'y trouve également compris.

Les plantes contenues dans cette famille l'ont la plupart herbacées, quelquefois ligneuses, très-rarement arborescentes. Les feuilles sont nues & alternes dans les unes, opposées & munies de stipules dans beaucoup d'autres ; elles ont des fleurs axillaires ou terminales.

Le calice est d'une seule pièce, souvent divisé en cinq parties. La corolle est presque toujours composée de cinq pétales alternes avec les divisions du calice, renfermant des étamines libres & en nombre défini, ordinairement au nombre de dix, alternes avec les pétales & opposées aux divisions du calice. L'ovaire est simple, supérieur, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate simple, quelquefois divisé.

Le fruit est capsulaire, à plusieurs loges ou à plusieurs capules, souvent au nombre de cinq, renfermant une seule ou plusieurs semences attachées aux angles intérieurs des capules. L'embryon est plane, entouré d'un périsperme charnu.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont les suivants :

1. Feuilles souvent opposées, munies de stipules à leur base.

Les herbes ou tribules. . . . . *Tribulus*.  
Les fagones. . . . . *Fagonia*.  
Les fagagelles. . . . . *Zygophyllum*.  
Les gayacs. . . . . *Guaiacum*.

2. Feuilles nues & alternes.

Les rues. . . . . *Ruta*.  
Les harmales. . . . . *Peganum*.  
Les dictamnés ou fraxinellés. . . . . *Didymum*.

Genres très-voisins des rutacées.

Les mélantées. . . . . *Melanthus*.  
Les diosmées. . . . . *Diosma*.  
Les emplévrées. . . . . *Empleurum*.  
Les arubes. . . . . *Araba*.

RUYSCHIE. *Rayschia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, dont la famille n'est pas encore bien connue, & qui paroît avoir des rapports avec les *rhmanns* ; il comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, épaisses, entières, les fleurs disposées, en épis terminaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles, muni en dessous d'une bractée charnue ; cinq pétales réfléchis ; cinq étamines ; un ovaire ; un stigmate sessile, applati, à plusieurs rayons.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, à cinq folioles concaves, arrondies, imbriquées, munies à leur base d'une bractée charnue, entière ou lobée.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, plus longs que le calice, réfléchis.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont aplatis, subulés, plus courts que les pétales ; terminées par des anthères oblongues, tombantes.

4°. Un ovaire supérieur, ovale ; point de style ; un stigmate applati, à quatre ou cinq rayons.

Le fruit, qui n'est pas encore bien connu, est présumé consister en une baie à quatre ou cinq loges.

#### ESPÈCES.

1. RUYSCHIE à feuilles de clusier. *Rayschia clusifolia*. Jacq.

*Rayschia foliis obovatis, obtusis ; floribus bracteatis clavatis, indivisis*. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 108. n°. 2736. tab. 135. fig. 1.

*Rayschia foliis obovatis, obtusis, aveniis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1116. n°. 1.

*Rayschia (clusifolia), foliis obovatis, integris, aveniis ; floribus bracteatis solitariis*. Swartz, Prodr. 50. — Idem, Flor. Ind. occid. pag. 502. — Jacq. Amer. 75. tab. 51. fig. 2.

Arbrisseau parasite, dont les tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques ; garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales, épaisses, luisantes, très-glabres, sans nervures, d'un vert-pâle ; longues de trois à quatre pouces, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, terminales, droites, longues d'un pied, dont le pédoncule commun est glabre, épais, un peu charnu ; les ramifications éparfes, alternes, très-courtes, & supportant des fleurs nombreuses, pédicelées. Leur calice est divisé en cinq folioles glabres, ovales, pendantes, persistantes, munies en dessous de deux autres folioles opposées, petites, ovales, entre lesquelles se trouve une bractée ovale, aiguë, épaisse, ponctée de rouge, plus grande que les folioles latérales. Les cinq pétales sont ovales, plus longs que le calice, épais, de couleur purpurine, caducs, réfléchis ; cinq, quelquefois six à sept étamines, dont les filaments sont élargis & de couleur pourpre à leur base. L'ovaire est à quatre faces, le style très-court, le stigmate plane, à quatre ou cinq rayons.

Cette plante croît à la Guiane & à la Martinique, dans les forêts, sur le tronc des arbres. (Descript. ex Swartz.)

2. RUYSCHIE de Guiane. *Rayschia fouroubea*.

*Rayschia foliis obovatis, obtusis, mucronatis ; floribus bracteatis praequantis trilobis*. Lam. Vultur. Gener. vol. 1. pag. 108. n°. 2737. tab. 135. fig. 2.

*Rayschia (fouroubea), foliis obovatis, obtusis, mucronatis, venosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1116. n°. 2.

*Rayschia (fouroubea), foliis obovatis, emarginatis, apice denticulatis, venosis ; floribus bracteatis tripartitis*. Swartz, Prodr. 50. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 504.

*Souroubea guianensis*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 244. tab. 97.

*Logania pentacrina*. Scop. Introd. Gener. 1076. — Gmel. Syst. veget. vol. 1. pag. 422.



Ses tiges sont farmenteuses, cylindriques, divisees en longs rameaux écartés, flexibles, fragiles, revêtus d'une écorce tendre, cendrée, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, acuminées à leur base, échancrées à leur sommet, avec une pointe particulière dans son milieu; glabres à leurs deux faces, épaisses, charnues, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, longues, rameuses, terminales; les pédicules alternes, écartés, unifoires. Les calices sont à cinq folioles, quelquefois fixés, concaves, arrondies, munies en dessous d'une bractée à trois découpures très-profondes, dont les deux latérales, plus longues que le calice, sont lancéolées, obtuses, concaves, divergentes, rougeâtres; la troisième cylindrique, presque en massue, tubulée, de couleur écarlate.

Les pétales sont jaunes, oblongs, caducs, réstichés, de couleur jaunâtre; les filaments élargis & jaunes à leur base; les anthères brunes; l'ovaire ovale, à cinq côtes; le style presque nul; le stigmate charnu, plane, à cinq rayons.

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane, sur les rives de la petite rivière nommée Gallion. (*Descript. ex Swartz & Aublet.*)

**RYANIE.** *Ryania*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, qui paroît appartenir à la famille des tilleuls, & avoir des rapports avec les *Lactia* : il comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, munies de stipules; à fleurs axillaires & solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles persistantes; point de corolle; quatre stigmates; une baie subéreuse, à une seule loge, à plusieurs semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur, offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, à cinq folioles étroites, lancéolées, colorées.

2°. Point de corolle.

3°. Des étamines nombreuses (soixante environ), dont les filaments sont courts, subulés, munis de quelques poils rares à leur base, disposés sur un double rang, terminés par des anthères droites, subulées, toruleuses, ondulées après l'émission de la poussière fécondante.

Entre les étamines & l'ovaire, il existe un tube court, urcéolé, velu, de la longueur de l'ovaire.

4°. Un ovaire ovale, très-velu, surmonté d'un

style glabre, de la longueur des étamines, terminé par quatre stigmates convexes.

Le fruit est une baie subéreuse, sphérique, un peu elliptique, à une seule loge, contenant un grand nombre de semences ovales ou un peu globuleuses, chargées d'une enveloppe particulière & de quelques poils rares, renfermées dans cinq renfoncements oblongs, fixés transversalement par une suite de petits tubercules. L'enveloppe propre des semences est membraneuse, à trois ailes, chaque aile double, & ne recouvrant les semences qu'à leur base & jusque vers leur milieu. Sous cette enveloppe un peu cortice, il en existe une autre extrêmement fine & membraneuse. Le péricarpe est charnu, grailleux, ovale, aigu à sa base; l'embryon est laiteux, de la longueur du péricarpe; les cotylédons comprimés, un peu arrondis.

#### ES P È C E.

**RYANIE élégante.** *Ryania speciosa*.

*Ryania foliis petiolatis, oblongis, integris, acuminatis; pedunculis axillaribus, unifloris.* (N.)

*Ryania speciosa*. Vahl. Egl. t. pag. 51. tab. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1164.

C'est un arbre remarquable par la beauté de ses fleurs, dont les rameaux sont cylindriques, un peu cendrés, légèrement tomenteux à leur partie supérieure; garnis de feuilles alternes, pétiolées, longues de sept à huit pouces, oblongues, presque elliptiques, aiguës, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, à nervures obliques; la côte du milieu est pulvérulente en dessous, les autres nervures élevées, leur intervalle rempli par un grand nombre de veinules simples, disposées en un réseau lâche. Les pétioles sont courts, canaliculés en dessus, munis à leur base de stipules subulées, blanchâtres, caduques, un peu plus longues que les pétioles.

Les fleurs sont solitaires, quelquefois au nombre de deux, l'une desquelles avorte très-souvent; situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules très-courts & simples. Le calice est divisé en cinq folioles étroites, lancéolées, ouvertes, longues d'un pouce & demi, nerveuses, colorées, chargées extérieurement d'une poussière fine, cendrée. Il n'y a point de corolle.

Les étamines sont très-nombreuses, un peu plus courtes que le calice, terminées par des anthères droites, trois fois plus courtes que les filaments; glabres, mucronées. Les fruits sont formés par une baie subéreuse, une fois plus grosse qu'une noix ordinaire, de couleur brune.

Cette plante se trouve à l'île de la Trinité. (V. f. in herb. Lam.)

**SABAL.** Adanson, Famille des Plantes, vol. 2. pag. 495. Veyret CORYMBE de Caroline, vol. 2. pag. 151, auquel il faut ajouter pour synonymie :

*Chamarops* (acaulis), *stipitibus inermibus scapiferae lateralibus*. Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 207.

*Subal carolinianum*. Hort. Paif.

*Sabal Adansonii*. Guetlan.

*Chamarops*. Hort. Vendeborn. Jacq.

**SABICE.** *Sabicea*. Genre de plantés dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des rubiacées, qui a des rapports avec les *patima*, &c qui comprend des arbrisseaux grimpans, exotiques à l'Europe, dont les fleurs sont axillaires, presque sessiles, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle infundibuliforme ; un stigmate à cinq découpures linéaires ; une baie à cinq loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice turbiné, d'une seule pièce, divisé à son limbe en cinq découpures oblongues, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, en forme d'entonnoir, dont le tube est long, grêle ; le limbe en soucoupe, divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont courts, insérés vers l'orifice du tube de la corolle, terminés par des anthères oblongues, à deux loges.

4°. Un ovaire inférieur, environné par la base tubulée du calice, surmonté d'un style long, filiforme, terminée par cinq stigmates étroits, oblongs.

Le fruit est une baie rougeâtre, orbiculaire, velue, couronnée par les découpures du calice, à cinq loges, contenant des semences nombreuses, fort petites, anguleuses.

#### E SP È C E S.

1. SABICE cendrée. *Sabicea cinerea*. Aubl.

*Sabicea caule volubili, foliis ovatis, acutis, subtus albicis ; tubo floris prolongo*. Aublet, Guian. vol. 1. pag. 192. tab. 75.

*Schweinfeldia cinerea*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 582.

*Sabicea* (cinerea), *foliis oblongis, acutis, tomentosis, subtus inaequalis ; floribus subsessilibus*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 352. & Prodr. 46.

Arbrisseau grimpant, qui pousse de sa racine plusieurs tiges longues, ramées, cylindriques, couvertes d'une poussière fine, blanchâtre ou cendrée : ses rameaux sont diffus, &c se repandent sur les arbres voisins. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, vertes en dessus, chargées de petites touffes de poils blancs, clairsemés ; blanchâtres & tomenteuses en dessous, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, partagées dans leur milieu par une nervure saillante, de laquelle naissent plusieurs autres ; latérales, confluentes à leur sommet, longues de quatre pouces sur un & demi de longueur ; supportées par des pétioles courts, munis à leur base de deux stipules courtes, ovales, aiguës.

Les fleurs sont axillaires, au nombre de quatre ou six dans chaque aisselle, médiocrement pédonculees, garnies à leur base de deux petites bractées étroites, oblongues, blanchâtres. Leur calice est globuleux, un peu turbiné, réfléchi à son orifice, où il se divise en cinq découpures étroites, allongées, aiguës, persistantes. La corolle est blanche, infundibuliforme, munie d'un tube grêle, très-long, velu extérieurement, inséré autour d'un disque qui couronne l'ovaire. Le limbe se divise en cinq lobes étroits, aiguës, velus en dessous : les filamens sont très courts, les anthères longues. L'ovaire se convertit en une baie rouge, velue, succulente, couronnée par les divisions du calice, divisée intérieurement en cinq loges remplies de semences fort petites, anguleuses.

Cette plante croît à la Guinée, parmi les haies qui bordent les Savannes ; elle fleurit & fructifie presque pendant tous les mois de l'année. *h* (Descript. ex Aubl.)

3. SABICE hérissée. *Sabicea hirta*. Swartz.

*Sabicea foliis ovato-lanceolatis, acutis, hirsutis ; floribus pedunculatis*. Swartz, Nov. Plant. Gener. & Spec. pag. 46. — Flor. Ind. occident. vol. 1. pag. 450.

*Schweinfeldia hirta*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 582.

Arbrisseau grimpant, rameux, dont les tiges & les rameaux sont hérissés, velus ; les feuilles opposées, pétiolées, ovales, acuminées, velues.

portées par des pétioles courtes, cylindriques, garnis à leur base de stipules grandes, larges, membraneuses, ovales, en cœur, d'un blanc-pâle.

De l'aisselle des stipules sortent des pédoncules plus courts que les pétioles, supportant une petite ombelle à trois fleurs, munie d'une involucre d'une seule pièce, à quatre divisions ovales, ouvertes, hispides. Chaque fleur est pédicellée. Leur calice est supérieur, partagé en quatre découpures lancéolées, longues, droites, striées, velues, persistantes. La corolle est en entonnoir, munie d'un tube deux fois plus long que le calice, velu à son orifice, & d'un limbe plane, à cinq divisions lancéolées. Les anthères ont leurs filaments subulés, de la longueur du tube; les anthères aussi longues que les filaments; l'ovaire ovale, surmonté d'un style simple, aussi long que la corolle, terminé par un stigmate à cinq divisions. Le fruit est une baie arrondie, couronnée par le calice, de couleur blanche à l'époque de sa maturité, contenant plusieurs petites semences dans des loges en demi-cercle.

Cette plante croît dans les forêts montagneuses de la Jamaïque. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

2. *SABICE rude. Sabicea aspera.* Aublet.

*Sabicea caule volubili, foliis ovatis, acutis, asperis, subtus villosis.* Aubl. Guian. vol. 1. pag. 194. tab. 76. — Lam. Illustr. Gen. tab. 165.

*Schwenkfeldia (aspera), foliis ellipticis, acuminatis, asperis, subtus incanis; floribus fissilibus.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 982. n° 3.

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges velues, par ses feuilles plus étroites, acuminées.

Ses racines sont traçantes, & produisent plusieurs tiges ligneuses, sarmenteuses, & se divisent en rameaux alongés, grimpans, velus, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, lancéolées, vertes, ponctuées à leur face supérieure, rudes, velues en dessous, acuminées à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, longues de quatre pouces sur un & demi de large, marquées de nervures latérales, simples, obliques, rougeâtres, munies à leur base de deux stipules petites, linéaires, aiguës.

Les fleurs naissent par petits paquets dans l'aisselle des feuilles, au nombre de cinq à sept, soutenues par des pédoncules très-courts, munies à leur base de petites bractées, assez semblables aux stipules. Le calice est velu, à cinq divisions étroites, entre chacune desquelles est une tache rougeâtre. La corolle est blanche, velue; son tube grêle, chargé de poils blancs à son orifice; son limbe varie par le nombre de ses divisions, de qua-

tre à cinq; il en est de même pour les étamines & les stigmates, qui manquent quelquefois d'une partie. Le style se divise en trois, quatre ou cinq stigmates charnus, alongés. L'ovaire se convertit en une baie molle, rouge, velue, couronnée par les découpures du calice, partagée intérieurement en trois, quatre ou cinq loges, remplies de semences fort menues.

Cette plante croît dans la Guiane, sur les bords de la rivière de Sinémari, au dessus du troisième saut; elle fleurit & fructifie dans le commencement de l'hiver. Les Galibis la nomment *jabissabi*. *h* (*Descript. ex Aubl.*)

**SABIER.** *Hura.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monoïques, de la famille des euphorbes, qui a quelques rapports avec les *amphalea*, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, laiteux, garnis de feuilles alternes & de fleurs en chaton; les fleurs femelles solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

*Des fleurs monoïques; les fleurs mâles imbriquées sur un chaton; un calice court, urcéolé, tronqué; point de corolle; les filaments réunis en cylindre; les anthères verticillées. Les fleurs femelles solitaires; un calice urcéolé; point de corolle; un stigmate pelté, à douze ou dix-huit rayons; une capsule orbiculaire à autant de côtes.*

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques.

Les fleurs mâles sont imbriquées, & disposées, dans la bifurcation des rameaux, en un chaton oblong, pendant, garni de fleurs sessiles & d'écaillés oblongues, sous chacune desquelles est une fleur qui offre:

1°. Un calice très-court, cylindrique, tronqué, en forme de pot.

2°. Point de corolle.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont réunis en un seul corps cylindrique, un peu plus long que le calice, roide, bifide & pelté à son sommet, garni dans son milieu de deux ou trois rangs de tubercules verticillés, sous chacun desquels sont placées deux anthères ovales & bifides.

Les fleurs femelles sont solitaires, & sur la même plante que les fleurs mâles. Chacune d'elles offre:

1°. Un calice d'une seule pièce, cylindrique, urcéolé, sillonné, très-entier, tronqué, fortement appliqué contre l'ovaire, quelquefois divisé en trois parties à l'époque de la maturité.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire supérieur, un peu arrondi, situé

dans le fond du calice, surmonté d'un style long, cylindrique, presque infundibuliforme, terminé par un grand stigmate pétri, concave, coloré, divisé à son contour en douze ou dix-huit rayons obtus.

Le fruit est une capsule ligneuse, orbiculaire ou globuleuse, comprimée, marquée extérieurement de douze ou dix-huit côtes saillantes, parragées en autant de loges courbées en quart de cercle, terminées à leur sommet par une pointe élastique, contenant chacune une seule semence grande, comprimée, presque orbiculaire.

## E S P A C E.

SABLIER élastique. *Hura crepitans*. Linn.

*Hura foliis ovato-cordatis, crenatis; petiolis fupernis glanulosis*. (N.)

*Hura*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 198. — Hort. Clusiot. 486. tab. 34. — Roy. Lugd. Bar. 131. — Miller, Dict. — Lam. Ill. Gen. tab. 795.

*Hura americana, abutili indici folio*. Commel. Hort. 2. pag. 131. tab. 66. — Ephr. Pist. 12. — Trév. Ehret. 34. 35. fig. 1.

*Hippomane arbutum, ramulis ternatis; foliis cordatis, crenatis*. Brown. Jam. 351.

*Burau ex floribus nucibus arboris hura*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 333. Ic. — Sloan, Jam. 114.

*Arbor crepitans*. Hermand, Mex. 88.

Vulgairement le buis de sable, noyer d'Amérique, lablier ou pet du diable.

C'est un fort grand arbre, qui s'élève à plus de quatre-vingts pieds de haut, sur un tronc droit, divisé en plusieurs branches & rameaux étalés, d'où découle un suc blanc & laiteux, & dont l'écorce est marquée d'un grand nombre de cicatrices occasionnées par l'attache & la chute des feuilles. Celles-ci sont grandes, alternes, périolées, ovales, oblongues, échancrées en cœur à leur base, aiguës, acuminées à leur sommet, crénelées à leurs bords, d'un beau vert, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures simples, latérales, parallèles, transverses, dont l'intervalle est rempli par un réseau fin, à larges mailles; elles ont près d'un pied de longueur, sur huit à neuf pouces de largeur; supportées par des périoles grêles, presque aussi longues que les feuilles, glanduleux à leur partie supérieure, munis à leur base de stipules lancéolées, très-caduques; les jeunes feuilles sont roulées en dedans sur elles-mêmes.

Les fleurs sont moniques; les mâles séparées des femelles, sur le même pic. Les fleurs mâles sont disposées par imbrication sur un chiron-simple, pendant sur un long pédoncule, terminal ou sortant d'entre les aisselles des rameaux, de forme

ovale, oblongue, conique; chaque fleur située dans l'aisselle d'une écaïlle, munie d'un calice court, entier, tronqué à son sommet; d'étamines dont les anthères sont insérées sous un double ou triple rang de tubercules qui environnent, en forme d'anneau, une colonne plus longue que le calice: il n'y a point de corolle.

Les fleurs femelles sont solitaires dans le voisinage des fleurs mâles, pédoncules, droites, dont le calice est un tube tronqué, un peu urcéolé, appliqué contre l'ovaire. Le style est épais, chatnu, cylindrique, un peu évasé en entonnoir vers son sommet, terminé par un stigmate concave, élargi en forme de bouclier, divisé en douze ou dix-huit rayons obus, recourbés: il lui succède une capsule ligneuse, orbiculaire, comprimée à sa face supérieure, ombiliquée à son sommet, composée de douze ou dix-huit côtes, qui forment autant de loges, dans chacune desquelles est renfermée une semence grande, comprimée; ces capsules, lorsqu'elles sont mûres, s'ouvrent avec élasticité & avec bruit, & lancent au loin leurs semences.

Cet arbre croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, au Mexique, à la Jamaïque, dans l'île de Cayenne, &c. h (V. f.)

Les habitants de l'Amérique se servent des capsules de cette plante, après en avoir enlevé les semences, pour y mettre du sable, qu'ils répandent ensuite sur l'écriture; ce qui leur a fait donner le nom de sablier. Linné dit que si le suc qui découle de cet arbre entre dans les yeux, il occasionne une cécité qui dure huit jours. Son bois est propre à faire des solives & des poutres. On prétend que ses fruits sont purgatifs.

SABLINF: *Arenaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs régulières, polypétales, de la famille des caryophyllées, qui a de très-grands rapports avec les *stellaria* & les *astae*, & qui comprend des herbes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont petites, entières, opposées; les fleurs axillaires ou terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice persistant; à cinq folioles; une corolle à cinq pétales entières; dix étamines; trois styles; une capsule à une seule loge, polysperme; un réceptacle central, libre.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice persistant, à cinq folioles oblongues, acuminées, ouvertes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ovales, entiers.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont subulés, surmontés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté de trois styles droits & réfléchis, terminés par des stigmates un peu épais.

Le fruit est une capsule ovale, recouverte par le calice ; à une seule loge qui s'ouvre à son sommet en cinq parties, contenant des semences nombreuses, réniformes, attachées à un réceptacle libre & central.

Observations. On peut regarder ce genre & celui des *alsine* comme une simple division du même genre, réunis par leurs rapports naturels, très-éloignés l'un de l'autre dans la méthode sexuelle, à raison du nombre différent des étamines, qui ordinairement se bornent à cinq dans les *alsine*, & dont les capsules se divisent en trois valves ; cependant les caractères qui séparent ces deux genres sont si peu constants, qu'on trouve des *arenaria* à cinq étamines, des *alsine* à dix ; des *arenaria* dont les capsules ont trois valves, des *alsine* qui en ont cinq.

On conçoit les difficultés qu'entraîne nécessairement cette variété dans les principaux caractères ; cependant il est nécessaire de chercher à diviser le plus possible des genres aussi nombreux en espèces, & en général les *arenaria* ont un *ficus* qui leur est particulier. A l'exception de quelques espèces, toutes ont de très-petites feuilles linéaires, étroites, sétacées ou un peu lancéolées, opposées, connées à leur base, nues, ou dans quelques-unes munies de stipules membraneuses, glabres ou plus souvent pubescentes. Les corolles ont cinq pétales entiers, en quoi elles diffèrent de celles des *stellaria*, qui ont leurs pétales profondément bifides, & de plus leur capsule partagée en six valves. Dans les *spergula*, autre genre très-voisin des *arenaria*, les ovaires sont surmontés de cinq styles, ainsi que dans les *cerastium*.

L'établissement des espèces n'offre pas moins de difficultés ; elles peuvent d'abord s'établir sur la forme des feuilles, qui sont ovales ou lancéolées dans les unes ; linéaires, subulées, sétacées dans d'autres ; c'est le plus grand nombre, & dans ce cas la disposition des fleurs, la grandeur de la corolle relativement à celle du calice, la forme des folioles calicinales, peuvent fournir des distinctions utiles.

Les difficultés augmentent lorsqu'il s'agit de présenter la synonymie : souvent les détails manquent, & telle plante qui paroît convenir très-bien à telle autre, soit par les figures qu'on nous en a données, soit par les caractères énoncés dans une courte description, peut aussi s'en écarter par la différence des autres parties, dont on ne nous parle pas.

J'ai remarqué que plusieurs espèces acquéroient un développement progressif, qui peut donner lieu à bien des erreurs lorsque l'on est dans l'impossi-

bilité de l'observer. Souvent, dans le premier âge, les tiges sont presque simples, les pédoncules à peine rameux ; mais si ces mêmes plantes sont dans un terrain favorable, & plus avancées en âge, elles se développent avec une vigueur étonnante : les rameaux sont très-nombreux, les fleurs offrent une ample panicule par les ramifications de leurs pédoncules, &c. Leur port n'est plus le même, & dans ce cas j'ai trouvé qu'il falloit s'en tenir aux proportions & aux formes des parties de la fructification, surtout aux proportions du calice avec la corolle & les capsules.

## E S P È C E S.

1. *S. ALINE* à feuilles charnues. *Arenaria peploides*. Linn.

*Arenaria foliis ovatis, acutis, carnosiss.* Linn. Syst. veget. pag. 423. n°. 1. — Flor. suec. 375. 396. — Flor. lap. 149. It. Oel. 151. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 160. tab. 64. — Fabr. Helmst. pag. 134. — Reyg. G. d. 1. pag. 119. — Hoffm. Germ. pag. 153. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 188. — Il. 480. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 717. n°. 1.

*Hohenya peploides*. Ehrh. Beitr. 2. pag. 181.

*Alfne litoralis, foliis portulacae*. Tourn. Inf. R. Herb. 242. — C. Bauh. Pin. 251. — Loef. Pruff. 12. tab. 2.

*Alfnes quoddam genus pelagicum & litorale*. Cluf. Hist. 184.

*Telephium maritimum, portulacae folio*. Buxb. Aq. Petrop. 3. pag. 271.

Cette plante a des tiges très-basses, rameuses presque dès leur base ; les rameaux sont foibles, couchés, très-lisses, cylindriques, garnis de feuilles opposées, sessiles, ovales, épaisses, charnues, courtes, longues de deux à trois lignes, obtuses, quelquefois un peu mucronées, distantes sur les rameaux fertiles, très-rapprochées sur les rameaux stériles, connées à leur base, entières à leurs bords.

Les fleurs sont, les unes, axillaires & latérales ; les autres, terminales, portées sur des pédoncules simples, filiformes, plus courts que les feuilles. Le calice est divisé en cinq folioles un peu charnues, vertes, glabres, ovales, presque obtuses, légèrement membraneuses à leurs bords. La corolle, un peu plus longue que le calice, est composée de cinq pétales blancs, ovales, obtus, entiers, ongiculés ; les étamines sont au moins aussi longues que les pétales ; les capsules ovales, le réceptacle glanduleux.

Cette plante croît naturellement sur les bords de la mer, dans les contrées septentrionales de l'Europe. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (V. v.)

2. *SABLINE*

1. *SABLINE* à fleurs en tête. *Arenaria tetraquetra*, Linn.

*Arenaria foliis ovatis, carinatis, recurvis, quadriflorum imbricatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 605. — Mantiss. 186. — All. Flor. pedem. n° 1718. tab. 89. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 717. n° 2.

*Caryophyllus saxatilis, ericifolius, ramosus, repens*. C. Bauh. Pin. 211. — Prodr. 125. — Burf. XI. 135.

2. *Gypophylla* (aggregata), foliis mucronatis, recurvatis; floribus aggregatis. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 181. — Amoen. Acad. vol. 3. pag. 25. — Schreb. in Nov. Act. Acad. N. C. IV. pag. 140. — Miller, Dict. n° 1. — Gérard, Flor. gallo-prov. pag. 405. n° 6. *sub arenaria*. — Gouan, Hort. Monsp. pag. 211. n° 1.

*Saponaria calicibus pentaphyllis; floribus aggregatis; foliis mucronatis, canaliculatis, recurvis*. Linn. Hort. Upf. 107.

*Caryophyllus saxatilis, ericifolius; umbellatis corymbis*. Magu. Monsp. 53. tab. 5. — Rai, Hist. 1033. — C. Bauh. Pin. 211. — Prodr. 105.

*Rubiola montana*. Barrel. Icon. rar. n° 649. tab. 595. — Boccon. Mus. 2. pag. 60. tab. 47.

*Arenaria capitata*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 39. n° 677. XI.

La disposition des feuilles rend cette espèce facile à distinguer au premier aspect : elles sont imbriquées, très-rapprochées, & présentent presque quatre faces. Les fleurs sont disposées en un fascicule capité.

Ses racines sont droites, grêles, dures, peu rameuses : il s'en élève une tige qui se divise, presque dès son origine, en rameaux très-simples, droits, blanchâtres, longs de trois à quatre pouces, nombreux, garnis de quelques petits poils courts, très-rarement, & de feuilles opposées, petites, imbriquées, ovales, étroites, en carène en dehors, canaliculées en dedans, approchant de celles de la bruyère, fermes, recourbées en dehors, très-glabres, striées, très-rapprochées, cartilagineuses à leurs bords, ciliées & connées à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un petit corymbe pédoncule, fascié, formant une petite tête composée de quatre à cinq fleurs fécondes. Le calice est divisé en cinq folioles lancéolées, roides, aiguës, scarieuses ; les extérieures un peu plus grandes que les autres. La corolle est composée de cinq pétales blancs, ovales, oblongs, obtus, sans ongle, marqués d'une ligne dans leur milieu. La capsule est un peu allongée, surmontée de trois styles ; elle s'ouvre à son

Botanique. Tome I.

sommet en cinq valves, & renferme de petites semences.

La variété 3 a voit été d'abord rangée parmi les *gypophylla* ; mais depuis Linné lui-même a reconnu qu'elle devoit appartenir aux *arenaria* par les pétales entiers, ses trois styles, & qu'elle différoit à peine de l'*arenaria tetraquetra*.

Ces plantes croissent dans les Pyrénées & les Alpes. La variété 3 se rencontre aussi dans les environs de Montpellier. 2 (V. f.)

3. *SABLINE* à deux fleurs. *Arenaria biflora*. Linn.

*Arenaria foliis obovatis, obtusis; caulibus procumbentibus; pedunculis bifloris, lateralis*. Linn. Syst. Plant. pag. 423. — Mantiss. 71. — Gouan, Illustr. 30. — Allioni, Flor. pedem. n° 1699. tab. 44. fig. 1. & tab. 64. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 717. n° 3.

*Asine caule erecto, prostrato; foliis ovatis*. Hall. Helv. n° 877.

*Arenaria foliis subcoriaceis, obovatis, basi ciliatis; caulibus prostratis, ramosissimis, diffusis; pedunculis lateralibus, subbifloris; petalis calice longioribus*. Wulfen, in Jacq. Collect. 1. pag. 250. — Jacq. Icon. rar. 1. tab. 83. — Reiner & Hohenwarth, Iter 1. pag. 158.

On distingue cette espèce à ses petites feuilles presque rondes, assez semblables à celles du serpolet, & à ses pédoncules dichotomes, à deux fleurs.

Ses racines sont un peu traçantes, dures, garnies de fibres capillaires, touffues, fasciculées ; elles produisent des tiges nombreuses, grêles, allongées, diffuses, cylindriques, glabres, géniculées, étendues sur la terre, à peine rameuses ; garnies de feuilles opposées, sessiles, ovales ou un peu arrondies, très-obtus, un peu rétrécies à leur base, glabres à leurs deux faces, vertes, quelquefois munies inférieurement & à leurs bords de poils très-rarement.

Les fleurs naissent le long des rameaux : elles sont latérales, axillaires, supportées par des pédoncules filiformes, beaucoup plus longs que les feuilles ; dichotomes à leur sommet, garnis à leur dichotomie de deux petites bractées opposées, linéaires, aiguës ; terminés par deux fleurs de longueur inégale : quelquefois les pédoncules sont simples. Les folioles calicinales sont ovales, aiguës, un peu mucronées, glabres, vertes, médiocrement membranées à leurs bords ; la corolle blanche, à peine plus longue que le calice ; les capsules presque globuleuses, obtuses.

Cette plante croit dans la Suisse, sur les Alpes, dans les contrées méridionales de l'Europe. 2 (V. v.)

Z z

4. **SABLINE à fleurs latérales.** *Arenaria lateriflora*. Linn.

*Arenaria foliis ovatis, obtusis; pedunculo laterali bifido.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 613. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 119. n°. 68. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 718. n°. 4.

Cette plante paroît tenir le milieu entre l'*arenaria trinervia* & l'*arenaria bifida*. Elle ressemble au premier par la forme & la grandeur de ses feuilles, mais elles sont obtuses & sans nervures; elle se rapproche du second par ses pedoncules bifides, mais ils sont bien plus longs, & ses calices plus petits que la corolle.

Ses tiges sont courtes, grêles, filiformes, très-simples, longues de trois à quatre pouces; garnies de feuilles opposées, ovales, rétrécies en pétiole à leur base, obtuses à leur sommet, vertes, lisses, fort tendres, à trois nervures longitudinales, mais à peine sensibles. Les fleurs sont axillaires, latérales, soutenues par des pedoncules presque capillaires, écartés des tiges, longs au moins de deux pouces, bifides à leur sommet, munis, à la base de cette bifurcation, de deux petites bractées opposées, ovales, aiguës, terminées par de 2x fleurs dont le calice est composé de cinq folioles ovales, obtuses, vertes, blanches & scarieuses à leurs bords. La corolle est blanche, une fois plus longue que le calice; les pétales oblongs, arrondis & entiers à leur sommet, médiocrement onguiculés à leur base.

Cette plante croît dans la Sibérie: elle y a été recueillie par M. Patrin, qui en a communiqué un exemplaire à M. Lamarck. (*V. f. in herb. Lam.*)

5. **SABLINE à trois nervures.** *Arenaria trinervia*.

*Arenaria foliis ovatis, trinerviis, subsiliatis, petiolatis; corollis calice brevioribus.* (N.)

*Arenaria foliis ovatis, acutis, petiolatis, nervosis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 603. — Cæd. Flor. dan. tab. 429. — Hort. Cliff. 173. — Flor. succ. 374. 397. — Roy. Lugd. Bat. 471. — Gort. Ing. 71. — Pollich. Pal. n°. 423. — Hoffm. Germ. 134. — Roth, Germ. 1. pag. 188. — Il. 480. — Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 36. n°. 676. II. — Gouan, Monsp. pag. 218. — Sauvag. 153. — Gerard, Flor. gall. prov. 424.

*Alpine foliis ovato-lanceolatis, trinerviis.* Haller, Helv. n°. 878.

*Alpine plantaginifolia.* Tournef. Inst. R. Herb. 242. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 364. Icon. — Garid. Aix. 24. — Magnol. Botan. Monsp. pag. 13.

Cette plante a des rapports avec l'*arenaria ciata* & l'*arenaria multicaulis*; mais elle diffère de toutes deux par ses pétales plus courts que le calice, & par ses feuilles médiocrement pétioles.

Ses racines sont composées de fibres nombreuses & capillaires: ses tiges sont herbacées, folibles, grêles, plus ou moins allongées, souvent très-rameuses, légèrement velues, garnies de feuilles opposées, rétrécies à leur base en un pétiole court; ovales, aiguës, d'un vert tendre, marquées de trois nervures longitudinales, glabres à leurs deux faces, légèrement ciliées à leur contour, distantes, assez grandes, relativement à celles des autres espèces.

Les fleurs sont axillaires, latérales & terminales, supportées par des pedoncules simples, solitaires, filiformes, beaucoup plus longs que les feuilles, très-écartés des tiges, terminés par une seule, un peu recourbés, surtout à l'époque de la maturité des fruits. Le calice a des folioles ovales, lancéolées, très-aiguës, légèrement pubescentes, ainsi que les pedoncules. La corolle est blanche, plus courte que le calice. Les capsules sont ovales, presque globuleuses; elles s'ouvrent en cinq valves à leur sommet, & sont remplies de petites semences noires, un peu réniformes, glabres, presque luisantes.

Cette plante est assez commune dans les forêts de l'Europe, aux lieux humides & ombragés. ○ (*V. v.*)

6. **SABLINE à feuilles de buis.** *Arenaria buxifolia*.

*Arenaria pubescens, foliis ovato-oblongis, sessilibus; pedunculis dichotomis, subsiliatis; corollâ vix calicem superante; calicibus repentibus.* (N.)

*Alpine canadensis, repens & perennis, buxifolia.* Linn. Herb.

Il existe beaucoup de rapports entre cette plante & l'*arenaria trinervia*: elle en diffère par la disposition des nervures, & par les corolles au moins aussi longues que les calices.

Ses tiges sont grêles, rameuses, rampantes, longues de cinq à six pouces & plus, pubescentes, garnies de feuilles opposées, sessiles, ovales, oblongues, obtuses, pubescentes, ciliées à leurs bords, marquées de quelques nervures latérales, obliques, longues de six à sept lignes, larges de trois ou quatre, vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont axillaires, terminales ou latérales, supportées par des pedoncules capillaires, de la longueur des feuilles, pubescentes, dichotomes à leur sommet, terminés par deux, quelques fois trois fleurs assez petites, pédicelées, munies, à la base des pédicèles de deux petites bractées courtes, opposées, ovales. Le calice est divisé en cinq folioles linéaires, courtes, obtuses, presque glabres, un peu membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, un peu plus grande que le calice; les capsules glabres, ovales, obtuses, de

la longueur de la corolle, s'ouvrant en cinq valves à leur sommet, & renfermant de très-petites semences.

Cette plante croît au Canada : elle a été communiquée à Linnard par Vailland ; elle existe dans son herbier, & dans celui de M. Justieu, sous le nom cité plus haut. ♀ (*V. f. in herb. Juss.*)

7. SABLINE ciliée. *Arenaria ciliata*. Linn.

*Arenaria foliis ovatis, nervosis, ciliatis, subsessilibus, acutis; corollâ calicibus longiore.* (N.)

*Arenaria foliis ovatis, nervosis, ciliatis, acutis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 608. — Wedd. Flor. dan. tab. 346. — Jacq. Micell. vol. 2. pag. 367. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 37. n°. 677. IV.

*Arenaria foliis oblongo-obovatis, subpetiolatis, ciliatis; corollis calice majoribus; perianthii foliolis lanceolatis, subnervosis.* Wulf. in Jacq. Coll. vol. 1. pag. 245. tab. 16. fig. 2. — Reimer & Hohenwarth, Iter 4. pag. 162.

*Alpine serpyllifolia, multicaulis & multiflora.* Seg. Veron. vol. 1. pag. 421. tab. 5. fig. 2.

*Alpine foliis lanceolatis, petalis integris, calice majoribus.* Sauv. 153.

β. *Arenaria norvegica.* Gunn. Norveg. n°. 1100. tab. 9. fig. 7.

A peine cette espèce peut-elle être distinguée de l'*Arenaria multicaulis* : ses feuilles sont un peu pétiolées, marquées de nervures, tandis que dans l'*Arenaria multicaulis* elles n'ont aucune nervure apparente ; qu'elles sont parfaitement sessiles, & les tiges bien plus rameuses. Elle diffère de l'*Arenaria trinervia* par ses corolles plus grandes que les calices.

Ses tiges sont grêles, courtes, médiocrement rameuses, presque glabres, garnies de feuilles opposées, petites, ovales, un peu oblongues, vertes à leurs deux faces, presque charnues, sessiles, rétrécies à leur base, très-aiguës à leur sommet, glabres, un peu ciliées, particulièrement à leur base ; marquées de quelques nervures peu sensibles.

Les fleurs sont axillaires, latérales, soutenues par des pédoncules grêles, plus longs que les feuilles ; simples, solitaires, unilatérales. Le calice se divise en cinq folioles lancéolées, un peu nerveuses. La corolle est blanche, plus longue que le calice.

Cette espèce croît aux Alpes & dans les contrées méridionales de la France, aux lieux pierreux & montagneux. ♀ (*V. f.*)

8. SABLINE à tiges nombreuses. *Arenaria multicaulis*. Linn.

*Arenaria foliis ovatis, enerviis, sessilibus, acutis; corollis calice majoribus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 605.

*Arenaria foliis pulso-pulso-subcoriaceis, ovato-lanceolatis, sessilibus, ciliatis; corollis calice majoribus, perianthii foliolis ovato-lanceolatis, subnerviis.* Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 248. tab. 17. fig. 1.

*Arenaria foliis ovatis, nervosis, sessilibus, imbricatis, acutis.* Linn. Amœn. Acad. vol. 1. pag. 162. n°. 155.

*Alpine alpina perennis; radice lignosa, siccis albis, facie sempervivi minimi.* Linn. Amœn. vol. 1. l. c.

*Alpine foliis ovato-lanceolatis, ciliatis; petalis calice majoribus.* Haller, Helv. n°. 876. tab. 17.

*Alpine alpina, serpyllifolia, multicaulis & multiflora.* Tournef. Inst. R. Herb. 243.

*Arenaria ciliata, var. β.* Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 37. n°. 677. IV.

Plusieurs auteurs ont regardé cette plante comme une simple variété de l'*Arenaria ciliata*. Elle en a en effet presque tous les caractères : son port est un peu différent ; ses tiges sont très-rameuses, plus longues ; ses feuilles plus fortement ciliées & sans nervures.

Il sort d'une touffe de racines fibreuses, des tiges couchées en grande partie, divisées en un grand nombre de rameaux presque glabres, garnis de feuilles opposées, parfaitement sessiles, plus ou moins rapprochées, petites, presque charnues, ovales-lancéolées, glabres & vertes à leurs deux faces, plus ou moins ciliées à leurs bords, aiguës à leur sommet, médiocrement rétrécies à leur base, sans nervures apparentes.

Les fleurs sont solitaires, latérales ou terminales, soutenues par des pédoncules filiformes beaucoup plus longs que les feuilles. Les calices sont composés de cinq folioles ovales, lancéolées, verdâtres, lisses, sans nervures. La corolle est blanche, beaucoup plus grande que le calice.

On rencontre cette espèce dans les Alpes, les Pyrénées, & sur les hautes montagnes de l'Allemagne, ainsi que dans les contrées méridionales de la France. ♀ (*V. f.*)

9. SABLINE à feuilles de céraiste. *Arenaria cerastifolia*. Poir.

*Arenaria pubescens, caule erecto; foliis spatulato-ovatis; floribus subpaniculatis, axillaribus; petalis calice duplo longioribus.* (N.)

*Arenaria caule erecto, pubescente; foliis spatulatis, floribus subsolitariis, petalis calice duplo longioribus.* Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 166.



*Arenaria* (spatulata), caule erecto, filiformi, pubescente; foliis inferioribus spatulatis; petalis obovatis, calice longioribus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 358.

Cette plante se distingue par sa ressemblance avec les *cerastium*; par ses feuilles ovales, lancéolées, pubescentes, ainsi que toutes ses autres parties; par ses grandes corolles, une fois plus longues que le calice.

Ses racines sont droites, menues, presque simples, munies de quelques fibres capillaires: elles ne produisent ordinairement qu'une seule tige droite, velue, haute de trois à quatre pouces, un peu striée, glutineuse, tendre, grêle, médiocrement rameuse, quelquefois simple. Les rameaux sont alternes, ouverts; les feuilles opposées, sessiles, pubescentes, vertes à leurs deux faces, ovales, lancéolées, obtuses; les inférieures spatulées ou rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures presque elliptiques ou lancéolées, longues de quatre à cinq lignes, larges de deux & plus.

Les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures; elles forment, par leur ensemble, une sorte de panicule terminale, supportée par des pédoncules filiformes, inégaux, vixueux, pubescens; les uns très-simples & plus longs; d'autres munis de deux ou trois fleurs pédonculées, garnis à leur base de deux bractées opposées, linéaires, un peu aiguës, velues. Les calices se divisent en cinq folioles peu ouvertes, ovales, oblongues, obtuses, velues, un peu glanduleuses, striées, blanches & membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, ouverte, une fois plus longue que le calice; les pétales ovales, arrondis & quelquefois légèrement échancrés à leurs bords. Les étamines, au nombre de dix, sont plus courtes que la corolle; les antières blanches; l'ovaire surmonté de trois styles; la capsule ovale-obtuse.

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, dans les bois de Terrailiane, où elle croît à l'ombre & dans le sable. M. Desfontaines l'a également rencontrée dans les environs d'Alger. ○ (V. v.)

#### 10. SABLINA de Majorque. *Arenaria balearica*.

*Arenaria foliis ovatis, lucidis, subcarneis; caule repente, pedunculis unifloris.* Linn. Syst. Nat. 2. Append. 250. — Syst. veget. pag. 423. — L'héritier, Stirp. 1. pag. 29. tab. 15.

*Arenaria muscosa.* Medic. in Act. Palat. vol. 3. Physf. pag. 202. tab. 12.

C'est une fort petite plante qui croît en gazon touffu, étalé, & dont les tiges sont étendues sur la terre, non brisées, rampantes, filiformes, presque capillaires, radicaux, rameuses, légèrement pubescentes, longues d'un à deux pouces, garnies de très-petites feuilles pétiolées, opposées, nom-

breuses, ovales, obtuses, un peu arrondies, presque charnues, glabres, sans nervures, luisantes, munies à leur face supérieure de quelques poils rares, sensibles à la loupe.

Les fleurs sont solitaires, situées la plupart dans l'aisselle des ramifications, ou terminales, soutenues par des pétioles capillaires, un peu pubescens, au moins aussi longs que les tiges; garnis vers leur milieu de deux petites bractées sessiles, opposées, semblables aux feuilles. Le calice est à cinq divisions concaves, obtuses, vertes ou un peu brunes, pubescentes. La corolle, une fois plus longue que le calice, est blanche, ouverte, à cinq pétales ovales, oblongs, obtus; les étamines de couleur blanche, ainsi que les pistils, de moitié plus courtes que la corolle; l'ovaire globuleux & verdâtre.

Cette espèce croît naturellement dans les îles Majorque & Minorque. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ✕ (V. v.)

#### 11. SABLINA à feuilles de serpolet. *Arenaria serpyllifolia*. Linn.

*Arenaria foliis subovatis, acutis, sessilibus; corollis calice brevioribus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 606. — Flor. suec. 373. 398. — Hort. Cliff. 173. — Roy. Lugd. Bat. 451. — Pollich, Pal. n.º. 424. — Leers, Herborn. n.º. 325. — Gunn. Norveg. n.º. 564. — Hoffm. Germ. 1. 14. — Roth, Germ. 1. pag. 189. — Il. 481. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 710. n.º. 9. — Curtis, Lond. Icon. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 37. n.º. 677. VI. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 356.

*Arenaria* (serpyllifolia), foliis ovalibus, acutis, subsiliatis; floribus sparsis; petalis calice subtristato acutoque brevioribus. Michaux, Flor. boreal.-amer. vol. 1. pag. 274.

*Alpine foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis; petalis calice brevioribus.* Hall. Helv. n.º. 875.

*Stellaria serpyllifolia.* Scop. Carn. edit. 2. n.º. 544.

*Ajnanthemum.* Mich. Hort. 109.

*Alpine minor, multicaulis.* Tourn. Inst. R. Herb. 241. — C. Bauh. Pin. 250. — Morif. Hist. 2. §. 5. tab. 23. fig. 5.

*Alpine minima.* Dod. Pempt. 30. Icon. — Lobel, Icon. 461. — Fusch, Hist. 23. Icon.

*Alpine minor.* Tabern. Ic. 708. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 564. exclus. Icon. — Gérard, Hist. 71. 2. Icon.

*Alpine aquatica, minima.* Parkins, Theatr. 1259. Icon.

En ne considérant que le port de cette plante, selon ses différents âges, on pourroit la méconnoître, & soupçonner deux espèces lorsqu'en effet il n'en existe qu'une seule sous une forme un peu

différente, distincte par toutes ses parties légèrement pubescentes; par ses feuilles petites, ovales, aiguës; par sa corolle plus courte que le calice, & par ses capsules coniques.

Cette plante produit d'abord des tiges courtes qui se divisent en rameaux droits, presque simples, sur lesquels les feuilles sont très-rapprochées; terminées par des fleurs presque fasciculées vers l'extrémité de ces rameaux; mais ensuite ils se ramifient & s'étendent considérablement. Ces nouvelles ramifications sont ordinairement dichotomes dans leur origine; elles deviennent, en se développant, très-nombreuses, diffusées, étalées, en partie presque unilatérales dans certains individus, & forment des touffes amples, un peu couchées. Ces derniers rameaux sont grêles, filiformes, pubescents, ayant leurs articulations bien plus écartées. Les feuilles sont opposées, sessiles, petites, ovales, aiguës, un peu épaisses, légèrement ciliées à leurs bords, verdâtres, appliquées contre les tiges, & presque imbriquées sur les premiers rameaux; ouvertes, très-écartées sur les derniers.

Les fleurs sont axillaires, latérales & terminales, supportées sur des pédoncules capillaires, inégaux, ouverts, simples, unislois, quelquefois munis à leur base d'une seconde fleur sessile. Les calices sont divisés en cinq folioles ovales, oblongues, très-aiguës, un peu frisées, pubescentes ou un peu hispides. La corolle est blanche, presque de moitié plus courte que le calice; les pétales souvent un peu réfléchis. Les capsules sont coniques, quelquefois médiocrement inclinées sur leurs pédoncules, qui deviennent horizontaux; elles renferment des semences extrêmement petites, d'un brun-noirâtre, très-nombreuses.

Cette espèce est très-répandue; elle croît dans les diverses contrées de l'Europe, dans la Barbarie, dans l'Amérique. ☉ (V. v.)

## 12. SABLINE à feuilles de fragon. *Arenaria ruscifolia*.

*Arenaria foliis minimis, coriaceis, ovatis, acuminatis; floribus subpaniculatis, dichotomis; calicibus subcampanulatis, acutis; petalis calice fere duplo longioribus.* (N.)

Cette plante ressemble assez, par ses feuilles, à l'*Arenaria serpillyfolia*; mais elles sont plus dures, coriaces; les calices campanulés; la corolle une fois plus grande.

Les tiges se divisent en rameaux presque simples, tendres, menus, pubescents, jaunâtres, garnis de feuilles opposées, coriaces, assez semblables à celles du *ruscus*, tant par leur substance ferme, coriace, que par leur forme, mais infiniment plus petites, ovales, connées, glabres, un peu téréciées à leur base, très-aiguës & presque piquantes à leur sommet, bordées à leur contour,

très-rapprochées à l'extrémité des rameaux stériles.

Les fleurs sont un peu paniculées ou dichotomes, portées sur de longs pédoncules filiformes, pubescents, presque simples, munis à leur base & souvent vers leur milieu de deux bractées plus petites que les feuilles, à peu près de la même forme. Les calices ont une forme campanulée, & se divisent en cinq folioles ovales, coriaces, aiguës, légèrement pubescentes. La corolle est blanche, une fois plus grande que le calice.

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de Madrid, a été envoyée à M. Lamarck. J'ignore son lieu natal. (V. f. in herb. Lam.)

## 13. SABLINE géniculée. *Arenaria geniculata*. Poir.

*Arenaria foliis linearibus; floribus paniculatis, pubescentibus; petalis calice brevioribus.* Poir., Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 166.

*Arenaria* (procumbens), *foliis linearibus lanceolatis; caulibus prostratis, villosis; petalis calice brevioribus.* Vahl, Symbol. 2. pag. 50. tab. 33.

*Arenaria* (herniariifolia), *pubescens; caule filiformi, elongato, procumbente; foliis linearibus, floribus paniculatis, petalis calicem vix superantibus.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 359. & vol. 2. Suppl. pag. 450.

*Alsine maritima, longius radicata, herniaria foliis.* Boccon, Sic. pag. 18. tab. 10. — Tourn. Inst. R. Herb. 243.

*Cherleria sedoides*? Forsk. Catal. Plant. ægypt. pag. 66. n°. 141.

Cette plante a quelques rapports avec l'*Arenaria montana*; elle en diffère par ses fleurs plus petites, par ses corolles à peine aussi longues que les calices, par tous ses rameaux couchés.

Ses tiges sont dures, fortes, presque ligneuses, très-courtes, un peu tortueuses, glabres; elles se divisent presque dès leur base en un grand nombre de rameaux alongés, rameux, cylindriques, étendus sur la terre, pubescents surtout vers leur partie supérieure, très-flexibles, noueux, articulés, souvent géniculés à leurs articulations inférieures, longs de quinze à dix-huit pouces & plus, garnis de feuilles opposées, sessiles, linéaires, très-entières, aiguës à leur sommet, presque glabres ou légèrement pubescentes; les inférieures plus alongées & un peu rétrécies à leur base.

Les fleurs sont petites; elles naissent à l'extrémité des rameaux, où elles forment une petite panicule lâche; supportées par des pédoncules inégaux, droits, filiformes, légèrement hispides, un peu viqueux. Le calice est composé de cinq folioles ovales, oblongues, aiguës, lisses, membra-

neufes & blanchâtres à leurs bords. La corolle est blanche, un peu plus courte que le calice; les pétales entiers, elliptiques; ils renferment dix éramines à peine aussi longues que la corolle, trois styles capillaires, écartés. Il leur succède une capsule glabre, ovale, obtuse, de la longueur du calice, qui s'ouvre en cinq valves à son sommet, & qui renferme des semences fort petites, d'un brun-noirâtre.

J'ai recueilli cette espèce en Barbarie, dans les environs de la Calle, où elle croit dans le sable, sur les bords de la mer. M. Desfontaines l'a également observée dans les environs de Madagascar. ♀ (V. v.)

14. *SABLINE* des montagnes. *Arenaria montana*. Linn.

*Arenaria foliis linearibus lanceolatis, scabris; caulibus sterilibus longissimis, procumbentibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 362. n°. 11. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 272. — Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 41. n°. 677. XVIII.

*Alpine foliis linearibus, acuminatis; petalis florum integris, calice duplo longioribus*. Monn. Observ. 127.

*Arenaria (montana), foliis linearibus lanceolatis; ramis floriferis cretillis; sterilibus longissimis, procumbentibus*. Vent. Jard. de Cels, pag. 34. tab. 34.

*Myosotis lusitanica, linaria folio, magno flore*. Tourin. Infl. R. Herb. ex herb. Vaillant. (V. v.)

Il existe quelques rapports entre notre *arenaria geniculata* & cette espèce; cependant cette dernière en est très-distincte par ses fleurs plus grandes, & par ses corolles plus longues que les calices.

Ses racines sont blanchâtres, grêles, simples, articulées, garnies de quelques fibres courtes à leurs articulations; elles produisent un grand nombre de tiges ou rameaux allongés, étendus sur la terre, les uns fertiles, beaucoup plus longs & couchés; les autres stériles, plus courts, relevés. Ils sont foibles, articulés, presque glabres, verts ou un peu rougeâtres, garnis de feuilles opposées, sessiles, planes, linéaires, lancéolées, presque obtuses, vertes à leurs deux faces, couvertes (particulièrement en dessous) de très-petits poils couchés, à peine sensibles; ce qui les rend rudes au toucher, au moins aussi longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont grandes, axillaires, solitaires, situées vers l'extrémité des rameaux, quelquefois terminales, au nombre de deux ou trois au même point d'insertion; supportées par des pédoncules filiformes, simples, pubescents, droits avant la floraison, recourbés vers l'époque de la maturité des fruits, munis vers leur milieu de deux petites bractées opposées, lancéolées, velues. Leur calice est divisé en cinq folioles ovales, lancéolées, très-

aiguës, à peine pubescentes, d'un vert-tendre, un peu membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, ouverte; les pétales deux fois plus longs que le calice, très-entiers, ouverts, ovales, arrondis, obtus. La capsule est glabre, ovale, un peu renflée, au moins aussi longue que le calice, s'ouvrant par son sommet & jusque vers son milieu en cinq valves; elle renferme des semences chagrinées, presque arrondies, d'un brun-foncé, un peu échancrées en rein.

Cette plante croît dans le sable & sur les montagnes, dans les contrées méridionales de l'Europe. On la trouve en France. M. Desportes m'en a communiqué un exemplaire recueilli dans les environs du Mans. ♀ (V. f.)

15. *SABLINE* à feuilles de linéaire. *Arenaria linearifolia*.

*Arenaria caulibus diffusis, foliis linearibus acutis, subpubescentibus; floribus subsolitariis; foliolis calicinis ovatis, subvillosis; corollâ calicibus multo majore*. (N.)

Cette espèce se distingue par ses feuilles linéaires, aiguës; par la grandeur de ses corolles, beaucoup plus longues que les calices. Elle a de grands rapports avec l'*arenaria montana*, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, nombreux, presque couchés, pubescents, particulièrement vers leur sommet; garnis de feuilles opposées, presque lancéolées, étroites, linéaires, aiguës, sessiles, longues d'un demi-pouce & plus, celles de la base des rameaux plus longues, vertes à leurs deux faces, glabres en dessus, légèrement pubescentes en dessous.

Les fleurs sont latérales, axillaires, quelquefois terminales, portées sur des pédoncules allongés, souvent solitaires, simples, ou bien à deux ou trois fleurs pédiculées; les pédoncules filiformes, velus; les calices à cinq folioles assez larges, ovales, aiguës, pubescentes, sans nervures sensibles, à peine scarieuses à leurs bords. La corolle est blanche, au moins une fois plus grande que le calice, ample, à cinq grands pétales ovales, très-larges, arrondis à leur sommet, onguiculés à leur base.

Cette plante croît naturellement en Espagne. (V. f. in herb. Lamarck.)

16. *SABLINE* à fleurs rougeâtres. *Arenaria rubra*. Linn.

*Arenaria foliis filiformibus; stipulis membranaceis, vaginantibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 606. — Flor. suec. 376. 399. — Neck. Gallob. pag. 198. — Pallas, Iter. vol. 1. pag. 170. — Pollich. Pal. n°. 425. — Mench. Haff. n°. 359. — Gouan. Monsp. pag. 218. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 44. n°. 677. XXVI. — Poir. Voyag. en Esp.

vol. 2. pag. 166. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 357. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 721. n. 14. — Petiv. Herb. tab. 59. fig. 8.

*Alfne foliis linearibus & stipulis ovato-lanceolatis, argenteis.* Haller, Helv. n. 872.

*Alfne spargula facie minor, sive spargula minor, foliis subaristatis.* Tournef. Inst. R. Herb. 244. — C. Bauh. Pin. 211. & Prodr. 119. — Lindern. Alsat. 149. tab. 4. fig. 2.

a. *Arenaria rubra* (campestris).

*Arenaria* (rubra), caulis prostratis; foliis oppositis, filiformibus, internodiis duplo brevioribus; calicibus caulis aequalibus. Roth, Germ. vol. 1. pag. 189. — Il. 481. — Hoffm. Germ. 154.

*Polygonum foliis graminis, spargula capitulis.* Lef. Fluct. 203. tab. 63.

*Spargula purpurea.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 722. Icon.

*Arenaria foliis linearibus, taginantibus, internodio longioribus.* Sauvag. 133.

β. *Arenaria rubra* (marina). C. Bauh. Flor. dan. tab. 742.

*Arenaria* (marina), caulis prostratis; foliis oppositis, linearibus, carnosis, longitudine internodiorum; calicibus caulis dimidio brevioribus. Roth, Germ. vol. 1. pag. 189. — Il. 482. — Hoffm. Germ. 154.

*Arenaria foliis linearibus, longitudine internodiorum.* Hort. Cliffort. 173. — Gronov. Virg. 161. Royle, Lugd. Bat. 451.

*Spargula marina nostris.* Rai, Hist. 1024. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 723. Icon. *Alisioer.*

*Alfne spargula facie media.* Tournef. Inst. R. Herb. 243. — C. Bauh. Pin. 251.

*Arenaria foliis linearibus, longitudine internodiorum.* Sauvag. 141.

*Spargula marina.* Dalech. Hist. 2. pag. 1385. Icon.

*Alfne spargula marina.* Motif. Oxon. Hist. 2. 5. tab. 23.

Un des caractères particuliers à cette espèce est d'avoir, à la base des feuilles, des stipules blanches & membraneuses, caractère qui lui est commun, à la vérité, avec *Arenaria media*, avec laquelle elle a beaucoup d'autres rapports; mais cette dernière en diffère par ses fleurs beaucoup plus grandes & par ses semences entourées d'une aile membraneuse.

Ses riges se divisent presque dès la racine en très-longes rameaux cylindriques, diffus, très-étalés, étendus sur la terre, souples, cylindriques,

très-ramifiés, noueux, articulés, légèrement pubescents à leur partie supérieure; garnis de feuilles seules, oppoées, épaisses, un peu charnues, très-étroites, linéaires, subulées, convexes en dessous, glabres à leurs deux faces, longues au moins d'un pouce dans la variété α, environ de la longueur des entre-nœuds; munies à leur base de deux stipules oppoées, ovales, aiguës, blanches, transparentes & très-minces. De l'aisselle de la plupart de ces feuilles il en sort d'autres plus petites, inséculées.

Les fleurs sont petites, axillaires; quelques-unes latérales: les autres forment, à l'extrémité des rameaux, de petites panicules, dont les pédoncules sont capillaires, courts, inégaux, presque rameux, velus, un peu visqueux; unifoires, munis à leur base de petites bractées oppoées, semblables aux stipules. Le calice est partagé en cinq folioles étroites, oblongues, aiguës, membraneuses à leurs bords, velues extérieurement. La corolle, à peine plus longue que le calice, est d'un rose-tendre ou purpurine, quelquefois bleuâtre, très-rarement blanche, composée de cinq pétales ovales, obtus, très-entiers. Il n'y a souvent que cinq étamines à anthères doubles, & de trois à cinq pistils, selon Haller & Fabricius. Les capsules sont ovales, aiguës, de la longueur du calice; elles s'ouvrent à leur sommet en cinq valves, & contiennent des semences fort petites, planes, rousâtres, point environnées d'une aile membraneuse.

La variété β diffère de la précédente par ses nœuds beaucoup plus rapprochés, par ses feuilles plus courtes, plus nombreuses & moins étroites, légèrement pubescentes en dessous & à leurs bords. Quelques botanistes assurent que le nombre des étamines varie de quatre à dix. Les capsules sont plus courtes que les calices.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, dans les terrains élevés & sablonneux: on la rencontre aux environs de Paris. La variété β croît plus particulièrement sur les côtes maritimes. J'ai recueilli l'une & l'autre sur la côte de Barbarie. ○ (V. v.)

17. *SABLINE* à semences ailées. *Arenaria media*. Linn.

*Arenaria foliis linearibus, carnosis & stipulis membranaceis, seminibus marginibus membranaceo cinctis, caule pubescente.* (N.)

*Arenaria foliis linearibus, carnosis & stipulis membranaceis, caulis pubescentibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 606. — Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 102. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 722. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 358.

*Alfne spargula, facie minima, seminibus marginatis.* Tournef. Inst. R. Herb. 244.

*Alpine spargula*, facie minima. Magn. Botan. Monsp. pag. 14.

*Spargula annua*, femine foliaceo, nigro, circulo membranaceo, albo, cintho. Ephemer. Natur. Cur. Centur. 5. pag. 275. tab. 4.

Quoique cette plante ait presque entièrement le port de la précédente, elle en est cependant une espèce très-distincte, caractérisée par des feuilles plus charnues, des rameaux pubescents presque redressés, des fleurs plus grosses, & surroulé par le cercle membraneux qui entoure les semences.

Ses tiges se divisent presque dès leurs racines en rameaux articulés, grêles, pubescents, d'une longueur médiocre, peu ramifiés & couchés à leur partie inférieure, redressés à leur partie supérieure; garnis de feuilles opposées, épaisses, charnues, étroites, linéaires, presque obuses, convexes à leur face inférieure, presque planes en dessus, légèrement pubescentes; munis dans leurs aisselles d'autres feuilles fasciculées, & à leur base de deux stipules très-fines, membraneuses, opposées, ovales, acuminées, les entre-nœuds rapprochés, aussi longs ou plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont grandes, terminales, disposées en une panicule petite, presque unilatérale, supportées par des pédoncules filiformes, pubescents, inégaux, munis à leur base de petites folioles courtes, subulées, & de bractées membraneuses, semblables aux stipules. Le calice est divisé en cinq grandes folioles larges, ovales, obuses, un peu velues, blanches & membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, à cinq pétales obtus; les capsules ovales, de la longueur du calice, contenant des semences beaucoup plus grandes que celles de l'*Arenaria rubra*; arrondies, lenticulaires, environnées d'une membrane blanche & circulaire.

Cette plante croît en France, en Angleterre, dans la Barbarie, sur les rochers, le long des côtes maritimes. Je l'ai recueillie au mont Saint-Michel, peu loin d'Avranches. ○ (V. v.)

18. SABLINE à trois fleurs. *Arenaria triflora*. Linn.

*Arenaria foliis lanceolato-subulatis, ciliatis; ramis subtrifloris; petalis linearis, obtusis*. Linn. Syst. Plant. pag. 423. n°. 10. — Mant. 240. — Cavan. Icon. Rar. vol. 3. pag. 26. tab. 249. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 721. n°. 12.

*Alpine saxatilis, juniperifolia*. Vaillant, Paris. tab. 4. fig. 1.

Les tiges se divisent, un peu au dessus de la racine, en un grand nombre de rameaux dressés, ascendants, longs de trois à quatre pouces, cylindriques,

un peu pubescents, presque simples ou à ramifications alternes; garnis de feuilles fasciculées, particulièrement à leur partie inférieure; assez semblables à celles du genévrier, ouvertes, presque planes, lancéolées, étroites, roides, subulées, très-aiguës, légèrement ciliées à leurs bords & un peu pubescentes en dessous; celles qui avoisinent les fleurs sont un peu plus larges, presque velues en dessous, mucronées.

Les fleurs sont terminales, portées sur des pédoncules roides, droits, hispides, filiformes, tantôt au nombre de trois seulement, inégaux, uniflores; tantôt les rameaux se terminent par une bifurcation, dont chaque branche supporte trois pédoncules, ou une fleur solitaire, droite, pédonculée dans le milieu de la bifurcation, plus courte que les autres: il arrive aussi que, par suite de développement, les fleurs sont plus nombreuses, les pédoncules plusieurs fois divisés; il en résulte une sorte de panicule: chaque division est munie à sa base de deux petites bractées opposées, ovales, oblongues, très-aiguës, pubescentes. Les fleurs sont grosses: leur calice est divisé en cinq folioles ovales, presque concaves, aiguës, pubescentes en dehors. La corolle est blanche, composée de cinq pétales presque une fois plus longs que le calice, très-ouverts, ovales, oblongs; les éamines sont blanches; le pistil verdâtre, plus court que les éamines; la capsule ovale, glabre, renflée, un peu globuleuse, de la longueur du calice.

Cette plante croît dans les lieux montagneux des contrées méridionales de l'Europe, dans les Pyrénées. M. Foucault m'en a communiqué des exemplaires qu'il avoit recueillis à Fontainebleau, au mail d'Henri IV. ☿ (V. f.)

Observations. La plupart des botanistes de Paris regardent cette plante, qu'on trouve à Fontainebleau, comme l'*Arenaria laricifolia* de Linné. Je ne suis point de cet avis, & il me semble qu'elle convient parfaitement à l'*Arenaria triflora* du même auteur; & quoiqu'elle ait en effet quelques rapports avec l'*Arenaria laricifolia*, elle n'en a ni les calices presque tubuleux, ni le même nombre de fleurs.

19. SABLINE d'Autriche. *Arenaria austriaca*. Linn.

*Arenaria caulis suffruticosa, prostratis, inde herbaceis & erectis; foliis subulatis, floribus geminis, petalis emarginatis*. Linn. Syst. veget. edit. 14. pag. 425. — Jacq. Flor. austr. vol. 3. tab. 270. — Allioni, Flor. pedem. n°. 1708. — tab. 64. fig. 2.

*Arenaria (austriaca), foliis linearibus; ramis erectis; pedunculis terminalibus, longissimis, binis; petalis obtusis, emarginatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 728. n°. 33.

*Arenaria*

*Arenaria triflora*. Villars, Plant. du Dauph. vol. 3. pag. 623. tab. 47.

Ses racines font grêles, cylindriques, un peu roussâtres, fibreuses : il s'en élève quelques tiges diffuses, dures & érendues par terre à leur base, très-rameuses, à peine légèrement pubescentes, longues de six à sept pouces, garnies de feuilles opposées, simples, légèrement striées, étroites, subulées, allongées, à peine velues, presque planes ; les inférieures très-rapprochées & plus longues.

Les fleurs sont terminales, disposées en une petite panicle, au nombre de deux ou trois sur chaque pédoncule commun, qui est très long, bifurqué à son sommet ; chaque pédoncule partiel grêle, filiforme, uniflore, muni à la base & souvent dans son milieu de deux petites bractées courtes, ovales : les pédoncules latéraux n'ont ordinairement que deux fleurs : le terminal en offre une troisième située dans la bifurcation, & aussi longue que les autres. Le calice se divise en cinq folioles oblongues, aiguës, cannelées extérieurement. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales ovales, obtus, très-souvent tronqués ou légèrement échancrés à leur extrémité.

Je doute un peu que la plante d'Allioni soit exactement la même que celle de M. Villars : elle parait avoir de bien grands rapports avec l'*Arenaria larsifolia*. Quant au *Jussaria biflora* de Jacquin, je ne puis être de l'opinion de Willdenow, qui la regard comme une simple variété de cette espèce, quoiqu'elle en soit en effet un peu rapprochée ; mais son port, la forme de ses pétales, leur échancre constante & régulière, la largeur de ses feuilles, la doivent faire distinguer comme une espèce de *Jussaria*.

Cette plante croît sur les montagnes alpines, aux environs de Grenoble, dans l'Allemagne & la Suisse. ♀ (V. f.)

10. SABLINE de Bavière. *Arenaria bavarica*. Linn.

*Arenaria foliis semicylindricis, carnosis, obtusis ; petalis lanceolatis ; pedunculis terminalibus, subnatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 363. n°. 14. — Amoen. Académ. vol. 4. pag. 315. — Pallas, Iter 2. pag. 321.

*Alpine alpina, foliis teretibus, obtusis ; flore albo*. Séguier, Veron. vol. 1. pag. 439.

*Saxifraga bavarica*. Rai, Hist. 1033. — Pen. 159.

*Saxifraga bavarica Jungermanni & Parkinsonii*. Rai, Catal. Stirp. Ext. 338.

Cette plante a ses tiges ramifées & ses feuilles opposées, sessiles, charnues, à demi-cylindriques, Botanique. Tome VI.

glabres, obtuses, plus longues que les entrenœuds, disposées sur des rameaux presque dichotomes, durs, étalés, géniculés.

Les fleurs sont terminales, souvent au nombre de deux ; les pédoncules sont simples, uniflores, munis à leur base & quelquefois vers leur milieu de deux petites bractées opposées. Les pétales sont très-minces, lancéolés, blancs ; ils renferment dix étamines & trois styles.

On trouve cette plante dans la Bavière. ♀

21. SABLINE à feuilles d'œillet. *Arenaria dianthoides*. Smith.

*Arenaria foliis linearibus, margine scabris ; bracteis ventricosis, pedunculis superantibus*. Smith, Icon. ined. vol. 1. pag. 163. tab. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 725. n°. 19.

*Alpine orientalis, caryophylli folio ; flore magno, in capitulum congesto*. Tourn. Coroll. 17.

Cette plante a de très-grands rapports avec l'*Arenaria cucubaloïdes*, quant à son port & à la forme des feuilles ; mais elle en est très-différente par la disposition des fleurs, qui sont réunies, à l'extrémité des tiges, en un épi court, presque en tête, & dont les bractées ventrues sont plus longues que les pédoncules.

Les racines sont presque ligneuses, garnies de filaments grêles : il s'en élève plusieurs tiges droites, hautes d'un pied, presque simples, cylindriques, glabres, articulées ; les articulations distantes, garnies de feuilles opposées, sessiles, connées à leur base, très-glabres, épaisses, linéaires, subulées, très-troites, denticulées & rudes à leurs bords, canaliculées à leur face extérieure, aussi longues & même plus longues que les entrenœuds : les dernières sont plus courtes, plus élargies à leur partie inférieure, très-aiguës, ayant presque la forme des bractées.

Les fleurs sont toutes terminales, formant un épi court, serré, ovale ; chacune d'elles soutenue par un pédoncule simple, filiforme, très-court, muni de bractées ventrues, membraneuses, plus longues que les pédoncules, acuminées ; les supérieures plus courtes. Ces fleurs font moniques par avortement. Leur calice est composé de cinq folioles glabres, ovales, obtuses, membraneuses. La corolle est blanche, presque trois fois plus longue que le calice ; les pétales ovales, onguiculés. Ils renferment, dans les fleurs mâles, dix étamines, dont cinq aussi longues que les pétales ; les autres plus courtes. Les anthères sont sagittées ; l'ovaire ovale, stérile, surmonté de trois styles très-courts.

Les fleurs femelles contiennent dix étamines très-courtes ; des anthères membraneuses, vides ; un ovaire ovale, surmonté de trois styles aussi longs

que la corolle, & autant de stigmates réfléchis, pubescens à leur partie supérieure.

Cette plante croît naturellement dans l'Arménie, où elle a été découverte par Tournefort. ♀ (*Descript. ex Smith.*)

22. *SABLINE* à feuilles de béhen. *Arenaria cuculoides*. Smith.

*Arenaria-folius linearibus, margine scabris; paniculâ dichotomâ, pubescente; petalis obovatis*. Smith. Icon. ined. vol. 1. pag. 17. tab. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 723. n° 18.

*Alfina orientalis, caryophylli folio, viscosa; flore magno, albo*. Tournefort. Coroll. 17.

*Alfina viscosa, longissimis & angustissimis foliis.* ? Amm. Ruth. 66.

Cette espèce diffère de l'*arenaria gypsophiloides* par ses filurs trois fois plus grandes; par ses pétales ovales & non lanceolés, & par ses tiges plus élevées.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, munies de quelques fibres capillaires; elles produisent des tiges droites, nombreuses, verdâtres, glabres, cylindriques, presque simples, hautes presque d'un pied & demi, garnies de feuilles opposées, connées à leur base, épaisses, un peu charnues, graminiformes, vertes, glabres, étroites, concaves à leur partie inférieure, tubuleuses, aiguës, longues de trois à quatre pouces, rudes à leurs bords, fasciculées à la base des tiges; les supérieures plus courtes.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule simple, étalée, dichotome; à ramifications opposées, ainsi que les subdivisions. Les pédoncules propres sont courts, presque capillaires, visqueux, pubescens, munis à toutes les divisions de bractées lanceolées, concaves, très-acuminées, membranées à leurs bords, bien plus courtes que les pédoncules. Le calice est composé de cinq folioles ovales, aiguës, pubescentes, visqueuses, carénées, striées, scarieuses à leurs bords. La corolle est grande, blanche, approchant de celle du lin commun; les pétales ovales, obtus, marqués de quelques veines presque transparentes. Les étamines sont au nombre de dix, dont cinq aussi longues que la corolle; cinq autres plus courtes. L'ovaire est un peu arrondi, surmonté de trois styles aussi longs que les pétales. Il lui succède une capsule ovale, ventreuse, à une seule loge, de la longueur du calice qui la recouvre.

Cette plante a été découverte par Tournefort dans les plaines de l'Arménie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (*P. v.*)

23. *SABLINE* calicino. *Arenaria calicina*. Poir.

*Arenaria glaberrima, foliis graminibus, brevibus; pedunculis longissimis, subanisiformis; petalis lanceolatis, hyalinis, cauce multo brevioribus.* (N.)

*Arenaria caule erecto, levi; foliis lineari-lanceolatis, pedunculis unifloris, calicibus corollâ longioribus.* Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 167. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. Append. pag. 450.

Cette plante est une des plus distinctes de ce genre: elle a le port du *stellaria graminea*, & se fait remarquer par ses feuilles presque semblables à celles des graminées, mais plus courtes; par ses calices très-longs, & par ses corolles minces & transparentes, bien plus courtes que les calices. Elle ressemble encore tellement au *sagina erecta*, surtout par la disposition de ses filurs & ses calices droits, qu'on pourroit la confondre aisément au premier aspect.

Ses racines sont capillaires, presque simples; ses tiges varient selon l'âge de la plante. D'abord elles sont simples, hautes de deux ou trois pouces, terminées par une ou deux fleurs; elles deviennent, avec l'âge, plus nombreuses, rameuses à leur base; se terminent par un bien plus grand nombre de fleurs, & s'élèvent à la hauteur de six ou sept pouces. Elles sont droites, menues, très-glabres, articulées, garnies de feuilles opposées, sessiles, très-lisses & glabres, d'un vert tendre à leurs deux faces, planes, linéaires, lancéolées, aiguës, fortement connées à leur base, longues d'un pouce & plus, droites ou un peu courbées.

Les fleurs sont terminales, tantôt solitaires, portées sur un très-long pédoncule droit, s'étacé; tantôt il sort du même point d'insertion trois ou quatre pédoncules très-inegaux, les uns ayant deux & trois pouces, les autres de deux à six lignes, tous uniflores & terminaux, munis à leur base de deux bractées opposées, semblables aux feuilles, mais bien plus courtes. Le calice est glabre, vert, lisse, composé de cinq folioles lancéolées, très-aiguës, droites, blanches, scarieuses & membranées à leurs bords. La corolle est au moins une fois plus courte que le calice, blanche, composée de cinq pétales étroits, n'oblongs, lanceolés, très-minces, transparents, presque confondus avec les parois internes du calice, contre lesquels ils sont appliqués. Les étamines sont inégales; les plus longues presque de la longueur de la corolle. Les capsules sont ovales, presque crinées, de la longueur du calice, un peu plus courtes, divisées profondément en cinq valves minces, scarieuses, contenant de très-petites semences attachées à un réceptacle libre & central.

J'ai trouvé cette plante en Barbarie, dans le pays des Nalis & aux environs de la Calle, dans les lieux un peu humides. ○ (*P. v.*)

24. *SABLINE* glabre. *Arenaria glabra*. Mich.

*Arenaria glaberrima, erectifolia, filiformi-multicaulis; foliis subulato-linearibus, planis, patulis; pedicellis unifloris, elongatis, divaricatis; calicis laciniis ovalibus, obtusifolius, levibus, corollâ brevioribus.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 1. p. 274.

Michaux observe que cette espèce a beaucoup d'affinité avec le *Jellaria uniflora* de Waltherius. C'est une plante très-glabre, qui produit des tiges nombreuses, redressées, filiformes, glabres, garnies de feuilles planes, étalées, linéaires, subulées, ouvertes.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules rameux, dont les divisions ou les pédoncules propres sont écartés, allongés, terminés par une seule fleur. Les calices sont divisés en cinq folioles ovales, un peu obtuses, lisses. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice.

On trouve cette plante sur les rochers, dans les contées septentrionales de la Caroline.

25. SABELLE des roches. *Arenaria saxatilis*. Linn.

*Arenaria foliis subulatis; caulibus paniculatis; calicis foliolis ovatis, obtusis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 607. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 724. n°. 20. — Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 40. n°. 677. XVII.

*Arenaria foliis subulatis; calicinis laciniis membranâ ipsâ latiore, acutis, obtusis.* Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 181.

*Alfue foliis linearibus, petalis calice longioribus.* Haller, Helv. n°. 869.

*Spergula foliis aciformibus, densis; ramis ramosis, subnudis.* Sauv. Monsp. 45.

*Alfue saxatilis & multiflora, capillaceo folio.* Vaillant, Paris. pag. 7. tab. 2. fig. 3. — Tourn. Inst. R. Herb. 243. — Haller, Opusc. 113.

*Alfue caryophylloide, tenuifolia; flore albo, punctato.* Pluken. Almag. 22. tab. 7. fig. 3.

*Anthyllis lychnidis annua.* ? Barrel. Icon. rar. 580.

8. *Arenaria (exipitosa), foliis subulatis; caulibus paniculatis; calicis foliolis striatis, acuminatis, marginem membranaceis; pedunculis pubescentibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 724. n°. 21.

*Arenaria capisosa.* Ehrh. Herb. 55. — Hoffm. Germ. 155.

*Arenaria saxatilis.* Roth, Germ. I. pag. 180. — II. 484.

*Alfue saxatilis & multiflora, capillaceo folio.* Hall. Gœtt. in Horcyn. n°. 15.

*Alfue foliis conjugatis, angustis, linearibus; petalis integris.* Linn. Gœtt. 195.

Cette espèce, & la plupart des suivantes, sont assez difficiles à bien caractériser, ayant un aspect presque semblable, & les nuances qui les distin-

guent se perdant dans le passage d'une espèce à l'autre par des variétés intermédiaires; ce qui a probablement occasionné l'établissement de plusieurs espèces particulières, sur lesquelles il se présente beaucoup d'incertitudes lorsqu'il s'agit de les bien déterminer. La synonymie n'est pas moins embarrassante.

Quant à celle dont il s'agit ici, je ne fais si nous la connoissons bien parfaitement, & si la plante à laquelle on la rapporte est bien celle de Linné. Elle devroit avoir les folioles calicinales obtuses, d'après Linné; la nôtre les a toujours aiguës & presque acuminées. Willdenow, qui paroît n'avoir pas vu non plus l'espèce de Linné à folioles calicinales obtuses, a adopté une nouvelle espèce établie par Ehrhart sous le nom d'*arenaria capisosa*, qui ne diffère de l'*arenaria saxatilis* que par ses calices aigus, & peut-être ses tiges plus courtes. Je les ai réunies en attendant qu'elles soient mieux connues. La figure donnée par Vaillant convient parfaitement bien à la plante que je vais décrire.

Les racines sont dures, allongées, fibreuses: elles produisent un grand nombre de tiges menues, hautes de quatre à six pouces, glabres, cylindriques, rameuses, garnies de feuilles glabres, très-étroites, connées & un peu élargies à leur base, aiguës, subulées à leur sommet, marquées de deux fortes nervures à leur partie inférieure, quelquefois à peine ciliées vers leur base: elles sont très-nombreuses, disposées en gazon dense à la partie inférieure des tiges, & plus longues que les autres, qui diminuent de grandeur à mesure qu'elles approchent des fleurs. Elles sont beaucoup plus courtes que les entre-nœuds, droites, rarement recourbées.

Les fleurs forment une panicule plus ou moins diffuse, dichotome, dont les ramifications, plus ou moins divisées, sont toutes opposées, très-glabres, filiformes; les pédoncules propres, capillaires, inégaux, uniflores, munis à leur base de deux très-petites stipules opposées, membraneuses. Le calice est composé de cinq folioles ovales, oblongues, glabres, étroites, aiguës, membraneuses à leurs bords. J'ai cependant observé que dans certains individus ces folioles paroissent obtuses par le prolongement de la membrane qui les environne: elles sont marquées, dans leur milieu, de trois nervures blanchâtres peu sailantes, surtout les deux latérales. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales oblongs, obtus.

Je conclus de ces détails, ou que nous ne connoissons peut-être pas la plante de Linné, ou que l'*arenaria capisosa* de Willdenow, qui me paroît être une variété plus petite de la plante que l'on trouve à Fontainebleau & dans les Alpes, est aussi la même que l'*arenaria saxatilis* de Linné, à folioles calicinales plus aiguës.



Cette plante croît très-communément sur les rochers, dans les Alpes, l'Allemagne, la France : on la trouve aussi à Fontainebleau.  $\pi$  (V. v.)

26. SABLINA scarieuse. *Arenaria squarrosa*, Mich.

*Arenaria foliis imis squaroso-imbricatis, canaliculatis, glabris; cauliculis simplicissimis, oligophyllis; floribus terminalibus, paucis, erectis; petalis calice sub-orando multo majoribus*. Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 374.

Cette espèce, qui a des rapports avec l'*Arenaria saxatilis*, d'après Michaux, en est distincte par ses calices un peu arrondis, & par ses feuilles inférieures.

Elle se divise dès la base en plusieurs tiges, dont les rameaux sont courts, très-simples, presque nus. Les feuilles inférieures sont nombreuses, imbriquées, étroites, subulées, glabres, canaliculées à leur face supérieure, scarieuses à leurs bords ; celles des rameaux plus courtes, opposées, en petit nombre. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en une petite panicule très-peu garnie. Les pédoncules sont droits, filiformes ; les calices presque globuleux ; la corolle blanche, beaucoup plus grande que les folioles calicinales.

On trouve cette plante dans les terrains sablonneux, au milieu des bois de pin de la Caroline, sur les bords du fleuve Santée. Elle y a été découverte par Michaux.

27. SABLINA printanière. *Arenaria verna*.

*Arenaria foliis subulatis, caulibus paniculatis; calicibus ovum-inatis, striatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 364. n°. 17. — Mantiss. pag. 72. — Jacq. Flor. austr. 5. pag. 2. tab. 404. — Lamarck. Flor. franç. vol. 3. pag. 42. n°. 677. XXIII. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 724. n°. 22.

*Alfne globosa, tenuissimis foliis, floribus albis*. ? Hern. Parad. pag. 12. tab. 12. An potius ad *arenariam recurvam* referenda ?

*Alfne pusilla, pulchro flore, folio tenuissimo, nostras, seu saxifraga caryophylloides, pusillo; flore albo, pusillo*. Tourn. Inst. R. Herb. 243. — Rai, Hist. 1033.

Il est difficile de bien caractériser cette plante, & de la distinguer de l'*arenaria saxatilis* autrement que par son port, étant bien moins élevée ; ses pétales d'ailleurs ne sont pas beaucoup plus longs que les calices, & ses pédoncules sont quelquefois légèrement piluleux, ainsi que ses rameaux.

Ses racines sont potées, tendres, filiformes, un peu pubescentes, légèrement fibreuses ; elles poussent des tiges nombreuses, serrées, disposées en gazon, presque couchées, d'où s'élèvent des rameaux droits, presque simples, filiformes, longs

de deux à trois pouces. Les feuilles sont presque fasciculées à la base des tiges & même des rameaux ; les caulinaires droites, opposées, plus courtes, menues, subulées, aiguës, verruées, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont terminales, disposées en une petite panicule à rameaux courts, opposés. Les pédoncules sont capillaires, droits, inégaux, à peine pubescents. Le calice est divisé en cinq folioles glabres, ovales, aiguës, vertes, marquées dans leur milieu de trois nervures blanchâtres, membraneuses à leurs bords. La corolle est aussi longue que le calice, blanche, composée de cinq pétales ovales, obtus, renfermant dix étamines toutes égales, aussi longues que les pétales, terminés par des anthères petites, arrondies. Les capsules sont ovales, obtuses, recouvertes par le calice persistant.

Cette plante croît dans les Alpes & les départements méridionaux de la France, sur les rochers.  $\pi$  (V. f.)

28. SABLINA gypsophile. *Arenaria gypsophylloides*.

*Arenaria foliis linearibus, raciolibus setosis, panicula subpubescente, petalis lanceolatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 364. n°. 15. — Schreb. Act. Nov. Acad. N. C. vol. 4. pag. 139. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 723. n°. 17.

*Alfne orientalis, coryophylli folio; flore parvo, albo*. Tourn. Coroll. 17.

Cette espèce est très-peu connue. D'après Linné elle présente deux sortes de feuilles ; des feuilles radicales, fines, courtes, setacées & non-breuses ; des feuilles caulinaires, linéaires, plus longues que les entre-nœuds, approchant de celles de l'aillet. Ses fleurs sont blanches, disposées en une panicule légèrement pubescente, terminale, branchue, dichotome, un peu pyramidale ; les pédoncules propres un peu velus. Le calice se divise en cinq folioles dures, roides, ovales, mucronées. Les pétales sont entiers, lanceolés, trois fois plus longs que les folioles calicinales.

Cette plante a le port de l'*arenaria saxatilis* ; ses tiges sont droites, hautes d'environ un demi-pied, lisses, divisées en sept ou huit articulations. Elle croît dans le Levant.  $\pi$

29. SABLINA à petites feuilles. *Arenaria tenuifolia*. Linn.

*Arenaria foliis subulatis, caule paniculato, capsulis erectis; petalis calice brevioribus, lanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 607. — Pollich, Pal. n°. 427. — Oeder. Flor. dan. tab. 329. — Hoffm. Germ. 151. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 190. — Il. pag. 485. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 43.

n°. 677. XXIV. — Gérard, Flor. gall.-prov. pag. 404. n°. 5. — Gouan, Monip. pag. 218.

*Arenaria foliis subulatis*; *calicinis laciniis membranis ipsi angustiore acutis, acutissimis*. Guettard, Stamp. vol. 2. pag. 282.

*Alpine tenuifolia*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 364. Ic. — Vaillant, Patif. pag. 7. tab. 3. fig. 1. — Tourn. Inst. R. Herb. 243.

Cette sabline a une très-grande ressemblance avec l'*Arenaria saxatilis*, & l'on pourroit aisément les confondre sans les fleurs de la première, dont la corolle est presque une fois plus petite que le calice, & celui-ci à folioles bien plus étroites : elle est en général plus fluette, plus délicate dans toutes les parties.

Ses racines sont grêles, presque simples ; elles produisent des tiges nombreuses, menues, très-glâbres, quelquefois un peu purpurines à leur partie inférieure ; divisées en rameaux diffus, paniculés, nombreux, glâbres, très-fins ; garnis de feuilles opposées, petites, fort étroites, connées à leur base, tubuleuses, aiguës, bien plus courtes que les entre-nœuds, d'un vert-pâle ; les supérieures moins longues que celles du bas.

Les fleurs sont terminales, disposées en petites panicules étalées, dont les ramifications sont irrégulières, les unes dichotomes, d'autres épaisses, simples ou un peu rameuses ; les pédoncules propres capillaires, inégaux, filiformes, glâbres, point visqueux ; munis à leur base de bractées opposées, étroites, lancéolées, très-aiguës. Le calice est divisé en cinq folioles glâbres, verdâtres, marquées de trois lignes blanchâtres, point saillantes, membraneuses à leurs bords, lancéolées, étroites, très-pointues à leur sommet. La corolle est blanche, presque de moitié plus courte que le calice, composée de cinq pétales lancéolés, obtus. Les capsules sont glâbres, ovales, oblongues, obtuses, plus longues que les folioles calicinales, s'ouvrant à leur sommet en cinq valves, & contenant des semences glâbres, extrêmement petites.

Cette plante croît partout en Europe, sur les rochers, les vieux murs, & dans les lieux arides. ○ (V. v.)

### 30. SABLINE étalée. *Arenaria patula*. Michx.

*Arenaria tota puberula*; *caulibus filiformibus, paniculatis, multifloris*; *foliis setaceo-subulatis, patentibus*; *petalis submarginatis*; *calice acutissimo & striato, paulo longioribus*. Mich. Flor. borcal.-amer. vol. 1. pag. 273.

Malgré les rapports nombreux que cette espèce peut avoir avec l'*Arenaria tenuifolia*, on les distingue constamment par ses pétales un peu plus longs que les folioles calicinales, & légèrement échançrés à leur sommet.

Ses tiges sont droites, légèrement pubescentes, filiformes, divisées en rameaux très-étalés & comme paniculés, garnis de feuilles opposées, sessiles, linéaires, subulées, un peu pubescentes, très-ouvertes. Les fleurs sont terminales, nombreuses, portées sur des pédoncules capillaires, disposées en une panicule étendue. Les calices se divisent en cinq folioles presque glâbres, alongées, très-aiguës à leur sommet, striées sur leur dos. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales ovales, oblongs, un peu échançrés à leur sommet.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique, sur les rochers, aux environs de Knoxville, où elle a été découverte par Michx.

### 31. SABLINE visqueuse. *Arenaria viscidula*.

*Arenaria pusilla, erecta, setaceo-ramosissima, tota viscido-pubens*; *foliis subulatis*; *calicibus strictis, linearibus, lanceolatis*. Richard, Mss. — Thuill. Flor. patif. édit. 2. pag. 219. n°. 7.

*Alpine (viscosa)*, *caule paniculato foliisque pubescentibus*; *petalis conjunctis*; *calice pubescente brevioribus*. Schreb. Spicil. pag. 30.

### *Arenaria hybrida*. ? Villars, Dauph. tab. 47.

Quoique très-voisine de l'*Arenaria tenuifolia*, cette espèce s'en distingue en ce qu'elle est constamment beaucoup plus petite, visqueuse, chargée sur le plus grand nombre de ses parties de poils longs très-fins.

Ses racines sont grêles, simples & blanchâtres ; ses tiges nombreuses, vertes ou purpurines, hautes d'un à deux pouces au plus, droites, couvertes, ainsi que les rameaux, de longs poils extrêmement fins ; divisées presque dès leur base en rameaux nombreux, courts, diffus ; garnis de petites feuilles opposées, sessiles, très-étroites, tubuleuses, nervées à leur base, surtout les inférieures ; visqueuses, pubescentes, presque velues, droites, au moins aussi longues que les entre-nœuds, excepté les dernières.

Les fleurs sont disposées en petites panicules terminales, un peu étalées, médiocrement rameuses ; supportées par des pédoncules inégaux, capillaires, droits, velus, visqueux, unifoires. Les calices sont composés de cinq folioles très-droites, roides, fort étroites, linéaires, lancéolées, aiguës, striées, velues. La corolle est blanche, presque de moitié plus courte que le calice ; les capsules oblongues, obtuses.

Cette espèce croît aux environs de Paris, dans le bois de Romainville & ailleurs ; elle fleurit vers la fin du printemps. ○ (V. v.)

### 32. SABLINE de Gérard. *Arenaria Gerardii*. Willd.

*Arenaria foliis linearis-fabulosis, trinerviis; floribus geminis terminalibus; calicinis foliulis acuminatis, margine membranaceis, trinerviis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 729. n°. 36.

*Arenaria foliis linearibus, erectis, subius striatis; floribus fastigiatis, inaequaliter pedunculatis.* Gétard, Flor. gall.-prov. pag. 45. n°. 7. tab. 15. fig. t.

*Arenaria liniflora.* Jacq. Flor. austr. 5. tab. 445.

p. Eadem, caulibus dupl. altioribus. (N.)

Cette fabline a le port de l'*arenaria viscidula*; mais elle est presque glabre, point visqueuse; les feuilles striées, ainsi que les calices; la corolle un peu plus longue que le calice; les fleurs point paniculées, mais seulement deux ou trois à l'extrémité de chaque tige. Cette plante avait été rapportée par Linné à l'*arenaria juniperina*, dont elle est très-différente.

Les racines sont menues, presque simples, un peu noirâtres; elles produisent un grand nombre de tiges fasciculées, droites, simples, filiformes, glabres, ou garnies de quelques poils rares à sa partie supérieure, très-courts; hautes de deux ou trois pouces. Les feuilles inférieures sont réunies en un gazon serré; celles des tiges sont opposées, droites, plus courtes que les entre-nœuds, linéaires, sétacées, courtes, très-étroites, planes à leur face supérieure, un peu roulées en dehors à leurs bords, d'où résultent trois nervures, en y comprenant celle du milieu; un peu plus larges & plus courtes à mesure qu'elles approchent du sommet des tiges.

Les fleurs sont petites, situées à l'extrémité des tiges au nombre de deux ou trois, portées sur des pédoncules inégaux, insérées au même point, droites, celui du milieu beaucoup plus long, les deux latéraux quelquefois très-courts, légèrement pubescens, capillaires, munis à leur base de deux bractées opposées, courtes, ovales, aigües, qui existent également sur les pédoncules latéraux, à leur partie supérieure. Les calices sont divisés en cinq folioles ovales, droites, roides, étroites, acuminées, sillonnées par trois ou quatre nervures, un peu pubescentes. La corolle est blanche, à peine plus longue que le calice; les éamines de même longueur que la corolle; l'ovaire surmonté de trois styles courts; la capsule oblongue, à cinq valves, contenant des semences fort petites, d'un brun-noirâtre.

La variété s'en diffère de la précédente que par ses tiges envahir une fois plus hautes, plus étalées, & par les fleurs plus constamment au nombre de trois sur chaque tige.

Cette plante croit dans les pâturages secs, sur le sommet des montagnes alpines, dans les contrées méridionales de la France & en Allemagne. (V. f.)

33. *SABLINE* à feuilles de mélèze. *Arenaria laricifolia*, Linn.

*Arenaria foliis setaceis, caule superne nudifloro, calicibus subultrifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 607. — Jacq. Austr. 3. pag. 39. tab. 272. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 726. n°. 27. — Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 38. n°. 677. XII.

*Alpine foliis linearibus, angustissimis; calicibus tubulosis, villosis.* Haller, Helv. n°. 869.

*Stellaria laricifolia.* Scop. Carn. n°. 541. tab. 18.

*Alpine faxatilis, laricis folia, major & majari flore.* ? Tournes. Inlt. R. Herb. 243.

*Alpine alpina, juncea folio.* C. Bauh. Pin. 251. — Idem, Prodr. t. 18. — Tournes. Inlt. 243.

*Lychnoides, juniperifolia, perennis.* ? Vaill. Paris. pag. 121.

Cette plante, que l'on a peut-être confondue avec l'*arenaria triflora*, doit en être distinguée par ses fleurs plus nombreuses, par ses calices, dont les folioles droites, allongées & velues forment presque un tube, par ses capsules oblongues, & par la disposition & la forme de ses feuilles plus longues, un peu plus étroites.

Elle pousse de ses racines plusieurs tiges droites, presque simples ou rameuses seulement à leur partie inférieure; articulées, pubescentes, cylindriques, presque nues à leur partie supérieure; hautes de trois à cinq pouces, garnies de feuilles étroites, linéaires; presque sétacées, fermes, un peu pubescentes, légèrement élargies à leur base, connées; les inférieures disposées en gazon ou fasciculées; les supérieures opposées, écartées des tiges, en petit nombre, siliulées.

Les fleurs sont disposées en une panicule très-peu garnie à l'extrémité des tiges; elles sont au nombre de quatre ou six environ, portées sur des pédoncules simples ou médiocrement rameux, bifides, droits, pubescens, inégaux; munis à leur base de deux stipules courtes, étroites, aigües. Le calice est oblong, composé de cinq folioles lancéolées, linéaires, presque orbiculées, un peu velues, marquées de trois grosses nervures peu saillantes, membraneuses à leurs bords, droites, assez grandes. La corolle est blanche, au moins d'un tiers plus longue que le calice, ample, composée de cinq pétales élargis, obtus. Les capsules sont glabres, ovales, oblongues, obtuses, s'ouvrant à leur sommet en cinq valves, contenant des semences très-petites.

Cette espèce croit dans les Alpes, en Suisse, dans les départemens méridionaux de la France. (V. f.)

34. *SABLINE* à feuilles recoutbées. *Arenaria recurva*, Jacq.

*Arenaria foliis linearibus subulatis, sulcatis, recurvis, secundis; caulibus procumbentibus; pedunculis subhifloris, terminalibus, erectis; calicibus striatis.* Wulf. in Jacq. Collect. 1. pag. 244. tab. 6. fig. 1.

*Arenaria (recurva), foliis radicalibus congestis, recurvis, subulatis; caule simplici, subtrifloro.* All. Pedem. n°. 1713. tab. 89. fig. 3.

*Alpine foliis sulcatis, recurvis; radicalibus linearibus, congestis; caulibus lanceolatis.* Haller, Helv. n°. 868.

3. *Arenaria (uniiflora), foliis fasciculatis, capillari-fetaceis; caule unifloro.* (N.)

Cette espèce est petite : ses tiges sont grêles, couchées, étendues, nombreuses, presque simples, garnies de feuilles opposées, très-étroites, linéaires ou lancéolées, subulées, légèrement sillonnées à leur face extérieure, presque toutes tournées du même côté, recourbées en dehors. Les fleurs sont terminales, portées sur des pédoncules droits, à une, deux ou quelquefois trois fleurs. Les calices ont leurs folioles lancéolées, striées, un peu velues, scarieuses à leurs bords ; la corolle blanche, à cinq pétales ovales, oblongs, un peu plus longs que le calice ; la capsule ovale, oblongue, à cinq valves.

Comme je n'ai pas vu cette plante, décrite par Jacquin, & qui peut-être est un peu différente de celle de Haller & d'Allioni, que je ne connois pas davantage, pour éviter d'ailleurs d'augmenter le nombre des espèces par des variétés, j'ai rapproché la plante de celle de Jacquin, qui en a les caractères à quelques différences près, & qui ressemble assez bien à la figure qu'il en a donnée, un peu moins à celle d'Allioni, qui a les folioles plus larges. Ceux qui pourront observer ces plantes dans la nature, jugeront mieux que moi des rapports qu'elles peuvent avoir avec celle que je vais décrire.

Ses racines sont grêles, petites ; elles produisent un grand nombre de tiges presque simples, étendues sur la terre, longues de quatre à cinq pouces & plus, filiformes, glabres, un peu pubescentes à leur partie supérieure, munies à leur base de petites feuilles fetacées, subulées, agrégées ; celles des tiges sont ramassées, à chaque articulation, en petites fascicules tournées du même côté ; elles sont fines, à peine pubescentes, marquées d'un léger sillon, inégales, recourbées en dehors.

Les fleurs sont terminales, solitaires, portées sur un pédoncule quelquefois un peu incliné, presque glabre, setacé, terminé par une seule fleur petite. Le calice est divisé en cinq folioles ovales, un peu aiguës, à peine pubescentes, vertes, presque point striées, marquées de trois lignes blanchâtres peu sensibles, point saillantes, légèrement membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, un peu plus grande que le calice.

Cette plante croît en Suisse & dans les Alpes. (*V. f. in herb. Lam.*)

M. Dupuis m'a communiqué une plante recueillie en Suisse, qui a beaucoup plus de rapports avec celle de Jacquin : elle me paroît aussi être très-voisine, par son port, de l'*Arenaria linearis* ; mais ses corolles sont plus petites, à peine plus longues que le calice. Ses tiges sont courtes, ligneuses, tortueuses ; les rameaux supérieurs hifloires, pubescens ; les feuilles inférieures fasciculées, recourbées, striées, presque glabres ; les supérieures opposées ; les pédoncules simples, uniflores ou à deux fleurs alternes ; les calices striés, roides, acuminés, presque glabres ; la corolle blanche, un peu plus longue que le calice.

35 *SARLINE* striée. *Arenaria linearis*. Linn.

*Arenaria foliis linearibus, erectis, appressis; calicibus oblongis, striatis.* Linn. Syst. plant. vol. 2. pag. 366. n°. 12. — Amcen. Academ. vol. 4. pag. 315. — Allioni, Flor. pedem. n°. 1712. tab. 26. fig. 4.

*Caryophyllus saxatilis, polygoni minoris folio & facie.* Burf. IX. 129.

*Arenaria laricifolia.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 619. tab. 47.

Cette plante me paroît avoir de très-grands rapports avec l'*Arenaria laricifolia*, si celle que je soupçonne telle est véritablement la plante de Linne : voilà ce dont, avant tout, il faudroit être parfaitement assuré ; & dans un genre aussi étendu & dont les espèces sont si rapprochées, il est très-difficile d'acquiescer cette certitude, à moins d'avoir sous les yeux les individus d'après lesquels cet auteur en a établi les caractères. Je prévins donc que mes descriptions sont faites sur des individus observés en nature, soit secs, soit vivans, & non d'après celles des auteurs. Ceux qui seront bien certains des espèces de Linné, pourroient juger alors si ces descriptions y conviennent ou non.

Celle dont il est ici question a des racines dures, grêles, presque ligneuses, très-peu garnies de fibres ; elles produisent plusieurs tiges courtes, dures, nouvelles, un peu redressées, disposées en gazon, d'où s'élèvent des rameaux droits, simples, hifloires, un peu pubescens.

Les feuilles inférieures sont nombreuses, droites, fasciculées ; celles des rameaux plus petites, opposées, droites, appliquées contre les tiges, linéaires, très-étroites, un peu pubescentes, légèrement striées, roides, un peu subulées.

Les fleurs sont terminales, ordinairement au nombre de deux, portées sur des pédoncules droits, pubescens, cylindriques, simples, presque égaux, munis à leur base de deux bractées courtes, opposées, un peu plus larges que les feuilles ; chaque

péduncle est quelquefois muni, dans sa longueur, de deux autres bractées semblables. Les fleurs sont assez grandes, & ressemblent beaucoup à celles de l'*Arenaria loricifolia*. Le calice est pubescent, presque velu; les folioles droites, linéaires, oblongues, obtuses, marquées de plusieurs grosses nervures saillantes; ce qui les rend striées, membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, plus grande que le calice; les capules glabres, oblongues, obtuses, de la longueur du calice, s'ouvrant en cinq valves à leur sommet.

Cette plante croît naturellement dans les Alpes & en Autriche. (V. f.)

La plante de M. Villars a, d'après la gravure qu'il en a donnée, un port trop différent de celle d'Allioni, pour qu'on puisse la rapporter certainement à la même espèce.

36. *SABLINE* à tiges roides. *Arenaria striata*. Mich.

*Arenaria glabra, erecta, striata multicaulis; foliis subulato-linearibus, erectis; panicula rariiflora; petalis, calice ovali-lanceolato, conspicue striato multo longioribus.* Michaux, Flor. boreal-amer. vol. 1. pag. 274.

Selon Michaux, cette sabline se rapproche de l'*Arenaria striata*, mais elle est beaucoup plus élevée.

Elle pousse de ses racines des tiges nombreuses, droites, très-roides, rameuses, parfaitement glabres, garnies de feuilles opposées, droites, linéaires, subulées, glabres à leurs deux faces, connées à leur base.

Les fleurs sont disposées en une panicule très-peu garnie. Le calice est divisé en cinq folioles ovales, lancéolées, marquées extérieurement de fortes stries. La corolle est blanche, beaucoup plus longue que les folioles calicinales.

Cette espèce a été découverte par Michaux sur les rochers dans la Nouvelle-Angleterre & au Canada.

37. *SABLINE* filiforme. *Arenaria filifolia*.

*Arenaria caulis suffruticosus, dichotomis; foliis setaceis; pedunculis terminalibus, simplicibus, unifloris.* Vahl, Symb. 1. pag. 33. tab. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 721. n° 31.

*Arenaria (filifolia), foliis filiformibus liliatis.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. 211.

Ses tiges ont un peu frutescentes, glabres, foibles, cylindriques, dichotomes, divisées en rameaux grêles, alternes, presque simples, garnis de feuilles opposées, glabres, sessiles, setacées, ouvertes; les inférieures fasciculées.

Les fleurs sont axillaires & terminales, portées

sur des péduncles simples, uniflores, capillaires, au nombre de deux ou trois, opposés. Le calice est composé de cinq folioles glabres, étroites, lancéolées, acuminées, marquées de deux stries; la corolle blanche, à peu près aussi longue que le calice; les pétales ovales, oblongs, obtus.

Cette plante croît dans l'Arabie. (Descript. ex Vahl.)

38. *SABLINE* fasciculée. *Arenaria fasciculata*. Linn.

*Arenaria foliis subulatis; caule erecto, striato; floribus fasciculatis, petalis brevissimis.* Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 366. n° 23. — Jacq. Austr. vol. 2. tab. 181. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 41. n° 677. XX.

*Arenaria caule paniculato, striato, dichotomo; foliis subulatis, striatis; calicibus acuminatis, nervosis, striatis.* Gouan, Illustr. 30.

*Stellaria rubra.* Scop. Carn. n° 338. tab. 17.

*Alfina foliis filiformibus, pungentibus; calicibus aristatis.* Haller, Hist. n° 870.

Cette espèce est remarquable par son port, en ce que presque toutes ses parties sont fasciculées; ses tiges, ses feuilles, ses fleurs, ses calices sont très-acuminés, plus longs que la corolle. Quelques auteurs ont confondu cette plante avec l'*alfina mucronata* de Linné: cette dernière en est très-distincte, très-déliée, fort menue.

Ses racines sont grêles, un peu dures, articulées, un peu traçantes ou horizontales: il s'en élève des tiges nombreuses, en touffes gazeuses, hautes de cinq à six pouces, droites, roides, médiocrement rameuses, glabres, filiformes, garnies de feuilles linéaires, très-étirées, subulées, aiguës, appliquées contre les tiges, roides; les inférieures fasciculées; les supérieures opposées, plus courtes, vertes, un peu striées à leur base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en petites panicules serrées, dont les premières ramifications sont dichotomes, assez longues, inégales, filiformes, très-glabres; les péduncles particuliers fort courts, ramifiés par falceaux, munis à leur base de deux petites bractées opposées, courtes, subulées. Les calices se divisent en cinq folioles longues, étroites, panachées de vert & de blanc, subulées, roides & piquantes à leur sommet, striées sur leur dos, membranuleuses, à peine ciliées à leurs bords. La corolle est blanche, petite, au moins une fois plus courte que le calice; les pétales ovales, oblongs, la capsule ovale, à peine plus longue que la corolle.

Cette espèce croît dans les montagnes alpines, aux environs de Grenoble, de Montpelier, dans la Carniole & l'Autriche. (V. v.)

39. *SABLINE*

39. SABL'NE hispide. *Arenaria hispida*. Linn.

*Arenaria foliis subulatis, subulis hispida*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 668. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 725. n°. 23.

Il est difficile de pouvoir prononcer sans doute sur la plante que présente ici Linné, n'en citant aucune figure, & la courte description qu'il en donne étant insuffisante.

C'est, d'après lui, une plante qui a le port d'un *fregula*, dont les tiges sont simples, chargées de quelques poils rares; les feuilles opposées, planes, subulées, hérissées en dessous de quelques poils. Les fleurs forment d'abord une panicule dichotome, dont les deux divisions de viennent ensuite rameuses & supportent des pédoncules alternes.

J'ai observé, dans l'herbier de M. Lamarck, une plante qu'il a reçue des Alpes, & que j'ai cru devoir rapporter à celle de Linné. Ses tiges sont simples, blanchâtres, peu élevées, presque glabres, surtout à leur partie inférieure; articulées, garnies de feuilles planes, verdâtres, très-aiguës, fort petites; les inférieures glabres; les supérieures légèrement velues à leur face intérieure.

Les fleurs étoient presque solitaires & terminales sur de longs pédoncules simples ou dichotomes, mais sans autres ramifications, peut-être parce que la plante n'étoit pas arrivée à son entier développement; les pédoncules hispides, filiformes, très-droits; les calices à cinq folioles ovales, presque glabres, très-aiguës, acuminées, à trois nervures, deux latérales en bordure, une dans le milieu, point membraneuses ni scarieuses; la corolle blanche, plus longue que le calice. Ces caractères rapprochent aussi cette plante de l'*arenaria grandiflora*. Le mauvais état des échantillons ne m'a point permis d'en juger.

Cette espèce croît dans les Alpes & aux environs de Montpellier. (V. f. in herb. Lam.)

40. SABL'NE hérissée. *Arenaria echinata*.

*Arenaria foliis filiformibus, subulatis, vix pubescentibus; floribus spinulatis; calicibus peanunculæ hispidis-glandulosis; corollâ calicem æquante; caulibus subramosis, brevibus*. (N.)

*Alpine minima, lusitana, verna; capitulis echinatis*. Tourn. Inst. R. Herb. 245.

Peut-être cette plante est-elle l'*arenaria hispida* de Linné, avec laquelle elle a de grands rapports, & qui se distingue particulièrement par ses calices hérissés & glanduleux, & par sa corolle de la longueur du calice.

C'est une fort petite espèce, dont les racines sont fort menues, presque simples, dures, ligneuses, qui produisent des tiges quelquefois simples, plus souvent rameuses, hautes de deux pouces au

Butanic. Tome VI.

plus, droites, pubescentes, à rameaux alternes, ouverts, garnis de feuilles opposées, sessiles, filiformes, subulées, un peu pubescentes, fasciculées & plus longues à la base des rameaux.

Les fleurs sont disposées en une petite panicule courte à l'extrémité des rameaux, dont les premières & même les secondes divisions sont très-souvent dichotomes, pubescentes & glanduleuses; chaque fleur pédicelée. Le calice est divisé en cinq folioles lanceolées, presque obtuses, filonnées, hérissées de très-petits poils courts, nombreux, glanduleux; blanchâtres & membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, au moins de la longueur du calice. Les capules sont glabres, ovales, obtuses, aussi longues que les folioles calicinales.

Cette plante croît dans les Alpes; elle se trouve dans l'herbier d'Isard, chez M. de Justieu, éti-quetée par Tournet. (V. f. in herb. Just.)

41. SABL'NE raboteuse. *Arenaria scabra*.

*Arenaria foliis lanceolatis-acutis, patentibus, duris, scabris; peanunculâ paniculatis, dichotomis; calicibus asperis, corollâ brevioribus; caule simplici, brevifloro*. (N.)

C'est une fort petite plante, remarquable par les aspérités dont sont chargées ses feuilles & les calices.

Ses tiges sont droites, fort petites, filiformes, roides, très-simples, hautes de deux pouces au plus, hérissées de poils courts & blanchâtres, garnies de feuilles sessiles, opposées, très-ouvertes, fort petites, lanceolées, vertes à leurs deux faces, aiguës & piquantes à leur sommet, planes en deux, un peu recourbées en dehors, couvertes de petits tubercules & de poils rudes, connés à leur base.

Les fleurs sont terminales, disposées en une petite panicule d'abord trifide, dont les ramifications sont capillaires, droites, pubescentes; ensuite dichotomes, unifoire ou bifore, une des deux fleurs presque sessile; la base de chaque division garnie de deux petites bractées opposées, assez semblables aux feuilles, mais plus petites. Le calice est divisé en cinq folioles ovales, acuminées, très-aiguës, brisées, raboteuses, membraneuses & blanchâtres à leurs bords. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît sur les rochers arides, dans les Alpes. (V. f. in herb. Just.)

42. SABL'NE verticillée. *Arenaria verticillata*. Willd.

*Arenaria foliis subulatis, spinosis floribusque verticillatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 725. n°. 24.

Bbb

*Alfne orientalis, fruticosa, serotilis; foliis & floribus verticillatis.* Tourn. Coroll. 18.

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, noueux, pubescents, garnis de feuilles roides, subulées, mucronées à leur sommet, réunies trois ou quatre par fascicules opposés; ce qui donne aux feuilles l'apparence de verticilles. Les pédoncules sont axillaires, & fourmillent quatre fleurs; ils sont opposés, & présentent également la forme d'un verticille. Les calices se divisent en cinq folioles linéaires, subulées & piquantes. Les pétales sont blancs & fimbriés.

Cette plante croît dans l'Arménie, entre Erzeron & Tocat. ( *Descript. ex Willd.* )

43. SABLINS à feuilles de genévrier. *Arenaria juniperina.* Linn.

*Arenaria foliis subulatis, spinosis; caulibus erectis, calicibus striatis, capsulis oblongis.* Linn. Manuill. 72. — Smith. Icon. ined. vol. 2. pag. 35. tab. 35. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 725. n° 25.

*Alfne orientalis, fruticosa, camphorata folio.* ? Tourn. Coroll. 18.

Ses tiges sont nombreuses, droites, cylindriques, pâles ou blanchâtres, hautes d'un demi-pied, légèrement pubescentes, noueuses à leurs articulations, garnies de feuilles opposées, ovées, connées à leur base, subulées, marquées de trois nervures, presque à trois faces, roides, mucronées, piquantes, un peu pubescentes; les radicales sont droites, beaucoup plus courtes, glabres, obtuses.

Les fleurs sont disposées en une panicule droite, terminale, dichotome, légèrement pubescente, munie de bractées fort petites, ovales, lancéolées, aiguës, à trois nervures, scarieuses & ondulées à leurs bords; les pédoncules propres glabres, droits, filiformes, à une seule fleur. Leur calice est lisse, oblong, fermé, composé de cinq folioles ovales, lancéolées, mucronées, à trois nervures, deux folioles internes, recouvertes par les trois folioles externes. La corolle est blanche, presque une fois plus longue que le calice; les pétales striés, ovales, lancéolés, obtus; les étamines filiformes, toutes égales; leurs anthères petites, arrondies; l'ovaire oblong, terminé par trois styles de la longueur des étamines; les capsules luisantes, oblongues, obtuses, un peu plus longues que le calice, à une seule loge, à trois valves, contenant des semences nombreux, comprimés, arrondies, pezzés, noiettes.

Cette plante est soupçonnée croître dans l'Orient. Il n'y a nul doute si la synonymie de Tournefort, citée par Willdenow, lui convient. ( *Descript. ex Smith.* )

Observations. J'ai vu, dans l'herbier de M. La-

marck, une plante qui lui a été communiquée par Michaux, & qu'il avoit rapportée d'Orient. Elle a de grands rapports avec celle de Linné: le mauvais état de l'individu ne me permet pas de l'affirmer. Elle lui ressemble quant à la forme & à la toideur des feuilles, qui en reçoivent d'autres fasciculées dans leurs aisselles. Je n'y ai vu que les débris d'une seule fleur portée sur un très-long pédoncule latéral. La capsule étoit grosse, presque globuleuse, une fois plus longue que le calice, un peu ouverte en cinq valves aiguës à leur sommet. Les folioles persistantes du calice étoient ovales, obtuses, larges, striées, pubescentes.

Linné, en parlant de l'*arenaria juniperina*, dit qu'il ressemble par son port à l'*arenaria saxatilis*; que ses tiges sont hautes d'un demi-pied, toides, lisses, garnies de feuilles subulées, roides, dures, mucronées & presque épineuses à leur sommet. Les fleurs sont disposées en panicule. Les calices sont oblongs, aiguës, à cinq nervures; les pétales blancs & lancéolés; les capsules allongées, un peu plus grandes que le calice.

44. SABLINS à feuilles de renouée. *Arenaria polygonoides.* Jacq.

*Arenaria foliis linearibus, caulibus procumbentibus; pedunculis bifloris, terminalibus, erectis, calicum subdivisorum foliolis cernivis.* Wulfen. in Jacq. Collet. 1. pag. 241. tab. 15. — Reiner & Hohenwath, Iter t. pag. 165.

*Stellaria ciliata.* Scop. Carn. n° 536. tab. 17. — Gunn. Flor. norveg. vol. 1. pag. 45. n° 91.

*Alfne foliis linearibus, obtusis; calicibus viscidis.* Hall. Helv. n° 863.

*Alfne polygonoides, foliis brevibus, flore albo.* Seguer. Plant. veron. vol. 3. pag. 177. tab. 4. fig. 1.

*Sagina ramis erectis, bifloris.* ? Linn. Flor. lapp. pag. 118. n° 158. — Weder. Flor. dan. Fasc. 1. tab. 12. ( *Ex Jacq.* )

Ses racines sont très-longues, presque simples, divisées en quelques fibres filiformes, à peine rameuses: il s'en élève des tiges nombreuses, couchées, disposées circulairement en gazon, médiocrement rameuses, longues de trois à quatre pouces, lisses, cylindriques, un peu visqueuses, garnies à leur base de feuilles disposées en rosettes, opposées le long des rameaux, sessiles, linéaires, un peu pulpeuses, planes à leur face supérieure, un peu arrondies en dessous, sans nervures sensibles, obtuses, à peine aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, quelques-unes latérales, supportées par des pédoncules biffides dès leur base, capillaires, glabres, munis à leur base & vers leur partie moyenne de deux petites bractées opposées, ovales, lancéolées. Le calice est divisé en cinq folioles glabres, un peu char-

nnet, ovales, lancéolées, blanches & membraneuses à leur contour. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice, composée de cinq pétales ovales, oblongs, très-entiers, renfermant dix étamines de la longueur du calice, les alternes plus courtes; les anthères d'un blanc-jaunâtre; l'ovaire globuleux, surmonté de trois styles, auquel succède une capsule ovale, oblongue, à une loge, à cinq valves, contenant des semences ovaires, ténuiformes.

Cette plante croît sur les montagnes alpines, dans la Suisse & l'Allemagne. ○

45. SABLINE de Caroline. *Arenaria caroliniana*.

*Arenaria foliis subulatis, imbricatis; caule peniculato, pedunculis trifloris.* Walther. Flor. carolin. pag. 141.

Cette plante a des tiges droites, divisées en rameaux disposés en panicule, garnis de feuilles nombreuses, opposées, imbricées, subulées. Les fleurs sont placées à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules à trois divisions, chaque pédoncule particulier simple & uniflore.

Cette plante croît dans la Caroline, où elle a été observée par Waltherius.

46. SABLINE à grandes fleurs. *Arenaria grandiflora*. Linn.

*Arenaria foliis subulatis, planis, strillis; radicalibus confertis, caulibus unifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 608. — Allion. Flor. pedem. n° 1711. tab. 10. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 728. n° 34. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 40. n° 677. XV.

*Arenaria foliis lanceolatis, cauliculis multifloris; foliis calicinis inaequalibus, exterioribus coracis-ovatis, latoribus.* Gouan. Illustr. n° 30.

*Arenaria jungerina.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 624.

*Alpine foliis sulcatis, argutis lanceolatis; petioliis unifloris.* Hall. Helv. n° 874.

*Alpine uniflora & grandiflora, foliis acuminatis, glabris; petalis integris.* Allion. Spec. pedem. 49. tab. 10. fig. 1.

On distingue cette espèce à ses tiges chargées ordinairement d'une seule fleur, quelquefois de deux; à ses corolles très-grandes, & aux folioles calicinales ovales, un peu inégales.

Ses racines sont dures, grêles, un peu ligneuses; il s'en élève plusieurs tiges basses, articulées, & des rameaux droits, courts, pubescents, cylindriques, très-peu feuillés vers leur sommet, garnis à leur partie inférieure de feuilles médiocrement fasciculées, opposées, planes, étroites, lancé-

olées, linéaires, un peu toides, très-rigides à leur sommet, striées, pubescentes, élargies & connées à leur base, à nervures un peu blanchâtres.

Les fleurs sont terminales, ordinairement foliaires, portées sur un long pédoncule simple, filiforme, droit, un peu pubescent. Le calice se divise en cinq folioles presque inégales, élargies, ovales, aiguës, légèrement pubescentes, un peu nerveuses, verticillées. La corolle est blanche, au moins une fois aussi longue que le calice, ouverte, à cinq pétales entiers, ovales, oblongs, obtus. Les capsules sont ovales, obtuses, de la longueur du calice. On rencontre quelquefois des individus à deux, & même à trois fleurs.

Cette plante croît dans les Alpes, sur les montagnes du Chevalant Dauphiné, aux environs de Montpelier, &c. & (V. f.)

47. SABLINE à fleurs de lin. *Arenaria liniflora*. Linn.

*Arenaria caulibus erectis, inferis ramosis, sessiliculis; foliis subulatis, floribus geminis.* Linn. f. Suppl. pag. 241. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 729. n° 35.

*Arenaria foliis subulatis, caulibus sessiliculis, floribus geminis.* Linn. Syst. veget. pag. 385. — Jacq. Collect. vol. 2. pag. 107. tab. 3. fig. 3.

*Arenaria striata.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 630. tab. 47.

*An arenaria capillata?* Allioni, Flor. pedem. 1. n° 1705. tab. 89. fig. 2.

Cette espèce, assez semblable par ses corolles à l'*arenaria grandiflora*, en diffère par son port & par ses feuilles bien plus étroites.

Elle pousse de ses racines des tiges courtes, dures, tortueuses, rameuses, un peu couchées, d'où s'élèvent d'autres rameaux droits, très-simples, cylindriques, longs de trois à cinq ponces. Les feuilles inférieures sont nombreuses, souvent plus étroites, plus longues; les supérieures opposées, linéaires, subulées, un peu arrondies, lisses, aiguës, distantes, presque droites.

Les fleurs sont terminales, au nombre de deux ou trois, portées sur des pédoncules droits, un peu pubescents, simples, munis à leur base & vers leur milieu de petites bractées subulées.

Les calices se divisent en cinq folioles lancéolées, légèrement pubescentes, aiguës, marquées de deux ou trois stries longitudinales. La corolle est blanche, grande, assez semblable à celle du lin, composée de cinq pétales ovales, larges, marquées de lignes transparentes, au moins une fois plus longues que les calices. Selon M. Villars, on aperçoit sur les feuilles de cette plante, à



l'aide d'une loupe, une infinité de petites glandes jaunâtres.

Cette plante croît sur les montagnes, aux environs de Grenoble, dans les Alpes, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe méridionale. 2.

48. **SABLINE lancéolée.** *Arenaria lanceolata*. Allioni.

*Arenaria foliis linear-lanceolatis, trinerviis, marginis scapulis, oppositis; calicibus lanceolatis, nervosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 727. n°. 29.

*Arenaria lanceolata.* Allioni, Flor. pedem. n°. 1715. tab. 26. fig. 5.

*Alpine caule fuscato, dichotomo; foliis linearibus, acutis.* Haller, Helv. n°. 864. Ex Allioni.

Ses racines sont fibreuses, rampantes : il s'en élève des tiges dures à leur base, tortueuses, garnies d'un grand nombre de feuilles touffues, disposées en gazon, d'où sortent des rameaux presque simples ou dichotomes à leur sommet, droits, munis de feuilles opposées, courtes, linéaires, lancéolées, glabres, fermes, aiguës, ouvertes, quelquefois un peu pubescentes, rudes à leurs bords, marquées de trois nervures saillantes.

Les fleurs sont au nombre de deux ou trois à l'extrémité des rameaux, portées sur des pédoncules grêles, droits, filiformes. Les folioles calicinales sont linéaires, lancéolées, aiguës, marquées de quelques nervures, à peine pubescentes. La corolle est blanche, un peu plus grande que le calice; les pétales ouverts, ovales, très-entiers; les étamines un peu plus longues que les pétales, cinq alternes, plus courtes; trois styles setacés.

Cette espèce paroît être constituée par ses feuilles lancéolées, à trois nervures, & par les folioles calicinales, semblables aux feuilles.

Cette plante croît dans les Alpes & sur les montagnes du Piémont. 2.

49. **SABLINE prismatique.** *Arenaria cherlerioides*. Vill.

*Arenaria caule basi suffruticoso, unifloro; foliis linear-lanceolatis, imbricatis; calicibus aequalibus.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 626. Icon.

*Alpine foliis fuscatis, aculeatis; petalis unifloris, petalis integris.* Haller, Enumer. 388. n°. 12. — Emend. l. n°. 76.

C'est une fort petite plante, qui s'élève à peine d'un à deux pouces, remarquable par son port, dont les tiges sont dures, ainsi que les rameaux, entassés, disposés en un gazon dense, épais; les extrémités des rameaux herbacées. Les feuilles

sont nombreuses, imbriquées, courtes, sessiles, fort petites, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces; les supérieures un peu pubescentes, roides, sillonnées sur leur dos, aiguës, un peu piquantes à leur sommet, à peine longues de deux lignes. Celles qui terminent les tigeaux stériles, forment, par leur rapprochement, une sorte de pinnule à quatre faces.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux, supportées par un pédoncule court, simple, setacé, à peine pubescent. Le calice est divisé en cinq folioles droites, ovales, lancéolées, aiguës, légèrement pubescentes, marquées extérieurement de plusieurs stries, membraneuses & blanchâtres à leurs bords. La corolle est blanche, à peine plus longue que le calice; les pétales entiers.

Cette plante croît dans les Alpes & aux environs de Grenoble. 2. (V. f.)

50. **SABLINE capillaire.** *Arenaria capillaris*.

*Arenaria foliis infimis caespitosis, longissimis, capillaribus; calicibus ovato-obtusis, glabris, corollâ multo brevioribus; caulibus simplicibus, subrigidis.* (N.)

C'est une très-jolie espèce, bien distincte par ses feuilles capillaires, semblables, surtout, les inférieures, à celles du *festuca duriuscula*.

Ses tiges sont droites, presque simples, hautes de cinq à six pouces & plus, articulées, filiformes, glabres, verdâtres. Les feuilles sont fines, très-étroites; les inférieures capillaires, fasciculées, très-droites, un peu roides, longues au moins de deux pouces, glabres, un peu roulées à leurs bords, aiguës; les feuilles supérieures opposées, un peu plus larges, bien plus courtes, moins longues que les entre-nœuds.

Les fleurs forment presque une ombelle à l'extrémité des tiges, au nombre de deux, plus souvent trois, supportées par de longs pédoncules simples, presque égaux, uniflores, quelquefois dichotomes, glabres, capillaires, munis à leur base de deux petites bractées membraneuses, élargies à leur base, acuminées, très-aiguës. Les calices sont glabres, divisés en cinq folioles larges, ovales, obtuses, membraneuses à leur contour. La corolle est blanche, ample, au moins une fois plus longue que le calice; les pétales ovales, ongiculés, élargis, & légèrement innués ou crénelés à leur sommet.

Cette plante a été recueillie par M. Patrin, dans la Sibirie. (V. f. in herb. Jussieu & Lamarck.)

51. **SABLINE setacée.** *Arenaria setacea*.

*Arenaria perennis, caespitosa nulli; caulibus procumbens, vix perceptibili pube; ramis elongatis, simplicibus; foliis fasciculatis, bristis, caulis setaceis; fasciis terminatis, paucifloris; calicibus glabris*

*rimis, corollâ subbrevisioribus, acutissimis.* Rich. Miff.  
— Thuell. Flor. parif. édit. 2. pag. 220.

Cette sabline produit des tiges qui se divisent, dès leur base, en un grand nombre de rameaux errandus sur la terre, disposés en gazon, à peine pubescens, alongés, presque simples, garnis de feuilles fines, setacées, droites, fasciculées, particulièrement les inférieures, toides; les supérieures opposées, plus courtes.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en un petit bouquet peu garni, point étale, dont les pédoncules sont filiformes. Les calices sont divisés en cinq folioles très-glabres, aiguës. La corolle est blanche, un peu plus longue que les folioles calicinales; les pétales ovales.

Cette plante se trouve à Fontainebleau, tocher du Cuvier; elle fleurit vers le milieu de l'été. 74

**SABOT.** *Cypripedium.* Genre de plantes monocotylédones ou unilobées, à fleurs irrégulières, de la famille des orchidées, qui a des rapports avec les *helleborines* & les *asif* : il comprend des herbes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont amples, entières; les fleurs terminales, presque foliaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

La division inférieure du calice *entée, très-ventrue, concave; la supérieure droite; ovale; les autres très-droites, disposées en croix.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* (que quelques-uns prennent pour une corolle) à cinq ou six divisions irrégulières, inégales; la supérieure redressée, large, ovale, lancéolée; les autres latérales, très-ouvertes, linéaires, lancéolées, fort longues, droites, aiguës; l'inférieure presque pendante, plus courte que les autres, renflée, concave, très-ventrue, obtuse, en forme de sabot, ayant à son bord supérieur une lèvre petite, plane, ovale, réfléchie.

2°. Point de *corolle*, à moins qu'on ne regarde comme telle le calice.

3°. Deux *étamines*, dont les filamens sont très-courts, insérés sur le pistil, terminés par des anthères droites, recouvertes par la lèvre de la division inférieure du calice.

4°. Un *ovaire* inférieur, alongé, contourné, muni d'un style très-court, qui fait corps avec la lèvre supérieure de la division inférieure du calice, terminé par un stigmate charnu.

Le fruit est une capsule ovale, oblongue, à trois côtes obtus, marquées de trois sutures, sous lesquelles elle s'ouvre par trois valves, à une seule loge, contenant des semences nombreuses, fort

petites, attachées sur un réceptacle linéaire, adré longitudinalement à chacune des valves du pericarp.

#### ES P È C E S.

##### 1. SABOT DE VÉNUS. *Cypripedium calceolus.* Linn.

*Cypripedium radicebus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis, caulinis alternis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1346. — Ad. Upl. 1740. pag. 24. — Flor. suec. 755. 820. Miller, Dict. n°. 1. Icon. tab. 242. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 2. tab. 1. — Reyg. Géol. 1. pag. 219. — Kuiph. Centur. 10. n°. 35. — Knorr. Del. Hort. 1. tab. M. 2. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 522. n°. 1109. — Idem, Illustr. Gen. tab. 729. fig. 1. — Ledcut. Liliac. tab. 19.

*Cypripedium (calceolus), foliis caulinis oblongis, alternis.* Thunb. Flor. japon. pag. 50.

*Cypripedium (calceolus), radicebus fibrosis; foliis ovato-lanceolatis, caulinis; petalis acuminatis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 302. n°. 1.

*Cypripedium foliis ovato-lanceolatis.* Flor. lap. 318. — Gronov. Virgin. 135.

*Calceolus (marianus), foliis ovato-lanceolatis; petalis interioribus ligulatis.* Crantz. Flor. austr. pag. 454.

*Calceolus foliis ovato-lanceolatis.* Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 2. tab. 1.

*Calceolus marianus.* Tourn. Inst. R. Herb. 437. tab. 249. — Dodon. Pempt. 180. fig. t. 2.

*Helleborine folio rotundo, sive calceolus.* C. Bauh. Pin. 187. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 12. tab. 11. fig. 14.

*Damofonii species quibusdam, sive calceolus D. Mariae.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 518. lc.

*Pseudo-damofonium.* Cluf. Stirp. Pann. pag. 271. tab. 272.

*Calceolus radicebus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis.* Hall. Helv. n°. 1307. tab. 43.

« *Helleborine sive calceolus, flore luteo, concavo; longiore, tenuiore folio.* Morif. Oxon. Hist. 3. §. 12. tab. 11. fig. 14.

« *Helleborine virginiana seu calceolus, flore luteo, majore.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 488. §. 12. tab. 11. fig. 15.

*Cypripedium (calceolus), minutum pubescens, caule folioso; lacinia calicinis exterioribus, oblongo-ovatis, acuminatis; interioribus linearibus congestisque; calceolo luteo.* Mich. Flor. boreal.-amer. vol. 2. pag. 161.

« *Calceolus minor, flore vario.* Amm. Ruth. t. 33. tab. 12.

*Calceolus foliis benis, ovatis.* Gmel. Sibir. t. p. 5.

Cette belle plante a des racines fibreuses, d'où s'élève une tige haute d'environ un pied, glabre, tendre, striée, terminée par une, quelquefois deux fleurs remarquables par leur grandeur & leur forme, garnie dans sa longueur de quatre ou cinq feuilles très-larges, approchant de celles du *veratrum*; ovales, lancéolées, un peu aiguës, glabres à leurs deux faces, à nervures longitudinales, vaginales à leur base. Les nervures, examinées à la loupe, sont légèrement pubescentes, ainsi que l'extrémité des tiges.

La feuille terminale, un peu plus étroite que les autres, mais de la même forme, tient lieu de spathe: il en sort une, racéme de deux fleurs, pédonculées, un peu pendantes. Leur calice n'a que quatre divisions; la supérieure droite, un peu plus large; les deux latérales très-ouvertes, fort longues, étroites, lancéolées, agumées, un peu pubescentes; la division inférieure un peu pendante, renflée, fort grande, concave, creusée en forme de sabot, ovale, obtuse, plus courte que les autres, de couleur jaunâtre, tandis que les divisions extérieures sont, ou verdâtres, ou d'un pourpre foncé. Ces fleurs présentent quelques variétés dans leurs proportions, leur forme & leurs couleurs.

On trouve cette plante dans les prés couverts, en Suisse, dans les Alpes & dans les départements méridionaux de la France; elle croît aussi dans l'Amérique septentrionale & en Sibirie. (V. f.)

2. SABOT jauitre. *Cypripedium flavescens*. Redoute.

*Cypripedium lobo styli sagittiformi, basi deflexo, labio petalis brevior, compresso*. Redoute, Liliac. 4<sup>e</sup>. livr. tab. 20.

*Cypripedium (parviflorum), lobo styli sagittiformi, basi deflexo, &c.* Swartz, Orch. Academ. Nylandii. 1800. pag. 251.

*Cypripedium (parviflorum), corolla labio superiore sagittiformi, basi deflexo, subius carina anguste canaliculata, inferiore petalis brevior, compresso*. Salisb. Linn. Soc. pag. 77. tab. 2. fig. 2.

*Helleborine calceolus, dicta mariana, caule folioso; flore lato minore*. Pluken. Mantill. pag. 101. tab. 418. fig. 2. *Pesuma*.

Cette espèce ressemble beaucoup au *cypripedium calceolus*, & l'on est tenté au premier coup d'œil de le prendre pour une simple variété de cette plante. Un examen plus attentif fait reconnaître que ce sont deux espèces parfaitement distinctes. L'un a la fleur entièrement jaune; l'autre a les divisions extérieures de la corolle de couleur pourpre: le premier a le lobe du style en forme de flèche & réfléchi; le second a ce même lobe ovale & concave; enfin, l'un est originaire de

l'Amérique septentrionale, tandis que l'autre ne se trouve que dans les Alpes, en Europe.

Ses racines sont nombreuses, simples, cylindriques; la tige droite, herbacée, simple, haute de huit à dix pouces, munie de quelques poils courts & blanchâtres, garnie de cinq à six feuilles épaisses, sessiles, en gaine à leur base, ovales, oblongues, aiguës, entières, pubescentes.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges, un peu inclinées. La corolle est d'un jaune-pâle. On y distingue cinq divisions, en y comprenant le sabot: la supérieure droite, ovale, oblongue, racherée de petits points rouges, pubescente sur les nervures; l'inférieure réfléchie, souvent échan-crée à son sommet, plus large & plus courte que la précédente; les deux latérales un peu plus longues. Le sabot est jaune, avec quelques veines rougeâtres, formées par des séries de petits points; horizontal, obtus, comprimé; les bords repliés en dedans.

L'ovaire est inférieur, cylindrique, de couleur verte, pubescent, marqué de six sillons: le lobe du style est jaune, à trois divisions: celle du milieu se prolonge en forme de flèche; elle est creusée en dessous en carène; les deux latérales réfléchies. Les anthères sont au nombre de deux, distinctes, placées sur les divisions latérales du style, arrondies, jaunâtres.

Cette plante est originaire de l'Amérique septentrionale, d'où elle a été envoyée par Michaux, & cultivée dans le jardin de M. Cels; elle fleurit au printemps. (V. f.)

3. SABOT du Canada. *Cypripedium canadense*. Mich.

*Cypripedium totum hirsutum, caule folioso; laciniis calicinis exterioribus lato-ovatis, obtusis; caliceo purpureo*. Mich. Flor. boreal. amer. vol. 2. pag. 161.

*Calceolus marianus, canadensis*. Cornuti, Canad. 204. — Tournet. Inst. R. Herb. 437.

*Helleborine sive calceolus marianus, hirsutus; flore maximo, purpurascens*. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 12. tab. 11. fig. 17.

Cette espèce doit être distinguée du *cypripedium calceolus*, ayant ses tiges & ses feuilles velues, les fleurs bien plus grosses, & les découpures de leur calice d'une forme différente.

Ses racines sont fibreuses & produisent une tige droite, feuillée dans toute sa longueur, cylindrique, velue. Les feuilles sont larges, ovales, oblongues, herbacées de poils un peu roides, particulièrement sur les nervures, amplexicaules & vaginales à leur base, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont grandes, solitaires ou quelque-

fais deux à l'extrémité des tiges, portés sur des pédoncules courts, pubescents, un peu inclinés : ces tiges sortent d'une gaine étroite, lanceolée, entière, aiguë. Les trois découpures extérieures du calice sont larges, ovales, obtuses, ordinairement plus courtes que la découpure intérieure : celle-ci est très-grosse, renflée, ciselée en sabot, de couleur purpurine.

Cette plante croît au Canada & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale. ♀

4. SABOT à fleurs blanches. *Cypripedium album*. Aiton.

*Cypripedium radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis, caulibus ; petalis obtusis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 303.

*Helleborine calceolus, dicta mariana, flore gemello, candido, venis purpureis striato*. Pluk. Mantill. 101. tab. 418. fig. 3.

On distingue cette espèce du *cypripedium calceolus* à ses divisions calicinales extérieures, plus courtes, obtuses, plus larges.

Ses racines sont composées de plusieurs fibres médiocrement rameuses & presque charnues ; elles produisent une tige droite, élève, cylindrique, munie de deux ou trois feuilles sessiles, amplexicaules ou vaginales à leur base, assez amples, ovales, lancéolées, aiguës, vertes à leurs deux faces. Chaque tige se termine ordinairement par deux fleurs un peu pendantes, sur un pédoncule plus court que la spathe : celle-ci est étroite, longue, acuminée, d'une seule pièce. Le calice se divise en cinq découpures, dont les quatre extérieures sont ovales, lancéolées, obtuses ; l'inférieure très-renflée, ovale, presque ronde, blanche, ainsi que les découpures extérieures, marquées de veines purpurines.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale.

5. SABOT du Japon. *Cypripedium japonicum*. Thunb.

*Cypripedium foliis coulinis subrotundis, suboppositis, nervosis*. Thunb. Flor. japon. pag. 30.

Ses tiges sont droites, cylindriques, velues, garnies dans leur milieu de deux feuilles amplexicaules, presque opposées, médiocrement arrondies, aiguës à leur sommet, finement & ondulées à leurs bords, glabres, marquées de nervures saillantes, larges d'environ trois pouces. Un peu au dessous des fleurs est une foliole sessile, solitaire, oblongue, aiguë, très-entière, à peine longue d'un pouce. Les fleurs sont terminales, solitaires, de la grandeur de celles du *cypripedium calceolus*.

Cette plante se rencontre au Japon, où elle

flourit vers le milieu du printemps. (*Descript. ex Thunb.*)

6. SABOT à hampe nue. *Cypripedium acaule*. Aiton.

*Cypripedium minus pubescens, foliis ad imum caulem binis, oblongis, non acuminatis ; scapo nudo, unifloro ; laciniis calicis exterioribus lanceolatis ; caliceo purpureo*. Michx. Flor. boréal.-amer. vol. 2. pag. 161.

*Cypripedium acaule, radicibus fibrosis ; foliis oblongis, radicalibus*. Ait. Hort. Kew. vol. 3. p. 303. n°. 3.

*Helleborine calceolus, dicta mariana, foliis binis ; racine excavato productis ; flore purpureo*. Pluk. Mantill. pag. 101. tab. 418. fig. 1.

Cette espèce a des racines composées de quelques fibres, d'où s'élève une hampe nue, cylindrique, grêle, légèrement pubescente, garnie à sa base de deux feuilles radicales, ovales, oblongues, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, sessiles, amplexicaules à leur base, marquées de nervures simples, parallèles, longitudinales.

Cette hampe est terminée par une seule fleur, un peu penchée sur un pédoncule court, à la base duquel est une spathe étroite, lancéolée, rigide, d'une seule pièce. Le calice est divisé en cinq découpures, dont quatre sont ouvertes, plus grandes, lancéolées, aiguës ; la cinquième, renflée & creusée en sabot, est très-obtuse, un peu ovale, d'une belle couleur purpurine.

Cette plante croît dans l'Amérique. ♀

7. SABOT bulbeux. *Cypripedium bulbosum*. Linn.

*Cypripedium bulbosum sabrotundo ; folio sabrotundo, radiati*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 34. — Act. Upsal. 1740. pag. 25. — Flor. suec. 736. 821.

*Cypripedium folio sabrotundo*. Flor. lap. 319. tab. 12. fig. 5.

*Serapias scapo unifloro*. Gmel. Sibit. vol. 1. pag. 7. tab. 2. fig. 1.

*Orchis lapponensis, monofolia*. Rußb. Elyf. 2. pag. 209. fig. 10.

Cette espèce a pour racines une bulbe blanchâtre, arrondie, d'où sortent à la base plusieurs fibres épaisses, charnues, entortillées, confuses ; il s'en élève une tige fort tendre, droite, haute d'environ un demi pied, blanchâtre, un peu rougeâtre à sa partie supérieure, chargée, dans sa longueur, de quatre ou cinq petites feuilles courtes, en forme d'écailles, acuminées ; il n'existe qu'une seule feuille radicale, ovale, presque ronde, quelquefois d'une couleur blanchâtre en dessous, verte en dessus, les nervures presque en qua-

thille, supportée par un péiole à peu près aussi long que la feuille.

La tige ou hampe se termine par une seule fleur inclinée, munie d'une spathe simple, linéaire, lancéolée, purpurine. Le calice le divise en six découpures, dont cinq sont très-ouvertes, linéaires, lancéolées, panachées de pourpre & de blanc; la découpure inférieure, en forme de sabot, est un peu comprimée latéralement, purpurine en dehors, jaunâtre & marquée en dedans de lignes purpurines, concaves, grossièrement plissée à ses bords, & dont la lèvre supérieure est un peu arrondie, de couleur pourpre, légèrement échancrée.

Cette plante croît en Sibérie, sur les bords du fleuve Léna, où elle fleurit au commencement du printemps. (*Description ex Gmel.*)

**SABRE** (Feuilles en). *Acinaciformia folia*. Les feuilles prennent ce nom lorsque, considérées relativement à leur forme, elles sont allongées, un peu épaissies & charnues, ayant un de ses bords mince & tranchant, & l'autre épais & obtus, comme dans le *mesembryanthemum acinaciforme* Linn.

**SAFRAN**. *Crocus*. Genre de plantes monocotylédones ou unilobées, à fleurs lilacées, de la famille des iris, qui a quelques rapports avec les *wisifolia*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, dont les racines sont tubéreuses & tuniquées, les hampes simples, uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une spathe d'une seule pièce; une corolle tubulée, régulière, à six divisions; trois stigmates roulés en cornes; trois étamines; une capsule à trois loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Une spathe membraneuse, d'une seule pièce, qui tient lieu de calice.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, régulière, dont le tube est grêle, allongé, le limbe droit, partagé en six découpures ovales, oblongues.

3°. Trois étamines, dont les filamens sont subulés, plus courts que la corolle, insérés sur son tube, terminés par des anthers sagittées.

4°. Un ovaire inférieur, arrondi, surmonté d'un style filiforme, aussi long que les étamines, terminé par trois stigmates roulés en cornes, dentés en crête.

Le fruit consiste en une capsule ovale, à trois côtes, à trois loges, à trois valves, contenant plusieurs semences arrondies.

*Observations*. Ce genre est remarquable par les

trois stigmates qui terminent un style simple, roulés en cornes, épaissis insensiblement de leur base à leur partie supérieure, presque à deux lames, dentés, incisés ou multiarés à leur sommet.

Les safrans varient à l'infini, surtout par les nuances de leur corolle. On avoit d'abord rapporté toutes ces variétés à la même espèce, au safran cultivé. Il paroît néanmoins qu'on doit y distinguer plusieurs espèces, dont les types se retrouvent dans la Nature; quoique très-rapprochées, elles offrent des différences constantes dans les proportions de leurs parties; quelques-unes dans leurs couleurs & dans les diverses époques de leur floraison. Les meilleurs caractères consistent dans la longueur des stigmates, comparée à celle des étamines; dans la profondeur de leurs divisions; on peut y joindre la grandeur du limbe relativement à celle du tube, & les feuillets très-étroits, roulés à leurs bords, ou planes & un peu plus larges; la couleur jaune ou violette; la première, dans les variétés, ne passe point au violet, ni la seconde au jaune.

#### E S P È C E S.

1. **SAFRAN printanier**. *Crocus vernus*. Linn.

*Crocus flaminibus filis longioribus limbo parvo, tubo multo brevior. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 106. n°. 444. tab. 30. fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 33.*

*Crocus (vernus), stigmate trifido, corollâ brevior, erecto; foliis linearibus, planis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 195. n°. 2.*

*Crocus (fativus p. vernus), foliis latioribus, margine patulo. Linn. Syst. veget. pag. 83. — Curt. Magaz. tab. 45. — Jacq. Flor. austr. Append. tab. 26. — Berger. Phytogr. 2. pag. 195. Icon. — Mill. Dict. n°. 3. — Kniph. Centur. 1. tab. 31. — Blackw. tab. 144. fig. 2.*

*Crocus vernus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 50.

*Crocus vernus, latifolius; flore purpureo, magno. Tourn. Inst. R. Herb. 251. — C. Bauh. Pin. 65.*

*Crocus vernus, latifolius, purpureus; flore majore. J. Bauh. Hist. 2. pag. 640. Icon.*

*Crocus latifolius, purpureo flore, majore. Clus. Hist. 2c. 4. Icon.*

*Crocus vernum masicum. Clus. Pann. pag. 226. tab. 227.*

*Crocus vernus, flore purpureo, magno. Morif. Ox. Hist. 2. 6. 4. tab. 2. fig. 3 & 4.*

*Crocus montanus, vernalis. H. Eyster. Æstiv. 3. pag. 10. fig. 3.*

*Crocus, tubâ brevissimâ trifidâ. Haller, Helv. n°. 1257.*

g. Variétés

*g. Varietates numerosissima, floribus violaceis, luteis, albis, variegatis, &c. Tournet. &c.*

Ce n'est point ici l'espèce de safran connue dans le commerce, qui ne fleurit que dans l'automne, tandis que celle-ci fleurit au printemps, & qui de plus en est distinguée par les divisions plus courtes de son limbe, par les stigmates légèrement trifides, par les étamines plus longues que le pistil, & par les feuilles en général moins étroites & non roulées sur leurs bords.

Ses racines sont pourvues de plusieurs bulbes articulés ou d'une seule bulbe pleine, charnue, arrondie, revêtue d'enveloppes brunes, garnie de fibres qui se divisent en plusieurs filaments; elles produisent des feuilles toutes radicales, longues, étroites, glabres, linéaires, très-lisses, subulces, traversées dans leur longueur par une ligne blanchâtre, enveloppées à leur base par une gaine composée de membranes sèches, minces, transparentes, striées, tronquées obliquement à leur sommet, roulées les unes sur les autres.

Il s'en élève une ou plusieurs hampes simples, hautes de deux ou trois pouces, presque triangulaires, entourées à leur base d'une gaine très mince, longue, argentée; elles se terminent par une fleur assez semblable à celle du colchique, ordinairement d'un violet tendre, quelquefois mélangée de pourpre, blanche ou panachée. La corolle est composée d'une tube étroit, fort long, qui se dilate insensiblement vers son sommet, & se termine par un limbe campanulé, partagé en six découpures droites, elliptiques, lancéolées, beaucoup plus courtes que le tube, les trois intérieures plus petites. Les étamines, au nombre de trois, sont attachées à l'orifice du tube; leurs anthères sont jaunes, droites, sagittées, adnées aux filaments. Le style, plus long que le tube, beaucoup plus court que les étamines, se divise à son sommet en trois stigmates courts, un peu plus longs que les anthères, de couleur jaune, élargis vers leur sommet, à deux lames, dentés en crête. L'ovaire est oblong, à trois côtes, marqué très-souvent de six veines violettes; la capsule à trois loges & à trois valves.

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, en Italie, en Espagne & dans l'Atlas. (V. v.)

Les variétés innombrables que fournit cette jolie plante par le mélange agréable de ses couleurs, l'ont fait admettre comme plante d'ornement dans les parterres, où elle fleurit au printemps.

## 2. SAFRAN à fleurs jaunes. *Crocus luteus*, Lam.

*Crocus flaminibus pistillo longioribus; limbo magno, fere longitudine tubi*, Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 166. n°. 443.

*Crocus vernus, latifolius, flavus; flore majore*. Tourn. Instr. R. Herb. 352. — C. Bauh. Pin. 66.

Botanique. Tome VI.

*Crocus verni species flava*. J. Bauh. Hist. 2. p. 643.

*Crocus vernus, latifolius, flavo flore*. Clus. Hist. 205. 1c.

M. Lamarck a cru devoir distinguer cette plante comme une espèce différente du safran de printemps. En effet, les parties de la fructification n'ont point les mêmes proportions: le limbe de sa corolle est bien plus grand que dans le safran du printemps, & sa couleur est jaune & ne passe point dans les variétés à la couleur purpurine.

Ses racines ont des bulbes petites, arrondies, médiocrement comprimées: il en sort un grand nombre de feuilles radicales, étroites, lisses, planes, linéaires, subulées à leur sommet, plus longues que les corolles, munies dans leur milieu d'une nervure blanche, un peu filasseuse, médiocrement élargie; entourées à leur base d'une gaine membraneuse, souvent roussâtre ou brune, qui se divise à son sommet en deux ou trois lobes courts, obtus ou un peu aigus, quelquefois déchiquetés.

Du milieu des feuilles sortent plusieurs hampes à une seule fleur d'un jaune plus ou moins foncé, dont le tube est grêle, renflé vers son sommet, où il s'épanouit en un limbe à six découpures ovales, lancéolées, obtuses, droites, presque aussi longues que le tube; les étamines, beaucoup plus courtes que la corolle, sont plus longues que le pistil: celui-ci se divise en trois stigmates courts, inégaux, roulés en cornet, striés, épais à leur sommet, plissés & crépus.

Cette espèce fleurit au printemps. Elle croît dans les montagnes de la Suisse: on la cultive avec les autres espèces dans les parterres. (V. v.)

## 3. SAFRAN cultivé. *Crocus sativus*, Linn.

*Crocus flaminibus pistillo brevioribus, stylo apice profunde trifido*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 166. n°. 442. tab. 30. fig. 1. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 34. — Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 494. n°. 1095.

*Crocus stigmate tripartito, longitudine corollæ reflexo; foliis linearibus, marginè revolutis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 194. n°. 1.

*Crocus sativus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 70. — Blackw. tab. 144. — Bergert, Phytogr. 161. 1c.

*Crocus spathâ univelvi, radicali; corollæ tubo longissimo*. Linn. Spec. Plant. 36. — Mater. medic. pag. 43. — Millet, Dict. n°. 1.

*Crocus floribus fructui impositis, tubo longissimo*. Roy. Lugd. Bat. 41. — Hort. Upf. 15.

*Crocus flore fructui imposito*. Hort. Cliffort. 18.

*Crocus sativus*. Tournet. Instr. R. Herb. 350. — C. Bauh. Pin. 65. — Lobel. Icon. 137. — Dodon. Pempt. 213. Icon. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 637.

C c c

Icon. superior. — Camer. Epitom. 33. Icon. — Fusch. Hist. 441. Icon. — Marthiol. Comment. 71. Icon. — H. Eyll. Ed. 3. pag. 10. fig. 4. — Miller, Icon. tab. 111.

*Crocus autumnalis, fativus*. Motif. Oxon. Hist. 2. pag. 335. n°. 4. tab. 2. fig. 1.

*Crocus fativus Matthioli*. Dalech. Hist. 2. pag. 152. Icon.

Le SAFRAN. Regnault, Bot. Icon.

Espèce intéressante par la beauté de ses fleurs, & surtout par les propriétés économiques & médicinales, que l'on cultive en grand dans beaucoup de pays, & qui se distingue des autres espèces par l'époque de la floraison; du safran d'automne par la longueur du tube de la corolle, par sa couleur purpurine, par ses feuilles plus étroites, roulées à leurs bords.

Ses racines sont formées par une bulbe atrondia, de la grosseur d'une noisette, un peu comprimée, revêtue d'une pellicule brune & fibreuse: il en sort plusieurs fibres longues, & qui s'enfoncent assez profondément dans la terre. Il s'élève immédiatement de ces racines des feuilles longues de sept à huit pouces, très-étroites, d'un vert-foncé, un peu roulées à leurs bords, subulées, aiguës, traversées par une nervure blanche. Du milieu de ces feuilles sort une hampe courte, qui supporte une grande fleur d'un pourpre-clair, enveloppée à sa partie inférieure par une spathe très-mince, blanchâtre, d'une seule pièce, qu'il faut distinguer des membranes écailleuses qui entourent également les feuilles à leur base.

La corolle est composée d'un tube grêle, étroit, fort long, rétréci à sa partie supérieure, où il se dilate en un limbe divisé en six découpures droites, ovales, oblongues, un peu obtuses, bien plus courtes que le tube. Les étamines sont plus courtes que le pistil; elles ont des anthères jaunâtres, allongées, plus courtes que le limbe. L'ovaire est arrondi, surmonté d'un style grêle, blanchâtre, qui se divise à son sommet en trois stigmates odorans, médiocrement allongés, plus longs que les étamines, d'une belle couleur jaune-doré, incisés & renflés à leur sommet. Il leur succède une capsule ovale, oblongue, acuminée, à trois côtes, à trois valves, à trois loges, dans lesquelles sont renfermées des semences arrondies.

Cette plante croît naturellement dans l'Orient, l'Italie, la Sicile. On la cultive en grand dans la plupart des contrées méridionales de l'Europe; en France, dans plusieurs départemens, principalement dans le ci-devant Gâtinois. Ses fleurs ne se montrent que dans l'automne; elles paroissent seules, durent peu: après leur chute, les feuilles se montrent & subsistent une grande partie de l'hiver. (V. v.)

On ne se sert que des stigmates du safran qui en portent le nom, & pour lesquels seuls on le cultive. Ces stigmates desséchés entrent, comme assaisonnement, dans un grand nombre d'alimens qu'ils colorent: on les fait entrer dans les crèmes, les pâtisseries, les gâteaux de riz, de vermicelli, de pomme de terre, &c. ainsi que dans cette liqueur que l'on nomme *iscabac*. Le safran fournit aux teinturiers une belle couleur jaune, mais elle dure peu & coûte très-cher: les peintres en font usage pour laver leurs plans: les bulbes fournissent de l'amidon.

Mais l'usage le plus habituel du safran consiste dans son emploi en médecine. Les médecins font le plus grand éloge de ses propriétés. Elles résident principalement dans le principe subtil & pénétrant qui s'en dégage, & qui agit puissamment sur les nerfs & sur le cerveau, qu'il ébranle à la manière des narcotiques: de là vient ce sommeil profond, l'éthargie & même mortel qu'il produit sur les personnes qui respirent trop long-temps un air imprégné de ses parties odorantes; la gaieté & l'enjouement qu'il procure à ceux qui en usent sobriement; la folie, les ris immodérés & convulsifs qu'il excite dans ceux qui en abusent. On ne doit donc en user que modérément & à propos: une trop grande dose produiroit des accidens très-funestes. Quelques auteurs assurent que trois gros pourroient occasionner la mort; cependant son usage est si familier aux Polonois, qu'ils le mêlent souvent jusqu'à la dose d'une once dans leurs alimens; mais alors le safran devient pour eux ce que l'opium est pour les Turcs: un usage habituel & gradué en émousse l'activité.

Le safran est excitant & fort chaud; il n'agit pas seulement sur les nerfs; il porte encore son action sur les liqueurs & toutes les parties solides des corps animés; il excite un organe général, accélère la circulation, sollicite les sécrétions, porte fortement les sueurs à la peau, rétablit le flux menstruel, hâte l'accouchement & l'expulsion de l'arrière-faix, &c. On peut l'employer dans les affections hypocondriaques & hystériques, les maladies venteuses; contre les douleurs opiniâtres, les foiblesse d'estomac, l'insomnie, la toux, les suffocations, les spasmes, la cardialgie, la dysenterie, &c.; mais les personnes maigres, bilieuses & pléthoriques ne doivent en user qu'avec beaucoup de réserve. Sa dose en subsistance est depuis un grain jusqu'à cinq. On l'emploie dans les cataplasmes résolutifs: on le fait entrer dans les colyres, surtout pour préserver les yeux des suites de la petite vérole; on en prépare un sirop; il entre aussi dans la thériaque, dans la confécion d'hycinthe, les pillules dorées, &c.

La culture, la récolte & les maladies singulières du safran présentent des faits intéressans qui nous ont été fournis par Duhamel & plusieurs autres

cultivateurs. Pour cultiver le safran, on choisit un terrain bien uni & qu'on a laissé reposer pendant deux ans; on le labouré vers le second mois de printemps, en traçant des sillons très-ferres & très-profonds; on le fume bien & on l'entoure d'une haie fort épaisse pour écarter les bestiaux & principalement les lièvres. Au commencement de l'été, on plante les bulbes dans des trous à trois pouces de distance les uns des autres. Dès le premier mois de l'automne on s'arce les mauvaises herbes par un beau tems, de peur d'offenser les oignons, & avec la pioche on donne un troisième labour. Les terres dans lesquelles le safran se plaît le mieux sont les terres noires, légères, un peu sablonneuses; les rousfaires.

On donne le nom de *safranère* au champ dans lequel on cultive le safran. Une safranère bien ménagée peut durer trois ans: on prétend même qu'elle peut durer jusqu'à neuf, mais il est plus avantageux de lever les oignons de terre après leurs trois années de production. On les place dans un endroit sec, & on ne les replante pas dans la même terre; ce qui l'useroit trop. Elle a besoin avant, d'être bien réparée & suffisamment amendée. La première année on arpent produit au plus quatre livres de safran sec; mais à la seconde & à la troisième il en donne jusqu'à vingt. Quelques cultivateurs partagent en quatre parties le terrain qu'ils veulent mettre en safran, afin de faire plus commodément leur récolte, parce qu'une partie fleurit pendant qu'ils dépouillent l'autre.

Les fleurs du safran se montrent plus tôt ou plus tard, suivant que les automnes sont sèches ou humides, chaudes ou froides. Quand, au commencement de l'automne, il survient des pluies douces, & qu'il s'y joint un air chaud, les fleurs paroissent avec une abondance extraordinaire: tous les matins les champs semblent couverts d'un beau tapis gris-de-lin; c'est alors que les paysans n'ont de repos ni jour ni nuit; mais lorsqu'il survient des pluies & du vent, on en perd beaucoup. « Je me souviens qu'une année, dit M. Duhamel, il survint de fortes gelées avant que les premières fleurs eussent été épluchées, & que l'on fut près du quinze jours sans en voir paroître de nouvelles. On croyoit que la récolte étoit finie; mais le tems s'éclaircissant, les fleurs reparurent les unes après les autres. » Ordinairement la récolte du safran dure trois semaines ou un mois. Dans le fort de la récolte on recueille les fleurs soit le matin, avant qu'elles soient épanouies: celles du matin sont toujours plus fermes, car il paroît que le safran croît plus pendant la nuit que pendant le jour.

Lorsque les fleurs sont transportées à la maison, les femmes séparent adroitement le pistil de la fleur, évitant de le couper ni trop haut ni trop bas, afin de ne point laisser de blanc, & de ne point couper non plus au dessus de la division des stig-

mates. On distingue à ce petit bout blanc, lorsqu'il en reste, le vrai safran d'avec le *safranum* que les paysans y mêlent quelquefois. Les acheteurs redoutent surtout de trouver dans le safran des fragmens de pétales, parce que ces parties qui se moisissent lui communiquent une mauvaise odeur.

Dans le tems de la récolte on voit transporter dans les villes & villages voisins, où on ne recueille point de safran, des charrettes du safran à éplucher. A mesure qu'on l'épluche, il faut le faire sécher à un feu très-doux. Pour cet effet, dans le ci-devant Gâtinois, on le met sur des tamis de crin suspendus, au dessous desquels on place de la braise: la beauté du safran dépend de la manière dont il est desséché. Quand le safran est bien sec on le met dans du papier & dans des boîtes. Il faut cinq livres de safran vert pour en faire une livre de sec. Quand les paysans font pour le vendre, ils mettent leurs boîtes à la cave pour en augmenter le poids. Le prix du safran étoit fort cher autrefois: on le vendoit jusqu'à 60 francs la livre; il est aujourd'hui diminué d'environ deux tiers.

On distingue trois maladies principales & fort singulières qui attaquent les bulbes du safran, que l'on nomme le *fasset*, le *tacon* & la *mort*.

Le *fasset* est une sorte de production monstrueuse, en forme de navet, qui arrête la végétation de la jeune bulbe, dont elle s'approprie la substance: cette maladie devient en conséquence un obstacle à leur multiplication; mais on peut remédier à ce mal par l'amputation, lorsqu'on lève les pieds au bout de trois ans pour en séparer les bulbes.

Le *tacon* est une carie qui attaque le corps même de la bulbe, & qu'on ne se manifeste pas sur les enveloppes. Les bulbes sont plus sujettes à cette maladie dans les terres rousfaires. On enlève la partie cariée lorsque cette carie n'a pas pénétré trop avant.

La *mort* s'annonce par des symptômes bien singuliers; elle est, à l'égard de plusieurs plantes, ce que la peste est aux hommes & aux autres animaux. Elle attaque d'abord les enveloppes, qu'elle rend violettes & hérissées de petits filaments; elle pénètre ensuite jusque dans la bulbe qu'elle fait périr. On s'aperçoit aisément du désordre qu'elle y cause par l'état des feuilles qui jaunissent & se dessèchent.

Dès qu'une bulbe est atteinte de cette maladie, elle devient contagieuse pour les bulbes voisines: cette contagion se communiquant de proche en proche, elle fait périr toutes les bulbes dans un espace circulaire, dont la première bulbe atteinte est le centre & en même tems le foyer. Si l'on plante par mégarde une bulbe malade dans un champ sain, la maladie s'y établit en peu de tems, & elle y occasionne les mêmes ravages que nous venons de rapporter: une seule pelée de terre,



prise dans un endroit infecté, & jetée sur un champ dont les plantes sont saines, y porte la contagion.

On ne connoît point de remède pour les bulbes attequés de cette maladie : on fait seulement les en préserver par la même précaution qu'on emploie pour arrêter les progrès de la peste. Pour cet effet, on ouvre, autour des endroits infectés, des tranchées profondes d'un pied, & l'on jette la terre que l'on en tire sur celle où les oignons sont morts. Une circonstance bien remarquable, c'est que l'impression de cette contagion reste tellement adhérente au terrain de la safrannière, que les bulbes saines qu'en voudroit y planter au bout de douze, quinze & vingt ans, se trouvoient en peu de tems attequés de cette maladie.

Duhamel, si connu par la sagacité de ses observations, a découvert quelle étoit la vraie cause de cette maladie contagieuse : il a observé des corps glanduleux, ressemblant assez à de petites truffes, mais dont la superficie est velue : leur grosseur n'excède pas celle d'une noisette ; ils ont l'odeur du champignon ; les uns sont adhérens aux bulbes du safran, & les autres en sont éloignés de deux ou trois pouces. De ces glandes partent des filets ordinairement de la grosseur d'un fil fin, & de couleur violette, velus comme les corps glanduleux ; quelques-uns s'étendent d'une glande à l'autre ; d'autres vont s'insérer entre les régu-mens des bulbes, & partagent en plusieurs ramifications, & pénètrent jusqu'au corps de la bulbe sans paroître sensiblement y entrer. Ces observations prouvent que ces tubercules sont des plantes parasites, qui, comme les truffes, se multiplient dans l'intérieur de la terre sans se montrer à sa superficie. Cette plante parasite se nourrit aux dépens de la bulbe du safran, puisque ses racines pénètrent les enveloppes & s'attachent à sa propre substance : c'est le *tuber parasiticum* Bull., *sclerotium crocum* Persl.

Duhamel s'est assuré de la vérité de ce fait en plantant quelques tubercules de *mori de safran* dans des pots où il avoit planté, dans de la terre saine, des oignons de différentes fleurs : en un an, ces tubercules se sont multipliés dans le pot, & ont attaqué les oignons. Depuis ce tems, il a observé cette même plante parasite qui occasionnoit les mêmes ravages sur des hiebles, des anonis & des plants d'asperges. Cette petite truffe parasite n'attaque point les plantes annuelles, ni celles qui n'ont leurs racines qu'à la superficie de la terre.

Ces observations expliquent pourquoi la maladie s'étend circulairement, puisque les oignons ne sont attequés que par les racines de la plante parasite, qui étend ses racines circulairement. Il n'y a donc pas de meilleur moyen pour arrêter les progrès, que les tranchées faites circulairement.

#### 4. SAFRAN d'automne. *Crocus autumnalis*.

*Crocus spatha univalvi pedunculatâ, corolla tubo brevissimo.* Miller, Dict. n.º 2.

*Crocus juncifolius autumnalis, flore magno purpurascens.* Boeth. Ind. alt. 2. 120.

*Crocus silvestris autumnalis.* Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 335. §. 4. tab. 2. fig. 2.

*Crocus alpinus autumnalis.* Tournef. Inst. R. Herb. 350. — C. Bauh. Pin. 65.

*Crocus montanus autumnalis.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 646. — Lobel. Ic. 138.

*Crocus montanum, primum.* Clus. Hist. 209.

*Crocus silvestris autumnalis.* Dodon. Pempt. pag. 214. Icon.

*Crocus montanus Clusii.* Dal. Hist. 2. p. 1535. Ic.

Cette plante me paroît devoir être distinguée du safran cultivé par les proportions de ses fleurs, ayant le tube de la corolle fort court, & les divisions du limbe fort profondes.

Les bulbes de ses racines sont fort petites, arrondies, tortement comprimées ; elles produisent des feuilles toutes radicales, très-étroites, alongées, lineaires, subulves, à peine roulées à leurs bords ; enveloppées à leur base par plusieurs gaines sèches & membraneuses. De leur centre s'élève une hampe à une seule fleur, enveloppée avant son épanouissement par une spathe courte, d'une seule pièce, très-mince.

La corolle est grande, purpurine ou d'un bleu foncé. Son tube est grêle, bien plus court que le limbe, médiocrement élargi vers son sommet. Le limbe se divise en six grandes découpures droites, lanceolées, profondes, ordinairement terminées en pointe, quelquefois obtuses ; les élamines sont presque de moitié plus courtes que le limbe ; leurs anthères sont jaunes, étroites, alongées, lanceolées ; le style se divise à son sommet en trois stigmates très-longs, roulés en cornet, insensiblement renflés vers leur partie supérieure, crenelés ou dentés à leur sommet, plus longs que les élamines.

Cette plante ne fleurit qu'en automne. Elle croit en Suisse, sur les Alpes & dans les départemens méridionaux de la France. Je l'ai trouvée aux environs de Marseille. (V. v.)

#### 5. SAFRAN à stigmates déchiquetés. *Crocus multistidus*, Ram.

*Crocus flore aphylo, stigmatibus capillaceo multifidis.* Ramond. Buller. Philom. Thetmid. an 8. p. 129. n.º 41. tab. 8.

*Crocus pyrenaicum autumnale.* Clus. Cur. post. 23. & Append. alter. — C. Bauh. Pin. 65.

*Crocus montanus, autumnalis, violaceus, amplo flore, Belgarum.* Hort. Paris. 59. — Tournef. Inst. R. Herb. 350.

*Crocus autumnalis, flore violaceo.* Cistel. Reg. (ex herb. Vail.)

*Crocus (nudiflorus), stigma inclusis, trifido; lobis multifidis laciniatis; periculis formicis; flore aphyllis.* Smith. Flor. britan. vol. 1. pag. 41.

*Crocus nudiflorus.* Engl. Bot. tab. 491.

*Colchicum commune.* Deer. Not. 57.

Ce safran, d'après les observations de M. Ramond, diffère du safran d'automne par la brièveté & la division de ses stigmates, & par l'époque où ses feuilles se développent : il diffère du safran de printemps par une partie de ces mêmes caractères ; il n'appartient donc pas plus à l'une qu'à l'autre de ces espèces, & surtout il s'éloigne beaucoup du safran de printemps, quoiqu'Haller ait observé, dans les stigmates de ce dernier, une certaine disposition à se diviser en filaments lorsqu'ils ont atteint le dernier terme de leur développement.

Sa bulbe est petite ; elle produit ordinairement une seule fleur, toujours dépourvue de feuilles, elle est grande & belle. Son tube est recouvert, jusqu'aux deux tiers, par cinq ou six gaines membraneuses, lâches, blanchâtres, dont les trois premières partent des enveloppes de la bulbe, & les suivantes de la base de l'ovaire. Le limbe est grand, d'un beau violet ; les étamines plus courtes que les divisions ; le style est plus long que les étamines ; il est terminé par trois stigmates courts, inodores, de couleur orangée, divisés en filaments très-déliés, qui forment ensemble une petite houppe de l'aspect le plus élégant. Les feuilles ne paroissent qu'au printemps, tandis que les fleurs s'étoient montrées en automne ; elles sont ordinairement au nombre de trois, médiocrement longues, tout-à-fait linéaires, & semblables à celles du safran d'automne.

Cette plante croît dans les Pyrénées ; elle est très-abondante depuis les vallées jusqu'à deux mille mètres d'élevation ; elle commence à fleurir vers l'équinoxe d'automne. (Description ex Ram.)

**SAGINE.** *Sagina.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les *buzonia*, qui comprend des herbes fort petites, la plupart indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples & petites, les fleurs presque solitaires, axillaires ou terminales, longuement pédonculées ; les pétales caducs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre folioles ; quatre pétales ; une capsule à une seule loge, à quatre valves ; des semences nombreuses.

# CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à quatre folioles ovales, concaves, très-ouvertes, persistantes.

2°. Une corolle composée de quatre pétales ovales, ouverts, plus courts que le calice.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont capillaires, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, presque globuleux, surmonté de quatre styles subules, recourbés, pubescens, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule ovale, enveloppée par le calice ouvert, à une seule loge, à quatre valves, contenant des semences nombreuses, fort petites, attachées à un placenta central.

**Observations.** Les sagine sont de petites plantes rampantes ou peu élevées, qui se distinguent des *buzonia* par le grand nombre de leurs semences, les *buzonia* n'en ayant que deux, & par leur quatre styles. Ces mêmes divisions, ainsi que celles de leur calice & de leur corolle, les font également distinguer des *arenaria* & des autres genres de cette famille, desquels elles se rapprochent par leur port.

## ES P È C E S.

1. *SAGINE couchée.* *Sagina procumbens.* Linn.

*Sagina ramis procumbentibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 185. — Flor. lappon. 157. — Flor. succ. 148. 155. — Ard. Spec. 2. pag. 23. tab. 8. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 159. — Jacq. Vindeborn. 26. — Pollich. Pal. 178. — Lamarck. Flor. franç. vol. 3. p. 10. n°. 664. II. — Roth. Germ. vol. 2. pag. 71. II. 200. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. p. 360. n°. 1746. tab. 90. — Petiv. Herb. tab. 59. fig. 10. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 117. — Curtis, Lond. 158.

*Sagina foliis subulatis.* Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 402. n°. 2.

*Alfina tetraetemon, foliis lanceolatis, connatis.* Haller, Helv. n°. 861.

*Alfina floribus tetrandris, tetragynis ; caulibus diffusis.* Scop. Carn. 1. pag. 496. n°. 1.

*Alfina saxifraga, graminifolia ; floribus tetrapetalis, herbis & muscosis.* Pluken. Almag. pag. 23. tab. 74. fig. 2.

*Sagina scapis & ramis unifloris.* Guetard, Stamp. 2. p. 277.

*Alfinella muscosa flore, repens.* Diel. Gieff. 81. — Rai, Angl. 4. pag. 90.

*Alfina pusilla, graminea ; flore tetrapetalo.* Seguier.

Veron. pag. 421. tab. 5. fig. 3. — Lindern. Hort. alfar. tab. 8.

*Alfene minima, flore fugaci.* Rai, Suppl. 501. — Tournef. Inst. R. Herb. 243.

*Alfene littoralis graminea.* Botan. Monsp. 190.

β. *Saxifraga graminea, pusilla; foliis brevioribus, crassifloribus & succulentis.* Rai, Angl. 3. pag. 345.

Cette petite plante a le port d'un *arenaria*. Ses tiges sont nombreuses, toures étendues sur la terre, longues de deux ou trois pouces au plus, disposées en gazon, formant une rosette étalée, glabres, fort menues, plus ou moins rameuses, garnies de feuilles très-étroites, opposées, linéaires, aiguës, connées à leur base, plus courtes que les entre-nœuds, quelquefois un peu charnues.

Les fleurs sont solitaires, portées sur des pédoncules simples, axillaires ou terminaux, plus longs que les feuilles, fortement recourbés à l'époque de la maturité des fruits, uniflores, sésacés. Les calices sont glabres, divisés en quatre, quelquefois cinq folioles ovales, obtuses, glabres, courtes, verdâtres, un peu ouvertes après la floraison. La corolle est fort petite, composée de quatre à cinq pétales diaphanes, quelquefois nuls ou très-caducs, à peine de la longueur du calice. La capsule, un peu plus longue que le calice, est ovale, obtuse, & se divise en quatre valves membraneuses, obtuses. Elle renferme des semences nombreuses, fort petites, toulâtées.

Cette plante varie par son port, selon ses développemens; elle est plus ou moins rameuse: les fleurs sont quelquefois presque solitaires, terminales; d'autre fois il en existe plusieurs autres axillaires, dont les pédoncules sont inégaux: elles sont nombreuses sur certains individus. J'en ai recueilli un exemplaire aux environs de Montpellier, dont les tiges sont uniflores, les pédoncules très-longs, terminaux; les fleurs un peu plus grosses.

Cette espèce est très-commune sur les vieux murs, les terrains arides & sablonneux. Elle croit en Europe & dans la Barbarie. ○ (V. v.)

## 2. SAGINE droite. *Sagina arifolia*. Linn.

*Sagina caule erecto, subuniflora.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 185. — Pollich. Pal. 179. — Griseb. Flor. iten. in Nov. Act. R. N. C. vol. 4. Append. 274. — Hoffm. Germ. 59. — Lamarck. Flor. franç. vol. 3. pag. 9. n°. 664. l. — Roth. Germ. 1. pag. 72. — Il. 201. — Hoffm. Germ. 59. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 360. n°. 1748. — Gouan. Monsp. 77. — Oeder. Flor. dan. tab. 8. fig. 1.

*Sagina foliis linearis-lanceolatis.* Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 402.

*Sagina scapis unifloris.* Guettard, Stamp. 2. pag. 276. — Dalibard. Parif. 56.

*Alfene foliis caryophyllis.* Rai, Angl. 3. pag. 344. tab. 15. fig. 4.

*Alfene verna, glabra.* Tournef. Inst. R. Herb. 242. — Magnol. Monsp. 14. — Vaillant, Parif. pag. 6. tab. 3. fig. 2.

Cette espèce est facile à distinguer, non-seulement par son port, ses tiges n'étant jamais couchées, mais encore par ses calices roides, droits, très-aigus, & par ses pétales très-courts.

Ses racines sont composées d'un grand nombre de filamens capillaires, sésacés, touffus: il s'en élève plusieurs tiges, les unes simples, droites, uniflores; d'autres médiocrement rameuses ou dichotomes, grêles, filiformes, hautes de deux à quatre pouces, glabres, lisses, verdâtres; les rameaux sont très-ouverts, alternes, étalés, garnis de feuilles sessiles, opposées, connées à leur base, d'un vert presque glauque, & glabres à leurs deux faces, étroites, un peu graminiformes, aiguës.

La plupart des fleurs sont portées par de très-longs pédoncules droits, terminaux, presque solitaires; quelques-uns sont axillaires & beaucoup plus courts. Le calice est glabre, persistant, composé de quatre folioles droites, fermes, alongées, lancéolées, très-aiguës, blanchâtres & membraneuses à leurs bords. La corolle est fort petite, composée de quatre pétales très-minces, transparents, oblongs, étroits, qui manquent très-souvent, & qui persistent quelquefois avec les capsules: les étamines sont à peu près de la longueur de la corolle; l'ovaire ovale, presque rond, surmonté de trois à cinq styles: il lui succède une capsule ovale, très-glabre, au moins aussi longue que le calice, qui se divise à son sommet en six valves aiguës, & renferme des semences brunes, fort petites, attachées autour d'un placenta central, cylindrique, une fois plus court que la capsule.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux sablonneux & les bois. ○ (V. v.)

## 3. SAGINE apétale. *Sagina apetalis*. Linn.

*Sagina caule erectifusculo, pubescente; floribus alternis, apetalis.* Linn. Mantrif. p. 559. — Hoffm. Germ. 59. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 719. n°. 3.

*Sagina caule erectifusculo, dichotomo, subpubescente; floribus apetalis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 360. n°. 1747.

*Sagina caulibus erectis, radice annua, floribus apetalis.* Ard. Spec. 22. tab. 8. fig. 1.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du *Sagina procumbens*. Elle paroît tenir le milieu entre

cette espèce & le *Sagina erecta*. Elle diffère de toutes deux par ses riges légèrement pubescentes, & ses fleurs constamment sans pétales.

Elle s'élève peu : ses riges sont presque droites, un peu rameuses ou dichotomes : ses fleurs sont alternes, axillaires, dépourvues de corolle. Elle croit en Europe, particulièrement en France, en Italie, en Angleterre, &c. ○

#### 4. SAGINE fasciculée. *Sagina fasciculata*.

*Sagina caule repente, radicante, articulata; ramis suberectis; foliis spatulatis, subsessandis; pedunculis axillaribus, unifloris.* (N.)

Cette plante avoit été confondue avec plusieurs échantillons du *Sagina procumbens*, que j'avois recueilli en Barbarie. Un examen plus attentif m'a fait reconnoître qu'elle en étoit une espèce très-distincte, remarquable par ses riges plus longues, radicales; par ses feuilles fasciculées, même celles des rameaux, presque toutes unilatérales.

Ses racines sont blanchâtres, divisées en trois ou quatre fibres grêles, alongées, pubescentes, à peine garnies de chevelus. Elles produisent des riges nombreuses, inégales, disposées en un gazon touffu, rampantes, articulées, radicales à leurs articulations, longues de cinq à six pouces & plus, souples, fort grêles, glabres, filiformes. Chacune des articulations est chargée d'une touffe de feuilles d'où sortent autant de nouvelles riges ou rameaux, presque simples, également couchés, un peu relevés à leur partie supérieure, articulés, munis à leurs articulations inférieures de quelques membranes blanchâtres, écailleuses.

Les feuilles caulinaires sont fasciculées à chaque articulation, courtes, étroites, subulées, glabres à leurs deux faces, sigués, un peu courbées en arc, toutes tournées du même côté; quelquefois les dernières sont simplement opposées, connées à leur base, dépourvues de stipules, plus courtes que les entre-nœuds.

Les fleurs sont axillaires, terminales & latérales, supportées par des pédoncules simples, uniflores, capillaires, très-glabres, un peu plus longs que les feuilles. Le calice est glabre, petit, divisé en cinq folioles courtes, ovales, obtuses, un peu concaves, ouvertes, persistantes, réfléchies après la fécondation : les étamines sont de moitié plus courtes que le calice. La capsule est ovale, un peu plus longue que le calice, s'ouvrant en quatre valves membranées, obtuses, contenant des semences fort petites, attachées sur un placenta central.

Quoique je n'aie pu m'assurer du nombre des étamines & des styles, & que je n'y aie point observé de pétales, les détails que je viens de présenter sur cette plante me paroissent suffisants pour être autorisés à la rapporter aux *Sagina*.

J'ai recueilli cette espèce dans les lieux sablonneux, sur les côtes de la mer, dans le royaume d'Alger, aux environs de la ville de Bonne. & (V. v.)

5. SAGINE à feuilles de ceraille. *Sagina ceratoides*. Smith.

*Sagina caule diffuso, dichotomo; foliis spatulatis, obovatisque recurvis; pedunculis fruticosis, reflexis.* Smith, A&S. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 343. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. p. 718. n°. 1.

Cette espèce a le port d'un *crassium*, mais ses fleurs sont constamment à quatre divisions.

Ses riges sont nombreuses, diffuses, longues de six à sept pouces, cylindriques, presque glabres & fort grêles à leur partie inférieure, pubescentes & dichotomes à leur sommet, pâles & renflées à leurs articulations, divisées en rameaux alternes, étendus, garnis de feuilles opposées, ouvertes, molles, très-entières, ovales, réfléchies en dehors, pubescentes à leurs deux faces, plus pâles & un peu plus luisantes en dessous, marquées de veines droites & longitudinales : les intérieures spatulées, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures sessiles, en ovale renflées; les dernières ovales, sans stipules.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées dans la bifurcation des rameaux, d'abord presque sessiles, ensuite pédonculées; les pédoncules filiformes, pubescents, longs d'environ un pouce, réfléchis à l'époque de la maturité des fruits.

Cette plante croît dans les plaines sablonneuses & les fentes des rochers, sur les bords de la mer, en Ecosse. ○ (*Descript. ex Smith.*)

#### 6. SAGINE de Virginie. *Sagina virginica*. Linn.

*Sagina caule erecto, floribus oppositis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 185. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 719. n°. 5.

*Sagina affinis, planta minima, floribus albis.* Clavt. Mss. 649.

Ses riges sont droites, filiformes, hautes de trois à quatre pouces, garnies de feuilles opposées, écartées entr'elles, fort petites, subulées. Les fleurs sont terminales & opposées, quelques-unes pourvues de pédoncules propres. Leur calice est droit, à quatre divisions; la corolle composée de quatre pétales oblongs; les étamines au nombre de quatre; les filaments de la longueur du calice. L'ovaire n'a point de style; il est surmonté d'un stigmate obtus : il lui succède une capsule pyramidale, terminée en une sorte de bec, à une seule loge, renfermant des semences nombreuses.

Cette plante s'écarte des *Sagina* par le défaut de style & par un seul stigmate sessile. Elle croît sur

le bord des fontaines, parmi les mousses, dans la Virginie. (*Descript. ex Linn.*)

**SAGONE.** *Sagonea*. Genre de plantes dicotylédones, à fls. complètes, monopétalées, campaniformes, de la famille des liserons, qui a des rapports avec les *Hydrolea*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont simples, les feuilles alternes, les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle campanulée, à cinq lobes ; une capsule à trois loges, s'ouvrant transversalement ; cinq étamines ; trois styles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions oblongues, aiguës.

2°. Une corolle monopétale, campaniforme, dont le limbe se divise en cinq lobes courts, arrondis, aigus.

3°. Cinq étamines, insérées sur la base de la corolle, dont les filaments sont tubuleux, terminés par des anthères oblongues, courbées en demi-cercle, vacillantes, sillonnées à leurs deux faces.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté de trois styles, terminés par un stigmate capité.

Le fruit est une capsule à trois côtes, à trois loges s'ouvrant transversalement, & contenant un grand nombre de semences fort petites, attachées à un réceptacle central, à trois angles.

#### E S P È C E.

**SAGONE aquatique.** *Sagonea aquatica*.

*Sagonea foliis lanceolatis, alternis; floribus axillaribus, subracemosis.* (N.)

*Sagonea aquatica.* Aubl. Guian. vol. 1. pag. 285. tab. 111. — Lam. Illustr. Gener. tab. 212.

*Reichelia palustris.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1502.

Plante herbacée, qui produit de la même racine plusieurs tiges droites, simples, cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, garnies de feuilles alternes, lisses, vertes, étroites, lancéolées, presque sessiles, acuminées, rétrécies en pétiole à leur base, longues d'environ trois pouces, sur un de large au plus.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles, disposées en très-petites grappes, au nombre de trois ou cinq. Le calice est glabre, profondément découpé en cinq folioles vertes, lancéolées, aiguës. La corolle est bleue, d'une seule pièce,

campaniforme, partagée à son limbe en cinq lobes arrondis, égaux, courts, un peu aigus ; les filaments sont blancs, les anthères jaunâtres, vacillantes, bifides à leurs deux extrémités. L'ovaire est presque globuleux ; il se convertit en une capsule marquée de trois sillons, s'ouvrant transversalement en deux valves, divisée en trois loges séparées par des cloisons membraneuses ; les semences sont fort petites, attachées sur un placenta dans l'angle interne de chaque loge.

Cette plante croît à la Guiane, sur le bord d'un ruisseau qui coule dans une savanne située dans les déserts, entre la crique des Galibis & la rivière de Sinémari. Les Galibis la nomment *Jagoun-jagou*. (*Descript. ex Aubl.*)

**SAGOUER.** *Sagus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, ordinairement monoïques, de la famille des palmiers, qui a des rapports avec les *rotangs* (*calamus*), & qui comprend des arbres ou arbrustes exotiques à l'Europe, dont le tronc est terminé à son sommet par un faisceau de feuilles aïcées, les fleurs nombreuses, disposées sur un spadice rameux, écaillés.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs la plupart monoïques ; un calice double, l'extérieur à trois divisions squamiformes, l'intérieur à trois divisions plus longues ; point de corolle ; six étamines : dans les fleurs femelles, un ovaire ovale ; un seul stigmate obtus ; une noix presque globuleuse, couverte d'écaillés imbriquées du sommet vers la base.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées sur un régime ou spadice très-rameux, fort ample ; chacune des ramifications enveloppée par deux ou trois spathe partielles, s'ouvrant latéralement ; les fleurs mâles occupant la partie supérieure de ces rameaux ; les fleurs femelles placées à la partie inférieure.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice double, l'extérieur d'une seule pièce, à trois divisions, en forme d'écaillés ; l'intérieur à trois découpures plus longues que le calice extérieur, & regardées comme la corolle par quelques botanistes.

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne pour elle le calice intérieur.

3°. Six étamines, dont les filaments sont presque égaux, épais, terminés par des anthères droites.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice comme dans les fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Un seul ovaire ovale, surmonté d'un style filiforme.

filiforme, subulé, terminé par un stigmate simple, ovale, obtus.

Le fruit est une noix arrondie ou un peu ovale, foveau acuminée par la base persistante du stylet, couverte d'écaillés luisantes, imbriquées du sommet vers la base, à une seule loge, à une seule valve, renfermant une seule semence ovale-oblongue, ridée, lacuneuse, tuberculée d'une manière très-irrégulière : l'embryon est latéral, selon Gärtn.

**Observations.** M. Palisot-Beauvois a bien voulu me communiquer les observations qu'il a faites sur le *raphia*, qu'il a vu chez les Owarés. Il s'ensuit que les fruits de cet arbre, qui paroît être le même que celui qui croît à Madagascar, offrent quelques particularités remarquables, que je vais indiquer. Les fleurs mâles ont un triple calice; les deux extérieurs sont monophylles; le plus extérieur est anguleux, ouvert d'un seul côté; le second est plus petit, en forme de cupule; enfin, le troisième se divise en trois découpures coriaces, oblongues, presque ligneuses, égales, concaves, plus grandes que les deux autres calices.

On trouve dans Rumphius & quelques autres auteurs, plusieurs palmiers qui ont de grands rapports avec les sagouiers, qui peut-être appartiennent à ce genre; mais leur fructification ne nous est pas encore assez connue pour oser les y rapporter. Nous nous sommes bornés aux espèces suivantes.

#### ESPÈCES.

##### 1. SAGOUIER *raphia*. *Sagus raphia*.

*Sagus spadice ramosissimo, singulis floribus squamâ circulari cinctis, frondè pinnatâ.* (N.)

*Sagus palma-pinus.* Gärtn. vol. 1. pag. 27. tab. 10. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 771.

*Palma-pinus.* Lobel. Adverf. pag. 450. Icon. — Lobel. ic. 233. — Dalech. Hist. 2. pag. 1832.

*Raphia* (vinifera). *spadice ramosissimo, magno; singulis ramis spatâ duplici aut triplici inclusis; ramulis similiterque floribus squamâ circulari, annuliformi & friâ imbricatâ, alternatim egredientibus; frondè pinnatâ.* Palisot-Beauv. Icon.

*Exotici fructus seu arboris ramus, cum fructibus squamosis.* Clus. Cur. Post. 82. 84.

*Fructus peregrinus, abiegna noci persimilis.* *Palma-pinus, seu conferta.* J. Bauh. Hist. 1. pag. 398.

*Palma conferta.* Jonhst. Dendr. tab. 48.

*Areca seu faustil.* Beff. Mus. pag. 22. tab. 5.

*Yecoti.* Grew. Mus. pag. 200.

C'est un arbre d'une moyenne grandeur, dont le tronc est droit, cylindrique, très-simple, cou-

Botanique, Tome VI,

ronné à son sommet par une touffe de feuilles grandes, nombreuses, très-amplées, pinnées, pendantes, dont le pétiole commun est garni de petites épines presque dans toute sa longueur.

De la base de ces feuilles sortent & pendent de très-grands régimes ou spadices très-ramifiés, subdivisés en un grand nombre d'autres rameaux fertiles, rapprochés, inégaux, chacun d'eux environné de deux ou trois spatules partielles, courtes, cuneiformes, comprimées, tronquées, fendues longitudinalement à un de leurs côtés. Les fleurs sont sessiles, & disposées alternativement sur chacune des divisions du spadice, enveloppées à leur base par une sorte d'écaïlle circulaire, dure, coriace, un peu jaunâtre, lisse, presque luisante; ces écaïlles sont imbriquées, & recouvrent les rameaux dans toute leur longueur.

Les fleurs mâles, situées sur les mêmes régimes que les fleurs femelles, en occupent la partie supérieure; elles sont très-nombreuses, persistent pendant quelque temps, & tombent enfin à la maturité des fruits, qui forment par leur ensemble, leur rapprochement & leur nombre, une grosse touffe ovale, serrée, composée de baies sèches, presque ovales, luisantes, écaïllées; les écaïlles sont très-serrées, fortement imbriquées du sommet vers la base, ovales, obtuses.

Cet arbre croît dans différentes contrées de l'Inde, au Malabar, à l'île de Madagascar, en Afrique, dans les royaumes d'Oware & de Bénin, sur le bord de toutes les rivières. (V. f.)

« C'est, dit M. Palisot-Beauvois, une des productions les plus communes, mais c'est aussi une des plus utiles pour les habitants des pays où elle croît. Les peuples des royaumes d'Oware & de Bénin en font un grand usage. Les feuilles leur servent à former des palissades, des entourages, les murs & les couvertures de leurs maisons. Les femmes, après avoir tourné toutes les folioles des feuilles d'un même côté, réunissent cinq ou six feuilles par leurs côtes, qu'elles attachent avec des lianes. Les hommes fixent ensuite ces espèces de faisceaux à des poteaux placés à une distance convenable à la longueur de ces feuilles, & les plaçant les uns sur les autres, en commençant, comme nos couvreurs, par en bas, ils fabriquent des espèces de murs très-épais, à l'abri des injures de l'air & du soleil, mais qui, d'un autre côté, deviennent le repaire des rats, qui fourmillent dans ces contrées, & des serpents qui leur font la chasse. Les couvertures se font de même; & pour empêcher que le vent ne soulève toutes ces folioles, qui forment une forte épaisseur, ils les attachent avec des lianes.

« Ils retirent du tronc, comme dans d'autres contrées on le fait du palmier à vin, une liqueur très-agréable, qu'ils appellent *boudon*; mais les

D d d

Owars ayant, comme tous les peuples peu civilisés, un goût particulier, dominant & déformé pour les liqueurs fortes, ils ont trouvé le moyen (qui peut-être leur a été indiqué par les Portugais lorsque ceux-ci ont voulu s'établir parmi eux) de faire fermenter les semences dépourvues de leur enveloppe écaillée, & d'en extraire une liqueur très-spiritueuse, très-forte, & qui enivre aisément, mais qui n'est pas tout-à-fait aussi agréable au goût que celle qui est extraite directement de la sève de l'arbre. »

Cet arbre fournit cette substance connue sous le nom de *sagou*; mais il n'est pas le seul: un grand nombre de palmiers en donnent également en plus ou moins grande abondance. On retire le *sagou* particulièrement de la moëlle du tronc, qui est plus ou moins transparente, blanche & fongueuse, suivant l'âge de l'arbre. Les habitants l'émouvent après avoir fendu l'arbre dans sa longueur; ils écrasent cette moëlle, la mettent dans une espèce de cône on d'entonnoir fait d'écorce d'arbre, assujéti sur un tamis de crin; ils la délaient avec beaucoup d'eau. Ce fluide entraîne, par les trous du ramis, la portion la plus fine & la plus blanche de la moëlle; la partie fibreuse reste sur le tamis.

L'eau chargée de la partie la plus atténuée de cette moëlle est reçue dans des pots, & elle y dépose peu à peu la séculé qui en troublait la transparence. On décante l'eau éclaircie, & on passe le dépôt à travers des platines perforées, qui lui donnent la forme de petits grains, sous laquelle le *sagou* nous parvient. La couleur rousse qu'ils offrent à leur surface est due à l'action du feu sur lequel on les a fait sécher. Ces grains se ramollissent & deviennent transparents dans l'eau bouillante. On en forme, avec le lait ou le bouillon, une sorte de potage léger & assez agréable, qu'on a fort recommandé dans la phthisie.

Le *sagou* est donc un véritable amidon, auquel on peut très-bien substituer celui de pommes de terre: ses qualités sont très-indépendantes de sa forme. Quand on veut faire cuire ce *sagou*, on en met environ une cuillerée à bouche dans un poëlon, pour le délayer peu à peu dans une chopine d'eau chaude ou de lait; on place ce poëlon sur un feu doux, & on remue sans discontinuer pendant une demi-heure ou environ: on y ajoute du sucre, des aromates, de l'eau de fleurs d'orange, &c.

Dans les îles Moluques, aux Manilles, aux Philippines, on forme aussi avec la pâte molle du *sagou*, des pains mollets de demi-pied en carré, & d'un doigt d'épaisseur. On en attache, en forme de chapelet, dix ou vingt ensemble, & on les vend ainsi par les rues des villes & faubourgs d'Amboine.

Les habitants de cette contrée font encore une

espèce de *poudingue*, assez agréable pour les convalescens, avec cette pâte encore molle, mêlée de jus de poisson & de suc de limon, avec quelques autres aromates.

## 2. SAGOUIER farineux. *Sagus farinifera*.

*Sagus spinis longissimis, spadice maximo, ramis divergentibus, longissimis; fructibus ovatis, (N.)*

*Sagus farinifera*. Gært. de Fruct. & Sem. plant. vol. 2. pag. 186. tab. 120. fig. 3.

*Sagus longispina*. Rumphius, Amboin. vol. 1. pag. 75.

*Mitroxylon*. Rottb. Nov. Aët. Dan. 2. pag. 525. tab. 1.

C'est un arbre dont le tronc est court, peu élevé, presque lisse, couronné à son sommet par une touffe de feuilles très-amples, ailées, divisées en folioles longues, très-étroites, vertes & glabres à leurs deux faces, très-lisses, aiguës, armées sur leurs pétioles de très longues épines, rares, caduques.

La spathe qui enveloppe les régimes est grande, chargée d'épines caduques; le régime très-ample, extrêmement rameux dès la base; les rameaux divergens, très longs, de dix à douze pieds, leurs divisions longues d'un pied & demi environ; comprimés, couverts d'écaillés simples, tronquées, de deux pouces de long, alternativement distiquées: de chacune d'elles sort un chaton divariqué, cylindrique, sessile, tomenteux, long de six à huit pouces, imbriqué d'écaillés coriaces, nombreuses, qui recouvrent entièrement des fleurs fort petites, nombreuses, dont beaucoup avortent.

Les fleurs, d'après Rottboll, sont hermaphrodites: leur calice est divisé en six découpures, dont trois intérieures plus longues; elles renferment six étamines non saillantes, les filamens concaves, élargis à leur base; les anthères sagittées & conniventes. L'ovaire est surmonté d'un seul style droit, d'un stigmate épais. Le fruit est une noix assez grosse, de la forme d'un œuf de poule, couverte d'écaillés luisantes, imbriquées du sommet vers la base, coriaces, d'un jaune clair, souvent blanchâtres & membranées à leurs bords, presque triangulaires, marquées extérieurement, dans leur milieu, d'un sillon longitudinal: elle renferme une seule semence dure, ovale; caractère qui ne permettrait pas de réunir cette espèce aux *calamus*, quand bien même il seroit très-certain que toutes les fleurs sont hermaphrodites.

Cet arbre croît dans les Indes. Son tronc contient une moëlle farineuse, qui est un aliment très-sain quand elle est recueillie avant la floraison. On retire aussi du *sagou*, ainsi que de beaucoup d'autres palmiers. (V. f. in herb. Juss.)

3. SAGOUÏER bache. *Segou americana*.

*Segou caule excelso, subtriangulari; foliis flabelliformibus, longissimis; fructibus subglobosis. (N.)*

Le bache. Aubl. Guian. Append. 103.

Quoique nous n'ayons sur cette belle espèce de palmiers que le peu de détails que nous en a donnés le botaniste Aublet, elle a tant de rapports avec le genre dont nous traitons, que nous avons cru devoir le mentionner ici. Nous nous bornons à ce qu'en a dit Aublet.

« Le bache, dit cet auteur, est le seul palmier que j'aie rencontré de son espèce. Son tronc est fort, très-dur; ses fibres longitudinales sont noires & solides; il s'élève à trente pieds, sur deux pieds & plus de diamètre; il est comme triangulaire. Ses feuilles sont en éventail, d'une grandeur & d'une largeur considérables; elles ont cinq pieds environ de diamètre.

« Les fruits sont portés sur un régime très-branché & fort grand; ils sont de la grosseur d'une moyenne pomme & rougeâtres; c'est une coque muqueuse, lisse, comme vernissée, ferme, couverte d'écaillés qui imitent à peu près celles de la pomme de pin dans sa jeunesse.

« Dessous cette coque est une grosse amande, dont la nation des Maïes fait du pain qui sert à sa nourriture. Le tronc du palmier-bache résiste à la hache par sa dureté; il est employé par ces mêmes peuples dans la construction de ses canots; les feuilles leur servent à couvrir ces canots, afin de les agrandir. Ces Maïes tirent des feuilles tendues un fil très-fin, avec lequel ils fabriquent des hamacs & des pagnes. Cet arbre est précieux à cause de son utilité. Lorsqu'on vient à se perdre dans les déserts, & que l'on rencontre ces arbres, on se trouve préservé de la famine. Les perroquets sont très-frands de son fruit; tous les matins ils se rendent sur ces palmiers; c'est aussi les lieux où les Carabes leur tendent des pièges. »

Cet arbre croît principalement sur le bord des rivières, des ruisseaux, dans les cantons marécageux de la Guiane. ¶

SAINTFOIN. *Hedyfarum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs papilionacées, de la famille des légumineuses, qui a de grands rapports avec les *aschinomene*, & qui comprend des herbes, quelques arbrustes exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont simples, ou géminées, ou ternées, ou ailées avec une impaire, munies de stipules séparées des pétioles; les fleurs axillaires ou terminales, solitaires ou paniculées, ou en épis, très-souvent garnies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; la carène obtuse & comprimée; une gousse articulée; les articulations planes, à une seule semence; dix étamines diadelphes.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, d'une seule pièce, divisé, jusque vers son milieu, en cinq découpages droits, subulés.

2°. Une corolle papilionacée, dont l'étendard est réfléchi, comprimé, ovale-oblong, émarginé; les ailes droites, oblongues, très-étroites; la carène droite, comprimée, en partie buse.

3°. Dix étamines diadelphes, dont les filaments sont réunis en un seul corps, ou un filament séparé des autres; courbés, terminés par des anthères comprimées, arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, grêle, linéaire, comprimé, surmonté d'un style subulé, incliné, terminé par un stigmate très-simple.

Le fruit est une gousse composée d'articulations arrondies ou de forme variée, plus ou moins comprimées, à une seule semence, à une, quelquefois à deux valves.

Observations. Ce genre est solemment distingué des *aschinomene*. Dans ces dernières, les gousses ne doivent être sinuées ou échinées que d'un seul côté, c'est-à-dire, que les formes des articulations ne sont prononcées qu'à leur côté extérieur, tandis que l'intérieur est droit, linéaire. Ce caractère s'évanouit par des nuances si insensibles, qu'il est impossible de trouver des limites entre ces deux genres.

Quant à celui dont il est ici question, en y comprenant les *aschinomene*, je ne lui trouve aucun caractère tranchant. Il faut d'abord en écarter le calice & la corolle, dont les différences ne peuvent être ici employées que comme des caractères spécifiques. Les calices sont, les uns d'une seule pièce, courts, campanulés ou prolongés en tube, à cinq dents plus ou moins courtes, égales ou inégales; les autres profondément divisés, jusqu'à leur moitié ou jusqu'aux trois quarts, en cinq découpages profondes, lancéolées, très-inégales, formant quelquefois deux lèvres.

La corolle varie par la forme, & surtout par la proportion relative de ses pétales. La plus remarquable est celle des deux ailes, souvent très-courtes, à peine aussi longues ou plus courtes que le calice, d'autres fois égalant presque la carène; l'étendard est tantôt plus long, tantôt plus court que la carène. Il est donc évident, d'après ces



dét. ils, qu'on ne peut établir aucun caractère générique sur ces deux parties de la fleur, le calice & la corolle : il ne faut pas compter d'ailleurs sur celles de la fécondation.

Le fruit nous reste donc seul pour fixer nos idées sur ce genre : mais on y a mis si peu d'importance, qu'on a réuni dans un même genre des plantes qui auroient dû être séparées, d'après la forme de leurs gouffes : ce travail nous étoit interdit, d'après la forme de cet ouvrage. Nous nous bornons donc à en présenter ici les bases.

Tournefort avoit, avec beaucoup de raison, séparé les *hedyfarum* des *onobrychis*. Ces deux genres sont faciles à établir, en rangeant parmi les *onobrychis* toutes les espèces dont les gouffes sont inarticulées, un peu renflées, souvent hérissées de pointes, à une seule loge, à une seule valve, renfermant une seule semence.

Parmi les espèces d'*hedyfarum* inarticulées, il en est qui ont une gouffe à deux valves plus ou moins comprimées, sans aiguillons ; elles entreront, ou dans les *halimolobos* de Thunberg, ou dans les *lespedeza* de Michaux, ces deux genres devant être réunis, les gouffes étant bivalentes dans l'un & l'autre.

Quant aux espèces d'*hedyfarum* dont les gouffes sont articulées, on séparera :

1°. Celles qui ont une gouffe cylindrique, dont les articulations, quoique très-séparables, n'offrent aucun rétrécissement sensible au point de leur contact.

2°. Celles qui, avec ce dernier caractère, c'est-à-dire, sans rétrécissement, sont plates, comprimées, linéaires.

3°. Celles qui sont échanquées, ou dont les formes ovales, anguleuses, elliptiques ne sont prononcées que d'un seul côté.

4°. Celles qui sont échanquées à leurs deux côtés, lobées ou sinuées.

Ainsi les deux genres *aschinomene* & *hedyfarum* sont susceptibles d'être divisés au moins en six genres : les espèces deviendroient plus aisées à reconnaître, & elles offriroient presque dans chacun de ces genres les mêmes sous-divisions que les *hedyfarum* : feuilles simples, feuilles tectées, feuilles ailées.

M. de Jussieu a préparé à ce sujet un beau travail, dont les bases sont appuyées également sur la forme des gouffes. Il seroit à désirer, pour les progrès de la science, que ce célèbre professeur voulût bien faire connaître le résultat de ses observations.

On trouvera à l'article *Sesbana* l'*aschinomene serban*, *grandiflorus*, &c. de Linné, dont les gouffes

sont longues, étroites, cylindriques, presque inarticulées, les calices à cinq dents courtes, égales.

## ESPÈCES.

### \* Feuilles simples ou conjuguées.

#### 1. SAINFOIN agul. *Hedyfarum alhagi*. Linn.

*Hedyfarum foliis simplicibus, lanceolatis, obtusis ; caule fruticoso, spinoso*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1051. — Gronov. Orient. 228. — Gmel. Iter 2. tab. 29. — Miller, Dict. n°. 18. — Lerche, in Nov. Act. A. N. C. vol. 5. Append. pag. 167. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1171. n°. 1.

*Genista, spartium spinosum, foliis polygoni*. C. Bauh. Pin. 394.

*Alhagi Maurorum*. Tourn. Infl. R. Herb. Corol. 54. tab. 483. — Rauholf. Itin. pag. 94. tab. 94.

*Genista spinosa, flore rubra*. Wheel. Itin.

C'est un joli arbrisseau, qui s'élève à la hauteur d'environ trois pieds, sur des tiges glabres, cylindriques, divisées en rameaux droits, nombreux, étalés, presque glabres, garnis de feuilles simples, alternes, ovales, lancéolées, légèrement pubescentes, d'un vert-pâle, orbiculées à leur sommet, rétrécies à leur base, supportées par des pétioles très-courts, munis à leur base d'aiguillons étroits, alongés, fort aigus, inégaux, subulés, un peu bruns ou rougeâtres, d'un blanc-jaunâtre à leur sommet.

Les fleurs naissent en petites grappes très-nombreuses, latérales, un peu pendantes sur des pédoncules glabres, striés, chacune d'elles pédonculée, distante. Le calice est court, de couleur cendrée, ferme, persistant, presque campaniforme, tronqué à son orifice, ou à peine marqué de cinq petites dents à peine sensibles, dont une supérieure plus large. La corolle est d'une belle couleur pourpre dans son centre, rougeâtre sur ses bords ; le style est court, subulé, aigu ; l'ovaire oblong, très-étroit : il lui succède une gouffe composée de plusieurs articulations glabres, nues, ovales, globuleuses, petites, à peine légèrement comprimées, rapprochées ou plus souvent très-distantes, recourbées ; elles sont univalves, à une seule loge, & renferment une semence un peu réniforme.

Cette plante croît dans la Syrie, la Perse, la Tartarie. Sa culture dans les jardins d'Europe exige des soins, & on réussit bien difficilement à en obtenir des fleurs & des fruits. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

Toutes les parties de cette plante, surtout ses rameaux & ses feuilles, sont chargées, dans les grandes chaleurs de l'été, d'une liqueur grasse & onctueuse, qui a la consistance du miel. La fraîcheur de la nuit la condense, & la réduit en forme

de grains que l'on nomme *manne d'ahagi*, & que les naturels du pays appellent *trangebin*. On réunit ces grains, qui sont de la grosseur des semences de la coriandre, & on en forme des pains assez gros, d'une couleur jaune foncée. On prétend que trois onces de cette manne, dans une infusion de séné, purgent très-bien; elle est cependant inférieure en bonté à celle de la Calabre.

2. SAINFOIN à feuilles de buplèvre. *Hedysarum bupleurifolium*. Linn.

*Hedysarum foliis simplicibus, lanceolatis, acutis; caule inerari, stipulis scariosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1051. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1171. n°. 2.

*Ornithopodium madraspatanum, bupleurifolio*. Petiv. Gazoph. 18. tab. 11. fig. 12.

*Scorpioides madraspatan, graminis leucanthemifolia, siliquis noasif*. Pluken. Amalth. pag. 189. tab. 443. fig. 5.

Cette plante a des rameaux grêles, fort longs, effilés, alternes, écartés, presque herbacés, glabres, striés, presque glauques, garnis de feuilles alternes, fort distantes, légèrement pétiolées, lancéolées, étroites, longues d'un pouce & plus, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, finement réticulées, d'un vert-tendre, souvent réfléchies sur leur pétiole, qui est très-court, articulé tant à sa base qu'à son sommet, garni de stipules scarieuses, très-minces, droites, vaginales, bispides, striées, aiguës, à peu près de la longueur des pétioles; elles sont déchiquetées, & plus nombreuses à l'insertion des rameaux axillaires.

Les fleurs forment de longs épis grêles, presque filiformes à l'extrémité des rameaux, supportées par un pédoncule commun, droit, long de six à huit pouces, glabres: les fleurs y sont rangées alternativement, fort distantes, surtout les inférieures; appliquées contre le pédoncule, les unes sessiles, les autres pédicelées, solitaires ou deux par deux, garnies à leur base de bractées en forme d'écaillés sèches, ovales, aiguës. Le calice est composé de cinq folioles lancéolées, acuminées, verdâtres, striées, membraneuses à leurs bords. La corolle est petite, purpurine, à peine aussi longue que le calice. Il lui succède une gousse droite, allongée, très-glabre, articulée, chaque articulation ovale, mais tronquée à ses deux extrémités, à une seule loge, à une seule semence.

Cette plante varie, selon Linné, à feuilles lancéolées & à feuilles oblongues, en cœur. Elle croit dans les Indes. (*V. f. in herb. Lam.*)

Observations. Willdenow cite une plante qu'il possède des Indes, & qui diffère de celle-ci par des feuilles oblongues, lancéolées, aiguës; par des sti-

pules linéaires, lancéolées, scarieuses, plus longues que les pétioles; par les dents du calice allongées, linéaires, lancéolées, ciliées à leurs bords. Il n'a point vu les fruits. Il est à remarquer que, dans l'espèce que j'ai décrite d'après un individu sec, le calice est remarquable en ce qu'il est découpé en cinq folioles, & non pas denté.

3. SAINFOIN à feuilles de gramin. *Hedysarum gramineum*. Retz.

*Hedysarum foliis simplicibus, linearis lanceolatis; stipulis scariosis, racemis natis, pedicellis bifidis, dentibus calicis barbatis*. Retz. Obferv. 5. pag. 26. — Wendl. Hort. Herrenhuf. 1. pag. 7. tab. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1172. n°. 3.

Arbrisseau dont les tiges sont roides, cylindriques, rameuses, articulées, garnies de feuilles alternes, simples, pétiolées, longues de deux pouces, larges d'environ une ligne & demie, linéaires, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières, acuminées à leur sommet, supportées par des pétioles courts, de couleur brune, munis à leur base de deux stipules scarieuses lancéolées, acuminées; deux autres sont également appliquées à chacune des articulations des tiges, & se convertissent en fibres lorsque les rameaux sont vieux.

Les fleurs forment des grappes droites, nues, allongées, sur lesquelles les pédoncules partiels sont distans, uniflores, réunis deux par deux. Les calices sont tubulés, anguleux, scarieux, divisés à leur orifice en cinq dents subulées, barbues intérieurement. La corolle est petite & purpurine; les gousses composées de plusieurs articulations, de quatre à cinq & peut-être davantage, glabres, convexes, mucronées.

Cette espèce se rencontre dans les Indes orientales & à Tranquebar. Tj (*Descript. ex Retz.*)

4. SAINFOIN glumacé. *Hedysarum glumacum*. Vahl.

*Hedysarum foliis simplicibus, lanceolatis; stipulis calicibusque scariosis, leguminibus rugosis*. Vahl. Symb. 1. pag. 54. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1172. n°. 4.

*Hedysarum (violacum), folia simplicia, linearis; caule annuo, procumbente*. Forskh. Flor. ægypt-arab. pag. 136.

Ses tiges sont presque ligneuses, glabres, cylindriques, rameuses, couchées, effilées, longues d'un pied environ; divisées en rameaux courts, alternes, garnies de feuilles simples, médiocrement pétiolées, alternes, ovales, lancéolées, acuminées, longues d'un pouce, glabres à leurs deux faces; munies à la base de leur pétiole de stipules scarieuses, lancéolées, ovales, de la longueur des pétioles.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, allongées, sur lesquelles ces fleurs sont rangées deux à deux, ou solitaires, alternes. Leur calice est divisé en cinq découpures scarieuses, striées, chargées de poils, tant à leurs bords qu'à leur sommet. La corolle est violette; les gouffes articulées, longues d'un pouce, composées de quatre ou six articulations presque rondes, ridées, comprimées, terminées par le style persistant & subulé.

Cette plante se rencontre dans l'Arabie heureuse. *(Descript. ex Vahl.)*

5. SAINFOIN ridé. *Hedysarum rugosum*. Willd.

*Hedysarum foliis simplicibus, linearilanceolatis; stipulis calicibusque scariosis; caule erectiusculo, piloso; tomenti articulis transversim rugosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1172. n°. 5.

Cette espèce paroît avoir de grands rapports avec *Hedysarum glumaceum*, dont elle diffère par ses feuilles pubescentes & ciliées, par les longues stipules.

Ses tiges sont glabres, cylindriques, munies de quelques poils diffus, d'un léger sillon longitudinal, hautes d'un pied & demi, garnies de feuilles simples, alternes, pétioles, longues d'un pouce & demi ou deux pouces, linéaires, lancéolées, entières, obtuses & mucronées à leur sommet, légèrement pubescentes en dessous, ciliées à leurs bords, munies à la base de leurs pétioles destipules membraneuses, oblongues, lancéolées, acuminées, presque d'un pouce de long, plus longues que les pétioles.

Il sort de l'aisselle des feuilles & de l'extrémité des rameaux, des grappes longues d'environ un demi-pied lorsqu'elles sont terminales, de moitié plus courtes quand elles sont axillaires, les fleurs réunies deux par deux & supportées par des pédoncules partiels, capillaires. Leur calice est profondément divisé en cinq découpures linéaires, lancéolées, striées, ciliées à leurs bords. Les gouffes sont courtes, composées de quatre ou cinq articulations arrondies, comprimées, à rides transverses, saillantes, terminées par le style persistant.

Cette plante croît dans la Guinée. *(Descript. ex Willd.)*

6. SAINFOIN hérissé. *Hedysarum erinaceum*.

*Hedysarum foliis simplicibus, orbiculatis; stipulis minimis; pedunculis axillaribus, subracemosis; leguminibus inarticulatis, monospermis, recurvis, aculeatis, villosis*. (N.)

Cette plante, qui s'offre sous l'aspect de l'*Hedysarum moniliforme*, au point de s'y méprendre, en est bien distincte par les gouffes à une seule articulation arquée, hérissée d'aiguillons & velue.

Ses racines sont dures, petites, fibreuses, d'un brun-noir. Il s'en élève une tige qui se divise presque dès son origine en rameaux couchés, longs de quatre à cinq pouces, presque simples, herbacés, un peu cylindriques, à deux ou trois angles, légèrement pubescents, garnis de feuilles simples, alternes, pétioles, petites, orbiculaires, un peu rétrécies en coin à leur base, arrondies à leur sommet, entières à leurs bords, presque charnues, vertes à leurs faces, légèrement hispides, supportées par des pétioles très-courts. Les stipules sont scarieuses, blanchâtres, extrêmement petites.

Les pédoncules sont axillaires, plus courts ou à peine aussi longs que les feuilles; ils se terminent par une petite grappe ou épi composé de quatre à cinq petites fleurs pédiculées, pendantes, alternes, dont le calice est court, velu, divisé à son orifice en cinq dents aiguës. La corolle, à peine plus longue que le calice, est très-ouverte, une étamine est séparée des neuf autres; son anthère est grosse, oblongue. Le fruit est une gouffe courte, poir articulée, à une seule sémence; un peu comprimée, velue, hérissée d'aiguillons inégaux; ceux de la carène plus longs que les autres, un peu courbés en crochet; celui du sommet, droit, subulé, allongé; cette gouffe est plus ou moins courbée en demi-cercle, arrondie à son côté opposé.

Cette plante a été recueillie dans les Indes par M. Sonnerat, qui en a communiqué un exemplaire à M. Lamarck. (*V. f. in herb. Lam.*)

7. SAINFOIN en chapelet. *Hedysarum moliniferum*. Linn.

*Hedysarum foliis simplicibus, orbiculatis; leguminibus moniliformibus, globoso articulatis*. Linn. Mantiss. 102. — Burm. Flor. ind. tab. 52. fig. 3.

*Hedysarum foliis elliptico-subrotundis, subius pubescentibus; stipulis scariosis; petiolo longioribus; articulis lomentis globosis, pubescentibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1173. n°. 7.

Cette espèce se distingue de l'*Hedysarum moliniferum*, par ses tiges bien plus courtes, velues ainsi que les pédoncules; par les articulations de ses gouffes globuleuses & pubescentes.

Ses tiges sont couchées, longues de six à sept pouces au plus, filiformes, velues, à peine rameuses, un peu comprimées & striées, garnies de feuilles petites, alternes, pétioles, orbiculaires ou elliptiques, obtuses à leurs deux extrémités, quelquefois légèrement échancrées à leur base, vertes, glabres à leur face supérieure, un peu pubescentes en dessous, particulièrement sur leurs principales nervures; les pétioles sont caillottes, d'environ un tiers plus courts que les feuilles, pubescents, munis à leur base de deux stipules amplexicaules, petites, ovales, aiguës, scarieuses,

presque planes, striées, à peu près aussi longues que les pétiolés.

Les pédoncles sont axillaires, droits, filiformes, très-velus, longs au moins d'un pouce, terminés par un épi court, composé de petites fleurs alternes, presque sessiles, peu nombreuses, munies de bractées très-étroites, aiguës. Le calice est tubulé, glabre, strié, divisé en cinq découpures ouvertes, subulées, aiguës. La corolle est fort petite, purpurine ou peut être d'un blanc-jaunâtre dans l'état de siccité : il lui succède une gouffe allongée, composée de plusieurs articulations renflées, globuleuses, chargées de poils courts, crochus à leur sommet lorsqu'on les examine à la loupe, ainsi que l'a très-bien observé Linné.

On trouve cette plante dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

8. SAINFOIN à feuilles de nummulaire. *Hedysarum nummularifolium*. Linn.

*Hedysarum foliis simplicibus, obovato-sabrotundis; stipulis scariosis, petiolo brevioribus; lomentis glabris, reticulatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1173. n° 6.

*Hedysarum foliis simplicibus, cuneiformibus*. Linn. Flor. 188. — Burm. Flor. ind. pag. 64.

*Onobrychis maderaspatanum, nummularia folio, ornithopodii filiginis*. Petiv. Catoph. 4t. tab. 26. fig. 4.

Cette espèce me parait différer beaucoup de l'*Hedysarum moniliferum* : ses feuilles sont plus grandes, les articulations des gouffes plus arrondies, toute la plante beaucoup plus grande.

Ses tiges sont longues, anguleuses, pubescentes, striées, grêles, peu rameuses, couchées, garnies de feuilles alternes, pétioolées, simples, un peu ovales ou arrondies, quelquefois échancrées en cœur à leur base, obtuses à leurs deux extrémités, vertes à leurs deux faces, un peu plus pâles & légèrement velues en dessous, particulièrement à leur principale nervure; réfléchies à l'extrémité de leur pétiole, qui à environ la moitié de la longueur des feuilles. Les stipules sont vaginales, scarieuses, blanchâtres, striées, appliquées contre les tiges, à peu près aussi longues que les pétioles.

Les fleurs sont disposées en épis axillaires ou terminaux, longs de deux ou trois pouces, grêles, lisses; les pédoncles sont filiformes, articulés; à chaque articulation est une fleur pédiculée, solitaire à la partie inférieure du pédoncle, souvent deux à deux vers son sommet; leur calice est glabre, strié, à cinq découpures droites, aiguës. La corolle est purpurine ou blanchâtre, petite, un peu plus longue que le calice. Il lui succède une

gouffe pubescente dans sa jeunesse, presque glabre à l'époque de la maturité, articulée; les articulations peu arrondies, presque cylindriques, légèrement comprimées, sessiles, ridées, renfermant une semence un peu réniforme.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

La plante que nous venons de décrire, est exactement celle dont Petiver a donné la figure, & qui est citée par Linné; mais elle s'écarte un peu de la description de ce dernier auteur. Je n'ai pas vu les feuilles cuneiformes ni les gouffes velues sur leur dos, excepté dans leur première jeunesse.

9. SAINFOIN à feuilles d'alibouffer. *Hedysarum styracifolium*. Linn.

*Hedysarum foliis simplicibus, cordato-orbiculatis, retusis, supra glabris, subtus tomentosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1052. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1174. n° 8.

C'est une plante dont les tiges sont ligneuses, presque quadrangulaires, cannelées, légèrement velues, droites, garnies de feuilles alternes, pétioolées, assez grandes, presque orbiculaires ou un peu ovales, légèrement pubescentes à leur face inférieure, glabres en dessus, longues d'un pouce & demi, articulées à leur insertion avec le pétiole, pendantes, nerveuses, entières à leurs bords; les pétioles sont presque aussi longs que les feuilles, munis à leur base de stipules lanceolées. Je ne connais ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante croît dans l'Asie. (V. f. in herb. Lam.)

10. SAINFOIN à feuilles en rein. *Hedysarum reniforme*.

*Hedysarum foliis simplicibus, reniformibus; caulis tereti*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1051. — Burm. Flor. ind. tab. 52. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1174. n° 9.

Plante remarquable par ses feuilles en forme de rein, assez semblables à celles de l'*Asarum europaeum*, mais beaucoup plus petites, qui à des rapports avec l'*Hedysarum sororium*, dont elle diffère par ses gouffes à plusieurs articulations.

Ses tiges sont filiformes, cylindriques, garnies de feuilles alternes, simples, longuement pétioolées, glabres à leurs deux faces, obovées, presque tronquées & point échancrées à leur sommet, munies à la base de leur pétiole de stipules fort petites, aiguës. Les fleurs sont disposées en grappes à l'extrémité des tiges, réunies très-souvent deux à deux, ou bien elles sont placées dans les aisselles des feuilles supérieures, solitaires ou geminées. Les gouffes sont composées de plusieurs articulations lisses, à une seule semence.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

11. SAINFOIN velouté. *Hedyfarum velutinum*. Willd.

*Hedyfarum foliis simplicibus, ovatis, tomentosis; stipulis bracteisque filiformibus, lomentis villosotomentosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1174. n.º 10.

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, pubescens, garnis de feuilles simples, alternes, pétiolées, ovales, obtuses, mucronées à leur sommet, longues de trois pouces, molles & tomenteuses à leurs deux faces, munies à leur base de stipules filiformes, plus courtes que les pétioles.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, longues de quatre à cinq pouces, terminales & axillaires, sur lesquelles sont placées des fleurs fort petites, presque sessiles, de couleur violette, garnies de bractées menues, capillaires, plus longues que le calice. Ce dernier est velu profondément, divisé en cinq découpures aiguës. Les gouffes sont longues d'un demi-pouce, articulées, velues, tomenteuses, composées d'articulations oblongues, comprimées.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. (Descript. ex Willd.)

12. SAINFOIN à gouffes cachées. *Hedyfarum latrosum*. Linn.

*Hedyfarum foliis simplicibus, ovatis, serrulatis; leguminibus occultatis, bracteis fornicatis, supinis, fereisofa*. Linn. Syst. veget. pag. 672. n.º 12. — Mantiff. 270. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1175. n.º 13.

*Legum. maderaspatanum, elatines folio*. Petiv. Gazophyll. tab. 30. fig. 11.

Ses tiges sont presque ligneuses, nues, divisées en quelques rameaux longs, flexibles, effilés, cylindriques, diffus, chargés de poils très-fins & blanchâtres, garnis de feuilles simples, alternes, pétiolées, écartées, ovales, à peine denticulées, presque glabres, ciliées à leurs bords, plus rapprochées à l'extrémité des rameaux; les inférieures munies à leur contour de quelques petites dents épineuses. Leur pétiole est très-court; les stipules sont petites, caduques.

Les fleurs sont ou solitaires ou plus souvent deux à deux dans l'aisselle des feuilles supérieures, soutenues par un pédoncule très-petit, simple, biflore; recouvertes entièrement par une grande bractée concave, naviculaire ou en voûte, rousâtre, qu'on prendroit aisément pour une feuille desséchée. Les gouffes sont presque rhomboïdes, mucronées, & ne renferment qu'une seule semence.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Juss. & Lam.)

13. SAINFOIN vaginal. *Hedyfarum vaginale*. Linn.

*Hedyfarum foliis simplicibus, cordato-oblongis; petiolis simplicibus, stipulis vaginalibus*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n.º 13. — Flor. zeylan. 287. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1176. n.º 14.

*Genista articulata, repens; foliis crassifolius, planis, acutis*. Burm. Zeylan. pag. 104. tab. 49. fig. 1.

*Hedyfarum monophyllum, repens; filiculis glabris, non crenatis*. Herm. Zeyl. 33.

*Unduryal, alia species; folio singulari oblongo*. Herm. Zeyl. 5. 10.

Cette plante a quelques rapports avec l'*Hedyfarum buxifolium*, par la forme de ses feuilles qui sont quelquefois lancéolées, mais plus souvent oblongues, elliptiques; elle est d'ailleurs remarquable par les stipules qui entourent les tiges en forme de gaine.

Ses tiges sont nombreuses, herbacées, couchées, glabres, vertes, à peine rameuses, cylindriques, garnies de feuilles simples, alternes, pétiolées, très-variables dans leur forme; les inférieures en ovale renversé, échancrées à leur base; les supérieures, plus allongées, lancéolées, en cœur, elliptiques ou aiguës; d'autres, obtuses & mucronées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, veinées, réticulées, supportées par des pétioles cylindriques, grêles, plus courts que les feuilles; les stipules sont lancéolées, acuminées, appliquées contre les tiges.

Les fleurs sont disposées en longs épis simples, allongés dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux, supportant des filers pédiculées, alternes, munies de bractées courtes, aiguës. Les calices sont oblongs, divisés en cinq découpures lancéolées, pointues, presque sèches. Les corolles sont purpurines, fort petites. Il leur succède des gouffes glabres, articulées, presque cylindriques, légèrement comprimées, réticulées; les articulations peu distinctes.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à l'île de Ceylan. ○

14. SAINFOIN à gouffes cylindriques. *Hedyfarum cylindricum*.

*Hedyfarum foliis simplicibus, ovato-subrotundis, longi petiolatis; leguminibus cylindricis, articulis sessilibus, striatis; stipulis vaginalibus*. (N.)

*Onobrychis maderaspatanum, nummularia folio, barbarea filiquis*. Petiver, Gazoph. tab. 26. fig. 1. *Opiuma*.

Cette

Cette espèce a de très-grands rapports avec l'*Hedyfarum vaginale*, dont elle n'est peut-être qu'une variété : elle en diffère par ses feuilles presque orbiculaires, très-obtusées, & peut-être par les gouffes plus arrondies, celles de l'*Hedyfarum vaginale* ne nous étant pas suffisamment connus. Au reste, l'insinuation de la figure de cette plante, donnée par Petiver, qui y convient parfaitement, & celle donnée par Burman, de l'*Hedyfarum vaginale*, en feront reconnoître la différence au premier aspect.

Ses tiges sont grêles, souples, herbacées longues, cylindriques, couchées, articulées, rameuses ; garnies de feuilles alternes, distantes, longuement pétiolées, presque membraneuses, arrondies ou un peu ovales, obtusées à leur sommet, ordinairement échanquées en cœur à leur base, glabres, d'un vert gai, un peu plus pâles en dessus & à peine pubescentes ; marquées de nervures obliques, réticulées. Les pétioles sont longs de trois à quatre lignes, droits, filiformes, un peu plus courts que les feuilles, très-ouverts. Les stipules environnent les tiges en forme de gaine ; elles sont droites, lancéolées, subulées, aiguës, tronquées à leur base, blanchâtres & membraneuses, très-rapprochées & presque imbriquées à l'extrémité des rameaux, & cachent entièrement cette partie de la tige.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un épi alongé, grêle, quelquefois axillaire ; elles sont alternes, distantes, pédiculées, solitaires sur chaque pédicule. Le calice est glabre, oblong, divisé, à son orifice, en cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle est fort petite, purpurine ou d'un bleu clair, un peu plus longue que le calice. Il lui succède une gouffe cylindrique, longue au moins d'un pouce, pédunculée, droite, chaque articulation sessile, tronquée à ses deux extrémités, légèrement comprimée, lisse, glabre, striée, la dernière aiguë : elles se détachent avec la plus grande facilité ; elles ne renferment, dans une seule loge, qu'une semence brune, un peu échanquée en rein, obtuse ou presque tronquée à ses deux extrémités.

Cette plante croît dans l'Inde & à l'Île-de-France. ☉ ? (V. f. in herb. Lam.)

15. SAINFOIN à tiges triangulaires. *Hedyfarum triquetrum*. Linn.

*Hedyfarum foliis simplicibus, cordato-oblongis ; petiolis elatis, ramis triquetris*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 15. — Flor. zeyl. pag. 132. n°. 186. — Burm. Flor. ind. tab. 32. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1176. n°. 15.

*Onobrychis zeylanica, monophylla ; coule trian-gulo, petiolis foliorum alatis*. Burm. Zeylan. p. 176. tab. 81.

Botanique. Tome VI.

*Onobrychis zeylanica, aurantii folio*. Petiv. Sicc. 247. — Rai, Suppl. 247.

*Phaeolus montanus*. 7. Rumph. Amboin. vol. 6. pag. 146.

Cette plante se distingue par ses tiges triangulaires, par les pétioles ailes, & par ses gouffes articulées, très-comprimées. Elle pousse, d'une racine commune, plusieurs tiges triangulaires, cannelées, légèrement purpurines ou verdâtres, un peu velues, à peine rameuses ; garnies de feuilles simples, alternes, pétiolées, lancéolées, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, quelquefois échanquées en cœur à leur base, longues d'un pouce & demi à quatre pouces, larges d'environ un pouce, glabres à leurs deux faces, veinées, légèrement ciliées à leur contour ; les pétioles plus courts que les feuilles, surtout dans les supérieures ; ailes comme ceux du citronnier ; les stipules oblongues, lancéolées, sèches, aiguës, striées.

Les fleurs sont axillaires ou terminales, alternes ou rapprochées deux par deux, portées sur des pédoncules simples, à peine pubescents ; garnis de bractées étroites, lancéolées, plus courtes que les pédoncules partiels, scarieuses, très-glabres. Les calices sont courts, campanulés, velus, à cinq divisions inégales, aiguës. La corolle est petite, purpurine. Il lui succède une gouffe longue, articulée, très-comprimée, large, presque plane, très-velue ; les articulations entières & un peu arrondies à leurs bords, à une seule loge, renferment une seule semence plate, ovale, brune, un peu échanquée en rein.

Cette espèce se rencontre dans les Indes orientales. ✕ ? (V. f. in herb. Lamarck.)

16. SAINFOIN à grandes bractées. *Hedyfarum strobiliferum*.

*Hedyfarum foliis simplicibus ; bracteis strobiliferum inflatis, cordatis, obtusis*. Linn. Flor. zeylan. 87. tab. 3. — Burm. Flor. ind. 165. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1176. n°. 16.

*Onobrychis India orientalis ; fagi foliis alternis, filiculis spica longa dispositis*. Rai, Suppl. 234.

*Corpinus zeylanico, filiquosa*. Burm. Zeyl. 54.

C'est une espèce très-reconnoissable à la grandeur de ses bractées & à la longueur de ses épis.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux droits, alternes, un peu pubescents, presque cylindriques, striés, garnis de feuilles amples, pétiolées, alternes, glabres, ovales, oblongues, lisses, longues au moins de trois pouces sur un pouce & demi de large ; entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, vertes, plus pâles au dessous, & marquées de nervures régulières, fail-

E e e

lantes, presque simples, un peu jaunâtres, & de veines transversees, ondulees, pubescentes.

Les fleurs sont disposées sur de très-longs épis axillaires & terminaux, simples, flexueux; munis, dans toute leur longueur, de grandes & larges bractées renflées, arrondies, presque en cœur, aiguës à leur sommet, imbriquées, un peu velues; marquées de nervures & de veines en réseau, membraneuses, d'un brun très-clair, recouvrant entièrement les fleurs & les gouffes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *H. (V. f. in herb. Lam.)*

17. SAINFOIN à feuilles imbriquées. *Hedyarum imbricatum*. Linn. f.

*Hedyarum foliis simplicibus, cordatis sessilibus, stipulatis; superioribus imbricatis, floriferis*. Linn. f. Suppl. 340. — Thumb. Nov. Act. Upl. 6. pag. 42. tab. t. fig. 2.

*Hallia (imbricata), foliis cordato-ovatis, convolutis, imbricatis; foribus axillaribus, sessilibus*. Thumb. Prodr. 131. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1170. n°. 7.

On distingue aisément cette espèce à la disposition de ses feuilles imbriquées, sessiles, & à ses larges stipules.

Ses tiges sont filiformes, herbacées, rameuses, dressées, les rameaux presque simples, striés, un peu velus, garnis de feuilles alternes, sessiles, très-rapetochées, appliquées contre les tiges, imbriquées, ovales, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, très-entières à leurs bords, les supérieures plus grandes que les inférieures, ordinairement plissées en deux, un peu raboteuses, ciliées tant sur leur carène qu'à leurs bords; munis à leur base d'une stipule courte, assez grande, ovale, dans la même position que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires, sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures qui les cachent entièrement. Elles ont un calice court, velu, divisé assez profondément en cinq découpures étroites, lancéolées, aiguës, ciliées par de longs poils blancs. La corolle est une fois au moins plus longue que le calice, de couleur purpurine, un peu rougeâtre, rayée par des veines noirâtres; l'étendard est ovale, étendu, plus long que la carène; les ailes étroites, de la même longueur, & presque aussi larges que la carène. Le fruit est une gouffe à deux valves, à une seule semence.

Cette plante croît parmi les gazons, au Cap de Bonne-Espérance. *H. (V. f. in herb. Lam.)*

18. SAINFOIN en aîles de chauve-souris. *Hedyarum vespertilionis*. Linn.

*Hedyarum foliis simplicibus ternatisque, intermedio bilobo; lobis patentibus, lanceolatis; lomentis articulis flexuoso-plicatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1177. n°. 17.

*Hedyarum foliis simplicibus ternatisque; foliis intermatis bilobis; lobis lanceolatis, divaricatis; leguminibus plicatis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 63.

*Hedyarum foliis simplicibus, lunatis; lobis retro falcatis, racemo terminali, leguminibus retrofractis, in calice inflato inclusis*. Linn. Suppl. pag. 331. — Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 366. — Idem, Colloq. 2. pag. 139. — Loureiro, Flor. cochin. pag. 346.

C'est une plante très-remarquable par la forme singulière de ses feuilles simples ou ternées, la foliole impaire étendue en deux lobes ouverts horizontalement.

Ses tiges sont simples, grêles, un peu frutescentes, élancées, hautes de trois à quatre pieds, rameuses à leur partie supérieure, légèrement hispides; les rameaux ne paroissent ordinairement qu'après que la tige principale a produit des fleurs. Les feuilles sont alternes, pinnées, simples, quelquefois ternées. La grande foliole, qui est très-touvent seule, se partage en deux lobes horizontaux, longs au moins de deux pouces, étroits, assez semblables à deux ailes de papillon bien ouvertes; marquée de deux ou trois nervures transverses, & de petites veines saillantes & en réseau; le lobe inférieur terminé fort souvent par un autre lobe très-petit, articulé, pendant; cette feuille est de couleur verte, quelquefois mêlée de brun, de blanc ou de jaune par zones; dans le milieu de l'échancrure des lobes est une très-petite pointe particulière. Lorsqu'à cette feuille se joignent une ou deux autres folioles latérales, elles sont petites, tronquées, cuneiformes. Le pétiole est droit, filiforme, muni à sa base de stipules subulées.

Les fleurs forment une petite grappe ou plutôt un épi court, terminal, souvent réunies deux à deux, une sessile, une autre pédicelée; on en voit aussi de solitaires & sessiles dans l'aisselle des feuilles supérieures; elles sont munies, à leur base, d'une bractée lancéolée, cartilagineuse. Leur calice est campanulé, très-velu, à cinq divisions lancéolées, aiguës. La corolle est petite, très-ouverte, mêlée de blanc & de violet; les ailes & la carène fortement réfléchies; les éminences forment un seul paquet, en forme d'une colonne droite, au milieu des pétales réfléchis. L'ovaire est linéaire. Après la fécondation, le calice se ferme, s'enfle, & recouvre le fruit dans sa jeunesse, qui devient une gouffe articulée, repliée à chacune de ses articulations.

Cette plante croît dans l'Inde & à la Cochinchine. *O* n° ? (*V. f. in herb. Lam.*)

19. SAINFOIN sagitté. *Hedysarum sagittatum*.

*Hedysarum foliis simplicibus, cordatis, lanceolato-sagittatis; floribus solitariis, pedunculis capillaribus longissimis.* (N.)

Espèce remarquable par ses fleurs solitaires, supportées par de longs pédoncules capillaires.

Sestiges font tendres, herbacées, à trois angles, très-glabres, vertes, divisées en longs rameaux très-ouverts, diffus; garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, lancéolées ou presque sagittées, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, veinées, entières à leurs bords, longues au moins d'un pouce sur trois lignes de large. Les pétioles sont très-courts, munis à leur base de stipules opposées, ovales, lancéolées, aiguës, ouvertes, plus longues que les pétioles.

Les fleurs font solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, capillaires, droits ou arqués, au moins une fois aussi longs que les feuilles. Le calice est presque glabre ou un peu rude, divisé, au-delà de sa moitié, en cinq découpures presque égales, oblongues, linéaires, aiguës, mucronées. La corolle est petite, à peine plus longue que le calice, d'un rouge-pourpre. Je n'ai point vu les fruits.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

20. SAINFOIN à feuilles bilobées. *Hedysarum fororum*. Linn.

*Hedysarum foliis simplicibus, reniformibus, emarginatis; caule triquetro.* Linn. Syst. veget. pag. 672. n°. 8. — Mantiss. 270.

*Hallia (fororia), foliis subrotundo-reniformibus, emarginatis, glabris; floribus racemosis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1170. n°. 8.

*Glycine (monophyllos), caule volubili; floribus paniculatis, lateralibus.* Burm. Flor. ind. pag. 161. tab. 50. fig. 2.

*Lens moderaespota, nummularia folio.* Petiv. Gazoph. tab. 32. fig. 1.

Cette plante s'écarte beaucoup des *hedysarum* par son port, & n'en est par cela même que plus distincte. Elle a beaucoup de rapports avec les *glycine*, parmi lesquels Burman l'a placée dans sa flore des Indes ; elle se rapproche en fait un *hallia*, genre établi pour Thunberg, & dans lequel les gouffes font monopermes, à deux valves. L'espèce dont il est ici question présente ce caractère ; elle est de plus remarquable par ses feuilles presque rondes, échancrées à leurs deux extrémités.

Ses tiges sont glabres, herbacées, sarmenteu-

ses, hautes d'environ un pied & demi, grêles, striées, anguleuses, presque à trois faces, garnies de feuilles alternes, pétiolées, distantes, très-simples, petites, arrondies, plus larges que longues, presque à deux lobes, échancrées à leur sommet, en forme de rein à leur base, glabres à leurs deux faces, minces, tendres, entières à leurs bords, souvent rattachées dans leur disque, médiocrement réticulées ; les pétioles capillaires, plus courts que les feuilles ; les stipules courtes, ovales, élargies, acuminées, membranacées.

Les pédoncules communs font capillaires, pubescents, axillaires, longs de deux ou trois pouces, sur lesquels les fleurs sont distantes, disposées deux à deux ou opposées, munies de pédoncules partiels extrêmement fins, longs de trois à quatre lignes : je n'y ai point observé de bractées ; peut-être sont-elles très-caduques. Les calices sont pubescents, campanulés, très-courts, divisés à leur orifice en cinq petites dents fort courtes, presque obtuses. La corolle est petite, purpurine ou blanche, autant que j'ai pu en juger d'après des individus secs ; les gouffes sont courtes, ovales, très-comprimées, arrondies à un de leur côté, presque tronquées à leur côté intérieur, glabres, à une seule articulation (deux selon Linné), quelquefois légèrement échancrées vers sa base, renfermant une seule semence oblongue, obtuse à ses deux extrémités, échancrée en rein.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f.)

21. SAINFOIN à feuilles variées. *Hedysarum diversifolium*.

*Hedysarum foliis simplicibus, ovatis, integris seu sublobatis, quandoque ternatis; racemis subterminalibus; leguminibus linearibus, pubescentibus, subintegris.* (N.)

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, presque ligneux, d'un brun rougeâtre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, simples, ovales, presque elliptiques, longues d'un pouce & demi, glabres à leurs deux faces, vertes à leur face supérieure, un peu blanchâtres ou cendrées en dessous, entières ou un peu lobées, quelquefois ternées, surtout les feuilles supérieures ; les pétioles sont striées, glabres, munies à leur base, sur les tiges, de deux stipules tronquées à leur base, sèches, roussâtres, aiguës, & de deux autres très-petites, un peu au dessous de l'insertion des feuilles avec leur pétiole.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, simples, presque terminales, plus longues que les feuilles ; les pédoncules partiels, longs de deux à trois lignes, sont solitaires ou presque fasciculés ; les bractées très-caduques ; les calices courts, campanulés, ouverts, divisés en cinq découpures



oblongues, inégales, très-aiguës, presque glabres; la corolle petite, à peine une fois aussi longue que le calice; les gouffes sont planes, articulées, velues, comprimées, presque point échan-crées à leurs articulations.

Cette plante a été découverte par Commerfon à l'île de Madagascar. *H. (V. f. in herb. Jussieu.)*

22. *SAINFON à deux folioles. Hedyfarum diphyllum*. Linn.

*Hedyfarum foliis binatis, ovato-lanceolatis; bracteis geminis, subciliatis; lomenti articulis pubescentibus, aculeatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1178. n°. 18.

*Hedyfarum foliis binatis, petiolatis; bracteis geminis, ovatis, acutis, sessilibus*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 17.

*Hedyfarum foliis binatis, petiolatis; floralibus sessilibus*. Miller, Dict. n°. 5.

*Onobrychis maderaspatana, diphyllum; siliculis clypeatis, hirsutis, minor*. Pluken. Almag. pag. 170. tab. 146. fig. 6.

*Nelam-mari*. Rheed. Malab. vol. 9. pag. 161. tab. 82. — Rai, Suppl. 404.

2. *Hedyfarum diphyllum*. Swartz, Observ. 285.

*Hedyfarum herbaceum, procumbens; foliis geminatis, spicis foliatis terminalibus*. Brown, Jam. 301.

*Hedyfarum minus, diphyllum*. Sloan, Jam. 73. Hist. i. pag. 185. — Rai, Suppl. 450.

Cette plante & la suivante, que Linné a regardée comme la même, sont jusqu'alors les seules espèces d'*Hedyfarum* que nous connoissions à deux folioles. Celle-ci se distingue par ses feuilles lancéolées, par ses gouffes épineuses, petites & pubescentes, presque cachées par les bractées.

Ses tiges sont couchées, grêles, cylindriques, à peine légèrement pubescentes, divisées en rameaux touffus, filiformes, nombreux, ramifiés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, composées de deux folioles lancéolées, glabres, vertes à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, arrondies à leur base, ponctuées en dessous lorsqu'on les considère à la loupe, longues d'environ six lignes, larges de deux, entières à leurs bords, ouvertes, fructées à l'extrémité d'un pétiole comprimé, de même longueur au moins, muni à sa base de deux stipules étroites, lancéolées, droites, aiguës, portuées en dessous.

De l'aisselle des feuilles sortent des épis longs de deux ou trois pouces, simples, droits, tellement couverts de bractées, qu'on les prendroit pour un rameau feuillé; ces bractées sont deux à deux, alternes, presque imbriquées, ouvertes, ovales, aiguës, vertes, ponctuées, ciliées à leurs bords,

sessiles, marquées de nervures droites, partant toutes d'un point commun de la base. Les fleurs sont fort petites, sessiles, tout-à-fait cachées par les deux bractées qui les accompagnent. Leur calice est glabre, presque scarieux, à cinq divisions lancéolées, aiguës. La corolle est un peu plus longue que le calice; il lui succède une gouffe courte, à peine plus longue que les bractées, composée de deux ou trois articulations étroites, ovales, comprimées, pubescentes, hérissées d'aiguillons inégaux, courts, subules.

Cette plante croît dans les Indes orientales; on la trouve aussi en Amérique, à Cayenne, aux Antilles; cette dernière est plus grande. *○ (V. f. in herb. Lamarck.)*

23. *SAINFON conjugué. Hedyfarum conjugatum*. Willd.

*Hedyfarum foliis binatis, ovatis; bracteis geminis, ciliatis; lomenti articulis glabris, aculeatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1178. n°. 19.

*Hedyfarum diphyllum*. 2. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1653.

*Hedyfarum diphyllum, foliolis ovatis, siliculis asperis, geminis, inarticulatis*. Burm. Zeylan. pag. 114. tab. 50. fig. 1.

*Onobrychis maderaspatana, diphyllum; siliculis asperis*. Pluken. Phytog. tab. 102. fig. 1.

Malgré les grands rapports qui existent entre l'*Hedyfarum diphyllum* & cette espèce, elle doit cependant en être distinguée par son port, ses tiges étant droites, bien moins rameuses; par ses folioles ovales & non lancéolées, par ses gouffes ordinairement plus longues, plus larges, épineuses, mais non pubescentes.

Ses tiges sont très-glabres, cylindriques, presque filiformes, droites, plus hautes que celles de l'espèce précédente, divisées en rameaux moins nombreux, effilés, ouverts, garnis de quelques feuilles distantes, alternes, pétiolées, composées de deux folioles courtes, ovales, un peu aiguës, entières à leurs bords, presque en cœur, glabres à leurs deux faces, longues de trois à quatre lignes au plus, larges d'environ deux lignes, supportées par des pétioles droits, plus longs que les feuilles, munis à leur base de deux petites bractées lancéolées, aiguës.

De l'aisselle des rameaux ou des feuilles sortent des épis droits, simples, solitaires, longs de trois à quatre pouces, nus à leur partie inférieure, munis de bractées opposées, un peu distantes, sessiles, ovales, aiguës, ciliées à leurs bords, vertes à leurs deux faces, à nervures droites, renfermant des fleurs solitaires, sessiles, dont le calice est scarieux, à cinq divisions lancéolées, aiguës. La corolle est petite, de couleur jaune; il lui suc-

ède une gousse comprimée, allongée, composée de quatre ou cinq articulations larges, ovales ou un peu orbiculaires, glabres, épineuses, chaque articulation de la longueur des bractées.

Cette espèce croît dans l'Inde & à l'île de Ceylan. ( *V. f. in herb. Lam.* )

24. SAINFOIN à quatre feuilles. *Hedysarum tetraphyllum*.

*Hedysarum foliis digitato-quadrifoliatis, bracteis suborbiculatis, leguminibus multiauriculatis, asperis.* (N.)

*Zornia* (tetraphylla), foliis digitato-quadrifoliatis, bracteis suborbiculatis. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 76. tab. 41.

*Zornia bracteata.* Walter. Flor. carol. pag. 181. — Gmel. Syst. nat. vol. 2. pag. 1076.

♂. *Hedysarum* (tetraphyllum), foliis ternatis quadrinatisque, stipulis sagittatis. Thunb. Prodr. pag. 132. — Nov. Act. Upsal. 6. pag. 44. tab. 3.

*Hedysarum* (tetraphyllum), foliis ternatis quadrinatisque, racemis elongatis, bracteis geminis, flore majoribus. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1203. n°. 78.

Cette plante, dont on a fait un genre particulier, est tellement rapprochée par son port, & même par les parties de la fructification, de l'*Hedysarum diphyllum*, qu'elle n'en diffère que par ses feuilles à quatre folioles au lieu de deux.

Ses racines sont grêles, peu rameuses, divisées en filamens capillaires; elles produisent une tige haute d'environ un pied, foible, grêle, à peine rameuse, glabre, garnie de feuilles alternes, pétiolées, composées de quatre folioles presque sessiles, situées à l'extrémité du pétiole commun, ouvertes en digitations, inégales, étroites, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, pointues à leurs deux extrémités, longues d'un pouce & davantage, larges d'environ trois lignes, supportées par des pétioles filiformes, au moins de la longueur des feuilles; munis à leur base de stipules membraneuses, courtes, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont axillaires ou terminales, disposées le long d'un pedoncule commun en un épi droit; elles sont alternes, presque sessiles, petites, renfermées chacune entre deux grandes bractées larges, ovales, glabres, un peu arrondies, quelquefois un peu aiguës, sessiles, opposées, striées longitudinalement. Leur calice est court, campanulé, presque à deux lobes, à cinq dents. La corolle est petite, entièrement cachée par les bractées; l'étendard est réfléchi, échancré en cœur; les anthères alternativement oblongues & globuleuses. Les gousses sont étroites, linéaires,

articulées, un peu plus longues que les bractées, composées d'articulations tronquées à un de leur côté, ovales, comprimées, hérissées de poils courts & rudes.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique, dans la Caroline intérieure. ( *V. f. in herb. Jusçu.* )

Quoique la plante que Thunberg a nommée *hedysarum tetraphyllum* ait été recueillie au Cap de Bonne-Espérance, & qu'elle offre, d'après la description, quelques différences, je n'ai pu la regarder comme une espèce séparée. Ses feuilles font, sur le même individu, ternées & quaternées; les stipules à demi sagittées; les bractées ovales, aiguës, rétrécies deux à deux, nerveuses, plus longues que les fleurs; les gousses sont ordinairement composées de quatre articulations tudes, en forme de collier.

\* \* Feuilles ternées.

25. SAINFOIN élégant. *Hedysarum pulchellum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis; bracteis geminis, conjugatis, orbiculatis, lineatis.* Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 18. — Burman, Flor. ind. pag. 165. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1179. n°. 20.

*Hedysarum foliis ternatis, bracteis fibrolosum orbiculatis, conjugatis.* Flor. zeylan. pag. 135. n°. 292. — Spec. Plant. edit. 2. p. 1053.

*Hedysarum trifoliatum, frutescens; flore & fructu inter duo foliola absconditis.* Burm. Zeylan. pag. 116. tab. 52.

*Onobrychis maderaspatana, triphylla; siliculis elongatis foliaceis.* Rai, Suppl. 234.

*Onobrychis indica, triphylla; foliis amplis, mucronatis; siliculis parvis in fructum longum ex alis inter bina foliola circinnata, arcte connatis reconditis.* Pluken. Amalth. 161. tab. 433. fig. 7.

C'est un très-joli arbrisseau, dont les feuilles sont composées de trois folioles, la terminale très-grande; les fleurs disposées en très-petites grappes, cachées par des bractées ovales, formant par leur réunion un long épi simple.

Ses tiges sont peu élevées, ligneuses, rudes, légèrement velues, d'un pourpre foncé, divisées en rameaux droits, presque simples, quadrangulaires, cannelés, pubescens, garnis de feuilles pétiolées, alternes, composées de trois folioles inégales, pétiolées, ovales ou elliptiques, obtuses à leurs deux extrémités, épaisses, ridées, glabres & d'un vert foncé en dessus, cendrées & pubescentes en dessous, légèrement ciliées à leurs bords, marquées de fortes nervures simples, latérales, & de veines faillantes, presque parallèles; la foliole terminale beaucoup plus grande.

longue de deux à trois pouces sur au moins un pouce de large; les deux folioles latérales presque deux fois plus petites; les pétioles sont velus, épais, munis, à leur base & à celles des folioles latérales, de deux stipules très-petites, caduques, aiguës, très-velues.

Il sort de l'aisselle des feuilles supérieures un ou plusieurs épis simples, longs de six ou huit pouces & plus, garnis dans toute leur longueur de bractées opposées, arrondies, pédiculées, épaisses, presque imbriquées, ridées, pubescentes, ciliées à leurs bords, réunies deux par deux, & cachant une petite grappe de fleurs au nombre de deux ou trois, munie d'une troisième bractée fort petite, étroite, lancéolée, presque sétacée, velue, & qui pourroit faire regarder les plus grandes comme de véritables feuilles; opinion d'autant plus vraisemblable, que j'ai remarqué de jeunes épis où elles n'existoient pas; elles manquent aussi aux fleurs terminales. Le calice est fort petit, couvert de poils nombreux, rouffâtres; la corolle est petite, purpurine; les gouffes sont glabres, comprimées, plus courtes que les grandes bractées, composées de deux ou trois articulations au plus, la dernière terminée par une petite pointe aiguë, à une seule loge, contenant une semence noirâtre, plane, un peu arrondie, légèrement échancrée en rein.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. Commerçon l'a également recueillie aux îles Philippines. *H* (*V. f. in herb. Lam. & Justic.*)

26. SAINFOIN à feuilles de spartium. *Hedysarum spartium*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis simplicibusque, subomentosis; caule dichotomo; floribus geminis; leguminibus articulatis, hispida.* Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 19. — Mantill. 271. — Burm. Ind. pag. 166. tab. 51. fig. 3.

*Hedysarum foliis ternatis simplicibusque, lineari-lanceolatis, subomentosis; pedunculis unifloris, axillaribus, subgeminatis; tomentis hispida.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1179. n°. 21.

*Spartium persicum, monophyllum & criphyllum.* Garcin. herb.

Cette espèce a presque l'aspect du *spartium junceum*, remarquable par les rameaux étalés, & par ses fleurs éparées, axillaires, distantes.

Ses tiges sont ligneuses, blanchâtres, striées; ses rameaux presque dichotomes, grêles, élancés; garnis de feuilles, dont les unes sont simples, foliaires; d'autres, ternées, pétioles, alternes, linéaires, lancéolées, petites, longues de six à huit lignes, tomentueuses: dans les feuilles ternées, la foliole terminale est beaucoup plus longue que les latérales, rétrécies à ses deux extrémités;

les pétioles garnis à leur base de stipules très-courtes, obtuses.

Les fleurs sont, les unes foliaires, d'autres deux à deux dans l'aisselle des feuilles, presque sessiles ou légèrement pédunculées, munies d'une petite bractée étroite sur le pédoncule. Leur calice est court, à cinq dents; la corolle de couleur jaune; les pétales fournis d'onglets de la longueur du calice. Les gouffes sont courtes, composées de trois articulations un peu orbiculaires, monospermes, hérissées de poils rouffâtres.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. *H* (*Descript. ex Burm.*)

27. SAINFOIN en ombelle. *Hedysarum umbellatum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, pedunculis umbelliferis, caule fruticoso.* Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 21. — Flor. zeyl. 293. — Jacq. Hort. Schoenb. 3. pag. 26. tab. 297.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-ovatis, ramisque triquetris, hirsutis; pedunculis umbellatis, axillaribus, petiolo brevioribus; caule fruticoso.* Will. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1182. n°. 30.

*Hedysarum trifoliatum, arborecens; floribus ex alis foliorum; siliquis copiosis, glabris.* Burm. Zeyl. pag. 115. tab. 51.

*Folium crocodili.* Rumph. Amboin. vol. 4. pag. 112. tab. 52.

Arbrisseau facile à distinguer par la disposition de ses fleurs en ombelle à l'extrémité d'un pédoncule commun, & plus courtes que les feuilles, & par ces dernières, blanchâtres & velues à leur face inférieure.

Ses tiges sont ligneuses, purpurines, arrondies, divisées en rameaux étalés, striés, triangulaires, pubescens, blanchâtres surtout à leur partie supérieure; garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées; les folioles pédiculées, grandes, ovales, un peu arrondies, obtuses, glabres, vertes en dessus, blanchâtres & fortement pubescentes en dessous, nerveuses, veinées, longues de deux pouces au moins, sur un pouce & demi de large; les deux folioles latérales une fois plus petites; les pétioles velus, un peu jaunâtres; les stipules fort petites, aiguës.

Les pédoncules sont simples, courts, axillaires; ils supportent, à leur extrémité, cinq à six fleurs, munies chacune d'un pédoncule particulier, disposées en ombelle, plus courtes que les feuilles; munies, sous leur calice, de deux bractées opposées, velues, lancéolées, aiguës. Les calices sont très-velus, hérissés de poils griffâtres, couchés; divisés en quatre dents aiguës, presque égales. La corolle est blanche, petite, au moins une fois plus

longue que le calice; les gouffes sont articulées, glabres, un peu comprimées; les articulations presque globuleuses, un peu allongées, renfermant chacune une seule sinuance arrondie, réniforme, glabre, noirâtre.

Cette plante croît dans les Indes, à l'île de Ceylan & dans celle de Madagascar. *h* ( *V. f. in herb. Lam.* )

28. SAINFOIN diffus. *Hedysarum diffusum*, Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, ovatis, subtus canis; stipulis oblique cordatis; caule ascendente, triquetro; racemis erectis, paniculatis; lomentis multarticulatis, planis, repandis, hirtis*. Willden Spec. Plant. vol. 3. pag. 1190. n°. 23.

Ses tiges sont ascendantes, hautes de deux ou trois pieds, divisées en rameaux alternes, diffus, à trois angles, pileux sur leurs angles, garnis de feuilles alternes, pétioolées, ternées, composées de trois folioles oblongues, ovales, entières, très-obtusées, mucronées à leur sommet, pubescentes, vertes à leur face supérieure, blanchâtres en dessous; les folioles des feuilles inférieures longues de trois pouces, celles des feuilles supérieures de moitié plus courtes; les stipules situées à la base des folioles sont oblongues, acuminées; celles de la base des pétioles en cœur oblique, aiguës.

Les rameaux sont terminés par des grappes droites, paniculées; celles qui partent de l'aisselle des feuilles sont simples, beaucoup plus courtes, garnies de bractées en cœur, caduques. Les calices, ainsi que les pédoncules & les pétioles, sont chargés de poils blanchâtres. Les gouffes sont articulées, comprimées, droites, hérissées, composées de cinq articulations arrondies inférieurement, presque anguleuses à leur partie supérieure.

Cette plante croît à Tranguebar & dans les Indes orientales. *h* ( *Descript. ex Willden.* )

29. SAINFOIN dichotome. *Hedysarum dichotomum*, Willden.

*Hedysarum foliis ternatis, ellipticis, obtusis, pubescentibus, subtus canis; stipulis ovatis; caule dichotomo, triquetro; racemis elongatis; lomentis repandis, hirtis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1182. n°. 25.

*Hedysarum dichotomum*, Klein, in Litt.

Cette espèce se rapproche de l'*Hedysarum diffusum*; elle en diffère par ses tiges dichotomes, non anguleuses, mais à trois faces; par ses grappes simples, allongées; par les stipules ovales beaucoup plus petites.

Ses tiges sont droites, pubescentes, triangulaires, dichotomes, garnies de feuilles pétioolées,

alternes, ternées; composées de trois folioles longues d'un pouce ou d'un pouce & demi; oblongues, elliptiques, obtusées à leurs deux extrémités, pubescentes, entières, blanchâtres en dessous; munies, à la base de leurs pétioles, de stipules courtes, ovales.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, droites, longues d'un pied; les pédoncules sont ternés, garnis de bractées ovales & caduques. Les gouffes sont articulées, comprimées, hérissées, hnées à leurs deux bords, composées de six articulations.

Cette plante croît naturellement à Tranguebar. *h* ( *Descript. ex Willden.* )

30. SAINFOIN strié. *Hedysarum striatum*, Thunb.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, stipulatis; caule herbaceo; floribus axillaribus, solitariis*. Thunb. Flor. japon. pag. 289. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1182. n°. 28.

Ses tiges sont herbacées, à plusieurs faces anguleuses, foibles, droites, pileuses, rameuses, hautes d'un pied & plus, divisées en rameaux simples, alternes, nombreux, effilés, très-ouverts; garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioolées, ternées; composées de trois folioles oblongues, très-entières, obtuses ou émoussées à leur sommet; terminées par un poil soyeux, glabres à leurs deux faces; parallèlement striées; la principale nervure pileuse; la foliole terminale à peine plus grande, longue d'environ six lignes; munies, à la base de leur pétiole, de stipules ovales, membranées, brunes, appliquées contre les tiges.

Les fleurs sont axillaires, solitaires; soutenues par un pédoncule simple, uniflore, très-court. Le calice est divisé en cinq découpures garnies de poils rares, allongés; la corolle est de couleur purpure.

Cette plante croît naturellement au Japon. ( *Descript. ex Thunb.* )

31. SAINFOIN soyeux. *Hedysarum sericeum*, Thunb.

*Hedysarum foliis ternatis, emarginatis, villosis; caule frutescente, erecto; floribus axillaribus, solitariis*. Thunb. Flor. japon. pag. 289. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1182. n°. 29.

Cet arbrisseau a des rapports avec l'*Hedysarum striatum*, dont il diffère par ses tiges ligneuses, par ses feuilles plus longues, soyeuses, non striées; par ses stipules sétacées, ouvertes.

Ses tiges sont droites, anguleuses, fortement striées, rameuses, garnies sur ses angles de poils roides, hautes de deux pieds & plus, divisées en rameaux nombreux, droits, alternes, effilés,

ramifiées, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, alternes, très-nombreuses, ternées, composées de trois folioles oblongues, rétrécies à leur partie intérieure, droites, presque sessiles, émoussées & mucronées à leur sommet; couvertes à leurs deux faces de poils soyeux & tomenteux, longues d'environ un demi-pouce, la terminale plus longue; les pétioles sont courts, munis à leur base de stipules ouvertes, sétacées.

Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules courts, simples, capillaires. Les calices sont divisés en cinq découpures, tomenteux & soyeux.

Cette plante se rencontre au Japon. *h* (Defcript. ex Thunb.)

### 32. SAINFOIN rude. *Hedysarum asperum*.

*Hedysarum foliis ternatis; foliis amplifimis, subis mollibus incanis, supra asperis; floribus paniculatis; leguminibus multarticulatis, subglobosis.* (N.)

Espèce remarquable par la grandeur de ses feuilles molles & tomenteuses en dessous, rudes en dessus; par ses gouffes dont les articulations sont presque globuleuses, & par ses fleurs disposées en une ample panicule.

Ses tiges sont droites, épaisses, rameuses, quadrangulaires, articulées, hispides, anguleuses, fistuleuses, garnies de feuilles alternes, ternées, composées de trois grandes folioles inégales, ovales, entières, obtuses, vertes & rudes à leur face supérieure, blanchâtres, molles, pubescentes, presque tomenteuses en dessous, à nervures saillantes, réticulées; la foliole terminale beaucoup plus grande, les pétioles munis à leur base de stipules larges, bifides, sagittées & auriculées à leur base; striées, velues, aiguës & acuminées.

Les fleurs, très-nombreuses & presque fasciculées, sont disposées en longues grappes droites, latérales & terminales, formant par leur ensemble une très-ample panicule diffuse, étalée, longue d'environ un pied, très-ramifiée, velue; garnies de bractées membraneuses, ovales, lancéolées, aiguës, nerveuses. Les calices sont courts, tubulés, à cinq dents; la corolle fort petite; les gouffes étroites, pubescentes, un peu visqueuses, composées d'articulations petites, ovales, un peu globuleuses, médiocrement aiguës à leurs deux extrémités.

J'ignore le lieu natal de cette plante. (*V. f. in herb. Jussieu.*)

### 33. SAINFOIN à feuilles sinuées. *Hedysarum repandum*. Vahl.

*Hedysarum foliis ternatis, repando-crenatis; racemis terminalibus, elongatis.* Vahl. Symbol. 2.

pag. 82. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1188. n°. 42.

*Hedysarum fœlpe*. Commerl. Herb. Vulgairement saintfoin à grattoir, pois grattes.

Arbrisseau distingué par les larges crénelures sinuées des folioles, & par les longues grappes lâches de ses fleurs, ainsi que par ses gouffes linéaires, qui suffiroient pour être pour former de cette espèce un genre particulier.

Ses tiges sont cylindriques, un peu purpurines, ligneuses, pubescentes à leur partie supérieure, divisées en rameaux allongés, grêles, quadrangulaires, cannelés, velus, garnis de feuilles longuement pétiolées, distantes, alternes, lâches, ternées, composées de folioles inégales, ovales, oblongues, acuminées, ciliées à leurs bords, irrégulières dans leurs formes, un de leurs côtés plus étroit que l'autre, minces, vertes & glabres à leur face supérieure, cendrées & pubescentes en dessous, particulièrement par leurs nervures; les deux folioles latérales, longues de deux à quatre pouces, sur près qu'un pouce & demi ou trois de larges la terminale plus grande, plus régulière; sinuées ou à larges crénelures, obtuses à leur contour; les pétioles sont grêles, velus, plus longs que les feuilles; les stipules opposées, un peu ouvertes, rouffâtres, linéaires, lancéolées, aiguës, ciliées.

Chaque rameau est terminé par un pédoncule presque si forme, velu, long de huit à dix pouces, à ramifications longues & diffuses; qui supporte des fleurs presque en grappes, très-distantes, réunies deux ou trois à chaque articulation, soutenues par des pédoncules particuliers, longs, simples, capillaires, uniflores, ciliés, un peu visqueux, inclinés avant la floraison; les calices sont campanulés, divisés en cinq découpures irrégulières, aiguës, velues; la corolle purpurine, les ailes lancéolées, plus courtes que la carène; les gouffes étroites, comprimées, linéaires, très-glabres; leurs articulations à demi ovales, allongées, aiguës à leur insertion, rudes, accrochantes.

Cette plante croît à l'île Bourbon; elle se trouve aussi dans l'Arabie heureuse. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

### 34. SAINFOIN à feuilles d'érythoine. *Hedysarum erythraefolium*. Just.

*Hedysarum foliis ternatis; foliis lato-ovatis, acuminatis; racemis subpaniculatis; articulis doli-briformibus, glabris.* (N.)

Cette espèce approche de l'*Hedysarum repandum*, mais ses feuilles ne sont point sinuées; ses tiges sont glabres, les fleurs bien moins étalées.

Ses racines sont grosses, presque charnues, blanchâtres, rameuses: il s'en élève des tiges grêles, souples, effilées, glabres, striées, anguleuses, garnies de feuilles amples, pétiolées, réunies quelquefois

quelquefois trois ou quatre vers l'extrémité des rameaux, ternées, composées de trois grandes folioles ovales, obtuses ou légèrement acuménées, glabres à leurs deux faces, minces, vertes en dessus, blanchâtres en dessous, à nervures blanches ou jaunâtres, entières à leurs bords, longues de deux à quatre pouces, larges de deux à trois; les pétioles sont glabres, filiformes, striés, anguleux, de la longueur des feuilles, munis à leur base de stipules sèches, subulées.

Les pédoncules sont situés à l'extrémité des rameaux; ils m'ont paru aussi partir des racines; ils sont glabres, un peu comprimés, striés, anguleux, longs presque d'un pied, supportant à leur partie supérieure des fleurs médiocrement paniculées, munies de pédoncules partiels, inégaux, simples, capillaires, glabres, alternes ou deux à deux, longs d'un pouce; garnies de bractées fort petites, setacées, ciliées. Les calices sont glabres, très-courts, presque campanulés, divisés à leur orifice en cinq dents courtes, presque obtuses. La corolle est blanchâtre dans l'état de dessiccation, petite; la carène presque aussi longue que l'écrand; les gouffes sont longues, articulées, comprimées, très-glabres; les articulations courbées presque en forme de doigt, aiguës à leurs deux extrémités, arrondies à leur côté antérieur, tronquées de l'autre.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. (*V. f. in herb. Juss.*)

Les Sauvages emploient en infusion les racines de cette plante dans les dysenteries, le flux de sang, les hémorragies. On assure qu'ils en obtiennent d'heureux effets.

### 35. SAINFOIN visqueux. *Hedysarum viscidum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis; leguminibus membranaceis, levibus, integris; caule rarisque hispida.* Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 506. n°. 22. — Flor. zeyl. 295.

*Phasiolus viscosus; spiculo, flore ac fructu villosa.* Burm. Thesaur. zeyl. 187. tab. 84. fig. 1.

*Hedysarum zeylanicum, trifoliatum, viscosum; phasoli folio subrotundo; fuscis compressis, hirsutis.* Mufl. Zeyl. pag. 36.

Cette plante, par la forme de ses feuilles, ressemble beaucoup à l'*Hedysarum repandum*; cependant elle en est très-différente par ses fleurs, à la vérité en longs épis grêles, mais bien moins distantes, & dont les pédoncules sont beaucoup plus courts, les gouffes plus larges, velues.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, étalés, velus, d'un pourpre noirâtre, presque cylindriques, visqueux, garnis de feuilles pétioles, composées de trois folioles inégales, assez grandes, les

deux latérales à peine pédiculées, ovales, presque rhomboïdales, glabres à leur face supérieure, velues & tomenteuses en dessous, entières & légèrement ondulées à leurs bords, supportées par des pétioles de la longueur des folioles supérieures, tomenteux, presque tétragones, munis à leur base de petites stipules courtes, lancéolées, acuménées, très-caduques & velues. De l'aisselle des feuilles & de l'extrémité des rameaux s'élèvent de longs épis grêles, visqueux, velus, cylindriques, de quatre à huit pouces de longueur, garnis de fleurs distantes, opposées ou alternes, supportées par des pédoncules particuliers, capillaires, longs d'environ un demi-pouce, très-ouverts, munis à leur base de petites bractées ovales, velues. Le calice est fort court, campanulé, à cinq dents écartées & un peu inégales. La corolle est purpurine: il lui succède une gouffe droite, plane, très-visqueuse, velue, sans articulations, longue d'un demi-pouce, sur deux lignes de largeur, & dont je n'ai pu observer les semences à cause de la jeunesse du fruit.

Cette plante croît dans l'Inde & à l'île de Ceylan. (*V. f. in herb. Lam.*)

### 36. SAINFOIN hérissé. *Hedysarum hirtum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, ovalibus; caule fruticoso; spicis oblongis; calicibus fruticulosque hirsutis, monospermis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Gronov. Virgin. 128.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-ellipticis; stipulis subulatis; racemis axillaribus, oblongis, foliis longioribus, lomentisque uniaiculatis, hirsutis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1193. n°. 53.

*Leptocera (polystachia) erecta, villosissima; foliis rotundato-ovalibus, spicis pedunculatis, corollâ calicis subequali, legumine calicem subequante.* Michaux. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 71. tab. 40.

*Trifolium fruticosum, hirsutum; spicis oblongis, pedunculatis.* Gronov. Virgin. 1. pag. 175.

*Idem, foliis rotundioribus, utrinque villosis.* (N.)

C'est un arbrisseau distingué par la disposition de ses fleurs en petites grappes touffues, axillaires, dont les fruits consistent en une petite gouffe non articulée, à peine aussi longue que le calice, aiguë & velue.

Ses tiges se divisent en rameaux allongés, cylindriques, un peu anguleux & cannelés à leur partie supérieure, à peine pubescents, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles ovales, elliptiques, velues dans leur jeunesse, glabres dans leur entier développement, vertes à leurs deux faces, mais un peu plus pâles en dessous, longues d'environ un pouce & demi, larges d'un demi-pouce & plus; les folioles

latérales plus courtes, médiocrement pédiculées, obtuses à leurs deux extrémités, mucronées par une très-petite pointe à leur sommet; les pétioles presque aussi longs que les folioles, munis à leur base de stipules sétacées, fort petites, velues.

Les fleurs sont disposées en épis rameux ou en grappes axillaires, quelques-unes sessiles, plus ordinairement munies d'un pédoncule commun, souvent de la longueur des feuilles, presque capillaire, pubescent, rameux à sa partie supérieure, soutenant des fleurs inégalement pédiculées, très-approchées, presque fasciculées ou en bouquet. Leur calice est velu, blanchâtre ou de couleur purpurine, à cinq découpures roides, très-droites, lancéolées, acuminées, très-aiguës. La corolle est blanche, environ une fois aussi longue que le calice; ses fruits sont renfermés dans le calice, à peine aussi longs. Ils consistent en une petite gouffe à une seule articulation comprimée, ovale, aiguë, revêtue de poils blanchâtres.

Cette plante se rencontre dans les contrées septentrionales de l'Amérique. *H. (V. f. in herb. Lam.)*

La variété *g* est beaucoup plus velue que la précédente; ses folioles plus arrondies, un peu plus petites, & velues à leurs deux faces. Elle a été recueillie à la Caroline par Frazer.

37. SAINFOIN à gouffes pendantes. *Hedysarum revocatum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, racemis erectis, leguminibus pendulis, multi-articulatis*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 21. Mantiss. 103.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-ovatis, subteris sericeo-tomentosis; racemis erectis, elongatis, axillaribus; lomentis reflexis, recandis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1181. n°. 27.

Des gouffes composées de plusieurs articulations distinguent particulièrement cette espèce de l'*Hedysarum lineatum*, avec lequel d'ailleurs elle a beaucoup de rapports.

C'est un arbrisseau dont les tiges rameuses sont garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales ou un peu arrondies, entières, glabres à leur face supérieure, tomenteuses & soyeuses à leur face inférieure. Les fleurs sont disposées en grappes, les unes latérales, plus petites; d'autres, terminales, plus longues, droites, allongées; les pédoncules sont filiformes, pendans; les gouffes comprimées, un peu courbées, sinuées à leur côté extérieur, composées de quatre à sept articulations monospermes.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. *H. (Descript. ex Linn.)*

38. SAINFOIN méridional. *Hedysarum australe*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, ramisque triquetris, sericatis; pedunculis umbellatis, axillaribus, petiolo brevioribus; caule fruticofo*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1183. n°. 31.

*Hedysarum umbellatum*. Forst. Prodr. n°. 274.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec l'*Hedysarum umbellatum*, dont elle n'est peut-être qu'une variété; cependant son port n'est pas le même: elle en diffère encore par ses folioles oblongues, une fois plus petites.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux alternes, velus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles allongées, étroites, lisses à leur face supérieure, soyeuses en dessous, marquées de nervures simples, linéaires & de veines en réseau. Les pétioles, les pédoncules & les calices sont couverts d'un duvet soyeux, & non de poils séparés & roides comme ceux de l'*Hedysarum umbellatum*. Ses fruits ne sont pas encore connus.

Cette plante croît dans l'île de Tanna & dans la Nouvelle-Calédonie. *H.*

39. SAINFOIN à crochets. *Hedysarum lappaceum*. Vahl.

*Hedysarum foliis ternatis, obcordatis; caule suffructuoso, ramoso, divaricato; floribus axillaribus, subsiliariis; lomentis biarticulatis, homophloeocaulis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1184.

*Hedysarum foliis ternatis, obcordatis; floribus axillaribus, subsiliariis; leguminibus biarticulatis, sevis homophloeis*. Vahl. Symboi. 1. pag. 54.

*Hedysarum foliis ternatis, obcordatis; caulibus protumebentibus; siliquis compressis, spinosis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. 136.

Ses tiges sont presque ligneuses, étendues sur la terre, cylindriques, pubescentes, très-rameuses, de la grosseur d'une plume de pigeon, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de folioles sessiles, en cœur renversé, petites, un peu épaisses, velues, pourvues à leur sommet d'une pointe recourbée, les folioles latérales plus petites; les pétioles courts, munis à leur base de deux stipules fort petites, subulées.

Les fleurs sont solitaires, quelquefois deux, situées dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules courts, garnis à leur partie inférieure de bractées subulées. Leur calice est velu, divisé en cinq découpures subulées. La corolle est petite, une fois plus longue que le calice; l'étendard aussi long que la carène; les ailes linéaires, de la longueur du calice; l'ovaire velu; les gouffes longues d'un demi-pouce, composées de deux articulations comprimées, orbiculaires, velues; couvertes de poils roides, courbés en crochets à leur sommet.

On rencontre cette plante dans l'Arabie heureuse. (Description ex Vahl.)

40. SAINFOIN tomenteux. *Hedysarum tomentosum*. Thunb.

*Hedysarum foliis ternatis, subius tomentosis; caule angulato, tomentoso; racemis axillaribus*. Thunb. Flor. japon. pag. 188. — Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1181. n° 26.

Cette plante est remarquable par le duvet tomenteux qui recouvre presque toutes ses parties, excepté la face supérieure des feuilles.

Ses tiges sont herbacées, anguleuses, droites, flexueuses, hautes d'un pied & davantage, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, très-entières, obtuses, mucronées à leur sommet, bordées à leur contour, veinées & nerveuses, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous; les folioles latérales légèrement pétiolées, longues de six lignes; la terminale une fois plus longue; les pétiolés sont droits, sillonnés, très-velus, longs d'un pouce, munis à leur base de stipules opposées, étacées, élargies à leur partie inférieure. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires.

Cette plante se rencontre au Japon. (Description ex Thunb.)

41. SAINFOIN velu. *Hedysarum villosum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, ellipticis, mucronatis, utrinque tomentosis, stipulis lanceolatis, racemis axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1195. n° 67.

Ses rameaux sont cannelés & tomenteux, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles elliptiques ou en ovale renversé, tomenteuses à leurs deux faces, entières à leurs bords, mucronées à leur sommet, obtuses, longues d'environ un pouce, munies, à la base de leur pétiole, de bractées courtes & lancéolées.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes beaucoup plus longues que les feuilles. Leur calice est divisé en cinq découpures lancéolées, aiguës, chargées de poils courts & roides. La corolle, plus grande que le calice, paraît, d'après le sec, devoir être de couleur jaunâtre; les fruits ne sont pas connus.

Cette plante paraît tenir le milieu entre l'*Hedysarum trichocarpum* & l'*Hedysarum hirtum*; mais les grappes de ces fleurs sont beaucoup plus grandes que dans ces deux espèces. Son lieu natal n'est pas connu. (Description ex Willd.)

42. SAINFOIN à fruits courts. *Hedysarum trichocarpum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, lanceolatis, obtusis, subtus strigosis; stipulis hirsutissimis; racemis subcapitis; lomentis uniauriculatis, calice brevioribus, villosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1194. n° 54.

*Hedysarum trichocarpum*. Steph. in litt.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, alternes, striés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles oblongues, lancéolées, entières à leurs bords, obtuses & mucronées à leur sommet, glabres à leur face supérieure, chargées, à leur face inférieure, de poils courts & couchés, longues d'un pouce; la foliole terminale plus grande, longuement pétiolée; la base du pétiole commun munie de stipules filiformes, très-ouvertes.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes pédonculées, réduites au nombre de six à neuf en un fascicule presque capité. Les calices sont pubescents, divisés en cinq découpures subulées, presque de la longueur de la corolle. Les gousses n'ont point d'articulations; elles sont courtes, ovales, aiguës & velues.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. (Description ex Willd.)

43. SAINFOIN glutineux. *Hedysarum glutinosum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-ovatis, acuminatis; panicula scapiformi et calice basi; pedunculis viscosis; lomentis auriculatis oblongo-triangulatis, glabrisculis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1198. n° 69.

*Hedysarum glutinosum*. Mülleb. in litt.

Ses rameaux sont cannelés, garnis de feuilles amples, ternées, longuement pétiolées, alternes, composées de trois folioles ovales, presque en cœur, longues de quatre à cinq pouces & plus, très-larges, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, chargées à leur base, longuement acuminées à leur sommet, minces, vertes, la terminale plus grande, un peu arrondie, nerveuse & finement réticulée.

Les fleurs sont disposées en une panicule très-ample, axillaire, située vers la base des tiges, divisée en ram aux bords, effilés, visqueux, pubescents ou chargés de poils courts; les filaments sont distans, pédonculés, disposés presque deux à deux alternativement, munies de bractées étroites, filiformes, plus longues que les pédoncules partielles. Le calice est fort petit, presque campanulé, obtus; les gousses sont composées d'articulations oblongues, distantes, irrégulières, très-obtuses, chargées de poils rares, épais, très-courts.



Cette plante croît au Canada & dans les contrées septentrionales de l'Amérique. (V. f. in herb. Lam.)

44. SAINFOIN pied-de-lièvre. *Hedysarum lago-podioides*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, racemis oblongis, leguminibus inflexis, calicibus hirsutis*. Linn. Syst. veget. pag. 562. — Burm. Flor. ind. pag. 68. tab. 53. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1203. n°. 80.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, obtusis; spiciis hirsutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1057.

Ses tiges se divisent en rameaux presque anguleux, un peu comprimés, velus ou tomenteux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles inégales, ovales, obuses, presque sessiles, rudes, & d'un beau vert à leur face supérieure; pubescentes & douces au toucher en dessous, entières à leurs bords, terminées quelquefois par une petite pointe particulière, à nervures latérales, simples, obliques, presque parallèles & jaunâtres, dont l'intervalle est rempli par un joli réseau de veines un peu faillantes; la foliole terminale longue de deux pouces & plus; les latérales beaucoup plus petites; le pétiole plus court que ces dernières, velu, rouffâtre, muni à sa base de stipules sétacées & velus.

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux un épi ovale, obtus, épais, très velu; chaque fleur pédonculée, garnie à sa base d'une bractée ovale, subulée, large, velue, ciliée à ses bords, un peu jaunâtre. Les calices sont très-courts, terminés à leur orifice par trois filaments longs, capillaires, très-velus, chargés, ainsi que les pédoncules, de poils rouffes, abondans, mous, d'un blanc cendré. La corolle est fort petite; les gouffes à une seule semence.

Cette plante croît dans l'Inde, à la Chine & aux îles Philippines. (V. f. in herb. Lam.)

45. SAINFOIN à gouffes échancrées. *Hedysarum emarginatum*.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, glabris; stipulis subovatis, minimis; floribus paniculato-racemosis; leguminibus subarticulatis, articulis emarginatis*. (N.)

Cette plante a des rameaux droits, anguleux, frêles, à peine velus, toides, verdâtres, garnis de feuilles alternes, ternées, fermes, composées de trois folioles ovales, longues d'un pouce & demi, plus élargies à leur base, épaisses, entières, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, marquées, surtout en dessous, de nervures blanchâtres, munies, à la base de leur pétiole, de

petites stipules courtes, un peu ovales, lancéolées, aiguës, glabres, un peu frêles.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles, disposées en très-longues grappes presque simples, dont l'ensemble forme une ample panicle; ces fleurs sont supportées par des pédoncules partiels, capillaires, un peu pubescens, garnis à leur base de très-petites bractées sétacées. Le calice est fort petit, court, presque glabre, à cinq petites dents; la corolle fort petite, jaunâtre; les gouffes glabres, très-comprimées, à une seule articulation ovale, un peu élargie, échancrée à un de ses côtés.

Cette plante croît à la Martinique. (V. f. in herb. Lam.)

46. SAINFOIN tortueux. *Hedysarum tortuosum*. Swartz.

*Hedysarum foliis ternatis, ovali-oblongis, obtusis, glabris; racemis erectis, axillaribus; leguminibus tortuosis, compressis, pubescentibus*. Swartz, Prodr. 107. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1190. n°. 47.

*Hedysarum foliis ternatis, ovato-lanceolatis, glabris; racemis axillaribus terminalibusque; leguminibus compressis, tortuosis*. Vahl. Symbol. 2. pag. 82.

*Hedysarum caulescens, erectum, triphyllum; floribus minimis; spiciis laxis, terminalibus*. Brown, Jam. 301.

*Hedysarum triphyllum, erectum*. Sloan, Hist. 1. pag. 184. tab. 116. fig. 2.

On distingue cette espèce à ses folioles glabres, lancéolées, obtuses; à ses grappes de fleurs longues & peu garnies, & particulièrement à ses gouffes, dont les articulations ont une forme rhomboïdale.

Ses tiges sont menues, glabres, cylindriques, presque ligneuses à leur partie intérieure, hautes de quatre à cinq pieds; elles se divisent en rameaux droits, alternes, élançés, pubescens, un peu frêles & anguleux, légèrement visqueux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, sensiblement ciliées à leurs bords lorsqu'on les examine à la loupe; la foliole terminale lancéolée, presque elliptique, obtuse à ses deux extrémités, longue de deux pouces; les deux folioles terminales, ovales, lancéolées, pédiculées, une fois plus courtes; les pétioles pubescens, munis, à leur base & à l'insertion des folioles, de petites stipules sétacées.

Les fleurs forment des grappes simples, ou plutôt de longs épis axillaires & terminaux, d'environ un pied de longueur, très-droits, velus, cylin-

dirigés, peu garnis, sur lesquels les fleurs sont distantes, deux à deux, alternes, supportées par de longs pédoncules partiels, capillaires, tressoufflés, garnis à leur base d'une petite bractée sétacée, fort petite; celles du pédoncule commun sont opposées, ovales, aigües, pubescentes. Les calices sont petits, de couleur verte en dehors, purpurine en dedans, ordinairement à quatre divisions aigües; munis de deux petites callosités, comme dans les *deltochloa*. La corolle est petite; la carène & les ailes d'un pourpre clair; les gouffes sont longues, étroites, linéaires, articulées, pubescentes; les articulations un peu rorées, courtes, presque égales, petites, de forme rhomboïdale.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, à la Martinique. h (V. f. in herb. Lam.)

Cette plante s'écarte un peu de la description qu'a donnée M. Vahl de l'*hedyfarum tortuosum*, mais pas assez pour la considérer comme une espèce différente. Ses feuilles sont bien plus grandes, obtuses, point mucronées, plutôt elliptiques qu'ovales; ses tiges très-élevées. On pourroit presque la regarder comme intermédiaire entre l'*hedyfarum tortuosum* & l'*hedyfarum molle*, qui peut-être devroient entrer dans la même espèce.

47. SAINFOIN à feuilles molles. *Hedyfarum molle*. Vahl.

*Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, attenuatis, subius villosis; racemis terminalibus, pedicellis subternis, leguminibus tortuosis.* Vahl. Symbol. 2. pag. 81. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1191. n°. 48.

J'ai dit plus haut que cette plante étoit si voisine de l'*hedyfarum tortuosum*, qu'elle ne m'en paroît guère qu'une variété, surtout ayant observé des individus intermédiaires entre ces deux plantes; cependant cette dernière ne m'étant pas suffisamment connue, je lui ai conservé le rang que M. Vahl lui a donné.

Ses tiges, d'après cet auteur, sont plus fortes que celles de l'espèce précédente; & elles sont garnies de feuilles alternes, ternées; les folioles plus grandes, souples, couvertes en dessus d'un duvet mou, qui existe à leurs deux faces lorsqu'elles sont jeunes, légèrement tachetées. Les fleurs sont disposées en longs épis; les pédoncules partiels réunis au nombre de quatre ou cinq; les gouffes sont une fois plus grandes que celles de l'espèce précédente, tortueuses, rhomboïdales; la dernière articulation bien plus ample que les autres.

Cette plante croît dans l'Amérique, à l'île de Sainte-Croix. h (Descript. ex Vahl.)

48. SAINFOIN à gouffes nombreuses. *Hedyfarum polycarpum*.

*Hedyfarum foliis ternatis, ovatis, obtusis; stipulis fasciculatis; racemis spicatis; leguminibus numerosissimis, articulatis, hispidis, recurvatis; articulis suborbiculatis.* (N.) Lam. Illustr. Gener. tab. 628. fig. 4.

C'est une très-belle espèce, distinguée par ses gouffes nombreuses, hispides, composées d'articulations comprimées, presque orbiculaires, agréablement réticulées.

Ses rameaux sont droits, glabres, cylindriques, un peu striés, garnis de feuilles alternes, ternées, composées de folioles pédiculées, ovales, obtuses à l'un des deux extrémités, glabres à leurs deux faces, épaisses, nervueuses, réticulées; la foliole terminale presque une fois plus grande que les deux latérales, longue d'un pouce & demi, supportée par des pétioles un peu pubescents, munis à leur base de stipules allongées, étroites, subulées, de moitié plus courtes que les pétioles.

Les fleurs sont disposées presque en grappes, sur un épi simple lorsqu'il est latéral, rameux vers la base quand il est terminal, long de cinq à six pouces & plus. Le pédoncule commun est droit, pubescent; les pédoncules partiels courts, simples, capillaires, munis à leur base de petites bractées élargies à leur base, filueuses, ciliées à leurs bords, sétacées; les fleurs sont nombreuses, rapprochées; le calice est glabre, petit, presque tubulé, divisé à son orifice en cinq dents courtes, aigües; la corolle d'une grandeur médiocre. Le fruit est une gouffe longue d'environ deux pouces & plus, étroite, composée de six à huit articulations presque orbiculaires, un peu tronquées à leurs deux extrémités, hérissées, surtout vers leurs bords, de poils rudes & courts, réticulées par des nervures presque divergentes.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

49. SAINFOIN paniculé. *Hedyfarum paniculatum*. Linn.

*Hedyfarum foliis ternatis, oblongo-lanceolatis, glabris; panicula terminali; lomentis articulis rhombicis, pubescentibus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1196. n°. 61.

*Hedyfarum foliis ternatis, lineari-lanceolatis; floribus paniculatis, leguminibus rhombicis.* Linn. Spec. Plant. 1056. — Gronov. Virgin. 108.

*Onobrychis mariana, triphylla; passiflora pentaphylla asaphiorea folio & facie; siliculis dentatis, asperis.* Pluken. Mantiss. pag. 140. tab. 432. fig. 6.

*Hedyfarum flans, foliis trifoliatis, linearibus, glabris; panicula sparsiflora, leguminibus renocissimis, articulis subovalis-lenticularibus.* Mich. Flor. botcal. Amer. vol. 2. pag. 74.

Ses tiges, hautes d'un pied & demi à deux pieds, se divisent en rameaux élancés, glabres, cylindriques, finement striés, de couleur purpurine ou rougeâtre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de folioles oblongues, lanceolées, étroites, presque acuminées, un peu obtuses, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles en dessous, entières à leurs bords, pédicelées, longues d'environ deux pouces, larges de quatre lignes, munies de stipules courtes, aiguës.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, longue, assez ample, dont les ramifications sont filiformes, élancées, un peu pubescentes, sur lesquelles les fleurs sont distantes, placées alternativement, solitaires ou deux à deux, ou presque en petits paquets; soutenues par des pédoncules terces, longs de trois à quatre lignes, garnis à leur base de très-petites bractées presque scarieuses, un peu concaves, ovales, aiguës. Les calices sont courts, pubescents, presque campanulés, entiers, divisés à leur orifice en cinq dents courtes, élargies, à p. fine aiguës. La corolle est petite, purpurine; les gousses sont longues, pubescentes, composées ordinairement de quatre articulaires rhomboïdales (presqu'ovales & lenticaulaires, selon M. Chauv.).

Cette plante croît dans la Virginie, la Caroline, & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

50. SAINFOIN à rameaux souples. *Hedysarum junceum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, lanceolatis; leguminibus uniauriculatis, rhombicis, pedunculatis, lateralibus, subumbellatis*. Linn. Syst. veget. pag. 674. n°. 32. — Dec. 1. tab. 4.

*Hedysarum foliis ternatis, linearibus, basi attenuatis, subhis strigoso-pubescentibus; racemis axillaribus; lomentis uniauriculatis, ovatis, levibus, cordatis longitudoine*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1194. n°. 55.

*Hedysarum triphyllum, fasciculis albis, polyanthos*. Amm. Ruth. 154.

*Cytisus saxatilis, meliodori folio ad caulem appressis; floribus in foliorum axillis*. Amm. Ruth. 281.

Cette espèce a presque le port d'un genre par ses rameaux élancés, par ses feuilles ternées, à folioles linéaires, obtuses, & par ses fleurs réunies, sous l'assise des feuilles, en petits paquets & presque en ombelle.

Ses tiges sont droites, divisées en rameaux souples, longs, striés, pubescents, garnis de feuilles nombreuses, alternes, presque droites, péti-

olées, ternées, composées de trois folioles presque égales, linéaires, oblongues, obtuses à leur sommet, un peu plus étroites à leur base, longues d'un pouce, sur deux lignes de large; glabres à leur face supérieure, pubescentes & réticulées en dessous, presque sessiles; le pétiole commun velu, muni à sa base de petites stipules sétacées.

Les fleurs sont nombreuses, disposées le long des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes plus courtes que les feuilles, presque en forme de petites ombelles; les pédoncules pubescents, garnis de très-petites bractées courtes, ovales. Le calice est un peu velu, cendré, divisé en cinq découpures lanceolées, courtes, striées. La corolle est blanche, l'étendard marqué, vers sa base, de lignes purpurines. Le fruit est une petite gousse point articulée, à peine de la longueur du calice qui l'enveloppe, médiocrement comprimée, ovale, aiguë, revêtue de quelques poils couchés & cendrés.

Cette plante croît dans la Sibérie & la Tartarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

51. SAINFOIN à fleurs sessiles. *Hedysarum sessiliflora*.

*Hedysarum erectum, foliis oblongis; fasciculis floribus sessilibus, numerosis; leguminibus calice minuto subnudatis, acutis*.

*Leptoderm sessiliflora*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 70.

*Medicago (virginica), caule erecto, ramossimo; floribus fasciculatis, terminalibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 573. n°. 2.?

*Loto affinis trifoliata, frutescent, glabra*. Pluken. Mant. 120.?

*Hedysarum junceum*. Walter, Flor. carolin. secundum Michaux.

Cette plante a de très-grands rapports avec *Hedysarum junceum*; elle en diffère par ses fleurs en grappes sessiles, nombreuses, axillaires.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, alternes, garnis de feuilles pétiolées, ternées, composées de trois folioles oblongues, elliptiques, assez larges, quelquefois beaucoup plus étroites, presque linéaires, glabres à leurs deux faces, réticulées, vertes, plus pâles en dessous, munies, à la base des pétioles, de bractées sétacées. Les fleurs sont nombreuses, disposées par fascicules sessiles dans l'aisselle des feuilles; leur calice est velu, petit, caduc, à cinq dents presque égales, profondes, aiguës. Les gousses ne sont point articulées; elles sont ovales, pétiolées, dépouillées ordinairement du calice, à une seule sémence.

Cette plante croît dans la Caroline & la Virginie. (*V. f. in herb. Juss.*)

52. SAINFOIN réticulé. *Hedysarum reticulatum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, linearibus, subius strigoso-pubescentibus; racemis axillaribus; lomentis uniauriculatis, ovatis, reticulatis, calice majoribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1194. n°. 56.

*Hedysarum reticulatum*. Mühlent. in litt.

Cette espèce ne paroît être qu'une variété de l'*Hedysarum junceum*, à laquelle elle ressemble beaucoup, mais dont elle diffère, d'après Willdenow, par ses feuilles aussi larges à leur base qu'à leur sommet, par ses fleurs beaucoup plus petites, par ses calices ordinairement point persistans, par ses gouffes ovales, aiguës, réticulées, beaucoup plus grandes que les calices.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ♀

53. SAINFOIN à fleurs violettes. *Hedysarum violaceum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis; floribus geminatis; leguminibus nudis, venosis, articulatis, rhombis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Kniph. Centur. 3. n°. 49.

*Hedysarum foliis ternatis, ellipticis, obtusis; racemis umbellatis, longitudine petioli; floribus geminatis; lomentis uniauriculatis, rhombis, reticulatis, glabris*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1195. n°. 50.

*Hedysarum foliis ternatis, lanceolatis; leguminibus monospermis*. Gronov. Virgin. 106.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, souples, presque filiformes, cylindriques, pubescens, garnis de feuilles alternes, ternées, composées de trois folioles presque égales, variées dans leur grandeur, ordinairement longues de cinq à six lignes, sur trois lignes de large, presque sessiles, ovales, arrondies à leurs deux extrémités, quelquefois un peu rétrécies en coin à leur base, souvent surmontées d'une petite pointe à leur sommet, entières, glabres à leur face supérieure, pubescentes ou un peu velues en dessous, marquées de nervures latérales, confluentes vers le bord des feuilles, réticulées, munies, à la base de leur pétiole, de petites stipules opposées, sétacées.

Les fleurs sont axillaires; les péduncules communs sétacés, très-fins, plus longs que les feuilles, supportant ordinairement deux fleurs vers leur sommet, sessiles ou un peu pédonculées; celles des feuilles inférieures sont quelquefois plus nombreuses, presque agglomérées, & leur péduncule

bien plus court. Leur calice est fort petit, pubescent, à cinq divisions égales, courtes, aiguës; la corolle violette, petite: il lui succède une gouffe deux ou trois fois plus longue que le calice, comprimée, rhomboïdale, aiguë, glabre, réticulée, ne contenant qu'une seule semence.

Cette plante croît dans la Virginie: elle m'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline. ♀ (*V. f.*)

La description que je viens de présenter est conforme à celle que Linné a donnée de cette plante. Willdenow s'en écarte, en attribuant aux feuilles une forme elliptique, & représentant les fleurs comme de petites grappes, presque disposées en ombelle, supportées sur un péduncule commun, long de deux lignes. Ce ne peut être probablement qu'une variété, surtout relativement à la disposition des fleurs, qui sont quelquefois presque sessiles, & comme fasciculées dans l'aisselle des feuilles inférieures. Quant à la forme elliptique des folioles, je n'en ai vu aucune qui se rapproche dans les individus que j'ai examinés.

54. SAINFOIN divergent. *Hedysarum divergens*. Willden.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, obtusis; racemis petioli longioribus; floribus geminatis; lomentis uniauriculatis, ovatis, reticulatis, glabris*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1196.

*Hedysarum divergens*. Mühlent. in litt.

Cette plante, d'après Willdenow, voisine, mais très-différente de l'*Hedysarum violaceum*, a des feuilles ternées, alternes, composées de trois folioles oblongues, obtuses, entières à leurs bords, mucronées à leur sommet, longues d'un pouce & demi, glabres à leur face supérieure, couvertes en dessous de poils rares & couchés.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, longues d'un pouce ou d'un pouce & demi, ordinairement un peu plus longues que les pétioles. Celles qui se trouvent dans les aisselles des feuilles inférieures sont beaucoup plus courtes, & supportent souvent trois ou quatre fleurs, tandis que les supérieures n'en ont ordinairement que deux. Les gouffes sont glabres, sans articulations, courtes, ovales, réticulées, ne renfermant qu'une seule semence.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale. ♀ (*Descript. ex Willden.*)

55. SAINFOIN lespédèze. *Hedysarum lespedeza*.

*Hedysarum foliis ternatis, ovalibus; pedunculis longissimis, setaceis, spiciformis; leguminibus uniauriculatis, nudatis*. (N.)

*Lepedeza* (procumbens), gracilis, universa pa-

*bens ; foliolis ovatis ; pedunculis setaceis , distincte pauciterque spiciferis ; leguminibus calice minuto-nudatis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 71. tab. 39.

Cette plante a les plus grands rapports avec l'*Hedyfarum violaceum* & l'*Hedyfarum divergens*. Je ne la regarderois même que comme une variété si Michaux, qui l'a recueillie dans son lieu natal, n'en eût fait une espèce, & même un genre sous le nom de *Lepidoptera*, consacré à M. Lépédère, gouverneur de la Floride.

Ses tiges sont couchées ; elles produisent des rameaux droits, alternes, presque simples, point striés, pubescens, filiformes, garnis de feuilles alternes, ternées, pétiolées, composées de trois folioles ovales, à peine longues d'un demi-pouce, larges de trois à quatre lignes, presque sessiles, entières, glabres à leur face supérieure, chargées en dessous de quelques poils courts, rares & couchés ; obtuses & même un peu mucronées par une petite pointe à leur sommet, nerveuses, veinées, réticulées ; les pétioles de moitié plus courts que les feuilles, garnis à leur base de stipules sétacées.

Les fleurs sortent de l'aisselle des feuilles supérieures ; elles sont supportées par un pedoncule commun, capillaire, beaucoup plus long que les feuilles, écarté, oblique, soutenant un, quelquefois deux ou trois épis de fleurs peu nombreuses, presque sessiles. Leur calice est fort petit, pubescent, blanchâtre, à cinq dents courtes, aiguës. La corolle est petite, purpurine ; le fruit est une gousse ovale, point articulée, glabre, nue ou non recouverte par le calice, petite, un peu aiguë, à une seule semence.

On trouve cette plante dans la Caroline & la Virginie. ? (*V. f. in herb. Lamarek.*)

56. SAINFOIN à fleurs agglomérées. *Hedyfarum conglomeratum*.

*Hedyfarum foliis trifoliatis, subsessilibus ; foliolis oblongis, floribus capitato-terminalibus, leguminibus calice multo minoribus.* (N.)

*Lepidoptera (capitata), erecta ; foliis subsessilibus, foliolis oblongis, capitulis fissilibus conglomerato-terminalibus, legumine intra calicem multo majorem recondito.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 71.

Ses tiges sont droites, velues, cylindriques, striées ; elles se divisent en rameaux garnis de feuilles alternes, presque sessiles, ternées, composées de trois folioles sessiles, oblongues, luisantes, soyeuses, munies de stipules sétacées. Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en petits paquets agglomérés & en tête, pourvus de pedoncles partiels très-courts, mu-

nis de bractées subulées. Les calices sont divisés en cinq folioles étroites, roides, aiguës, velues. Les gouffes sont fort petites, point articulées, ovales, pubescentes & lenticulaires, à une seule semence, plus courtes que le calice persistant qui les enveloppe.

Cette plante se rencontre dans la Caroline & la Virginie. (*V. f. in herb. Juss.*)

57. SAINFOIN couché. *Hedyfarum safinum*. Swartz.

*Hedyfarum foliis ovatis, obtusiusculis, subhis incano-villosis ; caule ramofo-procumbente ; racemis simplicibus, erectis, terminalibus.* Sw. Prodr. 106.

*Hedyfarum foliis ternatis, oblongis, obtusiusculis, superne nitidis, subtus incanis ; stipulis ovatis, acuminate, racemo simpliciter terminatis ; lomeni articulari semiorbiculatis, incanis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1190. n°. 46.

*Hedyfarum triphyllum, fruticosum, supinum ; flore purpureo.* Sloan, Jam. 73. Hist. 1. pag. 185. tab. 118. fig. 2. — Rai, Suppl. 458. — Tournef. Inst. R. Herb. 401.

Ses tiges sont couchées, rameuses, presque glabres, garnies de feuilles ternées, alternes, pétiolées, composées de trois grandes folioles oblongues, lancéolées, pédicelées, obtuses ou un peu aiguës, luisantes à leur face supérieure, blanchâtres en dessous, munies, à la base de leur pétiole, de stipules ovales, acuminées.

Les fleurs sont disposées en grappes simples, droites, à l'extrémité des rameaux & des tiges. La corolle est de couleur violette ou purpurine ; les gouffes articulées, comprimées ; les articulations à demi-orbiculaires, blanchâtres, un peu pubescentes, monopermes.

Cette plante croît dans la Jamaïque. 6

58. SAINFOIN à grappes. *Hedyfarum racemosum*. Thunb.

*Hedyfarum foliis ternatis, oblongis ; stipulis glabris ; caule frutescente, erecto ; racemis axillaribus, erectis, longissimis ; leguminibus glabris.* Thunb. Flor. jap. pag. 285. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1192. n°. 51.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, glabres, divisées en rameaux alternes, glabres, relevés, anguleux, de couleur purpurine, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles pétiolées, ovales, oblongues, aiguës, très-entières, ouvertes, vertes à leur face supérieure, blanchâtres en dessous ; les folioles latérales plus courtes, la terminale une fois plus grande & plus longue, supportées par des pétioles glabres, filiformes, longs d'un pouce, munis à leur base

base de deux stipules sétacées, longues d'une demi-ligne : on en voit de semblables au dessous de chaque foliole.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles disposées en grappes longues de six à sept pouces, droites, étalées, dont les pédoncules communs sont capillaires, filiformes ; les fleurs solitaires ou réunies deux à deux, supportées par des pédoncules partiels très-courts, capillaires ; les gouffes lisses, comprimées, acuminées.

Cette plante croît au Japon. *Th* (*Descript. ex Thunb.*)

59. SAINFOIN jaunâtre. *Hedysarum lutescens*.

*Hedysarum foliis ternatis, foliolis obovato-subrotundis ; spicis terminalibus ; leguminibus brevibus, hispidis ; caulibus tomento lutescente induratis.* (N.)

Cette espèce est remarquable par le duvet jaunâtre qui revêt presque toutes ses parties, & par ses feuilles d'un vert-jaunâtre.

Ses rameaux sont droits, filiformes, cylindriques, couverts de poils courts, serrés, d'un jaune-pâle, garnis de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles inégales, en ovale renversé ou un peu arrondies, épaisses, entières, d'un vert-jaunâtre, légèrement pubescentes, lisses en dessus, marquées en dessous de nervures saillantes, latérales, simples, parallèles, arquées. Les pétioles sont pubescents, munis de stipules droites, lancéolées, velues, striées, très-aiguës, appliquées contre les rameaux.

Les fleurs forment une grappe ou un épi court, terminal, quelquefois axillaire, hérissé de poils fins & jaunâtres ; les pédoncules partiels courts, velus, solitaires ou réunis plusieurs ensemble. Les stipules sont très-caduques ; les calices courts, hispides, divisés en cinq découpures ouvertes, inégales, lancéolées, aiguës ; la corolle à peine une fois plus longue que le calice ; les gouffes petites, à deux ou trois articulations uniformes, point sinuées, velues, terminées par un filament recourbé.

Cette plante croît à la Chine. Elle a été envoyée par M. Poivre. (*V. f. in herb. Juss.*)

60. SAINFOIN à folioles obtuses. *Hedysarum obtusum*. Willden.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, obtusis, basi subcordatis ; stipulis lanceolato-subulatis ; panicula terminali ; articulis lomenti semiorbiculatis, reticulatis, hispidis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1190. n°. 45.

*Hedysarum obtusum*. Mühlenb. in litt.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, cylindriques à leur partie

Botanique. Tome VI.

inférieure, presque triangulaires à leur partie supérieure, chargées de poils très-courts, & garnies de feuilles alternes, ternées, pétioles, composées de folioles ovales, échanquées en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, longues d'un pouce, glabres à leur face supérieure, un peu rudes en dessous ; les folioles latérales plus petites ; les pétioles munis de stipules lancéolées, subulées, fort petites & caduques.

Les fleurs forment une grappe paniculée, droite, simple, terminale. La corolle est de couleur violette ; les gouffes composées de trois articulations hispides, à demi-arrondies, réticulées.

Cette espèce croît dans la Pensilvanie. *x* (*Descript. ex Willden.*)

61. SAINFOIN à petites feuilles. *Hedysarum mycrophylum*.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, villosis ; caule frutescente, erecto, glabro ; floribus terminalibus, paniculatis.* Thunb. Flot. jap. pag. 284. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1191. n°. 49.

Cette plante a des tiges ligneuses, droites, gâbres, filiformes, de couleur purpurine, chargées de rameaux alternes, droits, ramifiés, semblables aux tiges dont les ramifications sont courtes, capillaires, réséchies, couvertes presque entièrement par les stipules, ainsi que les rameaux. Les feuilles sont pétioles, alternes, petites, ternées, composées de trois folioles ovales, aiguës, très-entières, nerveuses, vertes & glabres à leur face supérieure, plus pâles & velues en dessous ; les folioles latérales plus courtes, médiocrement pétioles ; la terminale supportée par un pétiole plus long. Le pétiole commun est glabre, capillaire, de couleur purpurine, long d'environ une ligne ; les stipules membraneuses, sessiles, très-nombreuses, ovales, subulées.

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux, où elles forment une sorte de panicule, dont les pédoncules partiels sont alternes ou presque dichotomes, flexueux, hispides, de couleur purpurine. Les calices sont velus ; la corolle purpurine ; les gouffes composées de trois articulations raboteuses, velues, comprimées.

Cette plante croît au Japon. *Th* (*Descript. ex Thunb.*)

62. SAINFOIN blanchâtre. *Hedysarum canescens*.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundis, subulatis pubescentibus ; stipulis ovatis, acuminatis ; caule angulari, ciliato-hispido ; racemis paniculatis ; lomenti articulis triangularibus, hispidis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1188. n°. 41.

*Hedysarum foliis ternatis, subulatis scabris ; caule*  
G g 5

*hispido; floribus racemosis, conjugatis.* Linn. Syst. veget. pag. 674. n.º. 27. — Hort. Upf. 131.

*Hedysarum foliis ternis foliariis; et eule hispida, fruticosum.* Hort. Cliff. 369. — Gron. Virgin. 108. — Royen, Lugd. Bat. 385.

*Ostrya americana, floribus spicatis; foliis ternatis, caespitosi, usque fuscis asperis.* Fluker. Almag. pag. 270. tab. 368. fig. 5.

*Hedysarum (paleaceum), foliis ovato-subrotundis; stipulis bracteisque paleaceis; spica terminali, simpliciter.* (N.)

Je ne suis pas assez certain de la plante que Linné a nommée *hedysarum canescens*. La description qu'il en donne ne convient qu'imparfaitement à notre variété *H. Willdenow* a développé davantage la description de Linné, & cette dernière diffère très peu de la plante *H.* La plus grande différence consiste dans les fleurs en épis simples, ou moins dans l'unique individu que j'ai examiné. Je n'en ai pas vu les fruits.

Ses tiges sont fermes, droites, presque ligneuses, cannelées, anguleuses, velues, presque quadrangulaires, ainsi que ses rameaux. Les poils qui les recouvrent, sont très-fins, ouverts, mous, pubescents; les feuilles alternes, pétiolées, composées de trois folioles inégales; larges, ovales, un peu arrondies, pétiolées, fermes, longues de deux pouces sur presque autant de large, d'un vert-pâle, entières, glabres à leur face supérieure, un peu blanchâtres en dessous, & chargées de quelques poils rares & couchés, nerveuses, à réseau lâche. Les pétioles sont velus, munis à leur base de larges bractées scarieuses, ovales, presque en cœur, acuminées, velues, ciliées, nerveuses; celles qui accompagnent les folioles, beaucoup plus petites.

Les fleurs sont disposées (en grappes paniculées dans la plante de Willdenow & de Linné) en épis simples, droits, terminaux, velus, garnis de fleurs peu distantes, supportées par de petits pédoncules partiels capillaires, très-velus, longs de deux à trois lignes, unifoires, alternes, munis de bractées assez semblables aux stipules, quelquefois rougeâtres ou tachetées de rouge. Le calice est petit, velu, profondément divisé en cinq découpures profondes, presque égales, linéaires, lancéolées. La corolle est au moins deux fois plus grande que le calice, d'un blanc jaunâtre. Les gouffes sont composées d'articulations comprimées, hispides, triangulaires, d'après Willdenow.

Cette plante croît dans la Virginie, & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale. *(V. f. in herb. Lamarck.)*

63. SAINFOIN glabre. *Hedysarum glabellum*. Michaux.

*Hedysarum glaberrimum, erectum, foliosum; foliis trifoliatis, apprimé ovalibus, utrinque obtusis, subulis subulosis; stipulis minutis, subulatis; racemum laxè paniculato; leguminibus articulis triangulo-subrhomboidis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 73.

Cette espèce est très-voisine de l'*hedysarum canescens*; elle en diffère par toutes ses parties presque entièrement glabres, par ses feuilles ovales, par ses stipules fort petites.

Ses tiges sont droites, rameuses, cylindriques, médiocrement striées, presque glabres, divisées en rameaux alternes, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles pédiolées, ovales, obtuses à leurs deux extrémités, vertes à leur face supérieure, de couleur presque glauque en dessous, glabres, entières, munies, à la base de leur pétiole, de stipules courtes, petites, subulées.

Les fleurs sont disposées en grappes, la plupart terminales, presque paniculées, lâches, peu garnies; chaque fleur supportée par un pédoncule partiel, filiforme, allongé, rapproche souvent deux par deux alternativement. La corolle est purpurine; les gouffes articulées, comprimées, presque glabres, composées d'articulations triangulaires, presque rhomboïdales, monoéperves.

Cette plante a été recueillie par Michaux dans la Caroline inférieure. (*Descript. ex Mich.*)

64. SAINFOIN à feuilles coriaces. *Hedysarum coriaceum*.

*Hedysarum foliis ternatis; foliis ovato-ellipticis, margine tomentoso-ellatis; stipulis setaceis, recurvis; spicis terminalibus compositis, axillaribus simplicibus; floribus sessilibus.* (N.)

C'est une belle espèce qui a quelques rapports avec l'*hedysarum canescens*, mais qui en diffère par ses folioles ovales, par ses fleurs sessiles & par ses stipules sétacées.

Ses tiges se divisent en rameaux droits, allongés, étalés, alternes, striés, presque cylindriques, velus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, composées de trois folioles presque égales, assez rapprochées, ovales, elliptiques, longues d'environ un pouce & demi à deux pouces, sur un pouce de large; obtuses à leurs deux extrémités, épaisses, presque coriaces, glabres, verdâtres en dessus, pubescentes, médiocrement velues en dessous, à nervures saillantes, obliques, latérales, dont l'intervalle est rempli par des veines lâches, sinuées, réticulées; les nervures couvertes d'un duvet jaunâtre & tomenteux; leur contour est environné d'un petit bourrelet de cils courts & touffus. Les pétioles sont velus, longs d'un pouce, munis de stipules fort petites, sétacées, velues, recourbées en dehors.

Les fleurs sont, les unes axillaires, disposées en un épi simple, plus long que les feuilles; les autres terminales, rangées sur un épi rameux particulièrement à sa base, presque paniculé, bien plus long que les épis latéraux, nus à leur partie inférieure, velus, tomenteux, roussâtres, garnis, à leur partie supérieure, de fleurs rapprochées, éparés, très-serrés vers le sommet, sessiles; chacune d'elles garnies de deux bractées opposées, presque lancéolées, aiguës, très-velues, de moitié au moins plus courtes que le calice qu'elles enveloppent à sa base. Celui-ci est divisé, très-profondement, en cinq découpures oblongues, étroites, lancéolées, mucronées, velues, concaves, presque égales. La corolle est jaune ou blanchâtre, plus longue que le calice. Je ne connois point les fruits.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. ? (V. f. in herb. Lamarck.)

65. SAINFOIN à tête conique. *Hedysarum conicum*.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundis, tomentosis; racemis capitis, calicibus glabris.* Burm. Flor. ind. pag. 167. tab. 54. fig. 1.

*Hedysarum capitatum.* Burm. Flor. ind. l. c.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-obovatis, obtusis, subtus tomentosis; stipulis lanceolatis; racemis axillaribus; lomentis lineariteratis, articulatis, pendulis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1189. n°. 43.

*Hedysarum trifoliatum, arborescens; floribus spicatis; foliis subrotundis, subtus lanuginosis.* Burm. Thes. zeyl. pag. 115.

*Onobrychis India orientalis, triphylla; foliis subrotundis, venosis, obovatis, parte tenui undique lanugine testis.* Pluken. Amalth. p. 161. tab. 433. fig. 3.

*Onobrychis spicata, zeylanica, trifolia, frutescens.* Herm. apud Rai. vol. 3. pag. 457.

*Undupyalis species arborescens, foliis ternis, seriatim ternatis, subtus lanuginosis.* Mul. Zeyl. p. 22.

*Estundupyalis*, apud Zeylonens.

Arbrisseau dont les tiges ligneuses sont blanchâtres, pubescentes, presque simples, garnies de feuilles pétioles, alternes, ternes, composées de folioles inégales, presque rondes ou en ovale renversé, obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, presque glabres & vertes à leur face supérieure, tomenteuses en dessous; les pétioles munis, tant à leur base que sous les folioles, de stipules opposées, sèches, membranées, lancéolées, aiguës.

De l'aisselle des feuilles sortent des pédoncules simples, dont la partie supérieure supporte un épi en tête conique avant la floraison, qui s'allonge

ensuite davantage & offre des fleurs pédicelées, dont le calice est glabre, divisé à son orifice en cinq petites découpures aiguës. Les gousses sont articulées, linéaires, un peu cylindriques, pendantes.

Cette plante croît à l'île de Ceylan & dans les Indes orientales. 5 (Description. ex Burm.)

66. SAINFOIN du Canada. *Hedysarum canadense*.

*Hedysarum foliis simplicibus ternatisque, caule levi, floribus racemosis.* Linn. Syst. veget. p. 673. n°. 26. — Hort. Ups. 232. — Mill. Dict. n°. 3.

*Hedysarum foliis radicalibus, simplicibus; caulinis ternatis, floribus laxè spicatis, leguminibus undulatis.* Hort. Cliff. 365. — Royen, Lugd. Bat. 385.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongo-lanceolatis; stipulis filiformibus, floribus racemosis, articulatis lomentis obtusè triangularibus, hispidis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. p. 1187. n°. 40.

*Hedysarum triphyllum, canadense.* Cornuti, Canad. p. 44. tab. 45. — Tourn. Inst. R. Herb. 401.

*Onobrychis major, perennis, canadensis, triphylla; filiculis articulatis, asperis, triangularibus.* Morif. Oron. Hist. 2. pag. 130. §. 2. tab. 11. fig. 9.

Belle espèce, remarquable par ses feuilles amples, ses folioles allongées, & surtout par ses fleurs purpurines, disposées en épis lâches, rameux, étalés en panicule.

Ses tiges sont droites, hautes de deux ou trois pieds, fermes, cannelées, anguleuses, glabres à leur partie inférieure, lâchement velues à leur partie supérieure; munis de rameaux nombreux, alternes, diffus, allongés, semblables aux tiges; garnis de feuilles alternes, pétioles, les inférieures quelquefois simples, ainsi que celles de la base des épis; les autres sont ternées, composées de trois folioles un peu inégales, pétioles, oblongues, lancéolées, obtuses, un peu rétrécies à leur sommet, plus larges à leur base, entières, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, à peine ciliées à leurs bords, longues d'environ trois pouces sur au moins un de large. Les pétioles sont légèrement velus, munis de stipules filiformes, pubescentes, aiguës, ciliées, roussâtres & membranées.

Les fleurs sont disposées en épis, les uns axillaires & presque simples; les autres terminaux, rameux, paniculés, nus à leur partie inférieure, velus; garnis de bractées sétacées, fort petites, velues, & de fleurs éparés, alternes, les unes solitaires, d'autres rapprochées presque par petits paquets; soutenues par des pédoncules propres, longs de trois à quatre lignes, droits, capillaires. Les calices sont divisés en cinq découpures assez profondes, lancéolées, velues, pointues, ciliées



à leurs bords. La corolle est de couleur purpurine ou un peu rougeâtre, d'une grandeur médiocre : il lui succède une gousse très-comprimée, étroite, alongée, composée de cinq à huit articulations hispides, ovales, presque triangulaires, renfermant une seule semence courte, réniforme.

Cette plante croît naturellement dans le Canada, la Virginie, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

67. SAINFOIN de Maryland. *Hedysarum marylandicum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, foliolis subrotundis; caule frutescente, ramossissimo; leguminibus articulatis, levibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Gronov. Virgin. 109.

*Hedysarum foliis ternatis, ablongis, subtus villosis; stipulis subulatis, racemis paniculatis, lomentis triarticulatis; articulis rhombeis, reticulatis, pilosis; fuscis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1189. n°. 44.

*Hedysarum trifoliatum, filiqu breviora*. Dillen. Eltham. pag. 174. tab. 144. fig. 171.

*Hedysarum triphyllum, marylandicum, minus; stipulis compressis, articulatis, asperis, brevioribus*. Rai, Suppl. 455.

Cette espèce a l'aspect d'un *soralea*, & particulièrement du *soralea bituminosa*, à folioles oblongues, lancéolées, obtuses, presque luisantes.

Ses tiges sont divisées en rameaux droits, effilés, cylindriques ou légèrement quadrangulaires, un peu pubescens; garnies de feuilles ternées, pétioles, alternes, composées de trois folioles lancéolées, longues d'un pouce & demi à deux pouces, quelquefois plus courtes, élargies, glabres, reticulées, entières à leurs bords, quelquefois pubescentes, presque velues dans leur première jeunesse, munies, à la base de leur pétiole, de deux stipules courtes, aiguës.

Les fleurs sont disposées en grappes presque paniculées, alongées, supportées par des pédoncules partiels, capillaires, rapprochés deux par deux. Les calices sont courts, divisés en cinq découpures aiguës. La corolle est de couleur purpurine; l'étendard ample, marqué à sa base d'une tache verdâtre, la carène blanchâtre à son onglet. Les gousses sont courtes, comprimées, composées d'environ trois articulations thomboidales, reticulées, légèrement piluleuses.

Cette plante croît en Amérique, dans la Caroline & la Virginie. (V. f. in herb. Justf.)

68. SAINFOIN à deux articulations. *Hedysarum biarticulatum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, caule suffruticoso, le-*

*guminibus biarticulatis*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 23. — Flor. zeyl. 296.

*Hedysarum foliis ternatis, ablongis; caule suffruticoso, ramoso; racemo terminali; lomentis biarticulatis, strigosis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1183. n°. 33.

*Hedysarum triphyllum, filiculis glabris, peltatis, geminis, inarticulatis*. Burm. Zeyl. pag. 114. tab. 50. fig. 2.

*Orobrychis zeylanica, trifolia, minor, perennis*. Rai, Suppl. 457.

Petit arbrisseau dont les tiges sont glabres, cylindriques, rougeâtres; les rameaux nombreux, diffus, un peu pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles alternes, petites, ternées, composées de trois folioles oblongues ou en ovale renversé, longues d'environ trois lignes, presque glabres & reticulées à leur face supérieure, pubescentes, nerveuses, presque cendrées en dessous; supportées par un pétiole court, muni de petites stipules lancéolées, acuminées, quelquefois biffées à leur sommet.

Les fleurs forment des épis grêles, longs de deux ou trois pouces, situés à l'extrémité des rameaux; les pédoncules partiels très-courts, capillaires, opposés, garnis de bractées subulées, aiguës. Le calice est court, glabre, à cinq divisions lancéolées, étroites, très-aiguës. La corolle est petite; les gousses comprimées, courtes, composées d'une & souvent de deux articulations orbiculaires, un peu ridées; couvertes à leurs deux faces de poils blanchâtres, couchés.

Cette plante croît dans les Indes orientales & à Pondichery. (V. f. in herb. Justf.)

J'ai observé, dans l'herbier de M. de Justf, une autre plante recueillie en Chine, qui diffère un peu de celle-ci. Ses fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, plus courtes que les feuilles; les gousses ne m'ont offert qu'une seule articulation ovale, presque glabre; tout le reste convient à la plante décrite plus haut.

69. SAINFOIN veiné. *Hedysarum lineatum*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, ablongis, lineatis; racemis axillaribus, pendulis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1054. — Burm. Flor. ind. pag. 167. tab. 53. fig. 1.

*Hedysarum foliis ternatis, ablongis, venoso-lineatis; stipulis lanceolatis; racemis axillaribus, nutantibus; lomentis mono-permis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1179. n°. 22.

*Hedysarum caule repente, viridi-lineato; foliis subsessilibus, trifoliatis, suborbiculatis; racemis elongatis, laxè parvifloris; leguminibus articulis lenticularibus*. Mich. Flor. bot. Amer. vol. 2. p. 72. ?

Ses tiges sont droites, presque ligneuses, cylindriques, glabres, rameuses, purpurines ou rougeâtres; garnies de feuilles alternes, pétioolées, ternées; composées de trois folioles allongées, presque lancéolées, glabres à leurs deux faces, un peu pubescentes à leur face inférieure dans leur jeunesse, longues au moins de deux pouces; marquées en dessous de nervures saillantes, quelques-unes prolongées en lignes droites, dans toute la longueur des feuilles; munies, à la base des pétioles, de stipules allongées, membraneuses, aiguës, striées.

Les fleurs sont disposées en grappes presque simples, ou en épis dans l'aisselle des feuilles & aussi longs. Les pédoncules partiels sont courts, capillaires, recourbés; les calices oblongs, pubescens, striés, divisés en cinq découpures lancéolées, aiguës. Les gouffes n'ont qu'une seule articulation de forme rhomboïdale, & ne renferment qu'une semence.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan. (V. f. in herb. Juss.)

Je doute que l'on puisse rapporter à cette plante l'espèce citée par Michaux, & qu'il a recueillie dans l'Amérique septentrionale, dont les tiges sont rampantes, verdâtres, striées; les feuilles presque sessiles, presque orbiculaires.

70. SAINFOIN à gouffes irrégulières. *Hedysarum heterocarpon*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, floribus spicatis, leguminibus articulatis, infimo monospermo, stipulis setaceis*. Linn. Syst. veget. pag. 673. n°. 24. — Flor. zeyl. 298.

*Hedysarum foliis ternatis, ellipticis, ovatis, subtilis canis; racemis axillaribus, tomentis scabris, inferioribus uniauriculatis, superioribus multiarticulatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1184. n°. 35.

*Hedysarum trifoliatum, foliis inferioribus sessilibus, superioribus articulatis*. Burm. Zeyl. pag. 117. tab. 53. fig. 1.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux glabres, diffus, cylindriques, grêles, garnis de feuilles alternes, pétioolées, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, presque elliptiques ou plus courtes, un peu arrondies, également variables dans leur grandeur, vertes en dessus, plus pâles & un peu blanchâtres en dessous, pubescentes ou presque glabres, obtuses, légèrement veinées, munies, à la base de leur pétiole, de stipules sétacées.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, droites, velues, nues à leur partie inférieure; les pédoncules partiels capillaires; pubescens, un peu rameux, garnis de petites bractées courtes, sétacées. Le calice est court, velu, presque campaniforme, divisé à son orifice en cinq dents ai-

guës. La corolle est petite, de couleur purpurine; les gouffes composées de plusieurs articulations ovales, comprimées, presque tronquées à un de leurs côtés, pubescentes, couvertes à leurs deux faces de poils rudes & courts.

Cette plante croît dans les Indes orientales. Elle a été également observée au Brésil par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

71. SAINFOIN en gazon. *Hedysarum caspiosum*.

*Hedysarum caule repente, caspio; foliis ternatis; foliolis ovato-subrotundis, glaberrimis; racemis laxis, pedunculis capillaribus, leguminibus articulatis, hispido viscidis articulis subovatis*. (N.)

Cette plante forme des touffes agréables en gazon très-étendu; elle pousse des mêmes racines un grand nombre de tiges rampantes, glabres, cylindriques, rameuses, grêles, striées, relevées à leur partie supérieure, garnies de feuilles pétioolées, alternes, nombreuses, ternées, composées de trois folioles pédiculées, ovales, un peu arrondies, minces, glabres, souvent un peu rétrécies en coin à leur base, vertes à leur face supérieure, plus pâles & un peu blanchâtres en dessous, longues d'environ sept à huit lignes, larges de six; la foliole terminale une fois plus grande. Les pétioles sont glabres, filiformes, aussi longs que les folioles, munis à leur base de stipules lancéolées, striées, surmontées d'un filament sétacé; les pétioles partiels un peu pubescens, garnis de stipules sétacées & velues.

Les fleurs forment des grappes axillaires & terminales, beaucoup plus longues que les feuilles, dont les pédoncules communs sont glabres, cylindriques, capillaires, nus à leur partie inférieure, peu garnis de fleurs alternes, supportées par des pédoncules partiels très-fins, presque sétacés, distans, longs d'un pouce & plus. Le calice est fort petit, à peine pubescent, divisé presque jusqu'à la base en cinq petites folioles lancéolées, aiguës. La corolle est grande, blanchâtre ou lavée de rose; les gouffes sont longues d'environ deux pouces, articulées, comprimées, droites & entières à un de leurs côtés, comme dans les *aschynomene*, divisées à l'autre en articulations presque ovales, oblongues, un peu visqueuses, légèrement hispides: chaque articulation renferme une seule semence assez grande, ovale, un peu échancrée.

Cette plante croît dans les bois à l'île-de-France, où elle fournit d'excellens pâturages. Elle y a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Juss.)

72. SAINFOIN stolonifère. *Hedysarum stoloniferum*. Richard.

*Hedysarum foliis ternatis, longè petiolatis; foliolis ovato-acuminatis, integris, reticulatis, subtilis*

*abidis ; racemis longissimis , laxis ; articulis subhispidis , sublanatis ; caule repente , flonifero . ( N. )*

Cette plante pousse des tiges alongées , rampantes , glabres , cylindriques , poussant de cha. un de ses nœuds des racines longues , étalées , fibreuses . Les rameaux sont en partie redressés , garnis de feuilles alternes , pétioles , ternées , composées de trois folioles assez grandes , ovales , entières à leurs bords , longuement acuminées , réticulées , verdâtres en dessus , blanchâtres en dessous , glabres à leurs deux faces , longues de deux pouces & plus , larges d'environ un pouce ; les pétioles sont très-longs , anguleux , striés , glabres , munis à leur base de stipules ovales , striées .

Les fleurs sont axillaires , disposées en grappes très-lâches , pauciflores ; les pédoncules partiels sont capillaires , souvent deux à deux , longs d'un pouce , munis de bractées opposées , petites , scarieuses ; le pédoncule commun est très-long , simple , presque glabre , strié . Les calices sont divisés en cinq folioles courtes , lancéolées , aiguës , presque glabres ; la corolle médiocre . Les gouffes ne sont guère composées que de deux articulations , quelquefois d'une seule , assez grandes , presque ovales , arrondies d'un côté , coupées ou légèrement échancrées à l'autre côté , très-comprimées , légèrement hispides , à une seule semence .

Cette plante a été recueillie aux Antilles par M. Richard . Elle croit aussi à la Guiane . ( *V. f. in herb. Juss.* )

#### 73. SAINFOIN rampant. *Hedyсарum reptans.*

*Hedyсарum foliis ternatis ; foliolis ovatis , rugosis , obtusis , subius subvillofis , nervosis ; racemis longissimis , radicalibus ; articulis subovatis , hispidis ; caule repante . ( N. )*

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & l'*hedyсарum floniferum* : elle en diffère par ses folioles ovales & non acuminées , ridées & un peu velues en dessous , & par les grappes de fleurs beaucoup plus longues . Elle se rapproche aussi beaucoup de l'*hedyсарum axillare* ; mais dans ce dernier les feuilles sont rhomboïdales , un peu arrondies .

Ses tiges sont grêles , rampantes , radicales à leurs nœuds , glabres , cylindriques , garnies de feuilles ternées , dont les folioles , longues au plus d'un pouce & demi , sur un pouce de large , sont fermes , péticolées , ovales , obtuses , presque glabres en dessus , ridées & pubescentes en dessous , particulièrement sur leurs principales nervures ; supportées par des pétioles velus , striés , longs de deux pouces . De l'aisselle des feuilles , & en même tems de la base des nœuds , s'élèvent des pédoncules longs d'un pied , nus dans leur partie inférieure , grêles , presque cylindriques , glabres , terminés à leur partie supérieure par une longue

grappe dont les fleurs sont distantes , mais nombreuses , presque opposées ou deux à deux , soutenues par des pédoncules partiels capillaires , simples , pubescens , longs d'un pouce . Les calices sont un peu pubescens , courts , à cinq découpures aiguës . Je ne connois point les corolles . Les gouffes sont composées ordinairement de deux articulations hispides , comprimées , un peu élargies , ovales , tronquées à un de leurs côtés , moins longues que celles de l'*hedyсарum floniferum* .

Cette plante croit à l'île Saint-Domingue , où elle a été recueillie par M. Desportes . ( *V. f. in herb. Juss.* )

#### 74. SAINFOIN à feuilles de cytis. *Hedyсарum laburnifolium.*

*Hedyсарum foliis ternatis ; foliolis ovatis , lucidis ; stipulis subulatis ; racemis terminatibus , laxis ; leguminibus longissimis ; articulis oblongis , hispidis . ( N. )*

Cette espèce est remarquable par ses feuilles luisantes , assez semblables à celles du *cytisus laburnum* , & par ses gouffes longues & étroites .

Ses tiges sont presque ligneuses , divisées en rameaux droits , alternes , cylindriques , presque glabres , garnis de feuilles alternes , ternées , composées de trois folioles pédiculées , ovales , aiguës , glabres à leurs deux faces , luisantes à leur face supérieure , un peu nervées , longues d'environ deux pouces sur un de large ; les feuilles inférieures beaucoup plus grandes ; les pétioles un peu comprimés , munis de stipules roides , sétacées .

Les fleurs sont disposées en grappes terminales , un peu lâches , supportées par un pédoncule commun , presque simple , droit , sur lequel les fleurs sont rangées presque par quelques petits paquets alternes ; pédiculées , munies de bractées sétacées . Les calices sont un peu velus , presque campaniformes , courts , divisés à leur orifice en cinq dents inégales , lancéolées , aiguës . La corolle est d'une grandeur médiocre : il lui succède une gouffe un peu pendante , longue , étroite , divisée par articulations alongées , comprimées , hispides .

Cette plante a été recueillie à l'île de Java par Commerçon . ? ( *V. f. in herb. Juss.* )

#### 75. SAINFOIN à feuilles de saule. *Hedyсарum salicifolium.*

*Hedyсарum foliis ternatis ; foliolis lanceolato-oblongis , glabris ; panicula diffusâ ; floribus numerosissimis ; leguminibus arcuatis , hispidis ; caule fruticoso . ( N. )*

Ses tiges sont droites , ligneuses , divisées en rameaux glabres , cylindriques , alongés , d'un brun noirâtre , garnis de feuilles alternes , pétio-

lées, ternées, composées de trois folioles pétiolées, oblongues, lanceolées, glabres à leurs deux faces, entières, vertes en dessus, plus pâles en dessous, nerveuses, réticulées, très-aiguës à leur sommet, un peu ternées à leur base, longues de six à sept pouces, sur un pouce au moins de large; la base des folioles munie de stipules lâches, glabres, très-étroites, roussâtres, ouvertes, longues de cinq à six lignes.

Les fleurs sont très-nombreuses, petites, disposées en une panicule étalée, ample, très-ramifiée; les pédoncules partiels, courts, éparés ou presque fasciculés; les bractées glabres, roides, lanceolées, subulées, très-aiguës, plus longues que les fleurs, caduques: les calices sont glabres, petits, tort courts, divisés à leur orifice en cinq dents inégales, subulées; la corolle à peine une fois aussi longue que le calice; les gousses linéaires, allongées, comprimées, articulées, velues, à peine sinuées à leurs bords.

Cette plante croît dans les Indes, d'où elle a été rapportée par M. Poivre. (V. f. in herb. Jacq.)

76. SAINFOIN oscillant. *Hedysarum gyrans*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, ovali-lanceolatis, obtusis, lateralibus minutissimis; panicula terminali; lomentis inferne repandis, scabrisculis, pendulis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1185. n°. 38.

*Hedysarum foliis ternatis*. Linn. f. Suppl. pag. 331. — Swartz, Observ. 289. — Broussonet, Journ. de Phys. & d'Hist. natur. année 1787. pag. 359. tab. 2. — Act. acad. Paris. 1784.

*Hedysarum foliis ternatis, glabris; foliis oblongis, lateralibus parvis; racemo composito, terminali*. Jacq. Icon. rar. 3. tab. 565. — Idem, Collect. 3. pag. 181.

*Hedysarum foliis ternatis, ovali-lanceolatis, obtusis; lateralibus minutis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 64.

*Buram-chadali*. Bengal.

*Chundali*. Ind.

Cette singulière espèce a fixé les regards des naturalistes par le mouvement presque habituel & spontané de ses folioles, dont nous parlerons après avoir donné la description de cette plante.

Ses racines font branches, fibreuses, annuelles, & très-souvent bisannuelles: il s'en élève une tige haute de deux à trois pieds, glabre, cylindrique, assez forte, divisée en rameaux souples, alternes, striés, verdâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles très-inégaux, pédiculées. La foliole terminale, la plus remarquable par sa grandeur, est longue de deux à trois pouces, sur presque un pouce

de large, lanceolée, elliptique, obtuse à ses deux extrémités, lisse, verte à ses deux faces, glauque dans son milieu, un peu pâle en dessous, marquée de nervures réticulées, peu sensibles. Les deux folioles latérales, très-écartées de la terminale, sont très-petites, étroites, lanceolées, oblongues, longues à peine d'un demi-pouce sur deux lignes de large, supportées par des pétiolés très-courts: elles manquent quelque-fois, surtout aux feuilles inférieures; elles sont du moins très-caduques. Les pétiolés communs sont filiformes, légèrement velus, longs d'un à deux pouces, munis à leur base de deux stipules oblongues, roussâtres, membraneuses, un peu concaves, acuminées: celles qui accompagnent chaque foliole sont fort petites, sétacées, subulées, ouvertes, caduques, de couleur verte.

Les fleurs sont disposées en épis droits, simples, lâches, allongés, situés dans l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux. Ces fleurs sont ordinairement opposées ou deux à deux, supportées vers la partie supérieure de l'épi par des pédoncules partiels capillaires, longs d'environ deux lignes, accompagnés à leur base de bractées en forme d'écailles ovales, concaves, caduques. Le calice est très-petit, presque tronqué à son orifice, marqué à peine de quatre à cinq petites dents peu sensibles. La corolle est rouge, composée de cinq pétales, dont l'étendard, aussi long que la carène, est un peu arrondi, légèrement ondulé à ses bords; les ailes plus courtes que l'étendard, onguiculées, un peu élargies, obtuses; la carène composée de deux pétales ovales, comprimés, obtus. Les étamines sont presque droites, au nombre de dix, dont neuf réunies par leurs filamens, la dixième solitaire, terminée par des anthères grosses, oblongues. L'ovaire est comprimé, linéaire, terminé par un stigmate obtus: il lui succède une gousse presque droite, articulée, comprimée, longue d'environ deux pouces, un peu recourbée & murronnée à son sommet, composée d'environ huit ou neuf articulations presque globuleuses, légèrement hipides.

Cette plante croît au Bengale, sur les bords du Gange, où elle fleurit vers la fin de l'été ou du commencement de l'automne, & donne ses fruits mûrs vers la fin de cette même saison. Elle a été recueillie dans les Serres du Muséum d'Histoire naturelle de Paris, il y a environ six ou sept ans. (V. v.)

Il existe beaucoup d'exemples de mouvements particuliers & presque spontanés dans les feuilles d'un grand nombre de plantes, surtout dans celles qui composent la famille nombreuse des légumineuses: le plus général est celui que Linné a nommé leur *sommell*; il a lieu par le rapprochement des folioles qui s'appliquent les unes sur les autres, & relient en cet état pendant toute la nuit, jusqu'à ce que les rayons du soleil naissant viennent les ou-

voir & les séparer : chacun connoît l'extrême irritabilité de la fenestre, dont il suffit d'approcher les mains sans la toucher, pour faire abaisser les pétioles & fermer toutes les folioles ; mais tant que la saison est calme & belle, cette plante n'a d'autres mouvements que son sommeil à l'entrée de la nuit, & son réveil au commencement du jour, à moins qu'il ne survienne un tems froid, humide ou nébuleux, qui alors oblige les folioles à changer de situation.

Il n'est pas de même du fainfoin oscillant. Sa foliole terminale est immobile, mais les deux autres, beaucoup plus petites, sont pendant le jour dans une agitation presque continuelle ; elles s'élèvent & s'abaissent successivement en décrivant un arc de cercle ; tantôt elles se meuvent dans le même sens ; tantôt l'une monte tandis que l'autre descend. On dit que, dans leur pays natal, ce mouvement est très-rapide ; il s'exécute plus lentement dans nos terres. Jamais, dit Deleuze, il n'est plus vif que dans le tems de la fécondation. Il cesse la nuit, & toutes les folioles sont abaissées lorsque la plante dort ; il se ralentit lorsque la plante est malade, ou lorsqu'elle est fatiguée par le vent ou par une trop grande chaleur.

Ce phénomène est trop remarquable pour ne point rappeler ici les observations les plus essentielles auxquelles il a donné lieu, ainsi que la découverte de cette plante singulière. M. Broussonet a publié à ce sujet un *Mémoire* très-curieux, inséré dans le *Journal de Physique & d'Histoire naturelle*, ainsi que dans les *Mémoires de l'Académie* : les faits qu'il cite, méritent d'autant plus de confiance, qu'ils ont été vérifiés en grande partie dans les terres du Muséum d'Histoire naturelle, & que d'ailleurs ce savant est un observateur très-scrupuleux.

« Cette plante singulière, dit-il, a été découverte au Bengale, dans les lieux humides & argileux, aux environs de Dacca, par milady Monson, que son zèle pour l'histoire naturelle avait déterminée à entreprendre un voyage dans les Indes. La mort l'a surprise au milieu de ses courses botaniques. Linné a cru devoir consacrer à sa mémoire un genre de plantes sous le nom de *monsonia*. M. le chevalier Banks ayant bien voulu me communiquer les manuscrits de milady Monson, j'en ai extrait les observations qui ont rapport aux mouvements de cette plante, & tels qu'elle les avoit observés au Bengale ; je les comparerai avec ceux que j'ai eu occasion d'examiner sur les individus qu'on cultive dans les terres en Europe. Cette plante y fut introduite pour la première fois en 1777, en Angleterre, dans le jardin de lord Eare, à Lutonpark : elle y fleurit en mars. Sa culture demande beaucoup de soins ; elle doit être renfermée dans une serre chaude, & n'en sortir presque jamais.

» Aucune partie de cette plante ne donne des signes d'irritabilité quand on la pique. Pendant le jour, la foliole terminale est étendue horizontalement & immobile ; pendant la nuit elle se recourbe & vient s'appliquer sur les branches. Les folioles latérales sont toujours en mouvement, portées alternativement vers le haut & vers le bas. Toute l'action du mouvement est dans le pétiole, qui paroît se contourner : ces folioles décrivent un arc de cercle. Aux Indes, deux minutes suffisent pour faire exécuter aux folioles tout leur mouvement ; je ne les ai jamais vues se mouvoir si promptement dans nos terres. Le mouvement qui les porte vers le bas est plus prompt que celui qui les fait aller vers le haut. Le premier est même quelquefois exécuté par interruption, du moins il n'est pas égal. Le mouvement vers le haut est, au contraire, toujours uniforme : le plus souvent chaque foliole se meut dans un sens opposé, c'est-à-dire que l'une est tournée en bas quand l'autre regarde le haut ; quelquefois une des folioles est immobile, tandis que l'autre se remue. Ce mouvement est si naturel, que si l'on vient à l'interrompre en fixant une des folioles, il recommence dès que l'obstacle est levé.

» Le mouvement n'a plus lieu dès que les grandes folioles sont agitées par le vent. Dans les animaux la transpiration est surtout accélérée par le cours du sang, par l'action des muscles, &c. Dans les plantes, où la circulation des fluides est très-lente, la perspiration paroît être augmentée par des causes externes ; l'agitation de l'air en est une des principales. Les feuilles, qui sont les organes destinés à cette fonction, ont ordinairement soutenues par des pétioles minces, & qui leur permettent de se mouvoir en tous sens : si cette structure manque, les organes des végétaux sont construits différemment. La chaleur du soleil, l'humidité ou une grande abondance de fluides dans des vaisseaux construits d'une manière particulière, déterminent la perspiration de plusieurs plantes. Le *dicoua*, le *ressotis*, &c. croissent dans des lieux humides, où les fluides abondent : plusieurs sensitives viennent dans des endroits où l'air est très-peu agité, ou bien celles dont la perspiration ne peut s'opérer de toutes ces manières, ont un petit nombre de feuilles, ordinairement succulentes, & recouvertes d'un épiderme très-mince. Quand le soleil est très-chaud, les folioles du fainfoin oscillant sont immobiles ; mais lorsque le tems est chaud & humide, ou qu'il pleut, elles se meuvent très-bien.

Ce mouvement paroît absolument nécessaire à cette plante, car dès qu'elle a poussé ses premières feuilles, il commence à avoir lieu & il se continue même pendant la nuit ; mais il s'affoiblit avec le tems. Dans nos terres à la lieue, surtout dans la première année ; à la seconde il est très-peu sensible. Dans son pays natal, toutes les feuilles sont

en mouvement ; jamais je ne les ai vues se remuer toutes dans nos ferres. Dans le moment que la plante est le plus chargée de fleurs, que la fécondation des germes a lieu, les folioles sont beaucoup plus agitées. Dans les plantes, comme dans les animaux, le tems de la reproduction des individus est toujours celui où tous les organes sont dans leur plus grande perfection. Dès que le tems de la génération est passé, les folioles cessent de se mouvoir ; les sensitives ne sont presque plus sensibles après ce tems ; les pétales de plusieurs plantes ne se referment plus périodiquement.

« Ce mouvement d'oscillation est tellement naturel à la plante oscillante, qu'il a non-seulement lieu pendant deux ou trois jours sur les folioles d'une branche qu'on a coupée, & qui a été mise dans l'eau, mais qu'il est même continué pendant quelque tems sur les feuilles des rameaux qu'on a séparés de la plante & qu'on n'a pas mis dans l'eau. Ne peut-on pas, dans ce dernier cas, le comparer en quelque sorte aux battemens du cœur des animaux, après que cet organe a été arraché ? Les feuilles semblent tenir lieu de cœur dans les végétaux ; elles augmentent par leur mouvement le cours des fluides, comme ce viscère par les contractions détermine la circulation du sang. Dès que les feuilles se séparent d'une plante, les progrès de la végétation sont arrêtés, & les végétaux ressemblent à ces animaux dont le sommeil périodique est caractérisé par une diminution dans les battemens de cœur.

« Les Indiens, qui sont de tous les peuples ceux qui s'adonnent le plus à la connoissance des plantes, n'ont point manqué de remarquer le mouvement singulier des feuilles de celle-ci, & ce phénomène étoit trop extraordinaire pour qu'il ne devint pas chez une nation superstitieuse l'objet d'un culte particulier. Ils cueillent à un certain jour de l'année, qu'ils nomment *Lanichur*, deux folioles latérales dans l'instant où elles sont les plus rapprochées ; ils les pilent ensemble avec la langue d'une espèce de chouette, & l'amant plein de foi croit, avec cette préparation, se rendre favorable l'objet de son amour. Je ne crains pas de rapporter ce trait d'après milady Monfon, persuadé que rien de ce qui a rapport à l'histoire d'une plante aussi curieuse que celle-ci, ne devoit être omis.

« Le mouvement est un attribut moins essentiel aux végétaux qu'aux animaux : plusieurs plantes ont des parties qui en donnent à peine quelques signes ; plusieurs en ont aussi qui sont entièrement cataleptiques, qui restent tout à coup immobiles ; ce qui s'observe plus rarement dans les animaux, excepté dans ceux qui sont rapprochés par leur forme, du règne végétal. Cette singularité est surtout remarquable dans une espèce de *dracocephalum* de Virginie, dont les pédoncules conservent tou-

Botanique, Tome VI,

tes les positions qu'on leur donne. Cette plante peut être mise en opposition avec le sainfoin oscillant.

Ce mouvement du sainfoin oscillant ne pourroit-il pas être attribué à ces sortes de trachées roulées en spirale, & qui paroissent destinées à recevoir l'air, & à aider la circulation de la sève. Irritées par l'action des fluides, ne peuvent-elles pas se tendre & se relâcher alternativement, & occasionner dans les parties des végétaux où elles exécutent cette opération, un mouvement particulier ?

77. SAINFOIN rampant. *Hedysarum repens*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, obcordatis ; caulibus procumbentibus, racemis lateralibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1056. — Mill. Dict. n°. 14.

*Hedysarum foliis ternatis, subrotundo-ellipticis, emarginatis ; racemis axillaribus, lomentis repandis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1201. n°. 73.

*Hedysarum caulibus procumbentibus ; racemis lateralibus, solitariis ; petioli pedunculo longioribus*. Gronov. Virgin. 1. pag. 86.

*Trifolium procumbens, trifolii fragiferi folio*. Dill. Eltham. pag. 172. tab. 142. fig. 169.

Ses tiges sont couchées, diffuses, rameuses, presque herbacées, cylindriques, grêles, velues, garnies de feuilles pétioolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, presque elliptiques, quelquefois un peu échancrées en cœur à leur base, à peine pubescentes ; la foliole terminale plus allongée, les pétioles très-velus, munis à leur base de stipules ovales, aiguës.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles ; elles forment des grappes peu garnies, velues ; les pédoncules partiels hispides, garnis de stipules lancéolées, aiguës. Les calices sont divisés en cinq découpures aiguës ; la corolle varie du blanc au rouge. Les gouffes sont allongées, étroites, comprimées, articulées ; les articulations arrondies à leur côté extérieur, un peu hispides.

Cette plante se rencontre dans la Virginie. x

78. SAINFOIN à folioles en cœur renversé. *Hedysarum obcordatum*.

*Hedysarum foliis ternatis, foliolis obcordatis, reflexis ; floribus spicatis, pendulis ; ramis glaberrimis, pubescentibus*. (N.)

Cette espèce paroît se rapprocher beaucoup de l'*Hedysarum repens*. Ses folioles sont plus petites ; ses fleurs disposées en épis grêles, allongés.

Ses tiges sont foibles, divisées en rameaux capillaires, pubescens, garnis de feuilles alternes, pétioolées, ternées, composées de trois folioles

h h h

inégales, à peine pubescentes; les deux latérales petites, ovales, presque en cœur, obtuses, un peu échancrées à leur sommet, à peine pubescentes, entières; la foliole terminale courte, une fois plus large, émoussée ou tronquée à son sommet, nerveuse, d'un vert-blanchâtre; les pétioles velus, filiformes, munis à leur base de stipules très-petites, aiguës.

Les fleurs forment des épis terminaux & latéraux, grêles, longs de quatre à cinq pouces, sur lesquels les fleurs sont distantes, rapprochées souvent deux à deux, supportées par des pédoncules partiels pubescens, réfléchis en dehors. Les bractées sont nulles ou très-caduques. Les calices sont blancs, membraneux, nerveux, réticulés, un peu velus, divisés assez profondément en cinq découpures lancéolées, aiguës, mucronées. Je ne connois ni la corolle ni les fruits.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de Java. (P. f. in herb. Juss.)

79. SAINFOIN ascendant. *Hedyсарum ascendens*. Swartz.

*Hedyсарum foliis ternatis, subrotundis, subtus pubescentibus; caule tereti; ramis declinatis, ascendentibus, pilosis; racemis simplicibus, erectis, axillaribus.* Sw. Prodr. pag. 106. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1185. n°. 36.

Ses tiges sont cylindriques, divisées en rameaux alternes, tombans à leur partie inférieure, puis redressés, pileux, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées, composées de trois folioles un peu inégales, longues à peine d'un demi-pouce, un peu arrondies ou elliptiques, glabres à leur face supérieure, pubescentes & blanchâtres en dessous, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en grappes ou plutôt en épis droits, très-simples, couverts de bractées imbriquées, oblongues, lancéolées, pileuses, plus longues que les calices.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans les contrées méridionales de l'Amérique. ♀

80. SAINFOIN des îles Maurice. *Hedyсарum mauritianum*. Willd.

*Hedyсарum foliis ternatis, subtus pubescentibus; foliolis inferioribus subrotundis, emarginatis, superioribus oblongis; racemo terminali; lomentis tomentoso-scabris, inferius repandis, nutantibus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1185. n°. 57.

Cette plante a des racines rampantes, d'où s'élèvent des tiges simples, droites, ascendantes, hautes de quatre à cinq pouces ou d'un demi-pied, cylindriques, pubescentes, garnies de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles glabres, vertes à leurs deux faces, pubes-

centes à leur face inférieure. Dans les feuilles du bas, ces folioles sont au moins une fois plus petites, arrondies, échancrées. Celles des feuilles supérieures sont oblongues, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes à l'extrémité des rameaux, longues de quatre à cinq pouces. Les pédoncules sont gemines, distans, munis à leur base de bractées fort petites; ils fournissent des fleurs pendantes. Les gouffes sont articulées, oblongues, linéaires, blanchâtres, tomenteuses, rudes au toucher, sinuées & arrondies à leur bord extérieur.

Cette plante croît dans l'île Maurice. ♀ (Desf. ex Willden.)

81. SAINFOIN scabieux. *Hedyсарum squarrosam*. Thunb.

*Hedyсарum foliis ternatis, ovatis, subtus nervosis, tomentosis; floribus spicatis, reflexis.* Thunb. Prodr. 131. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1183. n°. 51.

Nous n'avons que très-peu de détails sur cette plante. Ses tiges sont garnies de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles tomenteuses, marquées à leur face inférieure de fortes nervures. Les fleurs sont réfléchies & disposées en épis.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, où elle a été observée par Thunberg.

82. SAINFOIN en spirale. *Hedyсарum spirale*. Swartz.

*Hedyсарum foliis ternatis, ovatis, obtusis, glabris; caule ramossimo; ramis diffusis; racemis laxis, divaricatis; leguminibus spirali-tortuosis.* Sw. Prodr. 107. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1199. n°. 69.

*Hedyсарum (procumbens), foliis ternatis, caulibus procumbentibus, ramosis; floribus laxi spicatis, terminalibus; leguminibus contortis, articulis quadrangularibus.* Miller, Dict. n°. 10.

Cette plante a des tiges couchées, ligneuses, traçantes, très-rameuses, d'un pied & demi de longueur, divisées en rameaux alternes, diffus, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, un peu arrondies, glabres à leurs deux faces, d'un vert-pâle, obtuses à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes ou plutôt en panicules lâches, étendues, diffuses. La corolle est petite, d'un pourpre-pâle; les gouffes articulées, un peu allongées, étroites, contenant quatre ou six articulations rhomboïdales, séparées, légèrement velues, se contournant en demi-spirale vers

l'époque de la maturité, renfermant une petite semence comprimée.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, à la Jamaïque, &c. *H* (*V. f. in herb. Jaff.*)

83. SAINFOIN axillaire. *Hedysarum axillare*. Swartz.

*Hedysarum foliis ternatis, rhombico-subrotundis; caule repente, radicante; petiolis erectis, scapis axillaribus, foliis longioribus*. Swartz, Prodr. 107. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1199. n°. 67.

*Hedysarum triphyllum, majus, repens; scapis axillaribus, affurgentibus, infernet nudis, supernet spicatis*. Brown, Jam. 301.

C'est une plante assez forte & grande, dont les tiges sont rampantes, radicantes, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles pétiolées, alternes, composées de trois folioles rhomboidales, presque arrondies, dont le pétiole commun est redressé. De chaque nœud enracinant & de l'aisselle des feuilles s'élèvent de longs pédoncules en forme de hampe, nus à leur partie inférieure, plus longs que les feuilles, garnis à leur partie supérieure de fleurs disposées en épis.

Cette plante se rencontre dans les lieux montagneux & couverts de la Jamaïque. *x*

84. SAINFOIN cuspidé. *Hedysarum cuspidatum*. Willden.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, acuminatis; panicula terminali; articulis lomentis triangularibus, reticulatis, margine pubescentibus*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1198. n°. 64.

*Hedysarum cuspidatum*. Muhlénb. in litt.

*An hedysarum (acuminatum), erectum, simplex, summitate frondosum; foliis trifoliatis, ovalibus, longe acuminatis, impari rotundato-subrhombico; panicula terminali, longissime pedunculata?* Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 72.

Ses tiges sont herbacées, filloides, presque simples, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, longuement acuminées à leur sommet, un peu rudes à leurs bords; la foliole du milieu beaucoup plus grande, & supportée par un pétiole allongé. Les stipules sont ovales, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont disposées en une panicule assez ample & terminale. La corolle est de couleur violette, & les gouffes sont articulées, comprimées, composées d'articulations triangulaires, glabres à leurs deux faces, réticulées, pubescentes à leur contour, renfermant chacune une petite semence comprimée. L'*hedysarum acuminatum* de Michx.

ne me paroît point différer de cette espèce, qui d'ailleurs a beaucoup de rapports avec l'*hedysarum nudiflorum*.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale. *x*

85. SAINFOIN en queue. *Hedysarum caudatum*. Thunb.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, glabris; caule herbaceo, panicula terminali, leguminibus tomentosis*. Thunb. Flor. jap. pag. 286. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1197. n°. 62.

Ses tiges sont droites, glabres, simples, herbacées, hautes d'un pied & plus, garnies de feuilles droites, alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles oblongues, entières, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, marquées de nervures; les deux latérales beaucoup plus petites, médiocrement pétiolées; la terminale plus grande, plus longuement pétiolée, longue d'un pouce & demi; le pétiole commun à demi-cylindrique, canaliculé en dessus, long d'un pouce, muni à sa base & sous les folioles, de stipules sétacées, opposées.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une panicule serrée, penchée, velue, longue de six à sept pouces. Les calices sont hérissés de poils roides, divisés à leur orifice en cinq découpures. La corolle est de couleur purpurine. Les gouffes sont presque linéaires, revêtues d'un duvet tomenteux, d'un brun-noirâtre.

Cette plante se rencontre au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

86. SAINFOIN tubéreux. *Hedysarum tuberosum*. Willden.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, acutis; racemo terminali longissimo; lomentis repandis, villosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1197. n°. 63.

*Hedysarum tuberosum*. Roxb. in litt.

Ses tiges se divisent en rameaux ligneux, qui paroissent devoir être grimpans, garnis de feuilles alternes, longuement pétiolées, ternées, composées de trois folioles ovales, longues de trois pouces environ, assez larges, aiguës à leur sommet, foyeuses à leurs deux faces quand elles sont jeunes, & hirsutes en dessous à cause des poils nombreux qui les couvrent. Dans leur entier développement, elles sont roides, presque glabres en dessus, médiocrement foyeuses à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales à l'extrémité des rameaux, simples, longues d'un pied & demi à deux pieds. Les pédoncules partiels sont presque réunis deux à deux, velus &

H h h



foyeux, ainsi que le pédoncule commun. Les calices sont velus, chargés de poils foyeux; la corolle inclinée; les gouffes finées & velues dans leur jeunesse.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Descript. ex Willd.)

87. SAINFOIN cilié. *Hedysarum ciliare*.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, subitis pubescentibus, margine ciliatis; panicula terminali; tomenti articulis semiorbicularibus, hispidis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1196. n° 60.

*Hedysarum ciliare.* Mühlb. in litt.

Ses tiges sont glabres, droites, cylindriques, un peu pubescentes vers leur partie supérieure, garnies de feuilles médiocrement pétioles, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, longues d'un demi-pouce, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, obtuses, mucronées à leur sommet, légèrement ciliées à leurs bords, munies, à la base de leur pétiole, de stipules filiformes.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une panicule un peu pubescente. La corolle est petite, de couleur violette; les gouffes articulées, comprimées, composées de deux ou trois articulations à demi-orbiculaires, couvertes à leurs deux faces de poils fort courts, roides, un peu en crochet, chaque articulation renfermant une seule semence.

On trouve cette plante dans les contrées septentrionales de l'Amérique. 3.

88. SAINFOIN pileux. *Hedysarum pilosum*. Thunb.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, acuminatis; caule decumbente, hirsuto; racemis axillaribus.* Thunb. Flor. jap. pag. 290. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1199. n° 68.

Ses tiges sont filiformes, herbacées, extrêmement pileuses, un peu rameuses, divisées en rameaux courts, alternes, semblables aux tiges, garnis de feuilles pétioles, alternes, ternées, composées de trois folioles médiocrement pétioles, ovales, obtuses, munies à leur sommet d'une petite pointe sétacée, ouvertes, velues à leurs deux faces, longues de cinq à six lignes; la foliole impaire un peu plus grande & plus longuement pétiolée.

Les fleurs naissent, dans l'aisselle des feuilles, au nombre environ de quatre, disposées en grappes très-courtes, soutenues par des pédoncules capillaires, à peine de la longueur des pétioles. Les corolles sont de couleur purpurine.

Cette plante se rencontre au Japon. (Descript. ex Thunb.)

89. SAINFOIN en scorpion. *Hedysarum scorpiurus*. Swartz.

*Hedysarum foliis ternatis, oblongis, subitis hirsutis; caulibus procumbentibus, trigonis; racemis axillaribus; leguminibus teretibus, erectis.* Swartz, Prodr. 107. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1200. n° 70.

*Hedysarum triphyllum, hirsutum, minus, repens; racemis striatis, hirsutis.* Brown, Jam. 301.

Ses tiges sont presque couchées, à trois faces, presque à trois angles, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles oblongues, en ovale renversé, longue d'un demi-pouce, obtuses à leur sommet, glabres à leur face supérieure, hérissées de poils en dessous. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, allongées, droites, velues; les gouffes, assez semblables à celles du *coronilla*, sont presque arrondies, médiocrement comprimées; les articulations droites, oblongues, monospermes.

Cette plante se rencontre dans la Nouvelle-Espagne & à la Jamaïque. (Descript. ex Willd.)

90. SAINFOIN à deux fleurs. *Hedysarum biflorum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, ovatis, tomentosis; caule volubili; pedunculis bifloris, longitudine petioli; tomentis hirsutis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1200. n° 71.

Cette espèce se distingue particulièrement à ses pédoncules courts, terminés par deux fleurs.

Ses tiges sont pubescentes, fort grêles, à peine de l'épaisseur d'un fil, grimpantes, médiocrement rameuses, garnies de feuilles pétioles, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, molles, tomenteuses à leurs deux faces; les deux latérales ovales, elliptiques, obtuses, mucronées à leur sommet; la foliole terminale ovale, un peu rhomboïdale, mucronée.

De l'aisselle des feuilles sort un pédoncule très-court, à peine plus long que le pétiole, terminé par deux fleurs. Les gouffes sont articulées, comprimées, velues, composées de cinq à six articulations.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Descript. ex Willd.)

91. SAINFOIN couché. *Hedysarum prostratum*. Willd.

*Hedysarum foliis ternatis, ellipticis, obtusis; caule prostrato; racemis axillaribus; tomentis uniauriculatis, ovatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1200. n° 72.

*Hedysarum prostratum.* Mühlb. in litt.

Cette espèce est très-rapprochée de l'*hedyfaram repens*, mais elle en est distinguée par ses folioles oblongues, & par ses gouffes qui paroissent n'avoir constamment qu'une seule articulation.

Ses tiges sont cylindriques, hautes d'environ un demi-pied, couchées ou étendues sur la terre, chargées de poils épars appliqués contre les tiges, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles allongées, elliptiques, longues d'un demi-pouce, obtuses, mucronées à leur sommet, entières, glabres à leur face supérieure, couvertes, à leur face inférieure, de poils rares, blanchâtres, couchés.

Les fleurs sont disposées, dans les aisselles des feuilles, en grappes un peu pubescentes ou velues, plus longues que les feuilles. Les gouffes paroissent n'avoir qu'une seule articulation ovale, pubescente. Dans l'*hedyfaram repens* il arrive quelquefois que les gouffes n'offrent qu'une seule articulation, mais ordinairement elles en ont davantage.

Cette plante se rencontre dans la Pensilvanie. ( *Descript. ex Willden.* )

92. SAINFOIN à baguette. *Hedyfaram virgatum*. Thunb.

*Hedyfaram foliis ternatis, obtusis cum acuminis; caule angulato, piloso; pedunculis capillaribus, trifloris*. Thunb. Flor. japon. pag. 288. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1201. n°. 74.

Ses tiges sont anguleuses, herbacées, velues sur leurs angles, droites, rameuses, de couleur purpurine, divisées en rameaux alternes, filiformes, anguleux, étalés, élançés, couverts de poils épars, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ternées, composées de trois folioles ovales, très-entières, obtuses à leur sommet, muni d'une pointe courbe, serrée; réfléchies à leurs bords, vertes & glabres à leur face supérieure, plus pâles & pileuses en dessous, marquées de nervures droites; la foliole terminale plus grande, longue d'environ trois à quatre lignes.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles; elles forment de petites grappes dont les pédoncules sont capillaires, velus, ouverts, longs d'un pouce, réfléchis, soutenant ordinairement trois fleurs vers leur sommet.

Cette plante se rencontre au Japon. ( *Descript. ex Thunb.* )

93. SAINFOIN cilié. *Hedyfaram ciliatum*. Thunb.

*Hedyfaram foliis ternatis; foliolis ovatis, mucronatis, pilosis; pedunculis axillaribus, unifloris, foliis brevioribus*. Thunb. Prodr. pag. 112. — Nov. Act. Upf. 6. pag. 43. tab. 2. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1202. n°. 77.

Cette espèce, bien distincte par ses pédoncules unilobes, & les rameaux chargés de fleurs pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, un peu elliptiques, longues d'environ un pouce, très-entières à leurs bords, acuminées & médiocrement mucronées à leur sommet, ciliées à leur contour, pileuses à leurs deux faces. Les fleurs sont grandes, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules simples, foliaires, plus courts que les feuilles, terminées par une seule fleur; les feuilles varient & sont quelquefois entièrement glabres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, parmi le gazon. ( *Descript. ex Thunb.* )

94. SAINFOIN blanchâtre. *Hedyfaram incanum*. Swartz.

*Hedyfaram foliis ternatis, ovatis, acuminatis, subtus incanis; caule tereti, ramofo, aetia; racemis terminalibus, erectis; leguminibus declinatis, hirsutis*. Swartz, Prodr. pag. 107. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1180. n°. 24.

*Hedyfaram (canescens), foliis ternatis, subtus nervosis; caule glabro, fruticoso; floribus spicatis, terminalibus*. Muller, Dict. n°. 7.

*Hedyfaram triphyllum, majus & minus*. Plum. Ic. 149. fig. 1.

C'est un arbrisseau qui s'élève à près de cinq à six pieds de hauteur, dont les tiges sont glabres, cylindriques, droites, rameuses; les rameaux alternes, dressés, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de folioles ovales, oblongues, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, luisantes à leur face supérieure, blanchâtres & pubescentes au dessous, marquées de nervures & de veines réticulées; les pétiolés munis à leur base de stipules lancéolées, acuminées.

Les tiges & les rameaux sont terminés par de longs épis droits, composés de petites fleurs purpures. Les gouffes sont étroites, allongées, pendantes, médiocrement comprimées, divisées en plusieurs articulations un peu noueuses, hérissées de poils à leurs deux faces, arrondies à leur côté extérieur.

Cette plante se rencontre à la Jamaïque & dans la Nouvelle-Espagne. ( *Thunb.* )

95. SAINFOIN à poils crochus. *Hedyfaram uncinatum*. Jacq.

*Hedyfaram foliis ternatis, ovatis, villosis; caule frutescente, scandente; racemis terminalibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1204. n°. 81.

*Hedyfaram foliis ternatis, ovatis, villosis; caule fruticosa, pilis uncinatis scandente; racemis terminalibus*. Jacq. Hort. Schoenb. 3. p. 27. tab. 258.

Ses tiges sont presque ligneuses, grimpantes, couvertes de poils crochus, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, inégales, molles, velues à leurs deux faces, entières à leurs bords. Les fleurs sont disposées en grappes terminales.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. *h*

96. SAINTOIN grimpant. *Hedyсарum trigonum*. Swartz.

*Hedyсарum foliis ternatis, ovatis, acutis, hirsutis; caule scandente, triquetris; racemis longissimis, axillaribus; leguminibus tortuosis, inflexis.* Sw. Prodr. 107. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1187. n.º. 39.

*Hedyсарum (adhaerens), foliis ternatis, oblongis; racemis axillaribus; leguminibus teretibus, articulatis, villosis.* Vahl. Symbol. 2. pag. 82.

*Hedyсарum (triphyllum), maximum, scandens; caule trigono, hirsuto uncinatis munito; spicis amplis, terminalibus.* Brown, Jam. 301.

*Hedyсарum (Intortum), foliis ternatis, foliolis obcordatis; caule erecto, triangulo, villosis; racemis terminalibus; leguminibus articulatis, incurvis.* Mill. Dict. n.º. 11.

*Hedyсарum triphyllum, caule triangulari; foliis mucronatis; siliquis ternatis, intortis.* Houlton.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq à six pieds, dont les tiges sont grêles, foibles, triangulaires, presque simples ou médiocrement ramuscules, chargées de poils rares & fins, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de folioles pétiolées, allongées, ovales, longues d'un pouce, les latérales étroites & plus petites, couvertes à leurs deux faces de poils rares, fins, longs, couchés. Les pétioles sont pilux, longs d'un pouce & demi, garnis à leur base de stipules en demi-cœur, nerveuses, acuminées, clivées à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, longues de deux ou trois pouces. Les pédoncules partiels sont alternes, écartés, uniflores, garnis de bractées lancéolées, nerveuses, terminées par une pointe presque piquante. Les gouffes sont droites, longues d'un pouce, un peu recourbées, articulées; les articulations oblongues, couvertes de poils crochus.

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les lieux montueux. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

97. SAINTOIN à fleurs vertes. *Hedyсарum viridiflorum*. Linn.

*Hedyсарum foliis ternatis, ovato-oblongis, subris scabris; stipulis lanceolato-cuspidatis; racemis pani-*

*culatis, bracteatis; lomentis as. tria.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1192. n.º. 50.

*Hedyсарum foliis ternatis, acutiusculis; caule erecto; racemis longissimis, erectis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Gronov. Virgin. 109.

*Onobrychis americana, floribus spicatis; foliis ternis, caulecenis; siliquis asperis.* Pluken. Almag. pag. 276. tab. 308. fig. 2.

*Hedyсарum: etetum, puberulum; ramis virgatum & compositis racemifloris; foliis trifoliatis, oblongo-ovalibus, sursum angustatis; stipulis serratis, leguminibus tenacissimis, articulis ovalibus.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 72.

Cette plante a des rapports avec l'*Hedyсарum marylandicum*; elle en diffère surtout par ses folioles plus allongées, par les fleurs plus petites, par les articulations de ses gouffes ovales & non rhomboïdales, & par ses bractées.

Elle a des tiges droites, filloides, divisées particulièrement vers leur sommet en rameaux alternes, liches, nombreux, pubescens, & chargés en outre de poils longs & rares, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, aiguës à leur sommet, presque glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, principalement dans leur jeunesse; rudes en vieillissant, veinées, réticulées à leur face inférieure, longues de deux à trois pouces, munies, à la base de leur pétiole, de stipules lancéolées, cuspidées ou un peu en cœur.

Les fleurs sont disposées en grappes paniculées à l'extrémité des tiges & des rameaux, couvertes, avant la floraison, de bractées nombreuses, ovales, aiguës, caduques. Les calices sont velus, divisés à leur orifice en cinq découpures presque lancéolées, aiguës. La corolle est de couleur pourprine; elle devient verte par la dessiccation. Ses gouffes sont assez grandes, comprimées, articulées, composées d'articulations ovales, hispides ou rudes au toucher.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, dans la Virginie & la Caroline. *z* (*V. f.*)

98. SAINTOIN à fleurs nues. *Hedyсарum nudiflorum*. Linn.

*Hedyсарum foliis ternatis; scapo florifero, nudo; caule folioso, angulato.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1056. — Gronov. Virgin. 107.

*Hedyсарum foliis ternatis, subrotundo-ovatis, acuminatis; scapo paniculato, glabro, radicali; lomentis articulis subrotundo-triangularibus, glabrisculis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1198. n.º. 66.

*Hedyсарum caule nudo, longifloro, foliifero, florifero angulato.* Gronov. Virgin. pag. 86.

*Hedyfarum ovalis-trifolium*; pedunculis subradialibus, supra cauliculos propevenientes assurgentibus, nudis, paniculatis; leguminibus hinc profundissime incis, articulis subtriangulis, Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. p. 71.

Cette espèce a de grands rapports avec l'*Hedyfarum glutinosum*; mais ses folioles sont beaucoup plus petites que celles de cette dernière, ses pédoncules ne sont point vifqueux, & les articulations de ses gouffes plus courtes, un peu arrondies.

Ses tiges sont anguleuses, divisées en rameaux presque couchés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de trois folioles larges, ovales, un peu arrondies, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, vortas à leur face supérieure, blanchâtres en dessous, légèrement pubescentes à leur contour.

Il s'élève presque des racines, des pédoncules redressés, très-longs, en forme de hampe, glabres, point vifqueux, nus à leur partie inférieure, striés, soutenant, à leur partie supérieure, des fleurs disposées en panicule. Les calices sont divisés en cinq découpures aiguës. La corolle est de couleur purpurine; il lui succède des gouffes articulées, comprimées, composées d'articulations presque triangulaires, un peu arrondies, fortement rétrécies à leurs deux extrémités, réticulées, & chargées de poils rares & couchés.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale, depuis la Nouvelle-Angleterre jusque dans la Caroline. ☞

Michaux en a recueilli, dans le Kentucky, une variété dont les feuilles sont composées de folioles beaucoup plus petites, presque orbiculaires.

99. SAINFOIN à folioles arrondies. *Hedyfarum rotundifolium*. Mich.

*Hedyfarum caule prostrato petiolisque hirsutis; stipulis rotundato-cordatis, reflexis; foliis trifoliatis, orbiculatis, utrinque pilosis; racemis paucifloris, leguminibus articulis subrhomboides*. Mich. Flor. bor. Amer. vol. 2. pag. 72.

Cette plante a des tiges rameuses, hérissées de poils écartés, divisées en rameaux étendus sur la terre, & garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles orbiculaires, obtuses à leurs deux extrémités, couvertes de poils à leurs deux faces, entières, inégales, supportées par des pétioles velus, munis à leur base de stipules arrondies, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, réfléchies en dehors.

Les fleurs sont peu nombreuses, disposées en grappes courtes, lâches; les unes latérales, plus courtes, presque simples; les autres terminales, médiocrement paniculées, garnies à leur base de

bractées semblables aux stipules; ces fleurs sont pédiculées, de couleur purpurine. Les gouffes sont articulées, les articulations presque rhomboïdales.

Cette plante se rencontre dans la Caroline, où elle a été découverte par Michaux. (*Descript. ex Mich.*)

100. SAINFOIN bractéolé. *Hedyfarum bracteosum*. Michaux.

*Hedyfarum erectum, glabrum; foliis trifoliatis, oblongo-ovalibus, acuminatis; stipulis subulatis; racemo terminali, sparsifloro; leguminibus articulis, subovalibus*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 73.

Ses tiges sont glabres, droites, élevées, divisées en rameaux alternes, nombreux, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, glabres à leurs deux faces, entières, acuminées à leur sommet, munies, à la base de leur pétiole, de stipules étroites, acuminées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes peu garnies, dont les ramifications inférieures sont simples, garnies de bractées stériles ou sans fleurs; ces bractées sont assez grandes, ovales, très-glabres, longuement acuminées, marquées de plusieurs stries; les grappes supérieures sont munies de fleurs éparées, pédiculées, réunies souvent deux à deux. La corolle est de couleur purpurine; les gouffes comprimées, articulées; les articulations glabres, presque ovales.

Cette plante a été découverte par Michaux, dans les lieux montagneux de la Virginie & de la Caroline. (*Descript. ex Mich.*)

101. SAINFOIN barbu. *Hedyfarum barbatum*. Linn.

*Hedyfarum foliis ternatis; racemis oblongis, subramosis; leguminibus inflexis, calicibus pilosis*. Linn. Syst. veget. pag. 162. — Swartz, Obstr. 187. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1203 n°. 79.

*Hedyfarum foliis ternatis; floribus cernuis, racemosis; calicibus pilosis, leguminibus biarticulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1055. — Amoenit. academ. vol. 5. pag. 403.

Ses tiges sont couchées, longues, velues, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ternées, composées de folioles ovales, oblongues, tomenteuses en dessous; les pétioles sont pileux, munis à leur base de stipules membraneuses, ensiformes, presque sétacées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires &

terminales, droites, foliaires, de la longueur des feuilles, garnies de bractées membraneuses, naviculaires, nues, acuminées, de la longueur des pédoncules partiels : ces derniers sont geminés, uniflores. Les calices à demi-divisés, en cinq découpures munies de poils longs & barbus. La corolle est petite, à peine de la longueur des calices ; les gouffes sont composées de deux articulations comprimées, membraneuses.

Cette plante croît dans la Jamaïque, aux lieux arides & sablonneux. (*Descript. ex Linn.*)

102. SAINFOIN à larges gouffes. *Hedysarum latifolium*.

*Hedysarum foliis ternatis ; foliis ovato-lanceolatis, acutis ; floribus axillaribus ; racemis folio multo brevioribus ; leguminibus lato-articulatis, unifornibus ; caule scandente, pubescente.* (N.)

Cette espèce a des rapports avec l'*Hedysarum volubile*, dont les fruits ne sont pas connus : celle-ci en diffère par ses feuilles plus courtes, aiguës, non luisantes, remarquable d'ailleurs par ses gouffes plates & larges, sans échancrures à leurs bords.

Ses tiges sont presque ligneuses, grêles, cylindriques, grimpantes, pubescentes, garnies de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de folioles ovales, presque lancéolées, aiguës, longues d'un pouce & demi à deux pouces, minces, glabres, vertes à leur face supérieure, cendrées en dessous, nerveuses, veinées, réticulées, supportées par des pétioles pubescents, munis à leur base de stipules étroites, subulées.

Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, à peine plus longues que les pétioles ; les pédoncules sont velus, hispides, médiocrement rameux ; les calices campanulés, courts, élargis, terminés par cinq dents subulées. Les gouffes sont longues au moins de deux pouces, plates, élargies, glabres, articulées, à peine légèrement sinuées, pédiculées : chaque articulation renfermant dans son milieu, qui est un peu bombé, une petite semence d'un jaune-clair, luisante, échancrée en rein.

- Cette plante a été rapportée du Pérou par Joseph Jusieu. (*V. f. in herb. Jusieu.*)

103. SAINFOIN grimpant. *Hedysarum volubile*. Linn.

*Hedysarum foliis ternatis, ovato-oblongis ; caule volubili.* Linn. Syst. veget. pag. 675. n°. 49. — Hort. Cliff. 409. — Royen, Lugd. Bat. 385.

*Hedysarum foliis ternatis, lanceolatis, obtusis ; caule volubili, racemis axillaribus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1204. n°. 82.

*Hedysarum trifolium, scandens ; folio longiore, splendente.* Dillen, Eltham. pag. 173. tab. 143. fig. 170.

Ses tiges sont très-longues, grêles, farnetteuses, grimpantes, rouillantes, cylindriques, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétioles, ternées, composées de trois folioles ovales, oblongues, obtuses à leur sommet, pédiculées, vertes, luisantes à leur face supérieure, plus pâles, presque glauques en dessous, pubescentes dans leur jeunesse.

Les fleurs sont disposées en longs épis grêles, sortant de l'aisselle des feuilles ; les pédoncules sont simples, nus dans leur partie inférieure, presque glabres, garais, vers leur sommet, de fleurs rares, distantes, munies de petites bractées courtes, ovales, aiguës. Les calices sont velus, à cinq divisions inégales, aiguës. La corolle est d'une belle couleur purpurine, mêlée de jaune & de blanc ; l'étréandale ovale, presque rond, plus court que la carène ; les ailes étroites, obtuses, presque aussi longues que l'étréandale.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale. (*V. f. in herb. Jusieu.*)

\*\*\* Feuilles aillées.

104. SAINFOIN commun. *Hedysarum onobrychis*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis ; leguminibus monospermis, aculeatis ; corollam alis calicem aquantibus ; caule elongato.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1059. — Jacq. Austr. tab. 352. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 31. n°. 48. — Crantz. Austr. p. 424. — Pollich. Pal. n°. 604. — Gouan, Illustr. 48. — Gmel. Tub. 224. — Hoffm. Germ. 260. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 317. — Il. 211. — Gouan, Monsp. 382. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 604. n°. 3.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus subrotundis, aculeatis.* Hort. Cliffort. 365. — Hort. Upf. 211. — Royen, Lugd. Batav. 385. — Sauvag. Monsp. 235.

*Hedysarum caule erecto ; foliis pinnatis, cuneatis, glabris ; alis calicem aquantibus ; lomenis glabris, monospermis, aculeato-dentatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1215. n°. 108.

*Onobrychis caule erecto, ramoso ; floribus spicatis.* Haller, Helv. n°. 396.

*Onobrychis.* Rivin. tab. 2.

*Onobrychis viciifolia.* Scopul. Carn. 2. n°. 918.

*Onobrychis foliolovicia, fructu echinato, major.* Bauh. Pin. 350.

*Polygalon Gesneri.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 335. Icon.

Caput

*Caput gallinaceum Belgarum.* Lobel. Ic. 2. p. 81.  
— *Idem.* Obferv. pag. 527. Icon.

*Onobrychis.* Dodon. Pempt. pag. 548. Ic.

*Onobrychis foliis vicia, frutis echinato, major; floribus dilute rubentibus (floribus albis).* Tournef. Inst. R. Herb. 300 — Magn. Montp. p. 191.

*Hedysarum foliis pinnatis; leguminibus monospermis, aculeatis.* Sauvag. 233.

*Onobrychis sativa.* Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 652. n°. 623. V.

β. *Onobrychis incana, foliis longioribus.* C. B. Burser. XIX, 138.

Vulgairement esparcette, fainfoin.

Ce fainfoin, si connu par ses usages économiques, dont la culture est si généralement répandue, pousse des mêmes racines plusieurs tiges hautes d'environ un pied, vertes ou un peu rougeâtres, droites, cannelées, peu rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, longues, ailées, avec une impaire; composées d'environ vingt-neuf folioles oblongues, pédiculées, linéaires, rétrécies en coin à leur base, obtuses & mucronées à leur sommet, glabres & vertes en dessus, un peu blanchâtres & pubescentes en dessous, presque plissées par les nervures latérales, simples, régulières; les pétioles communs sont un peu velus; les pédicules le sont davantage; la base des pédoncules est enveloppée par des stipules larges, membranées, acuminées, velues, particulièrement sur leur dos.

De l'aisselle des feuilles sortent de très-longues pédoncules droits, pubescens, cylindriques, terminés par un bel épi long de deux à quatre pouces, garni de fleurs nombreuses, sessiles, munies chacune d'une petite bractée scarieuse, subulée. Le calice est velu, divisé à son orifice en cinq longues découpures très-étroites, subulées, inégales. La corolle est purpurine, couleur de lie de vin, rougeâtre ou quelquefois blanche; les ailes sont petites, étroites, à peine aussi longues que le calice. Les gouffes sont composées d'une seule articulation arrondie, courte, glabre, dentée, épineuse, presque en crête de coq, qui ne renferme qu'une seule semence réniforme.

Cette espèce offre quelques variétés, soit dans la couleur de ses fleurs, soit dans la forme de ses folioles, qui sont plus ou moins allongées, étroites, presque acuminées.

On cultive partout cette plante en grand; elle croît naturellement en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les sols arides & crayeux, sur les montagnes. x. (V. v.)

La facilité qu'a cette plante de croître aisément dans toutes sortes de terrains, même dans les sols

Botanique. Tome VI.

secs & stériles; l'excellente nourriture qu'elle offre aux bestiaux, l'ont fait employer généralement pour les prairies artificielles, &c, quoique d'un rapport souvent inférieur au trèfle & à la luzerne, bien des agriculteurs préfèrent le fainfoin; il produit beaucoup lorsqu'il est semé dans une terre légère, ni trop sèche ni trop humide. Dès qu'elle a été préparée convenablement, il faut semer les graines ni trop ni trop peu épaisses, dans un tems doux, sur une terre qui ne soit pas trop humide, vers la fin du mois de germinal. On regarde comme avantageux de faucher le fainfoin, même dès la première année, moins pour le profit qu'on en retire, que parce qu'en coupant les tiges supérieures, les racines en prennent plus d'accroissement; ce que l'on appelle *tailler*. A la seconde année, les tiges poussent avec assez d'abondance pour pouvoir être coupées deux ou trois fois dans l'année. Il est essentiel de choisir, pour la récolte de cette plante, un beau tems, car elle sèche plus difficilement que beaucoup d'autres fourrages.

Une prairie en fainfoin peut durer dix ou douze ans dans une terre médiocre, &c quelquefois le double dans une bonne terre. Les *Mémoires de la Société d'Agriculture de Berne* nous apprennent que des fonds sablonneux ont été tellement améliorés par des prairies artificielles de fainfoin, que leur rapport a augmenté à un point extraordinaire. Depuis que les habitants de Capelen en Suisse ont été obligés, par la disette de fourrage, de convertir leurs communes en prairies de fainfoin, tout y a pris une forme nouvelle; hommes, bestiaux, maisons, champs, tout y prospère vitiblement, dit Valmont de Bomare, tant il est vrai que rien n'est à négliger dans l'agriculture: la plus petite branche est propre à rétablir l'abondance dans un pays. Lorsqu'on veut semer de nouveau une prairie en fainfoin, la difficulté est de la défricher: on donne comme un moyen simple & peu coûteux, de couper avec une pelle, sur la fin de l'automne, la couronne des racines; alors le cœur des racines se pourrit pendant l'hiver: elle forme un excellent engrais qui ameublit la terre, & qu'on labouré plus facilement au printemps.

On a donné, à ce fourrage, le nom de *saint-foin*, *sainfoin* (saint-foin) par excellence, parce qu'il est en effet celui qui nourrit & engraisse le plus les bestiaux, qu'ils le recherchent avec une grande avidité. Il produit beaucoup de lait dans les femelles, surtout dans les vaches. Il est cependant très-essentiel de ne pas leur donner cette plante verte, à moins qu'on ne la mêle avec la paille d'avoine; il faut même ne les habitude que peu à peu à celle qui est sèche, & ne leur en donner qu'en petite quantité à la fois: ils la mangent avec trop d'avidité, & elle leur procure tant de sang, qu'on en a vu en danger d'être suffoqués. Ses semences sont fort bonnes pour nourrir les poules,

111

les échauffer & leur procurer des portes plus fréquentes.

Les anciens se servoient des feuilles de sainfoin, sous le nom de *plante sacrée*, pour résoudre les tumeurs & les enflures; ils en exprimoient le suc pour provoquer la sueur. Pilé & appliqué en cataplasme, il est recommandé comme un excellent résolutif: les fumigations de cette plante ont été mises en usage dans les paralysies. Les feuilles ramassées avant la pousse des fleurs, séchées avec soin & bien conservées, ont, dit-on, la saveur & l'odeur du thé, dont on fait usage en place de thé vert.

105. SAINFOIN à fleurs blanches. *Hedysarum album*. Willd.

*Hedysarum caule erecto; foliis pinnatis, linearibus, subius ferricis; alis calicis brevioribus; lomentis pubescentibus, monospermis, aculeato-dentatis*. Willd. Sc. Plant. vol. 3. pag. 1216. n° 109.

*Hedysarum album*. Willd. & Kitaib. Plant. tat. Hungar.

Quoique rapprochée de l'*Hedysarum onobrychis*, cette plante en diffère par un assez grand nombre de caractères pour en être distinguée.

Ses tiges sont cylindriques, droites, striées, couvertes de poils blanchâtres & couchés, garnies de feuilles alternes, ailées, pétiolées, les supérieures sessiles, composées de folioles linéaires, mucronées à leur sommet, chargées en dessous de poils soyeux & couchés. Les fleurs sont presque sessiles, disposées en long épi. La corolle est blanche, de la grandeur de celle de l'*Hedysarum onobrychis*; les ailes plus courtes que le calice. Les gouffes sont pubescentes, munies de dents en forme d'aiguillons; elles ne renferment qu'une seule semence.

Cette plante étoit en Hongrie, fut les montagnes calcaires. (*Descript. ex Willd.*)

106. SAINFOIN des roches. *Hedysarum saxatile*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis; leguminibus monospermis, sulcatis, mucis, corollam alis brevissimis, scapulis subradicatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1059. — Pallas, Itin. 2. pag. 107.

*Hedysarum caule ascendente; foliis pinnatis, linearibus, glabris; alis calicis brevioribus; lomentis glabris, monospermis, aculeatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1216. n° 110.

*Hedysarum foliis pinnatis; foliolis linearibus; leguminibus monospermis, sulcatis, luvibus; petalis inaequalibus*. Gerard, Flor. gall. Prox. pag. 54.

*Onobrychis saxatilis*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 653. n° 623. VI.

*Onobrychis saxatilis, foliis vicia angustioribus & longioribus, aequisetis*. Tournef. Inst. R. Herb. 390. — Garid. Aix. pag. 339. — Allion, Nickenb. 124.

Ses racines sont dures, ligneuses, profondes, d'un blanc jaunâtre en dedans, brunes & couvertes à leur partie supérieure d'écaillés membraneuses: une portion de la racine, recouverte de terre, est également écaillée & ligneuse; la partie qui s'élève au dessus de la terre est très-courte, glabre, striée, rameuse presque dès la base; ses rameaux sont courts, garnis de feuilles alternes, éparées, nombreuses, longuement pétiolées; la partie inférieure des pétioles dépourvue de feuilles: celles-ci sont ailées, composées de quinze à dix-neuf folioles opposées ou un peu alternes, médiocrement pédiculées, linéaires, très-étroites, un peu blanchâtres, pubescentes, aiguës à leur sommet, supportées par des pétioles filiformes, striés, pubescents, munis à leur base de stipules glabres, scarieuses, élargies à leur base, longuement acuminées, roussâtres, presque imbriquées par le peu de distance qui existe entre les feuilles; & comme les rameaux sont très-courts, & que les pétioles sont longs, les feuilles paroissent comme fasciculées.

Les pédoncules sortent de l'aisselle des fleurs; ils ressemblent presque à des hampes; ils sont droits, filiformes, plus longs que les feuilles, striés, presque glabres, terminés par un épi grêle, peu garni, chargé de fleurs alternes, presque sessiles; les inférieures plus écartées, fort petites, munies à leur base de petites bractées scarieuses, subulées. Le calice se divise en cinq dents longues, égales, sessacées, roides, toutes inférieures; la lèvre ou partie supérieure est constituée par une membrane coriace, blanchâtre, tronquée, finement crénelée; les ailes de la corolle sont courtes, mais un peu plus longues que le calice; la carène est presque de même longueur que l'écartement. Le fruit est une gouffe glabre, à une seule semence, filonnée, hérissée de quelques petites pointes peu sensibles; les dents persistantes & subulées du calice la font paroître comme épineuse.

Cette plante croît sur les rochers calcaires dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Nice, dans la Sibirie. Je l'ai recueillie dans les environs d'Aix. (P. v.)

107. SAINFOIN du Caucase. *Hedysarum petraum*. Willd.

*Hedysarum caule erecto; foliis pinnatis, oblongo-lanceolatis, glabris; alis calicis duplo longioribus; lomentis pubescentibus, monospermis, dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1217. n° 111.

*Hedysarum petraum*. Mischall. ab Bieberstein, Caucas. Taur.

Cette espèce, qui a de très-grands rapports

avec l'*hedysarum saxatile*, par ses tiges beaucoup plus allongées, par ses folioles lancéolées, par ses corolles blanches, par les ailes une fois plus longues que le calice, & par le caractère de ses gouffes.

Ses tiges sont droites, longs, rameuses, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de folioles oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières, opposées, presque sessiles. Les fleurs sont disposées en épis allongés; les corolles sont blanches, d'une grandeur médiocre; les ailes ont une longueur double de celle du calice; les gouffes sont pubescentes, à une seule semence, dentées à leurs bords.

Cette plante croît sur le mont Caucaïe, dans les terrains pierreux. (Descript. ex Willd.)

108. SAINFOIN CORNU. *Hedysarum cornutum*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, linearibus; leguminibus monospermis, levibus; caule fruticoso, pedunculis persistenti-spinosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1060. — Pallas, Itin. vol. 1. pag. 442. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1219.

*Onobrychis orientalis, frutescens, spinosa, tragacantha facie*. Tournef. Coroll. 26. Iter. vol. 2. pag. 108. tab. 108.

Cette plante a l'aspect de l'*astragalus tragacantha*, par la dureté de ses rameaux & la conversion des pédoncules en pointe épineuse.

Ses tiges sont basses, ligneuses, glabres, épaisses, de couleur brune, divisées en rameaux courts, très-diffus, nombreux, disposés en buissons tortueux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de sept à neuf folioles opposées ou alternes, presque sessiles, fermes, très-étroites, linéaires, entières, aiguës à leur sommet, légèrement velues, supportées par des pétioles velus dans leur jeunesse, munis à leur base de deux stipules fort petites, membraneuses, élargies inférieurement, acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées alternativement sur des pédoncules courts, axillaires, roides, simples, solitaires, mucronés, & formant, après la chute des fleurs, de longues épines persistantes, subulées, cylindriques, ligneuses, très-aiguës, de la longueur des feuilles, s'écartant fortement des rameaux. Ils soutiennent quatre à cinq fleurs pédicelées, placées un peu au-dessous de leur sommet. Les calices sont fort petits, presque glabres, divisés à leur orifice en cinq dents médiocres, droites, égales, subulées. La corolle est longue, étroite, purpurine; les ailes plus longues que le calice, la carène presque de même longueur que l'étendard. Le fruit est une gouffe lisse à une seule semence.

Cette plante croît dans l'Orient. M. Labillardière l'a recueillie dans la Syrie, & a bien voulu nous en communiquer un exemplaire. (V. f.)

109. SAINFOIN tête de coq. *Hedysarum caput galli*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis, crista densibus subulatis; alis brevissimis, caule diffuso*. Linn. Syst. veget. pag. 676. — Kniph. Centur. 9. n°. 44. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 178.

*Hedysarum caule erecto, foliis pinnatis, oblongis, glabris; alis calice brevioribus; lomentis monospermis, aculeatis; crista densibus subulatis, spinosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1217. n°. 113.

*Hedysarum foliis pinnatis; pedunculis suberectoribus; floribus alternis, sessilibus, subulatis*. Gouan, Flor. monsp. 195. & Hort. 382.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus aculeatis; corollarum alis minimis, calice brevioribus*. Getard, Flor. gall. Prov. pag. 504. n°. 4.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis, aculeatis; petalis aequalibus*. Linn. Spec. Plant. 751.

*Onobrychis caput galli*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 651. n°. 612. II.

*Onobrychis fructu echinato, minor*. C. Bauh. Pin. 350. — Tournef. Infr. R. Herb. 390. — Schaw. Specim. n°. 430.

*Chrys. gallinaceum minus*. C. Bauh. Prodr. 149.

*Onobrychis major, fructu echinato, minore*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 2. tab. 11. fig. 10.

On distingue cette espèce aux épines droites & simples dont ses gouffes sont armées; en quoi elle diffère de l'*hedysarum crista galli*, qui lui ressemble beaucoup, mais dont les épines sont plus larges, un peu denticulées; les gouffes plus fortes.

Ses racines sont dures, grêles, blanchâtres; elles produisent plusieurs tiges étalées, les unes tout-à-fait couchées, d'autres plus ou moins relevées, grêles, striées, légèrement pubescentes, longues d'environ un pied, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées d'onze à treize folioles opposées, presque sessiles, petites, linéaires ou un peu ovales, obtuses ou tronquées à leur sommet, quelquefois légèrement échancrées, avec une petite pointe dans l'échancrure; glabres, entières, munies de quelques poils rares à leur partie inférieure, un peu rétrécies à leur base; les pétioles garnis de stipules ovales, scarieuses, acuminées.

Les pédoncules sont axillaires, ordinairement plus courts que les feuilles avant l'époque de la floraison, plus longs à la maturité des fruits,



simples, foliacées, garnis de fleurs alternes, peu nombreuses, pédiculées, dont le calice est pubescent, divisé en cinq découpures longues, sétacées. La corolle est petite, de couleur violette, à peine plus longue que les divisions du calice; les ailes sont extrêmement petites; l'étendard ovale, un peu plus long que la carène. Le fruit est une gouffe presque ovale, dure, marquée à ses deux faces de plusieurs enfoncements, un peu arquée à l'un de ses bords, armée d'épines courtes, tordues, inégales, comprimées, subulées, aiguës, ordinairement disposées, de chaque côté, sur trois rangs.

Cette plante croît aux lieux stériles & montagneux dans les départements méridionaux de la France. M. Desfontaines l'a également recueillie sur les collines des environs d'Alger. ○ (V. f.)

110. SAINFOIN crête de coq. *Hedysarum cristae galli*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis, aculeatis; cristae laciniis lanceolatis, denticulatis*. Linn. Syst. veget. pag. 563.

*Hedysarum caule erecto, foliis pinnatis, oblongis, glabris; petalis subaequalibus; lomentis monospermis, aculeatis; cristae denticibus lanceolatis, denticulatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1218. n°. 114.

*Onobrychis cristae galli*. Lam. Flot. franç. vol. 2. pag. 652. n°. 623. III.

*Onobrychis, seu caput gallinaceum minus, fructu maximo, insigniter echinato*. Triumf. Obsev. 65. — Tournef. Inst. R. Herb. 390.

*Onobrychis minor, fructu echinato, majore*. Morif. Oxon. Hist. 2. §. 2. tab. 11. fig. 11.

Cette espèce, très-rapprochée de l'*hedysarum caput galli*, s'en distingue par ses fleurs ordinairement moins nombreuses, surtout par les fruits beaucoup plus gros, & dont le côté extérieur est surmonté d'une membrane découpée en crête de coq, dont les découpures, au nombre de trois ou quatre, sont linéaires, lancéolées, denticulées.

La plupart de ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied ou un pied & demi, fermes, stériles, glabres, médiocrement rameuses, garnies de feuilles alternes, petiolées, ailées, composées de quinze ou dix-sept folioles opposées; les inférieures alternes, pédiculées, linéaires, obtuses, souvent mucronées, aiguës à leur base, petites, vertes à leurs deux faces, glabres en dessus, un peu pubescentes ou velues en dessous; les pétioles chargés de quelques poils blanchâtres, munis à leur base de stipules blanches, transparentes, scarieuses, ovales, acuminées.

Les fleurs sont petites, alternes, presque sessiles,

disposées en épis courts à l'extrémité d'un long pédoncule axillaire, droit, foliaire, strié, légèrement velu, plus long que les feuilles; quelques-uns cependant sont beaucoup plus courts. Le calice est divisé profondément en cinq découpures très-étroites, inégales, subulées, aiguës, velues ou ciliées à leurs bords, un peu plus longues que la corolle: celle-ci est petite, de couleur violette, composée de pétales presque égaux. Le fruit est une gouffe ovale, médiocrement comprimée, à une & même deux semences presque noires, un peu échan-crées en rein, renfermées dans une seule loge: cette gouffe est tronquée à son côté intérieur, arquée à l'extérieur, qui est en même tems surmonté d'une forte crête ou arête plane, dure, épaisse, divisée à ses bords en trois ou quatre parties profondes, linéaires, lancéolées, armées à leurs bords de petites dents ou pointes courtes, épineuses; la face, tant supérieure qu'inférieure de chaque gouffe, est marquée de plusieurs cavités pubescentes, dont les bords sont armés d'épines inégales, plus courtes que celles de la carène, quelquefois légèrement denticulées à leurs bords.

Cette espèce croît aux lieux stériles, dans les contrées méridionales de l'Europe. On la trouve également dans les départements du midi de la France. ○ (V. v.)

111. SAINFOIN à crinière. *Hedysarum crinitum*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, racemis longis, leguminibus inflexis, caule fruticoso*. Linn. Syst. veget. pag. 677. n°. 65. — Maniff. 102. — Burm. Fior. ind. tab. 56. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1218. n°. 115.

Cette espèce ressemble tellement à l'*hedysarum lagopodioides* par les parties de sa fructification, qu'il seroit presque impossible de l'en distinguer sans ses feuilles ailées & ses folioles très-grandes.

Ses tiges sont ligneuses, presque arborescentes, droites, hautes, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de cinq folioles oblongues, glabres, réticulées à leurs deux faces, inégales à un de leurs côtés, longues de trois à quatre pouces, munies, à la base des pétioles, de deux stipules assez grandes, lancéolées, aiguës. Ses fleurs sont disposées en grappes alongées; chaque fleur portée sur un pédoncule particulier, capillaire, très-velu, fortement recourbé après l'époque de la floraison. Les trois plus grandes découpures du calice sont filiformes, très-petites, fortement réticulées; elles cachent en entier une petite gouffe lisse, ridée, luisante, d'un beau noir, qui se perd au milieu des nombreux pédoncules recourbés, & presque confondus les uns parmi les autres; de sorte que ces fleurs offrent alors, par leur ensemble, une sorte de crinière touffue: les semences sont brunes, luisantes, ovales.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Th*  
(*V. f. in herb. Juss.*)

112. SAINFOIN chevelu. *Hedysarum comosum*.  
Vahl.

*Hedysarum foliis pinnatis, lanceolatis; racemis elongatis, cylindricis; caule fruticoso*. Vahl. Symb. 2. pag. 84. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1219. n° 116.

Cette plante a des rapports avec l'*Hedysarum erinatum*; elle en diffère par ses feuilles plus longues & plus étroites; par ses grappes plus éfilées, terminales, garnies à leur sommet de bractées mêlées en forme de cheveux.

Ses tiges sont presque ligneuses, diviées en rameaux velus, anguleux, alternes, garnis de feuilles pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de folioles au nombre de cinq ou sept, linéaires, lancéolées, presque égales, longues de huit à neuf lignes & plus, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, veinées, réticulées, supportées par des pétioles velus, de la longueur des folioles; les partiels très-courts, hérissés de poils fort pe-  
rits, munis chacun à leur base de deux stipules subulées, plus longues que ces pétioles: celles de la base des feuilles sont ovales, acuminées, marquées de nervures droites.

Les fleurs sont disposées en grappes droites, terminales, longues de sept à huit pouces, garnies à leur partie supérieure de plusieurs bractées lancéolées, prolongées à leur sommet en un filament sétacé, trois & quatre fois plus long que les fleurs: celles-ci sont très-rapprochées, supportées par des pédoncules partiels très-courts. Les fruits n'ont pas été observés.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Th*  
(*Descript. ex Vahl.*)

113. SAINFOIN à fleurs touffues. *Hedysarum confertum*. Desfont.

*Hedysarum foliis pinnatis, foliolis subius nervosis, ellipticis; racemo conferto, pedunculis folio longioribus, legumine monospermo*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 178.

*Hedysarum caule procumbente, foliis pinnatis, ellipticis, pubescentibus; racemo ovato, lomentis monospermis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1217. n° 112.

Ses tiges naissent en touffes des mêmes racines; elles sont couchées ou en partie relevées, pubescentes, striées, longues d'environ un pied, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ailées, composées de folioles nombreuses, très-rapprochées, pubescentes, elliptiques, obtuses à leur sommet, striées à leur face inférieure, longues de quatre à cinq lignes, larges de trois, munies, à la base de leur

pétiole, de stipules sèches, scarieuses, ovales, aiguës.

Les pédoncules sont, les uns situés dans l'aisselle des fleurs, les autres à l'extrémité des rameaux, beaucoup plus longs que les feuilles, striés, pubescents, depourvus de feuilles; ils supportent des fleurs presque sessiles, disposées en grappes serrées, épaisses, ovales, longues d'environ un pouce, munies de bractées fort petites, sèches, subulées. Leur calice est d'une seule pièce, divisé à son orifice en cinq découpages sétacées. La corolle est d'une couleur de rose très-agréable, de la grandeur de celle de l'*Hedysarum onobrychis*; leur fruit est formé par une gouffe à une seule semence.

Cette plante croît dans le sable au environs de Sbib, proche Tunis, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. *x* (*Descript. ex Desfont.*)

114. SAINFOIN veiné. *Hedysarum venosum*. Desfont.

*Hedysarum foliolis venosis, inferius villosis; scapo foliis longioris; leguminibus circumnatis, denatis, spinosis, monospermis, villosissimis*. Desfont. Flor. atl. vol. 2. pag. 179. tab. 201.

*Hedysarum acule, foliis pinnatis, subrotundellipticis, f. b. villosis; lomentis monospermis, orbiculatis, margine denatis, villosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1213. n° 103.

Jolie espèce, bien distincte par ses corolles jaunes & par ses gouffes non articulées, à une seule semence, arrondies & garnies à leurs bords de dents fines, épineuses.

Ses tiges sont extrêmement courtes ou presque nulles; elles supportent des feuilles presque radicales, étendues, pétiolées, ailées, composées de folioles sessiles, au nombre de sept à treize; opposées, ovales, médiocrement arrondies ou elliptiques, longues d'environ un demi-pouce sur quatre lignes de large, velues en dessous, marquées à leur face supérieure de veines purpurines.

Du milieu des feuilles s'élèvent des pédoncules simples, longs d'environ un demi-pied, pubescents, plus longs que les feuilles, qui supportent des fleurs presque sessiles, disposées en un épi touffu, terminal, ovale avant la floraison. Les calices sont velus, divisés, au moins jusque vers leur moitié, en cinq découpages étroites, aiguës. La corolle est d'un jaune-pâle, de la grandeur de celle de l'*Hedysarum onobrychis*; l'écrandard marqué de veines purpurines: il lui succède une gouffe non articulée, pendante, comprimée, large d'environ quatre à cinq lignes, très-velue, arrondie, garnie à son contour de petites dents régulières, spinuliformes: elle ne contient qu'une seule semence.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines

sur les montagnes de Sbiba, proche Tunis.  $\times$  (*V. f. in herb. Juss. & Desfont.*)

115. SAINFOIN nain. *Hedysarum pumilum*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis; caule suffruticoso; corollam alis vexillo, vexilloque carina brevioribus; leguminibus monospermis.* Linn. Syst. veget. pag. 675. n°. 60. — Martius. 448. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1213. n°. 102.

C'est un fort petit albrissau, dont les tiges ont à peine trois à quatre pouces de hauteur : elles sont glabres, rameuses, garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, avec une impaire, de la longueur des tiges, composées de folioles presque sessiles, ovales, oblongues.

Les fleurs sont disposées en un épi glabre. Leur calice est d'une seule pièce, lisse, terminé à son orifice en cinq dents courtes, subulées. La corolle a la carène ample, large, très-grande, fort obtuse ; l'étendard est de moitié plus court que la carène : les gouffes ne sont point articulées ; elles ne contiennent qu'une seule semence.

Cette plante croît naturellement en Espagne.  $\gamma$

116. SAINFOIN à gouffes orbiculaires. *Hedysarum circinnatum*. Willden.

*Hedysarum caulescens, erectum; foliis pinnatis, oblongis; lomentis monospermis, orbiculatis, reticulatis, margine dentatis, pubescentibus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1213. n°. 104.

*Onobrychis orientalis, galea foliis erectior; floribus lineis purpureis, utrinque reticulatis.* Tournef. Coroll. 26.

*Onobrychis major, fructu alato.* Buxbaum. Centur. 2. pag. 38. tab. 42.

Cette plante paroît avoir de très-grands rapports avec l'*Hedysarum venosum* ; peut-être n'en est-elle qu'une variété dont les tiges sont plus élevées, les ailes de la corolle beaucoup plus courtes ; mais les fruits sont presque les mêmes, excepté que les poils qui les recouvrent, sont si fins & si courts, qu'ils ne sont bien visibles qu'avec le secours d'une loupe.

Ses tiges sont droites, peu rameuses, chargées de quelques poils roides, garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, avec une impaire ; composées d'environ onze à treize folioles oblongues, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous, mucronées à leur sommet, entières à leurs bords, munies, à la base des pétioles, de stipules ovales.

Les fleurs sont disposées en grappes très-longues, situées dans l'aisselle des feuilles ; le calice est presque tubulé, divisé en cinq dents à son orifice. La corolle est marquée à ses deux faces de lignes purpurines, disposées en réseau ; les ailes sont lan-

céolées, un peu plus courtes que le calice ; les gouffes orbiculaires, arrondies, à une seule articulation, réticulées à ses deux faces dans son milieu, pubescentes, environnées d'une membrane en forme d'aile, finement denticulée à ses bords.

Cette plante croît en Orient, dans la Cappadoce.  $\times$  (*Descript. ex Willden.*)

117. SAINFOIN de Tournefort. *Hedysarum Tournefortii*. Willden.

*Hedysarum caule erecto, pubescente; foliis pinnatis, oblongo-lanceolatis, subtus canis, pubescentibus; alis falcatis, calice longioribus; lomentis monospermis, villosis, articulato-falcatis, dentatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1214. n°. 105.

*Onobrychis orientalis, incana; flore luteo; fructu magno, radiato.* Tournef. Coroll. 26.

Ses tiges sont droites, pubescentes & blanchâtres, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, composées de folioles opposées, presque sessiles, oblongues, lancéolées ou un peu ovales, pubescentes à leurs deux faces, blanchâtres & velues en dessous, entières à leurs bords, munies, à la base de leur pétiole, de stipules oblongues, acuminées.

Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, beaucoup plus longues que les feuilles ; les calices sont velus, monophylles, divisés en cinq dents aiguës à leur orifice, la corolle est jaune, de la grandeur de celle de l'*Hedysarum coronarium* ; les ailes sont petites, un peu courbées en faux, plus longues que le calice. Les gouffes n'ont qu'une seule articulation très-velue, orbiculaire, échan-crée en faux à un de ses côtés, dentée à ses bords, couverte à ses deux faces d'aiguillons foibles, épars, saillans hors d'un duvet lanugineux ; il n'y a qu'une seule semence médiocrement réniforme.

Cette plante croît dans l'Arménie & le Levant.  $\times$  (*V. f. in herb. Jussieu.*)

118. SAINFOIN de Pallas. *Hedysarum Pallasii*. Willden.

*Hedysarum caule erecto, villoso; foliis pinnatis, ovatis, subtus tomentosis; alis obusis, calice brevioribus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1214. n°. 106.

*Hedysarum buxbaumianum.* Pallas, Nov. Aq. Petrop. 10. pag. 316.

Ses tiges sont très-velues, toutes couvertes de poils roides, étendus ; garnies de feuilles alternes, ailées, avec une impaire ; composées de folioles opposées, presque sessiles, ovales, velues, presque glabres en dessus, velues, tomenteuses & blanchâtres en dessous, munies, à la base de leur pétiole, de stipules oblongues, acuminées.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles, en grappes plus longues que les feuilles; les calices sont tubulés, divisés à leur orifice en cinq dents aiguës. La corolle est de couleur jaune, traversée par des veines purpurines; les ailes sont oblongues, obtuses, plus courtes que le calice.

Cette plante, d'après Willdenow, ne peut se rapporter à l'*Onobrychis major*, *fructu alato*, Buxbaum. Centur. 2. pag. 38. tab. 42, que Pallas cite en synonymie. La plante dont il est ici question en diffère par ses tiges velues, par ses folioles ovales, blanches & romescentes en dessous; par ses fleurs plus grandes, & peut-être par ses fruits s'ils étoient connus. La plante de Buxbaum a bien plus de rapports avec l'*hedyfarum circinnatum*; elle est aussi très-voisine de l'*hedyfarum Tournefortii*; mais dans cette dernière les poils des feuilles & des tiges sont couchés, les folioles oblongues, lancéolées, verdâtres, & les ailes courbées en faux, plus longues que le calice.

Cette espèce croit dans la Cherfonèse taurique. (Descript. ex Willden.)

119. SAINFOIN élégant. *Hedyfarum coronatum*. Willden.

*Hedyfarum caule erecto, flexuoso, pubescente; foliis pinnatis, ovatis, cuspidatis, subius cano-pubescentibus; alis lanceolatis, carnatis duplo brevioribus; lomentis monospermis, semiorbiculatis, villosis, aculeatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1215. n°. 107.

Cette espèce a de très-grands rapports avec l'*hedyfarum Tournefortii* & l'*hedyfarum Pallasii*; elle diffère de l'un & de l'autre par les gouffes à demi-orbiculaires, par ses feuilles bien plus petites, & par ses tiges bien moins velues, ainsi que par plusieurs autres caractères qui lui sont particuliers.

Ses tiges sont droites, roides, cylindriques, striées, un peu flexueuses, glabres à leur partie inférieure, pubescentes vers leur sommet, rameuses, garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, composées de folioles au nombre de sept à neuf, opposées, presque sessiles, ovales, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, vertes, lisses à leur face supérieure, pubescentes & blanchâtres en dessous, munies à la base de leur pétiole de stipules sèches, membraneuses, oblongues.

Les fleurs sont disposées en grappes très-longues, situées dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est presque tubulé, à cinq dents aiguës. La corolle a des ailes lancéolées, plus longues que le calice, de moitié plus courtes que l'étendard. Les fruits sont formés par une gouffe à une seule articulation orbiculaire, tronquée à un de ses côtés, velue, réticulée à ses deux faces, armée d'aiguil-

lons ouverts, alongés, inégaux; ces gouffes ne renferment qu'une seule semence.

Cette plante croît naturellement dans la Galatie & le Levant. (Descript. ex Willden.)

120. SAINFOIN à bouquets. *Hedyfarum coronatum*. Linn.

*Hedyfarum foliis pinnatis; leguminibus articulatis, aculeatis, nudis, rectis; caule diffusis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. — Hort. Cliff. 365. — Hort. Upsal. 231. — Royen, Lugd. Bar. 385. — Miller, Dict. n°. 1. — Kniph, Centur. 3. n°. 45. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 176. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 665. n°. 636. II. — Gouan, Hort. Monip. 382. n°. 3. — Getard, Flor. gall. Prov. pag. 503. n°. 1.

*Hedyfarum caulescens, diffusum; foliis pinnatis, subrotundo-ellipticis; lomentis articulatis subrotundis, aculeatis, nudis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1209. n°. 94.

*Hedyfarum clypeatum, flore suavis rubente*. Tournet. Inst. R. Herb. 401. — Schaw, Specim. n°. 307.

*Onobrychis femine clypeato, aspero, major*. C. Bauh. Pin. 350.

*Onobrychis altera*. Dodon. Pempt. 549. Icon.

*Hedyfarum alterum, clypeatum*. Lobel. Icon. 2. tab. 77.

*Astragalus romanus, sive hedyfarum clypeatum; siliqua aspera* J. Bai h. Hist. 2. pag. 335. Icon. t. 2.

*Hedyfarum clypeatum*. Getard, Hist. 1235. Icon. — Park. Theatr. 1087. Icon.

*Hedyfarum*. Rivin. 2. tab. 98.

*Hedyfarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis*. Sauvag. 235.

*Onobrychis articulato femine, aspero, clypeato*. Moris. Oxon. Hist. 2. §. 2. tab. 11. fig. 7.

Vulgairement sainfoin d'Espagne.

C'est une très-belle espèce, remarquable par ses beaux bouquets de fleurs d'un rouge agréable, & par ses folioles grandes, bordées de blanc.

Ses tiges sont droites, un peu flexueuses à leur partie supérieure, glabres, cannelées, striées, médiocrement rameuses, hautes d'un pied & demi, à deux pieds, garnies de feuilles alternes, ailées avec une impaire; composées de sept ou neuf folioles ovales, opposées, à peine velues, médiocelles, pulpeuses, vertes à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, entourées d'une petite borlure blanche composée de poils foyeux, obtuses & légèrement macronées à leur sommet, quelquefois un peu aiguës; la foliole impaire ordi-

nairement plus grande; les pétioles pubescens, munis à leur base de stipules lancéolées, aiguës.

Les pédoncules sont axillaires, cylindriques, striés, beaucoup plus longs que les feuilles, simples, roides, terminés par un bel épi long de deux pouces environ, touffu, composé de fleurs nombreuses, pédiculées ou presque sessiles, garnies à leur base de bractées très-étroites, presque aussi longues que le calice; celui-ci pubescent, divisé à son orifice en cinq découpures sétacées, très-aiguës. La corolle est d'un rouge vif, quelquefois blanche; l'ectandré est plus long que la carène; les deux ailes étroites, au moins aussi longues que la carène; celle-ci courbée, obtuse à son sommet. Les gouffes sont articulées; les articulations variables en nombre, arrondies, comprimées, glabres, chargées d'aiguillons courts, inégaux, recourbés.

Cette plante croît naturellement en Italie, à Malte, sur les côtes de Barbarie, & dans les départemens méridionaux de la France. (V. v.)

On cultive cette belle espèce dans les jardins parmi les fleurs de plate-bande, où elle produit un très-bel effet. Elle est aussi excellente pour la nourriture des bestiaux, & en en forme, dans plusieurs contrées de l'Europe méridionale, des prairies artificielles.

#### 121. SAINFOIN luisant. *Hedysarum nitidum*. Willden.

*Hedysarum caulescens, foliis pinnatis, ellipticis, tomentosis, sericeo-nitidis; lomenti articulis levibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1205. n°. 85.

*Hedysarum orientale, argenteum, flore luteo, siliqua glabrâ*. Tournef. Coroll. 27.

Ses tiges sont presque ligneuses, tomenteuses, d'un blanc de neige, garnies de feuilles pétioolées, alternes, ailées, avec une impaire; composées de onze à treize folioles petites, médiocrement pétioolées, elliptiques, tomenteuses à leurs deux faces, mais plus particulièrement à leur face inférieure; blanchâtres & soyeuses en dessus, longues d'environ un demi-pouce, très-étroites, garnies à la base de leur pétiole, de stipules sèches, brunes, velues, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont disposées en grappes dans l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, portées sur un pédoncule commun plus long que les feuilles, & chacune d'elles pédicellée; ces pédoncules, tant communs que partiels, sont rapprochés, recouverts par un duvet blanc, cotonneux. Le calice est tomenteux, à cinq découpures lancéolées, aiguës. La corolle est jaune; le fruit est une gouffe composée de plusieurs articulations lisses.

Cette plante croît naturellement dans l'Arménie. (V. f. in herb. Juss.)

#### 122. SAINFOIN à fleurs variées. *Hedysarum varium*. Willden.

*Hedysarum caulescens, foliis pinnatis, ellipticis, acutis, subtus tomentosis; lomenti articulis asperis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1206. n°. 86.

*Hedysarum orientale, incanum; flore vario, magnis siliqua asperâ*. Tournef. Coroll. 27.

Ses tiges sont ascendantes, striées, blanchâtres & tomenteuses, garnies de feuilles pétioolées, alternes, ailées, avec une impaire; composées d'environ quinze folioles pédicellées, ovales, elliptiques, obtuses ou un peu aiguës, velues, pubescentes à leur face supérieure, blanchâtres & tomenteuses en dessous. Les pétioles sont munis à leur base de stipules vaginales & membraneuses.

Les fleurs sont disposées en grappes dans l'aisselle des feuilles ou à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules communs presque trois fois plus longs que les feuilles. Les calices sont pubescens, courts, campanulés, à cinq dents aiguës; la corolle est grande, variable; les gouffes divisées en articulations hérissées d'aiguillons.

Cette plante croît dans le Levant, en Arménie. (V. f. in herb. Juss.)

#### 123. SAINFOIN à feuilles de fêne. *Hedysarum fenoides*. Willden.

*Hedysarum frutescens, foliis pinnatis; foliolis alternis, glabris, obovatis, retusis; racemis axillaribus paucifloris, lomenti articulis aculeatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1207. n°. 38.

C'est un arbrisseau dont les rameaux sont glabres, striés, marqués dans leur vieillesse de cicatrices occasionnées par l'impression des feuilles. Ils sont garnis de feuilles alternes, ailées, avec une impaire; composées de quinze à dix-neuf folioles alternes, glabres, en ovale renversé, obtuses, médiocrement pédicellées; les pétioles munis à leur base de stipules lancéolées.

Les pédoncules sont longs, axillaires, terminés par une grappe composée de trois, quatre ou cinq fleurs; chacune d'elles supportée par un pédoncule partiel assez long, muni vers son milieu de deux bractées lancéolées. Le calice est monophylle, divisé à son bord en cinq découpures lancéolées, plus courtes que la corolle. Le fruit est une gouffe longue d'un pouce & demi, composée de trois articulations oblongues, armées d'aiguillons.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Juss.)

#### 124. SAINFOIN à fleurs incarnates. *Hedysarum incarnatum*. Thunb.

*Hedysarum foliis pinnatis, cuspidatis, subius incanum*;

*incana*; caule erecto; floribus racemosis, cernuis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1209. n°. 92.

*Hedysarum incanum*. Thunb. Flor. jap. p. 289.

Cette espèce, qui a beaucoup de rapports avec l'*Hedysarum obscurum*, en diffère principalement par la privation de stipules.

Ses tiges sont herbacées, cylindriques, purpurines, droites, glabres, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de sept à neuf folioles légèrement pédiculées, oblongues, aiguës, entières à leurs bords, mucronées à leur sommet, vertes à leur face supérieure, glabres, blanchâtres en dessous, très-ouvertes, longues d'un pouce; celles du haut un peu plus grandes. Les fleurs sont disposées en grappes axillaires, longues de six à sept pouces; les pédoncules inclinés; la corolle de couleur incarnate.

Cette plante croît au Japon. (*Descript. ex Thunb.*)

125. SAINFOIN de Crimée. *Hedysarum tauricum*. Pallas.

*Hedysarum caulescens, erectum; foliis pinnatis, lanceolato-linearibus, subius pubescentibus; lomentis articulis subrotundis, scabrisculis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1208. n°. 91.

*Hedysarum tauricum*. Pallas, Nov. A&C. Petr. 10. pag. 315.

Ce sainfoin produit de la même racine plusieurs tiges presque simples, ou munies d'un ou deux rameaux au plus, droites, hautes d'environ un demi-pied, blanchâtres, couvertes de poils couchés, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de treize à dix-sept folioles linéaires ou linéaires-lancéolées, vertes & glabres à leur face supérieure, blanchâtres & chargées en dessous de poils couchés, munies, à la base des pétioles, de stipules scarieuses, lancéolées, connées & vaginales à la base des tiges.

Les fruits sont disposés en grappes axillaires à l'extrémité d'un pédoncule droit, simple, solitaire, qui surpasse plusieurs fois la longueur des feuilles. Le fruit est une gousse composée ordinairement de trois articulations recouvertes par la corolle. Ces articulations font arrondies, couvertes de poils blanchâtres, marquées de rides lisses & transverses.

Cette plante croît dans la Crimée. Elle varie à feuilles linéaires & à feuilles lancéolées. x (*Descript. ex Willden.*)

126. SAINFOIN de Suisse. *Hedysarum obscurum*. Linn.

*Hedysarum caulescens, flexuosum; foliis pinnatis, Essaique. Tome VI.*

*ovatis, glabris; racemis axillaribus, bracteis pendulo longioribus, articulis lomentis pendulis glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1208. n°. 90.

*Hedysarum foliis pinnatis; stipulis vaginalibus; caule erecto, flexuoso; floribus racemosis, pendulis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1057. — Grmel. Sibir. vol. 4. pag. 29. tab. 12. — Jacq. Flor. austr. tab. 168.

*Hedysarum alpinum*. Jacq. Hort. Vind. 266.

*Hedysarum caule erecto, ramofo; foliis ovatis; filiquis pendulis, levissimis*. Haller, Helv. edit. 2. n°. 395. tab. 12.

*Hedysarum (controvertum), foliis pinnatis; stipulis vaginalibus; floribus racemosis, & ligaminibus articulatis, glabris, pendulis*. Crantz, Ault. pag. 425. tab. 2. fig. 3.

*Hedysarum alpinum*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 664. n°. 635. l.

*Astragalus caulescens, erectus; stipulis vaginalibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 756.

*Astragalus caule erecto, ramofo; fructu purpureo, nitente, terminato*. Haller, Helv. edit. 1. n°. 567. tab. 14.

*Onobrychis semine clypeato, levi*. C. Bauh. Pin. 350.

*Astragalus alpinus, helveticus*. Scheuz. Iter. 2. pag. 330. — Comm. Litt. Nor. 1736. pag. 101.

*Hedysarum alpinum, filiqui levi; flore purpureo, caruleo*. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 401.

*Onobrychis clypeata, levis*. C. Bauh. Prodr. 149.

Linné regarde cette plante comme très-différente de l'*Hedysarum alpinum* (voyez cette espèce), quoique Crantz & quelques autres botanistes ne soient pas de son avis.

Ses racines sont très-longues, roussâtres, étendues: il s'en élève une & quelquefois plusieurs tiges droites ou un peu flexueuses, torles, glabres, striées, hautes d'un demi-pied ou d'un pied, médiocrement rameuses, garnies de feuilles longues, alternes, ailées, composées de quinze à vingt-une folioles opposées, sessiles, ovales, oblongues, entières, obtuses à leurs deux extrémités, vertes & glabres à leurs deux faces, agréablement veinées, munies, à la base des pétioles, de stipules membraneuses, vaginales, roussâtres, à demi-amplexicaules.

De l'aisselle des feuilles sortent des pédoncules au moins aussi longs que les feuilles, droits, striés, blanchâtres, velus, solitaires, terminés par un épi de fleurs pédonculées, pendantes, garnies à leur base de bractées presque filiformes, membraneuses, beaucoup plus longues que les pédoncules partielles, roussâtres; couvertes de longs poils blancs.

Le calice est très-velu, divisé en cinq découpures étroites, inégales, assez semblables aux bractées, mais plus courtes. La corolle est bleue ou purpurine; les deux ailes sont fort petites, plus longues néanmoins que l'étendard, plus courtes que la carène. Le fruit est une gousse composée d'articulations peu nombreuses, indéterminées, ovales, comprimées, veinées, pubescentes dans leur jeunesse, glabres à l'époque de la maturité, renfermant une seule semence.

Cette plante croît en Suède, dans les Alpes, dans la Savoie & l'Autriche. (V. f.)

127. SAINFOIN de Sibérie. *Hedysarum alpinum*. Linn.

*Hedysarum caulescens, erectum; foliis pinnatis, ovato lanceolatis, glabris; racemis longis, exillibus; bracteis pedunculo brevioribus; articulis lomentis pendulis glabris.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1207. n°. 89.

*Hedysarum foliis pinnatis; leguminibus articulatis, glabris, pendulis; caule erecto.* Hort. Ups. 232. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 26. n°. 35. tab. 10. — Lam. Ill. Gener. tab. 628. fig. 3.

*Hedysarum saxatile, siliqua levi, floribus purpureis, inodorum.* Amon. Ruth. 116. n°. 152. t. 53.

Cette espèce est elle la même que l'*Hedysarum officinarum*? En est-elle réellement distincte? C'est sur quoi les auteurs ne sont point d'accord. Linné affirme que bien certainement ce sont deux espèces très-distinctes, & il donne les différences en ce que celle dont il s'agit ici a des tiges droites, plus élevées; des feuilles ovales, lancéolées; des stipules à la vérité vaginales, mais les supérieures très-courtes; des grappes de fleurs allongées, distinguées particulièrement par des bractées plus courtes que les pédoncules partiels. Les caractères opposés à ceux-ci, dans l'*Hedysarum officinarum*, consistent dans des tiges tortes, flexueuses, moins élevées; des stipules amplexicaules, longues d'un pouce; des feuilles parfaitement elliptiques, mucronées; des bractées beaucoup plus longues que les pédoncules partiels. Quant au fruit, Linné ne l'a point connu.

Il suit de cette description & de ce rapprochement, que ces deux plantes sont en effet bien voisines l'une de l'autre, & que les caractères qui les séparent, sont d'une bien faible importance, à moins que l'inspection du fruit ne puisse en offrir d'autres plus essentiels.

Ce sont ces observations qui ont porté Crantz à n'établir aucune différence entre ces deux plantes; il assure que, parmi toutes celles qu'il a recueillies & observées avec soin, il s'est trouvé beaucoup d'individus qui offroient les caractères de l'*Hedysarum alpinum*, & d'autres ceux de l'*Hedysarum officinarum*, d'où il conclut que Linné a

établi une fautive espèce.

Il peut être fondé en raison, mais il ne l'est certainement pas d'employer, à l'égard d'un naturaliste aussi célèbre que Linné, des expressions dures, de le traiter comme un homme orgueilleux, qui ne veut recevoir d'avis de qui que ce soit, & qui s'arroge le droit de créer la nature. Cette mauvaise humeur fait tort aux savans, qui ont sans doute le droit d'exposer très-librement leurs opinions, mais non pas celui d'injurier ceux qui ne s'y soumettent pas. D'ailleurs, Crantz a bien vu la plante qui croît dans les montagnes alpines, l'*Hedysarum alpinum*, mais il ne connoît de l'*Hedysarum alpinum* qui croît en Sibérie, que ce qu'en a dit Linné, & quand un savant aussi distingué affirme que ces deux plantes sont très-différentes, il faut être un peu moins empressé à lui soutenir durement le contraire, surtout quand on ne connoît pas l'une des deux. C'est par cette raison que nous avons rappelé ici l'*Hedysarum alpinum* avec les observations de Linné, & que nous ne connoissons pas, laissant à chacun la liberté d'en faire une espèce particulière ou de la réunir à l'espèce de nos Alpes, jusqu'à ce que celle de Sibérie nous soit mieux connue.

Cette plante croît sur les hautes montagnes dans la Sibérie. (V.)

Nota. Je viens de voir, dans l'herbier de M. Lamarck, un *Hedysarum* de Sibérie. Il ressemble parfaitement à celui qui vient dans nos Alpes; & si cette plante est la même que celle de Linné, il est hors de doute que ces deux espèces n'en font qu'une, les caractères assignés par Linné, qui les différencient, n'ayant point de consistance.

128. SAINFOIN à tiges basses. *Hedysarum humile*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis; leguminibus articulatis, asperis; corolla alba obseletis, spicis hirsutis, caulis depressis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1058. — Gouan, Illustr. 48. — Idem, Monsp. p. 383.

*Hedysarum caulescens, procumbens; foliis pinnatis, linearis-cuneiformibus; alar brevissimis; lomentis articulis subrotundis, hirsutis, aculeatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1211. n°. 98.

*Hedysarum officinarum, minus; flore purpureo.* Tournef. Inst. R. Herb. pag. 401.

*Onobrychis clypeata, aspera, minor.* C. Bauh. Prodr. 149. — Magn. Botan. Monsp. 191.

*Onobrychis semine clypeato, aspero, minor.* C. Bauh. Pin. 350.

*Polygala Gsneri affinis, caput gallinaceum.* J. Bauh. Hill. 2. pag. 336. Icon. Bona.

Cette plante se rapproche de l'*Hedysarum coro-*

*narium*, dont elle diffère par ses folioles oblongues, très-étroites; par ses tiges plus basses, bien moins rameuses; par l'absence des ailes, dont il n'existe que le rudiment; enfin, par le petit nombre de ses articulations: elle a aussi quelques rapports avec l'*Hedysarum pumilum*; mais cette dernière est un arbrisseau, les épis sont glabres, & la corolle est différente.

Ses racines sont épaisses, étendues, presque ligneuses, divisées en longs filaments noisâtres, blancs en dedans; elles produisent des tiges un peu comprimées, nombreuses, hautes d'environ un demi-pied & plus, grêles, pubescentes ou légèrement velues, peu garnies de feuilles, à peine rameuses, plus souvent simples. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ailées, composées de treize à quinze folioles opposées, petites, presque linéaires, oblongues ou en ovale renversé, entières à leurs bords, glabres à leur face supérieure, légèrement velues en dessous & à leurs bords; les pétioles munies à leur base de bractées sèches, lanugineuses, aiguës, membraneuses & blanchâtres à leurs bords.

Les pédoncules sont axillaires ou terminaux, droits, pubescents, plus longs que les feuilles; ils supportent à leur partie supérieure un cône ovale, velu, touffu avant la floraison, ensuite un peu lâche; composé de fleurs pédiculées, éparées, garnies de bractées fort petites, presque subulées. Leur calice est hérissé de poils blanchâtres; divisé à son orifice en cinq dents qui se terminent par un ou plusieurs filaments setacés. La corolle ressemble beaucoup à celle de l'*Hedysarum coronarium*, mais plus petite, de couleur purpurine; l'étendard est aussi long que la carène; les ailes sont très-courtes, presque nulles, quelquefois on n'en aperçoit que les rudimens; elles sont un peu plus apparentes, environ trois fois plus courtes que l'étendard. Les gouffes n'ont bien souvent que deux articulations, quelquefois même une seule arrondie, un peu ovale, hérissée, & chargée d'aiguillons courts, inégaux.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France & en Espagne. (V. f.)

129. SAINFOIN argenté. *Hedysarum argenteum*. Linn. f.

*Hedysarum foliis pinnatis, subhis sericeis, lucidis; leguminibus articulis, seapo aphyllis. Linn. f. Suppl. pag. 333.*

*Hedysarum caule, foliis pinnatis, subrotundis ovatis, subhis sericeo tomentosis; seapo aphyllis; lomentis articulis rugosis, villosis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1205.*

*Astragalus (grandiflorus), caulis, hirsutus; seapis erectis, fricatis; foliis ovatis, obtusis, villosis. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1071.*

*Hedysarum grandiflorum*. Pall. Itin. 2. pag. 745. tab. 9.

*Hedysarum scopis radicatis. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 30. tab. 13.*

*Hedysarum villosum, argenteum, non ramosum; floribus spicatis, purpureo-violaceis. Amman. Ruth. 115.*

Cette plante n'a point de tiges; toutes les feuilles sortent du collet de la racine; elles sont pétiolées, ailées, longues de sept à huit pouces, composées de neuf à dix-sept folioles presque toutes égales, ovales, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, glabres à leur face supérieure, revêtues en dessous d'un duvet tomenteux, soyeux & luisant.

Du centre des feuilles s'élève un pédoncule ou une hampe épaisse, dépourvue de feuilles, blanchâtre, légèrement tomenteuse, de la longueur des feuilles, quelquefois plus longue; terminée par un épi oblong, un peu touffu. Le calice est velu, composé de cinq folioles oblongues, subulées, de la longueur de la corolle. Celle-ci est grande, de couleur violette ou blanchâtre; les ailes plus courtes que l'étendard. Les gouffes sont composées de deux ou trois articulations ridées, lanugineuses, recouvertes par la corolle desséchée & persistante.

Cette espèce, d'après Willdenow, varie par ses feuilles luisantes & soyeuses à leurs deux faces, ou seulement à leur face inférieure; par les hampes droites ou redressées & ascendantes; par les épis lâches ou touffus; enfin par les corolles violettes ou entièrement blanches. Ce même auteur regarde comme une simple variété de cette plante, l'*Hedysarum humicula* de Pallas.

Cette plante croît naturellement dans la Sibirie. ¶

130. SAINFOIN à feuilles panachées. *Hedysarum pictum*. Jacq.

*Hedysarum foliis pinnatis, in facie disco pictis; racemo spicato, erecto, longissimo; bracteis coloratis, caducis; leguminibus retrofractis, caule suffruticoso. Jacq. Icon. rar. 3. tab. 367.*

*Hedysarum caulescens, foliis pinnatis, lanceolatis; racemo longissimo, spicato; lomentis articulis ellipticis, flex. obovatis. Willden. Sp. c. Plant. vol. 3. pag. 1204. n.º 83.*

Arbrisseau agréable par ses feuilles tachetées ou panachées, distingué par ses fleurs en longs épis, garnies de bractées colorées.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux alternes, étalés, garnis de feuilles pétiolées, ailées, composées de folioles lancéolées, entières, longues d'environ six à sept pouces, d'un vert

Kkk 2



très-foncé à leurs deux faces, marquées d'une tache jaunâtre dans leur milieu, munies à la base de leur pétiole de stipules ovales, linéolées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un très-long épi droit, cylindrique, d'environ un pied & demi de longueur, tout couvert de bractées ovales, acuminées, d'un blanc-jambré, teintes de pourpre vers leur sommet, qui tombent ordinairement à l'époque de la floraison. Les calices sont d'une seule pièce, divisés en cinq dents oblongues, aiguës. La corolle est purpurine; les gouffes pendantes, articulées, très-longues, composées d'articulations chargées de poils courts & roides, particulièrement à leur bord extérieur; flexueuses, elliptiques.

Cette plante croît naturellement dans la Guinée. ( *Descript. ex Willd. & Jacq.* )

131. SAINFOIN à feuilles pâles. *Hedysarum patulum*. Desfont.

*Hedysarum caule procumbente, foliis ellipticis, pubescentibus; floribus racemosis; leguminibus, muricatis, articulatis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 177.

*Hedysarum caulescens, procumbens; foliis pinnatis, ellipticis, cano-pubescentibus; lomentis articulis subrotundis, aculeatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1210. n°. 96.

Cette espèce, très-rapprochée par ses fleurs & ses fruits de l'*Hedysarum coronarium*, en diffère par ses feuilles elliptiques & pubescentes.

Ses tiges sont couchées, herbacées, striées, divisées en rameaux pubescents, particulièrement dans leur jeunesse; garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de treize à dix-sept folioles elliptiques, de couleur cendrée, couvertes d'un duvet très-court & pubescent; longues presque d'un demi-pouce sur quatre à cinq lignes de large, munies, à la base de leur pétiole, de stipules sèches, membraneuses, ovales, aiguës.

Les fleurs sont disposées en grappes serrées, longues d'environ deux pouces. Leur calice est revêtu d'un duvet soyeux, divisé à son orifice en cinq dents aiguës. La corolle est d'un rose-pâle, de la grandeur de celle de l'*Hedysarum coronarium*. L'étendard est relevé de la même longueur que la carène; les ailes sont linéaires, plus courtes que la carène. Le fruit est une gouffe articulée, comprimée, assez semblable à celle de l'*Hedysarum coronarium*. Les articulations sont arrondies, à une seule sémence, couvertes d'aiguillons nombreux & fort courts.

Cette plante croît sur le mont Atlas, proche Mascara en Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. ( *Descript. ex Desfont.* )

132. SAINFOIN ligneux. *Hedysarum fruticosum*. Linn. f.

*Hedysarum foliis pinnatis; foliolis alternis, oblongis, mollioribus; stipulis subulatis, racemis axillaribus, leguminibus articulatis reticulatis*. Linn. f. Suppl. pag. 333.

*Hedysarum frutescens, foliis pinnatis; foliolis ellipticis, oblongis, subulatis pubescentibus, alternis; lomentis articulis reticulatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1206. n°. 87.

*Hedysarum fruticosum*. Pall. itin. vol. 3. pag. 755. tab. 3. fig. 1.

*Astragalus caulis ramosis, erectis; foliolis & floribus diffusis*. Gmel. Sibir. vol. 4. p. 45. tab. 22.

Cette espèce se distingue assez bien par ses folioles linéaires, pétiolées, toutes alternes, & par ses fleurs distantes, solitaires sur un épi terminal.

Ses tiges sont un peu ligneuses, divisées en rameaux étalés, alternes, presque cylindriques, un peu pubescents, médiocrement striés, roides, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, avec une impaire; composées de neuf à treize folioles écartées les unes des autres, alternes, pétiolées, molles, linéaires, presque elliptiques, étroites, obtuses à leur sommet, longues d'un pouce, entières à leurs bords, d'un vert blanchâtre, pubescentes en dessous; les pétioles un peu comprimés, striés; les stipules courtes, toisées.

Les fleurs sont peu nombreuses, écartées les unes des autres, pétiolées, disposées en épi à l'extrémité d'un pédoncule commun, droit, filiforme, simple, axillaire, pubescent: on remarque quelquefois une fleur solitaire à la base du pédoncule; les bractées ont l'apparence d'une petite écaille d'un brun-noirâtre, ciliée, très-courte. Le calice est verdâtre, tubulé, un peu hispide, divisé à son orifice en cinq dents presque égales, courtes, larges, aiguës. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'une belle couleur purpurine ou violette. L'étendard est ample, ovale, oblong, rayé, plus grand que la carène: celle-ci est obtuse; les ailes très-petites, à peine plus longues que le calice, étroites, obtuses; les gouffes sont étroites, articulées, les articulations ovales, fortement ridées, réticulées, grosses, renflées, au nombre de trois ou quatre.

Cette plante croît dans la Sibérie, le long du fleuve Selenga, dans le sable: on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ( *V. v.* )

Ce sainfoin est un excellent fourrage pour la nourriture des chevaux: comme il se plait beaucoup dans le sable, il peut être très-utile pour en fixer la mobilité & le rendre fertile.

133. SAINFOIN à fleurs en tête. *Hedysarum capitatum*. Desfont.

*Hedysarum caule decumbente, foliis pinnatis, foliolis obovatis, floribus racemoso-capitatis, pedunculis folio longioribus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 177. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1210. n°. 97.

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges quelquefois assez nombreuses, disposées en gazon & en partie couchées, striées, pubescentes ou revêtues d'un duvet très-court, garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, composées de folioles nombreuses, en ovale renversé ou elliptique, longues de trois à quatre lignes sur deux de large, entières à leurs bords, obtuses & souvent échancrées & tronquées à leur sommet, munies, à la base des pétioles, de stipules sèches, ovales, aiguës.

Les pédoncules sont axillaires, striés, une fois plus longs que les feuilles, supportant des fleurs presque sessiles, disposées en grappes capitées, garnies de bractées fort petites, ovales, aiguës. Leur calice est divisé en cinq découpures subulées; la corolle de couleur de rose, de la grandeur de celle de *Hedysarum coronarium*. L'étendard est un peu plus long que la carène, & les ailes un peu plus courtes que cette dernière. Le fruit n'est point encore connu.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines sur les côtes de Barbarie, proche Calsa, où elle croît dans les lieux sablonneux. (*Desfont.*)

134. SAINFOIN chaînu. *Hedysarum carnosum*. Desfont.

*Hedysarum caule procumbente, foliis pinnatis, foliolis carnosis, glaberrimis, truncatis; floribus racemosis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 177. tab. 100.

*Hedysarum caulescens, procumbens; foliis pinnatis, foliolis obovatis, mucronatis, carnosis, glaberrimis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1209. n°. 93.

Cette espèce, voisine de *Hedysarum flexuosum*, s'en distingue par ses folioles plus allongées, souvent tronquées à leur sommet; par ses fleurs plus grandes; par la carène & les ailes auriculées au dessus de leurs onglets.

Ses racines sont très-longues & rameuses, ses ramifications filiformes. Elles produisent des tiges épaisses, glabres, en partie couchées, cylindriques, striées, longues d'environ deux pieds ou deux pieds & demi, rameuses, garnies de feuilles pétioles, alternes, ailées, avec une impaire; composées de neuf à treize folioles presque opposées, molles, charnues, presque sessiles, glabres à leurs deux faces, ovales, oblongues ou ellipti-

ques, ébrusées ou tronquées à leur sommet, médiocrement rétrécies vers leur base, entières à leurs bords, longues d'environ un pouce, sur trois ou quatre lignes de large; supportées par des pétioles glabres, épais, munis de stipules presque lancéolées, acuminées.

Les pédoncules sont droits, simples, axillaires, à peu près aussi longs & même plus longs que les fleurs, garnis à leur base de bractées courtes, membraneuses, ovales, aiguës, ainsi qu'à l'insertion de chaque fleur: celles-ci forment à la partie supérieure des pédoncules, des épis très-serres, longs d'environ un pouce & demi. Les calices sont courts, glabres, tubulés, divisés à leur orifice en cinq dents aiguës. La corolle est d'une couleur rose-tendre, de la grandeur de celle de *Hedysarum coronarium*; l'étendard est ovale, médiocrement onguiculé, à peine plus long que la carène: celle-ci est bisevée vers sa base, munie d'un onglet étroit, subulé; les ailes étroites, obtuses, plus courtes que l'étendard, munies au dessus de leur onglet d'une dent latérale, courte, obtuse; ainsi que la carène; les filaments le courbent en angle droit vers leur sommet. Le fruit n'est pas encore connu.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les terrains sablonneux de la Barbarie, sur le bord des rivières. 2.

135. SAINFOIN flexueux. *Hedysarum flexuosum*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis, aculeatis, flexuosis; caule diffuso*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1038. — Mill. Dict. n°. 3. — Kniph. Centur. 4. n°. 30. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 176.

*Hedysarum caulescens, diffusum; foliis pinnatis, oblongis; lomentis flexuosis, articulatis aculeatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1210. n°. 95.

*Hedysarum siliquâ undulatâ*. Riv. Tetr. 213. — Idem, 2. tab. 99.

*Onobrychis major, annua; siliiculis articulatis, asperis, chryseis, undulatis junctis; flore purpureo rubente*. Motif. Oxon. Hist. 2. pag. 130. — Rai, Hist. 929.

*Hedysarum annuum, siliquâ asperâ, undulatâ, incurtâ*. Tournef. Inst. R. Herb. 401.

Cette espèce approche beaucoup de *Hedysarum coronarium*, surtout par la forme de ses feuilles; elle en est cependant très-distincte par ses gouffes, dont les articulations sont flexueuses; par ses fleurs plus petites, & ses feuilles pulpeuses.

Ses tiges sont diffuses, presque couchées, fort étendues, longues au moins de deux pieds, glabres, épaisses, cylindriques, verdâtres ou purpu-

raies, à rameaux étalés, garnis de feuilles alternes, pinnées, ailées, composées ordinairement de sept ou cinq folioles inégales, pédiculées, ovales, presque rondes, obtus, tendres, épaisses, un peu charnues, sans nervures fenêtrées, vertes, glabres à leurs deux faces, quelquefois marquées en dessous de poils rares & courtes, blanchâtres & ciliées à leur contour; la foliole terminale plus grande, plus arrondie; les latérales souvent rétrécies vers leur base; les pétioles épais, un peu hispides; les stipules étroites, aiguës, ciliées.

Les fleurs sont latérales ou terminales, disposées en une pinnule oblongue, serrée, obtus; le pédoncule commun pubescent, strié; chaque fleur presque sessile, munie à sa base d'une bractée ovale, velue, verte ou purpurine vers son sommet. Le calice est tubulé, court, divisé à son orifice en cinq dents étroites, lanceolées, ciliées, très-aiguës. La corolle est petite, purpurine ou rougeâtre, lavée de rose vers sa base. L'étendard est arrondi, plus court que la carène, rayé de pourpre; la carène d'une couleur plus foncée; les ailes étroites, linéaires, blanches, quelquefois un peu jaunâtres à leur extrémité, aussi longues que la carène; les anthères petites, d'un jaune doré; la dixième portée sur un filament solitaire. Les gousses sont articulées, flexueuses, composées d'articulations rudes, presque en forme de bouclier, chargées, d'aiguillons inégaux, renfermant une semence réniforme.

Cette plante croît dans l'Asie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

136. SAINFOIN à petites fleurs. *Hedysarum micranthos*.

*Hedysarum foliis ternatis pinnatifidis; foliis minimis, subrotundis; floribus axillaribus, subfiliariis; articulis glabris, semiorbiculatis; caule procumbente.* (N.)

Cette espèce est remarquable par ses folioles petites, arrondies, terminées en ailes; par ses fleurs souvent solitaires; par les articulations glabres & à demi-orbiculaires de ses gousses.

Ses tiges sont faibles, rameuses, couchées, longues d'environ un pied au plus, un peu rougeâtres, pubescentes, légèrement flexueuses, garnies de feuilles alternes, pinnées; les inférieures terrées; les supérieures ailées, composées de cinq à neuf folioles, fort petites, oblongues ou un peu ovales, presque sessiles, vertes à leurs deux faces, entières, obtus, quelquefois mucronées à leur sommet, à peine pubescentes, supportées par des pétioles légèrement pubescents, longs de deux ou trois lignes, munis à leur base de stipules droites, scarieuses, ovales, aiguës, fort petites, striées.

Les fleurs naissent dans l'aisselle des feuilles, sou-

tenues par des pédoncules à peu près aussi longs que les feuilles, solitaires, un peu hispides, simples ou divisées en deux ou trois autres pédoncules partiels, uniflores, garnis de bractées très-courtes, membraneuses, concaves. Le calice est verdâtre, presque glabre, petit, divisé en cinq découpures. La corolle est à peine deux fois plus longue que le calice; elle n'a pas de bractée ou un peu purpurine. Les gousses sont modérément réflexées, articulées, comprimées, très-glabres, les articulations arrondies, à demi-orbiculaires; la terminale mucronée.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. Juss.)

137. SAINFOIN épineux. *Hedysarum spinosissimum*. Linn.

*Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis, aculeatis, tomentosis; caule diffusis.* Linn. Syst. veget. pag. 676. n°. 57. — Hort. Upland. 231. — Miller, Dict. n°. 2.

*Hedysarum caulescens, diffusum; foliis pinnatis, obovatis, emarginatis; floribus racemosis-capitatis; lomenis articulis orbiculatis, villosis, aculeatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1212. n°. 100.

*Hedysarum hispanicum, spinosum, annuum, angustifolium; floribus parvis, ex albo-purpureiscentibus.* Boerh. Lugd. Bat. 3. pag. 51.

*Oxyrhiza minor, foliis cordatis, silicis magnis, asperis, compressis.* Pluken. Phytogr. 50. fig. 2.

Cette espèce est remarquable par ses petites folioles souvent échanquées à leur sommet; par les articulations larges, orbiculaires de ses gousses, toutes hérissées d'aiguillons, d'où lui vient sans doute son nom spécifique, ses rameaux n'ayant aucune épine.

Ses racines sont dures, grêles, un peu blanchâtres; elles poussent des tiges courtes, hautes de six à huit pouces, diffuses, presque couchées, rameuses, velues ou pubescentes, striées, anguleuses, garnies de feuilles alternes, pinnées, ailées, avec une impaire; composées de quinze à dix-neuf folioles fort petites, opposées ou alternes, à peine pédiculées, en ovale renversé, obtus & quelquefois échanquées à leur sommet, rétrécies, aiguës à leur base, entières, glabres à leurs deux faces, munies, à la base des pétioles, de très-petites stipules courtes, aiguës.

Les fleurs sont presque sessiles, disposées dans l'aisselle des feuilles en un petit épi presque capité à l'extrémité d'un pédoncule commun, simple, filiforme, pubescent, plus long que les feuilles; garnis, à l'insertion de chaque fleur, de petites bractées courtes, un peu ovales, acuminées, membraneuses, roussâtres, scarieuses à leurs bords.

Les calices sont courts, velus, blanchâtres, dont les dents égales se terminent par un fil setace. La corolle est d'une grandeur médiocre, milangée de pourpre & de blanc. Les gouffes sont longues, planes, comprimées, composées de deux ou trois articulations assez larges, presque orbiculaires, velues, réticulées, armées de pointes courtes, nombreuses, presque toutes égales.

Cette plante croît en Espagne. (V. f.)

138. SAINFOIN hérissé. *Hedysarum maricatum*. Jacq.

*Hedysarum foliis pinnatis, ad oras muricatis; pedunculis axillaribus, unifloris, terminalibus racemosis; leguminibus muricatis; caule suffruticoso, decumbente.* Jacq. Icon. rar. 3. tab. 568. — Idem, Collect. 5. pag. 147.

*Hedysarum caulescens, decumbens; foliis pinnatis; foliolis obovatis, emarginatis, margine hispida; racemo terminali; sementis multi-articulatis, repandis, muricatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1212. n.º 99.

Ses tiges sont presque ligneuses, en partie couchées, velues, hispides, divisées en rameaux alternes, pendans, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, tantôt avec une impaire, tantôt sans impaire; composées de folioles presque sessiles, petites, en ovale renversé, échancrées & même légèrement denticulées à leur sommet, munies à leurs bords de poils courts, roides, fort petits.

Les pédoncules sont, ou situés dans l'aisselle des feuilles, simples & uniflores, ou placés à l'extrémité des rameaux, & alors ils supportent des fleurs en grappes. Leur calice est court, à cinq dents aiguës; la corolle fort petite, de couleur jaune; les gouffes sont comprimées, composées de plusieurs articulations annuées & chargées de pointes inégales.

Cette plante croît chez les Patagons & sur les bords de la rivière Champion. x

139. SAINFOIN poncé. *Hedysarum punctatum*.

*Hedysarum caulis procumbentibus; foliis pinnatis; foliolis spicatis; leguminibus polyspermis, punctato-hirs.* Commers. Herb. infl.

Cette plante, velue sur toutes ses parties, est encore remarquable par les points noirs & nombreux dont ses gouffes sont chargées.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, cylindriques, presque ligneux, un peu rougeâtres, couverts de poils glanduleux & visqueux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de folioles petites, nombreuses, courtes, linéaires, obtuses, mucronées, longues de deux ou trois lignes, larges d'une ligne, pubescentes, cli-

liées à leurs bords, munies, à la base des pétioles, de stipules lanceolées, aiguës, tres-velues.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en épis serrés, longs d'environ deux pouces à l'extrémité d'un pédoncule commun plus long que les feuilles, velu, cylindrique, garni de bractées étroites, hispides, aiguës. Chaque fleur est soutenue par un pédoncule partiel, court, velu; les calices sont divisés en cinq longues découpures subulées, hispides, glanduleuses. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur jaune; l'étendard teint en pourpre extérieurement, les gouffes sont oblongues, comprimées; les articulations presque orbiculaires, hispides, ciliées à leur contour, chargées à leurs deux faces de petits points noirs.

Cette plante a été recueillie par Commerçon à Monte-Video. (V. f. in herb. Jussieu.)

140. SAINFOIN à feuilles de pimprenelle. *Hedysarum pimpinellifolium*.

*Hedysarum foliis pinnatis, foliolis subovatis, crenatis; racemis erectis, terminalibus; leguminibus articulis rotundatis, punctatis, hispida; caule prostrato.* (N.)

Belle espèce, distinguée par ses folioles approchantes de celles de la pimprenelle, crénelées à leurs bords, & par les articulations de ses gouffes ponctuées, hispides.

Ses tiges sont cylindriques, striées, pubescentes, couchées, rameuses, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ailées, avec une impaire; composées de neuf à onze folioles opposées, pédiculées, petites, ovales, un peu obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, glabres à leur face supérieure, un peu pileuses en dessous, crénelées à leur contour, particulièrement vers leur sommet; supportées par des pétioles comprimés, striés, couverts de poils courts, glanduleux, munis à leur base de deux petites stipules ovales, velues.

Les fleurs forment des grappes simples ou des épis lâches sur lesquels ces fleurs sont rangées alternativement deux par deux, ou quelquefois solitaires, supportées par des pédoncules simples, velus, filiformes, ouverts, garnis à leur base de petites bractées très-courtes, pubescentes. Les calices sont campanulés, presque glabres, verts, divisés à leur orifice en cinq dents courtes, presque obtuses. La corolle, au moins une fois plus grande que le calice, est purpurine; l'étendard d'une couleur plus foncée, plus grande que la carène, trivervée de lignes droites, ainsi que les autres pétales; elle m'a paru jaunâtre; les sillons au moins aussi longs que la carène. Les gouffes, longues au moins d'un pouce, sont comprimées, composées de huit à neuf articulations atrociées,

particulièrement à leur côté extérieur; ponceués, hispides à leurs deux faces, bordés d'une membrane courte, à demi-circulaire, ciliée.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombeij. (V. f. in herb. Jussieu.)

141. SAINFOIN à fleurs de deux couleurs. *Hedysarum bicolorum*.

*Hedysarum foliis pinnatis; foliolis numerosis, lanceolatis, pubescentibus; stipulis longitudine & forma foliorum; floribus bicoloribus; leguminum articulis antice subrotundis, subglabris; caulibus prostratis.* (N.)

*Hedysarum caulibus prostratis; foliis multijugis; floribus luteis, extus rubentibus; leguminibus multiauriculatis.* Commers. Herb. mss.

Elle se distingue par ses fleurs d'une belle couleur rouge à leur extérieur, jaunes en dedans, & par ses petites folioles nombreuses, de même forme & longueur que les stipules.

Les tiges sont couchées, herbacées, cylindriques, striées, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles ailées, alternes, composées de folioles petites, lancéolées, presque elliptiques, au nombre de dix-neuf à vingt-trois; obtuses à leurs deux extrémités, légèrement mucronées à leur sommet, longues de quatre à cinq lignes, larges d'une ligne & demie, pubescentes, entières, munies, à la base des pétioles, de stipules qui leur ressemblent, mais plus aiguës.

Les fleurs sont situées en grappes terminales, alongées, supportées par des pédoncules alternes, filiformes, longs d'un pouce & demi, pubescens, garnis de bractées ovales, acuminées. Les calices sont divisés à leur orifice en cinq découpures inégales, lancéolées, aiguës, très-acuminées. La corolle est une fois plus longue que le calice. Les gouffes sont étroites, alongées, comprimées, un peu courbées, composées de six à huit articulations arrondies extérieurement, presque glabres, hérissées de poils très-courts, étant vus à la loupe.

Cette plante a été recueillie à Monte-Video par Commerçon. (V. f. in herb. Jussieu.)

142. SAINFOIN en faux. *Hedysarum sulcatum*.

*Hedysarum foliis pinnatis; foliolis villosis, ovato-gonatis, minimis; pedunculis axillaribus subunifloris, leguminibus sulcatis, caule villoso.* (N.)

Ses tiges sont cylindriques, velues, très-rameuses, divisées en rameaux alternes, nombreux, un peu rougeâtres, presque filiformes, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec une impaire; composées de cinq à sept folioles petites, ovales, un peu tétécées en coin à leur base, atten-

dies à leur sommet, entières, pubescentes ou velues à leurs deux faces, vertes, longues de trois à quatre lignes presque égales. Les pétioles sont courts, munis à leur base de stipules lancéolées, acuminées, pubescentes, à nervures droites.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules capillaires, beaucoup plus longs que les feuilles, chargés de poils très fins, longs, ouverts, souvent uniflores ou bien articulés, & un peu flexueux; soutenant à chaque articulation une fleur pédicelée, garnie de bractées fort petites, aiguës. Les calices sont très-courts, velus, à cinq dents presque obtuses. La corolle est petite; les gouffes articulées, comprimées, courbées en faux antérieurement, composées de six ou huit articulations arrondies, surtout à leur côté extérieur; pubescentes, un peu rudes, à une seule semence.

Cette plante a été découverte par Commerçon dans le Brésil, le long de la rivière de Rio-Janeiro. (V. f. in herb. Jussieu.)

143. SAINFOIN du Brésil. *Hedysarum brasiliense*.

*Hedysarum glutinosum, foliis pinnatis, foliolis ovato-ellipticis, spicis axillaribus, articulis subinflatis, viscoso-hispidis.* (N.)

*Hedysarum glutinosum, spicis axillaribus.* Commerçon. Herb. mss.

On distingue cette espèce aux poils glanduleux & visqueux répandus presque sur toutes les parties, & à ses gouffes, dont les articulations sont petites, renflées.

Ses tiges se divisent en rameaux alternes, nombreux, diffus, cylindriques, chargés de poils inégaux, glutineux, garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, avec impaire; composées de folioles au nombre de onze à treize, vertes à leurs deux faces, ovales, presque elliptiques, longues d'environ quatre lignes sur deux de large, légèrement pubescentes, un peu ciliées à leur contour. Les pétioles sont courts, hispides, munis à leur base de stipules brunes, courtes, aiguës.

Les fleurs sortent de l'aisselle des feuilles, disposées en épis lâches, plus longs que les feuilles; écartés des tiges en angle droit, soutenant des pédoncules partiels, longs de deux ou trois lignes, très-visqueux; munis à leur base de bractées courtes, larges, amplexicaules, arrondies, presque réniformes, marquées de stries droites, & ciliées à leur contour. Les fleurs sont petites; les calices très-velus, courts, à cinq petites dents. Les gouffes sont très-étroites, linéaires, articulées, très-glutineuses, hérissées de poils courts, nombreux, glanduleux; composées d'articulations petites, un

peu ovales ou arrondies, convexes dans leur milieu, à leurs deux faces.

Cette plante a été recueillie dans le Brésil, à Rio-Janeiro, par Commerçon. ( *V. f. in herb. Jusieu.* )

144. SAINFOIN à fruits pendans. *Hedyfarum pendulum.*

*Hedyfarum foliis pinnatis; foliolis ovatis, pubescentibus minimis; calicibus viridibus, subglabris; racemis apice confertis; leguminibus pendulis, subhispidis.* ( N. )

*p. Eadem, calicibus incano-pubescentibus.* ( N. )

Cette espèce est remarquable par ses gouffes pendantes à l'extrémité de leur pédoncule, & par ses fleurs réunies ordinairement en paquets à l'extrémité des grappes.

Ses tiges sont grêles, cylindriques, un peu pubescentes, médiocrement rameuses, hautes de six à huit pouces & plus, garnies de feuilles alternes, ailées, composées de folioles petites, opposées, au nombre de quinze à dix-neuf, ovales, obtuses à leurs deux extrémités, souvent mucronées, vertes à leurs deux faces, légèrement pubescentes, entières, longues de trois lignes; les pétioles courts, munis de stipules ovales, acuminées, velues à leurs bords.

Les fleurs forment des grappes axillaires & terminales, longues de trois à quatre pouces; les fleurs inférieures, dissertes, solitaires; celles de la partie supérieure très-rapprochées, presque agglomérées, soutenues par des pédoncules longs de trois à quatre lignes & plus, pubescens; garnis de bractées courtes, petites, aiguës, un peu blanchâtres & velues. Les calices sont tubulés, verdâtres, un peu hispides; divisés, à leur orifice, en cinq dents inégales, lancéolées, acuminées. La corolle est grande, de couleur jaune; l'étendard presque un peu plus long que la carène, d'un jaune brun foncé en dehors. Le fruit est une gouffe pendante à l'extrémité du pédoncule partiel, écarté en angle droit du pédoncule commun; les articulations, au nombre de sept à huit, sont comprimées, arrondies en dehors, légèrement hispides.

La variété *p* ne m'a paru différer de cette espèce que par ses calices pubescens & blanchâtres, par ses tiges également pubescentes: les feuilles, dans leur jeunesse, présentent le même caractère.

Ces deux plantes ont été recueillies par Commerçon, dans le Paraguay, à Monte-Video. ( *V. f. in herb. Jusieu.* )

145. SAINFOIN de Virginie. *Hedyfarum virginicum.* Linn.

*Hedyfarum foliis pinnatis, caule fruticoso; legum. Botanica. Tome VI.*

*minibus articulatis, glabris; pedunculis erectis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1058. — Gronov. Virgin. 174. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1212. n°. 101.

*p. Hedyfarum (alpinum americanum), erectum; foliis pinnatis; stipulis subvaginantibus; leguminibus patulis, glabris, ex utraque sutura articulatis; articulis brevi-ovalibus.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 74.

Il paraît que l'on est fort incertain de la plante à laquelle Linné a donné le nom de *Hedyfarum virginicum*, qui restera long-temps douteuse tant que nous ne connoîtrons pas l'individu d'après lequel il a établi cette espèce, d'autant qu'il n'en a donné ni cité aucune figure. D'après cet auteur, les tiges de cette plante sont ligneuses, les feuilles ailées, ses gouffes droites, pédonculées, glabres, articulées.

La plante que Michaux y rapporte avec doute, & à laquelle il a donné un autre nom, a des tiges droites; les feuilles composées de folioles ovales, oblongues, pileuses; garnies de stipules presque vaginales; des gouffes glabres, articulées; les articulations courtes, ovales, arrondies à leurs deux côtés.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique, au Canada, le long des caractères des montagnes. Celle de Linné se trouve dans la Virginie. ✕

SAJOIRE. *Plukenetia.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monoïques, polypétales, de la famille des euphorbes, qui a des rapports avec les *dalechampia*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à tiges grimpantes, à feuilles alternes, entières, & dont les fleurs sont disposées en un épi lâche.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Des fleurs monoïques; point de calice; une corolle à quatre pétales; huit étamines dans les fleurs mâles, réunies par leurs filaments; un style très-long dans les fleurs femelles; un stigmate petit, à quatre lobes; une capsule comprimée, à quatre lobes, à quatre loges & avant de semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont monoïques, disposées sur un même épi, dont les femelles occupent la partie inférieure.

Chaque fleur mâle offre:

1°. Point de calice, à moins qu'on ne regarde comme telle la corolle.

2°. Une corolle composée de quatre pétales ovales, très-ouverts.

3°. Huit *étamines*, dont les filamens très-courts sont réunis en un seul corps; les anthères simples & droites.

4°. Quatre *glandes* situées à la base des étamines, surmontées de poils plus longs que les étamines, & qui paroissent être l'ovaire avorté.

La fleur *semelle*, ordinairement solitaire à la base de chaque *épi*, offre :

1°. Le *calice* & la *corolle* comme dans les fleurs mâles.

2°. Un *ovaire* supérieur, quadrangulaire, surmonté d'un style filiforme, extrêmement long, incliné, terminé par un stigmate pelté, à quatre lobes planes, obtus; chaque lobe ponctué dans le milieu à sa face supérieure.

Le fruit est une capsule comprimée, à quatre angles, chaque angle relevé en carène; à quatre loges, chaque loge divisée en deux valves, & contenant une semence arrondie, comprimée, un peu acuminée à une de ses faces.

*Observations.* Ce genre a été consacré, par Plumier, à la mémoire de Plukenet, célèbre botaniste anglais, qui a beaucoup contribué aux progrès de la science par les figures d'un grand nombre de plantes qu'il a fait graver à ses dépens, au nombre d'environ six mille, dans son *Almageste* & la *Phytographie botanique*.

#### E S P È C E.

SAJOIRE grimpante. *Plukenetia volubilis*. Linn.

*Plukenetia foliis cordatis, serratis, laxè petiolatis; floribus subracemosis.* (N.)

*Plukenetia scandens, hedera foliis, serratis; fructu tetragono.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 181. — Plumier, Gen. pag. 47. tab. 13. — Burm. Amer. tab. 226. — Lam. Ill. Plant. tab. 788.

*Sajo volubilis, fructibus corniculatis.* Rumph. Ambon. vol. 1. pag. 194. tab. 79. fig. 2.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont souples, grimpantes, fermeuses, glabres, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, entières, larges, dilataées, amples, échanquées en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour, aiguës, un peu acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, supportées par de longs pétioles très-flexibles.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, disposées presque en grappe sur un épi lâche, pédonculé : ces fleurs sont monoïques. Il n'existe qu'une seule fleur femelle, placée solitairement à la base de chaque épi, pédonculée, facile à distinguer par le style très-long qui s'élève du milieu de la corolle, & que termine un stigmate pelté,

à quatre lobes pondus dans leur milieu à leur face supérieure : les fleurs mâles existent seuls dans toute la longueur des épis; elles sont pédonculées : leur corolle est fort petite; les filamens des étamines réunis en un seul corps à peine aussi long que la corolle. Cette portion de l'épi se flétrit ordinairement après la fécondation, & il ne reste alors qu'un seul fruit sur chaque épi, supporté par la portion inférieure du pédoncule : ce fruit est une capsule comprimée, convexe, à quatre lobes, assez semblable aux fruits des *evonymus*.

Cette plante a le port des *bryones* ou des *tamans*. Elle croit dans les Indes occidentales, où elle a été observée par Plumier. ♀

SALACE de Chine. *Salacia chinensis*. Linn.

*Salacia foliis ovalibus, integerrimis, acutis; pedunculis axillaribus, unijloris.* (N.)

*Salacia chinensis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 44. — Maniss. 293. — Juss. Gen. Plant. pag. 424.

Arbrisseau qui forme un genre particulier, dont la famille, ainsi que la fructification, n'est pas encore très-bien connue, qui paroît avoir des rapports avec les *filago*, & même avec les *antidysma*, dont le caractère essentiel consiste dans :

Un calice fort petit, à cinq divisions; une corolle à cinq pétales; cinq anthères sessiles, insérées sur un ovaire supérieur; un style très-court.

Cet arbrisseau se divise en rameaux anguleux, lisses, très-étalés, plus épais à leur base, garnis de feuilles pétiolées, alternes, écartées les unes des autres, ovales, très-entières, un peu aiguës, lisses à leurs deux faces, assez semblables à celles du prunier.

Les fleurs sont produites par des bourgeons axillaires : il en sort plusieurs pédoncules simples, uniflores, plus courts que les pétioles.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, très-petit, persistant, divisé en cinq découpures ovales, aiguës, ouvertes.

2°. Une *corolle* composée de cinq pétales un peu arrondis, sans onglets.

3°. Trois *étamines* privées de filamens, dont les anthères sont situées sur le sommet de l'ovaire, divisées en deux lobes écartés à leur base.

4°. Un *ovaire* arrondi, plus grand que le calice, surmonté d'un style très-court entre les anthères, terminé par un stigmate simple.

Le fruit n'est pas encore connu. Linné soupçonne qu'il pourroit bien être à trois coques. M. Jussieu pense que ce genre n'est peut-être pas hermaphrodite, mais diïque; que les étamines ne

font point situées sur le pistil, mais sur un corps glanduleux qui occupe le centre des fleurs mâles.

Cet arbrisseau se rencontre dans la Chine. 5

**SALAI.** *Arbor carbonarius primus*, Rumph. Amb. vol. 4. pag. 126, tab. 62.

C'est, d'après Rumphius, un arbre d'une hauteur médiocre, dont les rameaux sont grêles, souples, d'une couleur verte, mêlée de blanc, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, lancéolées, entières, un peu ondulées à leurs bords, acuminées à leur sommet, longues de trois à quatre pouces, marquées de trois nervures longitudinales, & d'autres transverses, un peu sail-lantes, qui rendent les feuilles rudes au toucher à leur face inférieure. Elles sont en dessus d'un vert foncé, lanugineuses, pâles & cendrées en dessous.

Les fleurs ne sont point connues. Les fruits consistent en de petites baies d'un brun-noirâtre, de la grosseur de celles du genévrier commun, couronnées par le calice persistant à quatre folioles ovales, aiguës : ces fruits sont disposés en petites grappes très-courtes, épar-ses sur les tiges.

Rumphius cite une autre variété de cet arbre sous le nom de *salai ruber*, semblable au précédent, mais dont l'écorce est mêlée de vert-cendré & de rouge ; les feuilles d'un vert plus clair en dessus, également verdâtres, mais plus foncées en dessous. Les fruits sont de la grosseur d'un grain de poivre.

Ces deux arbres donnent leurs fruits au commencement de l'hiver, & les conservent très-long-tems. Leur bois est dur, blanc, de couleur blanche tant que l'arbre est en vie, & qui acquiert, par la dessiccation, une couleur rous-sâtre. Il se fend avec peine, brûle très-bien, même lorsqu'il est vert. On en fait d'excellent charbon.

Cet arbre croît à l'île d'Amboine, sur les collines exposées au vent. 5

**SALICAIRE.** *Lythrum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des salicaires, qui a des rapports avec les *caprea* & les *crena* d'Aublet, & qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont alternes ou opposées, & même quelquefois verticillées ; les fleurs disposées par verticilles en épis terminaux, ou quelquefois axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une calice persistant, à plusieurs dents alternativement plus petites ; une corolle à six pétales insérés à l'orifice du calice ; une capsule supérieure, à deux loges, polysperme, recouverte par le calice ; environ douze étamines ; un pistil.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, cylindrique, strié, persistant, divisé ordinairement en douze dents à son orifice ; les dents alternes plus petites.

2°. Une corolle composée de six pétales oblongs, obtus, ouverts, insérés par leurs onglets entre les dents du calice.

3°. Douze étamines, dont les filaments sont filiformes, de la longueur du calice, disposés sur deux rangs : ceux du rang supérieur plus courts, terminés par des anthères simples, relevées.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style subulé, incliné, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate orbiculaire, redressé.

Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, à deux loges, enveloppée par le calice, renfermant des semences nombreuses, fort petites.

**Observations.** Le genre des salicaires n'est qu'imparfaitement déterminé, la plupart des caractères qui le constituent étant très-variables. Il ne faut compter ni sur le nombre des étamines ni sur celui des pétales : à peine connoissons-nous deux ou trois espèces où il soit constamment le même. Les dents calicinales sont soumises à la même variabilité. Il ne reste que le fruit ou la capsule, qui doit être divisée en deux loges, à plusieurs semences, recouverte par le calice persistant ; mis de nouvelles plantes ont été introduites dans ce genre, auquel elles convenoient parfaitement, excepté que leur capsule n'avoit qu'une seule loge, & que, dans quelques-unes, les semences étoient bien moins nombreuses, & attachées sur un placenta central. La crainte de rendre les genres trop nombreux, surtout lorsqu'ils ont pour base des caractères d'une médiocre considération, a fait placer ces nouvelles plantes parmi les salicaires. D'autres botanistes ont cru, non sans raison, que, pour conserver aux salicaires le caractère le plus essentiel de leur genre, ils devoient en exclure ces espèces, & en former des genres nouveaux. Je n'aurois pas été très-éloigné de cette opinion si l'ordre alphabétique ne m'eût empêché de parler de plusieurs plantes qui ne pouvoient plus être placées ailleurs que dans cet article.

## ES P È C E S.

1. SALICAIRE commune, *Lythrum salicaria*, Linn.

*Lythrum foliis oppositis, cordato-lanceolatis ; floribus spicatis, dodecandris*, Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 640. — Millet, Dict. n°. 1. — Scap. Carr. n°. 565. — Pollich, Pal. n°. 450. — Blackw, tab. 500. — Weder, Flor. dan. tab. 671. — Kniph, Cen.



tur. 5. n°. 55. — Hoff. Germ. 162. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 203 ; II. 510. — Lam. Illustr. Gener. tab. 408. fig. 1. — Poiret, Voy. en Barbar. vol. 2. pag. 171.

*Lythrum foliis oppositis & verticillatis, floribus spicatis.* Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 459.

*Lythrum foliis oppositis.* Hort. Cliff. 178. — Flor. suec. 393. 422. — Roy. Lugd. Bat. 458. — Guett. Stamp. 2. pag. 122.

*Lythrum foliis verticillatis.* Flor. lapp. pag. 197.

*Salicaria spicata.* Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 103. n°. 731.

*Salicaria foliis lanceolatis, subhirsutis ; floribus spicatis.* Haller, Helv. n°. 854.

*Lyfimachia spicata, purpurea.* C. Bauh. Pin. 246.

*Lyfimachia purpurea, communis, major.* Clus. Hist. 2. pag. 51.

*Lyfimachia purpurea, quibusdam spicata.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 902. Icon.

*Pseudolyfimachium purpureum, alterum.* Dodon. Pempt. 86. Icon.

*Lyfimachia altera.* Camer. Epit. pag. 687. Icon.

*Salicaria vulgaris, purpurea ; foliis oblongis.* Tournef. Inst. R. Herb. 253. — Garid. Aix. 419.

Idem, foliis latioribus, superioribus, subrotundis, subhirsutis. (N.)

*Blattaria rubra, spicata, major ; folio subrotundo.* Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 490. 5. 5. tab. 10. fig. 11.

*Salicaria purpurea, foliis subrotundis.* Tournef. Inst. R. Herb. 253.

*Lyfimachia spicata, lanuginosa, folio subrotundo, flore purpureo.* Tournef. H. R. Paris.

*Lyfimachia spicata, purpurea ; folio subrotundo, ocyms facie.* Munt. Hist. 744.

7. *Lyfimachia trifolia, spicata, purpurea.* Boccon. Mus. 167.

8. *Lyfimachia quadrifolia, purpurea ; mollioribus & longioribus foliis.* Boccon. Mus. 167.

C'est une de ces belles plantes qui ornent agréablement le bord de nos étangs & de nos rivières, remarquables par ses longs & beaux épis de fleurs purpurines.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds ; elles sont fermes, droites, quadrangulaires, quelquefois rougeâtres, légèrement velues, très-rameuses vers leur partie supérieure, garnies de feuilles sessiles, opposées, quelquefois ternées & même quaternées, étroites, allongées, lancéolées, presque glabres ou légèrement pubescentes,

échancrées en cœur à leur base, entières à leurs bords, aiguës & même très-pointues à leur sommet ; elles varient beaucoup dans leurs proportions, tantôt très-étroites & plus longues, tantôt plus larges, presque obtuses, vertes en dessus, plus pâles, presque blanchâtres en dessous.

Les fleurs sont disposées presque par verticilles opposés, dans l'aisselle des feuilles supérieures, sessiles ou légèrement pédonculées, ordinairement en assez grand nombre, quelquefois plus rares ; elles forment par leur ensemble un long épi terminal, simple ou rameux dans quelques variétés. Le calice est tubulé, cylindrique, fortement strié, velu, particulièrement sur ses angles ; divisé à son orifice en douze petites dents, les alternes plus courtes. La corolle est d'une belle couleur purpurine, composée de six pétales oblongs, obtus, qui renferment une douzaine d'étamines plus courtes que la corolle ; la capsule est oblongue, acuminée, divisée en deux loges, enveloppée par le calice.

La variété  $\beta$  est une des plus remarquables de cette espèce. Ses feuilles inférieures sont très-larges, presque ovales, médiocrement rétrécies à leur sommet, un peu velues ; les supérieures & celles qui accompagnent les fleurs sont presque rondes, bien plus courtes, souvent longuement acuminées, ciliées à leurs bords, plus longues que les fleurs qu'elles cachent en partie ; je l'ai recueillie dans les environs de Paris, sur les bords de l'étang de Marcomy.

Cette plante croît en Europe ; elle est fort commune sur le bord des ruisseaux, des étangs & des fossés aquatiques.  $\gamma$  (V. v.)

Cette plante passe pour vulnérable, astringente ; elle est recommandée contre les diarrhées invétérées, les pertes qui ne sont accompagnées ni de chaleur ni d'irritation. Quoiqu'elle passe pour inutile dans les prairies, elle ne l'est pas dans les pâturages, où tous les bestiaux la mangent, excepté les cochons.

## 2. SALICAIRE effilée. *Lythrum virgatum.* Linn.

*Lythrum foliis oppositis, lanceolatis ; panicula virgata ; floribus dodocandris, ternis.* Linn. Spec. Plant. 642. — Gmel. Sibit. vol. 4. pag. 175. — Hoffm. Germ. 162. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 865.

*Lythrum (austriacum), foliis oppositis, linearilanceolatis, subsessilibus, nitidis.* Jacq. Hort. Vind. 243. — Flor. austr. tab. 7.

*Salicaria glabra, ramossima, longissimis & angustissimis foliis.* Amm. Ruth. 89.

*Salicaria glabra, longioribus & angustioribus foliis.* Amm. Ruth. 88.

*Lyfimachia rubra, non siliquosa.* C. Bauh. Pin. 246.

*Lythymachia rubra, secunda seu minor.* Clus. Hist. pag. 51.

*Lythymachia secunda seu minor, rubro flore.* Clus. Stirp. pann. pag. 478. tab. 477.

Ses tiges sont droites, lisses, quadrangulaires, hautes d'environ deux pieds, divisées en rameaux grêles, longs, effilés, alternes, formant par leur ensemble une ample panicule; garnies de feuilles opposées, étroites, lancéolées, aiguës, glabres à leurs deux faces, rétrécies à leur base presque en pétiole, luisantes, entières à leurs bords; quelquefois les supérieures sont alternes.

Les fleurs naissent vers l'extrémité des rameaux; elles sont au nombre de deux ou trois dans chaque aisselle, chacune d'elles pédonculée, & formant presque une petite grappe. La corolle est rougeâtre ou purpurine, & renferme une douzaine d'étamines.

Cette plante croît dans les lieux humides & les prés, en Autriche, dans la Sibérie, la Tartarie, &c. On la trouve aussi dans la Caroline, où elle a été recueillie par M. Bosc, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

1. SALICAIRE acuminée. *Lythrum acuminatum.* Willd.

*Lythrum foliis oppositis, lanceolato-acuminatis, racemo elongato, pedunculis solitariis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 666. n°. 3.

*Salicaria orientalis, foliis folio, ocutissimo & glabro.* Tournef. Coroll. 18.

Quoique le port de cette plante soit assez semblable à celui du *lythrum virgatum*, elle en est cependant très-distincte par ses feuilles beaucoup plus longues & plus acuminées, rudes à leurs bords, ainsi que par ses fleurs solitaires, plus étroites.

Ses tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds, à peine munies d'un ou de deux rameaux, garnis de feuilles opposées, sessiles, lancéolées, étroites, rétrécies à leur base, longuement acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, très-entières & rudes à leurs bords, légèrement veinées, longues de deux pouces & plus; celles qui accompagnent les fleurs sont plus courtes, linéaires, lancéolées; les dernières, subulées, plus courtes que les calices.

Les fleurs sont solitaires & point en grappes dans l'aisselle des feuilles; elles forment par leur ensemble un épi grêle & droit à l'extrémité des rameaux, long d'environ un demi-pied. Leur calice est cylindrique, presque en forme de clove, strié, muni de douze dents à son orifice. La corolle est composée de six pétales lancéolés, aigus; les étamines aussi longues que la corolle.

Cette plante croît dans l'Orient & la Géorgie. (V. f.) (Description, ex Willd.)

4. SALICAIRE à fleurs verticillées. *Lythrum verticillatum.* Linn.

*Lythrum foliis oppositis, subtomentosis, subpetiolatis; floribus verticillatis, lanceolatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 641. — Miller, Dict. n°. 6. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 866. n°. 5.

*Lythrum foliis oppositis, floribus verticillatis.* Gronov. Virgin. 52.

*Lythrum (verticillatum), foliis lanceolatis, oppositis, petiolatis; floribus axillaribus, subverticillatis aggregatis; fructibus globosis.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 281.

*Decodon aquaticus.* Walter. Flor. carol. pag. 137. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 677.

Ses tiges sont droites, roides, hautes d'environ un pied & demi, tomenteuses, pulvérulentes, tétragones, rameuses, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétioles, oblongues, lancéolées, rétrécies à leur base, légèrement tomenteuses. Les fleurs sont axillaires, disposées autour des rameaux en verticilles latéraux; elles font d'une couleur pourpre pâle, supportées par des pédoncules courts & droits, pubescents, presque campanulés, presque globuleux; le calice est divisé en dix à douze dents à son orifice; la corolle est purpurine, grande, composée de cinq à six pétales ongiculés; les étamines, au nombre de dix, ont des filaments sétacés, plus longs que la corolle, terminés par de petites anthères globuleuses; l'ovaire surmonté d'un style, auquel succède une capsule globuleuse, divisée en trois valves, selon Waltherius; s'ouvrant en trois valves, contenant un grand nombre de semences fort petites.

Cette plante croît dans les endroits marécageux de l'Amérique septentrionale, depuis le Canada jusque dans la Floride. (V. f. in herb. Lomarch.)

5. SALICAIRE à feuilles linéaires. *Lythrum lineare.* Linn.

*Lythrum foliis oppositis, linearibus; floribus oppositis, hexandris.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 641. — Miller, Dict. n°. 8. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 868. n°. 11.

*Lythrum foliis linearibus, floribus hexandris, solitariis.* Gronov. Virgin. 62.

*Lythrum (lineare), glabrum; coule virgatum paniculato, tetragono; foliis suboppositis, linearibus; floribus solitariis axillaribus, hexandris.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 280.

Ses tiges sont glabres, élancées, filiformes, hautes d'un pied & demi environ, anguleuses, très-rameuses, à quatre faces, dont les rameaux sont étalés en panicules, effilés, garnis de feuilles opposées, quelquefois presque alternes, linéaires,

entières à leurs bords, glabres à leur deux faces, assez semblables à celles du *Lythrum hyssopifolia*.

Les fleurs forment à l'extrémité des rameaux, par leur disposition, un long épi, ordinairement accompagné à sa base de plusieurs autres latéraux plus courts, composés de fleurs nombreuses, distantes, opposées, axillaires. Leur calice est glabre, fort étroit, lirié, divisé à son orifice en dix dents inégales; les alternes plus courtes. La corolle est fort petite; purpurine ou blanchâtre, composée de six pétales. Les étamines sont au nombre de six; l'ovaire est ovale; il lui succède une capsule à une seule loge, environnée par le calice persistant.

On rencontre cette plante dans l'Amérique septentrionale, la Caroline & la Virginie, aux lieux marécageux, vers les bords de la mer. (V. f. in herb. Lamarck.)

6. SALICAIRE à feuilles d'hysope. *Lythrum hyssopifolia*.

*Salicaria foliis alternis, linearibus; floribus hexandris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 642. — Hort. Upsal. 118. — Miller, Dict. n° 3. — Scop. Carn. n° 366. — Jacq. Flor. austr. 2. tab. 133. — Schell. Barb. n° 372. — Pollich. Pal. n° 451. — Hoffm. Germ. 172. — Roth. Germ. vol. 1. p. 263. II. 520. — Desfont. Flor. aint. vol. 1. pag. 372. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 171. — Gouan, Monsp. 228. — Gérard, Flor. gall. Prov. 459. n° 2.

*Lythrum foliis alternis*. Hort. Cliffort. 178. — Sauvag. Monsp. 57. — Royen, Lugd. Bat. 458. — Gorr. Gelr. 271.

*Salicaria hyssopifolia*. Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 103. n° 73. III.

*Salicaria foliis linearibus, floribus in alis sessilibus*. Haller, Helv. n° 855.

*Salicaria hyssopi folio latiore*. Tournef. Inst. R. Herb. 253. — Haller, Jen. 147. tab. 6. fig. 3.

*Hyssopifolia*. C. Bauh. Pin. 218.

*Hyssopifolia aquatica*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 792. Icon.

*Hyssopifolia major, latioribus foliis*. C. Bauh. Pin. 218. — Prodr. 108. Icon.

*Gratiola minor, sive hyssopifolia*. Magnol. Botan. Monsp. 123.

*Polygonum aquaticum, majus*. Barrel. Icon. 773. n° 1.

*S. Salicaria hyssopifolia, angustiore*. Tournef. Inst. R. Herb. 253. — Guariel, Art. 419.

*Hyssopifolia minor, angustioribus foliis*. C. Bauh. Pin. 218.

7. *Lythraea linifolia, purpureo-carulea*. C. Bauh. Pin. 246.

8. *Salicaria hyssopifolia, floribus albis*. Tournef. Inst. R. Herb. 253.

*Hyssopifolia floribus albis*. C. Bauh. Pin. 218.

Des rameaux nombreux, élanés; des feuilles alternes, linéaires; des fleurs à six étamines, solitaires dans l'aisselle des feuilles, distinguant suffisamment cette espèce de ses congénères.

Ses tiges sont hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, glabres, presque cylindriques, légèrement striées, vertes ou de couleur grisée, cendrées, divisées en rameaux alternes, épars, nombreux, grêles, simples, élanés, ouverts, garnis de feuilles alternes, quelquefois presque opposées, très-glabres, linéaires, obtusif ou un peu aiguës, entières à leurs bords, longues au moins d'un pouce sur environ trois lignes de large, minces, légèrement veinées; les supérieures plus étroites, aiguës.

Les fleurs sont toutes axillaires, solitaires, très-rarement feillées, supportées par un pédoncule simple, capillaire, presque aussi long que le calice, droit, un peu renflé vers son sommet. Le calice est petit, tubulé, cylindrique, lirié, divisé à son orifice en cinq à six dents écartées, aiguës, presque égales. La corolle est purpurine, quelquefois un peu blanchâtre à sa base, composée de six pétales ovales, obtus, légèrement onguiculés; ils renferment six étamines plus courtes que la corolle. La capsule est petite, obtuse, à deux loges.

La plante est remarquable par sa petitesse; elle n'a guère que six à huit pouces de haut. Ses tiges sont presque couchées, peu rameuses, presque filiformes, garnies de feuilles linéaires, courtes, très-étroites, obtuses; les fleurs sessiles; les calices étroits, allongés. Elle peut être considérée comme intermédiaire entre cette espèce & le *Lythrum thymifolia*. On rencontre aussi des variétés à fleurs blanches.

Cette plante croît en Europe, dans la Suisse, la France, l'Italie, l'Angleterre, aux lieux humides, inondés. Je l'ai également observée sur les côtes de Barbarie. J'ai recueilli la variété à aux environs de Soissons. (V. v.)

7. SALICAIRE à feuilles de thym. *Lythrum thymifolia*. Linn.

*Lythrum foliis alternis, linearibus; floribus tetrapetalis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 642. — Lerche, in Nov. Act. A. N. C. V. Append. 186. — Hoffm. Germ. 162. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 270. n° 16. — Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 459. n° 3. — Gouan, Monsp. 228.

*Lythrum foliis linearibus*. Sauvag. Monsp. 49.

*Pentaglossum* (linifolium), *foliis lanceolato-linearibus*. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 11. n°. 30.

*Salicaria thymifolia*. Lamarck, Flor. franç. vol. 3. pag. 104. n°. 731. IV.

*Salicaria minima*, *tenuifolia*. Tournef. Inst. R. Herb. 254.

*Hyssopifolia minor*, seu *potius thymifolia maritima*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 792. Icon.

*Salicaria hyssopifolia*, *angustifolia*. Buxb. Hal. 290.

*Polygonum aquaticum*, *minus*. Barr. l. Icon. rar. tab. 773. fig. 2.

*Gratiola minima*, vel *hyssopifolia minor*. Magn. Botan. Monsp. 123.

Un calice à quatre dents, quatre pétales, deux étamines, sont presque les seuls caractères qui distinguent cette espèce du *Lythrum hyssopifolia*; & comme le nombre de ces parties est très-variable dans ce genre, il devient douteux si cette plante n'est pas une simple variété de la précédente, surtout de notre variété 2.

Elle est fort petite : ses tiges sont droites, à quatre faces, hautes de six à huit pouces; quelquefois elles s'élèvent jusqu'à près d'un pied, divisées en rameaux alternes, ordinairement peu nombreux, garnis de feuilles alternes, fort petites, linéaires, assez semblables à celles du thym; très-rapprochées, sessiles, glabres à leurs deux faces, obtuses, ou à peine aiguës à leur sommet; les inférieures souvent opposées.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, situées le long des rameaux, fort petites, sessiles. Leur calice est tubulé, un peu élargi vers son orifice, à quatre ou cinq ftries, divisé à son sommet en quatre ou quelquefois cinq dents ouvertes, filiformes. La corolle est composée de quatre, quelquefois cinq pétales insérés à l'orifice du calice, droits, oblongs, obtus, ouverts, plus courts que le calice; ils renferment deux étamines, aussi longues que le calice, dont les filaments sont filiformes, les anthères globuleuses, pendantes, à deux loges. L'ovaire est oblong, cylindrique; le style court, filiforme, incliné; le stigmate capité; il leur succède une capsule cylindrique, à une loge, recouverte par le calice, contenant un grand nombre de semences globuleuses, fort petites.

Cette plante croît en Espagne, en Italie, dans les départements méridionaux de la France, en Egypte, aux lieux humides & ombragés. ☉ (V. f.)

8. SALICAIRE pétiolée. *Lythrum petiolatum*. Linn.

*Lythrum foliis oppositis, linearibus, petiolatis*;

*floribus dodecandris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 641. — Miller, Dict. n°. 7.

*Lythrum foliis petiolatis*. Gronov. Virgin. 52.

Ses tiges sont droites, roides, hautes d'environ deux pieds, velues, rameuses, garnies de feuilles opposées, linéaires, médiocrement pétioles. Les fleurs sont axillaires, solitaires, petites; leur calice est tubulé; leur corolle peu apparente, d'un pourpre pâle; les étamines au nombre de douze.

Cette plante croît dans la Virginie.

9. SALICAIRE à grappes. *Lythrum racemosum*. Linn. f.

*Lythrum diffusum, foliis oppositis, petiolatis, ovatis; racemis terminalibus, floribus oppositis*. Linn. f. Suppl. 250. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 867. n°. 7.

Cette plante a des tiges presque ligneuses, divisées en rameaux diffus, étalés, pileux & légèrement visqueux à leur partie supérieure, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, très-entières, veinées.

Les fleurs sont disposées en longues grappes, situées ou dans la bifurcation des rameaux, ou à leur extrémité; elles sont par paires, opposées, écartées les unes des autres, droites, pédicelées, garnies à leur base de bractées ovales. Les calices, ainsi que les pédicules, sont visqueux, garnis de poils courts.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. ☿ ( Descript. ex Linn. f. )

10. SALICAIRE à feuilles ciliées. *Lythrum ciliatum*. Swartz.

*Lythrum foliis oppositis, petiolatis, ovatis, glabris, margine ciliatis; racemis terminalibus; floribus subsecundis, decandris*. Swartz, Prodr. 76. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 868. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 867. n°. 8.

Il existe de très-grands rapports entre cette espèce & le *Lythrum racemosum*; elle s'en distingue par ses feuilles ciliées, par ses fleurs en grappes terminales, médiocrement pédoncules, dépouillées de bractées, presque unilatérales.

Ses tiges sont ligneuses, droites, hautes d'un à trois pieds, hispides, divisées en rameaux très-nombreux, légèrement velus, comprimés vers leur sommet, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, entières, nerveuses, veinées, glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont disposées en grappes assez grandes, terminales, plus longues que les feuilles; les pédoncules presque unilatéraux. Le calice est

tubulé, oblique à sa base, ventru, divisé en cinq dents à son orifice, marqué de dix stries noirâtres & ciliées. La corolle est composée de cinq pétales ovales, obtus, ondulés à leur contour, attachés entre les dents du calice par des onglets très-courts. Les étamines sont au nombre de dix, plus courtes que la corolle, munies d'anthères jaunâtres, fort petites. L'ovaire est oblong, le style de la longueur de la corolle, le stigmate simple & obtus. Le fruit est une capsule qui contient des semences comprimées, un peu arrondies, attachées sur les côtés d'un réceptacle central & commun.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les contrées septentrionales de la Jamaïque. *Th* (Description. ex Swartz.)

11. SALICAIRE à feuilles en cœur. *Lythrum cordifolium*. Swartz.

*Lythrum foliis oppositis, subsessilibus, cordatis, acutis, scabris; racemis terminalibus axillaribusque, floribus decandris.* Swartz, Prodr. pag. 76. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 866. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 869. n° 14.

C'est une plante médiocrement ligneuse, dont les tiges sont hautes d'un pied, inclinées, munies de rameaux pendans, puis redressés, filiformes, cylindriques, rudes au toucher, un peu hispides, garnis de feuilles opposées, légèrement pétiolées, petites, ovales, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, ridées, veinées, rudes à leurs deux faces, plus pâles en dessous, supportées par des pétioles courts, velus, cylindriques.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales & axillaires, simples, droites, filiformes, un peu flexueuses, garnies d'un grand nombre de fleurs pédonculées, feuillées. La corolle est grande, purpurine ou rougeâtre, composée de cinq pétales ovales, obtus, onguiculés, caducs. Le calice est tubulé, dilaté à sa base, strié, pubescent, muni de dix dents à son orifice. Les étamines sont au nombre de dix, courtes, presque égales; les anthères d'un blanc-pâle; l'ovaire oblong, surmonté d'un style subulé & terminé par un stigmate simple; il leur succède une capsule mince, à une seule loge, s'ouvrant latéralement, contenant des semences comprimées, arrondies, attachées sur un réceptacle central.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue, dans les grandes forêts. (Description. ex Swartz.)

12. SALICAIRE à trois fleurs. *Lythrum triflorum*. Linn. f.

*Lythrum glaberrimum, foliis oppositis, subsessilibus; lanceolatis, integris; pedunculis axillaribus, op-*

*positis; capitulo triflora.* Linn. f. Suppl. pag. 249. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 866. n° 4.

C'est une plante parfaitement glabre, très-reconnoissable par son port & par la disposition de ses fleurs en une petite tête.

Ses tiges sont longues, flexibles, herbacées, glabres, presque simples. Ses feuilles sont opposées, presque sessiles, ovales, lancéolées, très-entières à leurs bords, un peu rétrécies à leur sommet, longues au moins d'un pouce, distantes.

Les fleurs sont axillaires à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules filiformes, opposés, simples, plus longs que les feuilles, munis à leur sommet de deux bractées lancéolées, canaliculées, très-ouvertes, au moins aussi longues que les fleurs; ces bractées renferment trois fleurs fort petites, égales, pédiculées, de couleur bleuâtre. Leur calice est campanulé, presque globuleux, glabre, veiné, à cinq dents. La corolle est composée de cinq pétales ovales, un peu arrondis, onguiculés, insérés entre les dents du calice; les étamines plus courtes que la corolle, inégales; les anthères petites, globuleuses; le style filiforme, un peu plus long que les étamines.

Cette plante croît dans l'Amérique. *Th* (V. f. in herb. Lam.)

13. SALICAIRE à deux pétales. *Lythrum dipetalum*. Linn. f.

*Lythrum hispido-viscosum, foliis ternis seu oppositis, sessilibus, ovatis; floribus axillaribus, nutantibus, dipetalis.* Linn. f. Suppl. pag. 250. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 869. n° 10.

Cette espèce est très-distincte, agréable par la beauté de ses fleurs, qui n'ont que deux pétales.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont hispides, visqueuses, de couleur brune, divisées en rameaux alternes, garnis de feuilles sessiles, opposées ou ternées, ovales-oblongues, très-entières à leurs bords, hispides, très-rudes à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure. Les feuilles inférieures des tiges sont verticillées, quaternées ou ternées; celles des rameaux simplement opposées.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, pédiculées & pendantes. Leur calice est fort étroit, linéaire, hispide & visqueux. La corolle est composée de deux grands pétales droits, en ovale renversé, de couleur bleue ou violette, attachés à la partie supérieure du calice.

On trouve cette plante dans l'Amérique. *Th* (Description. ex Linn. f.)

14. SALICAIRE

14. SALICAIRE pemphis. *Lythrum pemphis*. Linn. f.

*Lythrum fruticosum*, hirsutum, foliis oppositis, oblongis, integris; floribus axillaribus, pedunculatis, solitariis; capsulâ circumscissâ, uniloculari. Linn. f. Suppl. pag. 439. — Forst. Prodrum. n°. 205. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 867. n°. 9. — Lam. Illustr. Gener. tab. 458. n°. 2.

*Pemphis acida*. Forst. Gener. n°. 34. tab. 34. — Juss. Gener. Plant. 331.

*Mangium porcellanicum*. Rumph. Amb. vol. 3. pag. 126. tab. 84.

Cette espèce peut former un genre particulier, ainsi qu'il a été établi par Forster & Jussieu, sous le nom de *pemphis*, s'écartant des salicaires par quelques-unes des parties de la fructification, particulièrement par ses capsules uniloculaires qui s'ouvrent transversalement à leur base, & renferment des semences attachées à un réceptacle central & denté. Nous l'avons conservée ici comme espèce, n'ayant point été mentionnée dans la lettre P, & M. Lamarck n'en ayant pas donné la gravure dans ses *Illustrations des genres*. Elle a d'ailleurs le port des salicaires, & leur ressemble dans ses autres parties.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont blanchâtres, velues, droites, divisées en rameaux garnis de feuilles opposées, ovales, entières, très-rapprochées vers l'extrémité des rameaux, pubescentes à leurs deux faces, rétrécies en pétiole à leur base. Les fleurs sont solitaires dans les aisselles des feuilles, supportées par des pédoncules simples, uniflores, munis de deux bractées à leur base.

Leur calice est d'une seule pièce, turbiné ou presque campanulé, filonné, divisé à son orifice en douze dents inégales; les alternes plus petites. La corolle est blanche, composée de six pétales insérés à l'orifice du calice, renfermant douze étamines; les alternes un peu plus petites; les filaments terminés par des anthères inclinées. L'ovaire est un peu ovale; il se convertit en une capsule presque sphérique, à une seule loge, qui se divise transversalement en deux valves vers leur base. Elles contiennent plusieurs semences anguleuses, attachées à un réceptacle central, denté, un peu saillant.

Cette plante croît sur les bords de la mer, dans l'île de Ceilan & dans celle de Madagascar. 7

15. SALICAIRE à fleurs alternes. *Lythrum parsonsia*. Linn.

*Lythrum foliis oppositis, ovalibus; floribus sessilibus, alternis, hexandris; caule diffuso*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 641. — Swartz, Observ. 193. Botanique. Tome VI.

*Parsonsia herbacea, foliis ovatis, oppositis; floribus singularibus, foliis ad alterum latum interpositis*. Brown, Jam. pag. 199. tab. 21. fig. 1.

*Parsonsia*. Juss. Gener. Plant. pag. 332.

Cette espèce offre bien moins de caractères pour former un genre que le *lythrum pemphis*. Cependant quelques botanistes ont cru devoir l'établir sous le nom de *parsonsia*, d'après sa capsule à une seule loge membraneuse & le réceptacle central des semences, caractères qui d'ailleurs la feront aisément distinguer des autres espèces de ce genre.

Ses tiges sont herbacées, couchées, rampantes, & se divisent en rameaux simples, alternes, filiformes, étalés, pubescens, un peu flexueux, garnis de feuilles presque sessiles, petites, opposées, ovales, nues & glabres à leurs deux faces, très-entières à leurs bords, marquées de trois nervures.

Les fleurs sont situées dans les aisselles des feuilles supérieures, presque sessiles, alternes, solitaires. Leur calice est tubulé, presque ventru, strié, muni, à son orifice, de six ou dix dents presque inégales. La corolle est d'un rouge-pâle, composée de six pétales oblongs, onguculés, obtus, qui renferment six étamines courtes, deux plus longues; les anthères blanchâtres. L'ovaire est oblong; le style subulé, un peu incliné; le stigmate arrondi, blanchâtre, légèrement bifide, pubescent. Le fruit est une capsule petite, membraneuse, couverte par le calice, à une seule loge, contenant de deux à six semences attachées sur un réceptacle central.

Cette plante croît en Amérique dans les lieux arides de la Jamaïque & de la Nouvelle-Espagne. 7

16. SALICAIRE mélanie. *Lythrum melanium*. Linn.

*Lythrum foliis oppositis, ovatis; floribus alternis, subdecandris; caule prostrato*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 641. — Swartz, Observ. 193.

*Melanium herbaceum, rectissimum; foliis ovatis, oppositis; floribus singularibus ad alas alternas*. Brown, Jam. 217.

Ses tiges sont couchées à leur base, relevées à leur partie supérieure, ascendantes, presque cylindriques, rudes, hautes d'environ un pied, médiocrement rameuses, garnies de feuilles pétioles, opposées, assez grandes, ovales, aiguës, très-entières, nerveuses, rudes au toucher, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont alternes, solitaires, axillaires, pédonculées. Leur calice est tubulé, élargi obliquement à sa base, strié, muni à son orifice de six

M m m

ou dix dents. La corolle est grande, d'une belle couleur purpurine, composée de six pétales onguiculés, ovales, ébrus, caducs, insérés à l'orifice du calice. Les étamines, au nombre de huit à dix, ont des filamens courts, inégaux, terminés par des anthères échancrées en cœur. L'ovaire est oblong, le style simple, subulé; le stigmate aigu. Il leur succède une capsule grêle, oblongue, contenant quatre à six semences ovales, coniprimées, attachées à un réceptacle central.

Cette espèce se rapproche, par sa fructification, du *lythrum parsonia*. Elle croit dans les contrées méridionales de l'Amérique, à la Jamaïque. ♀ (*Descript. ex Swartz.*)

**SALICAIRE (les).** *Salicaria*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle renferme un certain nombre de gentes qui ont tous des rapports avec les salicaires qui y sont comprises.

Les plantes qui composent cette famille sont herbacées ou ligneuses, munies de feuilles simples, opposées ou alternes, &c. de fleurs axillaires ou terminales.

Leur calice est tubulé ou en forme de pot; la corolle composée de plusieurs pétales en nombre défini, insérés à l'orifice du calice, alternes avec les divisions: ils manquent quelquefois. Les étamines définies, mais indéfinies dans les *lagerstromia* & les *munchausia*. Leur nombre est égal à celui des pétales ou double; leurs filamens sont attachés vers le milieu du tube du calice, terminés par des anthères fort petites.

L'ovaire est simple, supérieur, surmonté d'un seul style, terminé par un stigmate souvent en forme de tête. La capsule, environnée par le calice persistant, se divise en une ou plusieurs loges, renfermant plusieurs semences attachées à un réceptacle central. L'embryon n'a point de périsperme.

Les genres principaux contenus dans cette famille sont les suivans:

\* Corolle poly pétale.

Les sinkie.....	<i>Lagerstromia</i> .
Les munchausiers.....	<i>Munchausia</i> .
Les ginorés.....	<i>Ginora</i> .
Les grilles.....	<i>Griffia</i> .
Les hennés.....	<i>Laufonia</i> .
Les créneés.....	<i>Crenea</i> .
Les salicaires.....	<i>Lythrum</i> .
Les saliquiers.....	<i>Cuphea</i> .

\*\* Fleurs manquant très-souvent de pétales.

Les isnardes.....	<i>Isnardia</i> .
Les ammannes.....	<i>Ammannia</i> .
Les glauces.....	<i>Glaux</i> .
Les pépides.....	<i>Peplis</i> .

**SALICORNE.** *Salicornia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des arroches, qui a des rapports avec les *erato-carpus*, &c. qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les rameaux sont opposés, articulés, dépourvus de feuilles, chaque articulation terminée par deux dents; les fleurs fort petites, sessiles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Un calice entier, ventru; point de corolle; une ou deux étamines; un stigmate bifide; une semence recouverte par le calice.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre:

1°. Un calice entier, ventru, persistant, presque tétragone, constitué par le bord en échelle des articulations.

2°. Point de corolle.

3°. Une étamine (quelquefois deux), dont les filamens sont subulés, plus longs que le calice, terminés par des anthères droites, oblongues, tétragones, à deux loges.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, oblong, surmonté d'un style simple, très-court, terminé par un stigmate bifide.

Le fruit consiste en une semence recouverte par le calice ventru, &c. comme enfoncée dans la subs-tance des rameaux.

E S P È C E S.

1. **SALICORNE ligneuse.** *Salicornia fruticosa*. Linn.

*Salicornia caule erecto, fruticosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 5. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 34. tab. 4 fig. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 2. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 79.

*Salicornia caule erecto, fruticosa; articulis ramulorum apicibus; squamis floralibus truncatis, membranaceis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 24. n°. 3.

*Salicornia articulis subaequalibus, obusis, internodiis approximatis*. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 328. n°. 2.

*Salicornia (europea, petennis)*. Gouan, Monsp. pag. 2.

*Salicornia geniculata, sempervirens*. Tourn. Inst. Coroll. 51. tab. 485. — Schaw, Specim. n°. 511. — Garid. Aix. 261.

*Kali*. Camer. Epit. 246. Icon. Bona.

*Kali geniculatum*, majus. C. Bauh. Pin. 289.

*Salicornia sempervirens*. Sauv. Monsp. 7.

*Salicornia caule erecto, fruticosa*? Gmel. Sibit. vol. 3, pag. 8. tab. 1. fig. 1.

β. *Salicornia* (ambigua), fruticulosa, procumbens seu affurgens, inordinatè ramosa. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1, pag. 2.

Cette espèce a de grands rapports avec le *salicornia* herbacée; elle en diffère par ses tiges ligneuses, beaucoup plus élevées, rameuses, cylindriques, droites, perlées, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds; elles sont articulées, divisées en rameaux nombreux, opposés, très-rapprochés, composés d'un grand nombre d'articulations égales dans toute leur longueur, courtes, très-terreuses, échançonnées à leur sommet, charnues, dépourvues de feuilles, terminées supérieurement par une sorte de gaine urcéolée, munie de deux dents obtuses.

Les fleurs sont disposées dans les articulations supérieures; elles sont stériles, axillaires, fort petites, affectent ordinairement au nombre de trois; elles forment, par leur ensemble, un épi droit, cylindrique, terminal. Leur calice est formé par le bord des articulations, tronqué; il renferme une ou deux étamines plus longues que le calice. Le style est allongé, saillant hors du calice. Les semences sont ovoïdes, fort petites.

La variété β paraît différer trop peu de la précédente, pour qu'elle en puisse être séparée. Ses tiges ne sont que médiocrement ligneuses, couchées ou relevées; les rameaux diffus, épars.

Cette plante croît dans le sable sur les côtes maritimes de l'Europe méridionale, ainsi que sur celles de la Barbarie. La variété α a été observée par Michaux en Amérique. h (V. v.)

Elle possède les mêmes principes, & a les mêmes propriétés que le *salicornia herbacea*. On ne met, dans l'usage que l'on en fait, aucune différence entre ces deux espèces.

2. *SALICORNE herbacée. Salicornia herbacea*. Linn.

*Salicornia herbacea, patula, articulis apice compressis, emarginato-bifidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1, pag. 5. — Flor. suec. 1. — Mater. medic. pag. 36. — Æter. Flor. dan. 303. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1, pag. 13. n°. 33. tab. 4. fig. 1. — Pallas, Itin. vol. 1, pag. 479. tab. A. fig. 1. Append. 89. — Scop. Carn. ed. 2. n°. 1. — Jacq. Vind. pag. 1. — Miller, Dict. n°. 1. — Blackw., tab. 598. — Grimm. in Nov. Act. A. N. C. tom. 3. Append. 252. & tom. 5. Append. 120. — Roth. Germ. vol. 1, pag. 1. — Il. pag. 1. — Hoffm. Germ. 1. — Lam. Flor. franç. vol. 3, pag. 217. n°. 813. Il. — Desf.

Flor. atlant. vol. 1, pag. 3. — Gerard, Flor. gall. Prov. 328. n°. 1. — Vahl, Spec. Plant. vol. 1, pag. 10.

*Salicornia herbacea, patula, articulis apice compressis, emarginato-bifidis; spicis axillaribus, oppositis, pedunculatis; squamis obtusis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1, pag. 23. n°. 1.

*Salicornia* (herbacea, annua). Gouan, Monsp. pag. 2. n°. 1.

*Salicornia* (herbacea), pumila, erecta; spicis linearibus-oblongis; pedunculo subcapituli compresso, sursum lateferente. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1, pag. 1.

*Salicornia articulis apice crassifloribus, obtusis*. Linn. Mater. medic. 8. — Bailler. Subf. 2, pag. 105. tab. 50.

*Salicornia annua*. Sauv. Monsp. 7.

*Salicornia*. Horr. Cliff. 490. — Royen, Lugd. Bat. 205. — Dodon. Pempt. 82. Icon.

*Salicornia geniculata, annua*. Tournef. Infr. Coroll. 51.

*Kali geniculatum, brevius, annuum*. C. Bauh. Pin. 289.

*Kali*. Matth. Comm. 364. Icon. — Camer. Epit. 247. Icon. — Moris. Oxon. Hist. 2. 6. 5. tab. 33. fig. 8. — Excluse Synonym. C. Bauh.

*Kali geniculatum, seu salicornia*. J. Bauh. Hist. 3, pag. 705. n°. 1. 2. 3. Icon.

*Salicornia, seu kali geniculatum, vermiculatum*. Lobel, Advers. 170. Icon. Bon. — Gerard, Hist. 335. Icon.

*Kali geniculatum*. Barrel. tab. 191. — Donati, Tract. pag. 55. Icon.

*Kali geniculatum, pumila*. Dalech. Hist. 2, pag. 1378. Icon.

β. *Salicornia* (perennans), herbacea, patula; articulis apice compressis, emarginato-bifidis; spicis axillaribus, ternis, pedunculatis; squamis acutis, radice perenni. Willd. Spec. Plant. vol. 1, pag. 24. n°. 2.

*Salicornia herbacea*. Var. β. Pallas, Itin. vol. 1. Append. n°. 89. tab. D. fig. 1.

γ. *Salicornia* (myosuroides), procumbens, furculis longissimis. Dill. in Raii Synon. 137.

δ. *Salicornia* (purpurascens), ramifera, procumbens, foliis brevibus, purpurascens. Dill. in Raii Synon. 137.

ε. *Salicornia* (major), geniculatum, majus, sempervirens, humilior. Schol. Botan. 37.

ζ. *Salicornia erecta, foliis brevibus, cupressiformis*. Dill. in Raii Synon. 137.

Mmm 1



*Salicornia biennis*. Woody jointed Glasswort. Petiv. Hort. Brit. tab. 9. fig. 4.

C'est une plante herbacée, charnue, qui ordinairement s'élève peu. Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, hautes à peine d'un pied, divisées en rameaux opposés, dépourvus de feuilles, articulés, très-glabres; les articulations allongées, rétrécies inférieurement, plus épaisses & comprimées à leur sommet; l'articulation inférieure de chaque rameau, souvent plus longue & plus étroite que les autres; chacune d'elles échancrée à son sommet, terminée par deux dents opposées, aiguës. Cette partie devient, dans les articulations supérieures, un calice presque membraneux, légèrement tétragone, renfermant une, & même très-souvent deux étamines.

Ces fleurs sont réunies, au nombre de deux ou trois, à l'extrémité des articulations supérieures. Elles sont petites, fécondes, les filaments plus longs que le calice; le style court, épais; le stigmate légèrement bifide; les semences fort petites.

La plante a été persévérante par ses racines, beaucoup plus étalée, remarquable par ses épis légèrement pédonculés. Elle pourroit tenir le milieu entre cette espèce & le *salicornia frutesca*.

Cette plante croît sur les bords de la Méditerranée & de l'Océan. La variété *pa* a été observée, par Pallas, en Sibérie, dans les marais desséchés. Elle est vivace. Ses tiges sont couchées, plus grêles, plus rameuses: la première est annuelle. (V. v.)

Cette espèce, ainsi que toutes celles de ce genre, a une saveur saline: elles sont employées, ainsi que la soude (*salsola*), à la fabrication de la soude. On la laisse d'abord sécher au soleil, & puis on la brûle dans de grands trous. Il en résulte, lorsqu'elle a été long-tems calcinée, une masse dure, saline, connue dans le commerce sous le nom de *soude*, parce qu'en effet elle contient une très-grande quantité de cet alcali dont on fait usage pour les lessives ou pour la fabrication du savon.

Les Anglais & quelques autres nations sont confire les jeunes rameaux dans du vinaigre, & s'en servent d'assaisonnement dans les salades. Les troupeaux recherchent cette plante avec avidité.

### 3. SALICORNE des Indes. *Salicornia indica*. Willden.

*Salicornia articulata clavata, compressifolia, truncatis, bidentatis; spica terminalibus, cylindricis, salinaris, obtusis*. Willden. in Nov. Act. Soc. Am. Hist. Nat. 2. pag. 111. tab. 4. fig. 2. — Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 10. n°. 2.

Ses tiges sont diffuses, tombantes, souvent rampantes dans leur jeunesse, rameuses seulement à

leur base, beaucoup plus épaisses que celles du *salicornia herbacea*; d'un vert-glaucue, ainsi que toutes les autres parties de cette plante. Les rameaux sont opposés, ramifiés, articulés; leurs articulations très-courtes, un peu comprimées, en forme de clou, tronquées, terminées par deux dents en carène. Les épis sont terminaux, cylindriques, solitaires, longs d'un pouce & plus, obtus, épais, garnis d'écailles tronquées, très-serrées, imbriquées.

Cette plante croît abondamment dans les vastes plaines, sur les bords de la mer, à Tringebac.

### 4. SALICORNE en cône. *Salicornia stralacea*. Pallas.

*Salicornia caule prostrato, fruticosa; articulis truncatis, alternatim spiciferis; spicis nudis, brevissimis, oppositis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 25. n°. 4.

*Salicornia stralacea*. Pall. Itin. vol. 1. Append. n°. 91. tab. E.

*Salicornia arborescens, sine geniculis*. Buxbaum, Centur. 1. pag. 6. tab. 10. fig. 2.

Ses tiges sont couchées, presque ligneuses, longues d'un pied, divisées en rameaux droits, ramifiés, composés d'articulations tronquées, sur lesquelles sont placés des épis nus, très-courts, opposés, obtus, cylindriques, contenant environ une vingtaine de fleurs.

Cette plante se trouve sur les rochers élevés qui bordent la mer Caspienne. ?

### 5. SALICORNE de Virginie. *Salicornia virginica*. Linn.

*Salicornia herbacea, erecta, ramis simplicifloris*. Linn. Syst. veget. pag. 52. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 36.

*Salicornia virginica*. ? Forsk. Flot. ægypt.-arab. pag. 2. n°. 1.

D'après Linné, cette plante est herbacée, à tiges droites, divisées en rameaux très-simples, opposés, terminés par un long épi articulé, qu'on ne doit pas confondre avec le *salicornia herbacea*, qu'on rencontre également dans la Virginie. Le calice a la forme d'une écaille ovale, droite, creuse. Les étamines sont au nombre de deux; le pistil saillant.

La plante dont parle Forskhal, & qu'il rapporte à celle de Linné, est ligneuse, d'un vert-bleuâtre, couverte d'une farine légère. Les articulations des plus petits rameaux sont comprimées à leur sommet, échancrées ou bifides; l'articulation inférieure en carène à ses deux côtés; les autres cylindriques, entières: chacune d'elles renferme

dans son aisselle trois fleurs de chaque côté. Les styles sont saillans.

Cette plante croît dans la Virginie. On la trouve aussi en Arabie, si toutefois on peut y rapporter l'espèce décrite par Forskhal.

6. SALICORNE d'Arabie. *Salicornia arabica*. Linn.

*Salicornia articulata obtusa, basi incrassata; spicis ovatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 5. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 36. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 3. — Pall. Iter 1. Append. n°. 92. tab. D. fig. 3.

*Salicornia foliis alternis, vaginantibus, obtusis, dichotomis*. Linn. f. Suppl. 81.

*Kali arabum, secundum genus*. Dalech. Hist. 2. Append. 20. Icon.

*Kali geniculatum altiorum vel minus*. C. Bauh. Pin. 289. — Morif. Oron. Hist. 1. pag. 610. §. 5. tab. 33. fig. 7. — Rai, Hist. 211.

1. *Salicornia* (perfoliata), fruticosa, foliis carnosiss, urceolato orbiculatis, caule perfoliatis. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 3. n°. 4.

*Salicornia foliis alternis, orbiculatis, perfoliatis; ramis dichotomis*. Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 13.

Cette plante a des racines grosses, épaisses, ligneuses, de couleur cendrée : il s'en élève une tige frutescente, droite, cylindrique, divisée en rameaux diffus, alternes, composés d'articulations charnues, très-rapprochées, obtuses, épaissies à leur sommet, où elles forment un bourrelet un peu échancré.

La fructification croît en épis, à l'extrémité des rameaux supérieurs, dont la base est très-rétrécie, allongée ; ce qui donne à ces épis l'apparence d'être pédonculés. Ils sont ovales, oblongs. Les articulations sur ces rameaux fertiles sont beaucoup plus courtes, presque globuleuses, légèrement échanquées à leur sommet. Elles contiennent, dans ce sommet qui devient le calice, les étamines & le pistil.

Cette plante croît en Arabie, & dans la Barbarie sur les côtes maritimes. *h* (V. f.)

La variété *h*, qui est peut-être une espèce séparée, a des tiges diffuses, cylindriques, non articulées, flexueuses, hautes d'un pied, chargées de feuilles très-rapprochées, courtes, serrées. Dans les jeunes plantes, les tiges sont environnées d'une gaine épaisse, urcéolée. Les fleurs sont en épis axillaires & terminaux, pédonculés, cylindriques, souvent longs d'un pouce & demi ; les fleurs réunies trois par trois.

7. SALICORNE feuillée. *Salicornia foliata*. Linn. f.

*Salicornia foliis alternis, teretibus, brevibus, carnosiss; spicis axillaribus, sessilibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 38.

*Salicornia foliis linearibus, alternis, amplexicaulis-decurrentibus*. Linn. f. Suppl. pag. 81. — Pallas, Itin. 2. Append. n°. 93. tab. F. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 25. n°. 7.

Cette espèce a des tiges glabres, ligneuses, qui se divisent en rameaux alternes, presque simples : leurs articulations se prolongent en feuilles alternes, linéaires, cylindriques, courtes, charnues, amplexicaules, & comme decurrentes à leur base. La fructification forme, à l'extrémité des rameaux, des épis axillaires & sessiles.

Cette plante croît dans la Sibirie. *h*

8. SALICORNE amplexicaule. *Salicornia amplexicaulis*. Vahl.

*Salicornia foliis cordatis, amplexicaulis*. Vahl, Symb. 2. pag. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 26. n°. 8.

Cette salicorne a ses tiges en partie couchées, ligneuses à leur base, hautes de trois à quatre pouces, très-rameuses ; les rameaux sortent de l'aisselle des feuilles ; ils sont glabres, alternes, très-ouverts, longs d'un pouce & demi, toujours rapprochés deux par deux ; chaque articulation se termine par un épanouissement qui forme de petites feuilles alternes, obovées, convexes en dessous, planes en dessus, échanquées & amplexicaules à leur base ; celles des jeunes rameaux paroissent imbriquées, les articulations étant beaucoup plus courtes, très-rapprochées.

Cette plante croît en Barbarie, sur le bord des lacs, dans les environs de Tunis. *h* (Descript. ex Vahl.)

9. SALICORNE caspienne. *Salicornia caspica*. Pall.

*Salicornia articulata cylindrica, spicis filiformibus*. Pallas, Itin. 1. Append. n°. 90. tab. D. fig. 2. — Lepech. Itin. 1. pag. 154. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 13. n°. 37. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 26. n°. 9.

C'est une des espèces les plus remarquables de ce genre, par sa force & sa grandeur. Son tronc est presque arborescent ; ses rameaux sont articulés, composés d'articulations cylindriques, épaisses. Les épis sont pédonculés, souvent longs de deux pouces, filiformes, chargés de fleurs nombreuses & imbriquées.

Cette plante croît sur les bords de la mer Caspienne. *h*

10. SALICORNE en croix. *Salicornia cruciata*. Forsk.

*Salicornia frutesca, pedunculorum articulatis cruciatis, caulis globosis.* Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 2. n°. 3.

Cette espèce se rapproche par la forme & la disposition de ses articulations, du *salicornia virginica* de Forskh.

Ses tiges, d'après ce même auteur, sont ligneuses, couchées, cylindriques, de couleur brune; elles se divisent en rameaux droits, de couleur verte, nombreux, articulés; les articulations inférieures des rameaux stériles sont petites, presque globuleuses, tuberculées, terminées par des écailles pâles, très-fermées, disposées en croix sur six rangs: les articulations supérieures des rameaux fertiles sont beaucoup plus grandes, cylindriques, écailleuses, succulentes à leur sommet; les fleurs éparées. Le nombre des étamines n'a pas pu être observé.

Cette plante croît dans le Levant, sur le bord méridional des salines d'Alexandrie. *γ (Descript. ex Forskh.)*

**SALQUIER.** *Cuphea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des salicaires, qui a beaucoup de rapports avec les *lythrum*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, la plupart très-visqueuses, dont les feuilles sont opposées, les fleurs axillaires, presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à six dents inégales; six pétales inégaux; douze étamines; une capsule à une seule loge, recouverte par le calice; un réceptacle central.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, tubulé, strié, muni de six dents inégales à son orifice & la dent supérieure plus large.

2°. Une corolle composée de six pétales inégaux, les deux supérieurs plus grands.

3°. Douze étamines dont les filaments sont inégaux, disposés sur deux rangs; huit de même grandeur; quatre plus petits; les deux supérieurs velus, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style court, terminé par un stigmate capité.

Le fruit est une capsule à une seule loge, recouverte par le calice, qui se fendent ensemble, & prennent une forme naviculaire. Les semences sont lenticulaires, attachées en forme de petite grappe sur un réceptacle central denticulé, qui se courbe & s'incline entre la fente de la capsule.

1. SALQUIER visqueux. *Cuphea viscofissima.* Jacq.

*Cuphea viscosa, foliis petiolatis, ovato-oblongis, scabrisculis, integris; floribus subsolitariis.* (N.)

*Cuphea viscofissima.* Jacq. Hort. Vind. 2. pag. 83. tab. 177. — Koch. Beytr. 1. pag. 124. — Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 129. — Luff. Gener. Plant. pag. 332. — Lam. Illust. Gener. tab. 407. — Gærtn. de Fruët. & Sem. Centur. 3. tab. 44. fig. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 670.

*Balsamona pinto.* Vandell. Fasc. pag. 15. tab. 3.

*Lythrum (cuphea), foliis oppositis, ovato-oblongis, scabrisculis; floribus dodecandris.* Linn. f. Suppl. pag. 249. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 553. n°. 10.

C'est une plante herbacée, dont les racines sont fibreuses, un peu blanchâtres, annuelles, d'où s'élève une tige droite, cylindrique, haute d'un pied, un peu purpurine, visqueuse, pubescente ou légèrement hispide, divisée en rameaux simples, alternes, diffus, sortant de l'aisselle des feuilles, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales-oblongues, très-entières, un peu rudes à leurs deux faces, longues d'environ un pouce, supportées par des pétioles de moitié plus courts, droits, ouverts, visqueux.

Les fleurs sont axillaires, la plupart solitaires, latérales, à peine pédonculées; leur calice est cylindrique avant la fécondation, puis renflé, ressemblant à son orifice, d'un vert-blanchâtre, marqué de douze stries d'un vert plus foncé, hispide, visqueux, muni de six dents, la supérieure plus large. La corolle est purpurine, composée de six pétales, dont les deux supérieurs plus grands; douze étamines; une capsule oblongue, à une seule loge, renfermant plusieurs semences noires, lenticulaires, qui ne terminent leur maturité qu'après qu'elles ont été exposées à l'action immédiate de l'air, par le déchirement latéral de la capsule.

Cette plante croît dans les lieux humides & ombragés du Brésil. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (*P. w.*)

2. SALQUIER couché. *Cuphea procumbens.* Cav.

*Cuphea caule herbaceo, ramis procumbentibus; foliis ovato-lanceolatis, subsiliis; breviter petiolatis.* Cav. Icon. rar. vol. 4. pag. 55. n°. 418. tab. 380.

Ses tiges sont herbacées, médiocrement tétragones, divisées en rameaux penlans, velus, visqueux, d'un pied & plus de longueur, garnis de feuilles opposées, légèrement pétioles, ovales, lancéolées, hispides & visqueuses. Les fleurs sont

solitaires dans l'aisselle des feuilles, inclinées après la floraison, droites sur leur pedoncule pendant la floraison.

Leur calice est tubulé, chargé de poils glanduleux & visqueux, & marqué de douze stries de couleur violette; ventru & relevé en bosse à sa base, garni à son orifice de filamens lanugineux, divisé en six dents, dont cinq plus courtes, égales; la sixième, plus large, ovale, aiguë. La corolle est composée de six pétales d'un pourpre clair, alternes avec les dents du calice, élargis, ovales à leur lame; deux pétales plus larges, légèrement crenelés, terminés par des onglets très-étroits.

Les étamines, au nombre de onze, ont des filamens courts, velus, de couleur purpurine, un peu courbés, disposés sur plusieurs rangs, terminés par des anthères ovales, jaunâtres & filonées. L'ovaire est supérieur, ovale, oblong; le style tubulé, plus court que le calice, un peu courbé à son sommet; le stigmate médiocrement épaissi. La capsule est oblongue; à une seule loge, recouverte par le calice, s'ouvrant tous deux en même tems par une fente latérale, par où sort le réceptacle où sont attachées les semences en forme d'épi unilatéral.

Cette plante croît naturellement au Mexique. Elle a été cultivée au Jardin botanique de Madrid. ○ (*Descript. ex Cavan.*)

### 3. SALIQUIER en épi. *Cuphea spicata*. Cavan.

*Cuphea caule herbaceo, erecto; foliis ovatis, floribus spicatis*. Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 56. n°. 419. tab. 381.

Ses tiges sont droites, herbacées, velues, hautes d'un pied & plus, presque simples, un peu ramifiées à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, ovales, très-entières, pétioolées, vertes à leur face supérieure, glauques en dessous, beaucoup plus longues que leur pétiole, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, sur lesquels elles sont rangées deux par deux alternativement sur des pedoncules droits, capillaires. Leur calice est semblable à celui du *Cuphea procumbens*. La corolle est composée de six pétales pairs, d'un rose-tendre; les deux supérieurs plus grands: les autres parties de la fructification, semblables à celles de l'espèce précédente, mais plus petites.

Cette espèce croît au Pérou sur le bord des eaux, particulièrement sur la montagne de la Vinde, où elle fleurit au mois de juin. ○ (*Descript. ex Cavan.*)

### 4. SALIQUIER à tiges effilées. *Cuphea virgata*. Cavan.

*Cuphea caule virgato, foliis ovato-lanceolatis, sessilibus; floribus solitariis*. Cavan. Ic. rar. vol. 4. pag. 56. n°. 420. tab. 382. fig. 1.

Ses tiges sont herbacées, droites, hispides, effilées, hautes d'un pied & demi, à peine rameuses, garnies de feuilles sessiles, opposées, trois fois plus courtes que les entre-nœuds, ovales, lancéolées, très-entières, rudes & raboteuses à leur face supérieure, pileuses en dessous.

Les fleurs sont presque sessiles, solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles. Leur calice est long d'un demi-pouce, tubulé, rougeâtre, pileux, ventru à sa base, élargi à son orifice, divisé en six dents obtuses, la supérieure plus large; marqué de douze stries. La corolle est composée de six pétales d'un rouge clair; les deux supérieurs plus grands, & d'une couleur plus foncée. Les étamines sont au nombre de onze, velues, à peine aussi longues que la corolle; les anthères ovales; la fructification comme celle de l'espèce précédente.

Cette plante se trouve au Mexique, sur le bord des ruisseaux & dans les lieux humides, aux environs de la ville de *Salvatierra*; elle fleurit vers la fin de l'été. ○ (*Descript. ex Cavan.*)

### 5. SALIQUIER à pétales égaux. *Cuphea aequipetala*. Cavan.

*Cuphea foliis ovato-acutis, ciliatis; petalis aequalibus*. Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 57. n°. 421. tab. 382. fig. 2.

Ses racines sont fibreuses, fusiformes; elles produisent des tiges droites, herbacées, hautes d'un pied, hispides, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétioolées, plus longues que les entre-nœuds, ovales, aiguës, pileuses, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont solitaires, axillaires, presque sessiles. Leur calice est d'un vert tirant sur le violet. La corolle est composée de six pétales, tous égaux, d'une couleur violette, foncée, très-entières; les étamines, au nombre de onze à douze, dont deux latérales, ont leurs filamens lanugineux; les anthères sont ovales.

Cette espèce croît entre Acapulco & le Mexique, particulièrement sur le bord du fleuve Peregrino. ○ (*Descript. ex Cavan.*)

### SALOMONE de Canton. *Salomonja cantoniensis*. Loureiro, Flor. cochinch. pag. 18.

*Salomonja foliis cordatis, integerrimis; floribus spicatis, terminalibus; caule herbaceo*. (N.)

*Salmonia cantoniensis*, Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 8.

Plante qui forme seule un genre particulier, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; une corolle inférieure, à trois découpures; une étamine; un seul style; une capsule à deux loges monospermes.

Ses tiges sont herbacées, droites, longues de six pouces, annuelles, filloées, plusieurs réunies sur une même racine, garnies de feuilles médiocrement pétioles, éparfes, en forme de cœur, très-entiées, glabres à leurs deux faces, acuminées à leur sommet, marquées de trois nervures. Les fleurs sont violettes, disposées en un épi simple, court, droit, terminal.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, comprimé, à cinq découpures courtes, subulées, presque égales, un peu ouvertes.

2°. Une corolle monopétale, composée d'une lame oblongue, roulée à sa partie inférieure en un tube cylindrique, fendu longitudinalement, dont les bords sont connivens; élargie à sa partie supérieure en un limbe à trois divisions courtes, droites, arrondies; celle du milieu plus longue, & recourbée en capuchon.

3°. Une seule étamine, dont le filament est court, filiforme, situé vers le milieu de la plus longue découpure de la corolle, presque de même longueur; terminé par une anthere ovale, inclinée, recouverte par la partie recourbée de cette découpure.

4°. Un ovaire supérieur, un peu arrondi, comprimé, surmonté d'un style courbé, renflé dans son milieu, plus court que l'étamine, terminé par un stigmate épais.

Le fruit est une silique (ou peut-être une capsule) comprimée, à deux lobes, rude au toucher, à deux loges, ne renfermant qu'une seule semence comprimée, un peu ovale.

SALPIGLOSSE. *Salpiglossis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. Prodr. pag. 94. tab. 19.

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, en entonnoir, établi par Ruiz & Pavon, dont ils n'annoncent qu'une seule espèce herbacée, qui ne nous est encore connue que par ses caractères généraux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une capsule à deux loges; une corolle infundibuliforme; quatre étamines didynames; le rudiment d'une cinquième; un style plane & élargi en forme de langue à la partie supérieure, muni de deux petites dents opposées.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, à cinq angles,

divisé en cinq découpures égales, lancéolées, rigides, persistantes, les trois inférieures plus profondes.

2°. Une corolle très-grande, monopétale, en forme d'entonnoir, dont le tube est grêle, une fois plus long que le calice; l'orifice dilaté, campanulé, plissé, anguleux; le limbe ouvert, inégal, à cinq lobes ovales, échancrés, le supérieur plus large.

3°. Quatre étamines didynames, dont les filaments sont subulés, renfermés dans le tube, insérés vers son milieu, dont deux plus courts, terminés par des anthères ovales, à deux loges, bifides à leur base, conniventes; celles des étamines, plus longues, sont plus petites; le rudiment d'un cinquième filament situé entre les deux plus longues étamines.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un style de la longueur des étamines, en forme de langue, grêle, rétrécie à sa partie inférieure; insensiblement élargi & plane, muni vers son sommet de deux petites dents opposées, terminé par un stigmate tronqué.

Le fruit est une capsule renfermée dans le calice, ovale, à deux loges, à deux valves, chaque valve bifide; la cloison parallèle aux valves; les semences attachées de chaque côté de la cloison, qu'on peut regarder comme un réceptacle central. Ces semences sont nombreuses, fort petites, ovales ou arrondies.

La seule espèce rapportée à ce genre est une plante herbacée, qui croît au Pérou.

SALSEPAREILLE. *Smilax*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des aîperges, qui a des rapports avec les *ruscus* & les *discorea* : il comprend des herbes ou plus ordinairement des sous-arbrisseaux, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont très-souvent armées de deux vrilles à la base de leur pétiole; les fleurs disposées en petits corymbes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice coloré, à six divisions profondes; poise de corolle; six étamines dans les fleurs mâles; un style trifide dans les fleurs femelles; trois stigmates, une baie supérieure, à trois loges, à trois semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont dioïques. Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice inférieur, coloré, campanulé, très-ouvert, divisé profondément en six folioles oblongues, réunies à leur base, réfléchies à leur sommet,

2°. Point

2°. Point de corolle, à moins qu'on ne prenne le calice pour elle.

3°. Six diamines, dont les filamens sont simples, terminés par des anthères oblongues.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice comme celui des fleurs mâles :

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un style trifide, fort court, terminé par trois stigmates oblongs, fort écartés, pubescens.

Le fruit est une baie arrondie, à trois loges, à trois semences, plus ordinairement deux par l'avortement de la troisième.

**Observations.** Les salsepailleuses forment un genre très-naturel, dont aucune espèce ne s'écarte du caractère générique, & qui affectent toutes presque le même port ; ce qui, d'un autre côté, les rend très-difficiles à distinguer. Ce qui ajoute encore aux difficultés, c'est que les feuilles sont très-variables sur la même plante, & qu'il est rare de trouver une seule espèce pour laquelle la forme de ces feuilles puisse être parfaitement bien déterminée. Les caractères les moins inconstans sont appuyés sur la substance de ces feuilles, ou coriaces, très-épaisses, ou membraneuses & parcheminées ; sur la présence ou l'absence des épines, dont les nervures sont souvent pourvues ; sur le nombre & la disposition de ces mêmes nervures ; sur les tiges cylindriques ou anguleuses, épineuses ou non épineuses ; sur les fleurs, la plupart, à la vérité, disposées en petits corymbes ou ombelles axillaires, quelques-unes en longues grappes ; sur les proportions des pédoncules ; enfin, sur la grosseur & la couleur des fruits. Mais comme tous ces caractères ne peuvent que difficilement se vérifier sur les individus conservés en herbier, il s'ensuit qu'on court très-souvent le risque de faire de doubles emplois en prenant pour espèces des variétés de la même plante.

#### ESPÈCES.

\* *Tiges anguleuses, armées d'épines.*

1. *SALSEPAILLE piquante. Smilax aspera.*

*Smilax caule aculeato, angulari; foliis dentato-aculeatis, cordatis, novemnerviis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1458. n°. 1. — Gouan, Flor. monsp. 426. & Hort. 105. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 136. — Gronov. Orient. 516. — Mill. Dict. n°. 1. — Scop. Carn. 2. n°. 1221. — Lam. Flor. fr. vol. 2. pag. 217. n°. 122. — Duhamel, Arbr. édit. de Michel. pag. 234. tab. 53.

*Smilax caule angulato, aculeato; foliis cordato-oblongis, acutis, aculeatis.* Hort. Clus. 458. — Royen, Lugd. Bat. 218.

Botanique. Tome VI.

*Smilax aspera, fructu subente.* C. Bauh. Pin. 296. — Tournef. Inst. R. Herb. 654. — Garid. Aix. 444.

*Smilax aspera.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 115. Icon. — Dodon. Pempt. pag. 398. Icon.

*Smilax aspera, rutilo fructu.* Clus. Hist. 1. pag. 122. — Magn. Boron. 242.

*Smilax aspera Matthioli.* Dalech. Hist. 2. pag. 1422. Icon.

Vulgairement *liseron épineux*, *liser piquant*.

2. *Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro.* C. Bauh. Pin. 296. — Tournef. Inst. R. Herb. 654. — Garid. Aix. 444. — J. Bauh. Hist. 2. p. 116.

*Smilax aspera, nigro fructu.* Clus. Hist. 1. pag. 113.

3. *Smilax viticulis aspera; foliis longis, angustis, mucronatis, levibus; auriculis ad basin rotundioribus.* Pluken. Almag. pag. 348. tab. 110. fig. 5.

4. *Smilax foliis marginibus leviter spinosis, hastato auriculatis, seu absque auriculis.* (N.)

C'est une plante très-épineuse, dure, sèche, dont les tiges sont presque ligneuses, menues, anguleuses, très-glabres, flexueuses, garnies d'épines dures, épaisses, presque droites, divisées en rameaux allongés, qui s'accrochent en grimpant aux corps voisins ; garnis de feuilles alternes, pétiolées, roides, fermes, oblongues, lancéolées, très-aiguës, élargies & échancrées en cœur à leur base, lisses à leurs deux faces, vertes, marquées très-souvent de taches blanchâtres, armées à leurs bords, ainsi qu'à leurs nervures inférieures & sur les pétioles, d'épines assez nombreuses, roides, très-piquantes, marquées de sept à neuf nervures longitudinales, longues de deux à trois pouces, larges d'un pouce & demi ; soutenues par des pétioles striés, roides, longs de six à sept lignes, munis à leur base de deux vrilles opposées.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, rarement axillaires, flexueuses, allongées, simples, nues ou un peu feuillées, à peine épineuse ; supportant des fleurs réunies par petits paquets, alternes, dont les pédoncules sont simples, capillaires, longs de quatre lignes environ. Le calice est glabre, petit, ouvert en étoile, à six folioles étroites, linéaires, obuses, réfléchies. Les individus femelles portent de petites baies sphériques, rouges ou de couleur noire dans la variété 3, divisées en trois loges, contenant d'une à deux semences arrondies, rarement trois.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, ainsi que dans l'Espagne, l'Italie, la Palestine, &c. sur les rochers & parmi les buissons. b (P. v.)

La variété 2 a été recueillie, par Michaux, dans N n

la Caroline; elle est elle-même très-variable: ses feuilles sont légèrement denticulées à leurs bords, canotées hystées & auriculées, tantôt hystées sans auricule. Dans les individus nés sur les côtes maritimes, les feuilles persistent, restent toujours vertes; dans ceux des bords des grands lacs, elles sont caduques; celles qui naissent dans les terrains secs sont souvent maculées. Les baies sont noires, en dehors, pourpres en dedans, d'une à trois semences; les tiges anguleuses; les rameaux supérieurs souvent dépourvus d'aiguillons. (*Juss. herb. & mss.*)

2. *SALSEPAREILLE* de Mauritanie. *Smilax mauritanica*. Poig.

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis subinermibus, cordato-lanceolatis, quinque seu septemnerviis*. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 263.

*Smilax caule aculeato, angulato, scandente; foliis cordatis, mucronatis, sub septemnerviis, inermibus, rarius aculeatis, baccis rubinis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 367.

3. *Eodem, baccis luteis*. (N.)

Cette plante a des rapports avec le *smilax aspera*, dont elle diffère par ses tiges beaucoup plus élevées, par ses feuilles beaucoup plus grandes, jamais tachetées, très-rarement épineuses, ou dont des épines sont très-rare, presque moules. Comparée avec le *smilax excelsa* des herbiers de Vaillant & de Tournefort, cette plante ne peut y être rapportée, ainsi que l'a observé M. Desfontaines.

Ses tiges sont presque ligneuses, anguleuses, de couleur blanchâtre ou cendrée, grêles, très-longues, dissiles, flexueuses, grimpantes, armées de quelques aiguillons rares, distans, fort courts; elles se divisent en rameaux fort allongés, répandus sur les buissons, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-fines, coriaces, glabres à leurs deux faces, vertes & luisantes à leur face supérieure, un peu plus pâles en dessous, nerveuses, réticulées, élargies & échancrées en cœur à leur base, rétrécies, lancéolées, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, très-variables dans leurs formes; les unes très-larges, courtes, obtuses; d'autres beaucoup plus allongées, étroites, lancéolées, acuminées, marquées de cinq à sept nervures longitudinales, quelquefois neuf, longues de deux à cinq pouces, larges d'un pouce & den à trois pouces, point épineuses, excepté quelquefois sur leur principale nervure & à leurs bords; les pétioles longs d'un pouce & plus, munis à leur base de deux vrilles opposées.

Les fleurs sont diques, odorantes, en grappes; les unes axillaires, inférieures & courtes; les autres terminales, très-allongées, flexueuses, un peu épineuses à leur base, & sur lesquelles les

fleurs sont disposées par paquets presque verticillés, distans. Les pédoncules partiels sont capitulaires, plumeux, simples, longs d'un demi-pouce & plus; le calice coloré en blanc, à six folioles étroites, linéaires, très-ouvertes, obtuses, réfléchies en dehors: il renferme, dans les fleurs mâles, six étamines plus courtes que les divisions calicinales.

Les fleurs femelles renferment un style très-court, à trois divisions, terminé par trois pistils, auquel succède une baie molle, globuleuse, très-lisse, de couleur rouge ou d'un jaune clair dans la variété  $\beta$ , divisé intérieurement en trois loges, à trois semences arrondies, mais plus souvent deux, ou même une seule par l'avortement des autres.

Cette plante croît sur les rochers, dans les lieux arides, parmi les buissons, dans le royaume d'Alger, aux environs de Bonne & en plusieurs autres endroits. (V. v.)

3. *SALSEPAREILLE* à longue tige. *Smilax excelsa*. Linn.

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis inermibus, cordatis, novemnerviis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 255. n°. 2. — Miller, Dict. n°. 2.

*Smilax caule angulato, aculeato, alternatim inflexo; foliis sagittatis, acutis, inermibus*. Royen, Lugd. Bat. 228.

*Smilax orientalis, framentis aculeatis, excelsa arboris scandens, foliis non spinosis*. Tourn. Coroll. 44. — Buxbaum, Centur. 1. pag. 18. tab. 27. lc. *Malta*.

*Smilax aspera*. Prosp. Alpin. Ægypt. 140. tab. 141. ?

*Smilax caule angulato; foliis inermibus cordatis, majoribus, septemnerviis*. Duhamel, Arb. édit. de Mich. pag. 256. tab. 54.

*Smilax aspera, ponticu; framentis arboris excelsa scandentibus; foliis amplioribus non spinosis*. Aubr. Icon. inedit. in Juss. Coll. &c.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *smilax mauritanica*: il en diffère par ses feuilles une fois plus grandes, plus minces, membraneuses & non coriaces.

C'est un arbrisseau grimpant, dont les tiges cannelées, légèrement anguleuses, armées d'aiguillons presque droits, s'élèvent jusqu'à la hauteur des plus grands arbres; elles se divisent en rameaux longs & flexibles, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, presque obtuses, glabres à leurs deux faces, grandes, minces, marquées de cinq à sept nervures (je n'en ai jamais vu à neuf), entières, sans aiguillons. Les pétioles sont courts, supportant deux vrilles filiformes.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes axillaires, bien plus courts que les feuilles, supportées par des pédoncules fasciculés, à l'extrémité d'un pédoncule commun. Leur calice est divisé en six folioles ouvertes, recourbées à leur sommet. L'ovaire est arrondi : il lui succède une baie globuleuse, glabre, contenant deux semences convexes d'un côté, plane de l'autre.

Cette plante croît dans le Levant : on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v. & V. f. in herb. Tournef.)

**Observations.** La figure de cette plante, donnée par les auteurs de la nouvelle édition des arbres & arbustes de Duhamel, a été copiée d'après le dessin original d'Aubriet, qui accompagna Tournefort dans son voyage au Levant.

#### 4. SALSEPAREILLE de Catalogne. *Smilax catalonica*.

*Smilax foliis amplexicaulis, septemnerviis, margine dentato-spinosis; caule subangulato-aculeato.* (N.)

♂ *Smilax aspera bermudensis, grandioribus foliis, cordiformibus; radice furcata.* Pluken. tab. 110. fig. 6.

*Smilax bermudensis, caule subangulato; foliis cordiformibus, magnis, septemnerviis; margine dentato-aculeatis.* Duham. Arb. édit. de Michel. pag. 241.

Ses tiges sont anguleuses, presque ligneuses, cannelées, glabres, armées d'aiguillons, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, amples, fermes, coriaces, glabres à leurs deux faces, luisantes, munies de sept nervures, ovales, aiguës, en cœur à leur base, longues de trois à quatre pouces, sur environ trois pouces de large; pourvues d'aiguillons sur la principale nervure, & à leur contour de dents rares, fort petites, distantes, épineuses; les pétioles sont durs, épineux, longs d'un pouce.

Les fleurs sont disposées en grappes allongées, diffusées, flexueuses, sur lesquelles les fleurs sont distantes, presque solitaires, ou réunies trois ou quatre, la plupart pédunculées, quelques-unes sessiles, fort petites.

La plante de Plukenet, variété ♂, ressemble beaucoup à celle-ci; elle n'en diffère que par la forme de ses feuilles, qui paroissent plus courtes, un peu orbiculées, souvent mucronées.

Cette plante croît dans la Catalogne : celle de Plukenet se trouve dans les îles Bermudes. (V. f. in herb. J. B. S.)

#### 5. SALSEPAREILLE épineuse. *Smilax spinosa*.

*Smilax foliis lanceolatis, margine sinuatis, dentato-spinosis; caule angulato-aculeato.* (N.)

♂ *Smilax (ovata), caule angulato; foliis ovatis, trinerviis, marginibus raris aculeatis.* Duham. Arb. édit. de Michel. vol. 1. pag. 242. n°. 5.

Je ne connois point les fruits de cette espèce, qui présente d'ailleurs dans ses tiges & les feuilles, & la disposition de ses fleurs, les caractères des *Smilax*, remarquables par les dents épineuses du contour des feuilles.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, cannelées, anguleuses, divisées en rameaux glabres, un peu flexueux, armés d'aiguillons courts, droits, très-aigus, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, coriaces, étroites, lancéolées, longues de trois à quatre pouces, larges d'un pouce ou d'un pouce & demi, glabres à leurs deux faces, marquées de trois nervures longitudinales, les deux latérales peu prononcées, celle du milieu saillante, garnie d'aiguillons au dessous, nerveuse, réticulée; le contour des feuilles est sinué, à dents lâches, épineuses, approchantes des feuilles de houx. Les fleurs sont réunies à l'extrémité d'un pédoncule commun en petits fascicules ombellés.

Cette plante croît dans les Indes. Elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Dupuis. (V. f. in herb. Lam.)

La variété ♂ a les feuilles deux fois plus larges, ovales, oblongues, à cinq nervures. (V. f. in herb. Jusieu.)

#### 6. SALSEPAREILLE de Ceylan. *Smilax zeylanica*. Linn.

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis incrinibus, caulibus cordatis, ramulis ovato-oblongis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 255. n°. 5. — Flor. zeyl. 364. — Burm. Flor. ind. pag. 153. — Lam. I. illustr. tab. 817. fig. 1. — Gzertn. de Fruct. & Sem. Centur. 1. tab. 16. fig. 7.

*Smilax indica, spinosa; folio cinnamomi, pfrudochina quibusdam.* Burm. Thef. zeylan. pag. 22.

*China ambonensis.* Rumph. Amboin. vol. 5. pag. 457. tab. 161.

*Kari-vilandi.* Rheed, Malab. vol. 7. pag. 59. tab. 31.

♂ *Smilax (indica), caule angulato; foliis subrotundis, quinque-nerviis.* Duham. Arb. édit. de Michel. vol. 1. pag. 242. n°. 6.

Ses tiges sont glabres, striées, presque cylindriques, médiocrement anguleuses, armées d'aiguillons qui manquent quelquefois sur les rameaux, garnies de feuilles alternes, pétiolées, coriaces, ovales, quelquefois presque rondes,



échancrées en cœur à leur base, entières à leurs bords, les supérieures ovales oblongues, les unes obtuses, d'autres acuminées, glabres à leurs deux faces, marquées de cinq nervures longitudinales, & d'autres plus fines, saillantes, disposées en réseau.

Les fleurs sont disposées en petites ombelles axillaires, supportées par un pédoncule commun, simple, très-court, & par des pédoncules partiels assez nombreux. Le fruit est une baie noirâtre, ovale, à trois lobes.

Cette plante croît dans les Indes orientales, à l'île de Ceilan & dans celle de Madagascar. (V. f. in herb. Jusieu.)

7. *SALSEPAREILLE* officinale. *Smilax sa-saparilla*.

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis inermibus, ovatis, retuso-mucronatis, trinerviis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 355. n°. 4. — Mater. medic. 214. — Miller, Dict. n°. 5. — Blackw. tab. 393. — Regnault, Botan. Icon. — Lam. Illustr. Gener. tab. 817. fig. 1.

*Smilax caule angulato, aculeato; foliis ovatis, acutis, inermibus.* Royen, Lugd. Bat. 228.

*Smilax caule angulato, aculeato; foliis dilatato-cordatis, inermibus, acutis.* Hort. Cliffort. 439. — Gronov. Virgin. 120. 156.

*Smilax viticulis asperis, virginiana; folio hedgeraco, leni, zarza, nobilissima.* Plukenet, Almag. pag. 348. t. b. 111. fig. 2. — Rai, Suppl. 345.

*Smilax aspera, peruviana, seu sarsaparilla.* C. Bauh. Pin. 296.

*Smilax caule subangulato, spinoso; foliis cordatis, inermibus, trinerviis; petiolis triquetris, asperis; radicibus teretibus, geniculatis; bacis globosis, caruleis, monospermis.* Walter. Flor. Carol. 245. — Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 243. n°. 13.

Ses racines sont grêles, très-longues, souples, entortillées; ses tiges longues, roussâtres, anguleuses, très-glabres, rameuses, armées d'aiguillons assez forts, élargis, droits, aigus, garnis de feuilles pétiolées, alternes, coriaces, glabres, & dépourvues d'aiguillons à leurs deux faces; ovales, élargies, échancrées en cœur & presque auriculées à leur base; courtes, obtuses, mucronées, entières à leurs bords, de trois à cinq nervures, & dont les pétioles sont munis à leur base de deux vrilles capillaires.

Les pédoncules communs sont plus longs du double environ que les pétioles, simples, droits, terminés par des fleurs en ombelle, assez nombreuses, soutenues par des pédoncules partiels,

courts. Les calices sont petits, blanchâtres, à six folioles obtuses, presque droites.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique, au Mexique, au Pérou, dans le Brésil & la Virginie. (V. f. in herb. Lam. & Juss.)

Les racines de cette espèce, & sans doute de plusieurs autres sous le même nom, ont joui autrefois d'une grande réputation comme un puissant sudorifique, propre à opérer la dépuration des humeurs, à diviser & atténuer les visqueuses; c'étoit en conséquence un spécifique dans les maladies vénériennes; ces remèdes, qui paroissent en effet avoir eu quelques succès dans l'Amérique, n'ont pas aussi bien réussi en Europe, soit à raison de la diversité des climats, soit parce que les racines perdent leurs propriétés par la dessiccation & en vieillissant. Au reste, l'analyse n'y a trouvé aucun principe très-actif; & pour la dépuration du sang, nous avons dans la bardane, la chicotée, la patience, & des remèdes bien supérieurs, sans aller chercher dans un autre hémisphère des plantes d'une vertu douteuse.

8. *SALSEPAREILLE* persoliée. *Smilax persoliata*. Loureiro.

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis acutis, quinque-nerviis; stipulis cordatis, persoliatis.* Loureiro, Flor. cochinch. pag. 763. n°. 1.

Ses racines sont grosses, tubéreuses, arrondies, noueuses, brunes en dehors, plus pâles en dedans; elles poussent un grand nombre de fibres droites, simples, très-longues, horizontales.

Ses tiges sont longues, grimpantes, anguleuses, rameuses, armées d'aiguillons nombreux, courts, épars, garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, presque en cœur, grands, sans épines, glabres à leurs deux faces, entières, terminées par une pointe recourbée, marquées de cinq nervures & de veines réticulées, munies à leur base de stipules solitaires, persoliées, en cœur, soutenant sur leur pétiole deux vrilles très-longues, opposées.

Les fleurs sont dioïques, disposées en ombelles axillaires; les calices à six divisions réfléchies, renfermant six étamines, trois stigmates réfléchis, presque sessiles, auxquels succèdent de petites baies globuleuses, de couleur rouge, à trois lobes, monospermes.

Cette plante croît dans les forêts & sur les co-teaux de la Cochinchine. (V. Descript. ex Loureir.)

9. *SALSEPAREILLE* papyracée. *Smilax papyracea*.

*Smilax caule angulato; foliis ovato-oblongis, trinerviis, papyraceis & venosis.* Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. 1. pag. 242. n°. 8.

Espèce facile à distinguer par ses grandes feuilles \* inces, papyracées. Ses tiges sont anguleuses, glabres, cambrées, armées de quelques aiguillons, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, très-minces, vertes, glabres à leurs deux faces, longues de six à huit pouces, sur deux pouces & demi de large; marquées de trois nervures saillantes, & de veines élevées, agréablement réticulées; la base des feuilles est arrondie, presque tronquée, sans échancrure; leur sommet aigu, les pétioles libres, longs d'un pouce. Je ne connois ni les fleurs ni les fruits.

Cette plante a été envoyée de Cayenne par M. Bajon. *h* ? (*V. f. in herb. Lam. & Juss.*)

10. SALSEPAREILLE à feuilles de gui. *Smilax viscidifolia*.

*Smilax foliis angusto-lanceolatis, inermibus; umbellulis minimis; caule aspero, striato; ramis flexuosis, divaricatis. (N.)*

*Smilax caule angulato, foliis ovato-oblongis, inermibus, glabris, trinerviis & venosis. Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. t. pag. 243. n°. 17.*

Espèce très-remarquable par ses feuilles assez semblables à celles du gui commun, tant par leur épaisseur, que par leur forme.

Les tiges sont divisées en rameaux étalés & divergens, grêles, très-flexueux, striés, presque quadrangulaires, très-rudes sur leurs angles, garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, étroites, lancéolées, coriaces, très-épaisses, entières, glabres à leurs deux faces, sans épines; les supérieures longues d'environ un pouce & demi, sur un demi-pouce de large; je ne connois point les inférieures, qui pourroient être beaucoup plus grandes; & peut-être d'une forme un peu différente; elles sont marquées de trois à cinq nervures longitudinales, quelquefois un peu ramifiées, & de veines réticulées.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles & à la bifurcation des rameaux, en petites ombelles, dont le pétiole commun est droit, fort court; les pédoncules partiels ont à peine deux lignes de long. Les calices sont divisés en six folioles petites, aiguës, un peu verdâtres. Les étamines ont à peine la longueur du calice; leurs anthères sont petites, ovales, d'un jaune-pâle.

Cette plante se rencontre en Amérique, dans l'île Saint-Domingue. *h* ? (*V. f. in herb. Lam.*)

11. SALSEPAREILLE du Pérou. *Smilax obliquata*.

*Smilax caule subangulato, foliis triangulatis, angulis inferioribus obtusis, altero obliquo. Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. 1. pag. 242. n°. 11. — Juss. Herb.*

Cet arbruste a des racines qui se divisent de leur collet, en longs rameaux fasciculés, presque simples, chargés de quelques fibres capillaires. Ses tiges sont épaisses, striées, médiocrement anguleuses, presque tetragones, glabres, armées de quelques aiguillons, courts, recourbés; garnies de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées, triangulaires, longuement amincies à leur sommet, vertes à leurs deux faces, entières, longues de six à huit pouces & plus, larges de trois ou quatre à leur base; les deux angles inférieurs arrondis, l'un des deux plus étroit; la base tronquée ou un peu concave; trois ou cinq nervures saillantes, longitudinales, sans aiguillons. Les pétioles sont courts, un peu comprimés, munis, un peu au dessus de leur base, de deux vrilles opposées, très-longues, fortes, cylindriques. Je ne connois point la fructification.

Cette plante a été recueillie au Pérou par M. Jof. Justieu. *h* ? (*V. f. in herb. Juss.*)

12. SALSEPAREILLE à feuilles lancéolées. *Smilax lanceolata*.

*Smilax caule angulato-spinoso, foliis longis, angustis, lanceolatis inermibus. Walter. Flor. carol. pag. 245. — Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. t. pag. 242. n°. 7.*

*Smilax caule inermi, tereti; foliis inermibus, lanceolatis. ? Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 258. n°. 12.*

Les caractères qui portent, dans les espèces de ce genre, sur la présence ou l'absence des aiguillons, peuvent souvent induire en erreur, surtout lorsqu'on ne les détermine que d'après les herbiers. Celle dont il s'agit a presque toujours ses rameaux sans aiguillons, mais ses tiges en sont très-souvent munies, surtout à leur base; elles sont d'ailleurs sarmen-teuses, grimpantes, un peu anguleuses, surtout les rameaux; & garnies de feuilles alternes, pétiolées, luisantes & glabres à leurs deux faces, étroites, lancéolées & à trois nervures dans leur jeunesse; ovales, un peu oblongues lorsqu'elles sont plus anciennes, marquées de cinq nervures.

Les fleurs sont disposées en petits corymbes dans l'aisselle des feuilles; elles produisent de petites baies rouges ou de couleur écarlate, renfermant d'une à trois semences. Ces fruits durent presque pendant tout l'hiver.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale. Les individus qui naissent dans les lieux aquatiques, sont presque glabres; à peine les tiges offrent-elles quelques aiguillons: lorsqu'ils croissent dans les sols arides, ils sont beaucoup plus épineux. *h* ? (*V. f. in herb. Juss.*)

Il est très-douteux que ce soit ici la plante de Linné. La figure de Catesby, qu'il cite à l'appui, ne

convient ni à ce genre ni même à la famille, comme l'a très-bien observé M. Jaume dans l'ouvrage de Duhamel.

\* \* *Tiges cylindriques, armées d'épines.*

13. *SALSEPAREILLE* Squine. *Smilax china.*

*Smilax caule aculeato, teretiusculo; foliis inermibus, ovato-cordatis, quinquenerviis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 456. n°. 5. — Mater. medic. 214. — Mill. Dict. n°. 5. — Gmel. Iter 3. pag. 32. tab. 6. — Blackw. tab. 433.

*Smilax caule aculeato, foliis orbiculato-ovatis, inermibus, quinquenerviis.* Gronov. Orient. 317.

*Smilax formosensis, inferni aculeato; foliis fabrotundo-cordatis, trinerviis; petiolis claviculatis, alterisve.* Brown, Jsm. 359.

*Smilax minus, spinosa; fructu rubicundo; radice virtuosâ, chinâ diâ seu sankinâ.* Kœmpf. Amm. pag. 781. tab. 782.

*Smilax caule subangulato, teretiusculo; foliis retuso-acuminatis, ovato-cordatis, basi-rotundatis, quinquenerviis, supra rig. assinis.* DuRoi. Arb. édit. de Michel, pag. 239.

*China radix.* Bauh. Pin. 296.

*China michuacensis, seu smilax aspera minor.* Plum. Icon. 83.

*Fruticulus convolvulaceus, spinosus, sinicus; floribus parvis, amellis.* Pluken. Amalth. pag. 101. tab. 428. fig. 1.

Vulgairement la squine.

Ses racines sont grosses, noueuses, tuberculeuses, d'un brun-rougeâtre en dehors, blanchâtres, teintes de rouge en dedans; elles produisent des tiges longues, glabres, à peine anguleuses, presque cylindriques, rameuses, armées, surtout à la base des tiges, d'aiguillons courts & forts, garnis de feuilles alternes, coriaces, pétioles, ovales, échancrees en cœur à leur base, obtuses, acuminées à leur sommet, un peu variées dans leur forme, entières à leurs bords, sans aiguillons; marquées de cinq à sept nervures; les feuilles inférieures amples, très-grandes; les supérieures beaucoup plus petites, munies de vrilles à la base des pétioles.

Les fleurs sont axillaires, supportées par un pédoncule commun, très-simple, beaucoup plus court que les feuilles, qui soutient à son sommet un grand nombre de fleurs disposées en ombelle, munies d'un pédoncule partiel, simple, capillaire, long d'un demi-pouce & plus. Les calices sont blanchâtres ou d'un vert-jaunâtre, à six lobes; un peu réfléchies. Les fruites sont des baies arrondies, de la grosseur d'une petite prune.

Cette plante croît à la Chine & au Japon. Commenton l'a également recueillie à l'île Bourbon. h (V. f. in herb. Juss.)

Les racines sont employées en médecine, comme sudorifiques, diurétiques, propres à purifier le sang, & utiles dans la jaunisse, la goutte, les humeurs squirreuses; elles sont un peu résineuses & lorsqu'elles sont récentes, leur saveur est un peu âcre, pâteuse; mais sèches, leur goût est terreux, légèrement allringent. Des marchands chinois ont donné la vogue à cette plante pour la première fois en 1535; ils la vendent alors sous le nom de *fo-ling*, comme un spécifique contre les maladies vénériennes, bien plus efficace & moins gênante que le remède de gayac. Les Espagnols firent un si grand éloge de ses propriétés à l'empereur Charles-Quint, que ce prince en fit usage de son propre mouvement, à l'insu de ses médecins, pour le guérir de la goutte, & bientôt cette recette devint publique & en grande réputation: elle n'a aujourd'hui qu'une faible renommée. On a entièrement abandonné l'usage de ces racines dans les maux vénériens, & même comme sudorifiques & diurétiques; elles n'inspirent qu'une faible confiance.

14. *SALSEPAREILLE* à feuilles rondes. *Smilax rotundifolia.* Linn.

*Smilax caule aculeato, tereti; foliis inermibus, cordatis, acuminatis, septemnerviis.* Linn. System. Plant. vol. 4. pag. 256. n°. 6.

β. *Smilax (rotundifolia), ramis angulosis, rarius aculeatis; foliis subrotundis cordato-ovalibus, acutis, glaberrimis, quinquenerviis; bacis sphaericis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 137. — Duham. Arb. édit. de Michel, vol. 1. pag. 248. n°. 9.

Arbrisseau dont les tiges sont cylindriques, les rameaux anguleux, moins chargés d'épines que les tiges, garnis de feuilles pétioles, alternes, un peu arrondies, ovales, en cœur, très-glabres à leurs deux faces, sans épines, entières à leurs bords, aiguës ou médiocrement acuminées à leur sommet, marquées de cinq à sept nervures. Les fleurs produisent des baies sphériques.

Cette plante croît dans l'Amérique septentrionale, depuis la nouvelle Angleterre jusque dans la Virginie. h (Descript. ex Mich.)

15. *SALSEPAREILLE* à feuilles de laurier. *Smilax laurifolia.* Linn.

*Smilax caule aculeato, tereti; foliis inermibus, ovato-lanceolatis, trinerviis.* Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 259. — Gronov. Virgin. 193, 156. — Mill. Dict. n°. 13.

*Smilax ramis teretibus, subinermis; foliis coriaceis, lanceolato-oblongis, trinerviis, levigatis,*

*perfrutensibus*; umbellatis brevissimis pedunculatis; baccis globosis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 237.

*Smilax levis*, laurifolia, baccis nigris. Catesb. Carol. pag. 15. tab. 15.

*Smilax caule volubili, subangulato, infernè spinoso, foliis rigidis, perennantibus, nutantibus, trinerviis, ovato-lanceolatis, aliquando obovatis; spinis mucidè terminatis; baccis globosis, conglomeratis, nigris, monispermis.* Walther. Flor. carol. 244.

*Smilax caule inermi, teretiusculo, foliis inermibus, lanceolato-oblongis, levigatis, coriaceis, trinerviis.* Duham. Arbr. édit. de Michel, vol. 1. pag. 269.

Arbrisseau dont les tiges sont grimpantes, cylindriques, glabres, médiocement striées, rameuses; les rameaux un peu flexueux vers leur sommet, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lisses, très-fermes, coriaces, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, lancéolées, oblongues, un peu rétrécies à leur base, légèrement acuminées ou obtuses à leur sommet, assez semblables à celles du laurier, marquées de trois nervures. Ces feuilles varient un peu selon leur âge; elles sont plus larges dans leur jeunesse, moins épaisses.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles en petites ombelles, dont le pédoncule commun est de la longueur des pétioles; les pédoncules partiels un peu plus courts, les fleurs dioïques, dont le calice est à six folioles réfléchies en dehors; l'ovaire ovale, qui produit des baies noires, globuleuses, renfermant d'une à trois semences.

Cet arbrisseau croît dans la Virginie, la Floride & la basse Caroline. 1) (V. f. in herb. Juss.)

16. *SALSEPARILLE tamnoide. Smilax tamnoidea.* Linn.

*Smilax caule aculeato-tereti, foliis inermibus, cordatis, oblongis, septemnerviis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 257. n°. 8. — Miller, Dict. n°. 4.

*Smilax bryonia nigra foliis, caule spinoso, baccis nigris.* Catesb. Carol. 1. pag. 52. tab. 52.

Cette plante a des tiges souples, cylindriques, articulées, grimpantes, hautes de vingt pieds & plus; rameuses, armées d'épines, un peu flexueuses à leur sommet, garnies de feuilles alternes, pétiolées, oblongues ou élargies, variables dans leur forme, échancrées en cœur à leur base, glabres à leurs deux faces, marquées de sept à neuf nervures, munies de vrilles simples à la base des pétioles.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en ombelles touffues, dont le pédoncule commun est long, grêle, terminé par un très-

grand nombre de rayons ou de pédoncules partiels, inégaux. Les fruits sont des baies noires, arrondies, fermes, pendantes, qui ne ferment qu'une seule semence dure & globuleuse.

Cette plante croît dans la Caroline. 7)

Les habitants de la Caroline, au rapport de Catesb., mangent au printemps les jeunes pousses de cette plante comme des asperges, & ils font avec les racines une boisson à laquelle ils attribuent de grandes vertus, & particulièrement celle de purifier le sang. Ces racines sont tubéreuses, divisées en plusieurs nœuds. Quand on les tire de terre, elles sont tendres & pleines de suc; mais elles deviennent à l'air aussi dures que du bois.

17. *SALSEPARILLE à feuilles caduques. Smilax caduca.* Linn.

*Smilax caule aculeato, tereti; foliis inermibus, ovatis trinerviis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 257. n°. 9. — Miller, Dict. n°. 6. — Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 244.

Ses tiges sont fortes, grimpantes, cylindriques, glabres, armées d'épines courtes, & s'élèvent à plus de trente pieds sur les arbres auxquels elles s'accrochent. Ses feuilles sont coriaces, épaisses, ovales, glabres à leurs deux faces, échancrées en cœur à leur base, point épineuses, entières à leurs bords, aigües, acuminées à leur sommet, longues d'environ cinq pouces, sur trois & demi de large à leur base & marquées de trois nervures.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne & dans les contrées méridionales de l'Amérique. 7)

18. *SALSEPARILLE à feuilles cuspidées. Smilax cuspidata.*

*Smilax caule subcylindrico; foliis trinerviis, majoribus ovatis; margine inermi.* Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 242. n°. 10.

*China altera, aculeata; foliis oblongis, cuspidatis.* Plum. Amer. icon. 85.

C'est une très-belle espèce, dont les tiges sont ligneuses, glabres, presque cylindriques, à peine anguleuses, armées d'aiguillons courts, garnies de feuilles alternes, très-amples, épaisses, coriaces, ovales, oblongues; les supérieures lancéolées, plus petites, marquées de trois nervures principales, saillantes, & de deux autres moins sensibles, nulles dans les feuilles supérieures, réticulées, entières à leurs bords, un peu échancrées en cœur à leur base, obtuses ou acuminées à leur sommet; les feuilles inférieures longues de huit à dix pouces & plus, larges de quatre à cinq pouces, glabres à leurs deux faces, sans aiguillons; supportées par un pétiole court, contourné, strié, muni de deux vrilles opposées.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles portées sur un pédoncule commun, un peu plus long que le pétiole, divisé à son sommet en pédoncules partiels, nombreux, courts, presque en ombelle. Les fruits sont médiocrement acuminés.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, d'où elle a été rapportée par M. Leblond. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

19. SALSEPAREILLE glauque. *Smilax glauca*. Mich.

*Smilax ramis subteretibus, passim aculeatis; foliis quasi cordato-ovalibus, acuminatis, glabris, subius glaucis, quinquenerviis; umbellulis longipetiolatis pedunculatis, floribus parvis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 237. — Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 243.

*Smilax (glauca), caule subangulato; foliis oblongo-cordatis, levibus, subnervosis, subius glaucis.* Walt. Flor. amer. pag. 245.

Cette espèce a des tiges glabres, médiocrement anguleuses, divisées en rameaux cylindriques, armés d'aiguillons épars, garnis de feuilles ovales ou oblongues, presque en cœur; glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, vertes en dessus, d'une couleur glauque en dessous, marquées de cinq nervures longitudinales, peu saillantes. Les fleurs sont petites, disposées en ombelles soutenues par un long pédoncule commun.

Cette plante croît dans les forêts de la Caroline. *h*

20. SALSEPAREILLE à fleurs presque sessiles. *Smilax subsessilis* flora.

*Smilax caule aculeato, cylindrico; foliis magnis, ovatis, trinerviis; floribus subsessilibus.* Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 243. n° 15.

Belle espèce, dont les tiges sont fortes, cylindriques, glabres, finement anguleuses, armées d'épines distantes, assez fortes, rameuses, garnies de feuilles grandes, alternes, médiocrement pétiolées, ovales, longues de sept à huit pouces & plus, larges de quatre ou cinq, coriaces, vertes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, arrondies à leur base, à trois nervures, dont les latérales se ramifient en veinules réticulées.

Les fleurs sont ramassées, dans l'aisselle des feuilles, en petits paquets presque sessiles, ombellés, sans pédoncule commun; les pédoncules partiels très-courts, inférés sur une petite tige dure, munie de quelques petites écailles.

Cette plante a été rapportée du Brésil par Dombey. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

\*\*\* Tiges anguleuses, non épineuses.

21. SALSEPAREILLE ciliée. *Smilax bona nox*. Linn.

*Smilax caule inermi, angulato; foliis ciliato-aculeatis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 257. n° 10.

*Smilax aspera India occidentalis.* C. Bauh. Pin. 296.

*Smilax foliis latis, in margine spinosis, caroliniana; spicis quadrato.* Pluken. Almag. pag. 348. tab. 111. fig. 1.

*Smilax ramis angulosis, aculeatis; foliis hastato-lanceolatis; auribus rotundato obtusis, quinquenerviis; bacis globosis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 237. — Duham. Arbr. édit de Mich. vol. 1. pag. 242. n° 11.

*p. Smilax caroliniana, spicis quadrato latis; foliis angustis, asperis, auriculatis, ad basin angulosis.* Pluk. Almag. pag. 348. tab. 111. fig. 3.

Ses tiges se divisent en rameaux anguleux, armés d'aiguillons, garnis de feuilles hautes, lancéolées, alternes, dont les oreillettes sont arrondies, obtuses; le contour des feuilles cilié par de petites pointes piquantes; leur surface traversée par cinq nervures; leur pétiole soutenant deux stipules opposées. Ces feuilles varient; elles sont quelquefois plus larges, ovales, échancrées en cœur. Les fruits consistent en de petites baies globuleuses.

Cette plante croît sur les côtes maritimes de la Caroline & de la Floride. *h*

22. SALSEPAREILLE herbacée. *Smilax herbacea*. Linn.

*Smilax caule inermi, angulato; foliis inermibus, ovatis, septemnerviis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 258. n° 11.

*Smilax levis, marilandica; foliis hederæ nervosis, prelongis; pediculis infidentibus; flosculis minimis, in umbellam parvam congestis.* Rai, Suppl. 345.

*Smilax claviculata, hederæ folio, tota levis, & terræ marianæ.* Pluk. Almag. pag. 349. tab. 225. fig. 4.

*Smilax caule herbaceo, erecto, simplici; foliis longè petiolatis, ovalibus, septemnerviis; umbellulis longissimè pedunculatis, pedunculo compresso, bacis depressis globosis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 239. — Duham. Arbr. édit de Mich. vol. 1. pag. 244.

Ses tiges sont glabres, luisantes, droites, herbacées, point rameuses, roussâtres, sans épines, garnies de feuilles alternes, assez longuement pétiolées, minces, membraneuses, ovales, quelquefois lancéolées, luisantes & glabres à leurs

deux

deux faces, obtuses, rétrécies vers leur sommet, arrondies, entières à leur base & à leurs bords, marquées de cinq à sept nervures; les pétioles à peu près de moitié aussi longs que les feuilles, munis à leur base de deux vrilles filiformes.

Les fleurs sont axillaires, disposées en ombelle à l'extrémité d'un très-long pédoncule commun, grêle, comprimé. Les pédoncules partiels sont très-courts, presque égaux, capillaires; les fleurs très-petites, un peu verdâtres; les calices divisés en six folioles étroites, aiguës. Les fruits sont de petites baies globuleuses, un peu comprimées.

Cette plante croît dans la Pensilvanie & dans la Haute-Caroline. Elle y a été recueillie par Michaux. (V. f. in herb. Juss.)

\*\*\* Tiges cylindriques, non épineuses.

23. SALSEPAREILLE fausse quine. *Smilax pseudo-chino*. Linn.

*Smilax caule inermi, tereti; foliis inermibus, coultinis cordatis, ramis ovato-oblongis, quinque-nerviis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. p. 258. n°. 13.

*Smilax caule tereti, inermi; foliis inermibus, coultinis cordatis, ramorum lanceolatis; pedunculis longissimis*. Gronov. Virgin. 193. 156. ?

*Smilax caule tereti, inermi; foliis cordato-ovatis, acutis, inermibus; petiolis bidentatis*. Hort. Clifffort. 459. — Gronov. Virgin. 120.

*Smilax aspera, foliis trinerviis, oblongis; petiolis bicaliculatis*. Brönn. Jam. 359.

*Smilax virginiana, spinis innocuis armata; latis canella foliis, radice orundinacea, crassa, nodosa & cornosa*. Pluken. Almag. p. 349. tab. 110. fig. 5.

*Smilax aspera, fructu nigro; radice nodosa, magna, levi, forinacea*. Sloan, Jam. 105. Hill. 1. pag. 31. tab. 413. fig. 1.

*Smilax aspera, nodosa; radice rubra, majore*. Plum. Icon. 82.

*Chino spuria, nodosa*. C. Bauh. Pin. 297.

C'est un arbrisseau grimpant, dont les tiges sont cylindriques, légèrement striées, dépourvues d'aiguillons, excepté quelques-unes à leur base; divisées en rameaux nus, un peu flexueux. Les feuilles des tiges sont grandes, larges, ovales, éhancrées en cœur à leur base; celles des rameaux plus étroites, allongées, glabres à leurs deux faces, entières, marquées de cinq nervures, un peu acuminées à leur sommet, sans épines.

Les fleurs sont disposées presque en grappes axillaires, diffusées, presque paniculées, composées de petites ombelles dont le pédoncule commun est cylindrique, long d'environ quatre pouces, muni à sa base d'une petite foliole très-courte,

Botanique, Tome VI.

épaisse; les pédoncules partiels simples, soutenant de petites fleurs d'un blanc un peu verdâtre: il leur succède de petites baies contenant deux ou trois semences.

Cette plante croît dans la Virginie, la Jamaïque, & dans une partie de la Caroline. (V. f. in herb. Juss.)

Les Chinois se servent des tiges de cette espèce pour faire des corbeilles & autres meubles de cette nature.

24. SALSEPAREILLE à très-grandes feuilles. *Smilax megaphylla*.

*Smilax foliis amplioribus, cordatis; auribus rotundatis, globosis, venosis*. Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 244.

*China altera, non oculata; foliis amplioribus*. Plum. Mff. 5. tab. 138.

*Smilax caule inermi, tereti; foliis inermibus, cordatis, emarginatis*. Burm. Amer. pag. 73. tab. 84.

Cette espèce, remarquable par la grandeur de ses feuilles, a des racines nouvelles, tuberculeuses, d'où sortent de longues fibres filiformes, très-simples: il s'en élève des tiges droites, glabres, cylindriques, sans épines, articulées; les articulations saillantes, munies d'écaillés, garnies de feuilles pétioolées, alternes, très-amplies, larges de huit à dix pouces & plus, ovales, éhancrées fortement en cœur à leur base; les deux oreillettes arrondies, épaisses, coriaces, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, sans aiguillons, marquées de cinq nervures longitudinales, & d'autres transverses, ondulées. Les pétioles sont courts, épais, supportant deux vrilles simples, très-longues. Les fleurs sont disposées en ombelle dans l'aisselle des feuilles.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale; elle a de grands rapports avec le *Smilax salisparilla*, dont elle n'est peut-être qu'une variété à très-grandes feuilles. (V. f. in herb. Juss.)

25. SALSEPAREILLE à feuilles de ramanus. *Smilax tomiifolia*. Mich.

*Smilax caule herbaceo, scandente; foliis longi petiolatis, quasi triangularibus cordatis, rotundato-obtusis; nervis glabris*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 238. — Duham. Arbr. édit. de Mich. vol. 1. pag. 244.

*Smilax caule tereti, inermi; foliis inermibus, coultinis cordatis, ramis lanceolatis, pedunculis longissimis*. Gronov. Virgin. ?

Ses tiges sont grimpantes, herbacées, cylindriques, dépourvues d'aiguillons, garnies de feuilles dont la forme est un peu variable, presque trian-

ooo

gulaires; celles des tiges, en cœur, arrondies à leurs angles inférieurs, obtuses à leur sommet; les feuilles supérieures, plus allongées, plus étroites, lancéolées, marquées de nervures glabres.

Cette plante se rencontre dans la Caroline. ?  
(*Descript. ex Mich.*)

26. *SALSEPARILLE* pulvérulente. *Smilax pulverulenta*. Mich.

*Smilax caule herbaceo, scandente; foliis longe petiolatis, eximie cordatis, sensim acuminate, novem-nerviis; umbellulis longissimè pedunculatis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 238.

Ses tiges sont droites, herbacées, à pelne grimpances, simples, cylindriques, un peu comprimées à leur partie inférieure, anguleuses à leur partie supérieure, glabres, sans épines, hautes d'environ un pied, point rameuses, sans villes, excepté vers leur sommet, où elles sont très-courtes. Les feuilles sont, les unes ovales, en cœur; d'autres, plus étroites, lancéolées, longuement pétiolées, les inférieures alternes, les supérieures presque verticillées; membranées, entières, glabres à leur face supérieure, à neuf nervures, obtuses ou un peu mucronées, couvertes en dessous de petits poils très-courts, épars, qui ne paroissent, à l'œil nu, que comme une petite poussière blanche; les pétioles presque aussi longs que les feuilles, glabres, striés.

Les fleurs sont solitaires, portées sur de très-longes pédoncules roides, striés, aplatis, fixés dans l'aisselle des feuilles; quelquefois ces dernières sont remplacées par une membrane oblongue, vaginale, bifiée, très-mince, caduque. Les pédoncules communs sont terminés par un grand nombre de fleurs fasciculées, en ombelle, soutenues par des pédoncules partiels, inégaux, simples, uniflores. Le calice se divise en six découpures réticulées. Les étamines sont à peine aussi longues que les divisions du calice; les anthères, d'un jaune-pâle. Les fruits font des baies arrondies, bleuâtres.

Cette plante a été observée & recueillie par Michaux, dans la Basse-Caroline & au Canada. ? (V. f. in herb. Juss.)

27. *SALSEPARILLE* pubescente. *Smilax pubera*. Michaux.

*Smilax univèrse pubens, caule tereti, inermi; foliis ovali-cordatis; obtusis, quinquenerviis; umbellulis breviter pedunculatis, floribus brevissimè pedicellatis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 238.

*Smilax (pumila), caule subtereti, subpiloso, fruticoso; foliis petiolatis, cordatis, quinquenerviis; subius hirsutis*. Walter. Flor. carol. pag. 244. ?

*Smilax caule inermi, vix volubili; foliis cordatis,*

*subtus hirsutis; bacis albidis*. Duhamel, Aïbr. & Arbustes, édit. de Michel, pag. 240.

Ses tiges sont presque cylindriques, pubescentes, légèrement tomenteuses, frutescentes, sans aiguillons, peu élevées, hautes d'environ un pied, divisées en rameaux étiolés, noirâtres, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, quelquefois oblongues, un peu échancrées en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, souvent munies d'une pointe particulière, glabres à leur face supérieure, cendrées, velues & tomenteuses en dessous, sans aiguillons, entières, marquées de trois à cinq nervures longitudinales, réticulées.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites ombelles, dont les pédoncules communs, à peine plus longs que les pétioles, sont velus, droits, terminés par des pédoncules partiels fort courts, uniflores, pubescents. Les calices sont glabres, à six folioles obtuses, ouvertes en étoile; les étamines, plus courtes que les calices, ont des anthères d'un blanc jaunâtre: les fruits sont ovales, blanchâtres, à une seule semence.

Cette plante croît dans la Caroline méridionale, où elle a été observée par Michaux. ? (V. f. in herb. Lam. & Juss.)

Observations. Outre les espèces de salsepareille que je viens de présenter, on en trouve encore quelques autres, décrites par Miller dans son *Dictionnaire des Jardiniers*, qui ne me sont point connues, & qui n'ont point été citées par les autres botanistes. Je me bornerai à les présenter ici avec les observations de cet auteur. Peut-être que plusieurs d'entr'elles pourroient appartenir à quelques-unes des espèces ci-dessus mentionnées.

\* *SALSEPARILLE* à feuilles d'astiloloch. *Smilax aristolochiasifolia*.

*Smilax caule aculeato, tereti; foliis inermis, sagittatis, obtusiusculis, trinerviis*. Miller, Dict. n°. 7.

*Smilax aspera, aristolochiasifolia longioribus, ad basin auriculatis*. Hoult. Mif.

Cette plante a une tige épaisse, cylindrique, épineuse, qui grimpe sur les arbres voisins, & s'élève à la hauteur de trente ou quarante pieds. Ses feuilles sont épaisses, roides, sans épines, de sept pouces de longueur, avec deux oreillettes arrondies à leur base, larges de trois pouces & demi, obtuses à leur sommet, marquées de trois veines longitudinales, & supportées par des pétioles courts.

Cette espèce croît naturellement à la Vera-Cruz, dans la Nouvelle-Espagne. ?

\* *SALSEPARILLE* épineuse. *Smilax spinosa*.

*Smilax caule aculeato, tereti; foliis ovato-lanceolatis; nervis foliorum inferius aculeatis.* Miller, Dict. n°. 8.

*Smilax viticulis asperis, foliis oblongis, nervis foliorum spinosis.* Hoult. Mill.

Cette espèce a des tiges grêles, cylindriques, épineuses, qui s'attachent, au moyen de leurs vrilles, à tous les corps voisins, & s'élèvent ainsi à la hauteur de huit à dix pieds. Ses feuilles sont ovales, en forme de lance, de quatre pouces & demi de longueur, sur deux & demi de large dans leur milieu; elles n'ont point d'épines sur leurs bords, mais leur côte principale & leurs nervures sont armées d'épines courtes & rougeâtres.

Cette plante croît à la Vera-Cruz & dans la Nouvelle-Espagne.

\* **SALSEPAREILLE** de Virginie. *Smilax virginiana.*

*Smilax caule aculeato, angulato; foliis lanceolatis, inermibus, acuminatis.* Miller, Dict. n°. 9.

*Smilax viticulis asperis, virginiana; foliis angustis, levibus, nullis auriculatis præditis.* Pluken. Phyt. tab. 110. fig. 4.

Ses tiges sont minces, anguleuses, épineuses; ses feuilles en forme de lance, terminées en pointe aiguë, de trois pouces de longueur sur six de large, sans épines; leur base est un peu arrondie, sans oreillettes; elles sont glabres à leurs deux faces.

Cette plante croît à la Jamaïque & dans la Virginie.

\* **SALSEPAREILLE** à feuilles de canelle. *Smilax canellifolia.*

*Smilax caule inermi, tereti; foliis inermibus, ovatis, trinerviis.* Miller, Dict. n°. 10.

Cette espèce me paroît avoir de très-grands rapports avec le *Smilax pseudochina* Linn. Ses racines sont épaisses, charnues & rampantes; ses tiges, cylindriques & sans épines, grimpent sur les arbres & les buissons voisins, & s'élèvent à la hauteur de dix à douze pieds. Les feuilles sont ovales, terminées en pointe obtuse, de cinq pouces de long sur trois de large, munies de trois nervures longitudinales, sans épines.

Cette espèce se rencontre à la Jamaïque.

\* **SALSEPAREILLE** à tiges basses. *Smilax humilis.*

*Smilax caule inermi, tereti; foliis inermibus, ovato-cordatis, trinerviis; floribus corymbosis.* Mill. Dict. n°. 11.

*Smilax humilis, non spinosa; foliis aristolochia, bacis rubris.* Catesb. Carol. 1. pag. 47.

Ses tiges sont cylindriques, sans épines, de trois à quatre pieds de haut, garnies de feuilles ovales, en cœur, arrondies à leur sommet, longues d'environ trois pouces sur deux de large, marquées de trois veines longitudinales. Les fleurs sont disposées, dans les aisselles des feuilles, en petits corymbes ou en paquets arrondis; soutenus par des pédoncules courts; il leur succède des baies rouges & globuleuses.

Cette plante croît naturellement dans la Caroline; elle paroît se rapprocher du *Smilax herbacea*.

\* **SALSEPAREILLE** à tige carrée. *Smilax tetragona.* Linn. f.

*Smilax caule inermi, tetragono; foliis cordatis, quinquenerviis, acuminatis, inermibus.* Linn. f. Suppl. pag. 427.

Ses tiges sont tétragones, flexueuses dans toute leur longueur, garnies de feuilles en cœur, étroites, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, marquées de cinq nervures longitudinales, soutenues par des pétioles courts, de la longueur des oreillettes des feuilles, sans vrilles.

La patrie de cette plante n'est pas connue. Linné fils l'a mentionnée d'après un individu cultivé au Jardin d'Uptal, mais qui n'a point fleuri.

\* *Smilax (oblongata), foliis oblongis, acuminatis, glabris, trinerviis; nervis subius aculeatis.* Sw. Prodr. pag. 59.

\* *Smilax (variegata), foliis subcordatis, spinosociliatis; costâ subius spinosa.* Walter, Flor. carolin. pag. 244.

\* *Smilax (auriculata), foliis quinquenerviis, oblongis, auriculatis, obtusis, spinâ terminatis.* Walt. Flor. carol. pag. 245.

\* *Smilax (inermis), caule annuo, infermo; foliis inferioribus verticillatis, superioribus salutaris, cordatis, subquinquenerviis.* Walter, Flor. carolin. pag. 244.

**SALSIFIS.** *Tragopogon.* Genre de plantes dicotylédones, composées, semi-flosculeuses, de la famille des chicoracées, qui a de grands rapports avec les scorfonères & les *tragopogon*, qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, quelques-unes exotiques, à feuilles entières, à fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice simple alongé; des fleurs semi-flosculeuses, toutes hermaphrodites; des semences surmontées d'une aigrette plumbeuse, en soie d'araignée; un réceptacle nu.



## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes composées de demi-fleurons hermaphrodites, réunies dans un calice commun.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, simple, composé d'environ huit folioles lancéolées, égales; les intérieures alternes, toutes réunies par leur base.

2°. Une corolle composée de demi-fleurons imbriqués, nombreux; les extérieurs plus longs que ceux du centre; chacun d'eux tubulé, prolongé par une languette tronquée, divisée en cinq dents à son sommet.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments sont très-courts, capillaires, surmontés d'anthères allongées, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates réfléchis en dehors.

Les semences sont nues, enveloppées par le calice, renflé inférieurement, rétréci & cilié à son sommet; elles sont solitaires, allongées, anguleuses, rudes, presque tuberculeuses, rétrécies à leurs deux extrémités, terminées par un pédicule tubulé, qui supporte une aigrette plane, plumeuse, ouverte en étoile.

Le réceptacle est nu, plane, rude au toucher.

Observations. Ce genre est distingué des *Scorfonera* par ses calices simples, entiers à leur base, ordinairement partagés en huit folioles égales, plus ou moins profondément divisées, tandis que le calice des *Scorfonera* est composé d'écailles imbriquées, scarificées à leurs bords; il ne peut pas être confondu avec les *Geropogon*, dont le réceptacle est garni de paillettes.

Scopoli a séparé quelques espèces de ce genre pour en composer un genre nouveau, sous le nom d'*arisperrum* (barbouquine), le même que l'*aropogon* de Willdenow, & qui doit réunir le *tragopogon picroides* & le *tragopogon Dalechampii* Linn.

Leurs calices sont urcéolés, divisés bien moins profondément en huit découpures; les semences sont élongées transversalement; leur aigrette est supportée par un pédicule fistuleux, en forme de corne, ventru inférieurement, persistant.

Le meilleur de ces caractères consisteroit dans les semences, striées transversalement, si elles ne l'étoient également plus ou moins dans les autres espèces de *tragopogon*. Le caractère des supports de l'aigrette est assez remarquable; mais peut-il former un caractère générique? Quant aux divisions plus ou moins profondes du calice, ces proportions de grandeur & de forme ne peuvent guère être employées que pour distinguer les espèces.

Quelques-unes de ce genre, surtout les premières, se rapprochent tellement, qu'on a bien de la peine à y établir des différences. Linné les a établies sur les proportions de la corolle, relativement à la longueur du calice. Ce caractère est si peu constant, que je l'ai souvent vu varier dans les fleurs d'un même individu, surtout dans le *tragopogon pratense*. Leur port varie encore davantage, selon la nature du sol où croissent ces plantes, & leurs feuilles ont un développement dans les terrains favorables, qui rendent ces espèces presque méconnaissables.

## E S P È C E S.

1. *Salsifis* des prés. *Tragopogon pratense*. Linn.

*Tragopogon calicibus corolla radium aquantibus, foliis integris, striatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1109. — Mater. medic. 178. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 1. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 946. — Neck. Gallob. pag. 322. — Pollich, Pal. n°. 722. — Martusch, Sil. n°. 544. — Verr. Naff. 234. — Ludw. Eck. tab. 49. — Knorr. Dell. 2. tab. T. 3. — Kniph. Centur. 9. n°. 91. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 77. n°. 74. 111. — Idem, Illustr. Gener. tab. 646. fig. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 157. — Gouan, Monsp. 404.

*Tragopogon calicibus flosum superantibus*. Hort. Cliffort. 382. — Flor. suec. 648. 684. — Royen, Lugd. Bat. 119. — Daub. Paris. 142.

*Tragopogon foliis gramineis, carinatis, amplexicaulibus, caudatis, suberectis; calice, flore aequali*. Haller, Helv. n°. 8.

*Tragopogon pratense, luteum, majus*. C. Bauh. Pin. 274. — Tournef. Inst. R. Herb. 477. — Magn. Botan. Monsp. 259. — Garid. Aix. 469.

*Tragopogon calicibus flosum superantibus; foliis gramineis*. Sauvag. Monsp. 82.

*Tragopogon flos luteo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1059.

*Tragopogon*. Dodon. Pempt. 256. Icon. — Fusch, Hist. 817. Icon.

*Tragopogon pratense, luteum, minus*. Tournef. Inst. R. Herb. 477. — Morif. Hort. reg. Bles. — Garid. 469.

Vulgairement salsifis des prés, barbe de bouc.

Cette plante a des racines fusiformes, charnues, lacteuses, ainsi que les feuilles & les tiges; ces dernières sont simples ou rameuses, hautes d'un à trois pieds, glabres, fistuleuses, striées, garnies de feuilles alternes, sessiles, très-lisses, étroites, longues, pointues, élargies, amplexicaules & même vaginales à leur base, très-rétrécies & presque graminiformes à leur partie supérieure,

un peu ondulées à leurs bords, marquées dans leur milieu d'une nervure blanche.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité d'un long pédoncule un peu tendu à son sommet. Les calices sont glabres, simples, lancéolés, acuminés; la corolle jaune, aussi longue que le calice, quelquefois plus courte; les anthères brunes, ainsi que le dessous des languettes de la circonférence sur les filices.

Cette plante est très-commune dans les prés. ♂

Il ne faut pas confondre cette plante avec le salifis noir d'Espagne, qui est une scorfonère (*scorfonera hispanica*) que l'on cultive comme comestible, ainsi que le salifis blanc (*tragopogon porrifolius*) : celle dont il est ici question passe pour apéritive; elle est remplie d'un suc laiteux fort doux. On en mange dans le Nord les jeunes pousses, les feuilles & les racines, pourvu que ces dernières soient enlevées de terre avant la pousse des feuilles. Leur goût approche beaucoup de celui du salifis des jardins ou scorfonère d'Espagne. Cette plante est très-bonne dans les pâturages : tous les bestiaux la mangent, excepté les chèvres; elle est incommode dans les prés, parce qu'elle sèche difficilement.

## 2. SALSIFIS variable. *Tragopogon mutabilis*. Jacq.

*Tragopogon calicibus otophyllis, corolla radium aquantibus; foliis integris, strillis, lanceolato-acuminatis*. Jacq. Miscell. 2. pag. 316. — Plant. rar. Icon. Centur. 2. tab. 20.

Toutes les parties de cette plante sont laiteuses & glabres. Ses tiges sont droites, cylindriques, très-rameuses depuis leur base jusqu'à leur sommet, garnies de feuilles sessiles, entières, lancéolées, acuminées, très-finement denticulées ou simplement scabres à leurs bords, un peu ondulées, les inférieures ont presque un pied de longueur, sur deux pouces de large.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau, un peu odorantes, soutenues par de longs pédoncules simples. Les calices sont composés de huit folioles verdâtres, alternativement internes & externes; les demi-fleurs qui composent la corolle se développent successivement, varient en longueur, & sont ordinairement de couleur blanche, quelquefois rose, avec des filices rougeâtres. Les anthères sont jaunâtres, avec des filices brunes, les stigmates jaunes; les semences glabres, cendrées, surmontées d'une aigrette pédicellée, plumeuse, en toile d'araignée, avec cinq poils particuliers plus longs.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♂ (*Descript. ex Jacq.*)

## 3. SALSIFIS à feuilles ondulées. *Tragopogon undulatum*. Jacq.

*Tragopogon calicibus corolla radium aquantibus; foliis integris, sublinearibus; caulibus maxime undulatis*. Jacq. Miscell. 2. pag. 317. — Plant. rar. Icon. Centur. 1. tab. 19.

Ses racines sont fusiformes, de la grosseur du doigt; ses tiges sont droites, hautes de quatre à sept pouces, revêtues d'un duvet lanigineux caduc, garnies de feuilles linéaires, lancéolées, aiguës, sessiles, amplexicaules, rudes à leurs bords; les inférieures longues d'un pied; les supérieures plus étroites, ondulées.

Les fleurs sont foliaires à l'extrémité des rameaux; les calices composés de huit à treize folioles, de la longueur des demi-fleurs de la circonférence; ceux-ci sont d'une couleur de soufre clair; les semences rudes, cendrées, surmontées d'aigrettes plumeuses, médiocrement pédicellées. Ces fleurs sont plus grandes que celles du *tragopogon orientale*, avec lequel cette plante a beaucoup de rapports. Elle est très-laiteuse.

Cette plante croît dans l'Asie, sur le mont Taurus. ♂ (*Descript. ex Jacq.*)

## 4. SALSIFIS à grandes fleurs. *Tragopogon majus*. Jacq.

*Tragopogon calicibus corolla radio longioribus; foliis integris, strillis; pedunculis spernè incrassatis; corollulis ad apicem rotundatis*. Jacq. in litt. Flor. aust. vol. 1. tab. 29.

*Tragopogon dubium*. Scopul. Flor. carn. edit. 2. n°. 947.

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *tragopogon pratensis* & le *tragopogon porrifolius*; elle a les feuilles roides, simples, entières, glabres de la première; elle en diffère par ses calices plus longs que les demi-fleurs de la circonférence; ce dernier caractère la rapproche du *tragopogon porrifolius*, ainsi que ses pédoncules très-épais; elle n'est donc essentiellement distinguée de ces deux plantes que par ses demi-fleurs dont le sommet est arrondi, tandis qu'il est tronqué dans les autres espèces; elle est encore d'une grandeur remarquable; mais le port de *tragopogon* varie considérablement, & il est difficile d'établir, d'après lui, de bons caractères.

Cette plante croît dans l'Autriche.

## 5. SALSIFIS blanchâtre. *Tragopogon canum*. Willden.

*Tragopogon calicibus otophyllis, radium corolla subaquantibus; pedunculisque tomentosis; foliis linearibus, strillis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1493. n°. 5.

*Tragopogon casus*. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Cette plante a des tiges très-rameuses, diffusées, éralées, garnies de feuilles roides, linéaires, nerveuses, point ondulées. Les pédoncules & les jeunes rameaux sont chargés d'un duvet blanc, tomenteux. Les calices, également tomenteux, sont composés de huit folioles de la longueur de la corolle ou un peu plus courtes; les corolles d'un jaune-pâle.

Cette plante croît dans les prés de la Hongrie. ♂

6. *SALSIFIS* à feuilles de portreau. *Tragopogon porrifolium*. Linn.

*Tragopogon calicibus corolla radio longioribus; foliis integris, striatis; pedunculis superne incrassatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1110. — Hort. Upsal. 243. — Mûler, Dict. n°. 3. — Kniph. Centur. 7. n°. 93. — Lamarck, Flor. franç. vol. 2. pag. 79. n°. 74. — Hoffm. Germ. 272.

*Tragopogon foliis graminis, amplexicaulis; calice florum superante*. Haller, Helv. n°. 9.

*Tragopogon purpureo-caruleum, porrifolium, quod arisi vulgo*. Tournet. Inst. R. Herb. 477. — C. Bauh. Pin. 274. — Morlet. Oxon. Hist. 3. pag. 8. 5. 7. tab. 9. fig. 5.

*Tragopogon altissimum, seu barba hirci*. Dalech. Hist. 1. pag. 1079. Icon.

*Barba hirci altera*. Camer. Epit. 313.

*Barbula hirci purpureo carulea*. Tabern. Icon. 595. *Tragopogon calicibus florum purpureo-caruleum superantibus; foliis graminis*, Sauvag. 82.

♂. *Tragopogon folio oblongo, sinuato*. C. Bauh. Pin. 274.

Vulgairement *salsifis* blanc, *salsifis* des jardins, *serfishis*.

Cette espèce se distingue à ses corolles d'un pourpre violet, plus courtes que les calices, & à ses feuilles qui approchent assez de celles des portreaux.

Ses racines sont blanches en dehors & en dedans, fusiformes, charnues; ses tiges droites, hautes de deux à trois pieds, lisses, cylindriques, fistuleuses, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes, amplexicaules, très-alongées, un peu étroites, glabres à leurs deux faces, très-aiguës, creusées en gouttière à leur base, droites, entières; celles du bas un peu coroneuses à leur insertion.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par de longs pédoncules striés, fistuleux, très-verdiss à leur sommet. Les calices sont gla-

bres, plus longs que la corolle, composés de huit à dix folioles lancéolées, acuminées. La corolle varie pour le fond de ses couleurs, d'un pourpre violet plus ou moins foncé. Dans la variété ♂ des feuilles sont sinuées.

Cette plante croît en Suisse, dans les départemens méridionaux de la France; je l'ai recueillie dans les environs d'Aix & de Marseille. ♂ (V. v.)

On cultive cette plante dans les jardins. Ses racines fournissent un aliment sain & léger; elles passent pour diurétiques, apéritives & pectorales. On les croît inférieures à celles du *salsifis* noir d'Espagne (*scorfonera hispanica*), également cultivée.

7. *SALSIFIS* d'Orient. *Tragopogon orientale*. Linn.

*Tragopogon calicibus corolla radio brevioribus; foliis integris, subnauclatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 612. n°. 2. — Hort. Upsl. 243.

*Tragopogon orientale, angustifolium; flore maximo, luteo*. Tournet. Coroll. 36.

*Barba hirci*. Camer. Epitom. 312. Icon.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *tragopogon pratensis*; elle en diffère par ses fleurs plus grandes, par les calices, dont les folioles paroissent comme articulées ou coupées à l'endroit où elles se réfléchissent; par ses corolles plus longues que les calices.

Ses tiges sont glabres, droites, épaisses, cylindriques, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, presque ensiformes, glabres à leurs deux faces, un peu ondulées à leurs bords, aiguës, acuminées.

Les pédoncules sont droits, striés, terminaux, simples, uniflores, renflés à leur sommet; ils supportent une grande fleur, dont les calices sont composés de folioles glabres, larges, ovales, concaves, longuement subulées. La corolle est entièrement jaune; les demi-fleurs de la circonférence plus longs que les calices; les anthères jaunes; les semences oblongues, striées, presque à quatre angles, un peu ailées & chargées d'apexités sur leurs angles; toutes les semences fertiles, surmontées d'une aigrette luisante, un peu rouffâtre, supportée par un long pédicule tubulé.

Cette plante croît dans l'Orient & en Perse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♂ (V. v.)

8. *SALSIFIS* du Cap. *Tragopogon capensis*. Jacq.

*Tragopogon calicibus obliquo-phyllis, venososo-panicatis, corolla brevioribus; foliis runcinatis, sessilibus, spinoso-dentatis*. Jacq. Collect. 2. pag. 320. — Icon. rar. Centur. 2. tab. 74.

*Arnorogon* (caprôus), *calicibus hispidulo-aculeatis*, *oblongatis*, *profundè pectatis*; *foliis runcinato-dentatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1497. n.º 4.

Ses racines sont rameuses, & produisent des tiges de la grosseur du doigt, longues de trois ou quatre pieds, droites, divisées vers leur milieu en rameaux presque anguleux, hérissés de poils roides & blanchâtres, garnis de feuilles sessiles, alternes, concinées, un peu aiguës à leur sommet, légèrement hispides, roides, dentées & un peu épineuses à leurs bords, mais sans être piquantes.

Les fleurs sont placées, à l'extrémité des rameaux, sur des pédoncules longs d'un demi-pied, renflés vers leur sommet, légèrement hispides, cylindriques, simples, unifoires. Le calice est vert, allongé, conique, élargi à sa base, composé d'environ huit folioles presque égales, lancéolées, aiguës, concaves, qui s'agrandissent à mesure que les fruits mûrissent, & sont chargées, sur leur dos seulement, de poils roides & blanchâtres. La corolle est jaune, composée de demi-fleurs hermaphrodites, larges d'un pouce. Les semences sont rudes au toucher, un peu courbées, surmontées d'une aigrette pédicellée, plumeuse, d'un blanc de neige; portées sur un réceptacle nu.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.  
♂ (Descript. ex Jacq.)

9. SALSIFIS à feuilles de safran. *Tragopogon crocifolium*. Linn.

*Tragopogon calicibus corolla radio longioribus*; *foliis integris*, *radicalibus pedunculisque basi villosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1110. — Gouan, Monip. pag. 405. — Idem, Illustr. 52. — Lam. Flor. Franç. vol. 1. pag. 78. n.º 74. IX.

*Tragopogon calicibus pentaphyllis*, *corolla radio longioribus*; *foliis integris*, *radicalibus pedunculisque basi villosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1494. n.º 9.

*Tragopogon purpureo-caruleum*, *crocifolium*. Tournef. Init. R. Herb. 477. — C. Bauh. Pin. 275.

*Tragopogon crocifolius montanum*, *flore nigro*, *purpureo*. Col. Epher. 1. pag. 229. tab. 230.

♂. *Tragopogon* (angustifolium), *calicibus oblongis*, *corolla radio longioribus*; *foliis integris*, *striatis*, *glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1494. n.º 8.

*Tragopogon angustifolius*. Bellar. in litt.

Quoique très-voisine du *tragopogon porrifolium*, cette espèce s'en distingue par ses tiges constamment plus basses, par ses folioles calicinales moins nombreuses, rarement au-delà de cinq; par ses demi-fleurs en bien plus petit nombre.

Ses racines sont grêles, fusiformes. Ses tiges

s'élèvent à peine à la hauteur d'un pied; elles sont droites, glabres, striées, fistuleuses, un peu rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, longues, fort étroites, très-aiguës, ressemblant un peu à celles du safran, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces; elles forment, à leur base, une gouttière qui est remplie d'un duvet blanc, surtout dans leur jeunesse.

Les fleurs sont foliales, terminales, supportées par un pédoncule droit, strié, fistuleux, un peu renflé. Le calice est glabre, plus long que la corolle, composée de cinq folioles étroites, allongées, acuminées. La corolle est de couleur violette, un peu jaunâtre dans son centre; elle est composée de deux rangs seulement de demi-fleurs.

Cette plante croît en Italie, dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Montpellier. ♂ (V. v.)

La plante a me paroit devoir appartenir, comme variété, à la précédente, dont elle diffère par ses tiges beaucoup plus basses, par ses feuilles glabres à leur base, roides, lineaires, entières; enfin par les calices composés de huit folioles. Elle croît dans les environs de Nice.

10. SALSIFIS velu. *Tragopogon villosus*. Linn.

*Tragopogon calicibus corolla radio sesquialongioribus*, *caule folisque villosis*. Linn. Syst. Vi. nt. voi. 3. pag. 613. n.º 5. — Pallas, Iter 2. pag. 332.

*Tragopogon caule tomentoso*. Hall. Gætt. 418.

Cette plante a le port, la grandeur du *tragopogon porrifolium*. On la distingue aux poils blanchâtres qui recouvrent toutes les parties.

Ses tiges sont droites, très-hautes, striées, cylindriques, très-rameuses, pubescentes, velues. De chaque aisselle des feuilles sortent des rameaux alternes, édifus, paniculés, garnis de feuilles alternes, sessiles, très-longues, entières, étroites, presque uniformes, acuminées, chargées de poils blanchâtres à leurs deux faces, mais particulièrement à leur face inférieure.

Les pédoncules sont droits, cylindriques, terminaux, velus, striés, solitaires, mais qui paroissent former, par leur ensemble, une sorte de panicule, à cause du grand nombre des rameaux. Ils supportent une seule fleur légèrement inclinée à l'époque de la floraison, & dont les calices sont légèrement velus, composés de neuf folioles étroites, allongées, très-acuminées, presque une fois plus longues que la corolle. Celle-ci est d'un jaune très-pâle, composée d'environ dix-huit demi-fleurs. Les anthères sont bunes; les semences étroites, surmontées d'une aigrette plumeuse, longuement pédicellée.

Cette plante croît en Espagne : on la trouve également dans la Sibérie. <sup>d</sup>

11. **SALSIFIS** de Dalechamp. *Tragopogon Dalechampii*. Linn.

*Tragopogon calicibus monophyllis, corollâ brevioribus, inermibus; foliis runcinatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1110. — Hort. Upf. 224. — Hort. Cliff. 282. — Sauv. Monsp. 295. — Gouan, Monsp. pag. 404. — Miller, Dict. n°. 5. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 218. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 225.

*Arnopogon* (Dalechampii), *calicibus pubescentibus, inermibus; foliis runcinato-dentatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1496. n°. 1.

*Hieracium magnum Dalechampii*. Tournef. Infl. R. Herb. 470. — Dalech. Hist. 1. pag. 569. Icon. — Shaw. Specim. n°. 332. — Garid. Atx. pag. 231.

*Hedypnois monspessulana, sive dens leonis monspessulana*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1036. Icon. Bonz. — Geln. tab. 7. fig. 63.

*Hieracium asperum, flore magno dens leonis*. C. Bauh. Pin. 127.

*Hieracium sulphureum, incisifolium, montanum*. Barhel. Icon. rar. pag. 1043. tab. 209.

*Tragopogonoides perennis, caltha folio, magno flore*. Vaill. Act. acad. m. Paris. 1721. pag. 204.

*Tragopogon verticillatum*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 77. n°. 74. VI.

C'est une très-belle espèce, qui mérite de figurer dans nos jardins parmi les fleurs des parterres, distinguée par la grandeur de sa corolle, & par les feuilles des tiges terminées ou presque verticillées lorsqu'elles existent.

Ses racines sont grêles, droites, charnues, fusiformes; elles poussent des tiges hautes à peine d'un pied, simples, droites, cylindriques, finement striées, très-rudes au toucher, fistuleuses, rarement rameuses, garnies de feuilles radicales étendues en rosette, oblongues, lancéolées, obtuses, arrondies à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, diversement échancrées à leurs bords; les unes entières, lâchement dentées; d'autres sinuées ou crénelées, déchiquetées ou à demipinnatifides, molles, vertes, légèrement velues à leur face inférieure. Les feuilles caulinaires sont plus entières, moins allongées, très-souvent au nombre de trois presque verticillées : ce sont toujours les terminales. Quand il en existe d'autres, elles sont alternes, intermédiaires entre les feuilles radicales & les trois terminales. Quelquefois les hampe sortent immédiatement de la racine, & il n'existe que des feuilles radicales.

Les pédoncules sont fort longs, nus, droits, un peu rudes, cylindriques, terminés par une seule fleur, dont le calice est ample, presque glabre, entier à sa base, divisé en cinq folioles ovales, lancéolées, un peu aiguës ou obtuses. La corolle est grande, plane, d'un jaune de soufre, de couleur purpurine, un peu rougâtre en dessous. Les semences sont noires, oblongues, tuberculées, celles de la circonférence stériles & d'un blanc luisant; toutes surmontées d'un long pédicule fuligineux, qui supporte une aigrette touffue, plumeuse, fine, foyeuse, d'une légère teinte rougeâtre.

Cette plante croît dans les champs un peu arides, dans les départements méridionaux de la France, aux environs d'Aix, de Marseille, &c. Je l'ai également recueillie sur les côtes de Barbarie.  $\times$  (V. v.)

12. **SALSIFIS** picride. *Tragopogon picroides*. Linn.

*Tragopogon calicibus monophyllis, corollâ brevioribus, aculeatis; foliis runcinatis, denticulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1111. — Hort. Cliff. 382. — Gouan, Monsp. 405. — Idem, Illustr. 52. — Miller, Dict. n°. 4. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 78. n°. 74. VII.

*Arnopogon* (picroides), *calicibus hispido-aculeatis; foliis runcinatis, denticulatis; caulibus basi dilatatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1496. n°. 2.

*Pteris calicibus simplicibus, aculeatis; foliis inermibus, hastato-sinuatis*. Hott. Upf. 241. — Sauv. Monsp. 295.

*Sonchus asper, laciniatus, creticus*. C. Bauh. Pin. 124. — Prodr. 60. — Tournef. Infl. R. Herb. 474. — Magn. Monsp. 244.

*Hieracium majus, folio sonchi, semine incurvo*. C. Bauh. Pin. 127.

*Chondrilla cretica, nomine missa, semine crispo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 1022.

Cette espèce a presque le port d'un *picris*; elle se distingue par ses alperités & par ses feuilles tronquées.

Ses tiges sont hautes d'un pied & plus, droites, fermes, médiocrement fistuleuses, cylindriques, striées, munies de quelques poils rudes, très-distans; elles se divisent en rameaux nombreux, roides, ferrés. Les feuilles inférieures sont larges, anguleuses à leur sommet, élargies, sinuées ou dentées vers leur base; celles des tiges plus étroites, oblongues, aiguës, roncées ou déchiquetées irrégulièrement, glabres à leur face supérieure, hérissées de piquans en dessous & sur leur principale nervure, finement denticulées & un peu

peu piquantes à leurs bords, amplexicaules, un peu auriculées, terminées en fer de lance.

Les fleurs sont terminales, solitaires, supportées par de longs pédoncules simples, roides, fistuleux. Les calices sont composés de folioles élargies & conniventes à leur base, concaves, rétrécies, acuminées à leur sommet, chargées d'aspérités spinuliformes, un peu crochues. La corolle est d'un jaune quelquefois un peu verdâtre, surtout à son extérieur; plus longue que les calices. Les semences sont oblongues, étroites, un peu comprimées, hérissées d'aspérités à leurs deux faces. Leur aigrette est pédiculée, d'un blanc foyeux, très-fine, plumeuse.

Cette plante se rencontre sur le bord des chemins & des vignes dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Montpellier; elle croît aussi à l'île de Crète. Q (V. v.)

### 13. SALSIFIS rude. *Tragopogon asperum*. Linn.

*Tragopogon calicibus corollæ brevioribus, hispida; foliis integris, caulinis oblongis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 111. — Sauvag. Monfp. 82. — Gouan, Monfp. 405. — M. Illustr. 52. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 77. n°. 74. IV.

*Arnopogon (asper), calicibus hispido-aculeatis; foliis integris; caulinis oblongis, basi attenuatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1497. n°. 3.

*Sonchus asper, subrotundo folio, major & minor*. C. Bauh. Pin. 124. & Prodr. 60.

*Sonchus asper, folio subrotundo*. Magn. Botan. Monfp. 244.

Cette plante a bien quelques rapports avec le *tragopogon villosus*, mais elle en est très-différente par ses tiges très-basses, très-rarement rameuses, & par ses feuilles entières, à peine sinuées.

Ses racines sont grêles, longues, fusiformes, simples, un peu blanchâtres, à peine charnues; elles poussent une tige simple, droite, courte, longue de quatre à six pouces, roide, grêle, striée; très-rarement rameuse, hérissée de pointes courtes, épineuses, recourbées. Les feuilles inférieures sont entières, un peu ovales ou lancéolées, obtuses, arrondies à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, denticulées en dents inégales, spinuliformes à leur contour, glabres à leur face supérieure, hérissées en dessous, particulièrement sur la nervure du milieu; les feuilles supérieures, plus étroites, lancéolées, aiguës, quelquefois un peu sinuées.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par un pédoncule droit, simple, hérissé. Le calice est chargé d'aspérités, divisé en folioles au nombre de six à huit, élargies à leur base, longuement acuminées, roides, ouvertes. La corolle

Botanique. Tome VI.

est jaune, plus grande que le calice. Les semences sont rudes, brunes, un peu courbées, munies d'une aigrette pédiculée, blanche, foyeuse, plumeuse.

Cette plante croît aux environs de Montpellier, dans les départemens méridionaux de la France, à Marseille & à Aix, où je l'ai recueillie. (V. v.)

### 14. SALSIFIS dandelion. *Tragopogon dandelion*. Linn.

*Tragopogon foliis ensiformibus, integris, levibus; scapis radicalibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. p. 614. n°. 9. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1495. n°. 11.

*Leontodon foliis ensiformibus, integris; calice erecto, simplici*. Gronov. Virgin. 114.

Cette plante pousse, de ses racines, des feuilles toutes radicales, glabres, longues, ensiformes, très-entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, lisses à leurs deux faces.

Du centre des feuilles s'élève une ou plusieurs hampes en place de tige, entièrement privées de feuilles, simples, droites, uniflores, pubescentes à leur partie supérieure, soutenant une fleur dont le calice est simple, à folioles droites, aiguës. Les semences sont surmontées d'une aigrette plumeuse.

Cette plante croît dans la Virginie.

### 15. SALSIFIS laineux. *Tragopogon lanatum*. Linn.

*Tragopogon foliis ensiformibus, undatis, villosis; scapis radicalibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. p. 614. n°. 10.

*Leontodon foliis ensiformibus, integris, hirsutis; calice simplici, erecto*. Amœnit. Académ. vol. 4. pag. 287.

Cette plante pousse des feuilles toutes radicales, alongées, en forme d'épée, velues, presque lanugineuses, ondulées à leurs bords, acuminées à leur sommet. De leur centre s'élève une hampe nue, ou garnie, dans son milieu, d'une petite feuille à peine sensible; elle ne supporte qu'une seule fleur dont le calice est simple, composé de folioles droites.

Cette plante croît dans le Levant & la Palestine.

### 16. SALSIFIS de Virginie. *Tragopogon virginianum*. Linn.

*Tragopogon foliis radicalibus, hystris, rotundatis; caulinis indivisis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. p. 614. n°. 11. — Gronov. Virgin. 113.

*Tragopogon foliis lanceolatis, sessilibus, amplexi-*  
P p p

*caulibus, dentatis; caule ramoso.* Gronov. Virgin. 1. pag. 91.

Cette plante est une des plus embarrassantes de ce genre pour sa classification : elle n'appartient qu'à *tragopogon* que par ses calices simples ; elle a le port des *hyssopis*, les semences des *hieracium* ; les aigrettes simples, point plumées ni pédiculées ; la corolle de l'*arnica montana* ; peut-être conviendrait-il de lui créer un genre si l'on ne craignoit de les trop multiplier.

Les tiges sont droites, roides, simples, presque nues ou munies d'une ou de deux petites feuilles, quelquefois un peu rameuses. Les feuilles radicales sont glabres, oblongues, lancéolées, nombreuses, en forme de lyre ; les lobes arrondis ; celles de la tige, sessiles, amplexicaules, lancéolées, aiguës, très-entières.

Les tiges, ainsi que les rameaux, se terminent par trois pédoncules simples, uniflores, à la base desquels se trouvent deux petites feuilles opposées, lancéolées, l'une plus petite que l'autre. Le calice est divisé, presque jusqu'à sa base, en douze folioles égales, lancéolées, aiguës. La corolle est d'un jaune foncé, plus longue que le calice, navette, presque plane ; les semences étroites, oblongues, surmontées d'une aigrette simple & sessile.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de l'Amérique, dans la Virginie & au Canada.

\* *Tragopogon (ruber)*, *glaberrimus, foliis amplexicaulibus, integris; floribus solitariis, terminalibus.* S. G. Gmel. Iter. pag. 198.

**SALSIGRAME.** *Geropogon.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, à demi-fleurons, de la famille des chérotacées, qui a de grands rapports avec les *tragopogon* ou salifis, & qui renferme des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles entières, à fleurs terminales, presque foliaires ; les calices beaucoup plus longs que les corolles.

Le caractère essentiel de cette plante est d'avoir :

Un calice simple ; un réceptacle garni de paillettes strées ; les semences subulées ; celles du disque surmontées d'une aigrette plumée ; celles de la circonférence, terminées par cinq longues arêtes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes semi-flosculeuses, hermaphrodites, réunies dans un calice commun.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, simple, composé de folioles allongées, lancéolées, subulées, droites, plus longues que la corolle.

2°. Une corolle composée de demi-fleurons, tous hermaphrodites, presque imbriqués ; les extérieurs en nombre égal aux folioles du calice, les intérieurs plus courts, moins nombreux, chacun d'eux tubulé, prolongé par une languette étroite, à cinq dents.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments capillaires & très-courts font terminés par des anthères réunies en cylindre.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates filiformes & recourbés.

Les semences sont longues, étroites, subulées, de la longueur du calice ; celles de la circonférence, terminées par cinq byrbes ou arêtes droites, roides, ouvertes ; celles du centre, plus courtes, surmontées d'une aigrette plumée.

Le réceptacle est étroit, garni de paillettes strées.

**Observations.** Ce genre, très-voisin des salifis (*tragopogon*), tant par le port que par les calices, en diffère par les réceptacles garnis de paillettes, au lieu que celui des salifis est nu, & par les aigrettes de ses semences de deux sortes, celles des semences extérieures consistant en cinq filaments droits, allongés, semblables à cinq arêtes.

Le calice est caliculé, ou muni d'un second calice dans une des espèces de ce genre.

#### E S P È C E.

1. **SALSIGRAME** à feuilles glabres. *Geropogon glabrum.* Linn.

*Geropogon foliis glabris.* Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 611. n°. 1. — Jacq. Hort. tab. 33. — Lam. Illustr. Gener. tab. 646.

*Tragopogon gramineo folio, glabrum; flore dilute incarnato.* Rai, Suppl. 149.

*Tragopogon salicibus corolla radio longioribus; foliis integris; seminibus levibus, disci glaucosis, radiis setosis.* Hort. Upsal. 243.

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques, vertes, striées, hautes de deux à trois pieds, rameuses, fistuleuses. Ses rameaux sont axillaires, diffus, écartés, garnis de feuilles alternes, entières, étroites, fort longues, presque graminiformes, sessiles, vaginales & un peu élargies à leur base, entières, aiguës, glabres à leurs deux faces, striées, marquées de nervures longitudinales.

Les fleurs sont solitaires, terminales. Leur pédoncule, constitué par l'extrémité des rameaux, est renflé, glabre, droit, strié, fistuleux. Les fleurs ont un calice très-glabre, composé de folioles simples, très-étroites, longues de deux

pouces, égales, très-aiguës, plus longues que la corolle : celle-ci est un peu pourpre ou rougeâtre, entièrement cachée par le calice, presque une fois plus courte. Les semences de la circonférence sont de la longueur des folioles calicinales, surmontées de cinq filamens roides, un peu pubescens ; celles du centre plus courtes, tubuleuses, à aigrette, légèrement plumeuses.

Cette plante croît dans l'Italie : on la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

### 2. SALSIGRAME velu. *Geropogon hirsutus*. Linn.

*Geropogon foliis pilosis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 611. n°. 2.

*Tragopogon graminis, foliis hirsutis*. C. Bauh. Pin. 275. — Tournef. Inst. R. Herb. 477.

*Tragopogon graminis folio ; suave rubente flore*. Coll. Echpr. 1. pag. 232. tab. 231.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; elle en diffère par ses feuilles chargées de poils fins & longs. Ses tiges sont herbacées, rameuses, cylindriques, légèrement velues ; ses feuilles étroites, très-longues, presque approchantes de celles des graminées. Les fleurs sont solitaires, d'un rouge agréable.

Cette plante se rencontre en Italie. (V.)

### 3. SALSIGRAME caliculé. *Geropogon caliculatus*. Linn.

*Geropogon calicibus caliculatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 611. n°. 3. — Jacq. Hort. tab. 106.

Le caractère essentiel de cette espèce consiste dans un petit calice extérieur, situé à la base du calice commun. Ses racines sont perispermiques ; ses tiges nombreuses, ramifiées ; les fleurs terminales, penchées sur leur pédoncule avant leur épanouissement ; les calices caliculés, & les demi-fleurons très-nombreux.

Sa patrie n'est point connue. ( *Descript. ex Linn.* )

**SALVADORE.** *Salvadora*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs monopétalées, de la famille des arbrées, qui a des rapports avec les *rivina*, & qui comprend des arbustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées, & les fleurs disposées en grappes terminales, axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre divisions ; une corolle à quatre découpures profondes ; une baie ; une semence enveloppée d'une tunique.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, court, à quatre divisions ovales, un peu obtus.

2°. Une corolle monopétale, persistante, profondément partagée en quatre découpures roulées en dehors.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont droits, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, arrondi, surmonté d'un style court, terminé par un stigmate simple, obtus, ombiliqué.

Le fruit est une baie globuleuse, à une seule loge, contenant une seule semence sphérique, enveloppée d'une tunique calleuse.

Observations. Ce genre a de très-grands rapports avec les *rivina*. Il en diffère par une corolle dont les *rivina* sont privés, & par ses semences environnées d'une tunique ou enveloppe particulière, un peu calleuse.

### E S P È C E S.

1. **SALVADORE** de Persée. *Salvadora persica*. Linn.

*Salvadora foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, oppositis ; racemis terminalibus*. (N.)

*Salvadora*. Linn. Syst. veget. pag. 166. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 323. n°. 219. tab. 81. — Garc. Act. Angl. 1749. n°. 491. — Amoen. Acad. vol. 3. pag. 21. — Vahl, Symb. 1. pag. 12. tab. 4. — Roxb. Coromand. 1. pag. 26. tab. 26. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 695.

*Rivina paniculata*. Linn. Syst. Nat. edit. 10. pag. 899.

*Cissus (arborea), foliis oblongis, integris, crispis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 32. n°. 8.

*Embelia (grossularia), foliis ovato-lanceolatis, oppositis ; floribus tetrandris*. Retz. Obs. 4. pag. 24.

Arbrisseau dont les tiges sont glabres, & se divisent en rameaux opposés, cylindriques, recourbés, un peu pendans, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, aiguës ; quelques-unes acuminées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, épaisses, un peu charnues, soutenues par des pétioles courts, à demi-cylindriques, aplatis à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, solitaires dans les aisselles des dernières feuilles, dont l'ensemble forme une panicule étalée. Les pédoncules communs se divisent en quelques ramifications opposées, & soutiennent des petites fleurs pédiculées, dont le calice est glabre, fort petit ; la corolle de couleur verdâtre, monopétale, à quatre divisions ovales, obtuses, réfléchies &

P p 2



roulées en dehors, persistantes avec le fruit; les éramines un peu plus longues que la corolle; le sty le fort court; l'ovaire se convertit en une baie glabre, de la grosseur d'un pois, de couleur jaune ou noirâtre, environnée à sa base par le calice & la corolle desséchés, renfermant une seule semence arrondie.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales, sur les bords du golfe Perlique, dans l'Arabie. *Th* (*V. f.* in herb. Lam.)

Les Arabes, d'après le rapport de Forskhal, font grand cas de cette plante; ils en mangent les fruits lorsqu'ils sont parfaitement mûrs. Les feuilles passent pour résolutes, étant appliquées broyées sur les rumeurs & les bubons; elles jouissent sur-tout d'une grande réputation comme contre-poison, & ont été chantées à ce titre par quelques poètes arabes.

**SALVINIE.** *Salvinia*. Genre de plantes, qui approche de beaucoup de la famille des fougères, qui a de grands rapports avec les pilulaires & les marfées, qui comprend des herbes flottantes à la surface de l'eau, dont les feuilles sont étalées, opposées, radicales, fructifères dans leurs aisselles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des capsules arrondies, membraneuses, à une seule loge, réunies quatre ou neuf ensemble; des éramines situées sur les capsules.

Les salvinies, confondues d'abord avec les marfées, en diffèrent par des caractères si tranchés, qu'il n'étoit pas possible de les conserver dans ce genre; elles s'en distinguent par leurs capsules membraneuses, à une seule loge; par leurs racines verticillées; par la disposition de leurs feuilles, qui d'ailleurs ne sont point roulées en crosse avant leur développement, comme celles des marfées. De plus, dans ces dernières les capsules ont une enveloppe coriace, divisée intérieurement en plusieurs loges séparées par des cloisons très-minces & transversales.

#### E S P È C E.

1. SALVINIE nageante. *Salvinia natans*.

*Salvinia foliis oppositis, punctis pilosis, utrinque maculatis.* (N.)

*Salvinia* (natans), *foliis oppositis, simplicibus*. Hoffm. Germ. pag. 1. n°. 2. — Lam. Illustr. Gen. tab. 863.

*Salvinia vulgaris, aquis innatans; foliis subrotundis, punctatis, latè viridibus.* Mich. Gener. pag. 107. tab. 58. — Læff. Iter, 281.

*Marfæa* (natans), *foliis oppositis, simplicibus*.

Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1562. — Scholl. Barb. n°. 826. — Pall. Iter 1. pag. 431. — Guerr. Act. Acad. Paris. 1762. pag. 543. tab. 29. fig. 1. — Lam. Flor. franç. vol. 1. pag. 5. n°. 1244. — Hedw. Theor. pag. 104. tab. 8. fig. 1. 5.

*Marfæa* (salvinioïdes), *foliis oppositis, utrinque pilosis, longè radicatis, globiferis.* De Neck. in Act. Pal. vol. 3. Phys. pag. 297. tab. 21.

*Leucula polytrix, latifolia, punctata.* C. Bauh. Pin. 362.

*Leuc pultrix, fasciata.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 785. Icon.

Cette plante a des tiges grêles, flottantes, étalées, garnies dans toute leur longueur de feuilles à peine pétiolées, opposées, ovales, entières, légèrement échanquées en cœur à leur base, obuses à leur sommet, d'un vert gai, marquées à leurs deux faces de périoles saillans, épars, qu'on reconnoît, vus à la loupe, pour être composés d'une petite rouffe de poils articulés. Ces feuilles sont, dans leur jeunesse, plissées longitudinalement.

À la base de chaque feuille poussent des racines perpendiculaires, branches, & qui se divisent en petits rameaux nombreux, de couleur brune, articulés, dispersés par verticilles. Il sort de l'aisselle des principales divisions, de petites grappes médiocrement pédonculées, supportant de quatre à neuf capsules à une seule loge, orbiculaires, rapprochées deux par deux, un peu comprimées, blanchâtres, chargées, comme les feuilles, de petites touffes de poils; elles renferment un grand nombre de petits globules un peu arrondis, de couleur jaunâtre, attachées sur un réceptacle filiforme.

Cette plante croît à la surface des eaux stagnantes, dans les environs de Montpellier, & dans plusieurs autres lieux des départemens méridionaux de la France, en Auvergne, dans l'Italie, l'Allemagne, &c. M. Lamarck en a recueilli une variété plus petite dans les environs de Peronne.

Cette même plante a été observée dans l'Amérique méridionale; mais ses feuilles sont plus grandes, & la plante plus forte.

**SAMARA.** *Samara*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyépérales, de la famille des nerpruns, qui a des rapports avec les rhamnus & les myrica, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, & dont les fleurs, placées au dessous des feuilles, sont disposées en petits corymbes ombellés, ramifiés autour des rameaux.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice fort petit, à quatre folioles; quatre pétales creusés à leur base; quatre éramines attachées

aux pétales; un style, un stigmate infundibuliforme, un drupe monosperme.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, très-petit, persistant, partagé en quatre folioles aiguës.

2°. Une corolle composée de quatre pétales ovales, sessiles, creusés à leur base en une fossette longitudinale.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont longs, sétacés, insérés dans la fossette des pétales, terminés par des anthères en cœur.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, plus court que la corolle, surmonté d'un style le plus long, cylindrique, terminé par un stigmate en forme d'entonnoir.

Le fruit est un drupe arrondi, renfermant une seule semence.

### ESPÈCES.

1. SAMARA des Indes. *Samara lato*. Linn.

*Samara floribus confertis, pedicellatis; foliis ovatis, obtusis*. Swartz, Prodr. pag. 151.

*Samara lata*. Linn. System. veget. pag. 159. — Mantiss. 179. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 303. n°. 1536. tab. 74.

*Memoeylon umbellatum*. Flor. zeylan. 469. — Burm. Flort. ind. pag. 87.

*Cornus zeylanica silvestris, oltera, korokaha diffusa*. Burm. Theil. zeylan. pag. 76. tab. 31.

*Cornus zeylanica, alter, silvatica, seu arbor korokaha*. Mus. Zeylan. pag. 40.

C'est un arbre des Indes, dont le tronc se divise en rameaux alutres, revêtus d'une écorce cendrée, blanchâtre sur les plus jeunes, qui ne sont garnis de feuilles qu'à leur partie supérieure, l'inférieure étant occupée par les fleurs.

Les feuilles sont opposées, médiocrement pétiolées, ovales, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, vertes, entières à leurs bords, supportées par des pétioles courts & un peu noirâtres. Les fleurs occupent la partie inférieure des rameaux, au dessous des feuilles; elles sont disposées en petits corymbes très-rapprochés, nombreux, presque en ombelles très-courtes. Chaque fleur est pédonculée; le pédoncule filiforme, simple, long de quelques lignes: ces fleurs, quand elles sont fermées, ressemblent à de petits globules qui s'ouvrent en forme d'étoile par un calice très-petit, à quatre découpures aiguës, & par une corolle à quatre pétales jaunâtres. Les étami-

nes sont saillantes, plus longues que la corolle; les filamens sont attachés dans une fossette située à la base de chaque pétale. Le fruit est un petit drupe globuleux, à une seule semence.

Cette plante croît dans les Indes orientales. 7

2. SAMARA coriace. *Samara coriacea*. Swartz.

*Samara floribus sessilibus, conglomeratis; foliis lanceolato-ovatis, acutis, subcoriaceis*. Swartz, Prodr. 32.

Arbre de vingt à trente pieds, dont les rameaux sont alternes, presque tétragones, lisses, garnis de feuilles éparées, alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, aiguës, très-entières, roides, membraneuses, d'un vert foncé, glabres à leurs deux faces, nerveuses, veinées, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont latérales, axillaires, agglomérées, sessiles, blanchâtres, fort petites; les paquets nombreux, très-rapprochés. Les calices sont très-petits, divisés en quatre folioles ovales, aiguës, à peine longues d'une demi ligne; les pétales trois fois plus longs que le calice, oblongs, un peu aigus; les filamens sont très-courts, au nombre de quatre, insérés à la base des pétales; l'ovaire est supérieur, globuleux; le style très-court; le stigmate grand, ovale; les fruits noirâtres, de la grosseur d'un grain de poivre, à une seule loge.

Cette plante croît dans les forêts qui se trouvent sur les montagnes de la Jamaïque. Elle m'a été communiquée par M. Ledru, qui l'a recueillie à Porto-Ricco. 7. (V. f.)

\* *Samara* (pentandra), *floribus pentandris, foliis ellipticis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 160.

Espèce suffisamment distinguée par ses feuilles elliptiques, & surtout par les fleurs à cinq étamines, si toutefois elle appartient à ce genre. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance, & se cultive en Angleterre. 7

SAMARE. *Somara*. C'est une expression dont Plin. s'est servi pour désigner le fruit de l'orme, & que Gærtner a appelée & employée pour désigner les fruits de l'orme, du frêne, du boudreau, de l'ébène, du tulipier, &c. Le *Samara* est donc une espèce de capsule coriace, membraneuse, comprimée, à une seule loge, quelquefois deux, univalve ou plutôt sans valves, munie d'ailes sur ses côtés, ou terminée par une languette.

SAMENO. *Potjottii*. Rheed, Malib. pars 5. pag. 9. tab. 5.

C'est un arbre encore peu connu, décrit par Rheed dans son *Hortus malabaricus*: il est de la grandeur d'un prunier; son tronc est d'une grosseur médiocre, de couleur cendrée, revêtu d'une

écorce amère, un peu douceâtre, divisé en rameaux étendus horizontalement.

Les racines sont fibreuses, blanchâtres, couvertes d'une écorce noirâtre. Les feuilles sont oblongues ou ovales lancéolées, dentées à leurs bords, acuminées à leur sommet, alternes, pétioles, épaisses, glabres à leurs deux faces, luisantes, d'un vert-foncé en dessus, d'un vert plus clair en dessous, marquées de nervures fines, latérales, obliques, d'une faveur un peu amère.

Les fleurs sont disposées en grappes latérales, axillaires, plus courtes que les feuilles : elles sont blanchâtres, d'une odeur agréables ; elles paroissent n'avoir point de corolle. Leur calice est supérieur, divisé en cinq découpures aiguës, munies de cinq étamines ; elles sont remplacées par des fruits globuleux, inférieurs, couronnés par le calice : ils sont d'abord verdâtres, ensuite d'un bleu-noirâtre, & enfin tout-à-fait noirs, renfermant un osselet qui contient un noyau blanchâtre d'une faveur douce & un peu astringente.

Cet arbre croît dans les lieux pierreux & sablonneux ; il se conserve vert toute l'année, fleurit & donne des fruits au commencement de l'hiver.

Les feuilles de l'arbre, cuises dans l'huile, sont employées pour les maux d'yeux. On en fait aussi une infusion avec du gingembre, que l'on boit dans les douleurs d'entrailles.

**SAMOLE.** *Samolus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, de la famille des *limnaches*, qui a des rapports avec les *rozia*, & qui comprend des herbes indigènes de l'Europe, à feuilles alternes, dont les fleurs sont disposées en épis axillaires & terminaux ; les pédoncules munis d'une petite écaille vers leur milieu.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq dents ; une corolle en forme de soucoupe, un peu tubulée, à cinq lobes, cinq écailles, recouvrant autant d'étamines ; un style ; un stigmate simple ; une capsule à une loge, semi-inferieure.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à demi-inférieur, obtus à sa base, divisé supérieurement en cinq découpures droites, persistantes.

2°. Une corolle monopétale, en soucoupe, dont le tube est très-court, de la longueur du calice ; le limbe plane, parragé en cinq lobes obtus ; cinq écailles très-courtes, situées à la base des échancrures du limbe.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, attachés sur le tube de la corolle, sur-

montés d'anthères conniventes, couvertes par les écailles de l'orifice du tube.

4°. Un ovaire à demi-inférieur, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate capité.

Le fruit est une capsule à demi-inférieure, ovale, un peu globuleuse, environnée par le calice ; à une seule loge, s'ouvrant en cinq valves, renfermant un grand nombre de semences menues, anguleuses, attachées à un placenta globuleux, libre & pédicellé.

#### ES P È C E.

1. **SAMOLE aquatique.** *Samolus valerandi*. Linn.

*Samolus foliis ovato-rotundatis, integris ; floribus spicato-racemosis.* (N.)

*Samolus valerandi*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 243. — Hort. Cliff. 51. — Hort. Upf. 42. — Flor. iuec. 165. 192. — Royen, Lugd. Bat. 249. — Gronov. Virgin. 23. — Dalib. Paris. 69. — Haller, Helv. n°. 707. — Pollich, Pal. n°. 216. — Necker, Gallob. pag. 117. — Kniph. Centur. 4. n°. 71. — Sabb. Hort. 2. tab. 47. — Eder. Flor. dan. tab. 198. — Weber. Spicil. Flor. goett. pag. 7. — Bergeret, Phytogr. 1. pag. 39. Icon. — Curtis, Lond. Icon. — Gertn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 146. tab. 30. fig. 1. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 443. n°. 1990. tab. 101. — Idem, Flor. franç. vol. 3. pag. 329. n°. 923. — Poirer, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 124. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 185. — Michaux. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 109.

*Samolus valerandi*. Tournef. Infl. R. Herb. 143. tab. 60. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 791. Icon. — Schaw. Spec. n°. 523.

*Anagallis aquatica, rotundo folio, non crenato.* C. Bauh. Pin. 252.

*Anagallis aquatica, serotina.* Lobel. Ic. 467. — Gerard, Hist. 630. Ic.

*Alfne aquatica, perennis ; foliis beccabunga.* Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 323. §. 3. tab. 24. fig. 28.

*Anagallis aquatica, altera Lobelii.* Dalech. Hist. 1. pag. 1090. Ic.

2. *Samolus africanus.*

*Samolus africanus, folio rotundiore.* Walth. Hort. 162. tab. 23.

C'est une plante herbacée, dont les tiges, droites ou un peu couchées, s'élèvent à environ un pied au plus de haut ; elles sont glabres, tendres, cylindriques, verdâtres, fistuleuses, à peine ramoussées, garnies de feuilles ovales, spatulées ou presque rondes ; les radicales sont beaucoup plus grandes, & forment une rosette étendue sur la

terre; elles sont tendres, vertes, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, obtuses, rétrécies en pétiole à leur base; les supérieures presque sessiles.

Les fleurs sont disposées en épis ou en grappes assez longues, droites, terminales ou latérales, quelquefois un peu flexueuses, sur lesquelles les fleurs sont alternes, petites, soutenues par des pédoncules longs d'environ six lignes, simples, capillaires, presqu'articulés vers leur milieu, & munis d'une très-petite bractée squamiforme. Le calice est glabre, verdâtre, fort petit; la corolle blanche, un peu plus grande que le calice; les capsules globuleuses, renfermant un grand nombre de petites semences anguleuses & ponctuées.

Cette plante croît dans les lieux aquatiques, sur le bord des ruisseaux & des étangs, en Europe, & dans la Barbarie au royaume d'Alger, où j'ai recueillie. (P. v.)

La variété  $\delta$ , que l'on rencontre dans l'Asie & dans les contrées septentrionales de l'Amérique, ne diffère de la précédente que par ses tiges plus rameuses, plus fermes; & par ses feuilles plus arrondies, caractères insuffisants pour qu'on puisse la regarder comme une espèce particulière.

**SAMYDE.** *Samyda*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dont la famille n'est pas encore bien déterminée, qui a des rapports avec les *anavinga*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs axillaires, presque solitaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice d'une seule pièce, à cinq divisions; point de corolle; dix à dix-huit étamines insérées sur un anneau attaché vers le milieu du calice, & dont les dents supportent les anthères sessiles ou les filaments; une capsule supérieure, pulpeuse en dedans, à une loge, à quatre ou cinq valves, polyspermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice campanulé, presque rubulé, corollé intérieurement, à dix ftries, persistant, divisé à son limbe en cinq découpures inégales.

2°. Point de corolle.

3°. Dix ou dix-huit étamines, quelquefois huit, dont les anthères sont, ou toutes sessiles, insérées sur les dents d'un anneau qui s'élève jusqu'au milieu du calice, ou toutes munies de filaments alternes avec ces mêmes dents, au nombre de dix ou dix-huit.

4°. Un ovaire ovale, supérieur, surmonté d'un

style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate globuleux & pubescent.

Le fruit est une capsule arrondie, coriace, à une seule loge, à quatre ou cinq valves, contenant plusieurs semences percées à leur base, attachées aux valves, & environnées d'une subit-née pulpeuse qui remplit tout l'intérieur de la capsule.

*Observations.* Ce genre a été d'abord composé d'espèces dont la fructification dans la plupart étoit médiocrement connue : à mesure qu'on a pu l'observer plus scrupuleusement, on y a trouvé des caractères suffisants pour diviser ce genre en plusieurs autres sur lesquels nous ne pouvons plus revenir, qui portent la plupart sur la disposition des étamines, & que nous distinguerons par des divisions.

M. Lamarck a déjà fait connoître les *anavinga* dans le premier volume de cet ouvrage, dont le calice est divisé en cinq folioles ovales, concaves, ouvertes : il n'y a point de corolle. A la base de chaque foliole calicinale, on observe intérieurement dix écailles courtes, velues, qui alternent avec les filaments des étamines; ces filaments sont insérés sur les folioles du calice, à leur base, ainsi que les écailles. Le fruit est le même que celui des *Samyda*.

Les *casaria* diffèrent peu des *anavinga*. Leur calice est à cinq folioles; les écailles du fond du calice sont de quatre à cinq, alternes deux par deux, avec les filaments des étamines au nombre de huit ou dix; les capsules se divisent en trois valves, à une seule loge.

Les *agularia*, autre genre voisin des précédents : son calice est campanulé, à cinq découpures à son limbe, muni intérieurement d'un anneau jusque vers son milieu, divisé en cinq ou dix découpures inégales à son sommet; les filaments des étamines sont attachés sur les parois internes de cet anneau. L'ovaire est surmonté d'un stigmate sessile; la capsule est à deux loges, à deux valves épaisses, tubéreuses, à deux semences, quelquefois une seule par avortement, entourées jusque vers leur milieu d'une enveloppe particulière, spongieuse.

Dans les *Samyda* le calice est campanulé, à cinq découpures à son orifice; les étamines au nombre de dix plus ou moins, dont les anthères sessiles sont insérées sur le sommet des écailles qui divisent l'anneau inférieur du calice. Les capsules sont pulpeuses intérieurement, à quatre ou cinq valves, à une seule loge.

Il étoit essentiel de rapprocher ces genres, afin d'en mieux faire sentir les différences & les rapports. Ils se rapprochent par le nombre variable de leurs étamines, par leur insertion sur un corps particulier dont est garni le fond du calice; mais ils diffèrent par le point d'insertion de ces mêmes

étamines. Dans les *Samyda*, il n'y a point de filaments, ou plutôt, selon M. de Jussieu, les filaments sont réunis en forme d'anneau denté à son bord, chaque dent supportant une anthère; dans les *Anavinda* l'anneau est si court, qu'on n'en aperçoit que les divisions, qui paroissent autant d'écailles attachées aux parois internes du calice, & les anthères ont des filaments libres, alternes avec ces écailles, filaments également insérés, du moins en apparence, aux parois du calice; dans d'autres individus l'anneau est plus sensible, ses divisions en petites dents, les filaments insérés sur cet anneau, alternes avec les dents. (Voyez les *Illustrations des Genres*, planch. 355. fig. 2.)

Je serois très-porté à regarder cet anneau comme une corolle, fort petite à la vérité, mais qui en offre tous les caractères. Elle est monopétale, adnée avec le calice, dentée ou divisée presque jusqu'à sa base. Les filaments des étamines sont insérés sur cette corolle, libres, ou faisant corps avec elle dans toute leur longueur; dans ce dernier cas les anthères paroissent sessiles.

Cette considération fait alors disparaître, du moins comme caractère générique, celui qui est appuyé sur la forme de cet anneau, & sur la position des étamines. On en formeroit ce caractère générique: corolle monopétale très-courte; étamines insérées sur le tube. Les *Samyda* & les *Casuarina* ne feroient plus alors qu'un seul genre. Dans les deux le fruit est une capsule coriace, uniloculaire, pulpeuse intérieurement, à plusieurs semences, à trois ou cinq valves. Le nombre des valves est variable; les divisions du calice sont plus ou moins profondes. Je doute qu'on puisse appuyer sur cette variété un caractère générique. Il ne nous reste donc: constance que la corolle très-courte, monopétale; les étamines insérées sur la corolle; une capsule coriace, pulpeuse en dedans, à plusieurs valves, à une seule loge, polyisperme.

Les *Aquilaria* diffèrent de ce genre par leur capsule à deux loges, à deux valves subérénées, à une ou deux semences; ils se rapprochent du précédent par leur corolle & par l'insertion des étamines.

Il faut rapporter aux *Samydes* l'*Iranica guianensis* d'Aublet (voyez le vol. 3 de cet ouvrage), qui est le

*Casuarina* (ramiflora), floribus obovatis, foliis ellipticis, ferratis, utrinque glabris; ramis floriferis. W. & A. Symbol. 2. pag. 50.

*Aithenaa*. Schreb. Gener. Plant. n°. 66t.

## E S P E C E S.

### \* *Samyda*.

1. *SAMYDE* à feuilles luisantes. *Samyda nitida*, Linn.

*Samyda floribus obovatis; foliis cordatis, glabris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 557. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 614. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 355. fig. 2.

*Samyda foliis nitidis, cordatis, levissimè crenatis; ramamentis mollibus, rubentibus; racemis tenuioribus, alaribus*. Brown. Jam. 217. tab. 23. fig. 3.

Cette plante a des tiges divisées en rameaux alternes, diffus; garnies de feuilles pétiolées, alternes, ovales, échancrées en cœur à leur base, légèrement crénelées à leur contour, glabres à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées dans les aisselles des feuilles, en petites grappes courtes: leur calice est tubulé, divisé jusque vers son milieu en cinq découpures ovales, obtuses, colorées; garni à sa base intérieure d'un appendice annulaire, divisé en autant de dents qu'il y a d'étamines, avec lesquelles elles alternent. Le nombre de ces étamines varie de huit à dix. Les filaments sont courts, filiformes, terminés par des anthères ovales. L'ovaire est globuleux, muni d'un style court & simple, & d'un stigmate épais, obtus: il lui succède une capsule presque ronde, coriace, pulpeuse intérieurement, à une seule loge, à trois valves réfléchies en dehors à l'époque de la maturité, & qui laissent apercevoir un réceptacle central, droit, pulpeux, qui réunit un grand nombre de semences.

Cette plante croît dans la Jamaïque. 7j

2. *SAMYDE* à fleurs nombreuses. *Samyda multiflora*. Cavan.

*Samyda floribus obovatis, foliis ovatis, utrinque acutis, inferius tomentosis*. Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 43. tab. 67.

*Samyda floribus obovatis, foliis oblongis, dentatis, utrinque attenuatis, subtus tomentosis; pedunculis unifloris, aggregatis, axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 625. n°. 3.

Ses rameaux sont ligneux, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, légèrement dentées à leurs bords, à une seule nervure, ramifiée en veinules très-fines, glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous.

Les fleurs sont petites, axillaires, agglomérées; les pédoncules sont courts, munis à leur base de petites écailles insérées sur une base globuleuse. Les calices sont partagés profondément en quatre découpures ovales, blanchâtres; garnis intérieurement d'un appendice urcéolé, blanchâtre, court, divisé à son sommet en huit dents qui soutiennent autant d'anthères sessiles, ovales. L'ovaire est ovale, insensiblement rétréci vers son sommet, surmonté d'un stigmate globuleux.

Cette

Cette espèce se rencontre dans l'île Saint-Domingue. *h* (*Descript. ex Cavan.*)

3. *SAMYDE* à grandes feuilles. *Samyda macrophylla*. Willd.

*Samyda floribus obovatis; foliis ovatis, acutis, glabris; axillis venarum subius villosis; corymbo terminali*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 625. n°. 2.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, jaunâtres, couverts de cicatrices après la chute des pétioles, garnis de feuilles amples, souvent longues d'un demi-pied & plus, ovales, aiguës, glabres à leurs deux faces, à crénelures obtuses & peu marquées à leurs bords, légèrement velues en dessous sur la principale nervure, & dans les aisselles des veines.

Ses fleurs sont fort petites, pédonculées, disposées en un corymbe presque terminal. Leur calice est campanulé, divisé à son orifice en cinq découpures réfléchies en dehors. La corolle est remplacée par un tube très-court, campanulé, supportant les étamines, dont les filaments sont extrêmement courts, subulés; les anthères brunes; l'ovaire est de forme ovale, surmonté d'un style subulé, terminé par un stigmate velu. Le fruit n'a point été observé.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h* (*Descript. ex Willd.*)

4. *SAMYDE* velue. *Samyda villosa*. Swartz.

*Samyda floribus decandris; foliis oblongis, subserratis, basi obliquis, serratis, subius villosis; pedunculis foliariis, axillaribus*. Swartz, Prodr. pag. 68. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 758.

Ses tiges sont droites, hautes de six à sept pieds, munies de rameaux éraillés, cylindriques, pubescents, velus, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues, médiocrement acuminées, arrondies à leur base, obliques, à peine denticulées, molles, soyeuses, nerveuses, veinées; les nervures chargées à leur face inférieure de poils bruns. Les pétioles sont courts, velus, cylindriques.

Les fleurs, situées dans l'aisselle des feuilles, sont solitaires, assez grandes, blanchâtres, supportées par des pédoncules simples, très-courts, unilobes. Leur calice est tubulé, divisé jusque vers son milieu en cinq découpures oblongues, obtuses, ouvertes, réfléchies, blanchâtres à leur partie supérieure, vertes & pubescentes à leur partie inférieure; le tube ovale, cylindrique, strié, pubescent. Dans le fond est un appendice cylindrique, annulaire, de couleur blanche, de la longueur du calice; à dix fentes, à dix dents à son orifice, qui supportent dix anthères sessiles, oblongues, acuminées. L'ovaire est pubescent, ovale, supérieur, surmonté d'un style épais, cylindrique, ter-

Botanique. Tome VI.

miné par un stigmate vert, capité, perforé à son sommet. Le fruit est une capsule assez grande, ovale, médiocrement acuminée, charnue, à trois ou quatre faces peu marquées, dont l'écorce est coriace, pubescente, verdâtre, à une seule loge, à trois ou quatre valves séparées par des lignes rougeâtres, contenant plusieurs semences ovales, luisantes, enveloppées d'une pulpe écarlate ou d'un rouge-pâle.

Cette plante paroît avoir de grands rapports avec le *Samyda pubescens* de Linné, trop peu connu pour permettre de prononcer, qui a d'ailleurs douze étamines, tandis que la plante dont il est ici question n'en a que dix; elle fleurit au printemps, & croît sur les montagnes de la Jamaïque. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

5. *SAMYDE* à feuilles glabres. *Samyda glabrata*. Swartz.

*Samyda floribus decandris; foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, nitidis; pedunculis axillaribus, unifloris*. Swartz, Prodr. pag. 68. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 760.

Quoique très-rapprochée du *Samyda nitida*, cette espèce doit en être distinguée par ses dix étamines & par ses feuilles ovales, lancéolées & non en cœur; elle ne peut pas non plus être confondue avec le *Samyda crenata*, dont les étamines alternent avec les écailles de l'appendice.

C'est un arbuste qui s'élève à dix ou douze pieds sur un tronc lisse, divisé en rameaux lâches, étendus, garnis de feuilles alternes, pétioles, oblongues, ovales, lancéolées, ouvertes horizontalement, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, d'un vert gai, marquées de quelques pores très-fins, transparents; supportées par des pétioles très-courts.

Les fleurs sont assez grandes, de couleur blanche, soutenues par des pédoncules axillaires, solitaires, plus épais & plus courts que les pétioles simples, unilobes; munies à leur base de deux bractées fort petites, aiguës. Le calice est tubulé; le tube campanulé, glabre, cylindrique, partagé jusqu'en son milieu en cinq découpures larges, épaisses, lancéolées, obtuses, très-blanches, un peu réfléchies, persistantes. L'appendice est cylindrique, court, tronqué, inséré au fond du calice, muni à son sommet de dix dents qui supportent autant d'anthères sessiles, droites, fort petites, jaunâtres. L'ovaire est oblong, pubescent, surmonté d'un style cylindrique, épais, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate capité, vert, presque à trois angles, perforé à son sommet: il lui succède une capsule ovale.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque, Q 99

où elle fleurit vers le milieu de l'automne. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

6. SAMYDE pubescente. *Samyda pubescens*. Linn.

*Samyda floribus dodecandris; foliis ovatis, subtus tomentosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. — Swartz, Observ. 179.

M. Swartz pense que cette espèce est très-difficile à reconnoître; que les caractères qui en font la différence, sont peu distincts, & qu'il faut en retrancher les synonymes de Sloane & de Brown, qui ne peuvent convenir à cette plante.

Ses feuilles, d'après Linné, sont ovales, tomenteuses en dessous; ses fleurs renferment douze étamines. Cette plante croît dans l'Amérique. *h*

7. SAMYDE dentuculée. *Samyda ferrulata*. Linn.

*Samyda floribus dodecandris; foliis ovato-oblongis, ferrulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. — Mill. Dict. n°. 1. — Jacq. Collect. 2. pag. 126. tab. 17. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. n°. 8.

*Samyda floribus dodecandris*. Jacq. Amer. pag. 132.

*Guidonia ulmifolia, flore roseo-niveo*. Plum. Gen. pag. 4. tab. 24, & Icon. tab. 146. fig. 2.

Abrutisseau qui s'élève à la hauteur de trois ou quatre pieds, dont les rameaux sont cylindriques, pubescens, garnis de feuilles alternes, pétiolées, lancéolées; les inférieures un peu ovales, oblongues; les supérieures plus étroites, aiguës à leur sommet, finement dentées en scie à leur contour, pubescens à leur face supérieure, tomenteuses en dessous, épaisses, supportées par des pétioles très-courts.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, soutenues par des pédoncules courts, simples, uniflores, munis à leur base de deux bractées petites, brunes, subulées; leur calice est tubulé, campanulé, allongé, velu extérieurement, épais, d'un vert jaunâtre en dehors, blanc intérieurement, divisé jusque vers son milieu en cinq découpures ovales, un peu obtuses. Il offre dans son intérieur un appendice blanc, droit, conique, tronqué, marqué de dix-huit stries profondes, qui paroissent être autant de filamens réunis en un seul corps, terminés par un même nombre d'anthères sessiles, oblongues, sagittées, droites. L'ovaire est ovale, velu; le style blanchâtre, de la longueur des étamines; le stigmate capité, verdâtre, convexe; le fruit arrondi, passant du jaune au rouge, coriace, uniloculaire, à cinq valves, contenant plusieurs semences presqu'ovales, attachées aux valves, enfoncées dans une substance pulpeuse.

Cette plante croît à l'île Saint-Domingue, où elle fleurit vers le milieu de l'automne. *h* (*V. f*)

8. SAMYDE polyandrique. *Samyda polyandra*. Willd.

*Samyda floribus polyandris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. n°. 9.

*Melissaurum distichum*. Forst. Gener. n°. 72, & Prodr. n°. 570.

Un peu plus de détails sur cette espèce nous auroit fait connoître si elle appartient réellement aux *samyda*, ou si elle doit constituer un genre à part. Elle paroît ne différer des *samyda* que par les fleurs polyandriques; & comme nous avons vu combien le nombre des étamines étoit peu constant dans ce genre, ce caractère seul ne peut l'en écarter.

Cette plante a été observée par Forster dans la Nouvelle-Calédonie. *h*

9. SAMYDE à petites épines. *Samyda spinescens*. Swartz.

*Samyda floribus decandris, terminalibus; foliis lanceolato-ovatis, obtusis, crenatis, glabris; ramis parvis, spinescens*. Swartz, Prodr. pag. 68. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 762. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. n°. 6.

Arbuste dont les rameaux sont longs, divergens, cylindriques, terminés par une pointe épineuse, garnis de feuilles éparées, alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, obtuses à leur sommet, crénelées à leur contour, glabres à leurs deux faces, nerveuses & veinées, munies, à la base de leur pétiole, de stipules petites, lancéolées, membraneuses, obtuses.

Les fleurs sont presque sessiles, situées, entre les feuilles, vers l'extrémité des rameaux; elles sont grandes, d'un blanc-pâle; leur calice se divise en cinq folioles ovales, pubescentes, renfermant un appendice cylindrique & tronqué, qui supporte, à son sommet, huit ou dix anthères droites, sessiles. L'ovaire est ovale; le style subulé, épais; le stigmate en tête.

Cette espèce tient le milieu entre les *samyda* & le nouveau genre *castaria*, ayant le calice de ce dernier, l'appendice & les étamines sessiles du premier; ce qui prouve les grandes rapports qui existent entre ces deux genres, ainsi que nous l'avons dit plus haut à l'exposition des caractères génériques. Elle croît dans la Nouvelle-Espagne. *h* (*Descript. ex Swartz.*)

\*\* *Cestaria*.

10. SAMYDE épineuse. *Samyda spinosa*. Linn.

*Samyda floribus octandris, ramis spinosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. — Swartz, Observ. pag. 179.

*Casearia* (spinosa), floribus oëandris; foliis ovatis, serratis, glabris; pedunculis axillaribus, unifloris; ramis spinosis. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 626. n°. 1.

*Casearia* (aculeata), floribus oëandris. Jacq. Amer. 133. (Exclusa Plumieri Icon. 147. fig. 1.)

Arbrisseau d'environ sept pieds, dont les rameaux sont nombreux, diffus, munis, dans leur jeunesse, de quelques aiguillons distans, foliacés, garnis de feuilles ovales, aiguës à leurs deux extrémités, légèrement dentées en scie, glabres à leurs deux faces, longues d'un pouce & demi, très-rapprochées.

Les fleurs sont réunies en petits paquets dans les aisselles des feuilles, supportées par des pédoncules très-courts, unilobes. Les calices sont blancs, divisés en cinq folioles oblongues, obtuses. Les étamines sont au nombre de huit; leurs filamens subulés, alternes, avec les dents de l'appendice intérieur; les anthères oblongues; les ovaires arrondis, surmontés d'un style filiforme & d'un stigmate en tête, auxquels succèdent des capsules d'un pourpre-verdâtre, globuleuses, mucronées à leur sommet, coriaces, à une loge, à trois valves, contenant plusieurs semences anguleuses, enveloppées d'une substance pulpeuse.

Cette plante se trouve à Saint-Domingue, sur les montagnes, parmi les broussailles.  $\eta$

11. SAMYDE à feuilles crénelées. *Samyda crenata*.

*Samyda floribus oëandris; foliis ovatis, crenatis, glabris; cymis pedunculatis, axillaribus.*

*Casearia nitida*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 627. n°. 2.

*Casearia* (nitida), inermis; floribus oëandris. Jacq. Amer. 132. — Aët. Helv. 8. pag. 58. fig. 1.

Arbrisseau d'environ quinze pieds de haut, divise en rameaux nombreux, éreclus, garnis de feuilles ovales, alternes, pétioles, glabres à leurs deux faces, crénelées à leurs bords, obtus à leur sommet, longues d'un pouce & demi, mais très-variables dans leur grandeur & même dans leur forme; elles ont quelquefois jusqu'à quatre pouces de longueur, très-acuminées, luisantes.

Les fleurs sont disposées, en petits corymbes longs d'un pouce, dans l'aisselle des feuilles; elles sont petites, blanchâtres; contiennent huit étamines alternes, avec autant d'écaillés qui occupent le fond du calice. Celui-ci se divise en cinq folioles obtuses. Les capsules sont arrondies; elles renferment une pulpe écarlate ou de couleur purpurine, ne contiennent guère que deux semences, quelquefois une seule.

Cette plante croît en Amérique, dans les brouss

saies, aux environs de Carthagène.  $\eta$  (Description, ex Jacq.)

12. SAMYDE tomenteuse. *Samyda tomentosa*. Swartz.

*Samyda floribus oëandris; foliis ovatis, serratis, subius tomentosis*. Swartz, Prodr. pag. 68.

*Casearia* (hirta), floribus oëandris; foliis ovatis, serratis, subius hirtis. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 2. pag. 756.

Arbrisseau de sept à huit pieds de haut, dont les riges se divisent en rameaux alternes, cylindriques, un peu anguleux, pubescens, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, lancéolées, un peu rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, dentées en scie à leurs bords, glabres à leur face supérieure, hirsutes en dessous, nerveuses & veinées, supportées par des pétioles très-courts.

Les fleurs sont axillaires & latérales, fasciculées, soutenues par des pétioles courts, garnis à leur base d'écaillés membraneuses. Leur calice se divise en quatre découpures profondes, linéaires, lancéolées, obtuses, pubescentes, blanchâtres, vertes en dessous, persistantes. L'appendice intérieur est composé de huit petites folioles alternes avec les filamens, oblongues, velues. Les étamines sont au nombre de huit; leurs filamens droits, subulés; les anthères ovales, en cœur, droites, jaunâtres. L'ovaire est surmonté d'un style trigone, terminé par un stigmate capité un peu trifide. Les capsules sont oblongues, médiocrement acuminées, à trois valves.

Cette espèce se rencontre dans les pâturages des forêts de la Jamaïque.  $\eta$  (Description, ex Swartz.)

13. SAMYDE à petites fleurs. *Samyda parviflora*. Linn.

*Samyda floribus decandris; foliis ovato-oblongis, utrinque glabris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. Lœf. Iter, 260. — Miller, Dict. n°. 2. — Swartz, Observ. bot. 178.

*Casearia* (parviflora), floribus decandris; foliis oblongis, acuminatis, crenulatis, utrinque glabris, nitidis; pedunculis confertis, axillaribus, unifloris. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 627. n°. 5.

*Samyda foliis ovatis cum acumine; frutibus plurimis, minoribus, confertis*. Brown, Jam. 217.

*Arbor baccifera, foliis oblongis, acuminatis; floribus confertis ex albis foliorum erumpentibus; fructu minimo, croceo*. Sloane, Jam. 137. Hist. 2. pag. 108. tab. 211. fig. 2. — Rai, Dend. 108.

Arbuste dont les rameaux sont diffus, cylindriques, un peu tortueux, glabres, d'un brun noirâtre, quelquefois marqués de très-petites taches Qqq 2



ovales, un peu cendrées ou jaunâtres; garnis de feuilles alternes, pétioles minces, presque membracées, ovales, oblongues, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, crénelées à leur contour, vertes, luisantes à leur face supérieure, un peu plus pâles en dessous, longues d'environ trois onces, sur un pouce & demi de large; marquées de nervures latérales, simples, alternes, peu nombreux, & de veines réticulées. Leur pétiole est court, à peine long de deux ou trois lignes.

Les fleurs sont blanchâtres, axillaires, presque solitaires ou ramassées en petits paquets, supportées par des pétioles simples, cylindriques, filiformes, droits, longs d'un demi-pouce au moins, inégaux. Les calices se divisent en cinq petites découpures profondes, glabres, ovales, caliciformes. Les étamines sont au nombre de dix; leurs filaments alternent avec les dentelures de l'appendice intérieur. L'ovaire est ovale; il lui succède une capsule globuleuse, petite, divisée en trois valves remplies d'une pulpe jaunâtre.

Cette plante croît à Cayenne, & dans les régions chaudes de l'Amérique méridionale, parmi les buissons. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. *h* (V. f.)

#### 14. SAMYDE à petites feuilles. *Samyda parvifolia*.

*Samyda floribus decandris; foliis ovatis, acuminiatis, serratis, glabris; pedunculis unifloris, aggregatis, lateralibus.*

*Casearia parvifolia*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 628. n° 6.

*Casearia* (decandra), *floribus decandris*. Jacq. Amer. 133. tab. 85.

*Anavinga*. Lam. Illustr. Gen. tab. 355. fig. 2.

Cette plante, quoique rapprochée du *Samyda parviflora*, en diffère par ses feuilles beaucoup plus petites, ovales & non allongées; par ses fleurs latérales sur des rameaux nus, & non situées dans l'aisselle des feuilles; enfin par ses calices réfléchis. M. Lamarck l'a rangée parmi les *Anavinga* dans les *Illustrations des genres*; mais comme il n'en est pas fait mention à l'article *Anavinga*, nous avons cru devoir la rappeler ici.

C'est un arbrisseau d'environ quinze pieds, dont les tiges sont droites; les rameaux diffus, grêles, élançés, garnis de feuilles ovales, acuminées, pétioles, alternes, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont latérales, situées au dessous des feuilles, agrégées, supportées par des pétioles courts, uniflores. Les calices sont divisés en cinq

folioles blanchâtres, fortement réfléchies, ovales, obtuses; les étamines au nombre de dix. Leurs filaments sont inégaux, presque aussi longs que le calice.

Cette plante croît dans les forêts montagneuses de la Martinique. *h* (V. f. in herb. Lam.)

#### 15. SAMYDE sauvage. *Samyda florifera*.

*Samyda floribus decandris; foliis ovatis, acuminiatis, integerrimis; ramis virgatis; pedunculis axillaribus, confertifloris.*

*Casearia florifera*. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 752. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 628. n° 7.

Cette plante diffère du *Samyda parviflora* par ses feuilles plus grandes, plus ovales, longuement acuminées, point dentées; par ses fleurs plus nombreuses & plus petites, & par ses rameaux élançés.

C'est un arbrisseau dont les tiges glabres se divisent en rameaux longs, effilés, lâches, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales ou elliptiques, quelquefois ovales-lanceolées, longuement acuminées, minces, entières, glabres à leurs deux faces, luisantes, veinées, poreuses lorsqu'on les présente à la lumière, supportées par des pétioles courts & glabres.

Les fleurs sont ramassées par paquets dans l'aisselle des feuilles, au nombre de vingt ou trente, supportées par des pédoncules longs d'environ trois lignes, simples, uniflores, munis à leur base de petites écailles sèches, imbriquées. Les calices sont fort petits, blanchâtres, à cinq folioles ovales, ouvertes, pubescentes, munies d'oreillettes à leur base de dix écailles velues, blanchâtres, alternes avec les étamines. Celles-ci sont au nombre de dix; leurs filaments de la longueur du calice, terminés par des anthères blanchâtres, en cœur. L'ovaire est ovale, surmonté d'un style à trois faces, de la longueur des étamines, & d'un stigmate en tête, auquel succède une capsule fort petite, de la grosseur d'un grain de poivre, ovale, rougeâtre, à trois valves.

Cette plante est commune à la Jamaïque, parmi les buissons, sur les montagnes. *h* (Descript. ex Swartz.)

#### 16. SAMYDE pitombier. *Samyda pitumba*.

*Samyda floribus decandis, submontosis; foliis ellipticis, acuminiatis, pubescentis.*

*Casearia macrophylla*. Vahl, Eglog. 2. pag. 32. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 628. n° 8.

*Pitumba guianensis*. Aubl. Guian. vol. 2. Append. 29. tab. 385.

Il existe de grands rapports entre le *Samyda parviflora* & cette espèce ; mais celle-ci en est très-bien distinguée par les feuilles coriaces, beaucoup plus grandes, elliptiques plutôt qu'ovales, & par les fleurs légèrement tomentueuses.

Ses tiges se divisent en rameaux glabres, cylindriques, marqués de points grisâtres, garnis de feuilles alternes, pétioles, fermes, épaisses, coriaces, percées de petits trous, longues de six à huit pouces, larges de trois & plus, glabres à leurs deux faces, oblongues, presque ovales, elliptiques, légèrement & lâchement crénelées à leurs bords, acuminées à leur sommet, d'un vert foncé à leur face supérieure, plus pâles & un peu roussâtres en dessous, marquées de nervures latérales, alternes, d'un brun foncé, arquées, presque simples, & de veines transversales, à peine réticulées.

Les fleurs sont réunies dans l'aisselle des feuilles en petits fascicules, dont les pédoncules sont très-courts, simples, uniflores. Le calice est petit, divisé en cinq folioles légèrement velues en dehors. Les étamines sont au nombre de dix, alternant avec les divisions de l'appendice intérieur. Le fruit est une capsule globuleuse, pulpeuse en dedans, à une loge, divisée en trois valves, de la grosseur d'une noix.

Cette plante croît à Cayenne & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale. h (V. f.)

#### 17. SAMYDE de l'île Névis. *Samyda niviana*.

*Samyda floribus decandris ; foliis ovato-lanceolatis, obtusis, serrulatis ; ramulis flexuosis ; pedunculis axillaribus, confertissimis.*

*Casearia serrulata*. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 754.

Arbrisseau dont les rameaux sont glabres, cylindriques, élancés, revêtus d'une écorce blanchâtre ou cendrée, à ramifications éparées, presque filiformes, flexueuses, striées, garnies de feuilles alternes, pétioles, ouvertes, longues d'un pouce & demi, ovales, lancéolées, médiocrement acuminées, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces, luisantes & d'un vert gai en dessus, nerveuses & veinées, supportées par des pétioles longs d'environ deux lignes.

Les fleurs sont blanchâtres, fort petites, réunies par paquets, au nombre de dix à douze dans l'aisselle des feuilles, soutenues par des pédoncules longs d'une ligne, munis à leur base de petites écailles membraneuses. Les calices se divisent en cinq folioles ovales, concaves, ciliées à leurs bords, contenant, à leur base interne un rang circulaire de petites écailles linéaires, obtuses, blanchâtres, velues, alternes avec les étamines, dont les filaments sont très-courts, au nombre de

dix ; les anthères ovales, en cœur. L'ovaire est ovale, surmonté d'un style subulé, & terminé par un stigmate obtus.

Cette plante croît aux Antilles, dans l'île Névis. h (Description, ex Swartz.)

#### 18. SAMYDE hérissée. *Samyda hirsuta*.

*Samyda floribus decandris, foliis ovatis, acuminatis, dentato-serratis, hirtis, subulis villosis ; pedunculis lateralibus, confertis.*

*Casearia hirsuta*. Swartz, Flor. Ind. occident. vol. 2. pag. 755. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 629. n°. 12.

Cette espèce se distingue du *Samyda tomentosa*, par ses feuilles plus grandes, velues à leurs deux faces, & par les fleurs à dix étamines.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux cylindriques, flexibles, pubescents, garnis de feuilles grandes, alternes, pétioles, ovales, acuminées, dentées en scie à leurs bords, hérissées, molles, plus velues à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées en petits paquets latéraux, point axillaires, mais situés sous les feuilles alternativement. Leur calice se divise en cinq folioles ovales, lancéolées, blanchâtres, pubescentes, un peu velues, renfermant à leur base dix écailles ovales, velues, alternes avec les filaments : ceux-ci sont droits, subulés, au nombre de dix, terminés par des anthères ovales. L'ovaire est surmonté d'un style trigone, de la longueur des filaments, & d'un stigmate capité : il leur cache des capsules ovales, à trois faces, à trois valves, à une seule loge.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque & à la Nouvelle-Espagne. h (Description, ex Swartz.)

#### 19. SAMYDE à fleurs verdâtres. *Samyda viridiflora*.

*Samyda foliis ovato-ellipticis, glabris, subcoriaceis ; floribus subsessilibus, fasciculatis, axillaribus. (N.)*

Arbuste dont les rameaux, glabres, cylindriques, allongés, sont garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, elliptiques, membraneuses, presque coriaces, d'un vert-glauque, un peu jaunâtres, entières ou à peine crénelées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, longues de quatre à cinq pouces, larges de deux & demi, obtuses, à nervures latérales, alternes, presque simples, veinées en réseau saillant, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petits paquets, presque sessiles, ou dont les pédoncules sont inégaux, à peine longs d'une ligne, légèrement pubescents, verdâtres,

courts, à cinq découpures ovales, presque ob-  
tus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

**SANCHÈZE.** *Sanchezia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, très-voisin de la famille des scrofulaires, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles opposées, à fleurs verticillées, chaque verticille muni d'un involucre général & de bractées particulières.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions ; une corolle tubulée, à cinq découpures réfléchies, deux supérieures plus courtes ; quatre étamines plus courtes, dont deux stériles, les antérieures aristées ; une capsule à deux loges, à deux valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, à cinq découpures droites, ovales, spatulées, concaves, échancrées à leur partie supérieure, deux intérieures plus étroites & qui se flétrissent.

2°. Une corolle tubulée, irrégulière, dont le tube est recourbé, insensiblement rétréci vers sa base, relevé en bosse à sa partie supérieure, rétréci à son orifice ; le limbe, à cinq découpures ovales, échancrées, réfléchies en dehors ; les deux supérieures un peu plus courtes.

3°. Deux étamines, dont les filaments sont filiformes, comprimés, velus, saillans, insérés un peu au dessus de la base de la corolle, terminés par des anthères ovales, pendantes, à deux loges, bifides à leur partie inférieure, velues, munies, à la base de leurs divisions, d'une sorte d'appendice court, recourbé en éperon ; deux autres filaments plus courts, stériles, sans anthères, subulés, situés au même point d'insertion que les premiers.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, surmonté d'un style filiforme, plus long que les étamines, terminé par un stigmate bifide, dont les découpures sont inégales, subulées.

Le fruit est une capsule oblongue, acuminée, à deux loges, à deux valves, renfermant quelques semences planes, orbiculaires.

*Observations.* Ce genre a été consacré par Ruiz & Pavon, à la mémoire du célèbre Joseph Sanchez, professeur de botanique à Madrid.

#### E S P È C E S.

1°. **SANCHÈZE** à feuilles oblongues. *Sanchezia oblonga*.

*Sanchezia foliis oblongo-lanceolatis, subsessilibus,*

*utrinque glabris ; bracteis linearibus*, Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 103. n°. 1.

*Sanchezia (oblonga), foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis ; petiolis alatis*, Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 7. tab. 8. fig. B.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, herbacées, hautes de cinq à six pieds, légèrement tétragones, garnies de feuilles opposées, pétioles, oblongues, lancéolées, acuminées, glabres à leurs deux faces, supportées par des pétioles connés, courts, ailés.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, solitaires ou ternés ; rangées par verticilles, munis chacun d'un involucre composé de deux grandes folioles droites, ovales, très-entières, persistantes, de couleur écarlate, recouvrant en entier les pédoncules ainsi que des bractées linéaires, très-entières, velues, de couleur écarlate. La corolle & le calice sont jaunes, les filaments des étamines velus.

Cette plante croît au Pérou, dans les terrains ombragés & marécageux ; elle fleurit depuis la fin de l'été jusqu'à celle de l'automne. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

2. **SANCHÈZE** à feuilles ovales. *Sanchezia ovata*.

*Sanchezia foliis ovatis, petiolatis, subulis pubescentibus ; bracteis oblongis, emarginatis*, Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 103. n°. 2.

*Sanchezia (ovata), foliis ovatis, acuminatis ; petiolis semicylindricis*, Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 7. tab. 8. fig. C.

Ses tiges sont glabres, droites, tétragones, herbacées, presque simples, hautes de cinq à six pieds, garnies de feuilles pétioles, opposées, ovales, acuminées, très-entières, ouvertes, veinées, luisantes en dessus, pubescentes à leur face inférieure, supportées par des pétioles connés, à demi-cylindriques.

Les fleurs sont réunies en un épi terminal, disposées en verticilles sessiles, entourées d'un involucre à deux folioles ovales, aiguës, concaves, persistantes, de couleur rouge, réfléchies à leur sommet, munies d'autant de bractées que de fleurs qui sont oblongues, légèrement échancrées, de couleur écarlate. Le calice est presque rubulé, rétréci à sa base, à cinq divisions, de couleur purpurine. La corolle est jaune. Les filaments sont velus vers leur sommet.

Cette plante croît dans les lieux ombragés & marécageux du Pérou ; elle fleurit pendant tout l'été & l'automne. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

**SANCHITE.** *Bladhia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, régulières, mono-

pétiolées, qui paroît avoir de grands rapports avec la famille des apocinées, & qui comprend des sous-arbrisseaux fort petits, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont opposées ou presque ternées, les fleurs solitaires ou en petites grappes axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures ; une corolle en roue, à cinq divisions ; cinq étamines courtes ; un style ; une baie supérieure, à une seule semence tuniquee.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, très-court, persistant, divisé en cinq découpures ouvertes.

2°. Une corolle monopétale, régulière, en roue, partagée en cinq découpures ovales, obtuses, ouvertes.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont très-courts, surmontés d'anthères échancrées en cœur, aiguës, rapprochées en cônes, plus courtes que la corolle.

4°. Un ovaire supérieur, surmonté d'un style filiforme, plus long que la corolle, terminé par un stigmate simple, aigu.

Le fruit est une baie globuleuse, de la forme & de la grosseur d'un pois, à une seule loge, mucronée par le style persistant, renfermant une seule semence globuleuse, enveloppée par une tunique.

#### E S P È C E S.

##### 1. SANCHITE du Japon. *Bladhia japonica*. Thunb.

*Bladhia foliis ternis, ferratis, glabris; caule basi decumbente.* Thunb. Flor. japon. pag. 95. tab. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1122. n°. 1.

*Bladhia foliis ovatis, ferratis, glabris.* Lam. Ill. Genet. vol. 2. pag. 102. n°. 1727. tab. 133. fig. 2.

*Sankitsu, vulgòjamma tadò banna.* Kœmpf. Amœn. exot. Fascicul. 5. pag. 775.

C'est un petit arbrisseau qui s'élève à peine à la hauteur d'un pied, dont les racines sont presque simples, grêles, dures, horizontales, garnies de quelques chevelus très-fins. Les tiges sont glabres, cylindriques, presque simples, couchées à leur partie inférieure, redressées, garnies de feuilles opposées, ordinairement ternées, ovales, un peu allongées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont disposées dans l'aisselle des feuilles inférieures, ou un peu au dessous, en petites

grappes fort courtes, très-peu garnies, dont les pédoncules & leurs ramifications sont inclinées, pendans. Leur calice est glabre, fort court, presque campanulé, divisé à son orifice en cinq petites dents aiguës. La corolle est petite, une fois plus longue que le calice, blanche, odorante, monopétale, à cinq découpures ovales, un peu aiguës. Le fruit est une baie globuleuse, pistiforme, mucronée par le style.

Cet arbrisseau croît parmi les broussailles, sur les montagnes du Pérou. b

##### 2. SANCHITE glabre. *Bladhia glabra*. Thunb.

*Bladhia foliis oppositis, ferratis, glabris; caule erecto.* Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 331. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1122. n°. 2.

*Bladhia foliis ferratis, glabris, levibus.* Thunb. Flor. japon. pag. 330. n°. 5.

Cette espèce est très-voisine du *Bladhia japonica*; mais ses feuilles ne sont point ternées, ni les tiges couchées à leur partie inférieure.

C'est un arbrisseau peu élevé, dont les tiges sont droites, simples, glabres, cylindriques, garnies de feuilles opposées, presque sessiles, ovales, aiguës à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords. Les fleurs sont blanchâtres, petites, disposées en petites grappes axillaires, bien plus courtes que les feuilles.

Cette plante croît naturellement au Japon, où elle a été découverte par Thunberg. b

##### 3. SANCHITE velue. *Bladhia villosa*. Thunb.

*Bladhia foliis ferratis, villosis.* Thunb. Flor. japon. pag. 96. tab. 19. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1121. n°. 3.

*Bladhia foliis ovatis, ferratis, villosis.* Lam. Ill. Genet. vol. 2. pag. 102. n°. 1728. tab. 133. fig. 2.

Cet arbrisseau diffère des deux précédens par ses feuilles velues; il s'élève peu. Ses tiges sont cylindriques, hautes de trois ou quatre poices, droites, simples, un peu couchées inférieurement, chargées de poils courts, garnies de feuilles opposées, légèrement pétioles, peu nombreuses; les inférieures distantes, les supérieures plus rapprochées, ovales, courtes, velues, aiguës à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, crenelées ou profondément dentées en scie à leur contour.

Les fleurs sont supportées sur de longs pédoncules presque simples, droits, velus, garnis dans leur longueur & à leur point d'insertion de quelques petites bractées courtes, inégales, distantes, étroites, linéaires, velues, presque lancéolées,

arigues. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures presque subulées.

Cet arbrisseau croît naturellement au Japon. *Th.*

4. **SANCHITE** à feuilles crépues. *Bladhia crispa*. Thunb.

*Bladhia foliis oblongis, crispis, glabris*. Thunb. Flor. japon. pag. 97. — Lam. Ill. Gener. vol. 2. pag. 102. n°. 1719.

*Kakits*, vulg. *fanna tadsi banna*. Kœmpf. Amoen. exot. Fasc. 5. pag. 776. Reliq. tab. 7.

C'est un arbrisseau fort petit, dont les tiges sont droites, simples, glabres, garnies de feuilles alternes, oblongues, glabres à leurs deux faces, crépues à leur contour, très-distinctes par ces caractères des espèces précédentes. Les fleurs sont petites, les calices glabres, courts, à cinq dents; la corolle blanchâtre, à cinq divisions en roue.

Cette plante a été, ainsi que les précédentes, observée au Japon par Thunberg. *Th.*

**SANGA**. *Arbor vernicis, caju-sanga*. Rumph. Amb. vol. 2. pag. 259. tab. 85.

Cet arbre est, d'après Rumphius, celui duquel les Chinois retirent leur vernis. Il paroît appartenir au genre *bernardia*, ou du moins en être très-voisin; par les feuilles peltées & entières, il ressemble à quelques espèces de ricin.

Son tronc est d'une grosseur médiocre; son bois solide, mais spongieux intérieurement, brun dans le cœur, blanc, marqué de taches noires sur les couches extérieures. Il découle de son écorce, naturellement ou par incision, un suc blanc laiteux. Ses branches sont étendues, glabres, d'un brun cendré, divisées en rameaux diffus, garnis de feuilles éparées, alternes, pétioles, entières, peltées, attachées au pétiole un peu au dessus de leur base, amples, ovales, oblongues, acuminées, entières, un peu ondulées à leurs bords, d'un vert-foncé, glabres en dessus, nerveuses à leur face inférieure.

Les fleurs, de couleur blanche ou jaunâtre, sont disposées en grappes pendantes; il leur succède des fruits qui paroissent être des noix ovales, légèrement comprimées, renfermées dans une enveloppe coriace, veinée, d'où découle un suc résineux assez abondant.

Cet arbre croît en Chine, dans les îles Célèbes & ailleurs. *Th.*

La résine qui découle de son écorce, d'abord jaune & liquide, se durcit en une sorte de poix noirâtre, dure, luisante, friable. Dans son premier état elle est caustique, qu'elle enflamme rapidement les parties du corps sur lesquelles elle tombe; mais cette qualité n'altérant le port

tellement dans la résine sèche, qu'on peut se servir impunément des vases que l'on a vernissés avec elle, & dans lesquels on conserve la boisson. C'est cette même résine qu'emploient les Chinois, & dont ils font un si grand usage pour orner leurs meubles, leurs appartements & tous les ustensiles qui en sont susceptibles.

Les émanations qui s'exhalent de ces arbres sont réputées si nuisibles, que les habitants des îles Célèbes n'osent ni se reposer à leur ombre, ni même s'y arrêter. Ils les évitent comme un poison très-dangereux; ils assurent que leur influence fait enfler toutes les parties du corps, occasionne un grand nombre de pustules: les Chinois en sont moins effrayés; ils s'en approchent, mais avec de grandes précautions, pour en recueillir la résine.

Ceux qui font cette opération s'accoutument peu à peu aux influences de cet arbre, & en font bien moins incommodes. On prétend que les Chinois ont un préservatif contre ce venin, mais qu'ils ne le font connoître à aucune autre nation, d'où il arrive qu'ils sont les seuls à profiter de sa résine.

Les fruits, au rapport de Rumphius, lorsqu'on en a fait écouler le suc résineux ou qu'il s'est desséché, sont bons à manger, & n'occasionnent aucune incommodité.

**SANGSORBE**. *Sanguiforba*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des rosacées, qui pourroient former une famille particulière sous le nom de *pimpinelle*, qui réuniroit les *poterium*, les *ancistrum*, &c. avec lesquels ce genre a de très-grands rapports. Il comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ailées, avec une impaire; munies de stipules sur leur pétiole. Les fleurs sont disposées en une tête terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice supérieur, à quatre divisions colorées; point de corolle; quatre étamines; un style; un stigmate capité; deux écailles à la base de l'ovaire; deux semences renfermées dans le calice capsuliforme.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice supérieur, persistant, d'une seule pièce, tétragone à sa base, divisé en quatre découpures ovales, colorées.

2°. Point de corolle.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont très-fins, capillaires, beaucoup plus longs que le calice, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, tétragone, accompagné de

de deux écailles à sa base, surmonté d'un style filiforme, plus court que les étamines, terminé par un stigmate obtus, capité.

Le fruit consiste en deux semences, quelquefois une seule par avortement, un peu arrondies, coniques, renfermées dans le calice persistant, qui s'est durci, & a été converti en une sorte de capsule ovale, turbinée, un peu tétragone.

*Observations.* Nous avons déjà indiqué, à l'article PIMPINELLE, les rapports qui existoient entre les *poterium* & les *sanguiforba*, tellement qu'il est difficile de ne pas les confondre au premier aspect lorsque l'on s'arrête à leur port : l'inspection seule des parties de la fécondation peut les faire distinguer. Les sanguiforbes ont des fleurs hermaphrodites, & quatre étamines. Les pimpinelles sont dioïques ou quelquefois monoïques : leurs étamines sont nombreuses.

## E S P È C E S.

1. SANGSORÉE officinale. *Sanguiforba officinalis*. Linn.

*Sanguiforba foliis glaberrimis, foliolis ovato-subcordatis, spicis ovatis.* (N.)

*Sanguiforba spicis ovatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 169. — Hort. Cliff. 39. — Flor. suec. 130. 137. — Mater. medic. 52. — Gêner. Flor. dan. 97. — Pollich, Pal. n°. 104. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 141. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 62. — II. 176. — Hoffm. Germ. 54. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 344. n°. 1694. tab. 85.

*Pimpinella officinalis.* Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 343. n°. 931.

*Sanguiforba major.* Fuchs, 785. Icon.

*Pimpinella sanguiforba major.* Tournef. Inst. R. Herb. 156. — C. Bauh. Pin. 160.

*Pimpinella silvestris, seu sanguiforba major.* Dod. Pempt. 105. Icon.

*Pimpinella major, flore spadiæo.* J. Bauh. Hist. 3. part. 2. pag. 120. Icon.

*Pimpinella, five sanguiforba major Fuchsi.* Dal. Hist. 1. pag. 1088. Icon.

*Pimpinella tetrasemon, spicis brevi.* Hall. Helv. n°. 705.

3. *Pimpinella major, rigida, prealta, auriculata, subaurea.* Bocc. Mul. 2. pag. 19. tab. 7. — Tourn. Inst. R. Herb. 157.

*Sanguiforba (subaurea), spicis cylindricis; foliolis cordato-oblongis, rigidis, serratis.* Miller, Dict. n°. 2.

4. *Sanguiforba (hispanica), spicis orbiculatis, compatis.* Miller, Dict. n°. 3. Botanique. Tome VI.

*Pimpinella major, hispanica, altera, congesto-rato flore.* Tournef. Inst. R. Herb. 157. — Gmel. Sibir. 3. pag. 141.

Ses tiges sont droites, glabres, médiocrement rameuses, hautes d'un à trois pieds, anguleuses, garnies de feuilles pétioolées, alternes & les caulinaires distantes; les inférieures touffues, ailées, avec une limpaire; composées de onze à treize folioles petites, ovales, obtuses, courtes, opposées, pédiculées, un peu échanquées en cœur à leur base, dentées à leurs bords, vertes en dessus, d'un vert glauque en dessous, glabres à leurs deux faces; celles des feuilles supérieures un peu plus allongées, munies, à la base du pétiole commun, de deux petites folioles qu'on peut également regarder comme deux stipules.

Les fleurs sont sessiles, réunies, à l'extrémité d'un long pédoncule commun, en un épi ou une petite tête ovale. Les calices sont glabres, un peu rougeâtres, à quatre divisions profondes, ovales, aiguës, outre deux écailles plus étroites, presque de même longueur. Les étamines, au nombre de quatre, sont un peu plus longues que le calice. Les semences sont enveloppées par le calice durci, qui forme une sorte de capsule presque à quatre angles.

Cette plante croît en Europe dans les prés secs. x (V.)

Cette plante a les mêmes propriétés que la *pimpinelle officinale*; elle est plus astringente, mais elle a beaucoup moins de parfum; ce qui fait qu'on ne l'emploie pas en salade comme la *pimpinelle*. Les bestiaux la rebutent à cause de la dureté de ses tiges.

2. SANGSORBÉ de Mauritanie. *Sanguiforba mauritanica.* Desfont.

*Sanguiforba villosa, foliis profunde serratis; spicis ovatis, virescentibus; calice rugoso.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 142.

*Pimpinella tingitana, femine rugoso majore & minore, folisque magis incisus.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 263. §. 8. tab. 18. fig. 4.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la *sanguiforba officinalis*. On l'en distingue par ses tiges & ses feuilles plus ou moins velues; par ses folioles plus fortement cannelées; par les calices verdâtres, ridés à leur base.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, cannelées, anguleuses, légèrement velues, rameuses, garnies de feuilles ailées, avec une limpaire; composées de folioles ovales, un peu lancéolées; celles des feuilles inférieures presque rondes, obtuses à leur sommet, presque sessiles, opposées, vertes à leurs deux faces, un peu plus

R r r

pâles & velues en dessous, crénelées en dents de scie très-aiguës.

Les fleurs sont sessiles, réunies en une tête globuleuse, ovale ou allongée, & presque cylindrique à l'extrémité d'un très-long pédoncule simple. Leur calice est de couleur verte, à quatre découpures ovales, aiguës : ce calice devient fortement ridé lorsqu'il se convertit en quelque sorte en capsule à l'époque de la maturité des semences. Les étamines sont au nombre de quatre, saillantes hors du calice.

Cette plante a été observée, par M. Desfontaines, dans les haies au royaume d'Alger. Je l'ai également rencontrée dans les plaines au-delà des ruines d'Hyppone. ♀ (V. v.)

### 3. SANGSORBE moyenne. *Sanguisorba media*. Linn.

*Sanguisorba calicibus subciliatis, rubris; spicis cylindricis.* (N.)

*Sanguisorba spicis cylindricis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 169. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 654. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 334. n°. 1595.

*Pimpinella tetraemon, flaminibus tubo longioribus, spicis cylindricis.* Linn. Gœtt. 239.

*Pimpinella minor de Canada.* Lan. Hist. tab. 138.

*Pimpinella canadensis, major; spicis brevioribus, rubris; foliis levibus.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 264. §. 8. tab. 18. fig. 2.

*Pimpinella canadensis, spicis longis, rubentibus.* Tournef. Inst. R. Herb. 157.

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *sanguisorba officinalis* & le *sanguisorba canadensis*. Ses épis sont d'une longueur médiocre, & ses calices d'un rouge assez vif, légèrement ciliés.

Ses tiges sont glabres, droites, très-lisses, cylindriques, point anguleuses, légèrement striées, longues d'environ deux pieds, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de neuf à quinze folioles ovales, lancéolées, obtuses, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous, crénelées ou profondément dentées en scie à leur contour, pédiculées, opposées.

Les pédoncules sont simples, droits, allongés, terminaux, striés, supportant un épi cylindrique, obus, rougeâtre, long d'environ un ponce, garni de fleurs sessiles, très-ferrées, dont les calices se partagent en quatre découpures légèrement ciliées à leurs bords, ovales, presque obtuses. Les étamines sont au moins une fois aussi longues que les calices, munies d'anthères petites, globuleuses.

Cette plante croît au Canada, & se cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

### 4. SANGSORBE à longs épis. *Sanguisorba canadensis*.

*Sanguisorba spicis longissimis.* Linn. Syst. veget. pag. 158. — Hort. Cliff. 39. — Roy. Lugd. Bot. 242. — Cmel. Sibir. vol. 3. p. 143. — Mill. Dict. n°. 4. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 344. n°. 1696.

*Sanguisorba (canadensis), spicis longo-cylindricis, albidis; flaminibus longissimis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 100.

*Sanguisorba canadensis, flore albo, spicata.* Ruff. len. 63.

*Pimpinella maxima, foliis longioribus, &c.* Amm. Ruh. 37. n°. 17.

*Pimpinella sanguisorba, canadensis, major; spicis longiore, albis.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 264. §. 8. tab. 18. fig. 12.

*Pimpinella maxima canadensis, longius spicata.* Cornut. Canad. pag. 175. tab. 174. — Tournef. Inst. R. Herb. 157. — Barrel. Ic. rar. 18. tab. 739.

*Sanguisorba major, americana; flore albo, spicata.* Broff. Tournef.

Ses racines sont grosses, épaisses, fibreuses : il s'en élève des tiges rameuses, hautes de deux ou trois pieds, cylindriques, striées, légèrement velues, garnies de feuilles alternes, pétiolées, ailées, avec une impaire; composées de onze à treize folioles longuement pétiolées, presque alternes, grandes, ovales, oblongues ou lancéolées, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu plus pâles en dessous, nerveuses, veinées, réticulées, fortement dentées en scie à leurs bords, munies, à la base du pétiole commun, de deux stipules décurrentes, presque rondes, incisées.

Les pédoncules sont très-longs, simples, droits, striés, supportant à leur sommet un épi presque cylindrique, long de deux ou trois ponce, de fleurs sessiles, nombreuses. Les calices sont d'un vert-blanchâtre, à quatre découpures ovales, presque obtuses. Les étamines sont saillantes, très-longues; les anthères presque globuleuses; une à deux semences renfermées dans le calice converti en capsule.

Cette plante croît au Canada, dans les environs de Québec. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v.)

**SANGUINIÈRE.** *Sanguinaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des papavéracées, qui a des rapports avec les *argemone*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, qui n'ont que des feuilles radicales, une hampe à une fleur, & qui fournissent

sont, de toutes leurs parties, un suc rougeâtre, abondant.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles ; une corolle à huit pétales ; une filique ovale, à une seule loge ; un grand nombre d'étamines ; point de style ; un stigmate à deux filloles.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de deux folioles ovales, concaves, caduques, plus courtes que la corolle.

2°. Une corolle composée de huit pétales oblongs, très-ouverts, obtus, les intérieurs & alternes plus étroits.

3°. Un grand nombre d'étamines dont les filaments sont plus courts que la corolle, terminés par des anthères simples.

4°. Un ovaire supérieur, oblong, comprimé, sans style, surmonté d'un stigmate capité, marqué de deux sillons persistans.

Le fruit est une capsule oblongue, ventrue, ovale, rétrécie à son sommet, à une seule loge, s'ouvrant en deux valves caduques, appliquées contre un réceptacle persistant, colonnaire, sur lequel sont attachées, de chaque côté, des semences nombreuses, arrondies, acuminées.

#### E S P È C E.

SANGUINIERE du Canada. *Sanguinaria canadensis*. Linn.

*Sanguinaria foliis subreniformibus, sinuato-lobatis ; scapulis nigris*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 309.

*Sanguinaria*. Linn. Syst. veget. 489. — Hort. Cliff. 202. — Gronov. Virgin. 57. — Mill. D. & n°. 1. — Giseck. Icon. Fasc. 1. n°. 15. — Lam. Illustr. Gener. tab. 449. fig. A.

*Sanguinaria minor, flore simplicis*. Dillen. Eltham. pag. 335. tab. 252. fig. 326.

*Chelidonium majus canadense, acutalon*. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 257. §. 3. tab. 12. fig. 1. — Cornut. Canad. 212. — Rai, Hist. 1887.

*Ranunculus virginianus, albus*. Parck. Theatr. 327. — Rai, Suppl. 514.

β. *Sanguinaria major, flore simplicis*. Dill. Eltham. pag. 335. tab. 252. fig. 325. — Lam. Illustr. Gener. tab. 449. fig. B.

γ. *Sanguinaria major, flore pleno*. Dill. Eltham. pag. 335. tab. 252. fig. 326.

Vulgairement la beauharnoise, la grande célandrine.

#### Paccoon des Américains.

C'est une petite plante assez agréable, dont les racines sont épaisses, tubéreuses, horizontales, qui poussent inférieurement des filamens fibreux, capillaires, roussâtres. Du sommet des racines sortent souvent une seule feuille radicale qui enveloppe les fleurs avant leur développement, comme une spathe, & qui est elle-même enveloppée à l'abais par plusieurs gaines membraneuses, très-minces. Cette feuille est presque ronde, un peu en forme de capuchon réniforme, profondément échancrée à sa base, lobée, sinuée à son contour, glabre à ses deux faces, d'un vert-noirâtre en dessus, d'un blanc-bleuâtre en dessous, traversée par des veines très-ramifiées, rougeâtres, supportées par une petiole glabre, comprimé, élargi, long de trois à quatre pouces.

Les fleurs sont blanches, solitaires, supportées par une hampe grêle, plus longue que les feuilles, tendres, cylindriques. Le calice n'est composé que de deux folioles qui tombent aussitôt que les pétales s'épanouissent. La corolle est composée de huit pétales oblongs, obtus, quatre extérieurs, quatre presque intérieurs, alternes, un peu plus étroites. L'ovaire est oblong, aigu à son sommet, terminé par un stigmate sessile, capillaire, épais, un peu allongé, marqué de deux sillons profonds. Le fruit est une capsule ovale, oblongue, rétrécie à sa base, acuminée à son sommet, terminée souvent par le stigmate persistant, à une seule loge, à deux valves qui s'écartent, tombent & laissent à découvert les semences attachées, des deux côtés, à un placenta qui répond aux bords des valves.

Cette plante contient un suc rougeâtre, couleur de sang, qui s'écoule abondamment de toutes ses parties lorsqu'on les brise ; elle croit dans le Canada & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale : on la cultive au Jardin des Plantes. M. Boiss m'en a communiqué un exemplaire qu'il a recueilli en Amérique : ses fleurs varient par leur grandeur & se doublent quelquefois. (P. v.)

SANICLÉE. *Sanicula*. Genre de plantes dicotylédones, à cinq pétales, de la famille des ombellifères, qui a des rapports avec les *asfrantia*, & qui comprend des herbes exotiques ou indigènes de l'Europe, à feuilles palmées ou digitées, dont les fleurs sont disposées en ombelles, les ombellules presque sessiles, capitées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à peine sensible, presque entier ; cinq pétales réfléchis ; un fruit ovale, rude, hérissé.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées d'abord en une ombelle générale, composée à peine de trois ou quatre

R 11



rayons, munis à leur base d'un involucre qui n'enveloppe que la moitié des rayons, situé d'un seul côté; chaque rayon terminé par une ombellule en tête touffue, presque sessile, enveloppée en entier par un involucre plus court que les fleurs; celles du centre n'ont que des étamines.

Chacune de ces fleurs offre :

1°. Un calice presque entier, à peine sensible.

2°. Une corolle composée de cinq pétales comprimés, réfléchis.

3°. Cinq étamines dont les filaments sont simples, droits, un peu plus longs que la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, hispide, surmonté de deux styles subulés, réfléchis, terminés par des stigmates aigus.

Le fruit est ovale, aigu, très-raboteux, sans péricarpe, partagé en deux semences hémisphériques, convexes d'un côté, planes de l'autre.

#### ES P È C E S.

1. SANICLE d'Europe. *Sanicula europæa*. Linn.

*Sanicula foliis radicalibus, simplicibus; flosculis omnibus sessilibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 339. — Flor. suec. 222. 215. — Mater. medic. 76. — Æder. Flor. dan. 283. — Blackw. tab. 63. — Pollich, Pal. n°. 265. — Hoffm. Germ. 90. — Lam. Illustr. Genet. tab. 191. n°. 1.

*Sanicula foliis radicalibus, trilobatis; lateralibus lobis tripartitis; umbellis globosis*. Haller, Helv. n°. 737.

*Caucalis (sanicula), flosculis omnibus sessilibus; umbellis subcapitatis, subternis*. Crantz, Austr. 228.

*Caucalis (sanicula), seminibus rotundis, hispidis; floribus omnibus sessilibus; foliis radicalibus orbiculatis, profunde quinquelobis*. Roth. Germ. vol. 1. pag. 121. — Il. 310.

*Sideritis tercia Dioscoridis*. Column. Phyt. 71. 72.

*Sanicula flosculis omnibus sessilibus*. Gronov. Virgin. 147.

*Sanicula*. Hort. Cliff. 88. — Roy. Lugd. Bar. 93. — Rivin. tab. 30. — Dodon. Pempt. 140. Icon.

*Sanicula officinarum*. C. Bauh. Pin. 319. — Tournef. Inst. R. Herb. 326. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 402. n°. 986.

*Diapensa*. Camer. Epitom. Ic.

*Sanicula mas Fuschii, sive diapensa*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 639.

*Sanicula & diapensa*. Lobel. Icon. 663. — Idem. Observ. 378. Icon.

*Sanicula foliis palmato-digitatis; foliis quinis, incisifs, ovulis lanceolatis*. Sauvag. Monsp. 209. — Gouan, Monsp. 131.

Ses racines sont fibreuses, presque fasciculées, dures, épaisses à leur collet, d'où s'élèvent plusieurs tiges hautes d'un pied & demi environ, sans feuilles caulinaires lorsqu'elles sont simples, presque glabres, cannelées, peu rameuses, garnies de feuilles radicales, nombreuses, longuement pétioolées, glabres à leurs deux faces, luisantes à leur face supérieure, plus pâles ou un peu blanchâtres en dessous, souvent fort amples, palmées ou divisées en trois ou cinq lobes profonds, dentés, incisifs, élargis, & souvent trifides à leur sommet; les feuilles qui accompagnent la base des rameaux sont bien moins pétioolées & moins divisées.

Les fleurs sont blanchâtres, fort petites, réunies en ombellules globuleuses: les rayons de l'ombelle universelle sont au nombre de quatre ou cinq assez longs, & se divisent en trois parties à leur sommet, portant chacune trois ombellules partielles, sessiles. L'involucre universelle est courte, composée ordinairement de deux folioles trifides, portées d'un seul côté. Les involucre partielles sont plus courtes que les fleurs, à deux petites folioles étroites, opposées, aigues, entières. Les fruits sont hémissphériques, nombreux, la plupart courbés en crochets à leur sommet, comme celles de la bardane.

Cette plante croit en Europe, dans les bois, où elle est assez commune. (V. v.)

La sanicle entre dans les vulnéraires de Suisse; elle est astringente, détersive, très-vulnéraire. On prescrit son infusion seule ou coupée avec le lait, dans les hémorragies, les crachements de sang, les pertes, les ulcères internes. Les moutons & quelquefois les chèvres la mangent, mais les chevaux n'en veulent point.

2. SANICLE du Canada. *Sanicula canadensis*. Linn.

*Sanicula foliis radicalibus, compositis; foliolis ovatis*. Linn. Syst. veget. pag. 372. n°. 2. — Gronov. Virgin. 146. — Thunb. Prodr. 49.

*Sanicula canadensis, ampliflora, laciniato folio*. Tournef. Inst. R. Herb. 326.

Cette plante ne paroît différer essentiellement de la précédente que par la grandeur de toutes ses parties bien plus étendues. Ses tiges sont fort hautes, rameuses; les feuilles radicales très-longuement pétioolées, fort amples, très-profondément divisées en grands lobes laciniés, & dont les divisions sont ovales, incisives. La disposition des fleurs est la même que dans la *sanicula officinalis*,

mais très-différente dans les proportions de grandeur.

Cette plante croît au Canada & à la Virginie. ♀

3. *SANICLE* de Mariland. *Sanicula marilandica*. Linn.

*Sanicula flosculis masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus*. Linn. Syll. veget. pag. 272. — Gron. Virg. 31. — Jacq. Collect. 2. pag. 293. — Icon. rar. 2. tab. 348. — Lam. Illustr. Gener. tab. 191. n° 2. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 1. tab. 20. fig. 3.

*Sanicula marilandica, foliis ad petiolam usque partitis, five subpartitis; capitulorum floribus fertilibus, subternis & sessilibus; fertilibus numerosioribus, pedicellatis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 162.

*Sanicula foliis septilobatis, inaequalibus; flosculis masculis pedunculatis*. Hort. Upf. 57.

*Sanicula marilandica, caule & ramulis dichotomis; echinis minimis in eodem communi pediculo ternis*. Rai, Suppl. 260.

Ses tiges sont hautes, droites, grêles, stériles, très-glabres, divisées en rameaux presque dichotomes. Les feuilles radicales sont amples, longuement pétioles, digitées ou divisées, jusqu'à leur base, en six ou sept folioles lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, incisées & crénelées à leur contour, glabres à leurs deux faces, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous; les feuilles caulinaires moins grandes, médiocrement pétioles, & n'ayant très-souvent que cinq ou six folioles.

Les fleurs sont disposées en petites ombelles capitées. De l'extrémité des rameaux & des tiges partent deux longs pédoncules simples, dichotomes, qui supportent chacun, à leur sommet, une ombelle universelle à trois rayons, & dans la bifurcation une ombelle simple ou à un seul rayon, droite, beaucoup plus courte. Chaque rayon se termine par trois ombellules presque sessiles, ramassées en tête. L'involucre universel ressemble beaucoup aux feuilles: il est plus court que les rayons. Les fleurs font, les unes fertiles, les autres stériles. Les fertiles sont sessiles; les stériles médiocrement pédunculées. Les semences sont fort petites, hérissées de pointes courtes, recourbées en hameçon à leur sommet.

Cette plante croît au Mariland, dans la Virginie & la Caroline. Elle m'a été communiquée par M. Bosc. ♀ (V. f.)

*SANSEVIERA*. Genre établi par Thunberg, composé de plusieurs espèces enlevées au genre *Aletris* de Linné, dont elles s'écartent en effet par leur fruit, qui est une baie monosperme.

Le caractère essentiel de ce nouveau genre consiste dans :

Une corolle inférieure monopétale, dont le tube est filiforme, le limbe à six découpures réfléchies en dehors; six étamines insérées sur le limbe; une baie à une seule semence.

Les espèces d'*Aletris*, rapportées par Thunberg à ce genre, & qui ont déjà été mentionnées dans cet ouvrage à l'article *ALETRIS*, sont :

1°. *Sansevieria* (thyrsifolia), *acaulis; foliis lanceolatis, carnosiss; floribus geminatis*. Thunberg, Prodr. 65.

*Sansevieria* (guineensis), *foliis lanceolatis, unifornibus; stylo fluminibus aequali longiore; bracteis tubo corollae triplo brevioribus; floribus sessilibus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 159. n° 1.

Voyez l'article *ALETRIS* DE GUINÉE, vol. 1. pag. 79. n° 3.

2°. *Sansevieria* (zeylanica), *foliis glabris, oblongis, acutis, planis & lineari-lanceolatis, canaliculatis; stylo longitudine fluminum; bracteis pedunculi longioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 159. n° 2.

*Sansevieria* (æthiopica), *acaulis; foliis linguiformibus, convolutis; racemo oblongo, floribus erectis*. Thunb. Prodr. 65.

*Salmia spicata*. Cavan. Icon. rar. 3. pag. 24. tab. 264.

*Liriope spicata*. Loureiro, Coch. pag. 248.

Voyez l'article *ALETRIS* DE CEILAN, vol. 1. pag. 79. n° 4. a.

3°. *Sansevieria* (lanuginosa), *foliis nervosis, nervis lanuginosis, inferioribus oblongis, reliquis linearibus; stylo fluminum longitudine, pedunculis brevioribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 160. n° 3.

Voyez l'article *ALETRIS* DE CEILAN, vol. 1. pag. 79. n° 4. var. b.

*SANTALIN*. *Santalum*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs presque incomplètes, de la famille des oragées, qui a des rapports avec les *Escallonia*, & qui comprend des arbres à feuilles entières, opposées, dont les fleurs sont axillaires & terminales, presque disposées en thyrses.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice urcéolé, à quatre divisions; point de corolle; quatre écailles à l'orifice du calice; quatre étamines; un stigmate à trois lobes; une baie à trois loges, couronnée.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* d'une seule pièce, urcéolé, persistant, divisé, jusque vers la moitié, en quatre découpures ouvertes, ovales, aiguës.

2°. Point de *corolle*.

3°. Quatre *écailles* ovales, un peu épaisses, barbuës, couronnant l'entrée du calice, alternes avec les divisions.

4°. Quatre *étamines*, dont les filamens sont filiformes, pileux en dehors, insérés sur le calice, alternes avec les écailles, terminés par des anthers ovales.

5°. Un *ovaire* inférieur, enroulé par un disque convexe, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate trilobé, lobé, dont les lobes sont courts & obtus.

Le fruit est une baie ovoidé, couronnée, à trois loges.

*Observations.* Linné avoit fait deux genres, sous le nom de *frum* & de *santalum*, que M. Lamarck croit naturellement devoir être réunis en un seul, mais même appartient à la même plante, à laquelle il a conservé le nom de *frum*. La différence qui existoit, selon Linné, entre le *frum* & le *santalum*, consistoit en ce que, dans ce dernier, la fleur, outre quatre écailles alternes avec les découpures du calice, avoit encore une corolle fort petite, insérée sur les divisions du calice. M. Lamarck, d'après ses observations, n'admet point l'existence de cette corolle; & comme d'ailleurs les caractères, tant génériques que spécifiques, sont les mêmes dans les deux genres, il s'en suit que la même plante a été décrite sous deux noms différens.

Je suis très-porté à croire que ces deux célèbres botanistes ont véritablement observé ce qu'ils annoncent l'un & l'autre, & quoique leurs opinions paroissent contradictoires, qu'elles aient cependant la vérité pour base. Je saisis cette occasion pour exposer quelques observations que j'ai faites, il y a déjà long-tems, sur le calice & la corolle, & qui peuvent justifier l'opinion de ces deux savans.

Il existe un grand nombre de plantes qui paroissent privées de corolle, mais qui sont pourvues d'un calice ordinairement plus épais, coloré surtout en dedans & même à ses bords, dont les divisions sont très-souvent minces à leur contour, presque membraneuses, quelquefois colorées comme à leur intérieur, tandis que leur milieu est beaucoup plus épais, verdâtre en dehors, ainsi qu'on peut le remarquer dans le plus grand nombre des espèces du genre *polygonum*.

S'il étoit possible d'enlever, avec délicatesse, cette pellicule intérieure, colorée, qui débordé si souvent les folioles calicinales, il seroit bien

difficile, selon moi, de ne pas y reconnoître une véritable corolle extrêmement mince, & qui, dans les plantes dont il s'agit, fait corps avec le calice auquel elle y adhère tellement, qu'il n'est plus possible alors de la regarder comme un organe distinct. Les fleurs nous offrent souvent de semblables réunions. Ce sont les filamens qui sont tantôt réunis en un seul corps, comme dans les malvées, tantôt font pour ainsi dire collées sur la corolle presque dans toute leur longueur, qui cependant s'y distinguent par l'élevation ou les côtes qu'elles produisent aux endroits de leur insertion; enfin, dans d'autres plantes ces mêmes filamens font corps avec le style, & l'on conçoit aisément que des parties aussi délicates, aussi onctueuses peuvent très-bien s'enner en quelque sorte les unes sur les autres. Or, puisque cette réunion a lieu pour plusieurs parties des fleurs, ne sommes-nous point autorisés à l'admettre également pour le calice & la corolle, qui se rapprochent tant par leur organisation & la nature de leurs fonctions? Il paroîtroit peut-être trop indistinct, trop prématuré d'établir ces observations en principe, mais elles peuvent du moins s'appliquer à un grand nombre de plantes; & pour revenir à celle dont il est ici question, je suis très-porté à croire que, dans les *frum*, la corolle fait corps avec le calice; il est alors possible que quelquefois elle s'en détache. C'est ainsi que Linné l'aura observée, & que, d'après ce caractère, il aura établi le genre *santalum*; à quoi il faut ajouter que, d'après Linné, les pétales se trouvent appliqués sur les divisions du calice, & non alternes avec elles; ce qui alors seroit très-différent. La même plante se fera offrir, aux observations de M. Lamarck, la corolle appliquée entièrement sur le calice, & il aura prononcé sur l'identité de ces deux plantes.

#### E S P È C E.

*SANTALIN* à feuilles de myrte. *Sirium myrsifolium*. Lam.

*Sirium foliis simplicibus, lanceolatis, integris; floribus thysoides.* (N.) — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 374. n°. 337. tab. 74.

*Sirium myrsifolium*. Linn. Mantiss. 200. — Roxb. Coromand. 1. pag. 2. tab. 2.

*Santalum album*. Linn. Syst. veget. pag. 137.

*Santalum verum*. Breyer. Icon. 94. tab. 5. fig. 1. — Mater. med. 102. — Vahl, Symb. 2. pag. 32.

*Santalum album*. C. Bauh. Pin. 392. — Rumph. Ambon. vol. 2. pag. 42. tab. 11. — Burm. Flor. ind. 87.

C'est un arbre qui a l'aspect du myrte, & dont les tiges se divisent en rameaux étalés, roides, droits, glabres, presque cylindriques, articulés,

garnis de feuilles opposées, pétiolées, lancéolées, tendres, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, vertes à leur face supérieure, glauques en dessous, rétrécies, presque obtuses à leurs deux extrémités, assez larges, longues d'environ deux pouces, marquées de quelques nervures latérales, réticulées.

Les fleurs sont petites, disposées dans l'aisselle des feuilles terminales; elles forment une sorte de thyrsé à l'extrémité d'un pédoncule commun, beaucoup plus court que les feuilles, médiocrement ramifié. Le calice est glabre, entier, à quatre dents aiguës, aussi longues que le tube, muni, à son orifice, de quatre écailles un peu épaisses, ciliées à leur sommet, alternes avec les dents calicinales. L'ovaire est ovale; il lui succède une baie divisée en trois loges.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *h*  
(*V. f. in herb. Lam.*)

Le bois de cet arbre est connu dans le commerce sous le nom de *santal blanc*. Il est pesant, solide, d'une couleur pâle, médiocrement odorant, & se fend difficilement. On lui prête, pour les parfums, le *santal cinra*, qui appartient à une autre plante, ainsi que le *santal rouge*. On l'apporte de l'île de Timor & de Solor.

**SANTOLINE.** *Santolina*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, toutes flosculeuses, de la famille des corymbifères, qui a de grands rapports avec les *anastasia*, & qui comprend des sous-arbrisseaux ou des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont ou simples & tuberculées à leurs bords, ou ailées; les fleurs solitaires à l'extrémité de chaque rameau.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice imbriqué, hémisphérique; des fleurs toutes flosculeuses; un réceptacle garni de paillettes; des semences non aigrettes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont toutes flosculeuses, égales, hermaphrodites, réunies dans un calice commun.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, hémisphérique, imbriqué, composé d'écailles ovales, oblongues, aiguës, très-ferrées.

2°. Une corolle composée de fleurons hermaphrodites, égaux, nombreux, un peu plus longs que le calice; chaque fleuron infundibuliforme, divisé à son limbe en cinq découpures réfléchies en dehors.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments

sont capillaires, très-courts; les anthères oblongues, réunies en un cylindrique rubané.

4°. Un ovaire oblong, triloculaire, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par deux stigmates oblongs, comprimés, tronqués.

Les semences sont solitaires, oblongues, à quatre faces, sans aigrettes, placées sur un réceptacle plane, garni de paillettes concaves.

#### E S P È C E S.

1. *SANTOLINE* à feuilles de romarin. *Santolina rosmarinifolia*. Linn.

*Santolina pedunculis unifloris; foliis linearibus, margine tuberculatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1180. n°. 2. — Hort. Cliffort. 397. — Roy. Lugd. Bat. 146. — Willd. Observ. n°. 125. — Gouan, Monsp. 431. — Gerard, Flor. gall. Prov. 197.

*Santolina pedunculis unifloris, foliis linearibus*. Linn. Spec. 842.

*Santolina pedunculis unifloris; capitulis globosis; foliis linearibus, integerrimis*. Miller, Dict. n°. 5.

*Abrotanum femina, foliis rosmarini, majus*. C. Bauh. Pin. 137. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 12. §. 6. tab. 3. fig. 22. Icon. Bona.

*Santolina foliis rosmarini, major*. Tourn. Inst. R. Herb. 461.

*Abrotanum femina*, IV. Cluf. Hist. 1. pag. 432.

*Abrotanum femina, virens, vermiculato folio*. Barrel. Icon. rar. tab. 464.

*Santolina tuberculosa*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 42. n°. 36.

5. *Santolina* (minor), *pedunculis unifloris; foliis linearibus, confertis, obtusis*. Miller, Dict. n°. 6.

*Abrotanum femina, foliis rosmarini, minus*. C. Bauh. Pin. 137. — Kniph. Centur. 7. n°. 80.

*Santolina foliis rosmarini, minor*. Tourn. Inst. R. Herb. 461.

*Abrotanum femina*, V. Cluf. Hist. 342.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles très-étroites, linéaires, entières, plus ou moins tuberculées à leurs bords, mais point dentées; en quoi elle diffère de la suivante, de laquelle j'ai cru devoir la séparer, quoique la plupart des auteurs ne l'aient regardée que comme une variété.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, cylindriques, glabres, verdâtres, quelquefois d'une couleur glauque, ainsi que les feuilles; rameuses, hautes d'un à deux pieds & plus, garnies de feuilles éparées, nombreuses, alternes, plus distantes vers le sommet des tiges, linéaires, étroites, longues de plus d'un pouce, larges d'une à

deux lignes, quelquefois presque filiformes, verdâtres, glabres à leurs deux faces, obtuses, entées à leurs bords, lesquels sont munis de petits tubercules plus ou moins nombreux, semblables à de petites dentelures à peine sensibles.

Les fleurs sont solitaires au sommet de chaque rameau, dont l'extrémité sert de pédoncule. Leur calice est hémisphérique, glabre, composé d'écaillés imbriquées, de couleur brune, convexes en dehors, carénées sur leur dos; les écaillés intérieures membraneuses & presque frangées à leur sommet, les extérieures aiguës. Les fleurs sont jaunes, routes stériles, hermaphrodites, à peine plus longues que les calices; le réceptacle est plane, chargé de paillettes.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, ainsi que dans les autres contrées méridionales de l'Europe. *h* (P. v.)

La plante *β*, que quelques autres distinguent comme espèce, diffère de la précédente par ses tiges beaucoup plus courtes, par ses rameaux plus diffus & nombreux. Les feuilles sont très-étendues, plus courtes; les fleurs un peu plus petites.

## 2. SANTOLINE verte. *Santolina viridis*. H. P.

*Santolina foliis linearibus-oblongis, pinnatim denticulatis; floribus subsessilibus; ramis fasciculatis, longissimis.* (N.)

*Santolina (visere), pedunculis unifloris; foliis linearibus, longissimis, bisariis denticulatis.* Millot, Dict. n°. 4.

*Santolina rosmarinifolia*, var. *γ*. Linn. Spec. Pl. vol. 2. pag. 1180.

*Abrotanum femina*, viside. C. Bauh. Pin. 137.

*Santolina foliis obscure viridibus, flore aureo* (& *flore sulphurea coloris*). Tournef. Inst. R. Herb. 461.

*Abrotanum femina*, Pl. Clus. Hist. 342.

Je trouve dans cette plante, rapportée jusqu'aujourd'hui par la plupart des botanistes, au *Santolina rosmarinifolia* comme variété, des caractères qui doivent la faire distinguer comme espèce. La dentelure de ses feuilles est si remarquable, que, quoique très-fine & courte, elle les rend presque pinnatides par l'opposition des dents; de plus, outre que les têtes des fleurs sont assez généralement beaucoup plus grosses, les écaillés intérieures du calice ne sont point surmontées de cette membrane frangée dont j'ai fait mention dans l'article précédent. Toute la plante est parfaitement glabre, d'un vert beaucoup plus foncé, qui ne passe point à la couleur glauque.

Ses tiges sont fortes, ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux longs, très-nombreux; les supérieurs très-droits, presque fasciculés, angu-

leux, striés, de couleur verte, garnis de feuilles simples, éparées, sessiles, très-étroites, presque filiformes, longues d'un à deux pouces, glabres à leurs deux faces, divisées à leurs bords en petites dents courtes, opposées, quelquefois bifides, presque disposées sur quatre rangs, & qui sont en quelque sorte les rudiments d'une feuille ailée.

Les fleurs sont terminales, solitaires à l'extrémité de chaque rameau, grosses, un peu globuleuses, médiocrement hémisphériques, supportées par de longs pédoncules droits, toides, qui ne sont que le prolongement des rameaux, mais sans feuilles. Les calices sont d'un vert-jaunâtre, très-glabres, composés d'écaillés fermes, concaves, imbriquées, inégales, un peu aiguës, carénées sur leur dos; les intérieures obtuses. Les fleurs de la corolle, un peu plus longues que le calice & très-nombreux, sont jaunes; leur tube est un peu renflé; leur limbe petit, à cinq découpures courtes, ovales, aiguës; le réceptacle garni de paillettes linéaires, obtuses, arquées, de la longueur du tube de la corolle; les semences médiocrement tétragones, sans aigrette.

Cette plante croît en Italie, en Espagne, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe méridionale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (P. v.)

## 3. SANTOLINE à feuilles de bruyère. *Santolina erivoides*. H. P.

*Santolina pedunculis unifloris; capitulis minimis, depressis; foliis angustis-linearibus, subglabris, pinnatim denticulatis; ramis incano-pubescentibus, caulis glabris.* (N.)

*Santolina foliis erica vel sabina*. Tournef. Inst. R. Herb. 460.

*Abrotanum femina, foliis erica vel sabina*. C. Bauh. Pin. 137. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 12. §. 6. tab. 3. fig. 17. Capitula majores.

*Santolina altera*. Dodon. Pempt. 269. Icon.

*Abrotanum femina Dodonai*. Dalech. Hist. 1. pag. 938. Icon.

Cette espèce, très-voisine du *Santolina viridis*, en diffère par les têtes de ses fleurs beaucoup plus petites, par ses rameaux blanchâtres, presque tomenteux, & par ses feuilles un peu pubescentes.

Ses tiges sont droites, hautes d'un à deux pieds, ligneuses, glabres, cylindriques, de couleur cendrée, chargées d'un très-grand nombre de rameaux droits, grêles, élancés, revêtus d'un duvet blanc, tomenteux, garnis de feuilles éparées, petites, sessiles, très-simples, très-étroites, linéaires, longues de plus d'un pouce, sur une ligne de large; verdâtres, à peine pubescentes, munies à leurs bords de petites dents courtes, opposées, obtuses.

Les

Les fleurs forment de petites têtes hémisphériques, comprimées tant en dessus qu'en dessous, solitaires à l'extrémité des rameaux. Leur calice est presque glabre, un peu cendré, composé d'écaillés imbriquées, fortement arquées, petites, épaisses, marquées extérieurement d'une sorte nervure sur le dos, &c. de deux autres latérales, moins marquées. Les fleurons sont tous hermaphrodites, courts, de couleur jaune; le réceptacle garni de paillettes; les semences petites, point aigretées.

Cette plante se rencontre dans les contrées méridionales de l'Europe. On la cultive au Jardin des Plantes. *h* (V. v.)

4. SANTOLINE à feuilles de cyprès. *Santolina chama-cyparissus*. Linn.

*Santolina pedunculis unifloris, foliis quadrifariis dentatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1179. n°. 1. — Hort. Cliffort. 397. — Hort. Upsal. 252. — Mater. medic. 182. — Royen, Lugd. Bat. 146. — Mill. Dict. n°. 1. — Haller, Helv. n°. 123. — Lindw. Fct. tab. 198. — Blachw. tab. 346. — Kniph. Cent. 6. n°. 80. — Regn. Botan. — Gouan, Flor. gall. Prov. 191. — Gouan, Monsp. 431. — Lam. Illustr. Gener. tab. 671. fig. 3.

*Abrotanum femina, foliis teretibus*. C. Bauh. Pin. 136.

*Abrotanum femina, vulgare*. Clus. Hist. p. 341. Icon.

*Santolina foliis teretibus*. Tourn. Inst. R. Herb. 460.

*Chama-cyparissus*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 113. Icon.

*Polium Thophrasti & Dioscoridis, & arabum vermiculato folio*. Col. part. 1. 54.

*Abrotanum femina*. Lobel. Icon. 768.

*Santolina cupressiformis*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 42. n°. 36. IV.

Vulgairement fantoline, garde-tobe, petit cyprès.

Cette plante, qui varie un peu, soit dans son port, soit plus particulièrement dans la forme de ses feuilles, est cependant facile à distinguer par ces mêmes feuilles à dentelures, la plupart distribuées par quatre rangs : toutes les parties sous d'ailleurs plus ou moins tomenteuses, quoiqu'elles perdent souvent, par la culture, une grande portion de leur duvet.

Ses tiges sont ligneuses, assez épaisses à leur base, d'où s'élèvent un grand nombre de rameaux droits, cylindriques, pubescens ou tomenteux, blanchâtres ou de couleur cendrée, garnis de feuilles nombreuses, dissuses, sessiles, entières

Botanique. Tome VI.

par paquets, surtout à la base des ramifications; étroites, épaisses, presque cylindriques, tomenteuses, blanchâtres, munies à leurs bords de dents disposées sur quatre rangs, &c. qui semblent autant de tubercules dans les jeunes feuilles. A mesure que ces feuilles vieillissent ou se développent davantage, elles sont plus planes, &c. les dentelures plus allongées, presque pinnatifides; ou bien elles ressemblent assez souvent à quatre petites folioles très-courtes, presque verticillées autour de chaque feuille; enfin, leur forme est si variée, qu'elles se rapprochent quelquefois du *santolina rosmarinifolia*.

Les fleurs sont d'un jaune de soufre, solitaires à l'extrémité de chaque rameau, disposées en une tête assez grosse, hémisphérique, supportées par un pédoncule simple, allongé, grêle, presque nu, strié. L'ensemble de ces fleurs forme un beau corymbe. Le calice est d'un blanc-cendré, composé d'écaillés imbriquées, très-serrées, obtuses, un peu élargies, ciliées à leur sommet, ainsi que les paillettes dont le réceptacle est garni. La corolle est un peu plus longue que le calice; les fleurons nombreux, tous hermaphrodites; les semences tétragones, obtuses à leur sommet, pointues à leur base, sans aigrettes.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe; je l'ai recueillies dans nos départements méridionaux, aux environs d'Aix. *h* (V. v.)

On regarda cette plante comme un assez bon vermifuge, également utile dans les obstructions de la rate &c. du foie. Sa saveur est amère; son odeur forte écarte des étoffes les insectes rongeurs; mais l'aureome a encore plus d'effet, son odeur étant bien plus pénétrante.

5. SANTOLINE très-velue. *Santolina villosissima*.

*Santolina foliis subcylindricis, tuberculatis, villosissimis, incanis; pedunculis unifloris; caule fruticoso, subrepente*. (N.)

*Santolina rosmarinifolia*. Var. *4*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1180.

*Abrotanum femina, flore majore; foliis villosis & incanis*. C. Bauh. Pin. 137.

*Seriphium Dioscoridis, abrotani femina facie*. Lob. Icon. 754. Mediocris.

*Santolina flore majore, foliis villosis & incanis*. Tourn. Inst. R. Herb. 460. — Garid. Aix. 426. — Gérard, Flor. gall. Prov. pag. 193. n°. 2.

*Santolina chama-cyparissus*. Var. Gouan, Montip. pag. 431.

Cette plante me paroît devoir être distinguée comme une espèce particulière, bien plus voisine du *santolina chama-cyparissus*, que du *santolina rosmarinifolia*, quoique Linné l'ait présentée comme

une variété de cette dernière. Elle diffère de la première espèce par ses tiges très-dures, couchées; par ses feuilles presque cy lindriques, plutôt tuberculées que dentées, couvertes d'un duvet épais, lanugineux, d'une grande blancheur.

Ses tiges font ligneuses, très-dures, branchues, étendues sur la terre; elles produisent des rameaux courts, presque simples, à peine feuillés, velus, cotonneux, garnis à leur base de feuilles sessiles, serrées, disposées en gazons denses, très-agréables à la vue par leur blancheur; épaisses, lanugineuses, munies de dentelures presque disposées sur quatre rangs, un peu imbriquées, courtes, obtuses, en forme de tubercules, souvent perdus dans le duvet lanugineux des feuilles.

Les fleurs font solitaires, presque globuleuses, d'une grandeur médiocre, d'un beau jaune, supportées par un pédoncule qui n'est que le prolongement des rameaux, ou plutôt qui s'élève des branches étendues sur la terre. Les calices font un peu pubescens, composés d'écaillés imbriquées, inégales, ciliées à leurs bords, un peu arquées, marquées d'une côte saillante dans leur milieu, obtuses à leur sommet. La corolle est à peine plus longue que le calice; les écailles du réceptacle; nombreuses, membraneuses, de la longueur du calice, presque planes, linéaires, ciliées, obtuses, velues à leur sommet, & quelques-fois munies de deux ou trois petites dents.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, sur les hautes montagnes calcaires, entre les fentes des rochers, à la Sainte-Baume, au Mont-Victhoire aux environs d'Aix, où je l'ai recueillie.  $\bar{h}$  (P. v.)

#### 6. SANTOLINE blanchâtre. *Santolina incana*. Lam.

*Santolina foliis incanis, pinnatifidis, basi integris; pedunculis unifloris; caule repente, suffrutesco.* (N.)

*Santolina incana*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 43. n°. 36. VI.

*Santolina repens & canescens*. Tournef. Inst. R. Herb. 460.

*Abrotanum femina, repens, canescens*. C. Bauh. Pin. 137.

*Santolina quinta*. Dod. Pempt. 269.

M. Lamarck présente, dans sa *Flora française*, cette plante comme une espèce que les auteurs n'ont pas suffisamment distinguée. Je n'ai connoiss point, mais elle me parait avoir beaucoup de rapports avec notre *santolina villosissima*, dont elle diffère par le caractère de ses feuilles.

Cette charmante espèce, dit M. Lamarck, est très-différente du *santolina rosmarinifolia*, Sa ra-

cine produire plusieurs tiges un peu ligneuses, branchues, cylindriques, blanchâtres, cotonneuses, & hautes d'un pied. Ses feuilles font longues de six à huit lignes, tout-à-fait ailées dans leur moitié supérieure, dont la largeur n'a pas tout-à-fait deux lignes; simples à leur base, qui peut être considérée comme un pétiole qui les soutient, & d'une couleur blanchâtre, semblable à celle des rameaux; les feuilles supérieures font moins cotonneuses & moins blanches. Les fleurs font jaunes, terminales, & leurs pédoncules font moins longs que dans les autres espèces.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux, aux environs de Nîmes.  $\bar{h}$  (Descript. ex Lum.)

#### 7. SANTOLINE maritime. *Santolina maritima*.

*Santolina pedunculis unifloris, subcorymbofis; foliis lanceolatis, obtusis, subcrenatis, candidissimis, valde tomentosis.* (N.)

*Athanasia (maritima), pedunculis unifloris, subcorymbofis; foliis lanceolatis, indivisis, crenatis, obtusis, tomentosis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1182.

*Athanasia pedunculis bifloris; foliis lanceolatis, crenatis, obtusis, tomentosis.* Miller, Dict. n°. 6. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 236.

*Santolina corymbo terminali subdiviso; foliis oblongis, integerrimis, obtusis.* Hort. Cliffort. 358. — Gronov. Orient. 257.

*Filago maritima*. Linn. Spec. Plant. 927.

*Fila, o tomentosa, corymbo subramosa; foliis oblongis, obtusis, crenatis.* Miller, tab. 135.

*Diotis candidissima.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 261.

*Gnaphalium maritimum*. C. Bauh. 263. — Tourn. Inst. R. Herb. 461. — Schaw, Specim. n°. 268.

*Gnaphalium*. Camer, Epitom. 605. Ic.

*Chrysanthemum perenne, gnaphaloides, maritimum*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 81. §. 6. tab. 4. fig. 47. Mala.

*Gnaphalium legissimum*. Gzertn. de Fruft. & Sem. vol. 2. pag. 391. tab. 165. fig. 2.

*Gnaphalium maritimum multis*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 157. Ic.

*Gnaphalium maritimum*. Cluf. Hist. 329.

*Santolina tomentosa*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 41. n°. 36. I.

Un caractère particulier & très-remarquable dans cette plante, qui consiste en un prolongement à la base du tube de la corolle, en forme de deux oreillettes, a déterminé M. Desfontaines à

en faire un genre particulier. Les botanistes d'ailleurs ont beaucoup varié pour savoir à quel genre cette plante devoit appartenir. Linné, après l'avoir d'abord placée parmi les *filago*, ensuite parmi les *santolina*, l'a enfin rangée avec les *athanasia*. Gärner l'a regardée comme devant appartenir aux *gnaphalium*. M. Lamarck, à l'article *ATHANASIA*, l'a renvoyée parmi les *santolina*. C'est en effet le genre auquel elle appartient le mieux, à moins d'en faire un genre particulier, d'après l'observation de M. Desfontaines : elle a d'ailleurs, comme toutes les *santolina*, le calice hémisphérique ; le réceptacle garni de paillettes, mais convexes ; les semences sans aigrettes.

C'est une très-belle plante, dont les tiges sont un peu couchées à leur base, épaisses, cylindriques, revêtues d'un duvet coroneux, épais, d'une grande blancheur, médiocrement rameuses, garnies de feuilles esparses, sessiles, lancéolées, presque elliptiques, obtuses à leur sommet, point rétrécies à leur base, longues d'environ un pouce sur trois lignes de large, à peine denticulées à leurs bords, très-blanches, épaisses, tomenteuses à leurs deux faces comme celles de plusieurs espèces de *Rachys*.

Les fleurs sont terminales, disposées en petits corymbes dont les pédoncules sont courts, cylindriques, simples ou plus ordinairement à deux ou trois divisions uniflores, inégales, très-blanches. Le calice est hémisphérique, coroneux, composé d'écaillés imbriquées, un peu élargies, oblongues, médiocrement obtuses. La corolle est jaune, & ne contient que des fleurons tous hermaphrodites, un peu plus longs que le calice, tubulés, à cinq dents à leur limbe. Le tube se rétrécit vers son milieu ; il est comprimé, puis dilaté vers sa base, où il se divise en deux appendices auriculés, qui recouvrent l'ovaire de deux côtés. Les semences sont comprimées, en ovale renversé, sans aigrettes. Le réceptacle est conique, garni de paillettes convexes d'un côté, concaves de l'autre, tomenteuses à leur sommet.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe, sur les bords de la mer : je l'ai recueillie également sur les côtes de Barbarie, le long des côtes maritimes. (V. v.)

Ses tiges, les feuilles & les fleurs broyées ont une odeur aromatique & une saveur amère (Desfont.). Les Orientaux, au rapport de M. Labillardière, emploient avec succès l'infusion de cette plante pour dégager le gravier des reins & de la vessie.

Cette belle espèce méritoit une place dans nos parterres, où ses feuilles, d'une grande blancheur en contraste avec les fleurs d'un jaune doré, produiroient un effet agréable.

8. SANTOLINE à feuilles de *ptarmica*, *Santolina ptarmicoides*. Lam.

*Santolina foliis linearibus, subsistentibus, tomentosis, incanis; pedunculis multifloro-corymbosis.* (N.) Lam. Illustr. Gen. r. tab. 671. fig. 5.

*Ptarmica orientalis, foliis sessilibus, denatis.* Hort. Paris.

Ses tiges sont foibles, grêles, rameuses, légèrement thées, presque anguleuses, blanchâtres, pubescentes, chargées de rameaux allongés, diffus, inclinés, garnis de feuilles alternes, sessiles, petites, linéaires, obtusés ou à peine aiguës à leur sommet, finement denticulées à leurs bords, blanches & chargées d'un duvet tomenteux à leurs deux faces, longues de six à huit lignes.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux & des tiges, en petits corymbes un peu pendans, dont les pédoncules sont pubescens, munis d'une foliole à leur base, & quelquefois vers leur milieu ; rameux, dont les divisions supportent chacune trois à quatre fleurs pédonculées, d'une grandeur médiocre. Les calices sont ovales, d'un blanc-cendré, presque glabres, composés d'écaillés imbriquées, concaves, carenées extérieurement sur leur dos, obtuses. La corolle est jaune ; elle contient des fleurons hermaphrodites. Le réceptacle est garni de paillettes minces, transparentes, oblongues, blanches, presque de la longueur du calice. Les semences sont dépourvues d'aigrettes.

Cette plante a été rapportée du Levant par M. André. Elle est cultivée dans le jardin de M. Cels, & dans celui du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. (V. f.)

9. SANTOLINE très-odorante. *Santolina fragrantissima*.

*Santolina floribus corymbosis; foliis ovatis, crenulatis.* Vahl, Symbol. 1. pag. 70.

*Santolina corymbis sessilibus, caule fruticoso, diffusis, tomentoso; foliis ovatis, crenulatis, sessilibus.* Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 147. n°. 71.

Cette espèce, par la disposition & la forme de ses fleurs, a le port d'un *athanasia* ; cependant les caractères principaux la placent plus naturellement parmi les *santolina* ; elle a beaucoup de rapports avec le *santolina ptarmicoides*. Le mauvais état des individus que j'ai vus secs, ne m'a point permis de prononcer sur l'identité de ces deux plantes, qui ne sont peut-être que la même espèce.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont diffuses, rameuses, cylindriques, blanchâtres, légèrement tomenteuses, garnies de feuilles sessiles, alternes, petites, presque linéaires ou plutôt ovales, lancéolées, obtuses à leur sommet, crénelées à leurs bords, épaisses, blanchâtres & tomenteuses à leurs deux faces, longues à peine de



quatre à cinq lignes, quelquefois un peu rétrécies à leur base.

Les fleurs sont disposées en corymbes à l'extrémité des rameaux; les pédoncules communs alternes, ramifiés vers leur extrémité; les pédoncules partiels sont, les uns uniflores, les autres à deux ou trois fleurs pédiculées. Les calices sont ovales, blanchâtres, pubescens, composés d'écaillés imbriquées, inégales, ovales, oblongues, obtuses à leurs deux extrémités, minces, relevées dans leur milieu par une côte longitudinale. Les fleurs sont jaunes, toutes flosculées, un peu plus longues que les calices. Le réceptacle est ovale, oblong, alvéolé, garni de paillettes membraneuses, traversées par une ligne roussâtre, blanches à leurs bords. Les semences sont petites, obtuses, sans aigrette.

Cette plante croît en Égypte, dans les lieux défectueux & sablonneux. *Tr. (V. f.)*

Elle a une odeur forte, aromatique, très-pénétrante. Les Arabes en font usage dans leurs médicaments; ils emploient son suc pour les maladies des yeux.

#### 10. SANTOLINE des teinturiers. *Santolina tinctoria*, Molin.

*Santolina pedunculis unifloris, foliis linearibus, integerrimis; caulibus fruticosis*, Molin. Hist. natur. Chili, pag. 113. édit. franç.

*Santolinoides linearis folio, flore aureo, vulgè poquel*. Feuillée, Obsev. vol. 3, pag. 61. tab. 45.

Ses racines sont fusiformes & annuelles: il s'en élève des tiges droites, simples, striées, hautes d'environ deux pieds, garnies de feui les alternes, sessiles, étroites, alongées, linéaires, très-entières, d'un pouce & demi de long, sur deux lignes de large; vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont terminales, solitaires, semblables à celles des espèces communes d'un jaune doré. Les habitants du Chili retirent de cette plante une belle couleur jaune; ils la recueillent à la fin du printemps, & en forment de petits faisceaux qu'ils font sécher suspendus en l'air.

Cette plante croît dans le Chili, dans les champs. *O*

#### 11. SANTOLINE droite. *Santolina erecta*, Linn.

*Santolina pedunculis unifloris, foliis bipinnatis, caulibus simplicibus*, Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 730. — Linn. Illustr. Gener. tab. 671. fig. 4.

*Santolinoides alpina, saxatilis; foliis glaucis & velutis argenteis; floribus laevis*, Mich. Cames. 31. tab. 27.

*Pyrethrum alterum, minus, caespitosi radice, anthemidis flore italicum*, Barcl. Icon. rar. n°. 1105. tab. 512.

*Santolina alpina*, Gmel. Syst. Nat. vol. 2, pag. 1206. — Linn. Spec. Plant. pag. 1180.

Cette plante forme des gazons épais. Ses racines sont très-épaisses à leur collet, & poussent intérieurement des fibres alongées, roussâtres, presques simples: il s'en élève des tiges nombreuses, cylindriques, blanchâtres, velues, peu élevées, médiocrement feuillées, simples; les feuilles radicales sont nombreuses, roides, un peu charnues, d'un vert gai, un peu glauques, un peu velues & presqu'argentées, surtout à leur face inférieure; deux fois ailees, composées de folioles fort petites, inégales, ovales, aiguës ou un peu lincéolées. Les feuilles caulinaires sont alternes, moins composées, médiocrement pétiolées. Les fleurs sont jaunes, globuleuses, solitaires à l'extrémité de chaque tige.

Cette plante croît en Espagne, en Italie, sur les lieux élevés & montagneux. *z*

#### 12. SANTOLINE à feuilles d'anthesis. *Santolina anthemoides*, Linn.

*Santolina pedunculis unifloris, foliis bipinnatis; caule ramossimo, villosa*, Pall. Iter 1. pag. 438. — Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 730.

*Santolina perennis, chamamelis folio, caule ramoso*, Vaill. Paris. Act. 372.

*Santolina hispanica, chamamelis folio*, Tournef. Inst. R. Herb. 461. ?

Cette plante a des tiges basses, très-rameuses, hautes à peine de trois à quatre pouces, velues, garnies de feuilles alternes, pétiolées, pubescentes, deux fois ailees, dont les folioles sont assez semblables à celles de la camomille. Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules plus longs que les feuilles, très-roides à mesure que les semences approchent de la maturité.

Cette plante croît en Italie, en Espagne: on la rencontre également dans la Sibérie. *z*

\* *Santolina (tetrastris), caulibus prostratis, pedunculis unifloris; foliis bipinnatis, linearibus, trifasculis*, Forsk. Flor. ægypt.-arab. p. 147. n°. 72.

**SANVITALE.** *Sanvitalia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les verbena & les encelia, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les rameaux & les feuilles sont opposées: celles-ci entières; les fleurs solitaires, terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir:

Des fleurs radiées; un calice à un double rang de folioles; le réceptacle garni de paillettes; les semences

du disque comprimées, nues & ciliées; celles de la circonférence couronnées par trois dents.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont radiées, réunies dans un calice commun; les fleurons du disque hermaphrodites; les demi-fleurons de la circonférence, femelles.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice commun, hémisphérique, ouvert, composé d'écaillés planes, ovales, disposées sur deux rangs.

2°. Une corolle radiée, dont les fleurons très-nombreux occupent le centre; ils sont hermaphrodites, tubulés, divisés à leur limbe en cinq découpures; les demi-fleurons, placés à la circonférence, au nombre de douze environ, se terminent par une languette ovale, presque entière, ouverte.

3°. Cinq étamines synergènes, dont les filaments sont très-courts, capillaires; les anthères oblongues, réunies en cylindre.

4°. Un ovaire inférieur, comprimé, pubescent, surmonté d'un style plus long que les étamines, terminé par deux ligulées réfléchies en dehors.

Les semences sont nues; celles du disque pressées en coin, applaties, velues & ciliées sur leurs bords; les semences de la circonférence, turbinées, couronnées par trois dents subulées & divergentes.

Le réceptacle commun est conique, garni de paillettes ingulées, concaves, creusées en gouttières.

### E S P È C E.

SANVITALE couchée. *Sanvitalia procumbens*, Lam.

*Sanvitalia foliis ovatis, oppositis; superioribus subalternis, hirsutis; ramis oppositis, scabris.* (N.)

*Sanvitalia procumbens*, Lam. Journ. d'Hist. nat. vol. 2. pag. 178. tab. 33.—Idem, Illustr. Gen. tab. 686.

*Sanvitalia* (villula), caule herbaceo; foliis ovatis, oppositis; floribus solitariis, terminalibus. Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 51. n°. 388. tab. 351.

Cette plante ressemble, par son feuillage, à un veronica ou à un bidens, & par ses fleurs à un *rubus*, ayant, comme cette dernière, un réceptacle conique, convexe, presque noir; mais elle en est très-distincte par son caractère générique.

Ses tiges sont herbacées, cylindriques, rudes, un peu velues; branchues, verdâtres ou d'un vert pourpré, longues de dix à quinze pouces, couchées & étalées de tous côtés sur la terre, formant des touffes diffuses, de deux ou trois

pieds de diamètre, divisées en rameaux opposés, inégaux; les inférieurs ordinairement plus longs, garnis de feuilles opposées, surtout celles qui sont situées à la base des rameaux; les supérieures, quelquefois alternes, pétiolées, ovales, entières, vertes à leurs deux faces, médiocrement velues ou couvertes de poils courts, rares & couchés, rétrécies en pétiole à leur base, longues d'environ un pouce ou un pouce & demi, larges de cinq à huit lignes, ayant un peu l'aspect de celles de l'origan, marquées de trois nervures longitudinales.

Les fleurs sont terminales, solitaires, sessiles, environnées à leur base de bractées en forme d'involute, assez semblables aux feuilles, mais plus petites. Les calices sont presque pubescents, d'un vert-jaunâtre, composés de deux rangs d'écaillés planes, ovales, un peu élargies. La corolle est d'une grandeur médiocre; les demi-fleurons de la circonférence courts, d'un beau jaune; les fleurons du centre très-nombreux, petits, formant une tête ovale ou conique, presque noirs, contrastant agréablement avec le vert foncé du feuillage. Les semences sont velues & ciliées, de deux sortes; celles du centre applaties, en forme de coin, obtuses & nues à leur sommet; celles de la circonférence, turbinées, couronnées par trois dents écartées, aiguës.

Cette plante est cultivée au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris: elle a été envoyée par M. Guaitieri; elle croît naturellement dans l'Amérique méridionale. O (V. v.)

SAPIN. *Abies*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs en chatons, de la famille des conifères, qui a de très-grands rapports avec les pins, qui comprend des arbres ou arbrustes la plupart exotiques, quelques-uns indigènes de l'Europe, dont les rameaux sont alternes ou verticillés, résineux; les feuilles solitaires, point vaginales, point fasciculées, quoique souvent elles le paraissent; les fleurs disposées en un chaton très-simple.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs monoïques, disposées en un chaton très-simple; un calice écailleux; point de corolle; un grand nombre d'étamines réunies en colonne; des fleurs femelles, composées d'écaillés intérieures fort petites, organiformes, recouvertes par d'autres écailles exérieures, dorsales; deux noix opposées, monospermes.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont de deux sortes, les unes mâles, les autres femelles, sur le même individu, réunies en chatons.

Les fleurs mâles offrent :

1°. Sur un chaton oblong, un grand nombre de fleurs dont le calice est composé d'écailles imbriquées, disposées en spirales, courtes, souvent dilatées à leur sommet.

2°. Point de corolle.

3°. Plusieurs étamines, dont les filaments sont réunis en un seul corps en forme d'écailles, surmontés d'antheres oblongues, à une seule loge, réunies deux par deux, & qui se séparent à leur base après la fécondation, & se recourbent à leur sommet en capuchon.

Les fleurs femelles offrent :

1°. Pour calice, des écailles nombreuses, fort petites, imbriquées, onguiformes, chacune d'elles recouvre d'une autre écaille dorsale, colorée, acuminée, souvent plus grande, & qui est la plus apparente, & presque la seule visible lorsque la fleur commence à paraître; mais à mesure que les fleurs se développent & que les fruits approchent de la maturité, les écailles intérieures s'allongent, & deviennent si amples, qu'elles font alors bien plus grandes que les extérieures; elles s'arrondissent, s'élargissent, se recouvrent par imbrication, & forment un cône ovale ou oblong.

2°. Point de corolle.

3°. Deux ovaires situés à la base des écailles intérieures, surmontés de deux stigmates glanduliformes.

Le fruit consiste en deux noix osseuses, à une seule semence, renfermées dans un creux en forme de capsule à la base des écailles intérieures, revêtues extérieurement d'une enveloppe particulière, qui se dilate à sa partie supérieure en forme d'aile membraneuse. Plusieurs de ces écailles intérieures sont stériles, & n'offrent que deux membranes vides. Les écailles dorsales ou extérieures sont très-caduques dans les fleurs stériles; celles des fleurs fertiles existent plus long-temps, mais elles se dessèchent & se fêlent : d'où il suit que, dans les fruits ou les cônes mûrs, les écailles qui les composent & qui nous paroissent extérieures, sont en réalité les écailles internes qui sont restées presque seules apparentes. La radicule du germe est enveloppée d'un péricarpe blanchâtre, & les lobes font palmés.

Observations. J'ai exposé à l'article PIN, les différences qui existoient entre les pins & les sapins, ainsi que plusieurs autres observations relatives à ces deux genres. J'y renvoie le lecteur.

## ESPÈCES.

1. SAPIN d'Orient ou cèdre du Liban. *Abies cedrus*.

*Abies foliis rigidis, acutis, persistentibus; in ramis*

*nonnullis evolutis, fasciculatis; conis oblongo-fusculatis, obtusis, erectis.* (N.)

*Pinus (cedrus), foliis fasciculatis, acutis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 174. n°. 6. — Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 369. — Willden. Berl. Bauhz. 214.

*Pinus (cedrus), foliis fasciculatis, perennantibus; subrotundis ovatis, obtusis, erectis; squamis adpressis, rotundatis.* Lambert, Descript. ot Pin. pag. 59. n°. 32.

*Pinus foliis fasciculatis, perennantibus; conis ovatis, obtusis, erectis; squamis adpressis, rotundatis; coriacea levi.* Duroi, Hist. k. 2. pag. 84.

*Larix (cedrus), foliis acutis, perennantibus; conis obtusis.* Miller, Dict. n°. 3.

*Cedrus foliis rigidis, acuminatis, non deciduis; conis subrotundis, erectis.* Trew. Ehret. tab. 44. Nov. Act. A. N. C. III. Append. 445. tab. 13. fig. 1. 7.

*Cedrus conferta, foliis laricis.* C. Bauh. Pin. 490. — Rai, Hist. 1404.

*Cedrus Libani.* Bartel. Ic. 499. — Edward, Ornith. tab. 188.

*Cedrus phænicea.* Renalm. Spec. 27.

*Cedrus.* Bellon. Itin. 162. — Camer, Epit. 57. — Tabern. Icon. 942.

*Cedrus magnifice Libani, conferta.* J. Bauh. Hist. 1. part. 2. pag. 277. Icon.

*Larix orientalis, fructus rotundiores, obtusi.* Tourn. Inst. R. Herb. 586. — Duham. Arbor. vol. 1. pag. 332. tab. 132.

Le CÈDRE du Liban. L'roque, Voyage de Syrie, vol. 1. pag. 81. Icon. 1. 2.

*Cedrus alta, seu major.* Bellon. de Arbor. confert. cap. 3. pag. 3. versô; tab. pag. 6.

*Cedrus magna.* Dodon. Pempt. pag. 867. Icon.

Il est peu d'arbres dont la réputation soit plus ancienne, plus célèbre, plus justement méritée que celle du cèdre du Liban; & ce qui ajoute encore à son prix, c'est qu'il est rare que l'on cite peut ainsi dire le petit nombre d'individus qui existent aujourd'hui dans le Liban, dont il faisoit autrefois l'ornement.

Le tronc de cet arbre s'élève peu si on le borne aux premières branches; il n'a ordinairement que six à neuf pieds de haut, mais il est d'une grosseur énorme, surtout dans les vieux individus: les principales branches qui en partent, ressemblent chacune à autant de grands arbres; elles s'élèvent à une hauteur prodigieuse, & parviennent quelquefois à plus de cent pieds d'élévation; elles sont, à leur base, très-écartées, éten-

dues, presque horizontales, & forment sous cet arbre une voûte magnifique, épaisse, touffue, qui produit un ombrage des plus agréables & une fraîcheur que les rayons d'un soleil ardent ne peuvent dissiper. Ces branches se divisent en d'autres presque égales en force, ouvertes d'abord en éventail, & qui prennent ensuite une direction plus verticale, pour porter jusque dans les nues leur cime majestueuse : les plus petites branches & les rameaux, par un contraste très-agréable, pendent vers la terre, & forment des panaches touffus, dont l'effet est des plus pittoresques.

Les feuilles sont éparées, très-rapprochées, & paroissent fasciculées avant le prolongement des jeunes rameaux ; elles sont petites, très-étroites, roides, piquantes, aciculées, triangulaires, glabres, d'un vert-forcé, & durent tout l'hiver. Les fleurs sont disposées en charons simples, éparés sur les branches, les uns ne portant que des fleurs mâles, les autres des fleurs femelles : à ces dernières succèdent des cônes assez gros, ovales ou un peu arrondis, très-obtus à leur sommet, composés d'écaillés très-larges, imbriquées, onguculeuses, tronquées à leur sommet, veloutées & rouillatres à leur partie extérieure, minces, coriaces, munies à leur base de deux semences oïseuses, surmontées d'une aile large, très-mince, membraneuse.

Cet arbre croît en Syrie, sur le mont Liban & sur le mont Taurus. (P. v.)

Il est étonnant que la culture d'un des plus beaux arbres de la nature ait été si négligée ; qu'on n'ait pas songé plus tôt à en faire l'acquisition pour les forêts de l'Europe, où il peut s'acclimater parfaitement bien ; il aime les lieux élevés & le froid. On a enfin reconnu ses avantages, & on s'occupe aujourd'hui, surtout en France, de multiplier cet arbre intéressant ; mais comme il lui faut de longues années pour se montrer dans toute sa beauté, les individus que nous possédons, sont encore trop jeunes pour nous donner une idée de leur perfection. Un des plus beaux est celui qui a été planté au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle, par les mains du célèbre Bernard de Jussieu.

Le bois de cèdre est rougeâtre, odoriférant. Il en découle, pendant les grandes chaleurs de l'été, une résine qui se durcit, & que l'on nomme *cedria*. On l'obtient également par incision : elle est employée dans les embaumemens avec plusieurs autres aromates. Ce bois est regardé comme incorruptible : il est léger, supérieur à tous les bois de construction, & peut faire d'excellentes charpentes : on en fabrique de jolis ouvrages de menuiserie & de tabletterie. Les Anglais font des espèces de petits barils dont les douves sont moitié de bois de cèdre, moitié de bois blanc ; ils laissent séjourner dans du punch ou autres liqueurs

fortes ; elles y acquièrent un goût & une odeur qu'ils aiment beaucoup. On prétend que ce bois peut se conserver plus de mille ans sans altération. On rapporte que, dans le temple d'Apollon, à Utique, on trouva des débris de charpente faite de ce bois, qui avoient près de deux mille ans : on dit encore que la statue de Diane, qui étoit placée dans le fameux temple d'Éphèse, étoit faite de ce bois, ainsi que la charpente de ce merveilleux édifice. Comme il est très-fec & sujet à se fendre, il ne veut pas être attaché avec des clous, qui y tiennent peu. La meilleure façon est de l'assembler avec des broches du même bois. On lit dans la Bible, que Salomon reçut du roi Hiram pour le bois de cèdre avec lequel étoit construit le fameux temple de Jérusalem.

## 2. SAPIN mélèze. *Abies larix*.

*Abies foliis flexilibus, subacutis, deciduis ; in conis nonnullis volutis, fasciculatis ; conis ovatis, obtusis, subpendulis.* (N.)

*Pinus (larix), foliis fasciculatis, obtusis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 175. — *Mater. medic.* 205. — Scop. Carn. edit. 2. n. 1198. — *Trew.* in Nov. Act. A. N. C. III. Append. tab. 13. fig. 8. 28. — *Pallas*, Iter 1. pag. 451 & 2. pag. 127. — *Martusch.* Sil. n. 703. — *Ludw. Eck* tab. 86. — *Blackw.* tab. 477. — *Durr. Nass.* 263. — *Kniph.* Cent. 9. n. 77. — *Lam. Illustr. Gener.* tab. 785. n. 2. — *Gerard*, Flor. gall. Prov. 547. n. 6. — *Lam. Flor. franç.* vol. 2. pag. 1201. n. 175. VII. — *Pall.* Flor. ross. tab. 1. — *Allion.* Flor. pedem. vol. 2. pag. 178. — *Villars*, Dauph. vol. 3. p. 807. — *Wood.* Mater. medic. bot. 576. tab. 210.

*Pinus (larix), foliis fasciculatis, mollibus, obtusifolius ; bracteis extra squamas strobilorum extensivis.* *Ait.* Hort. Kew. vol. 3. pag. 369.

*Pinus foliis fasciculatis, deciduis ; strobilis ovato-oblongis ; squamarum marginibus reflexis, laceris ; bracteis pandariformibus.* *Lambert*, Descript. of Fin. pag. 53. tab. 35.

*Pinus foliis fasciculatis, deciduis.* *Hall.* Helv. n. 1658.

*Pinus foliis fasciculatis, deciduis ; conis ovato-oblongis ; squamis ovatis, subcylindricis, margine laceris.* *Duroi*, Harbk. 2. pag. 61.

*Larix (decidua), foliis deciduis ; conis ovatis, obtusis.* *Müll. Dict.* n. 1.

*Abies foliis fasciculatis, obtusis.* *Hort. Cliff.* 410. *Röy.* Lugd. Bat. 89. — *Gmel.* Sibir. 1. pag. 176.

*Larix folio deciduo, confisco.* *Tourn. Inst. R. Herb.* 586. — *J. Bauh. Hist.* 1. pag. 265. Icon. — *Hort. angl.* 43. fig. 11. — *Duham.* Arbr. vol. 1. pag. 332. n. 1. tab. 131. — *Garid.* Aix. 268.

*Larix.* *C. Bauh. Pin.* 493. — *Dod.* Pompt. 808.

*Abies foliis planis, submarginatis, bifariis versis; conis erectis.* (N.)

*Pinus (picea), foliis solitariis, emarginatis.* Lim. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1420. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1193. — Scholl. Barb. n°. 783. — Pollich, Pal. n°. 914. — Trew. in Nov. Act. A. N. C. 3. Append. tab. 13. fig. 29. 44. — Mattusch. Sil. n°. 704. — Gerard, Flor. gal. Prov. pag. 546. n°. 1. — Gzertn. de Fruct. & Sem. Plant. Centur. 6. tab. 91. fig. 1. — Pallas, Flor. ross. vol. 1. pag. 7. tab. 1. fig. F. — Allion, Flor. pedem. vol. 2. pag. 179. — Wood, Medic. botan. 575. tab. 209. — Vilm. Spec. Plant. vol. 5. pag. 345. — Willars, Dauph. vol. 3. pag. 809. — Lam. Illustr. Gener. tab. 785. fig. 1.

*Pinus abies.* Weder. Flor. dan. tab. 193. — Gzertn. L. sup. c.

*Pinus (picea), foliis solitariis, planis, subsucculentis; strobilis cylindricis, erectis; bracteis elongatis; antherarum cristis bicornis.* Lamb. Descript. of Pin. pag. 46. tab. 30.

*Pinus (picea), foliis solitariis, planis, emarginatis, pedunculatis; squamis conis obtusissimis, adpressis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 370. — Willden. Berl. Baumz. 217.

*Pinus foliis solitariis, planis, pectinatis, emarginatis.* Haller, Helv. 1657.

*Pinus (abies), foliis solitariis, emarginatis; conis oblongis, erectis; squamis subrotundis, planis, basi acuminatis.* Duroi, Harbk. 2. pag. 95. — Reiter und Abel. Abb. tab. 98.

*Abies (alba), foliis subulis argenteis, emarginatis; conis erectis.* Miller, Dict. n°. 1.

*Abies foliis solitariis, apice emarginatis.* Hort. Cliff. 449. — Royen, Lugd. Bat. 89. — Gmel. Sibir. 1. pag. 176.

*Abies taxifolia, fructu sursum fructante.* Tournef. Inst. R. Herb. 885. — Carid. Aix. pag. 1.

*Abies conis sursum expellentibus, seu mas.* C. Bauh. Pin. 505.

*Abies femina, seu elate teleja.* J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 131. Icon.

*Pinus candida.* Trag. 117.

*Pinus pectinata.* Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 202. n°. 175. X.

*Abies.* Clus. Hist. 1. pag. 34. — Dalech. Hist. 1. pag. 54. Icon.

*Abies altera.* Dod. Pempt. pag. 866. Icon.

Le sapin.

Cet arbre est celui auquel on donne de préférence le nom de *sapins*. Celui que Linné appelle

*pinus abies* est plus généralement connu sous le nom de *resse*, *picea*, *faux sapin*. Il est bien essentiel de s'entendre, d'autant plus que ces deux arbres sont importants à distinguer, relativement surtout au suc résineux qu'ils fournissent, comme nous le dirons plus bas. D'ailleurs, la différence entre ces deux arbres est facile à saisir. Celui-ci a des feuilles planes, blanchâtres ou blanches en dessous; l'autre a des feuilles très-étroites, anguleuses, presque quadrangulaires: ils ont au reste le port assez semblable.

Cet arbre a un tronc droit, haut de cent pieds & plus, d'une belle jetée. Son écorce est lisse & blanchâtre: il pousse, à sa partie supérieure, des branches fortes, ouvertes, étalées horizontalement, disposées, vers leur sommet, en une belle pyramide; elles se divisent en rameaux opposés, presque verticillés, jaunâtres, garnis de feuilles placées sur un même plan de chaque côté des petites branches; ce qui les fait paroître comme ailées ou pectinées. Elles sont presque linéaires, comprimées, coriaces, obuses, quelquefois écharcées à leur sommet, lisses & vertes à leur face supérieure, blanchâtres, presque argentées en dessous, à trois fortes nervures, une dans le milieu, & deux autres formées par le bord des feuilles un peu replié.

Les fleurs sont disposées en chatons simples, solitaires, de deux sortes; les uns mâles, jaunâtres, effilés, les autres femelles, presque cylindriques, souvent d'un rouge assez vif. Les cônes qui leur succèdent sont allongés, obtus, cylindriques, assez gros, redressés, ou leur sommet tourné vers le ciel, garnis d'écaillés planes, minces, coriaces, arrondies, rétrécies à leur base.

Cet arbre croît naturellement dans les départements méridionaux de la France, en Suisse, dans la Suède, l'Allemagne, &c. sur le revers des montagnes, du côté du nord. (V. v.)

Le sapin est un arbre précieux par l'usage habituel que l'on fait de son bois dans les charpentes, dans la menuiserie & la machine. Il n'y a, dit M. Duhamel, que les sapins proprement dits, ceux qui ont les feuilles blanchâtres par-dessous, d'un vert-clair en dessus, & que l'on nomme *sapins à feuilles d'if*, qui fournissent cette résine liquide & transparente connue sous le nom de *térébenthine*, tandis qu'il ne transsude des *piceas* (*abies excelsa*) qu'une résine qui se sèche, qui devient tellement concrète, qu'elle ressemble à des grains d'encens, & que l'on appelle *poix* dans le comté de Neuchâtel, où l'on en ramasse une grande quantité. Comme on trouve dans les auteurs beaucoup d'obscurité & de confusion sur les résines que fournissent les sapins, les piceas, les mélèzes & les pins, j'ai cru devoir présenter ici ce que M. Duhamel a dit de plus intéressant à ce sujet: ses observations ont jeté le plus grand jour sur

cette matrice importante, dont le commerce & les arts retirent de si grands avantages.

• Toutes les années, vers le milieu de l'été, des paysans italiens, voisins des Alpes, font une tournée dans les cantons de la Suille où les sapins abondent, pour y ramasser la térébenthine. Ils ont des cornets de fer-blanc qui se terminent en pointe aiguë, & une bouteille de la même matière pendue à leur ceinture. Ceux qui tirent de la térébenthine des sapins qui croissent sur les montagnes des environs de la grande Chartreuse, se servent de cornes de bœufs, qui se terminent en pointe, ainsi que les cornets de fer-blanc.

• C'est une chose curieuse de voir ces paysans monter jusqu'à la cime des plus hauts sapins, au moyen de leurs souliers armés de crampons qui entrent dans l'écorce des arbres, dont ils embrassent le tronc avec les deux jambes & un de leurs bras, tandis que de l'autre ils se servent de leur cornet pour crever de petites tumeurs ou des vessies que l'on aperçoit sur l'écorce des sapins. Lorsque leur cornet est rempli de cette térébenthine claire & coulante qui forme les vessies, ils la versent dans la bouteille qu'ils portent à leur ceinture, & ces bouteilles se voient ensuite dans des outres ou peaux de bouc, qui servent à transporter la térébenthine dans les lieux où ils l'ont en avoir le débit le plus avantageux.

• Comme il arrive assez souvent qu'il tombe dans les cornets, des feuilles de sapin, des fragmens d'écorce & des lichens qui salissent la térébenthine, ils la purifient par une filtration avant de la mettre dans les outres. Pour cet effet, ils lèvent un morceau d'écorce à un épicié; ils en font une espèce d'entonnoir, dont ils garnissent le bout le plus étroit avec des pailles du même arbre; ensuite ils remplissent cet entonnoir de la térébenthine qu'ils ont ramassée; elle s'écoule peu à peu, & les ordures restent engagées dans la garniture. C'est là la seule préparation que l'on donne à cette résine liquide avant de l'exposer en vente.

• On aperçoit tatement de ces sortes de vessies sur l'écorce des épiciés, & ce n'est que lorsqu'ils sont très-vigoureux & plantés dans un terrain gras. La résine de ces derniers arbres découle des entailles que l'on fait à leur écorce, tandis qu'au contraire il ne coule point de térébenthine par les incisions que l'on fait à l'écorce des sapins proprement dits. Toute la térébenthine se tire des vessies ou tumeurs qui se forment naturellement dans l'écorce. Si quelquefois on fait, par hasard ou par expérience, des incisions à l'écorce des sapins, il en sort si peu de térébenthine, qu'elle ne mérite aucune attention. Il est vrai que ces gontes de résine qui sortent liquides des pores de l'arbre s'épaississent à l'air presque comme celles des épiciés; mais il y a cette différence, que le suc des épiciés devient, en s'épaississant, opaque

comme l'encens, au lieu que celui des sapins est clair & transparent comme le mastic.

• Il est bon de remarquer que les vessies ou tumeurs qui paroissent sous l'écorce des sapins, sont quelquefois rondes & quelquefois ovales; mais, dans ce dernier cas, le grand diamètre des tumeurs est toujours horizontal, & jamais perpendiculaire.

• Dans les endroits où le sol est gras & la terre subitantielle, on fait deux récoltes de térébenthine dans la saison des deux sèves; savoir: celle du printemps & celle du milieu de l'été; mais chaque arbre ne produit qu'une fois des vessies pendant le cours d'une sève; ils n'en produisent même qu'à la sève du printemps dans les terrains maigres.

• Il n'en est pas ainsi des épiciés. Ces arbres fournissent une récolte tous les quinze jours, pourvu qu'on ait soin de rafraîchir les entailles qu'on a déjà faites à leur écorce.

• Les sapins commencent à fournir une médiocre quantité de térébenthine dès qu'ils ont trois pouces de diamètre, & ils en fournissent de plus en plus jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un pied. Alors les piqûres qu'on a faites à leur écorce forment des écailles dures & racornies: le corps ligneux, qui continue à s'étendre en grossissant, oblige l'écorce, qui est dure & capable d'extension, de se crever, & à mesure que l'arbre grossit, cette écorce qui, quand l'arbre étoit jeune, n'avoit qu'un quart de pouce d'épaisseur, acquiert jusqu'à un pouce & demi, & alors elle ne produit plus de vessies.

• Les épiciés au contraire fournissent de la poix tant qu'ils subsistent, en sorte qu'on en voit dont on tire de la poix en abondance, quoiqu'ils aient plus de trois pieds de diamètre.

• Les sapins ne paroissent pas s'épuiser par la térébenthine qu'on en tire, ni par les piqûres qu'on fait à leur écorce. Les écailles qu'elles occasionnent, & les gerçures de l'écorce des gros sapins, ne leur font pas plus contraires que celles qui arrivent naturellement aux écorces des gros ormes, des gros tilleuls ou des bouleaux.

• Il découle naturellement de l'écorce des épiciés, des larmes de résine, qui, en s'épaississant, font une espèce d'encens; mais pour avoir la poix en plus grande abondance, on emporte, dans le tems de la sève qui arrive au mois d'avril, une lamie d'écorce, en observant de ne point entamer le bois.

• Si l'on aperçoit, sur des épiciés qui sont entaillés depuis long-tems, que les plaies sont profondes, c'est parce que le bois continue à croître tout autour de l'endroit qui a été entamé, & comme il ne se fait point de productions ligneuses

l'intérieur du bois, à cinq ou six pouces du cœur, & à huit ou dix pouces de l'écorce, des dépôts de cette résine liquide qui ont quelquefois un pouce d'épaisseur, trois ou quatre pouces de largeur & autant de hauteur. Dans un tronc de quarante pieds de longueur, on trouve quelquefois jusqu'à six de ces principaux réservoirs, & quantité de petits : si on les entame avec la coignée, la térébenthine en coule abondamment, & les scieurs-de-long redoutent beaucoup ces réservoirs, qui empêchent la scie de couler.

« Les mélèzes jeunes & vigoureux n'ont presque jamais les réservoirs dont nous venons de parler : ces dépôts ne se forment que dans le tronc des gros arbres qui commencent à vieillir ; ils sont situés à six ou huit pieds de terre, entre les couches ligneuses, ordinairement plus près de l'axe de l'arbre, que de l'écorce. Plus les cavités sont voisines du centre, plus elles sont grandes & remplies de térébenthine.

« Une preuve encore que ce bois est extrêmement gras & résineux, c'est que dans le pays on bâtit des maisons ou cabanes en posant de plar, les unes sur les autres, des pièces de bois carrées, qui ont un pied de face. Dans les encoignures & vis-à-vis les refends, les poutres sont entaillées à mi-bois pour former les liaisons.

« Ces maisons sont blanches quand elles sont nouvellement bâties ; mais au bout de deux ou trois ans elles deviennent noires comme du charbon, & toutes les jointures sont fermées par la résine que la chaleur du soleil a attirée hors des pores du bois. Cette résine, qui durcit à l'air, forme un vernis luisant & poli qui est fort propre ; ce vernis rend ces maisons impénétrables à l'eau & au vent, mais aussi très-combustibles : c'est ce qui a plusieurs fois fait ordonner, par des réglemens de police, qu'elles seroient bâties à une certaine distance les unes des autres.

« Aux environs de Briançon, où il ne potoit pas qu'on sasse de commerce de la térébenthine que produit le mélèze, les paysans qui en ramassent pour leur usage, font avec la coignée, au pied de ces arbres, des entailles de six pouces de profondeur, & ils ramassent la térébenthine qui coule sur le plan horizontal de la plaie.

« Mais dans la vallée de Saint-Martin, près de Lucerne, pays de Vaudois, les paysans se servent de tarières qui ont jusqu'à un pouce de diamètre, & ils percent les mélèzes vigoureux en différens endroits, commençant à trois ou quatre pieds de terre, & remontant jusqu'à dix ou douze. Ils choisissent l'exposition du midi, & les nœuds des branches rompues où ils voient suinter de la térébenthine, & ils ont soin que le trou soit un peu en pente & qu'il ne pénètre pas jusqu'au centre de l'arbre.

Botanique. Tome VI.

« A ces trous ils ajoutent des gouttières faites de bois de mélèze, qui ont un pouce & demi de grosseur, sur quinze à vingt de longueur : une des extrémités de ces gouttières se termine en forme de cheville, dont le centre est percé d'un trou qui peut avoir six à huit lignes de diamètre : on enfonce cette extrémité dans les trous faits aux mélèzes, & la térébenthine coule par l'ouverture du bout de cette gouttière, d'où elle se répand dans des auge de bois préparées pour la recevoir.

« Les soirs & les matins, depuis la fin du mois de floréal jusqu'en vendémiaire, chaque paysan visite ses auges, & ramasse la térébenthine dans des seaux ou baquets de bois pour la transporter à la maison.

« Ils bouchent avec des chevilles les trous qui n'ont point donné de liqueurs & ceux qui cessent d'en fournir, & ils ne les rouvrent que douze ou quinze jours après ; alors ces trous fournissent ordinairement beaucoup plus de résine que les autres, & ils en donnent toujours de plus en plus jusqu'à ce que le froid resserre le bois & arrête tout écoulement.

« Un mélèze bien vigoureux peut fournir, tous les ans, sept à huit livres de térébenthine pendant quarante ou cinquante ans. S'il s'est mêlé quelques feuilles ou autres immondices dans les auges, on passe la térébenthine dans des tamis de crin fort grossiers, & l'on en remplit des outres qu'on porte à Briançon ou à Lyon pour les vendre aux marchands.

« Cette térébenthine reste toujours coulante, & de la consistance d'un sirop bien cuit. La résine ou la térébenthine de mélèze qui coule dans les baquets, se met quelquefois dans de grandes cucurbites de cuivre : on y ajoute de l'eau, & par la distillation on retire avec l'eau une huile essentielle, qui n'est pas cependant aussi estimée que celle qu'on retire de la térébenthine du sapin commun, quoiqu'on l'emploie aux mêmes usages.

« On trouve au fond de la cucurbitre, après la distillation, une résine épaisse ou une espèce de colophane grasse qu'on emploie comme celle du pin, & avec laquelle on peut faire du *brai gras*, dont nous avons parlé à l'article PIN.

« Les mélèzes qui ont fourni beaucoup de résine par les moyens que nous venons de détailler, ne sont pas estimés pour les constructions : on ne les emploie guère qu'à brûler, ou pour faire du charbon qui est plus léger & moins bon que celui fait avec les arbres qui n'ont point fourni de résine.

« Ordinairement on n'abat, pour les ouvrages de charpente & pour les scier en planches, que les mélèzes jeunes & vigoureux, parce que, outre

T t t

Sil. n°. 705. — Doerr. Naff. pag. 263. — Blackw. tab. 198. — Weder. Flor. dan. tab. 193. — Regnaud, Botan. Icon. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Plant. Centur. 6. tab. 91. fig. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. 346. n°. 2.

*Pinus foliis foliatis*, *tetragonis*, *mucronatis*. Hall. Helv. n°. 1656.

*Pinus excelsa*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 202. n°. 175. IX.

*Pinus (picea)*, *foliis foliatis*, *subulatis*, *bifariam versis*; *conis obovatis*, *pendulis*; *squamis ovalibus*, *planis*; *marginibus nodulatis & laceris*. Du Roi, Harbk. 2. pag. 110.

*Abies picea*. Miller, Dict. n. 2. — Gærtn. L. sup. c.

*Abies foliis foliatis*, *apice acuminatis*. Hort. Clifort. 449. — Flor. suec. 789-875. — Flor. lappon. 347. — Royen, Lugd. Bat. 83. — Dalib. Parif. 295. — Gmel. Sibir. 1. p. 175.

*Abies tenuior folio*, *fructu decursum inflexo*. Tournef. Inst. R. Herb. 585. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 3. n°. 5. tab. 2. — Garid. Aix. pag. 2. tab. 1.

*Abies rubra*. Trag. 1117.

*Picea*. Camer. Epitom. 47. — Marth. Comm. 57. — Dalech. Inst. 1. pag. 50. Icon.

*Abies*. Dodon. Pempt. pag. 866. Icon.

*Picea Latinorum*, *abies mas Theophrasti*. J. Bauh. Hist. t. pars 2. pag. 238. Icon. *Mediocris*.

1. *Picea major*, *prima*, *feu abies rubra*. C. Bauh. Pin. 493.

2. *Abies alba*, *feu femina*. C. Bauh. Pin. 505.

*Abies minor*. C. Bauh. Pin. 493.

3. Le faux SAPIN. Pesse, *picea*, *epicea*.

C'est un grand & bel arbre qui s'élève à plus de cent pieds de haut. Son tronc est droit, fort gros, cylindrique, nu dans la partie inférieure; ce n'est ordinairement qu'à une hauteur assez considérable qu'il se divise en branches étalées, presque horizontales, plus courtes à mesure qu'elles sont plus proches du sommet, formant une belle tête pyramidale. Les rameaux sont opposés, un peu pendans, entièrement couverts de feuilles épaisses, solitaires, très-nombreuses, très-approchées, & quoiqu'ouvertes souvent de manière à paroître disposées sur deux rangs, elles sont en effet rangées cylindriquement autour des rameaux, courtes, roides, presque subulées, un peu piquantes, glabres, un peu quadrangulaires.

Les fleurs sont disposées en chatons simples, ovales, oblongs, presque cylindriques, les uns composés uniquement de fleurs mâles, d'autres de fleurs femelles. A ces dernières succèdent des cô-

nes allongés, plus ou moins gros, presque sessiles, pendans, composés d'écaillés planes, imbriquées, ovales, très-minces à leurs bords onguiculées, obtuses, quelquefois un peu ondulées ou déchirées, rougeâtres ou d'un blanc-grisâtre; ce qui probablement dépend de leur âge.

Cet arbre croît dans les contrées septentrionales de l'Europe, en Allemagne, sur les montagnes, ainsi que dans les vallons un peu humides. On le rencontre également dans la Suisse & sur les montagnes des départemens méridionaux de la France. (V. v.)

Gerard fait mention d'une variété très-remarquable qui croît sur les montagnes alpines aux environs de Briançon, dont les cônes sont tous relevés, comme dans *Abies picea*.

Le bois du sapin élevé est blanchâtre, rougeâtre quand il s'altère. On en fait des planches & des pièces de charpente, d'excellentes pontes; il entre également dans la fabrication des grands vaisseaux; il tient un des premiers rangs parmi nos arbres forestiers dans les pays de montagnes. Les sapins rouges ne sont bons qu'à brûler, encore très-souvent les laisse-t-on périr sur pied. On emploie quelquefois son écorce, à la place de celle du chêne, pour tanner les cuirs.

Il ne faut pas confondre cet arbre avec le sapin proprement dit, qui fournit si abondamment de la véritable térébenthine. Celui-ci n'en donne presque pas; il se forme quelquefois, à la vérité, des vessies sur l'écorce des jeunes arbres, dans lesquelles on trouve un suc résineux, clair & transparent; mais cette substance n'est point de la vraie térébenthine, c'est de la poix toute pure, qui en peu de tems s'épaissit à l'air. On peut voir à l'article SAPIN COMMUN la différence qui existe entre les suc résineux que fournissent ces deux arbres.

Pour retirer la poix du sapin élevé ou *epicea* dans l'Allemagne, les paysans, suivant le docteur Aëtius, enlèvent des lanières d'écorce de la largeur de quatre doigts, depuis l'endroit où ils peuvent atteindre, jusqu'à deux pieds près de terre; & ayant ensuite répété cette opération de distance en distance autour des arbres, ils n'y retournent que deux ou trois ans après. Ils trouvent alors les plaies remplies d'une grande quantité de résine; ils la grattent avec un crocher, & la ramassent dans des espèces de seaux de figure conique, faits d'écorce de cornier. C'est avec ces mêmes vaisseaux qu'ils transportent la résine qu'ils ont recueillie, dans les ateliers où ils la travaillent de la manière suivante.

Ces ouvriers, pour conserver leurs habits, se revêtent d'une espèce de fourreau qui ne passe pas la ceinture. Ils établissent dans leurs ateliers, pour la préparation de la poix, des fourneaux qui ont extérieurement la forme d'un parallépipède;



ils y scellent bien exactement des chaudières de cuivre, de forme conique. Ces chaudières ont à leur fond un trou de la grosseur du doigt, lequel s'ajuste à un tuyau qui va, suivant une pente convenable, depuis un bout du fourneau jusqu'à l'autre, sortit de ce même fourneau par la partie postérieure.

Il y a, à la partie antérieure du fourneau, trois portes ou bouches par lesquelles on allume le feu, & comme le fourneau est partout exactement fermé, la fumée & l'air chaud ne peuvent en sortir que par trois ouvertures ou cheminées qui existent à la partie postérieure du fourneau. Toutes les chaudières, que l'on a soin de tenir exactement fermées, reçoivent une douce chaleur, suffisante pour faire fondre la résine dont elles sont remplies, & la fumée qui s'échappe de cette résine, le réverbérant, contribue à faire fondre celle qui ne l'est pas.

A mesure que la résine fond, elle s'échappe par l'ouverture qui est au fond des chaudières : de là elle coule dans les tuyaux qui s'étendent dans toute la longueur de l'intérieur du fourneau ; elle sort par leur extrémité, & elle se rend dans des vaisseaux qui sont placés pour la recevoir.

Pendant que cette substance résineuse est encore coulante, on la verse dans des baquets ou dans des vaisseaux d'écorce d'arbre. On la vend en cet état sous le nom de *poix grasse*. Lorsqu'il ne coule plus rien par le tuyau, l'on retire les immondes qui sont restés au fond des chaudières ; on en remplit des caisses, & l'on conserve cette matière pour faire du *noir de fumée*.

Si l'on veut de la poix sèche, on cuit la poix grasse dans d'autres chaudières, jusqu'à ce que toute l'humidité en soit évaporée ; quelquefois on mêle du vinaigre dans cette seconde cuisson. La poix prend alors une couleur rousse, & elle devient très-sèche : c'est là proprement ce que l'on appelle de la *colophane*.

Pour faire le noir de fumée, on bâtit un cabinet exactement fermé de toutes parts, excepté au milieu de la partie supérieure. L'on y fait cependant quelques autres ouvertures que l'on couvre d'un cône ou d'une espèce de corne de toile. A quelque distance de ce cabinet, on construit un four, dont la bouche est fort petite. L'intérieur de ce four communique avec le dedans du cabinet par un tuyau de cheminée rampant.

Un enfant allume une petite quantité des immondes qu'on a retirés des chaudières, & il l'introduit dans le four. A mesure que cette résine se consume, ce même enfant y en ajoute un peu de nouvelle, & en continuant de mettre, de moment en moment, un peu de résine dans le four, le cabinet se remplit de fumée ; cette fumée passe

en grande partie dans le cône de toile, où elle se rassemble en forme de suie.

Quand on juge que le cône ou corne est bien rempli de fuliginosités, des enfans battent la toile avec des baguettes pour faire tomber le noir de fumée sur la partie supérieure du cabinet, & l'on ramasse ce noir, dont on remplit des barils. Nous avons rapporté, à l'article *PIN*, les différentes manières de cuire les substances résineuses, & divers autres procédés pour faire le noir de fumée, ainsi que de l'usage de ces différentes substances.

#### 9. SAPIN noir. *Abies nigra*.

*Abies foliis solitariis, tetragonis, rectis, striatis; strobilis ovatis; squamis ellipticis; margine undulatis, erectis. Pinus nigra. Lambert, Descript. of Pin. pag. 41. tab. 27.*

*Pinus (nigra), foliis solitariis, tetragonis, undique sparsis, rectis, striatis; conis oblongis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 470. — Willden. Berl. Baumz. 210.*

*Pinus (mariana), ramulis pubescentibus, phyllorhis elevatis, patentibus; foliis solitariis, sessilibus, subsessilibus, tetragonis; lineis quatuor longitudinalibus punctatis; strobilis ovatis, pendulis; squamis obovatis, crassis, lignosis, rigidis, apice crenulatis, subundulatis. Ehrh. Beytr. vol. 3. pag. 23.*

*Pinus nigra. Duroi, Harbk. edit. Poet. vol. 2. pag. 182.*

*Abies (mariana), foliis linearibus, acutis; conis minimis. Wangenh. Beytr. 73.*

Arbre dont le tronc est droit, revêtu d'une écorce noirâtre, qui ne s'élève qu'à une hauteur médiocre, dont les rameaux sont étalés, pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles solitaires, sessiles, médiocrement tétragones, roides, marquées de points disposés fur quatre lignes; linéaires, un peu aiguës à leur sommet.

Les charons sont droits, pédonculés ; les antières dominées par une crête arrondie, ciliée, dentée ; les fleurs femelles sont droites, ovales, munies de petites bractées arrondies : il leur succède des cônes pendans, ovales, longs d'un pouce, lisses, d'un pourpre-noir, composés d'écaillés imbriquées, presque elliptiques, dentées ou laciniées à leur contour.

Cet arbre croît naturellement dans l'Amérique septentrionale. Il fleurit vers le milieu du printemps.  $\text{H}$

#### 10. SAPIN rouge. *Abies rubra*.

*Abies foliis solitariis, subulatis, acuminatis; strobilis, oblongis, obtusis; squamis rotundatis, sublobis, margine integris. Lambert, Descript. of Pin. pag. 40. tab. 28. Pinus rubra.*

*Pinus*

dans l'étendue de la plaie, peu à peu ces plaies parviennent à avoir plus de dix pouces de profondeur. Les plaies augmentent aussi en hauteur & en largeur, parce qu'on est obligé de les rafraîchir toutes les fois qu'on ramasse la poix, afin de détruire une nouvelle écorce qui se formeroit tout autour de la plaie, & qui empêcheroit la résine de couler, ou plutôt pour emporter une portion de l'écorce qui devient callosité à cet endroit lorsqu'elle a rendu sa résine. Bien loin que ces enraillures & cette déperdition de résine fassent tort aux épicias, on prétend que ceux qui sont plantés dans des terrains gras, péroient si l'on ne tiroit pas, par des enraillures, une partie de leur résine.

« Tous les ans les épicias ordinaires, dont les cônes sont très-longs, & dont les feuilles sont d'un vert plus clair que celles des sapins, fournissent de la poix pendant les deux sèves; mais les récoltes sont plus abondantes quand les arbres sont en pleine sève, & l'on en ramasse plus ou moins souvent, suivant que le terrain est plus ou moins substantiel, en forte que, dans les terrains gras, on en fait la récolte tous les quinze jours, en détachant la poix avec un instrument qui est taillé d'un côté comme le fer d'une hache, & de l'autre comme une gouge. Ce fer sert encore à rafraîchir la plaie toutes les fois qu'on ramasse la poix.

« Il est bon de faire remarquer que cette substance résineuse ne sort point du bois: il en suinte un peu, à la vérité, de l'épaisseur de l'écorce; mais la plus grande quantité transsude d'entre le bois & l'écorce. Elle se lève aussitôt qu'elle est sortie des pores de l'arbre; elle ne coule point à terre, mais elle reste attachée à la plaie en grosses larmes ou flocons, & c'est ce qui établit une si grande différence entre la poix que fournissent les épicias, & la térébenthine que donnent les sapins.

« Les épicias ne se plaisent pas dans les pays chauds; mais s'il s'y en trouve, il pourroit arriver que la poix qu'ils fournissent, seroit coulante presque comme la résine des pins. On fait que la chaleur amollit les résines au lieu de les dessécher, & ceux qui ramassent la poix des épicias remarquent bien qu'elle ne tient point à leurs mains lorsque l'air est frais, & qu'elle s'y attache au contraire quand il fait chaud: alors ils sont obligés de se les frotter avec du beurre ou de la graisse, afin d'empêcher cette poix, qui est gluante, de coller leurs doigts les uns contre les autres.

« La poix des jeunes épicias est plus molle que celle des vieux; mais elle n'est jamais coulante. Dans les forêts d'épicias qui font sur des rochers, on aperçoit beaucoup de racines qui s'étendent souvent hors de terre: si on les entaille, elles fournissent de la poix en abondance; mais cette poix est épaisse comme celle qui coule des entailles faites aux troncs. Enfin, la poix des épicias est suffisamment sèche pour être mise dans des sacs. C'est

dans cet état que les payfans la transportent dans leurs maisons, pour lui donner la préparation dont nous allons parler.

« On met la poix avec de l'eau dans de grandes chaudières. Un feu modéré la fond ensuite on la verse dans des sacs de toile forte & claire qu'on porte sous des pressés, qui, appuyant dessus peu à peu, font couler la poix pure & exempte de toute immondice. Alors on la verse dans des barrils, & en cet état on la vend sous le nom de *poix grasse* ou *poix de Bourgogne*: on met rarement cette poix en pains, surtout quand on veut la transporter au loin, parce que la moindre chaleur l'attendrit & la fait aplatis. On la renferme encore dans des cabas d'écorce de tilleul.

« Ce que nous venons de dire regarde la poix blanche, ou plutôt la poix jaune. On en vend aussi de noire, qui est préparée avec cette poix jaune dont on vient de parler, & dans laquelle on met du noir de fumée. Pour bien incorporer ces deux substances, on fait fondre à petit feu & doucement, de la poix jaune, dans laquelle on mêle une certaine portion de noir de fumée. Ce mélange s'appelle la *poix noire*, mais elle est peu estimée.

« Dans les années chaudes & sèches la poix est de meilleure qualité, & la récolte en est plus abondante que dans celles qui sont fraîches & humides.

« Si l'on met cette poix grasse dans des alambics avec de l'eau, il passe avec l'eau, par la distillation, une huile essentielle, & la poix qui reste dans la cucurbitte est moins grasse qu'elle ne l'étoit auparavant; elle ressemble alors à la colophane, dont il a été question à l'article PIN; mais l'huile essentielle qui a monté avec l'eau, n'est pas de l'esprit de térébenthine; c'est de l'esprit de poix, qui est d'une qualité bien différente & fort inférieure. Comme on a coutume de la vendre pour de l'esprit de térébenthine, on doit prendre bien des précautions pour n'être point trompé, surtout lorsqu'il est important d'avoir de véritable huile essentielle de térébenthine, soit pour les médicaments, soit pour dissoudre certaines résines concrètes.

« On fait la véritable essence de térébenthine en distillant avec beaucoup d'eau, celle qu'on retire des vessies du sapin. La térébenthine qui a été ramassée dans l'été fournit un quart d'essence, c'est-à-dire, que de quatre livres de belle térébenthine, on en tire une livre d'essence.

« Dans les forêts épaisses où le soleil ne peut pénétrer, on fait toutes les entailles du côté du midi; mais dans celles où le soleil pénètre, ce qui est rare, on les fait indifféremment de tous les côtés, pourvu néanmoins que ce ne soit pas du côté du vent de la pluie. On fait quelquefois trois

*Pinus americana*, rubra; foliis solitariis, subulatis, apice acuminatis, bifariam versis; conis ovalibus, pendulis. Wengen. Beytr. 75. tab. 16. fig. 54.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec l'*abies nigra*, mais elle s'élève beaucoup moins. L'écorce de son tronc est d'un rouge-brun. Ses feuilles sont solitaires, glabres, étroites, subulées, acuminées, disposées sur deux rangs. Les fleurs femelles sont ovales, sessiles; elles produisent des cônes ovales, cylindriques, longs d'environ un pouce, rougeâtres, lisses, pendans, munis d'échelles imbriquées, presque cunéiformes, entières à leur contour, arrondies à leur sommet, se divisant en deux lobes en vieillissant.

Cet arbre croît dans l'Amérique septentrionale, & fleurit vers le milieu du printemps.

# 11. SAPIN beaumier. *Abies balsamea*.

*Abies foliis planis, submarginatis, subulatis albidis; conis ovato-oblongis, erectis; squamis basi angustatis.* (N.)

*Pinus* (balsamea), foliis solitariis, submarginatis, subulatis lineis duplici punctatis. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 176. n° 9. — Gronov. Viig. 152.

*Pinus* (balsamea), foliis solitariis, planis, emarginatis, subpinnatis, supra suberectis; squamis conifloratis acuminatis, reflexis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 370. — Willd. Berl. Baumz. 218.

*Pinus foliis solitariis, planis, subsecundis; floribus cylindraceis, erectis; bracteis abbreviatis; antherarum cristis muticis.* Lambert, Descript. of Pin. pag. 48. tab. 31.

*Abies minor, pinnatis foliis, virginiana; conis parvis, subrotundis.* ? Pluken. Almag. 2. tab. 121. fig. 1.

*Pinus foliis solitariis, submarginatis; conis ovato-oblongis, erectis; squamis subrotundis, planis, basi acuminatis.* DuRoi, Harbk. 2. pag. 193.

*Pinus foliis planis, emarginatis, subpinnatis, supra suberectis; floribus ovato-oblongis, erectis; floribus squamis reflexis, acuminatis.* Hort. Angl. tab. 6.

*Abies* (balsamea), foliis subulatis argenteis, apice submarginatis, bifariam versis. Mill. Dict. n° 3.

*Abies taxifolia, odore balsami, gileadensis.* Rai, Hist. Append. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 3. n° 3.

*Abies* (balsamifera), foliis breviusculis, planis, subulatis albis; apice emarginatis integrif, subrecurvo-patentissimis; floribus sursum expandentibus oblongo-ovatis; squamis numerosis, abbreviatis, basi abrupte angustatis. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 207.

Botanique, Tome VI.

*Pinus abies balsamea.* Marshall, Arbr. Ancr. pag. 102.

Vulgairement beaumier de Gilead.

Cet arbre s'élève à la hauteur de cinquante à soixante pieds & plus; il se divise en branches nombreuses, touffues, & en rameaux opposés, garnis de feuilles solitaires, roides, planes, courtes, linéaires, entières à leurs bords, obtuses & souvent un peu échanquées à leur sommet, vertes en dessus, d'un blanc prêcheux argente ou un peu pulvérulent à leur face inférieure; très-ouvertes, un peu recourbées.

Les fleurs sont monoïques, en chatons solitaires, épars; les cônes sont ovales, oblongs, ayant leur sommet tourné vers le ciel, composés d'échelles courtes, imbriquées, nombreuses, rétrécies & tronquées à leur base, souvent acuminées à leur sommet, qui s'ouvrent & tombent ordinairement dans le courant de l'automne.

Cet arbre croît sur les montagnes de la Haute-Caroline & au Canada. On le cultive dans les jardins botaniques de l'Europe. Il y croît lentement & s'élève peu. b (V. v.)

L'écorce des branches & des rameaux se couvre de petites vésicules claires, blanches, dont la résine est plus douce que celle que l'on retire de nos sapins d'Europe, & qui ressemble beaucoup au baume de la Mecque, connu sous le nom de baume de Gilead. Elle le ramasse par les mêmes procédés employés pour recueillir celle de nos sapins; elle est fort élastique.

# 12. SAPIN blanc. *Abies alba*.

*Abies foliis rigidis, subtetragonis, subpungentibus; conis oblongo cylindraceis, rufis, suberectis; squamis integerrimis.* (N.)

*Pinus* (alba), foliis tetragonis, lateralibus incurvis; ramis subulatis nudissimis; conis subcylindricis. Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 371.

*Pinus* (alba), foliis solitariis, tetragonis, incurvis; floribus subcylindraceis, laxis; squamis obovatis, integerrimis. Lambert, Descript. of Pin. p. 39. tab. 26.

*Pinus* (laxa), ramulis glaberrimis, phyllophoris elevatis, patentibus; foliis solitariis, sessilibus, subsecundis, tetragonis, obtusiusculis, lineis quatuor longitudinaliter punctatis; floribus oblongo-ovalibus, pendulis; squamis obovato-subrotundis, integerrimis, tenuibus, levigatis. Ehrh. Beytr. vol. 3. pag. 24.

*Pinus* (canadensis), foliis solitariis, subulatis, bifariam versis; ramulis glabris; cicatricibus subsessilibus decurrentibus; conis ovatis, oblongis, pendulis, laxis; squamis subrotundis. DuRoi, Harbk. 2. pag. 124. — Wengen. Beytr. 3. tab. 1. fig. 2.

V v v

*Abies (alba), foliis subtriangulis, rigidis, subpungentibus; lateralibus curvatis ascendentibus; Arcubus oblongo-cylindricis, rufis, subduplicatis; squamis margine integerrimis.* Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 207.

*Abies picea, foliis brevibus; conis parvis, biuncialibus, laetis.* Duhamel, Arb. vol. 2. pag. 3. n°. 8.

*Pinus canadensis.* Miller, Dict. n°. 4.

Vulgairement sapinette ou épinette blanche du Canada. *Epicia*.

Cet arbre a un tronc droit, cylindrique, à écorce blanchâtre, chargé de branches allongées, qui se divisent en rameaux flexibles, opposés, pendans, & dont les ramifications supérieures sont presque verticillées, garnies de feuilles éparées, très-confusées, très-ferrées, les latérales ascendantes & un peu courbées; celles des deux faces droites. Ces feuilles sont roides, courtes, d'un vert un peu glauque, presque tétragones, mais un peu élargies sur les côtés; obtuses à leur sommet, la plupart terminées par une pointe très-courte, piquante, entières à leurs bords, longues de trois à quatre lignes, médiocrement arquées.

Les fleurs sont disposées ordinairement, à l'extrémité des jeunes rameaux, en châtons simples, cylindriques, les uns composés uniquement de fleurs mâles, les autres de fleurs femelles. Les fruits qui en résultent, forment des cônes pendans, de couleur rouffâtre, petits, longs à peine d'un à deux pouces, cylindriques, médiocrement obtus, de l'épaisseur du doigt, munis d'écaillés imbriquées, un peu lâches, onguiculées, minces, coriaces, presque rondes, point rétrécies à leur base, entières à leurs bords & au sommet, légèrement ridées, & luisantes extérieurement. Les semences sont petites, ovales, d'un brun-noir, surmontées d'une aile membraneuse, très-fine, ovale, obtuse.

Cette plante croît au Canada & dans la Nouvelle-Angleterre. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans beaucoup d'autres. (V. v.)

On fait au Canada, avec l'épinette blanche & quelques autres, une boisson très-saine, qui ne parait pas bien agréable lorsqu'on en boit pour la première fois, mais qui le devient lorsqu'on en a usé pendant quelque tems. Comme on peut également fabriquer cette liqueur avec notre sapin élève, *l'epicia*, & qu'en tout tems elle peut être à très-grand marché, nous allons en présenter ici la recette d'après M. Duhamel. Il seroit important d'en introduire l'usage dans les années où le vin est trop cher, & surtout lorsque la disette des grains fait également augmenter le prix de la bière.

« Pour faire une barrique d'épinette, il faut avoir

une chaudière qui tienne au moins un quart de plus. On l'empli d'eau, & dès que cette eau commence à être chaude, on y jette un fagot de branches d'épinette, rompus par morceaux; ce fagot doit avoir environ vingt-un pouces de circonférence auprès du lien.

« On enterrent l'eau bouillante jusqu'à ce que la peau de l'épinette se détache facilement de toute la longueur des branches. Pendant cette cuisson on fait tôt à plusieurs reprises, dans une grande poêle de fer, un boisseau d'avoine; on fait encore griller une quinzaine de galettes de bibeau de mer, ou, à leur défaut, douze ou quinze livres de pain coupé par tranches. Quand toutes ces matières sont bien rôties, on les jette dans la chaudière, & elles y restent jusqu'à ce que l'épinette soit bien cuite.

« Alors on retire de la chaudière toutes les branches d'épinette, & l'on éteint le feu. L'avoine & le pain se précipitent au fond: il faut ensuite retirer avec une écumoire les feuilles d'*epicia* qui flottent sur l'eau; enfin, l'on délaisse dans cette liqueur douce à quinze livres de sucre brut.

« On entonne sur le champ cette liqueur dans une barrique fraîche qui ait contenu du vin rouge; & lorsque l'on veut qu'elle soit plus colorée, on y laisse la lie & cinq à six pintes de ce vin. Quand cette liqueur n'est plus que tiède, on délaisse dans une chopine de levure de bière que l'on brasse bien fort, afin de l'incorporer avec la liqueur; ensuite l'on achève d'emplir la barrique jusqu'au bondon, que l'on laisse ouvert.

« Cette liqueur fermente, & jette dehors beaucoup de faletés. A mesure que la barrique se vide, l'on a soin de la remplir avec une partie de la même liqueur, que l'on conserve à part dans quelque vaisseau de bois.

« Si l'on ferme le bondon au bout de vingt-quatre heures, l'épinette reste piquante, comme le cidre; mais si on veut la boire plus douce, il ne faut la bondonner que quand elle a passé sa fermentation, & avoir soin de la remplir deux fois par jour. Cette boisson est très-rafraîchissante, fort saine, & lorsqu'on y est habitué on la boit avec beaucoup de plaisir, surtout pendant l'été. »

#### 15. SAPIN du Canada. *Abies canadensis.*

*Abies foliis linearibus, planis, obusis, submembranaceis; conis minimis, cylindricis-ovatis, pectinatis.* (N.)

*Pinus (canadensis), foliis foliariis, linearibus, obtusiusculis, submembranaceis.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 177. n°. 10. — Ait. Hort. Kew. vol. 3. pag. 370.

*Pinus (canadensis), foliis foliariis, planis, denticulatis, subdistichis; strobilis ovatis, terminalibus,*

vix folio longioribus. Lambert, Descript. of Pin.  
pag. 32. tab. 32.

*Abies foliis solitariis, confertis, obtusis, membranaceis.* ? Gronov. Virg. 191.

*Abies foliis picea brevioribus, conis minimis.*  
Duham. Arbr. vol. 1. pag. 3. n°. 7.

*Pinus - abies canadensis.* Marshal, Arbr. Amer.  
pag. 103.

*Abies* (canadensis), ramis gracilibus, ramulis  
novellis, villosissimis; foliis plani orbibus, linearibus,  
apice integro, obtusiusculis, serrulatis; strobilis mini-  
mis, cylindraceo-ovatis, aspidiotibus. Mich. Flor.  
bureal. Amer. vol. 2. pag. 206.

Vulgairement épinette de la Nouvelle-Angle-  
terre.

Cet arbre, quoiqu'il ne s'élève que médiocre-  
ment dans nos climats, a cependant de la beauté.  
Ses tiges sont droites, cylindriques, très-bran-  
chées, divisées en rameaux nombreux, opposés;  
les plus jeunes velus à leur naissance, garnis de  
feuilles petites, courtes, linéaires, disposées sur  
deux rangs, égales dans toute leur longueur, planes,  
entières à leurs bords ou un peu denticulées,  
assez minces, plutôt membraneuses que coriaces,  
obtusées, point échancrées, éparées, solitaires,  
vertes à leurs deux faces, d'un vert plus pâle en  
dessous.

Les fleurs sont disposées en chatons simples, les  
uns mâles, les autres femelles: ces dernières pro-  
duisent des cônes terminaux qui varient par leurs  
couleurs, blanchâtres en dedans, souvent un peu  
rougeâtres ou noirâtres en dehors, ovales, cylin-  
driques, courts, petits, pendans, composés d'é-  
cailles imbriquées, un peu arrondies, planes, en-  
tières à leurs bords. Les chatons mâles sont axil-  
laires, très-courts, peu garnis de fleurs, presque  
capites, pédonculés.

Cet arbre est très-commun dans l'Amérique  
septentrionale. On le rencontre depuis la baie  
d'Hudson jusque dans la Virginie, & sur les mon-  
tagnes de la Caroline. On le cultive dans les jar-  
dins d'Europe. ♀ (V. v.)

#### 14. SAPIN pectiné. *Abies pectinata.*

*Abies* (americana), foliis obtusis, strobilis sub-  
rotundis; squamis subrotundis, planis; cortice levi.  
Cmel. Syst. Nat. vol. 2. pag. 1073. n°. 23. — Gart.  
de Fruct. & Sem. Plant. Centur. 6. tab. 91. fig. 1.  
(Pinus.)

*Abies minor, pectinatis foliis, virginiana; conis  
parvis, subrotundis.* Pluk. Almag. pag. 2. tab. 125.  
fig. 1. — Duham. Arbr. vol. 1. pag. 3. n°. 6.

*Pinus pectinata.* ? Hort. Paris.

*Pinus-abies americana.* Marshal, Arbr. Amer.  
pag. 103.

Cet arbre a beaucoup de rapports avec l'*Abies  
canadensis*. Son tronc est grêle, & s'élève quel-  
quefois à une grande hauteur: ses branches sont  
nombreuses, entières horizontalement, divisées  
en rameaux opposés, très-lisses, garnis de feuilles  
petites, linéaires, très glabres, d'un vert-pâle,  
un peu cendré, minces, membraneuses, médio-  
crement rétrécies vers leur extrémité, entières à  
leurs bords, obtuses, avec une très-petite pointe  
à leur sommet, très-nombreuses, disposées, le  
long des rameaux, sur deux rangs, en forme de  
peigne, très-ouvertes.

Les cônes sont petits, ovales, un peu arrondis,  
composés d'écaillés planes, imbriquées, presque  
rondes, glabres, de couleur variable, ordinai-  
rement un peu cendrée. On se sert de l'écorce des  
branches pour tanner les cuirs; on en obtient aussi  
une couleur propre à teindre en rouge.

Cet arbre croît dans plusieurs contrées de l'A-  
métique septentrionale ♀

#### 15. SAPIN à feuilles d'if. *Abies taxifolia.* Lam- bert.

*Abies foliis solitariis, planis, integerrimis; stro-  
bilis oblongis, antheris infuso-aidymis.* Lambert,  
Descript. of Pin. pag. 51. tab. 33.

Cette espèce a de grands rapports avec le *pinus  
canadensis* par son port, & même par l'élévation  
de son tronc. Ses rameaux sont un peu diffus, oppo-  
sés ou alternes: ses feuilles sont plus étroites & plus  
longues, très-entières, glabres à leurs deux faces,  
planes, solitaires. Les chatons mâles sont ovales,  
presque sessiles, très chargés de fleurs; les anthères  
renflées & à deux loges; leur crête réfléchie & fort  
petite: on soupçonne que ses cônes sont beaucoup  
plus longs que ceux du *pinus canadensis*.

Cet arbre croît sur les cônes occidentales de  
l'Amérique septentrionale. ♀

#### 16. SAPIN à feuilles lancéolées. *Abies lanceo- lata.* Lamb.

*Abies foliis solitariis, lanceolatis, planis, patentibus; strobilis globosis, squamis acuminatis.* Lamb.  
Descript. of Pin. pag. 52. tab. 34. (Pinus lanceo-  
lata.)

*Abies major densa, pectinatis taxifolia, sub-  
tus capis; conis granatioribus, sursum rigentibus; fo-  
liorum & squamarum apiculis spinosis.* Pluck. Amalth.  
Botan. t. tab. 351. fig. 1.

Cette espèce est une des plus distinctes & des  
plus remarquables de ce genre, tant par la forme  
globuleuse de ses cônes, que par ses écaillés & ses  
feuilles aiguës ou mucronées à leur sommet.

V v v 2

Les feuilles sont foliaires, épaisses, ouvertes, & même un peu renversées, planes, entières, lincéolées, un peu élargies à leur base, se rétrécissant insensiblement, acuminées, très-aiguës à leur sommet, longues d'environ deux pouces, roides, piquantes, rudes à leurs bords. Les fleurs ne font pas encore connues. Les cônes sont sessiles, inclinés, globuleux, de la grosseur d'une noix, lisses, composés d'écaillés imbriquées, ovales, aigues, un peu déchirées à leurs bords, mucronées à leur sommet.

Cet arbre croît à la Chine : il est jusqu'à présent inconnu dans les jardins de l'Europe. h

#### 17. SAPIN denticulé. *Abies denticulata*. Mich.

*Abies foliis undique circa ramos erectis, brevioribus, subterragonis, retis; strobilis oblongiusculis ovatis; squamis margine crenulatis.* Mich. Flot. boreal. Amer. vol. 2. pag. 207.

*Pinus (mariana), foliis subsulcatis, bifariam versis; ramulis pubescentibus; cuneatis subfoliis sessilibus; strobilis ovatis, pendulis; squamis ovalibus, margine laevibus undulatisque.* Seligm. Av. 5. tab. 1. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Plam. Cent. 8. tab. 91. fig. 2. ?

Ce sapin, assez voisin de l'*abies americana*, me paroît avoir plus de rapport avec le *pinus mariana* de Gærtner, quoique Michaux le regarde comme le même que le *pinus americana* du même auteur. On conçoit, dans un genre comme celui-ci, combien il est difficile de prononcer sur la synonymie, surtout quand certaines espèces ne sont connues que d'après la description des auteurs.

Cette espèce, d'après Michaux, est remarquable par ses feuilles droites, très-courtes, presqu'à quatre faces, éparpillées tout autour des rameaux qu'elles recouvrent en totalité. Les cônes sont ovales, un peu allongés, composés d'écaillés imbriquées, d'un brun-châtain dans leur jeunesse; décolorées vers leur sommet, un peu rongées ou légèrement crénelées à leurs bords.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de l'Amérique septentrionale, au Canada & dans la Nouvelle-Angleterre. h

#### \* Espèces moins connues.

\* *Abies (araucana), foliis turbinatis, imbricatis, hinc mucronatis; ramulis quaternis, eructatis; strobilis globosis, pendulis; necibus conicis, hyalinis, alis densatis.* Molina, Hist. Chili. pag. 157. (Pinus.)

*Pinus araucana.* Gmel. Syst. Natur. vol. 2. pag. 1074. n°. 28.

\* *Abies (cupressiformis), foliis imbricatis, acutis.* Molina, Hist. Natur. Chili. pag. 144.

*Pinus cupressiformis.* Gmel. Syst. Natur. vol. 2. n°. 29.

\* *Pinus (dammar), foliis oppositis, elliptico-lanceolatis, striatis.* Lambert, Descript. of Pin. pag. 61. tab. 38.

*Dammar alba.* Rumph. Amboin. vol. 2. pag. 174. tab. 57.

*Arbor javanensis, visci foliis latioribus, conjunctis, dammar alba dista.* Rai, Hist. vol. 3. — Dendr. 130.

Quoique les fruits de cet arbre aient de grands rapports avec ceux des sapins, il est très-probable que cet arbre doit appartenir à un autre genre qui n'est pas encore connu. (Voyez, dans cet ouvrage, l'article DAMMAR BLANC.)

SAPONAIRE ou SAVONNIÈRE. *Saponaria*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, de la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les œillets, & qui comprend des herbes la plupart indigènes de l'Europe, à feuilles entières, opposées, dont les fleurs sont ordinairement disposées en corymbes terminaux, quelquefois axillaires; les calices anguleux dans quelques espèces.

Le caractère essentiel de ce genre consiste dans :

Un calice tubulé, nu à sa base, à cinq dents; cinq pétales ongiculés; dix étamines; deux styles; une capsule à une seule loge; un réceptacle libre, central.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, allongé, tubulé, nu à sa base, divisé en cinq dents à son orifice, persistant, quelquefois anguleux.

2°. Une corolle composée de cinq pétales, dont les onglets sont étroits, anguleux, de la longueur du calice; le limbe plane; chaque lame obtuse, très-élargie vers son sommet.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont tubulés, de la longueur du tube de la corolle, alternes avec les onglets de la corolle, souvent cinq plus tardifs, surmontés d'anthères oblongues, obtuses, inclinées.

4°. Un ovaire oblong, arrondi, surmonté de deux styles droits, parallèles, de la longueur des étamines, terminés par deux stigmates aigus.

Le fruit est une capsule allongée, aussi longue que le calice qui la recouvre; à une seule loge, contenant des semences nombreuses, fort petites, supportées par un réceptacle libre & central.

Observations. Ce genre est peu naturel : la plu-

part des espèces qui le composent, ne sont liées entr'elles que par l'absence des écailles qui le trouvent à la base du calice des oëillet, *dianthus*; les unes se rapprochent singulièrement des *gypsophilla*, telles que le *saponaria porrigens*, *cretica*, &c. dont les fleurs sont petites, les onglets courts; mais dans les *gypsophilla*, les calices sont plus profondément découpés, campanulés, point tubulés: la forme de ces mêmes calices distingue encore les saponaires des filénés, outre que ces derniers ont trois styles au lieu de deux, & que l'orifice de leur corolle est constamment couronné par un appendice composé de petites écailles situées à la base du limbe. Ce dernier caractère se rencontre aussi dans quelques espèces de saponaires, telles que le *saponaria ocyroides*, *lutea*, &c.

Il suit de ces considérations, que ce genre n'offre point de caractères bien tranchés dans les parties essentielles de sa fructification, & qu'il n'est que très-peu distingué des *gypsophilla*. Les espèces diffèrent également entr'elles par leur port, par la forme de leurs calices, dont les uns sont cylindriques, tubulés; les autres, fortement anguleux, à angles saillans, comme ceux de plusieurs espèces d'*agrostemma*.

## E S P È C E S.

1. SAPONAIRE officinale. *Saponaria officinalis*. Linn.

*Saponaria calicibus cylindricis, foliis ovato-lanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 584. — Hort. Cliff. 165. — Hort. Ups. 106. — Mater. medic. 117. — Roy. Lugd. Bat. 444. — Gtonov. Virgin. 160. — Gort. Gerl. 245. — Eder. Flor. dan. tab. 543. — Ludw. F&L. tab. 170. — Knorr. Del. t. tab. 5. 17. — Pollich. Pal. n° 407. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 542. n° 561. — Idem. Illustr. Gener. tab. 376. fig. 1. — Hoffm. Germ. pag. 147. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 181. — Il. pag. 474. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 667. — Curtif. Lond. tab. 102. — Ger. Flor. gall. Prov. pag. 412. n° 1. — Gouan. Monsp. pag. 212.

*Saponaria foliis ovato lanceolatis, trinerviis; floribus tubulosis, umbellatis*. Hall. Helv. n° 908.

*Saponaria major, levis*. C. Bauh. Pin. 206. — Magn. Botan. Monsp. 229.

*Lychnis silvestris, quæ saponaria vulgò*. Tournef. Inst. R. Herb. 336. — Garid. Aix. 397.

*Saponaria vulgaris*. Camer. Epit. 352. — Blakew. tab. 113. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 346.

*Saponaria*. Dod. Pempt. 179. Icon.

*Saponaria major*. Dalech. Hist. t. p. 822. Icon.

*Lychnis (officinalis), floribus digynis, corymbosis; capsulis quadrivalvis*. Scop. Carn. n° 510.

*Boottia vulgaris*. Neck. Gallob. 193.

*Saponaria vulgaris, simplex, major*. Morif. Oxon. 5. 5. tab. 22. fig. 52.

2. *Saponaria (hybrida), calicibus cylindricis; foliis ovatis, nervosis, semialexicaulibus*. Miller, Dict. n° 2.

*Lychnis saponaria dista, folio convoluta*. Rai, Synopf. 339.

*Saponaria concava, anglica*. C. Bauh. Pin. 206. — Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 548 5. 5. tab. 22. fig. 53. — Barlet. Icon. rar. tab. 92.

*Gentiana folio convoluta*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 521. Icon.

3. *Lychnis seu saponaria, flore pleno*. Tourn. Inst. R. Herb. 336.

*Saponaria flore pleno*. Cart. 209.

Ses racines sont grêles, dures, traçantes, très-étendues, un peu blanchâtres: il s'en élève des tiges hautes d'environ deux pieds, glabres, cylindriques, articulées, fistuleuses, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, presque sessiles, ovales, lancéolées, très-lisses, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu obtuses, d'un vert foncé, retraits presque en pétiole à leur base; marquées de trois nervures jaunâtres, longitudinales, un peu saillantes.

Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des tiges, presque ombellifères, d'une odeur assez agréable. Leur calice est très-glabre, cylindrique, alongé, divisé en cinq dents courtes, aiguës à son orifice. La corolle est blanche ou un peu rougeâtre vers l'extrémité des pétales; elle se double assez aisément, surtout dans les individus cultivés. Le fruit est une capsule alongée, cylindrique, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet en quatre parties.

On a quelquefois observé une variété très-singulière de cette plante, & que l'on regarde comme une hybride. La corolle est presque monopétale; les feuilles sessiles, ovales-oblongues, concaves; elle se rapproche des gentianes: la plupart des Anciens l'ont figurée. Il parait qu'elle n'a point été retrouvée depuis Gerard, qui l'avait observée en Angleterre.

Cette plante croit en Europe dans les champs, parmi les vignes, sur les vers des montagnes & ailleurs. (V. v.)

Cette plante est amère; elle passe pour désaltérante, diurétique, sudorifique & dépurative. On se sert surtout de l'extrait de cette plante contre les obstructions, les maladies de la peau, les douleurs de rhumatisme, les fleurs-blanches; elle réussit dans les fièvres compliquées par des accidens nerveux. Je l'ai vu appliquée, avec un grand succès, dans les rhumatismes par le médecin Marillac.

dans les hôpitaux militaires. Extérieurement la saponaire est détective : on croit que les Anciens s'en servaient pour préparer les étoffes à la teinture. C'est un savon acide, propre à déterger les graisses : c'est de cette propriété qu'elle a tiré son nom.

## 2. SAPONAIRE à fleurs rouges. *Saponaria vaccaria*.

*Saponaria calceibis pyramidalis, quinquangularibus; foliis ovatis, acuminatis, sessilibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 585. — Hort. Clif. 166. — Hort. Upf. 107. — Roy. Lugd. Bat. 443. — Guett. Stamp. 287. — Sauv. Monsp. 153. — Pollich, Pal. 408. — Hoffm. Germ. 147. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 186. — Il. pag. 473. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 668. — Gouan, Monsp. 212. — Gerard, Flor. gall. Prov. 412. n°. 2.

*Saponaria calceibis pyramidalis, quinquangularibus; foliis ovatis, connatis*. Hal. Helv. 907.

*Saponaria rubra*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 541. n°. 561. VIII.

*Lychnis vaccaria*. Scop. Carn. 2. n°. 511.

*Saponaria fegetalis*. De Neck. Gallob. pag. 194.

*Myagrum, vaccaria quorundam*. Tabern. pag. 866. Icon.

*Lychnis fegetum rubra, foliis perfoliata*. C. Bauh. Pin. 204. — Tourn. Inst. R. Herb. 315. — Garid. Aix. 296. — Magn. Botan. Montp. 169.

*Tham. nemon*. Val. Cord. pag. 104. Icon.

*Vaccaria*. Dodon. Pempt. pag. 104. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 357. Icon.

*Lychnis fegetum, vaccaria dista*. Morif. Oxon. Hist. 2. 6. 5. tab. 21. fig. 27.

*Isatis silvestris, vaccaria dista*. Lobel, Icon. 352. — Hem, Observ. pag. 190. Icon.

g. *Saponaria* (amplissima), *calceibis pyramidalis, quinquangularibus; foliis ovato-lanceolatis, semi-amplexicaulis*. Miller, Dict. n°. 4.

On peut aisément reconnaître cette espèce à ses belles fleurs rouges, à ses calices pyramidaux, munis de cinq angles saillans, & à ses feuilles ovales, lancéolées, sessiles.

Ses racines sont blanchâtres, rameuses, point racineuses : il s'en élève une tige droite, haute d'environ un pied & demi, cylindrique, fistuleuse, très-glabre, articulée, d'un blanc jaunâtre, branchue à sa partie inférieure, divisée en rameaux opposés, panicules, nombreux. Les feuilles sont sessiles, opposées, larges, connées à leur base, comme perlées, ovales, oblongues, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, glabres à leurs

deux faces, d'un vert glauque, à nervures longitudinales peu sensibles.

Les fleurs sont disposées en corymbe ; elles sont terminales ; les péduncules filiformes, opposés, très-longs, munis à leurs divisions de petites bractées lancéolées, aiguës. Les calices sont renflés, pyramidaux, à cinq angles très-saillans, verdâtres, divisés à leur orifice en cinq dents très-courtes. La corolle est d'un rouge assez vif, d'une grandeur médiocre ; les pétales légèrement crénelés à leur sommet ; les semences fort petites, un peu arrondies, fixées à un réceptacle central.

Cette plante croît dans les champs, parmi les blés, en France, en Allemagne, en Suisse, dans le Levant, &c. ○ (P. v.)

Miller cite, comme espèce distincte, une plante  $\beta$ , que l'on rencontre en Espagne, & qui ne parait être qu'une variété de la précédente, beaucoup plus élevée, plus ample, dont les feuilles sont plus grandes, ovales, lancéolées, un peu charnues, fortement connées à leur base.

## 3. SAPONAIRE de Crète. *Saponaria cretica*. Linn.

*Saponaria calceibis quinquangularibus, striatis; caule erecto, subdichotomo; foliis subulatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 584.

*Saxifraga altera*. Prosp. Alpin. Plant. exot. pag. 292. tab. 291.

Cette espèce a le port d'un silené ; elle pousse un grand nombre de tiges grêles, droites, hautes de huit à dix pouces & plus, cylindriques, velues, un peu visqueuses, divisées en rameaux étalés, opposés, presque dichotomes, filiformes, garnis de feuilles sessiles, opposées, linéaires, subulces, très-entières, lisses à leurs deux faces, longues d'environ un pouce.

Les fleurs sont terminales, presque paniculées ; les péduncules presque simples, axillaires, roides, uniflores, très-droits. Le calice est étroit, alongé, d'une seule pièce, muni de cinq angles, chaque angle marqué de trois stries ; l'orifice divisé en cinq dents, dont l'intervalle est membraneux. La corolle est purpurine ; les pétales petits, très-entières ; les semences noirâtres, fort petits.

Cette plante croît dans l'île de Crète, dans les sols arides & stériles ; elle passe pour propre à exciter les urines dans les obstructions des reins par la gravelle.

## 4. SAPONAIRE à fleurs pendantes. *Saponaria porrigens*. Linn.

*Saponaria calceibis cylindricis, pubescentibus; ramis divaricatis, caulis sessilibus penaulis*. Linn. Syst. Nat. 34. — Mantiss. pag. 239. — Willden. Spéc. Plant. vol. 2. pag. 668.



*Silene porrigens*. Linn. Syst. Nat. 3. pag. 230. — Jacq. Hort. Vind. 2. pag. 49. tab. 109.

*Silene* (*porrigens*), *caule paniculato, villosa; pedunculis axillaribus, filiformibus, solitariis, patentibus*. Gouan. Illustr. pag. 29.

*Lychnis chalceopsis*, *annua; foliis parum hirsutis, angustis, carnosis; pediculis infirmis, triuncialibus; caespitibus serè rotundis*. Morif. Oxon. Hist. 2. pag. 541. — Tournef. Inst. R. Herb. 337.

Cette espèce se distingue à ses fruits pendans, à ses calices renflés & presque globuleux à l'époque de la maturité des fruits, à ses tiges velues & à ses feuilles lancéolées, caractères qui la distinguent du *Saponaria cretica*, avec lequel elle a quelques rapports; elle a de plus l'aspect d'un silend.

Ses tiges sont droites, roides, articulées, velues, hautes de deux pieds, cylindriques, point fistuleuses, à peine striées, d'un vert-pâle, un peu visqueuses à leur partie supérieure, presque glabres inférieurement, divisées en rameaux dichotomes, très-étalés, alternes, axillaires, velus & visqueux. Les feuilles sont opposées, sessiles, lancéolées; les inférieures très-glabres, beaucoup plus longues & plus larges, entières à leurs bords, rétrécies, obtuses à leur sommet; les supérieures beaucoup plus étroites, presque linéaires, acuminées, pubescentes, un peu glutineuses, molles, entières.

Les fleurs forment, par leur ensemble vers l'extrémité des rameaux, une panicule étalée; elles sont axillaires, solitaires, lâches, supportées par des pédoncules capillaires, très-longs, glabres, réfléchis, plus longs que les feuilles supérieures. Les calices sont visqueux, pubescens, presque tubulés, divisés à leur orifice en cinq dents droites, lancéolées, assez profondes. La corolle est petite, blanchâtre ou couleur de chair. Les pétales sont légèrement échancrés à leur sommet, sans aucun appendice particulier; les étamines banchées, plus courtes que les onglets; l'ovaire ovale; les styles écartés; les stigmates simples; les capsules ovales, presque arrondies, s'ouvrant en cinq découpures à leur sommet; les semences petites & noires.

Cette plante croît naturellement dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☉ (P. v.)

5. SAPONAIRE d'Illyrie. *Saponaria illyrica*. Linn.

*Saponaria calceibus subcylindricis; caule erecto, viscido, purpurascens; ramis alternis, corollis punctatis*. Linn. Martiff. pag. 70. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 669. n° 5.

*Saponaria caule dichotomo, hirsuto; floribus fissi-*

*giatis; corollis patentibus; petalis integris, tripartitis*. Arduin. Spec. 2. pag. 24. tab. 9.

Ses tiges sont droites, tendres, hautes d'environ six à huit pouces, velues ou pubescentes, visqueuses, dichotomes, un peu purpurines, divisées en rameaux alternes, pubescens, garnis de feuilles opposées, sessiles, linéaires, lancéolées, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs forment un corymbe terminal. Les calices sont divisés, jusque vers leur moitié, en cinq découpures membraneuses à leurs bords. La corolle est blanche, très-ouverte; les pétales entiers, marqués sur leur limbe de trois points couleur de pourpre; les anthères sont également purpurines.

Cette plante croît dans l'Illyrie; elle a quelques rapports avec le *Saponaria porrigens*.

6. SAPONAIRE rampante. *Saponaria ocymoides*. Linn.

*Saponaria calceibus cylindricis, villosis; caulibus dichotomis, procumbentibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 385. — Jacq. Flor. austr. 5. pag. 39. tab. 23. Append. — Cavan. Icon. rar. 2. pag. 29. tab. 134. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 669. n° 6. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 412. n° 3. — Gouan, Monsp. pag. 212. n° 3. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 343.

*Saponaria repens*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 542. n° 361. X.

*Saponaria caulibus decumbentibus, nodosis; foliis ovato-lanceolatis; calicibus tubulosis, hirsutis*. Haller, Helv. n° 909.

*Lychnis vel ocymoides, repens, montanum*. C. Bauh. Pin. 206. — Tournef. Inst. R. Herb. 337. — Schench. Alp. 7. pag. 514.

*Ocymoides repens, polygonifolia*. Lobel. Icon. 341. — Idem, Obferv. pag. 185. Icon. — Dalech. Hist. 2. pag. 1429. Icon.

*Saponaria minor quibusdam*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 344. Icon.

*Lychnis montana, repens*. Gerard, Hist. 473. Icon.

*Ocymoides repens*. Parkinson, Theat. pag. 639. Ic.

*Lychnis vel ocymoides repens*. Motif. Oxon. Hist. 2. 5. s. tab. 21. fig. 38.

Cette plante a tellement l'aspect d'un silend, qu'il ne lui manque, pour être rangée parmi eux, qu'un pistil de plus & un calice ventru.

C'est une jolie espèce qui forme sur les rochers de larges gazons, dont la verdure est relevée par de belles fleurs rouges, élégantes, diaphanes; elle pousse de ses racines, des tiges couchées,

rampantes, longues de six à huit pouces & plus, grêles, cylindriques, pubescentes, articulées, divisées en rameaux dichotomes, garnis de feuilles opposées, pétioles, petites, ovales, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, entières à leur contour, légèrement pubescentes; les supérieures lancéolées, presque sessiles, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont nombreuses, disposées en corymbes à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules velus, filiformes, simples, courts, à peine plus longs que les feuilles. Les calices sont monophyllés, allongés, étroits, tubulés, cylindriques, souvent colorés vers leur partie supérieure, chargés de poils visqueux, divisés à leur orifice en cinq dents droites, petites, obtuses. La corolle est de couleur rose, ouverte, plane à son limbe; les pétales oblongs, presque elliptiques, insensiblement élargis de la base au sommet, onguiculés, souvent entiers, quelquefois légèrement échancrés; les onglets aussi longs que les calices, munis d'un double appendice à leur sommet, d'où résulte une petite couronne à l'orifice de la corolle, comme dans les *silènes*. Le fruit est une capsule ovale-oblongue, à une seule loge, s'ouvrant à son sommet presque vers la moitié en quatre valves, renfermant plusieurs semences brunes, réniformes.

Cette plante croît naturellement sur les rochers dans les environs de Montpelier, en Suisse, en Italie, ainsi que sur le mont Atlas, où elle a été observée par M. Desfontaines. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 7. SAPONAIRE d'Orient. *Saponaria orientalis*. Linn.

*Saponaria calicibus cylindricis, villosis; caule dichotomo, erecto, parvo*. Linn. Hort. Upsal. 106. n°. 2. — Miller, Dict. n°. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 670.

*Saponaria caule dichotomo; foliis lanceolatis, petiolatis; floribus solitariis, pedunculatis*. Royen, Lugd. Bat. 445.

*Lychnis orientalis*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 512.

*Lychnis orientalis, annua, supina, antirrhini folia; flore minimo, purpureo*. Tourn. Coroll. 24. Dillen, Elettam. pag. 205. tab. 167. fig. 204.

Cette espèce ressemble beaucoup au *saponaria* oymoides; elle en diffère par ses feuilles linéaires, lancéolées; par ses fruits ovales, plus renflés, & par sa corolle fort petite, dépourvue d'appendice en couronne à son orifice.

Ses tiges sont basses, presque couchées, petites, longues d'environ quatre à six pouces, divisées en rameaux dichotomes, droits, très-étalés, visqueux, pubescents, garnis de feuilles opposées, linéaires, lancéolées, rétrécies en pétiole à leur

base, petites, entières. Les fleurs sont très-petites, purpurines, solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, pédunculées; leur calice est ovale, chargé extérieurement de points élevés, piluleux, visqueux; les pétales étroits, presque angus, échancrés à leur sommet.

Cette plante croît dans l'Orient & la Carniole. ○

#### 8. SAPONAIRE à fleurs jaunes. *Saponaria lutea*. Linn.

*Saponaria calicibus teretibus; corollis coronatis; floribus subumbellatis; foliis sublinearibus, canaliculatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 585. — Allion, Flor. pedem. n°. 1560. tab. 23. fig. 1.

*Saponaria (lutea), calicibus teretibus cauleque hirsutis; petalis obovatis, integerrimis; floribus corymbosis; foliis linearilanceolatis, canaliculatis*. Smith, Spicil. botan. tab. 5. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 670. n°. 3.

*Saponaria foliis graminis, congestis; floribus umbellatis, petalis ovatis*. Haller, Helv. n°. 904.

*Lychnis floribus umbellatis, ochroleucis; petalis ovatis, filamentis nigris*. Allion, Specim. pedem. pag. 29. tab. 5. fig. 2.

Cette espèce se reconnoît à sa petitesse, à ses feuilles inférieures en gazon, à ses tiges simples, presque nues; à ses fleurs d'un jaune-pâle, presque en ombelle.

Ses tiges sont cylindriques, légèrement velues, hautes de deux à trois pouces, à peine feuillées, point rameuses; elles s'élèvent du centre d'une touffe de petites feuilles nombreuses, très-serres, qui forment sur les rochers des gazons épaux, agréables. Ces feuilles ont presque la forme de celles des graminées; elles sont courtes, étroites, presque linéaires, aiguës, longues à peine d'un pouce, glabres, entières, un peu canaliculées en dessus, d'un vert-jaunâtre ou un peu glauques; les caulinaires sont rarement au-delà de deux, opposées, sessiles, connées à leur base, quelquefois légèrement pubescentes. Celles qui accompagnent les fleurs peuvent être considérées comme des bractées.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en une sorte de corymbe ou d'ombelle serrée, agglomérée; médiocrement pédunculées. Leur calice est cylindrique, un peu jaunâtre, hérissé de poils cendrés, divisé à son orifice en cinq dents droites, courtes, ovales, arrondies, un peu mucronées. La corolle est d'un jaune-pâle, d'une grandeur médiocre; les pétales en ovale renversée, très-entiers, un peu couronnés à leur orifice; les onglets de la longueur du calice; les filaments noirâtres; la capsule ovale, oblongue; les semences tout petites.

Cette

Cette plante croît dans les Alpes, sur les rochers, en Suisse, dans la Savoie, & particulièrement sur le Mont-Cenis. (V. f.)

9. SAPONAIRE à feuilles de paquerette. *Saponaria bellidifolia*, Smith.

*Saponaria celtibus terribus, hirtis; caule glabro; petalis linearibus, crenatis; foliis spatulatis*, Smith, Spicil. Botan. 5. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 670. n°. 9.

*Lychnis lutea, montana, globularia capite & facie*, Barrel. Icon. rar. pag. 63. n°. 659. tab. 498.

*Lychnis rubra, globularia capite & facie, montana*, Boccone, Mus. 2. pag. 75. tab. 62. fig. 1.

*Globularia lutea, montana*, Column. Ecphr. 1. pag. 152. tab. 153.

*Bellis montana, globoso, luteo flore*, C. Bauh. Pin. 262.

Cette plante a quelques rapports avec le *Saponaria lutea*; elle en diffère par sa grandeur & par la forme de ses feuilles.

Ses racines sont épaisses, munies de quelques fibres; elles se divisent vers leur sommet en plusieurs ramifications qui forment autour de plantes distinctes, mais réunies par leur base.

Ses tiges sont droites, simples, hautes de cinq à six pieds, cylindriques, très-glabres, presque nues; les feuilles radicales sont droites, en toupes, presque spatulées, rétrécies en pétioles à leur base, un peu mucronées à leur sommet, légèrement sinuées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, un peu nerveuses, semblables à celles de la paquerette ou de la globulaire: les caulaires, au nombre de deux ou quatre, sont opposées, étroites, presque linéaires, conées à leur base.

Les fleurs sont disposées en une tête globuleuse & terminale, médiocrement pédonculées. Leur calice est cylindrique, droit, velu, divisé en cinq dents ovales; la corolle petite, de couleur jaune, & non rougeâtre. Il est à présumer que c'est par erreur que Boccone lui attribue cette dernière couleur: les pétales sont étroits, linéaires, presque cunéiformes, échancrés & même crénelés à leur sommet; les étamines jaunâtres, plus courtes que la corolle; deux styles; les stigmates un peu réfléchis; l'ovaire ovale; les semences petites, presque rondes, un peu échancrées.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, en Italie. 7.

SAPOTILLIER. *Achras*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des sapotilliers, qui a des rapports avec les *chrysothylum*, & qui comprend

Botanique, Tome VI.

des arbres ou arbrutes exotiques à l'Europe, à feuilles simples, entières, alternes, dont les fleurs sont nombreuses, axillaires; les pédoncules uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six divisions; une corolle campanulée; le limbe à six découpures; six écailles échancrées à l'orifice de la corolle; six étamines; une pomme globuleuse & charnue, à douze loges; autant de semences comprimées.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en six folioles droites, ovales, concaves, inégales; les extérieures plus larges & plus courtes; les intérieures colorées.

2°. Une corolle monopétale, de forme ovale, de la longueur du calice, & dont le limbe est divisé en six découpures planes, presque ovales.

Six écailles à l'orifice de la corolle, égales à ses découpures, plus étroites, échancrées à leur sommet.

3°. Six étamines, dont les filamens sont courts, subulés, fixés à l'orifice de la corolle, alternes avec les découpures, un peu courbés, terminés par des anthères aiguës.

4°. Un ovaire arrondi, un peu comprimé à ses deux extrémités, surmonté d'un style subulé, plus long que la corolle, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une pomme charnue, globuleuse, à douze loges, contenant chacune une semence ovale, luisante, comprimée, marquée d'une cicatrice latérale dans toute sa longueur.

Observations. M. de Jussieu a séparé de ce genre l'*achras mammosa* de Linné, qui diffère des autres espèces par une partie de moins dans les divisions du calice & de la corolle, & dans le nombre des étamines: de plus, ses fruits n'ont que dix loges au lieu de douze. M. de Jussieu lui a donné le nom de *Lucuma* qu'il porte dans le pays.

Swartz a rangé dans le nouveau genre qu'il a établi sous le nom de *bumelia*, quelques espèces d'*achras*, & en particulier l'*achras salicifolia* Linn. Ce genre est composé d'ailleurs d'espèces enlevées à d'autres, aux *chrysothylum* (cimicif), aux *fideroxylon* (argan). Tous ces genres diffèrent peu, & leur caractère principal n'est fondé que sur le nombre des parties de la fructification, & sur celui des divisions de leur calice & de leur corolle. Quant au genre *bumelia* de Swartz, il est difficile de le regarder comme véritablement distinct des *fideroxylon*. Dans ces derniers le fruit est une baie à cinq semences, qui ne s'y trouvent pas toujours à cause des avortemens de plusieurs d'entr'elles.

X x x

Dans les *lumella*, c'est un drope à une seule semence. Tous les autres caractères sont communs aux deux genres, & lorsque dans les *fiducylos* les semences avortent, & se réduisent à une seule, comme il arrive souvent, le faible caractère générique disparaît. Il existe d'ailleurs, dans les *fiducylos* des espèces qui composent ces deux genres, des rapports si nombreux, si naturels, qu'il est difficile de les séparer.

## E S P È C E S.

## \* Six étamines.

1. SAPOTILLIER commun. *Achras sapota*. Linn.

*Sapota floribus foliatis, foliis lanceolato-ovatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 470. — Swartz, Obsev. t. 28. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 214. n. 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 355.

*Sapota (achras), foliis oblongo-ovatis; fructibus turbinatis, glabris*. Müll. Dict. n. 1.

*Achras (sapota), floribus hexanaris*. Jacq. Amer. 17. tab. 41.

*Achras*, Icon. 1. 166.

*Sapota fructu ovato, majore*. Plum. Gen. Amer. pag. 43. tab. 4.

*Achras fructu elliptico, scabro, majore*. Brown, Jam. 20. tab. 19. fig. 3.

*p. Achras (aspostilla), bra hians, diffusus; fructu subrotundo; ciliatim laevigato breviori*. Brown, Jam. 2. pag. 200. Jacq. — Amer. pag. 57.

*Anona foliis laurinis, glabris, viridifusis; fructu minore*. Sloan. Jam. 206. Hist. 2. pag. 171. tab. 230. — Rai, Dendr. 78. — Catesb. Coroll. 2. pag. 87. tab. 87.

*Sapota fructu turbinato, minori*. Plum. Gener. Amer. pag. 43.

*Anona maxima, foliis laurinis, glabris, viridifusis; fructu minore*. Sloan. Jam. 206. Hist. 2. pag. 172. tab. 169. fig. 2. — Rai, Dendr. 79.

Arbre élégant, dont l'écorce duquel découle une sueur blanche & tenace. Son tronc varie singulièrement de hauteur, selon les localités; il s'élève depuis six jusqu'à dix quatre pieds de haut; son bois est blanc, son écorce brune. Il se divise en rameaux réunis en cime; les plus jeunes sont épais, un peu charnus, garnis de feuilles alternes, épaisses, pétiolées, ovales, lancéolées, épaisses, coriaces, aiguës à leurs deux extrémités, entières à leurs bords, longues de quatre à cinq pouces, sur deux pouces environ de large; glabres à leurs deux faces, presque luisantes & à nervures peu sensibles, linéaires, parallèles, latérales, peu distantes.

Ses fleurs sont solitaires, pédonculées, épaisses, situées entre les feuilles à l'extrémité des rameaux;

elles sont blanchâtres, inodores; elles varient beaucoup par leur forme extérieure, selon que la floraison est plus ou moins avancée. Les calices sont à six folioles ovales, concaves, aiguës. La corolle est monopétale, plus longue que le calice; son tube campanulé, à six divisions, & autant d'échancures à son orifice; elle renferme six étamines. Le fruit est une pomme charnue, globuleuse, assez grosse, variable dans sa forme, divisée en douze loges, & renfermant autant de semences, dont plusieurs avortent.

Cet arbre croît dans plusieurs contrées de l'Amérique méridionale, à la Jamaïque, à la Nouvelle-Espagne, dans les forêts. On le cultive à cause de ses fruits. (V. f. in herb. Juss.)

Ses fruits sont assez recherchés; ils ont une saveur douce, mais un peu fade; on les sert sur toutes les tables en Amérique; il faut, pour les trouver plus agréables, attendre qu'ils commencent presque à se pourrir. Beaucoup d'oiseaux & même d'autres animaux en font très-fraîches. L'écorce de l'arbre passe pour astringente, & très-bonne pour couper la fièvre.

2. SAPOTILLIER balatte. *Achras balata*. Aubl.

*Achras foliis ovato-oblongis, subinis cinereis; fructu viridi, oliviformi*. Aubl. Guian. vol. 1. pag. 308.

*Achras (diff. 2a), foliis foliatis; foliis cuneiformibus, emarginato-revifis*. Linn. f. Suppl. 210.

*Achras floribus confertis; corollis obodacimifis; foliis obovatis, emarginato-revifis*. Forst. Plant. Eiccl. n. 13. — Idem, Prodr. n. 155. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 223.

*Manit-Kara*, Rheed, Malab. vol. 4. pag. 53. tab. 25.

Fulgairement bois de natte.

*p. Eadem, foliis supra subcinereis, subinis viridiflavescens*. (N.)

C'est un arbre assez élevé, dont l'écorce est d'un vert noirâtre, d'où découle une liqueur onctueuse, inodore; il se divise en longues branches latérales, diffusées, & en rameaux épars, garnis de feuilles alternes, pétiolées, très-épaisses, coriaces, les unes ovales, d'autres un peu oblongues, glabres & luisantes à leurs deux faces, entières à leur contour, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base, marquées de nervures extrêmement fines & très-rapprochées, traversées en dessous par une côte épaisse, marquée en dessus d'un sillon longitudinal; froissées entre les mains, elles donnent une liqueur laiteuse, âcre & visqueuse.

Les fleurs sont portées à l'extrémité des rameaux, sur de longs pédoncules pubescents, striés, entre les feuilles. Le calice est composé de six folioles rougeâtres, aiguës, lanugineuses, de cou-

leur pourpre, ainsi que la corolle. Les fruits ont la couleur, la forme & la grosseur d'une olive verte; ils fournissent une liqueur visqueuse. Leur chair, quand ils sont mûrs, est d'une saveur douce, acidulée; elle excite l'appétit, & facilite la digestion.

Cette plante croît naturellement dans la Chine, aux îles Manilles. On la cultive au Malabar & dans plusieurs autres contrées de l'Inde.  $\text{H}$

Ses feuilles, broyées, pilées avec du gingembre & autres plantes aromatiques, sont employées extérieurement dans les paralysies.

La plante  $\beta$ , quoique recueillie dans la Martinique, a de tels rapports avec la précédente, que nous n'avons pu l'en séparer, ne la connaissant pas suffisamment. Ses feuilles ne sont point luisantes, mais très-lisses, d'un vert-conné en dessus, un peu jaunâtres en dessous. Les pédoncules sont glabres, striés, recourbés; les fleurs ne sont point du tout velues. D'ailleurs, cette plante est si ressemblante aux autres caractères de celle de Rhœd.  $\text{H}$  ( $\text{V. f. in herb. Lam.}$ )

### 3. SAPOTILLIER à fleurs sessiles. *Achras sessilifolia*.

*Achras foliis cuneato-oblongis, obtusis; floribus subsessilibus. (N.)*

C'est une fort belle espèce, dont les rameaux, très-épais, ligneux, l'écorce rugueuse, épaisse, paroissent appartenir à un arbre assez fort. Les feuilles sont alternes, éparées, pétioles, amples, coriaces, oblongues, rétrécies en coin à leur base, obtuses, arrondies, quelquefois un peu échancrées à leur sommet, glabres, luisantes à leurs deux faces, entières à leurs bords, marquées d'une côte longitudinale, saillante, épaisse, & de nervures latérales, fines, écartées, simples, dont le milieu est occupé par des veines agréablement réticulées.

Les fleurs sont éparées entre les feuilles, vers l'extrémité des rameaux, assez nombreuses, sessiles ou à peine pédonculées, solitaires: leur calice est un peu pubescent, de couleur brune. Je n'ai pu observer ni la corolle ni les fruits.

Cette plante a été recueillie à l'île-de-France par M. Stedman.  $\text{H}$  ( $\text{V. f. in herb. Lam.}$ )

\*\*\*

Les espèces suivantes ont été la plupart rangées, par différents auteurs, dans plusieurs autres genres déjà présentés dans cet ouvrage, ainsi que nous l'avons dit dans nos observations à la suite de l'exposition des caractères généraux. Nous avons cru devoir les mentionner ici avec les sapotilliers, ayant d'ailleurs de si grands rapports

avec les autres espèces de ce genre, qu'elles pourroient y être réunies sans un grand inconvénient.

\* \* Cinq étamines.

### 4. SAPOTILLIER marmelade. *Achras mammosa*. Linn.

*Achras floribus solitariis, foliis cuneiformi-lanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 469.

*Achras (sapota major), floribus pentandris*. Jacq. Amer. pag. 56. tab. 182. fig. 19.

*Achras floribus pentandris; foliis cuneiformi-lanceolatis, obtusis, integerrimis*. Dombey, Mss. in herb. Juss.

Lucuma. Juss. Gener. Plant. pag. 152.

*Sapota (mammosa), foliis lanceolatis; fructu maximo, ovato; seminibus ovatis, utrinque acutis*. Mill. Dict. n°. 2.

*Achras fructu maximo, ovato; seminibus paucioribus, oblongis, turgidis*. Brown, Jam. 5. pag. 201.

*Malus persea, maxima; foliis magnis, integris, longis; fructu maximo, oblongo, scabro; obiculo parvis rugoso, partim glabro*. Sloan. Jam. 2. p. 124. tab. 218.

*Arbor americana, pomifera; frondosis ramulis; foliis amplis, longioribus, obtusis, duris & venosis; margine aequali*. Pluken. Almag. pag. 39. tab. 268. fig. 2.

*Fructus oblongus, utrinque acuminatus seu conicus, levis, splendens, spadiceus*. Rai, Hist. 1800.

Vulgairement marmelade naturelle, lucuma, jaune d'œuf.

Bel arbre dont le tronc droit se termine par une cime ample, étendue, ramifiée; les jeunes rameaux épais, cylindriques, tomenteux à l'insertion des feuilles, chargés de cicatrices & d'aspérités par la chute des feuilles. L'écorce de cet arbre est brune; il en découle en petite quantité une liqueur laiteuse.

Les feuilles sont alternes, pétioles, grandes, oblongues, lancéolées, très-entières, obtuses, quelquefois aiguës à leur sommet, les unes rétrécies insensiblement à leur base en forme de coin, longues de huit à dix pouces, larges de trois ou quatre, coriaces, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus, marquées en dessous de nervures simples, latérales. Ces feuilles sont souvent réunies en touffe à l'extrémité des rameaux, éparées, & plus ou moins distantes.

Les fleurs sont solitaires, éparées, situées à l'extrémité des rameaux, pédonculées. Le calice est divisé en cinq folioles concaves, les deux extérieures plus grandes. La corolle est monopétale, ovale, à cinq découpures obtuses, lancéolées,

X x x 2

presque droites ; garnie intérieurement de cinq écailles subulées, qui ressemblent à des filaments stériles ; cinq éramines attachées à la corolle , alternes avec les écailles. L'ovaire est ovale, oblong, surmonté d'un style cylindrique, plus long que la corolle, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une pomme très-grosse, oblongue ou ovale, quelquefois un peu arrondie, dont la chair est ferme & jaunâtre, divisée intérieurement en dix loges ; une semence dans chaque loge, de la grosseur & de la forme d'une châtaigne : la plupart de ces semences avortent, & il n'en mûrit guère, dans chaque fruit, que de deux à quatre.

Cette plante croît à la Jamaïque, à l'île de Cuba & au Pérou, où les Espagnols la nomment *lucuma*. *h* (V. f. in herb. Juss.)

Ses fruits se mangent. Leur chair est douce, mais un peu fade ; les amandes agréables au goût, un peu amères.

Observations. M. de Jussieu a fait de cette espèce un genre particulier sous le nom de *lucuma*, qui offre pour caractère essentiel :

Un calice à cinq divisions ; une corolle monopétale, ovale, ventrée vers son milieu, droite, à cinq divisions alternant avec cinq écailles situées à l'orifice de la corolle ; cinq étamines alternes avec les divisions de la corolle ; une pomme très-grosse, charnue, à dix loges ; une semence arrondie ou anguleuse dans chaque loge ; plusieurs avortent.

5. SAPOTILLIER à feuilles de faule. *Achras salicifolia*. Linn.

*Achras floribus confertis, foliis lanceolato-ovatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 2. pag. 104. n°. 3.

*Achras foliis oblongis, nitidis, utrinque productis ; floribus confertis ; fasciculis intra frondes sparsis*. Brown, Jam. 201. tab. 17. fig. 4.

*Salicis folio lito, splendente arbori ; floribus parvis, pallidis luteis, pentapetalis, à ramulorum lateralibus confertim exsertibus*. Sloan. Jam. 170. Hist. 2. p. 98. tab. 206. fig. 2.

*Bumelia (salicifolia), foliis lanceolato-ovatis, acuminatis ; pedunculis confertis, axillaribus & lateralibus*. Swartz, Prodr. 50. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 497. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1086. n°. 6.

*Sideroxylon majichodendrum*. Jacq. Collect. 2. pag. 253. tab. 17. fig. 5.

*Cornus foliis laurinis ; fructu majore, luteo*. Catesb. Carol. 2. pag. 75. tab. 75.

Cette plante offre les caractères du *sideroxylon* ou des *bumelia* de Swartz, & doit être réunie à l'un de ces deux genres, ainsi qu'il a été fait par plusieurs auteurs.

C'est un arbrisseau dont les feuilles, assez semblables à celles du faule, sont ovales, lancéolées, acuminées, aiguës à leurs deux extrémités, luisantes, glabres à leurs deux faces, alternes, pétiolées. Les fleurs sont pédonculées, situées entre les dernières feuilles ; fasciculées, petites ; les filets alternes ; la corolle d'un jaune-pâle, à cinq divisions, ainsi que le calice ; cinq écailles à l'orifice de la corolle ; cinq éramines. Le fruit est un drupe assez gros, de couleur jaunâtre, dans lequel on ne trouve qu'une seule semence.

Cette plante croît à la Jamaïque sur les collines arides, à l'île de Sainte-Croix, & dans les îles Lucaves, particulièrement à celle de Bahama. *h*

#### 6. SAPOTILLIER noir. *Achras nigra*.

*Achras foliis terminalibus, oblongo-lanceolatis, glabris, margine undulatis ; ramis laxis ; ramulis virgatis, floriferis*. Swartz.

*Bumelia nigra*. Swartz, Prodr. pag. 49. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 487. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1085. n°. 1.

*Achras frutibus minoribus, glabris, per ramos sparsis ; seminibus subrotundis ; cicatricula minimâ, ovata*. Brown, Jam. 201.

C'est un arbre élevé, dont le tronc est droit, revêtu d'une écorce noirâtre, muni de branches lâches, divergentes, & de rameaux ouverts, situés horizontalement, garnis vers leur extrémité de feuilles éparées, pétiolées, rapprochées, oblongues, lancéolées, entières, ondulées à leurs bords, glabres à leurs deux faces, d'un vert noirâtre, nerveuses, veinées, persistantes, supportées par des pétioles très-longs, grêles, cylindriques, pendans.

Les fleurs sont réunies au nombre de quatre ou six par paquets entre les feuilles, soutenues par des pédoncules simples, uniflores, longs d'un quart de pouce. Le calice est divisé en cinq folioles ovales, concaves, blanchâtres, renversées. La corolle a un tube très-court : son limbe est ouvert, à cinq découpures ovales, concaves, muni à son orifice de cinq écailles lancéolées, ondulées à leurs bords, de la longueur des étamines, outre deux autres écailles très-petites, lancéolées, à la base des découpures. Les filaments sont subulés, au nombre de cinq, plus courts que la corolle. L'ovaire est ovale, supérieur ; le style plus court que les étamines ; le stigmate aigu, persistant. Le fruit est un drupe glabre, presque rond, renfermant un noyau noir, très-glabre, marqué d'une cicatrice oblique, latérale.

Cette plante croît dans les Indes occidentales, où elle fleurit dans l'été. *h*

Il découle de son tronc & de ses rameaux une liqueur laiteuse lorsqu'on les entame. Son bois est

très-dur, fort bon pour les constructions. On vante son écorce comme un bon fébrifuge dans les fièvres intermittentes.

7. SAPOTILLIER pâle. *Achras pallida*.

*Achras foliis terminalibus, ellipticis, obtusis; pedunculis confertis, lateralibus; ramis cretulis*. Sw.

*Bumelia pallida*. Swartz, Prodr. pag. 49. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 489.

Cette espèce, quoique très-voisine de l'*achras nigra*, en diffère en ce que c'est un arbre bien moins élevé, dont l'écorce est blanchâtre, les rameaux plus roides, les feuilles plus allongées, les fleurs plus grosses, les fruits plus gros.

Son tronc est bas; l'écorce est d'un blanc-cendré; les branches, ainsi que les rameaux, droites & non ouvertes horizontalement; les feuilles ramassées à l'extrémité des rameaux, éparées, alternes, pétiolées, elliptiques, un peu membrancées, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, nerveuses, veinées d'un vert-pâle; les pétioles allongés, glabres, cylindriques.

Les fleurs sont latérales, ramassées par paquets sur les rameaux, soutenues par des pédoncules courts, uniflores. Le calice est composé de cinq folioles, dont deux un peu plus grandes. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, découpée, presque jusqu'à sa base, en cinq parties; les écailles tridentées à leur sommet; les filaments aussi longs que la corolle; le stigmate aigu. Le fruit est un drupe ovale, oblong, à une seule semence.

Cette plante croît dans les campagnes de la Jamaïque; elle fleurit dans l'été. ♀

Son écorce fraîche distille une liqueur laiteuse; le bois n'est d'aucun usage; l'écorce est amère, astringente.

8. SAPOTILLIER à feuilles émoussées. *Achras retusa*.

*Achras foliis cuneato-ovatis, retusis, rigidis; pedunculis confertis, axillaribus*. Swartz.

*Bumelia retusa*. Swartz, Prodr. pag. 49. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 490. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1086. n°. 4.

*Achras, fructu minori, glabro; foliis ovatis; floribus confertis, alaribus*. Brown, Jam. 201.

Le tronc de cet arbre est peu élevé: ses branches sont revêtues d'une écorce lisse & cendrée; ses rameaux cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, éparées, les unes alternes, d'autres opposées, ovales, rétrécies en coin à leur base, arrondies & émoussées à leur sommet, entières à leurs bords, un peu épaisses, roides, luisantes, vertes à leur face supérieure, un peu blanchâtres en dessous, marquées de points noirâtres, sup-

portées par des pétioles courts, cy'indriques, roides.

Les fleurs sont petites, axillaires, ramassées, soutenues par des pédoncules courts. Leur calice est blanchâtre, un peu rude au rouchet. Le style est beaucoup plus long que la corolle, persistant sur un drupe ovale, monosperme.

Cet arbre croît sur les lieux montueux, dans les contrées occidentales de la Jamaïque, où il fleurit dans le printemps & l'été.

Les fruits, avant leur maturité, donnent un lait qui se coagule en une sorte de gomme très-astringente.

9. SAPOTILLIER de montagne. *Achras montana*.

*Achras foliis oblongis, obtusis; pedunculis longioribus, axillaribus, distinctis*. Swartz.

*Bumelia montana*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 493. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1087. n°. 8.

*Bumelia foliis sparsis, alternis, oblongis, apice obtusis; floribus axillaribus, pedunculatis*. Swartz, Prodr. 49.

Arbrisseau dont les rameaux sont cylindriques, légèrement verruqueux, revêtus d'une écorce d'un brun-noirâtre, garnis de feuilles éparées, alternes, pétiolées, oblongues, entières à leurs bords, un peu obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, luisantes en dessus.

Les fleurs sont axillaires, presque solitaires, ou de trois à quatre, situées vers l'extrémité des rameaux, soutenues par des pédoncules cylindriques, de la longueur des pétioles, simples, uniflores. Les calices sont divisés en cinq ou huit folioles concaves, presque rondes. La corolle a le tube ventru à la base; les découpures de son limbe, ondulées; les écailles aiguës, conniventes à leur sommet; les filaments, de la longueur de la corolle; le style plus court que les étamines; le stigmate épais.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans les contrées méridionales de la Jamaïque; elle fleurit vers la fin de l'été. ♀

10. SAPOTILLIER pentagone. *Achras pentagona*.

*Achras foliis lanceolatis, acuminatis, nitidis; pedunculis axillaribus, drupis pentagonis*. Swartz.

*Bumelia pentagona*. Swartz, Prodr. pag. 49. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 494. — Willden. vol. 1. pag. 1087. n°. 10.

Le tronc de cette espèce est d'une hauteur médiocre. Ses branches & ses rameaux sont ouverts, étalés, verruqueux, de couleur cendrée, garnis de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, épa-

gies, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, un peu roides, luisantes, glabres à leurs deux faces, veinées.

Les fleurs sont latérales & axillaires, supportées par des pedoncules simples, épais, beaucoup plus courts que les pétiotes. Les folioles calicinales sont arrondies, velues, blanchâtres, membraneuses, persistantes. La corolle est blanche; son tube, à peine de la longueur du calice. Son limbe est à cinq divisions concaves, ovales, ouvertes; les écailles lancéolées, presque de la longueur de la corolle, fixées à la base des filaments. L'ovaire est arrondi; le style (subulé, plus long que la corolle); le stigmate aigu. Le fruit est un drupe ovale, glabre, acuminé, à cinq côtés.

Cet arbre croît sur les montagnes des montagnes, à l'île Saint-Domingue. h

11. SAPOTILLIER à feuilles rondes. *Achras rotundifolia*.

*Achras foliis suborbiculatis, marginatis, venosis, coriaceis, utrinque glabris*. Swartz.

*Bumelia rotundifolia*. Swartz, Prodr. pag. 50. — Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 99. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1087. n° 11.

C'est un arbrisseau dont les rameaux sont étalés, lisses, cylindriques, de couleur cendrée, garnis de feuilles épaisses, pétiolées, opposées ou alternes, presque rondes ou orbiculaires, bordées à leur contour, coriaces, veinées, luisantes, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont axillaires, latérales, rapprochées par paquets, supportées par des pedoncules simples, filiformes, plus longs que les pétiotes. Les calices se divisent en cinq petites folioles arrondies. La corolle est blanche, petite, à cinq découpures obtuses, munie, outre les écailles du centre, de deux autres petites écailles à la base des découpures. L'ovaire est presque rond; le style le subulé, plus long que la corolle; le stigmate simple.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque, parmi les broussailles. h

12. SAPOTILLIER à feuilles en coin. *Achras cuneifolia*.

*Achras foliis cuneatis, obovatis*. Swartz.

*Bumelia cuneata*. Swartz, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 496. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1088. n° 12.

Cet arbrisseau est muni de rameaux lâches, effilés, glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, souvent réunies plusieurs ensemble au même point d'insertion, ovales, en coin à leur base, coriaces, quelquefois un peu échancrées à leur

sommet, veinées, glabres à leurs deux faces, mais point luisantes; supportées par des pétiotes très-courtes.

Les fleurs sont réunies par paquets axillaires ou latéraux vers l'extrémité des rameaux, au nombre de cinq à six, soutenues par des pedoncules à peine aussi longs que les pétiotes. Le calice se divise en cinq folioles concaves, arrondies. La corolle est fort petite; elle se partage à son limbe en cinq découpures acuminées, à peine plus longues que le calice. Les écailles intérieures sont fort petites, aiguës, insérées un peu au dessous du limbe. Les étamines sont attachées vers le milieu du tube. Les anthères sont ovales, aiguës; l'ovaire ovale; le style court, épais; le stigmate obtus.

Cette plante croît sur les montagnes de la Jamaïque & dans plusieurs autres endroits des Indes occidentales. h

SAPOTILLIERS (Les). *Sapota*. Famille de plants, ainsi nommée parce qu'elle renferme un certain nombre de genres qui ont tous des rapports avec celui des sapotilliers, qui y est compris.

Les plantes qui composent cette famille sont des arbres ou arbrisseaux, dont les feuilles sont entières, très-ordinairement entières; les fleurs nombreuses, axillaires; les pedoncules uniflores. Ces plantes distillent de la plupart de leurs parties un suc lacteux.

Leur calice est persistant, à plusieurs divisions; leur corolle monopétale, régulière, dont les divisions sont tantôt en même nombre que celles du calice, alternes, avec autant d'appendices intérieurs; tantôt ces divisions sont doubles de celles du calice, mais sans appendices.

Les étamines sont opposées aux découpures de la corolle, en même nombre, ou doubles, les appendices étant alors surmontés par des anthères.

L'ovaire est simple, supérieur, surmonté d'un seul style, & terminé par un stigmate ordinairement simple.

Le fruit est une baie ou un drupe, à une ou à plusieurs loges, chaque loge ne renfermant qu'une seule semence osseuse, luisante, avec une cicatrice latérale. L'embryon de la semence est plane, enveloppé d'un péricarpe charnu.

Les principaux genres contenus dans cette famille sont les suivants :

- Les jacquinières.....*Jacquinia*.
- Les mangillies.....*Mangilla*.
- Les argans.....*Sideroxylum*.
- Les illipés.....*Baffia*.
- Les mimufopes.....*Mimufops*.
- Les natières.....*Imbricaria*.



Les cainitiers.....*Chrysophyllum*.  
 Les lucaniers.....*Lucuma*.  
 Les apotilliers.....*Achras*.

\* Genres affilés aux apotilliers.

Les myrsines.....*Myrsine*.  
 Les inocarpes.....*Inocarpus*.  
 Les olaces.....*Olea*.  
 Les lécs.....*Leca*.

SAPPAL. *Verifolia*. Sappal Louali. Rumph. Amboin. vol. 3. pag. 100. tab. 77.

C'est un grand arbre des Indes, décrit & figuré dans l'*Herbaria amboinensis* de Rumphius, mais qui ne nous est encore connu qu'imparfaitement, faute de détails sur les parties essentielles de sa fructification. Son tronc est droit, fort élevé : son bois lourd, pesant, rougeâtre en dedans, blanc à ses bords ; il se divise en branches & en rameaux droits, cylindriques, élançés, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, étroites, oblongues, lancéolées, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies vers leur pétiole, longues de six à huit pouces, sur deux de large ; glabres à leurs deux faces, d'un vert-foncé en dessus, pâles, blanchâtres à leur face inférieure, traversées de veines latérales, obliques, supportées par des pétioles courts.

Les fleurs sont disposées en petites grappes axillaires, plus courtes presque de moitié que les feuilles, & de grappes terminales beaucoup plus amples, étendues en panicules. Ces fleurs sont petites, blanchâtres, à cinq pétales aigus : il leur succède des baies de la grosseur d'une cerise, de couleur noirâtre, mais un peu comprimées à leurs deux extrémités, revêtues d'une pellicule mince, divisées extérieurement en trois côtes, à trois sillons, renfermant dans leur intérieur trois noyaux aigus à leur sommet, enveloppés, lorsqu'ils sont secs, d'une farine jaunâtre au lieu de pulpe.

Cet arbre croît à l'île d'Amboine. Les habitants se servent de ses branches & de ses rameaux pour former des palissades. Son écorce, lorsqu'elle est fraîche, est très-odorante. Les femmes la mêlent aux aromates dont elles composent leurs parfums. Elle perd son odeur par la dessiccation ; elle est regardée comme cosmétique ; propre, étant mélangée avec d'autres ingrédients, à enlever les taches du visage & à nettoyer la peau. Le bois des vieux troncs est très-bon pour construire les édifices ; il résiste longtemps à la pourriture, & s'emploie de préférence pour les parties inférieures des bâtiments.

Rumphius parle encore d'un autre arbre du même nom, qui peut-être appartient à une autre espèce, aussi fort, aussi élevé que le précédent, mais dont le bois est blanc, tendre, léger. On enlève très-aisément son écorce, qui est odorante.

Ses feuilles sont oblongues, acuminées, beaucoup plus larges que celles de l'arbre précédent ; élargies, arrondies à leur base, d'un vert obscur à leur face supérieure, blanchâtres, légèrement tomenteuses en dessous, entières à leurs bords. Les fleurs sont blanches & fort petites ; ses fruits sont des bales noirâtres de même forme que les précédentes, & dans la même disposition.

Cet arbre croît aux mêmes lieux que le précédent. 7

SARACA des Indes. *Saraca indica*. Linn.

*Saraca foliis alternis, impari-pinnatis ; folioliis petiolatis, paniculâ racemosa*. (N.)

*Saraca*. Linn. Manrifl. 98. — Burm. Flor. ind. pag. 85. tab. 25. fig. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 856.

Arbre des Indes encore très-peu connu, qui paroît avoir quelques rapports avec la famille des légumineuses, & dont le caractère essentiel consiste dans :

Une corolle infundibuliforme, à quatre divisions ; point de calice ; six étamines en deux paquets opposés, insérées à l'orifice de la corolle ; le fruit pédicelé.

Son tronc se divise en branches diffuses & en rameaux alternes, garnis de feuilles alternes, pétioles, composées de quatre, six ou huit folioles pétioles, oblongues. Les fleurs sont disposées en plusieurs épis ovales, alternes, dont l'ensemble forme une panicule : ces épis sont munis de bractées opposées deux à deux, imbriquées, ovales, lancéolées.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, dont le limbe est divisé en quatre découpures ovales, ouvertes ; la découpure supérieure plus écartée, l'orifice élevé à son bord.

3°. Six étamines diadelphes, dont les filaments sont sétacés, inclinés, insérés à l'orifice de la corolle, réunis trois par trois à leur base, & formant deux paquets opposés, terminés par des anthères en forme de talon.

4°. Un ovaire supérieur, comprimé, oblong, pédonculé, de la longueur des étamines, surmonté d'un style subulé, incliné, aussi long que l'ovaire, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit paroît être une gousse, mais il n'est pas encore suffisamment connu.

Cet arbre croît dans les Indes orientales. 7

SARANI. *Kajava* - *Marau*. Sarani. Rhed. Hort. malabar. vol. 5. pag. 37. tab. 19.

Arbre du Malabar, dont le tronc, d'une grosseur médiocre, ne s'élève qu'à une hauteur moyenne; il se divise en branches & en rameaux noueux, revêtus d'une écorce un peu jaunâtre, doués d'un bois dur & blanchâtre. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, oblongues ou quelquefois un peu arrondies, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, d'un vert-noirâtre à leur face supérieure, plus pâles en dessous, d'une saveur un peu acide, astringente.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes opposées, beaucoup plus courtes que les feuilles, divisées en rameaux courts. Les calices sont rougeâtres, petits, partagés en quatre découpures. La corolle est inodore, de couleur bleuâtre, composée de quatre pétales, ou peut-être de quatre lobes arrondis, renfermant huit étamines terminées par des anthères arrondies. Le style est simple, grêle, droit. Les fruits sont des baies glabres, arrondies, luisantes, d'abord verdâtres, puis blanchâtres ou un peu bleuâtres; d'un noir-pourpre en dedans, remplies d'une pulpe douce, succulente, renfermant un noyau blanchâtre.

Cet arbre croît aux Indes, dans les environs de Cochin; il reste vert, fleurit & fructifie toute l'année; il a des racines blanches, revêtues d'une écorce rougeâtre, légèrement astringente. h

**SARAQUIER.** *Saracha*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des solanées, qui a de grands rapports avec les *physalis* & les *atropa*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont entières, alternes ou géminées, les fleurs latérales ou terminales, solitaires ou en corymbes.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq angles; une corolle campanulée, en roue à son limbe; cinq étamines; un style; une baie à une seule loge, enveloppée jusqu'à son milieu par le calice; des semences comprimées, logées dans autant de petites cellules éparées.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, campanulé, à cinq angles, à cinq découpures ouvertes, ovales, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle monopétale, campanulée à sa partie inférieure, ouverte en roue à son limbe, divisé en cinq découpures égales, ovales, réfléchies.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont tubuleux, insérés à la base de la corolle, droits, élargis à leur partie inférieure, plus courts que la corolle,

terminés par des anthères droites, ovales, à deux loges.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style filiforme, presque aussi long que la corolle, terminé par un stigmate obtus, en forme de tête.

Le fruit est une baie globuleuse, à une seule loge, enveloppée à sa partie inférieure, jusqu'à vers son milieu, par le calice persistant, contenant plusieurs semences comprimées, réniformes, renfermées dans autant de cellules éparées & distinctes, insérées sur un réceptacle charnu & globuleux.

*Observations.* Ce genre, établi par MM. Ruiz & Pavon en l'honneur du R. P. Isidore Saracha, bénédictin, botaniste très-zélé, diffère des *physalis* par le limbe de sa corolle en roue, par les étamines droites, par ses baies multiloculaires, enveloppées à leur base par le calice; il diffère des *atropa* par le calice à cinq découpures, par les divisions de la corolle, égales & réfléchies; par les étamines, les fruits & les semences.

Le *scopolia carnidica* de Jacquin (*Observ. bot. part. 1. pag. 32. tab. 20.*) parait avoir une très-grande affinité avec ce genre.

#### E S P È C E S.

1. **SARAQUIER ponctuée.** *Saracha punctata*. Ruiz & Pav.

*Saracha foliis ovato-oblongis, solitariis; corollis punctatis.* Ruiz & Pav. *Flor. peruv. vol. 2. pag. 42. tab. 178. fig. B.*

Plante un peu ligneuse, dont les tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, rameuses, cylindriques, de couleur brune; les rameaux alternes, un peu anguleux & pulvérulents dans leur jeunesse, garnis de feuilles sternes, éparées, pétiolées, ovales, oblongues, très-entières, glabres à leur face supérieure, veinées & pulvérulentes en dessous, aiguës à leur sommet.

Les fleurs naissent à l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, réunies plusieurs ensemble, dont les pédoncules simples, agités, uniflores, inégaux, pendans, un peu plus longs que la corolle. Les calices sont glabres, divisés en cinq découpures ovales, un peu arrondies, obtuses; la corolle très-grande, campanulée, pulvérulente en dehors, ouverte à son limbe, dont les découpures sont obtuses, réfléchies, d'un pourpro-jaunâtre, marquées de petites taches purpurines; les étamines insérées à la base du tube de la corolle.

Cette plante croît au Pérou, sur les hautes montagnes. x (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

Ses feuilles ont une saveur très-amère; elles passent pour anodines, émoullientes, dépuratoires.

2. **SARAQUIER**

2. SARAQUIER à deux fleurs. *Saracha biflora*. Ruiz & Pav.

*Saracha foliis ovatis, subgeminis; pedunculis bifloris*. Ruiz & Pav. vol. 2. pag. 42. tab. 179. fig. A.

Vulgairement, au Pérou, lomatiño cimarron ou pommes d'or.

Ses tiges sont droites, cylindriques, rameuses, pubescentes, hautes d'environ deux pieds, divisées en rameaux alternes, anguleux, pubescents, garnis de feuilles pétioles, alternes, presque géminées, ovales, aiguës, très-entières, retrécies à leur base & décurrentes sur leur pétiole.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, & soutenues par des pédoncules latéraux, foliaires, trifides à leur sommet, terminés par deux, rarement trois fleurs pendantes, dont la corolle est campanulée, d'un vert-jaunâtre, ouverte à son limbe, qui le divise en cinq découpures aiguës, veinées. Les étamines sont droites, une fois plus longues que la corolle. Le fruit est une petite baie, de la grosseur d'un pois, arrondie, un peu comprimée, blanchâtre.

Cette plante croît dans les champs, au Pérou, parmi les moissons & les haies; elle fleurit dans les mois de novembre & de décembre. On la cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid. (Description ex Ruiz & Pav.)

Ses feuilles, broyées & mêlées avec de la graisse de porc, passent pour émoullientes & anodines.

3. SARAQUIER à pédoncules tors. *Saracha contorta*. Ruiz & Pav.

*Saracha foliis ovatis, angulato-dentatis integrisque; pedunculis multifloris, umbellatis*. Ruiz & Pav. t. lor. peruv. vol. 2. pag. 43. tab. 180. fig. A.

C'est une plante herbacée, annuelle, dont les racines sont blanchâtres, très-fibreuses; les tiges droites, hautes de trois à quatre pieds, cannelées, à cinq angles, presque fistuleuses, glabres, rameuses, d'un violet-livide à leur partie inférieure, divisées en rameaux alternes, dichotomes, frisés, anguleux, pubescents, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, les inférieures foliaires, un peu anguleuses & dentées; les supérieures géminées, l'une plus petite que l'autre, inégales à leur base, très-entières à leur contour, obliques, aiguës à leur sommet, pubescentes à leurs deux faces, un peu decurrentes sur leur pétiole, qui est à demi-cylindrique, trois fois plus court que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en une sorte d'ombelle penlante, situées dans la bifurcation des rameaux & dans les aisselles des feuilles supérieures. Leur pédoncule commun est foliaire, filoné, tors ou en spirale, terminé par six ou par dix fleurs inclinées,

Botanique, Tome VI.

dont les pédoncules propres sont frisés, en spirale, uniflores. La corolle est d'un blanc jaunâtre, assez grande, campanulée, très-ouverte, & divisée à son limbe en cinq lobes aigus; les étamines sont velues à la base de leurs filamens; les fruits sont des baies noires, globuleuses, de la grosseur d'un pois.

Cette espèce croît au Pérou, sur les lieux élevés, depuis le bourg de Canta jusqu'à Ooragillo. On la cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid; elle fleurit toute l'année. (Description ex Ruiz & Pav.)

Ses feuilles passent pour émoullientes & anodines.

4. SARAQUIER couché. *Saracha procumbens*. Ruiz & Pav.

*Saracha foliis geminis, ovatis, integerrimis; pedunculis subquadrisloris, umbellatis*. Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 2. pag. 43. tab. 180. fig. B.

*Atropa (procumbens), caule herbaceo, procumbente; foliis geminis, inaequalibus, ovatis, glabris; floribus umbellatis*. Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 53. n°. 80. tab. 72.

Ses tiges sont couchées, herbacées, longues de trois pieds environ, très-rameuses, dichotomes, filonées, fistuleuses, pubescentes, anguleuses, & dont les rameaux sont alternes, semblables aux tiges, garnis de feuilles pétioles, geminées, l'une plus courte que l'autre; quelquefois foliaires, ovales, ouvertes, un peu ondulées à leurs bords, très-veinées, decurrentes sur leur pétiole; les plus jeunes luisantes en dessus, velues en dessous, à leurs bords & sur leur principale nervure.

Les fleurs sont disposées en ombelle à l'extrémité d'un pédoncule commun. Ce pédoncule est axillaire, foliaire, velu, à frises en spirale, terminé par deux, trois ou quatre fleurs, dont les pédoncules propres sont simples, velus, étalés pendant la floraison, plus rapprochés & pendans à l'époque de la maturité des fruits. Les calices sont velus, très-ouverts, tant dans les fleurs que dans les fruits, à cinq angles. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, d'abord ovale, plissée; ensuite campanulée, très-ouverte, en roue à son limbe, verdâtre à son centre, pubescente à ses bords. Les filamens sont droits, égaux, insérés à la base du tube; les baies glabres, luisantes, veinées, de la grosseur d'un pois, contenant des semences lenticulaires, un peu échanquées à leur base.

Cette plante croît au Pérou, dans la province de Canta, proche le bourg de Saint-Bonaventures; elle fleurit dans les mois de janvier & de février. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

5. SARAQUIER denté. *Saracha dentata*. Ruiz & Pav.

YYY

*Saracha foliis geminis, ovatis, integris dentatisque; pedunculis subquadris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 2. pag. 43. tab. 179. fig. B.*

Cette espèce a des racines fusiformes, blanchâtres, fibreuses, d'où sort une tige très-rameuse, herbacée, pubescente, annuelle, divisée presque dès la base en rameaux nombreux, alternes, diffus, couchés, foibles, anguleux, dichotomes, pubescents, longs d'un demi-pied, garnis de feuilles geminées, médiocrement pétioles, l'une plus petite que l'autre; ovales, petites ou oblongues, lancéolées; les unes très-entières, d'autres dentées ou sinuées, un peu aiguës ou obtus à leur sommet, rétrécies à leur base en un pétiole court.

Les fleurs sont disposées en ombelles; les unes terminales, d'autres latérales, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, inclinées, & dont le pédoncule commun est solitaire, filiforme, divisé à son sommet en trois ou quatre pédicelles propres, uniflores, inégaux, courts, pubescents. La corolle est campanulée, d'un blanc-violet, mince, velue à ses deux faces, marquée dans son centre de dix points verdâtres, divisée à son limbe en cinq découpures aiguës, ouvertes en roue. Les baies sont d'un jaune de safran, de la grosseur d'un petit pois; les semences un peu ridées.

Cette plante croît au Pérou, dans les décombres; elle fleurit aux mois de janvier & de février. (Dissect. ex Ruiz & Pav.)

Ses feuilles, cuites dans de la graisse de porc, & appliquées en cataplasme, sont employées pour amollir les tumeurs & en apaiser la douleur.

**SARCOCOLIER.** *Penna.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, campanulées, dont la famille naturelle n'est pas encore bien déterminée, qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, dont quelques-uns sont résineux, munis de feuilles opposées, sessiles, presque imbriquées; les supérieures & terminales en forme d'écaillés, colorées; les flus sont terminales, sessiles, solitaires ou fasciculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux folioles; une corolle campanulée, à quatre divisions; quatre étamines; un stigmate à quatre lobes, une capsule à quatre loges; deux semences dans chaque loge.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à deux folioles opposées, ovales, lancéolées, concaves, égales, caduques, plus courts que la corolle, semblables à des bractées.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, presque infundibuliforme, une fois plus longue que le

calice, dont le limbe est ouvert, plus court que le tube, divisé en quatre découpures aiguës.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont subulés, très-courts, droits, insérés sur le tube de la corolle, alternes avec les divisions du limbe, terminés par des anthères droites, en cœur.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, tétragon, surmonté d'un style filiforme, tétragon, un peu membraneux sur les angles, terminé par un stigmate capité, divisé en quatre lobes en croix.

Le fruit est une capsule tétragon, surmontée du style persistant, à quatre loges, à quatre valves, deux semences obtuses, oblongues, renfermées dans chaque valve; point de réceptacle central.

*Observations.* La plupart des plantes qui composent ce genre, ont beaucoup de rapports par leur facies avec les *Alaria* & avec plusieurs espèces de *Myrtées*; elles en diffèrent beaucoup par les parties de la fructification. Leur fruit approche de celui des *acanthées*; mais dans cette dernière famille, les capsules n'ont que deux loges. Ces considérations & plusieurs autres n'ont pas encore permis de fixer la place que les *Sarcocoliers* doivent occuper dans l'ordre des familles naturelles. Ils forment un genre assez naturel, composé d'arbrisseaux peu élevés, qui produisent la plupart une suc gommeux résineux.

#### ESPÈCES.

1. **SARCOCOLIER résineux.** *Penna sarcocolia.* Linn.

*Penna foliis ovatis, quadrifariam imbricatis; calicibus glutinosi, ciliatis, folio majoribus.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 316. n°. 1576. tab. 78. fig. 2.

*Penna foliis ovatis, planis; calicibus ciliatis, folio majoribus.* Linn. Syst. veget. pag. 154. — Mart. medic. 5t. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 626. n°. 1.

*Tithymali myrsinites specie; arbuscula aethiopica, subrotundis foliis, fasciculis arabica squamato capitulo duro, lacrymam fundens.* Pluken. Mantiss. pag. 183. tab. 446. fig. 6.

Perit arbrisseau, d'un aspect agréable, qui ne s'élève guère qu'à la hauteur d'un à deux pieds au plus, dont les tiges sont droites, les rameaux alternes, les supérieurs presque dichotomes, garnis de feuilles nombreuses, sessiles, opposées, perites, disposées sur quatre rangs, imbriquées, recouvrant les tiges dans toute leur longueur, de forme ovale, courtes, un peu arrondies, planes, presque obtuses à leur sommet, ou médiocrement aiguës, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont terminales, sessiles, réunies plusieurs ensemble à l'extrémité de chaque rameau. Les calices sont composés de deux folioles qui se confondent tellement avec les dernières feuilles, qu'elles paroissent imbriquées; mais elles sont plus grandes, glutineuses & ciliées. Les divisions de la corolle, plus longues que le calice, sont linéaires, obtuses, réfléchies. Le style est bien plus fort que le tube de la corolle.

Cette plante croît dans l'Éthiopie & au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

Il découle particulièrement des calices de cette plante un suc gommeux-résineux que l'on nomme *Jarcocolle* ou *colle-chair*, composé de grumeaux fort petits, friables, un peu spongieux, de couleur blanche ou jaunâtre, quelquefois brillante; d'une saveur acre, un peu amère, ensuite douceâtre, fade & peu agréable. Quelquefois ces grains sont pilonnés, puis ensemble par un duvet filamenteux, comme des graines de pavot qu'on auroit frottées avec quelques particules de toile d'araignée, qui sont peut-être les cils des calices.

La Jarcocolle est très-fragile sous les dents, & se dissout dans l'eau. Lorsqu'on l'approche de la flamme d'une bougie, elle bouillonne d'abord, & ensuite brûle avec éclat. On nous apporte cette substance de la Perse & de l'Arabie heureuse. Les auteurs ne sont point très-d'accord entr'eux sur ses vertus. Sérapion dit qu'elle ulcère les intestins, & qu'elle rend chauve. Hoffman en condamne l'usage interne, tandis que les médecins arabes vantent ses vertus purgatives. D'autres recommandent la Jarcocolle macérée dans du lait d'ânesse ou de femme pour l'ophthalmie ou les fluxions des yeux, qu'elle adoucit en tempérant l'acrimonie des larmes; de plus, elle detache les plaies, les consolide & les cicatrise. C'est de là que lui est venu son nom de *Jarcocolle* ou *colle-chair*; elle est, au reste, fort peu usitée.

2. *SARCOCOLIA mucronata*. *Penae mucronata*. Linn.

*Penae foliis cordatis, acuminatis; floribus ad apices ramulorum congestis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 316. n°. 1577. — Meerb. tab. 51. fig. 3.

*Penae foliis cordatis, acuminatis*. Linn. Syst. Plant. pag. 154. n°. 2. — Mater. med. 48.

*Penae floribus terminalibus; foliis acuminatis, glabris*. Thunb. Prodr. 30. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 626. n°. 2.

*Penae foliis ovatis, acuminatis*. Royen, Lugd. Bat. 399. — Hort. Cliffort. 37.

*Penae (mucronata), foliis cordatis, acuminatis, quadrifariam serratis; floribus acutiusculis*,

*bracteis rhomboidatis ciliatis, stylis tetragonis*. Berg. Plant. Cap. pag. 37. n°. 3.

*Erica africana, unedunt flore amplo; foliis cordiformibus, in acumen desinensibus*. Rai, Dend. 97.

*Tithymali myrsinites speciei, arborescentis aethiopicae, flore parvo, et latè basi in acumen mucronem subitè desinente; capitulis erigatis*. Pluk. Mant. 183.

Cette plante, assez semblable à la précédente, s'en distingue par ses feuilles en cœur & fortement mucronées à leur sommet, & par ses calices glabres & non ciliés.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes d'environ un pied, glabres, de couleur cendrée, chargées de cicatrices par la chute des feuilles, divines en rameaux diffus, presque verticillés, garnis de feuilles nombreuses, opposées, sessiles, ovales, presque en cœur, concaves ou presque en capuchon, glabres à leurs deux faces, coriaces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, très-rapprochées, longues d'environ deux à trois lignes, disposées sur quatre rangs.

Les fleurs sont ramassées aux sommets des rameaux en fascicules sessiles, environnées par les feuilles supérieures un peu colorées, en forme de bractées; le calice est glabre, composé de deux folioles linéaires, concaves, aiguës, fort petites. La corolle est trois fois plus grande que le calice, presque infundibuliforme, divisée à son limbe en quatre découpures droites, ovales, aiguës, beaucoup plus courtes que le tube. Les anthères sont comprimées, orbiculaires; l'ovaire tétragon, ovale; le stigmate à quatre lobes arrondis.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance & au Sénégal. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

3. *SARCOCOLIA* à feuilles de myrte. *Penae myrtoides*. Linn. f.

*Penae foliis lanceolatis*. Linn. f. Suppl. pag. 122. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 628. n°. 9.

*Penae (myrtillodes), floribus terminalibus, foliis lanceolatis*. Thunb. Prodr. 30.

Ses rameaux sont droits, cylindriques, rougeâtres, garnis de feuilles opposées, sessiles, nombreuses, très-rapprochées, imbriquées, lancéolées, assez semblables à celles du *myrtus tarentina*, lisses à leurs deux faces, à peine nerveuses en dessous, entières à leurs bords.

Les fleurs sont terminales, presque solitaires, environnées de bractées ou de feuilles florales, verdâtres, aiguës, sous lesquelles se trouvent deux autres petites folioles. Les calices sont verdâtres, aiguës, point colorés.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. (V. f.)

4. SARCOCOLIER écailléux. *Penaa squamosa*. Linn.

*Penaa foliis rhombeo-cuneiformibus, carnosis*. Linn. Syst. veget. pag. 154. n°. 5. — Mantiff. pag. 331. — Lam. III. Gen. vol. r. pag. 317. n°. 1580. — Aiton, Hort. Kew. Add. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 648. n°. 7.

*Penaa floribus terminalibus; foliis rhombeo-cuneiformibus, glabris*. Thunb. Prodr. 30.

*Penaa* (tetragona), *foliis quadrifariam imbricatis-patentibus; tabis florum longis; foliolis calicinis obovatis, ciliatis*. Berg. Plant. Cap. pag. 36. ?

*Gentiana athiopica, geniculata, caule perfoliata; foliis acuminatis, crassius, parvis ritu veluti squamis densissime tecto, summa parte floribus puncticis*. Pluk. Mantiff. 89. — Rai, Suppl. 370. ?

Cette plante me paroît être la même espèce que celle qui se trouve dans Bergius, sous le nom de *penaa tetragona*, peut-être avec quelques différences qui en font une variété.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ un pied, rameuses; les rameaux presque verticillés, hérissés de cicatrices par la chute des feuilles, presque tétragones, garnis de feuilles opposées, sessiles, très-rapprochées, imbriquées, disposées sur quatre rangs, épaisses, presque charnues, ovales, un peu rhomboidales, rétrécies en coin à leur base, médiocrement aiguës, un peu glanduleuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, marquées dans leur milieu d'une ligne longitudinale.

Les fleurs sont sessiles, agrégées aux sommités des rameaux, les dernières feuilles forment des bractées écaillées, disposées en épis, une fois plus larges que les autres feuilles, ciliées à leurs bords, glutineuses & résineuses. Le calice est à deux folioles ovales, un peu inégales, assez semblables pour le reste aux bractées; la corolle est beaucoup plus grande que les folioles calicinales, à quatre découpures ovales, souvent réfléchies.

Cet arbrisseau croît au Cap de Bonne-Espérance & dans l'Ethiopie. *h* (*V. f. in herb. Juss.*)

5. SARCOCOLIER fruticuleux. *Penaa frutescens*. Linn. f.

*Penaa foliis oblongiusculis, obtusis; bracteis orbiculatis, acutis*. Linn. f. Suppl. pag. 121. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 628. n°. 8.

*Penaa floribus terminalibus; foliis ovatis, glabris; bracteis obovatis*. Thunb. Prodr. pag. 30.

Perit arbrisseau, dont les tiges sont cylindriques lorsqu'elles sont dépouillées de leur écorce, divisées en rameaux de même forme, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, ova-

les, un peu oblongues, épaisses, sans nervures, entières à leurs bords, un peu obtusés à leur sommet, moins rapprochées que dans les autres espèces, glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont presque solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, médiocrement pédonculées, enveloppées à leur base par des feuilles florales ou bractées fort petites, rhomboidales, orbiculaires ou un peu aiguës. La corolle est partagée à son orifice en quatre découpures presque aiguës.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *h*

6. SARCOCOLIER brun. *Penaa fusca*. Linn.

*Penaa foliis rhombeo-ovatis; bracteis cuneatis, acutis, coloratis*. Linn. Syst. veget. pag. 154. n°. 4. — Mantiff. 199. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 317. n°. 1579. tab. 78. fig. 1.

*Penaa floribus terminalibus, foliis rhombeo-ovatis, bracteis coloratis*. Thunb. Prodr. pag. 30.

*Penaa* (sarcocolla), *foliis oppositis, rhombeis, acutis, planis, subpetiolatis, patentibus; foliolis calicinis linearibus*. Berg. Plant. Cap. pag. 35.

Arbrisseau peu élevé, dont les tiges sont très-rameuses, cylindriques, de couleur cendrée; les jeunes rameaux anguleux, glabres, dichotomes, garnis de feuilles ovales, presque rhomboidales, opposées, étalées, légèrement pétioles, sessiles à leurs deux faces, rétrécies à leur base, aiguës à leur sommet, entières à leurs bords, fermes, épaisses, longues d'environ trois lignes, planes, plus longues que les entre-nœuds.

Les fleurs sont presque fasciculées, rapprochées à l'extrémité de chaque rameau, légèrement pédonculées. Leur calice consiste en deux perites folioles linéaires, caduques, enveloppées par quelques feuilles bractéiformes, colorées. La corolle est purpurine, monopétale, infundibuliforme; le tube cylindrique, presque campanulé, verdâtre, presque anguleux; le limbe de couleur purpurine, à quatre découpures un peu ouvertes, courtes, ovales, obtuses, un peu repliées à leurs bords. Les filaments sont très-courts, fixés à l'orifice du tube; les anthères un peu arrondies, pyramidales; l'ovaire oblong, surmonté d'un style bulbé, de la longueur des éramines, terminé par un stigmate plane, à quatre lobes.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, aux lieux montagneux. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

7. SARCOCOLIER à fleurs latérales. *Penaa lateriflora*. Linn.

*Penaa foliis ovatis, floribus lateralibus, sessilibus*. Linn. f. Suppl. pag. 122. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 627. n°. 4.

*Pennis floribus lateralibus, foliis ovatis, glabris.*  
Thunb. Prodr. pag. 30.

Cette espèce a de tels rapports avec la *pennis marginata*, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une variété; elle en diffère cependant par ses fleurs jaunes & par ses feuilles ovales & non en cœur.

Ses tiges sont droites, rougeâtres, divisées en rameaux allongés, garnis de feuilles sessiles, opposées, parfaitement ovales, lisses à leurs deux faces, point bordées & très-entières à leur contour, un peu aiguës à leur sommet, légèrement carénées à leur base, plus longues que les entrenœuds.

Les fleurs sont latérales, sessiles, de couleur jaune, situées dans l'aisselle des feuilles & de même longueur. Leur calice est jaunâtre, scarieux, à quatre folioles. La corolle se divise en quatre découpures lancéolées, presque triangulaires ou carénées sur leur dos. Les filaments sont nuls ou adhérents, dans toute leur longueur, avec la corolle; les anthères sessiles, situées à l'orifice du tube; le stigmate obtus, à quatre faces.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*Descript. ex Linn. f.*)

#### 8. SARCOCOLIER camélé. *Pennis encorum.*

*Pennis foliis linearilanceolatis, laxiusculis; floribus congesto-capitatis, bracteis foliis minoribus.*  
Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 317. n°. 1581.

*Pennis foliis lanceolatis, acutis.* Meerb. tab. 51. fig. 2.

Cette espèce a des tiges ligneuses, glabres, cylindriques, de couleur brune ou cendrée, munies de rameaux épars ou un peu fasciculés, droits, élançés, presque quadrangulaires, rapprochés des tiges, garnis de feuilles sessiles, opposées, étroites, lancéolées, longues d'un pouce & plus, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, glabres à leurs deux faces, fermes, coriaces, plus longues que les entrenœuds, lâches ou un peu écartées des tiges.

Les fleurs sont réunies, en paquets fasciculés, à l'extrémité des tiges & des rameaux, presque capités; garnis de bractées beaucoup plus courtes que les feuilles. La corolle est petite, un peu plus longue que le calice, de couleur purpurine, dont le limbe est partagé en quatre lobes obtus.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

#### 9. SARCOCOLIER marginé. *Pennis marginata.* Linn. f.

*Pennis foliis cordatis, marginatis; floribus lateralibus.* Linn. Syst. veget. pag. 154. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 316. n°. 1578.

Arbrisseau dont les tiges sont roides; les rameaux ordinairement rapprochés au nombre de trois, garnis de feuilles opposées ou ternées, presque sessiles, en cœur, légèrement obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces, luisantes, un peu repliées & bordées à leur contour, de la grandeur de celles du buis. Les fleurs sont blanchâtres, latérales, presque sessiles, situées entre les feuilles & de même longueur.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, sur le bord des fleuves. *h* (*Descript. ex Linn.*)

#### 10. SARCOCOLIER à longues fleurs. *Pennis longiflora.* Meerb.

*Pennis foliis rhomboideis, acutis; floribus quadrifidis, purpureis; tubo longissimo.* Meerb. tab. 51. fig. 1. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 317.

Arbrisseau dont les rameaux sont alternes, un peu épars, presque simples, garnis de feuilles sessiles, opposées, ovales ou presque rhomboïdales, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, assez larges, longues de trois à quatre lignes, ouvertes ou écartées des tiges.

Les fleurs sont presque fasciculées à l'extrémité des rameaux; les dernières feuilles présentent des bractées imbriquées, assez semblables aux autres feuilles. Les calices sont courts; la corolle purpurine, munie d'un tube remarquable par sa longueur, trois & quatre fois plus long que le calice, un peu renflé vers son milieu; le limbe divisé en quatre lobes ovales, aigus, presque mucronés, au moins deux fois plus court que le tube.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*Descript. ex Icone Meerb.*)

#### 11. SARCOCOLIER à feuilles luisantes. *Pennis nitida.* Lour.

*Pennis foliis oblongis, congestis, nitidis; racemis terminalibus.* Lour. Flor. cochin. pag. 91.

Ses tiges sont ligneuses, droites, hautes d'environ quatre pieds, rameuses, garnies de feuilles ovales, oblongues, très-entières, luisantes, très-rapprochées, planes, rebéchies à leurs bords. Les fleurs sont terminales, presque en forme de grappes lâches. Leur calice est à deux folioles droites, rougeâtres, luisantes, oblongues. Leur corolle est campanulée, à quatre divisions filiformes. L'ovaire est supérieur, ovale; le style latéral; la capsule ovale, à plusieurs semences.

Cette plante croît dans les campagnes à la Cochinchine. (*Descript. ex Lour.*)

#### 12. SARCOCOLIER grimpant. *Pennis scandens.* Lour.

*Penas caule scandente, foliis cordatis, pedunculis trifloris.* Lour. Flor. cochin. pag. 92.

Ses tiges sont ligneuses, grimpantes, divisées en rameaux garnis de feuilles larges, en cœur, acuminées, très entières. Les fleurs sont axillaires, supportées par un long pédoncule terminé par deux fleurs. Le calice est grand, à cinq découpures persistantes. La corolle est de couleur jaune, campanulée, plissée, inférieure, à quatre divisions. Le fruit est une capsule à quatre loges, contenant plusieurs semences.

Cette plante croît à la Cochinchine. (*Descript. ex Willden.*)

*Observations.* Cette plante, ainsi que la *penas nitida*, n'ont été mentionnées ici que pour y appeler l'attention des botanistes qui pourroient les observer. Elles s'éloignent évidemment des sarcocodiers dans plusieurs de leurs parties, dans leur port; mais leur fructification n'est pas assez connue pour déterminer le genre auquel elles pourroient appartenir.

**SARCOPHYLLE.** *Sarcophyllum.* Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptales, irrégulières, de la famille des légumineuses, qui paroît avoir des rapports avec les *aspalathus*, & qui ne renferme qu'une seule espèce exotique à l'Europe, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice campanulé, à cinq découpures régulières; une gouffe en forme de sabre, aiguë.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice charnu, d'une seule pièce, campanulé, glabre, à cinq découpures droites, égales, ovales, obtuses, roulées à leurs bords.

2°. Une corolle papilionacée, dont l'étendard est en ovale renversé, trois fois plus long que le calice; les ailes lancéolées, presque naviculaires, un peu plus courtes que l'étendard; la carène de même grandeur que l'étendard, de forme naviculaire.

3°. Dix étamines diadelphes, de la longueur de la corolle, & dont les anthères sont petites, oblongues, tombantes.

4°. L'ovaire est glabre, supérieur, surmonté d'un seul style.

Le fruit est une gouffe oblongue, en forme de sabre, souvent très-aminée, & longue d'un demi-pouce.

#### E S P È C E.

**SARCOPHYLLE charnu.** *Sarcophyllum carnosum.* Thunb.

*Sarcophyllum foliis ternato-subfasciculatis, carnosus; floribus terminalibus, solitariis.* (N.)

*Sarcophyllum carnosum.* Thunb. Nov. Gen. pag. 135. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 668.

C'est un arbrisseau peu élevé, dont les tiges sont droites, glabres, très-rameuses, hautes d'un pied & plus; les branches & les rameaux épars, diffus, droits ou un peu courbés, élançés, cylindriques, légèrement fléxis, revêtus d'une écorce cendrée, garnis de feuilles sessiles, ternées ou presque fasciculées, charnues, linéaires, aiguës, entières, glabres à leurs deux faces, un peu ridées, longues d'un pouce, ouvertes & un peu recourbées. Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, droites, réfléchies après la floraison.

Cette plante croît sur les montagnes du Cap de Bonne-Espérance, où elle fleurit dans le mois de mars. h (*Descript. ex Thunb.*)

**SARGASSO.** *Acorus marinus.* Rumph. Amboin. vol. 6. pag. 191. tab. 75. fig. 2.

Il est à regretter que nous n'ayons pas, sur cette singulière plante, des détails suffisants qui nous la fassent mieux connoître.

Elle croît dans presque toutes les rivières de l'Inde, & ressemble assez, par son port, au *valisneria*. Ses racines (sont très-longues, fibreuses, rampantes, Stolonières; les feuilles allongées, assez semblables à celles des graminées, simples, entières, longues de deux ou trois pieds, molles, glabres, larges d'environ un pouce au plus, très-souvent recouvertes par les eaux, toutes radicales.

Il s'élève de leur base plusieurs hampes simples, nues, un peu roulées en spirale, glabres, cylindriques, chacune d'elles soutenant à son sommet un seul fruit d'une couleur verdâtre, ovale, aigu, formé extérieurement de six côtes muries de pointes courtes, épineuses, inégales, comme celles des châtaignes; Il renferme huit ou neuf osselets de forme pyramidale, environnés d'une substance gluante & visqueuse. Ce fruit est terminé, à son sommet, par deux pointes recourbées en dehors.

Ces sortes de fruits sont bons à manger, non-seulement crus, mais mieux encore lorsqu'ils sont cuits sous la cendre ou dans l'eau. Il faut en rejeter la substance visqueuse, qui est un peu amère. Les noix ont le goût des châtaignes. Les naturels retirent des feuilles des fils excellents, avec lesquels ils fabriquent leurs filets, & qui ont la propriété d'être presque incorruptibles dans l'eau.

Cette plante se trouve à l'île d'Amboine, aux Moluques, à Java & dans plusieurs autres contrées des Indes; elle se plaît dans les fonds sa-



blancs & pierreux, & garni au loin le bord des rivières.

#### SARMENTEUSE (Tige). *Sarmentofus caulis*.

Les tiges prennent le nom de sarmenteuses lorsqu'étant longues, mais très-foibles, elles se traînent sur la terre sans s'y attacher par des racines, ou bien grimpent sur les corps voisins qui s'offrent pour les soutenir. Cette direction particulière a lieu dans les tiges ligneuses, comme dans les tiges herbacées : celles de la vigne & de la betoine en fournissent un exemple.

#### SARMIANTE rampante. *Sarmienta repens*.

*Sarmienta foliis ovatis, carnosis, utrinque punctatis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 8. tab. 7. fig. B, & Flor. peruv. Prodr. pag. 3.

*Sarmienta foliis oppositis, ovatis, carnosis; floribus terminalibus; caule sarmentoso, parafitico*. (N.)

*Sarmienta repens*. Vahl, Spec. Plant. vol. 1. pag. 103.

*Utricularia foliis carnosis, scandens*. Feuill. Oberv. vol. 3. pag. 69. tab. 43.

C'est une plante parasite, grimpante, sarmenteuse, dont les tiges sont cylindriques, très-rameuses, rampantes; les rameaux pendans, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, ovales, charnues, sans nervures, entières à leurs bords, aiguës ou un peu acuminées à leur sommet, vertes en dessus, blanchâtres à leur face inférieure, ponctuées des deux côtés.

Cette plante constitue seule un genre particulier, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice à cinq divisions inégales; une corolle tubulée, renflée à sa partie supérieure, à cinq découpures; cinq filamens, trois stériles, deux fertiles; un seul style; une capsule à une loge qui s'ouvre transversalement.

#### Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, d'une seule pièce, à cinq découpures, dont quatre subulées, une cinquième plus large, échancrée.

2°. Une corolle urcéolée, dont le tube est ovale, oblong, ventru, très-étroit à sa base, rétréci à son orifice; le limbe divisé en cinq découpures ovales, égales, ouvertes.

3°. Deux étamines, dont les filamens sont saillans hors de la corolle, attachés à son orifice, filiformes, terminés par des anthères ovales, à deux loges; trois autres filamens stériles, subulés, insérés également à l'orifice de la corolle, plus courts que le limbe, l'un d'eux plus petit, situé entre les deux étamines fertiles.

4°. Un ovaire ovale, presque à cinq faces, supérieur, surmonté d'un style subulé, persistant, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule ovale, à une seule loge, qui s'ouvre transversalement, & qui renferme plusieurs semences ovales, attachées à un réceptacle charnu.

Les fleurs sont terminales, supportées par un pédoncule long, presque simple, uniflore, ou divisé à son sommet en deux pédicules courts, biflores. Les calices sont velus, munis à leur base de deux bractées oblongues, un peu charnues. La corolle est d'un rouge écarlate, pubescente en dehors.

Cette plante est très-commune au Chili, où elle croît dans les forêts, & fleurit vers la fin de l'hiver.

Les naturels du pays emploient ses feuilles pour amollir & extirper les cors & les callosités.

**SAROTHRE.** *Sarothra*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des caryophyllées, qui a des rapports avec les *drypis*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, petites, très-rameuses, munies de feuilles fort petites, opposées; de fleurs axillaires, solitaires, sessiles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq divisions; cinq pétales linéaires; cinq étamines; trois styles; une capsule à une loge, à trois valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, profondément divisé en cinq découpures linéaires, aiguës, droites, persistantes.

2°. Une corolle composée de cinq pétales linéaires, lancéolés, obtus, étendus, caducs, un peu plus longs que le calice.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont filiformes, de la longueur de la corolle, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire ovale, surmonté de trois styles filiformes aussi longs que l'ovaire, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule oblongue, aiguë, colorée, à une seule loge, à trois valves, contenant plusieurs semences fort petites, ovales, réticulées, attachées aux valves de la capsule par un cordon ombilical.

**SAROTHRÉ** à petites feuilles. *Sarothra gentianoides*. Linn.

*Sarothra foliis minimis, caulis ramosissimis*. (N.)

*Sarothra*. Linn. Syst. Plaut. pag. 599. — Amoen. Academ. vol. 3. pag. 11. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 115. — Kalm. Iter 2. pag. 253. — Lam. Illust. Gener. tab. 215.

*Gentiana caule ramifera ramosissimis; foliis subulatis, minimis*. Gronov. Virg. 29.

*Centaurium minus, spicatum, angustifolium folio, seu scoparium, marilandicum, novum*. Pluken. Mantill. pag. 43. tab. 342. fig. 2.

C'est une fort petite plante, haute de cinq à six pouces, dont les racines sont grêles, rameuses, fibreuses; les tiges droites, glabres, cylindriques, très rameuses presque dès leur base; les rameaux diffus, grêles, la plupart presque trichotomes, garnis de feuilles très-petites; les unes, celles des tiges, linéaires, aiguës; les autres, celles des rameaux, une fois plus courtes, à peine longues d'une ligne, presque orbiculaires, sessiles, opposées, entières, glabres à leurs deux faces, appliquées contre les tiges ou médiocrement écartées, distantes.

Les fleurs sont terminales, solitaires ou axillaires, sessiles, petites. Leur calice est court, presque une fois plus petit que la corolle, à cinq découpures profondes. La corolle très-caduque, composée de cinq pétales droits, linéaires, un peu aigus. Les capules sont composées de trois valves, mais à une seule loge, renfermant des semences petites, ovales, attachées au bord intérieur des valves par un cordon ombilical.

Cette plante croît dans les lieux arides, marneux de la Virginie & de la Pensilvanie. Elle m'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline. (V. f.)

**SARPALO.** *Bruzanelli. Sarpalo*. Rheed, Hort. Malab. vol. 5. pag. 83. tab. 42.

Bel arbre du Malabar, qu'il paroît devoir être rangé parmi les *grewia*, d'après la description & la figure que Rheed nous en a données, quoiqu'il borne à quatre le nombre des étamines.

Cet arbre s'élève à peu près à la hauteur de nos pommiers, & se divise en branches & en rameaux très-étalés. Son bois est tendre, blanc, revêtu d'une écorce cendrée, d'une odeur forte. Les feuilles sont alternes, pétiolées, grandes, oblongues, presque elliptiques; les unes un peu arrondies, d'autres acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, entières à leur contour, d'un vert foncé en dessus, beaucoup plus pâles en dessous,

marquées de nervures latérales, simples, alternes, un peu confluentes vers les bords; les pétioles courts, épais.

Les fleurs sont petites, purpurines, odorantes, disposées, à l'extrémité des rameaux, en grappes simples, droites, allongées, rangées alternativement, & soutenues par des pédoncules propres, simples, courts, uniflores. Leur calice est fort petit, d'un pourpre-verdâtre; la corolle à quatre pétales aigus, très-ouverts, réfléchis; autant d'étamines, dont les filaments sont terminés par des anthères purpurines. Le style est droit, épais, allongé. Les fruits sont des baies à deux ou trois coques, de couleur verdâtre, contenant deux ou trois noyaux d'un blanc-cendré.

Cet arbre croît sur les montagnes, parmi les forêts dans le Malabar, où il fleurit dans l'été, & donne ses fruits au commencement de l'hiver. 3

**SARRACÈNE.** *Sarracenia*. Genre de plantes à fleurs complètes, polypétales, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui approche des pavots par son stigmate & le nombre, ainsi que la situation des étamines; d'un autre côté, voisin des nénufars par ses capules à plusieurs loges, qui a des rapports avec les *nepenthes* par le caractère de ses feuilles tubulées. Il comprend des herbes marécageuses, exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont radicales, vaginales à leur base, renflées en tube, souvent remplies d'eau, ouvertes à leur orifice, & surmontées d'un appendice en forme d'opercule. Leurs fleurs sont grandes, solitaires, supportées par une hampe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice double, caduc; l'extérieur à trois folioles; l'intérieur plus grand, à cinq folioles colorées; cinq pétales; des étamines nombreuses, attachées sur le réceptacle; un ovaire supérieur; un style très-court; un stigmate petit; une capsule à cinq loges, à cinq valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double, inférieur; l'extérieur à trois folioles fort petites, ovales, caduques; l'intérieur ample, beaucoup plus grand, à cinq grandes folioles colorées, ovales, caduques.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, très-grands, arrondis & recourbés intérieurement à leur sommet, alternes avec les divisions du calice intérieur, insérés sur le réceptacle, munis d'onglets droits, ovales, oblongs, tronqués à leur base.

3°. Des étamines nombreuses, dont les filaments sont courts, attachés sur le réceptacle, terminés par des anthères simples, arrondies.

4°. Un

4°. Un ovaire supérieur, presque rond, surmonté d'un style court, épais, cylindrique, terminé par un stigmate très-large, plane, pelté ou en forme de bouclier, à cinq angles, couvrant en entier les étamines, persistant.

Le fruit est une capsule presque ronde, à cinq loges, à cinq valves séparées par une cloison; renfermant plusieurs semences petites, arrondies, acuminées, supportées par un réceptacle central, presque à cinq faces.

*Observations.* Ce genre très-naturel est tellement circonscrit dans les caractères, qu'il n'a avec les autres que des rapports éloignés, & qu'il pourroit seul former une famille. Il comprend d'ailleurs de très-belles espèces, dont les fleurs sont presque aussi éclatantes que celles des nénufars, dont le calice intérieur, au moins aussi ample que la corolle, offre comme elle des couleurs agréables. Son large stigmate, pelté, supporte par un style court, épais, ressemble à un large parasol, qui garantit les éramines qu'il recouvre de la trop grande humidité. Les feuilles sont bien plus singulières; elles forment un long tube conique ou ventru, souvent rempli d'eau, surmonté d'un appendice élargi, redressé ou recourbé, en forme d'opercule. Il faudroit, pour déterminer la place que ce genre pourroit occuper dans l'ordre des familles naturelles, une connoissance plus parfaite des parties de la fructification, surtout de ses semences. L'embryon ou le germe est-il bilobé ou à un seul cotylédon, pourvu ou privé de périsperme?

1. SARRACÈNE à fleurs purpurines. *Sarracenia purpurea*. Linn.

*Sarracenia foliis cucullatis, ventricosis, patulis, arcuatis.* Valt. Flor. carol. pag. 152.

*Sarracenia foliis gibbis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 728. — Hort. Cliff. 427. — Gronov. Virgin. 164. — Mill. Dict. n°. 1. tab. 241. — Lam. Illustr. Gen. tab. 452.

*Sarracenia foliis brevioribus, latioribus.* Catesb. Carol. 1. pag. 70. tab. 70.

*Calophyllum virginianum, brevior folio, flore purpurascens.* Moris. Hist. 3. pag. 333.

*Bucanaphyllum americanum, limonia congener dictum.* Pluken. Almag. pag. 71. — Amalth. pag. 46. tab. 376. fig. 6.

*Limonia pterinifolium, foliis formâ, floribus aristatis.* C. Bauh. Pin. 192.

*Sarracenia canadensis, foliis cavis & auratis.* Tourn. Inst. R. Herb. 657. tab. 476.

*Limonia congener.* Clus. Hist.

*Sarracenia (purpurea), foliis brevibus; sub Botanique. Tame VI.*

*ventricoso, gibbo, fauc. coarctata; alâ ventrali arcuatim elatari; appendice erectâ, subreniformi-carinata, muticâ, sessili; flore purpureo.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 310.

Cette espèce, ainsi que toutes les autres de ce genre, sont d'une forme très-curieuse, d'une grande beauté, remarquables par leurs feuilles tubulées, & par leur hampe terminée par une très-belle fleur, grande, purpurine, singulière dans toutes les parties.

Ses racines, épaisses, charnues, produisent un assez grand nombre de feuilles toutes radicales, sessiles, tubulées, courtes, très-renflées, & ventruës dans leur milieu, rétrécies à leur base, un peu resserrées à leur orifice, glabres, minces, verdâtres, droites; l'appendice qui les termine, est ample, droit, sessile, presque en rein, en forme de cœur, obtus, lisse en dehors, garni en dedans de quelques poils blanchâtres, couchés. Ces feuilles sont longues de cinq à six pouces, munies, à leur partie antérieure, d'une membrane en forme d'aile médiocrement arquée & longitudinale; le bord de leur orifice est un peu épais, d'un brun clair.

Du milieu des feuilles s'élève une hampe nue, simple, cylindrique, glabre, striée, haute de huit à dix pouces, droite, terminée par une fleur solitaire, grande, purpurine, dont le calice extérieur est fort petit, à trois folioles glabres, ovales, verdâtres. Le calice intérieur est coloré en un pourpre mélangé de vert, à cinq folioles ovales, oblongues, obtuses, longues d'un pouce & demi, veinées, réticulées. La capsule est globuleuse, ridée, presque verruqueuse en dehors, surmontée du stigmate persistant, plane, large d'un pouce & plus de diamètre, mince, divisée en cinq lobes, quelquefois bifides à leur sommet.

Cette plante croît dans les marais fangeux en Amérique, depuis la baie d'Hudson jusque dans la Caroline; elle m'a été communiquée par M. Bosc, qui l'a recueillie dans les environs de Charlestown. (V. f.)

2. SARRACÈNE à fleurs jaunes. *Sarracenia flava*. Linn.

*Sarracenia foliis striatis, longissimè infundibulatis; fauc. patulâ; alâ ventrali subnullâ; appendice erectâ, basi coarctatâ, imâ parte lateralibus retroflexis; mucron. subulato.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 310.

*Sarracenia foliis erectis, tubulatis; valvâ, callo contractâ; apice planâ, erectâ.* Walther. Flor. carol. pag. 153.

*Sarracenia foliis striatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 729. — Miller, Dict. n°. 2.

*Sarracenia foliis rectis.* Hort. Cliffort. 497. — Gronov. Virgin. 164.

*Sarracenia foliis longioribus & angustioribus.* Car-tesb. Carol. 2. pag. 69. tab. 69.

*Coilophyllum virginianum*, longiore folio erecto, flore luteo. Morif. Odon. Hist. 3. pag. 333.

*Bucanaphyllum elatius*, virginianum, seu limorio congeneris, altera species elatior; foliis triplò longioribus. Pluken. Almag. pag. 72. — Amaltb. pag. 46. tab. 152. fig. 3. Icon. Mula; tab. 376. Bg. 5. Bona.

*Thuris limpidifolium.* J. Bauh. Hist. 1. pag. 307. pars 2. Ic. — Lobel. Adverf. 430. Ic. ?

*Thuris limpidifolium pena.* Dalech. Hist. 2. pag. 1754. Icon. ?

On distingue aisément cette belle espèce du *sarracenia purpurea* à ses feuilles bien plus étroites & plus longues, point ventrues, & à ses fleurs jaunes.

Ses racines sont fortes, épaisses, fibreuses : il s'en élève des feuilles toutes radicales, longues d'environ un pied & demi, fermes, roides, dures, cylindriques, droites, nerveuses, creusées en forme d'entonnoir long, étroit, point ventrues ; l'aile membraneuse & longitudinale qui garnit leur partie extérieure est à peine sensible ; leur orifice est ample, très-ouvert ; ses bords un peu recourbés ; l'appendice, en forme d'opercule qui termine ses feuilles, est droit, fortement retreci à sa base, large, ovale, presque arrondi, réfléchi inférieurement à ses bords, mucroné, subulé à son sommet, glabre à ses deux faces.

Les hampes sont longues, droites, simples, cylindriques, glabres, striées, terminées par une fleur solitaire, un peu penchée, de couleur jaune. Le calice extérieur est composé de trois petites folioles ovales, concaves, jaunâtres, caduques ; l'extérieur se divise en cinq grandes folioles élargies, ovales, obtuses, d'un vert-jaunâtre ; les pétales sont recourbés en dedans ; l'ovaire globuleux ; le stigmate plane, très-ampli, ovale, à cinq lobes un peu aigus, peu profonds, jaunâtre en dessous, d'un jaune-verdâtre en dehors, persistant.

Cette plante se rencontre en Amérique, dans les lieux humides à découvrir, depuis la Caroline jusque dans la Floride ; elle m'a été communiquée par M. Boic. (V. f.)

*Observations.* Je soupçonne que la synonymie de Jean Bauhin, de Lobel & de Dalechamp appartient plutôt au *sarracenia variolosa* que Linné n'a point connu, qu'au *sarracenia flava*, à laquelle il la rapporte. Jean Bauhin, qui n'a vu que des feuilles, a regardé probablement les taches jaunes du *sarracenia flava* comme des gouttes concrètes d'un suc particulier à cette plante, d'où lui vient sans doute le nom de *thuris limpidifolium* qu'il lui a donné.

3. SARRACÈNE variolosa. *Sarracenia variolosa.* Mich.

*Sarracenia foliis elongatis, tubo supernè dorso maculoso, in appendicem fornicatam incurvatam, brevem desinente ; alà ventrali lineari-lanceolata ; flore flavo.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 310.

*Sarracenia (minor), foliis minoribus, tubulosis, cretibus ; valvâ concavâ, natante. ?* Walther. Flor. carol. pag. 153. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1150.

Cette plante diffère du *sarracenia flava* par ses feuilles beaucoup plus courtes, & par leur opercule plus étroit, fortement incliné sur l'orifice des feuilles, & plus particulièrement par les taches jaunâtres de leur partie supérieure.

Ses racines, assez grosses & fibreuses, produisent plusieurs feuilles toutes radicales, longues de huit à dix pouces, fermes, membranées, presque coriaces, droites, étroites, tubulées, presque cylindriques, rétrécies en période à leur base, striées, munies en devant d'une aile membraneuse, très-étroite, linéaire, longitudinale, marquée, sur le dos & à la partie supérieure du tube, de taches jaunâtres, irrégulières, assez grandes, comme des grains de petite vérole. L'appendice est presque en capuchon oblong, concave, sensible, recourbé fortement sur l'orifice, un peu mucroné à son sommet.

Les fleurs sont jaunes, solitaires, assez grandes ; leur calice, de même couleur ; l'intérieur, à cinq grandes découpures très-minces, plus longues que les pétales, ovales, élargies, rétrécies, obtuses à leur sommet ; les pétales étroits, recourbés en dedans à leur sommet.

Cette plante croît dans les pâturages humides en Amérique, depuis la Floride jusque dans la Caroline, où elle a été recueillie par M. Boic, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

*Observations.* La plante de Waltherius ne me parait point différer de celle de Michaux, quoiqu'il ne parle point, dans sa phrase spécifique, des taches varioliques dont les feuilles sont marquées. Je serois très-porté à croire que la synonymie de J. Bauhin, de Lobel & de Dalechamp, que j'ai rapportée, d'après Linné, au *sarracenia flava*, convient davantage à cette espèce, comme je l'ai dit en traitant de l'espèce précédente.

4. SARRACÈNE en bec de perroquet. *Sarracenia physocoma.* Mich.

*Sarracenia foliis brevibus, supernè coloratis, venoso-reticulatis ; alà ventrali fusco subconatim latrescente ; tubo sensim in appendicem recurvatam, rotundatam fornicatam ; flore purpureo.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 311.

La forme des feuilles & celle de leur appendice, la couleur purpurine des fleurs, distinguent cette espèce de ses congénères.

Ses feuilles sont toutes radicales, courtes, colorées à leur partie supérieure, tubulées, veinées, réticulées, munies à leur partie antérieure d'une aile membraneuse, longitudinale, qui insensiblement se rétrécit vers le haut, en forme de coin. Le tube s'amincit graduellement vers son sommet, où il s'allonge en un appendice recourbé, & insinue assez bien la tête d'un perroquet. Sa base est arrondie en forme de voûte, & son sommet mucroné.

Cette espèce se trouve dans l'Amérique septentrionale, depuis la nouvelle Géorgie jusque dans la Floride. (*Descript. ex Mich.*)

5. SARRACÈNE à fleurs rouges. *Sarracenia rubra*. Walth.

*Sarracenia foliis erectis, tubulatis; valvâ planâ, erectâ.* Walth. Flor. carol. pag. 152. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1150. n°. 3.

Cette espèce n'a, comme les autres, que des feuilles radicales, droites, rigides, tubulées; elles se terminent par un opercule en forme d'appendice, plane, élargi, relevé. Ses fleurs sont de couleur rouge.

On trouve cette plante en Amérique, dans les terrains humides de la Caroline. &c.

SARRÊTE. *Sarratula*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, de la famille des cironocéphales, qui a des rapports avec les chardons, & qui comprend des herbes, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les tiges sont la plupart hautes & rameuses, les feuilles médiocrement épineuses, les fleurs terminales.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice ovale, composé d'écaillés imbriquées, non-épineuses; des fleurons tous hermaphrodites; des semences surmontées d'une aigrette sessile, joyeuse; la réceptacle garni de paillettes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées de fleurons tous hermaphrodites; elles offrent :

1°. Un calice obovoïde, ovale, oblong ou presque cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, lancéolées, aiguës, ordinairement sans épines.

2°. Une corolle composée entièrement de fleurons tous hermaphrodites, égaux, tubulés, infundibuliformes, dont le tube est médiocrement courbé, le limbe ventru, à cinq découpures.

3°. Cinq étamines syngénèses, dont les filaments

sont capillaires, très-courts; les anthères cylindriques, réunies en tube.

4°. Un ovaire ovale, surmonté d'un style filiforme, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate médiocrement bifide; les divisions réflexibles en dehors.

Les semences sont nues, solitaires, en ovale renversé, surmontées d'une aigrette sessile, plumeuse ou pileuse.

Le réceptacle est garni de paillettes ou de poils; il est nu dans quelques espèces.

Observations. Ce genre milite tellement avec quelques autres qui en sont très-voisins, & il est si peu naturel, si l'on en excepte un très-petit nombre d'espèces, qu'il est fort difficile d'en déterminer exactement les limites, quoique déjà il ait éprouvé bien des changements, soit en y introduisant des espèces placées dans d'autres genres, soit en retranchant plusieurs autres pour en former des genres particuliers. C'est ainsi que les genres *vernonia* & *lythris* ont été établis : les espèces qu'ils renferment, se trouveront décrites à l'article VERNONIE.

Plusieurs espèces de *carduus*, de *cnicus*, de *centaurea*, quoiqu'éloignées des *sarratula* par plusieurs de leurs parties, y ont cependant été réunies, parce qu'ils s'y rapportoient par un plus grand nombre de caractères appuyés sur les parties les plus essentielles de la fructification.

Les *stachina* de Linné étoient trop peu distingués des *sarratula*, pour les conserver : nous avons cru devoir également les y réunir. Malgré ces changements, nous sommes forcés d'avouer que ce genre offre encore bien des difficultés, surtout relativement à certaines espèces que nous n'avons pas pu observer par nous-mêmes, & dont la description se trouve peu détaillée dans les auteurs qui en ont parlé. Nous aurions pu y en ajouter plusieurs autres, dont nous n'avons rien dit par la même raison.

M. Lamarck a supprimé entièrement le genre *cnicus*, dont la plupart des espèces appartiennent aux carthames, aux chardons, aux farfèrres. J'ai été forcé de réunir dans ce dernier genre les *cnicus* que M. Lamarck n'a point mentionnés dans les genres cités plus haut. J'avoue que plusieurs de ces espèces tiennent de bien près aux chardons. Il faut attendre, pour prononcer définitivement sur ces espèces, que la plupart soient mieux connues, & les limites de ces genres mieux déterminées.

Quelques espèces de *centaurea* devoient également trouver place parmi les farfèrres, ayant tous leurs fleurons fertiles. Nous pouvons citer entre autres le *centaurea buben*, déjà mentionné dans cet ouvrage.

\* *Serratula*. Linn.1. *SARRÊTE* des teinturiers. *Serratula tinctoria*. Linn.

*Serratula foliis lyrato-pinnatifidis; pinnâ terminali maximâ, floribus conformibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1144. — Hort. Cliff. 391. — Hort. Upf. 249. — Flor. succ. 660. 713. — Roy. Lugd. Bot. 143. — Dalib. Paris. 246. — Pollich, Pal. n. 760. — Pallas, Iter 1. pag. 63. — Martiusch, Sil. n. 582. — Deerr. Nass. pag. 215. — Oeder, Flor. dan. tab. 281. — Kniph. Cent. 2. n. 83. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 39. n. 34. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 176. — Gouan, Monsp. 421.

*Serratula foliis argutè serratis, basi subpinnatifidis; corymbo fastigiato*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1638. n. 1.

*Carduus inermis, foliis glabris, serratis; imis ovatis, superioribus semipinnatis*. Haller, Helv. n. 163.

*Carduus tinctorius*. Scop. Carn. edit. 2. n. 1012.

*Serratula*. C. Bauh. Pin. 235. — Dod. Pempt. 42. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 23. Icon. — Magn. Bot. Monsp. 239. — Dalech. Hist. 2. pag. 1357. Icon.

*Jacea nemorensis, quæ serratula vulgò*. Tourn. Infl. R. Herb. 444.

β. *Eadem, foliis omnibus integerrimis, serratis*. (N.)

γ. *Eadem, foliis, inferioribus integris, superioribus incisis*. (N.)

δ. *Eadem, foliis omnibus incisis*. (N.)

ε. *Eadem, foliis omnibus laciniatis*. (N.)

*Serratula alpina*. Zanon. tab. 94.

ζ. *Jacea nemorensis, quæ serratula vulgò; flore albo*. Tourn. Infl. R. Herb. 444.

Belle espèce d'un port agréable, dont les fleurs sont rougeâtres, les calices cylindriques, oblongs; les feuilles entières ou découpées, ou pinnatifides, sans épines.

Ses racines sont dures, petites, garnies de quelques fibres courtes: il s'en élève des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, fermes, lisses, peu rameuses, glabres, striées, divisées à leur partie supérieure en quelques rameaux paniculés. Les feuilles inférieures sont grandes, ovales, oblongues, presque lancéolées, pétiolées, glabres à leurs deux faces; la plupart pinnatifides ou ailées, terminées par un lobe fort grand, étroit, lancéolé: les feuilles supérieures beaucoup plus étroites, presque sessiles, ordinairement incisées, toutes

finement denticulées en scie à leur contour; les dents très-petites, aiguës, mais à peine piquantes.

Ces feuilles varient singulièrement, à un tel point que si l'on ne connoissoit point la suite de toutes ces variétés, quelquefois réunies presque sur le même individu, on seroit renu d'en faire plusieurs espèces. Quelquefois il n'existe que des feuilles entières, ovales, lancéolées, un peu élargies, comme dans la variété β. D'autres fois toutes les feuilles inférieures sont entières, les supérieures pinnatifides, var. γ. Tantôt toutes les feuilles sont incisées, var. δ; tantôt elles font toutes laciniées, var. ε. On rencontre enfin des mélanges de toutes ces variétés.

Les fleurs sont terminales, solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux, & forment, par leur ensemble, une panicule un peu diffuse. Les calices sont droits, cylindriques, de couleur verte, purpurine, composés d'écaillés agréablement imbriquées, inégales, ovales, oblongues, aiguës, blanchâtres & un peu tomenteuses à leurs bords. La corolle est purpurine ou blanchâtre dans la variété ζ. Les semences sont oblongues, un peu renflées, médiocrement comprimées, presque anguleuses, un peu rétrécies & obtuses à leur base, surmontées d'une aigrette sessile, pileuse, roussâtre. Le réceptacle est garni de paillettes alongées, scarieuses, un peu concaves, presque linéaires.

Cette plante croît dans les bois & les prés couverts. Je l'ai recueillie à Bellejames & à Marcouci aux environs de Paris, & sur les montagnes de Laon. γ.

Cette plante pourroit être précieuse aux arts par la couleur jaune affectée par elle, qu'elle fournit, & qu'on applique aux étoffes par le moyen de l'alun. Cette teinture passe pour plus solide que celle de la gaude & du genêt. On regarde son emploi en médecine comme propre à prévenir les suites funestes des chutes: elle est recommandée comme vulnérinaire & détersive; elle est inutile dans les prairies: les vaches & les cochons n'en veulent point: les chèvres, les moutons, rarement les chevaux, la mangent.

2. *SARRÊTE* couronnée. *Serratula coronata*. Linn.

*Serratula foliis lyrato-pinnatifidis; pinnâ terminali maximâ; flosculis radii semine longioribus*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 669. n. 2.

*Serratula foliis serratis, impari-pinnatis, subquinque jugis, pinnis confusiusculis, pedunculis unifloris, floribus radiatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1638. n. 2.

*Serratula praetis, centauroideis, montana*. Boccon. Muf. 2. pag. 45. tab. 37.

*Carduus inermis; foliis glabris, pinnatis; laciniâ*

*extima, maxima; capitulis squatis.* Gmel. Sibir. 2. pag. 49. tab. 20.

*Serratula foliis laciniatis.* Amoen. Ruth. n°. 181.

*Jacea nemorensis, altissima, centauroides.* Tourn. Inst. R. Herb. pag. 444.

Cette plante est remarquable par son port, surtout par ses feuilles inférieures, amples, très-grandes, en lyre ou pinnatifides; elle a bien quelques rapports avec le *serratula tinctoria*, mais toutes les parties sont au moins trois fois plus grandes. Un autre caractère qui l'en distingue, & même qui l'exclut de ce genre, est d'avoir des fleurs femelles; elle deviendrait une centauree si elle avoit des fleurs fertiles, mais toutes sont fertiles.

Ses tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, glabres, striées, fortement cannelées, roides, rameuses; les feuilles radicales très-amples, longues d'un pied & demi environ, presqu'en lyre ou profondément pinnatifides à leur partie inférieure, terminées par un très-grand lobe terné; la division du milieu large, ovale, aiguë; toutes les folioles incisées ou crénelées irrégulièrement, légèrement mucronées, glabres à leurs deux faces, vertes, à nervures rameuses, réticulées, un peu jaunâtres. Les feuilles caulinaires, particulièrement les supérieures, sont beaucoup plus petites, presque feilées, profondément pinnatifides; les pinnules lancéolées, denticulées à leur contour, obtuses ou aiguës, un peu conniventes à leur base; les dents un peu épineuses & piquantes.

Les fleurs sont disposées en un corymbe terminal, les unes situées dans l'aisselle des feuilles, les autres à l'extrémité des tiges; elles sont grosses, de couleur purpurine ou violette. Le calice est glabre, cylindrique, composé d'écaillés imbriquées, inégales, d'un vert-foncé, brunes & presque scarieuses à leur contour, coriaces, aiguës à leur sommet, ovales ou lancéolées. La corolle est toute composée de fleurons tubulés, dont le limbe est divisé en cinq découpures allongées, étroites: tous ces fleurons sont fertiles, mais ceux de la circonférence manquent d'étamines, & sont plus longs que les autres: ceux du disque sont hermaphrodites. Le réceptacle est garni de paillettes longues, coriaces, particulièrement à la circonférence; les semences couronnées par une aigrette sessile, pileuse.

Cette plante croît en Italie & dans la Sibérie. On la cultive au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. (V. v.)

3. SARRÈTE à cinq feuilles. *Serratula quinquefolia*, Willd.

*Serratula foliis serratis, impari-pinnatis, subjugis; pinnis confluentibus, pedunculis unifloris; squa-*

*mis calicinis interioribus elongatis, corollatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1639. n°. 3.

*Serratula quinquefolia.* Marshall, de Bieberstein.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *serratula coronata*, dont elle n'est peut-être qu'une variété, & dont elle diffère par les folioles de ses feuilles bien moins nombreuses.

Ses tiges sont droites, glabres, rameuses, striées, garnies de feuilles alternes; ailées avec une impaire; les pinnules confluentes à leur base, au nombre de trois, ou cinq plus ordinairement, dentées en scie à leurs bords. Les pédoncules sont uniflores; les calices assez petits, composés d'écaillés glabres, imbriquées, point pubescentes; les intérieures colorées, allongées; la corolle composée entièrement de fleurons tous hermaphrodites.

Cette plante croît dans les provinces septentrionales de la Perse. (V.)

4. SARRÈTE à tiges basses. *Serratula humilis*, Desfont.

*Serratula foliis pinnatifidis, subius tomentosis; caule simplici, unifloro; foliis calicinis subulatis, laxis.* Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 244. tab. 220.

*Serratula (humilis), foliis pinnatifidis; laciniis linearibus, integerrimis, subius tomentosis; caule uniflora; calicibuscano-tomentosis, laxis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1639. n°. 4.

*Jacea incana, chamætonis capitulo.* Boccon. Mus. tab. 109.

C'est une très-belle espèce à tige très-courte, simple, droite, striée, quelquefois mais rarement, feuillée, hautes de quatre à cinq pouces au plus, dont les racines sont tortueuses, brunes extérieurement, de la grosseur d'une plume d'oie. Les feuilles radicales sont pinnatifides, glabres à leur face supérieure, tomenteuses & blanchâtres en dessous, larges d'environ un pouce, longues de six à sept; les pinnules sont distantes, lancéolées, presque linéaires, obtuses à leur sommet, ou un peu aiguës, très-entières, quelquefois dentées à leur base; les pétioles médiocrement ailés.

Les fleurs sont solitaires, terminales, assez grosses; leur calice est court, cylindrique, composé de folioles presque imbriquées, presque égales, roides, linéaires, subulées, disposées sur trois ou quatre rangs, verdâtres, lâches à leur sommet. Toutes les fleurs sont strobiliformes & hermaphrodites, couleur de rose; leur limbe est partagé en quatre découpures linéaires, étroites; les anthères sont d'un jaune-pâle; le style simple, filiforme, terminé par deux stigmates médiocrement réfléchis. Les semences sont glabres, oblongues, striées, surmontées d'une longue aigrette sessile, blanchâ-

tre, presque plumueuse; le réceptacle est garni de paillettes acuminées, déchirées à leur sommet.

Cette espèce a été découverte par M. Desfontaines, dans le mont Atlas, aux environs de Tlemcen. ♀

5. SARRÊTE molle. *Serratula mollis*. Cavan.

*Serratula foliis pinnatifidis; laciniis oblongis, obtusis, integerrimis, subius tomentosis; caule unifloro; calicinis squamis pubescentibus, adpressis*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1640. n° 5.

*Serratula (mollis), acaulis, uniflora; foliis pinnatis, inferne tomentosis*. Cavan. Icon. 1. pag. 62. tab. 90. fig. 1.

Cette espèce a des rapports nombreux avec le *Serratula humilis*; elle en diffère par ses feuilles moins profondément pinnatifides; par les découpures oblongues, obtuses; par les écailles calicinales, plus inégales, moins ouvertes; enfin par l'aigrette bien plus touffue & plumueuse.

Ses racines sont vivaces, presque ligneuses; ses tiges très-courtes, simples, hautes d'environ un pouce, tomentueuses, uniflores; les feuilles lancéolées; les unes presque entières, d'autres, en plus grand nombre, pinnatifides, vertes en dessus, tomentueuses & blanchâtres à leur face inférieure; les découpures oblongues, obtuses.

Les fleurs sont terminales, solitaires; le calice composé d'écailles imbriquées, lancéolées, très-inégales, très-serrées, pubescentes, les extérieures plus courtes; les intérieures beaucoup plus longues, acuminées; les semences surmontées d'une aigrette plumueuse; le réceptacle garni de paillettes un peu déchiquetées.

Cette plante croît en Espagne. ♀ (Descript. ex Willd.)

6. SARRÊTE sans tige. *Serratula subcaulis*. (N.)

*Serratula foliis decursivè interruptè pinnatis, tomentosis; pinnulis integerrimis; caule unifloro; calicibus inermibus, squarrosis*. Gouan.

*Carduus mollis*. Gouan, Illustr. botan. pag. 63. non Linnæ.

Cette plante est différente du *carduus mollis* de Linné, & ne doit pas être confondue avec lui; elle est très-rapprochée du *Serratula humilis*, avec lequel elle doit être comparée.

Ses racines sont épaisses, un peu pivotantes, chargées vers leur collet d'écailles membranées. Les tiges sont simples, très-courtes, hautes d'un à deux pouces, filides, blanchâtres, tomentueuses, à peine feuillées. Les feuilles radicales sont assez nombreuses, en partie étendues sur la terre, pétiolées, ailées ou pinnatifides; les pinnules distantes, point confluentes, excepté les dernières;

linéaires, oblongues, quelquefois un peu ovales, aiguës, très-entières, vertes en dessus, tomentueuses & blanchâtres en dessous, glabres à leur face supérieure, souvent un peu crépues à leurs bords; les pétioles tomentueux, presque aussi longs que les feuilles; celles des tiges, au nombre de deux ou trois au plus, à pinnules bien plus étroites, très-aiguës.

Les tiges se terminent par une seule fleur droite, de la grosseur de celle du *carduus acaulis*. Le calice est ample, composé de quelques écailles lâches, imbriquées, planes, linéaires, oblongues, un peu aiguës, inégales, tomentueuses, blanchâtres, principalement les extérieures. Les fleurs sont jaunes, toutes semi-bisexuals, hermaphrodites; les semences courtes, ovales, presque anguleuses, tronquées à leur sommet, surmontées d'une longue aigrette rouffâtre, sessile, dont les poils sont simples, nombreux, point plumueux; le réceptacle garni de paillettes coriaces, linéaires, presque de la longueur des calices.

Cette plante croît sur les monagnes alpines, en Autriche & dans les départements méridionaux de la France. ♀ (V. f. in herb. Lam.)

7. SARRÊTE à tiges simples. *Serratula foliis pinnatifidis, linearibus, subius tomentosis; caule inermi, unifloro*. Linn.

*Carduus mollis*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 686. n° 30. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 328. — Jacq. Vindeb. 276. — Idem, Flor. austr. tab. 18. — Scopol. Carn. edit. 2. n° 1000. *far cirsio*. — Pollich, Pal. n° 169.

*Carduus foliis pinnatifidis, linearibus, subius tomentosis, margine revolutis; caule subnudo, unifloro; calicinis squamis tomentosis, ovato-lanceolatis, squarrosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1661. n° 36.

*Carduus mollis, laciniato folio*. C. Bauh. Pin. 377.

*Carduus mollior, primus*. Clus. Hist. 2. pag. 151.

Cette plante diffère du *carduus mollis* de Gouan, qui est notre *Serratula subcaulis*, par ses feuilles étroites, oblongues, linéaires, à peine pinnatifides, plutôt laciniées à leur contour, vertes à leur face supérieure, tomentueuses en dessous, roulées à leurs bords. Les tiges sont simples, peu élevées, presque nues ou munies de deux ou trois feuilles très-courtes, linéaires, terminées par une seule fleur, à laquelle la tige sert de pédoncule. Les calices sont composés d'écailles non épineuses, ovales, lancéolées, scarieuses; la corolle ne renferme que des fleurs tous hermaphrodites; les semences sont surmontées d'une aigrette sessile, dont les poils sont presque plumueuses ou chargées d'aspérités.



Cette plante croît naturellement en Autriche & dans plusieurs autres contrées de l'Allemagne. 2

8. SARRÊTE pygmée. *Serratula pygmaea*. Willd.

*Serratula foliis linearilanceolatis, hirsutis, marginibus revolutis; caule unifloro, villosa; calicinis squamis ovato-lanceolatis, adpressis.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1640. n°. 6.

*Serratula pygmaea*. Jacq. Austr. tab. 440.

*Cnicus* (pygmaeus), *caule unifloro; foliis sublinearibus, sessilibus, confertissimis; calice incrimis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1156.

*Cirsium pigmaum*. Scopul. Carn. n°. 996.

*Carduus caule unifloro, calice incrimis foliis sublinearibus, sessilibus.* Jacq. Vindeb. pag. 282. tab. 8.

*Carduus mollis; folio oblongo, cirsii capitulo.* C. Bauh. Pinn. 377.

*Carduus mollior, humilis, angustifolius.* Cluf. Hist. 2. pag. 151.

Cette plante, considérée dans les parties de sa fructification, convient bien mieux aux *serratula* qu'aux *cnicus*. Ses tiges sont basses, velues, simples, uniflores, hautes d'un à quatre pouces; les feuilles sont sessiles, très-rapprochées, étroites, linéaires, lancéolées, velues, vertes à leurs deux faces, roulées à leurs bords, entières.

Les fleurs sont solitaires, terminales; leur calice composé d'écaillés très-fermées, imbriquées, point piquantes, ovales, lancéolées; les semences surmontées d'une aigrette plumbeuse, & le réceptacle garni de paillettes.

Cette plante croît sur les montagnes alpines de l'Autriche, de la Carniole, &c. 2

9. SARRÊTE des Alpes. *Serratula alpina*. Linn.

*Serratula calicibus subhirsutis, ovatis; foliis indivisis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1145. — Miller, Dict. n°. 9. — Gunn. Norv. n°. 48. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 638. n°. 1201. Suppl.

*Serratula foliis subius villosis, dentatis; radicalibus ovato-lanceolatis; floribus terminalibus, subumbellatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. p. 1641. n°. 7.

*Serratula foliis petiolatis; radicalibus ovato-oblongis, dentatis; caulibus inaequaliteris.* Flor. suec. 661. 714.

*Serratula foliis ovato-lanceolatis, radicalibus serratis, caule thyrsoïde.* Flor. lappon. 291. — Hort. Uptal. 391.

*Cirsium foliis ovato lanceolatis, dentatis, subius tomentosis; calicibus villosis.* Haller, Helv. n°. 179. tab. 6.

*Cirsium inerme, foliis ex ovato-lanceolatis, denti-*

*culatis, inter lanugine candidis.* Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 67. tab. 16.

*Carduus cirsium minus, britannicum; floribus congestis.* Pluken. Almag. pag. 83. tab. 154. fig. 3.

1. *Serratula cynoglossifolia*.

*Cirsium humile, montanum, cynoglossi folio polyanthemum.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 148. — Dillen. Elram. 82. tab. 70. fig. 81. — Gmel. Sibir. 2. pag. 76. tab. 32. — Wæder. Flor. dan. tab. 37. — Haller, l. c. p.

2. *Serratula lapathifolia*.

*Serratula (discolor), foliis subius tomentosis, dentatis; radicalibus ovatis, subcordatis; caulibus ovato-lanceolatis; floribus terminalibus, subumbellatis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1641. n°. 8.

*Serratula alpina.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 40.

*Cirsium inerme, foliis ex ovato-lanceolatis, dentatis, infra lanugine candidis.* Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 61. tab. 67.

*Cirsium foliis ovato-lanceolatis, dentatis, f. hirsuta tomentosa; calicibus villosis.* Haller, Helv. n°. 179. tab. 6.

*Cirsium polyanthemum, molli, hirsuto folio.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 148. 5. 7. tab. 29. fig. 1.

*Cirsium foliis triangularibus, lancea dentatis.* Haller, Helv. 683.

*Carduus mollis, lapathifolius.* C. Bauh. Pin. 377. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 46. Icon. 47.

*Carduus mollior* 2. Cluf. Hist. 2. pag. 151.

*Cirsium alpinum, boni Henrici folio.* Tourn. Inst. R. Herb. 488.

*Carduus mollis, lapathifolius, secundus.* Cluf. Pann. pag. 663. tab. 664.

3. *Serratula angustifolia*.

*Serratula (angustifolia), foliis linearibus, integerrimis, hirsutis; floribus terminalibus corymbosis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1642. n°. 9.

*Cirsium inerme, foliis linearibus, utrinque viridibus; calicibus hirsutis.* Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 78. tab. 33. — Haller, l. c. Vat. 9.

Linné a cru devoir réunir comme variétés des plantes qui se ressemblent routes par leurs fleurs bleues, & dont les calices sont plus ou moins velus, mais qui diffèrent par leurs feuilles; nous avons déjà vu la même chose dans les *serratula tinctoria*.

L'espèce dont il est ici question a des tiges hautes d'un à deux pieds, droites, cylindriques, striées, assez fortes, plus ou moins lanugineuses, blanchâtres, médiocrement rameuses. Les feuilles inférieures sont grandes, entières, ovales,

oblongues, pétioles, dentées à leur contour; les feuilles caulinaires presque sessiles, très-entières, vertes en dessus, velues à leur face inférieure; elles sont beaucoup plus étroites, & presque semblables à celles de la cynoglossie dans la variété  $\beta$ .

La plante  $\gamma$  est une des variétés les plus remarquables: ses feuilles radicales & inférieures sont pétioles, molles, presque triangulaires ou hastées, ou un peu arrondies à leur base, quelquefois en cœur, légèrement dentées à leurs bords, très-aiguës à leur sommet, vertes à leur face supérieure, tomenteuses & blanchâtres en dessous: les feuilles caulinaires supérieures plus étroites, presque lancéolées, à peine pétioles. Dans la variété  $\delta$ , les feuilles sont étroites, presque linéaires, vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en une sorte de corymbe, au nombre de cinq à six, soutenues par des pédoncules courts, simples, un peu coteux; les calices sont ovales, composés d'écaillés fortement imbriquées, plus ou moins velues, d'un brun-noirâtre à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet. Les corolles sont toutes strobiliformes, hermaphrodites, de couleur bleue, quelquefois légèrement purpurine; les semences surmontées d'une aigrette sessile, pileuse; le réceptacle garni de paillettes étroites.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, sur les hautes montagnes, en Suisse, dans l'Autriche, la Lapponie, la Sibérie, &c. & (V. f.)

10. SARRÊTE à feuilles de saule. *Serratula foliifolia*. Linn.

*Serratula foliis linearilanceolatis, alternis, subius inanis, sessilibus, integerrimis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 670. n°. 4.

*Serratula foliis linearibus, integerrimis, subius tomentosis; margine revolutis, corymbo fastigiatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1641. n°. 10.

*Cirsium inerme, erectum; foliis ex linearilanceolatis, infra candidis*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 69. tab. 27.

Le port de cette plante ne répond qu'imparfaitement à celui des autres espèces: les détails de sa fructification ne sont pas assez étendus pour savoir si elle doit rester dans ce genre.

Ses tiges sont droites, anguleuses, rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles alternes, sessiles, assez semblables à celles des saules, linéaires, lancéolées, très-entières, vertes en dessus, blanchâtres à leur face inférieure, point ou presque point décurrentes à leur base.

Les fleurs sont rouges, pédonculées, réunies au nombre de trois ou quatre à l'extrémité de

chaque rameau. Les calices ressemblent à ceux du *ferratula alpina*.

Cette espèce croît dans les lieux secs & arides de la Sibérie. (Descript. ex Linn.)

11. SARRÊTE des Indes. *Serratula indica*. Willd.

*Serratula foliis linearilanceolatis, serratis, scabrisculis; caule paniculato, corymbis fastigiatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1642. n°. 11.

*Serratula indica*. Klein. in litt.

Ses tiges sont glabres, rameuses, filonées, hautes d'environ quatre pieds; les rameaux paniculés; les feuilles sessiles, alternes, linéaires, lancéolées, un peu rudes au toucher, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet; les supérieures très-entières.

Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux. Leurs calices sont cylindriques, composés d'écaillés inégalement, lancéolées, scarieuses à leurs bords; les semences sont couronnées d'une aigrette formée par des paillettes lancéolées, ciliées; le réceptacle est également garni de paillettes lancéolées, aiguës, dentées en scie.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Descript. ex Willden.)

12. SARRÊTE multiflore. *Serratula multiflora*. Linn.

*Serratula foliis lanceolatis, subius villosis, subcurrentibus, integerrimis; caule corymbofo, calicibus cylindricis*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 670. n°. 5.

*Serratula elatior, floribus umbellatis, parvis*. Geib. Tan. 294.

*Cirsium inerme, caulibus ascendens; foliis linearibus, infra cineris*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 71. tab. 28, ? id. flores majores.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *ferratula salicifolia*; mais ses feuilles sont décurrentes à leur base, velues en dessous: elle en diffère encore par le port.

Ses tiges sont anguleuses, fortes, branches, divisées en rameaux nombreux, dont l'ensemble forme un corymbe touffu. Les feuilles, approchant de celles du saule-oir, sont alternes, sessiles, lancéolées, très-entières à leurs bords, vertes en dessus, garnies en dessous d'un duvet blanchâtre, cendré. Les fleurs sont extrêmement nombreuses, & forment un corymbe très-touffu à l'extrémité des rameaux. Leur calice est cylindrique, composé d'écaillés glabres, aiguës, de couleur purpurine.

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie. (V. f. in herb. Lam.)

13. SARRÊTE

13. SARRÊTE caspienne. *Serratula caspica*. Pall.

*Serratula foliis lanceolatis, integerrimis, obtusis, subcarnosis, glabris; caule corymboso*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1643. n°. 13.

*Serratula caspica*, Pallas, Iter, vol. 2. Append. n°. 127. tab. Z.

Ses tiges sont droites, stériles, divisées en rameaux paniculés, garnis de feuilles alternes, sessiles, lancéolées, glabres à leurs deux faces, un peu charnues, très-entières à leur contour, obtuses à leur sommet. Les fleurs sont disposées en corymbes à l'extrémité des rameaux. Les semences sont surmontées d'aigrettes pileuses & ciliées; le réceptacle velu.

Cette plante croît sur les bords de la mer Caspienne. ♀

14. SARRÊTE mucronée. *Serratula mucronata*. Desfont.

*Serratula glabra, foliis integris, lanceolatis; caule paucifloro; squamis calicinis apice scariosis, acuminatis, reflexis*. Desfont. Flor. atlant. pag. 243. tab. 119.

*Serratula foliis oblongo-lanceolatis, integerrimis, glabris; caule subtrifloro, calice scarioso*. Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1643. n°. 14.

C'est une plante glabre dans toutes ses parties, dont les tiges sont droites, grêles, profondément striées, hautes d'environ un pied & demi, nues à leur partie supérieure, simples ou divisées en deux ou trois rameaux très-inégaux. Les feuilles sont alternes, très-entières, quelquefois médiocrement denticulées à leurs bords, longues d'environ six pouces, sur un ou deux de large; lisses & même luisantes à leur face supérieure, plus pâles en dessous; les feuilles inférieures ovales, lancéolées, rétrécies en pétiole à leur base, où elles deviennent décurrentes; les supérieures sessiles, plus étroites, acuminées.

Les fleurs sont terminales, solitaires à l'extrémité des tiges & de chaque rameau. Leur calice est ovale, composé d'écailles fortement imbriquées, lancéolées, mucronées à leur sommet, terminées par une pointe roide, scarieuse, un peu réfléchie. Les corolles sont toutes filiculeuses, hermaphrodites, couleur de rose ou d'un violet mêlé de rose, dont le limbe est divisé en cinq découpures linéaires; cinq étamines colorées; un style filiforme; un stigmate simple; des semences solitaires, nues, glabres, oblongues, striées, munies d'une aigrette sessile, pileuse. Le réceptacle est également chargé de poils au lieu de paillettes.

Cette plante a été observée, par M. Desfontaines, dans le royaume d'Alger, sur les collines Boanigue. Tome VI.

des environs de Mascara & sur le mont Atlas, où elle fleurit au printemps. ♀

15. SARRÊTE amère. *Serratula amara*. Linn.

*Serratula foliis lanceolatis, squamis calicinis apice scariosis, obtusis, paucis, coloratis; flocculis terminalibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 3. pag. 672. n°. 12.

*Serratula foliis lanceolatis, margine scabris, inferioribus basi dentatis, superioribus integerrimis, decurrentibus; floribus corymbosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1644. n°. 15.

*Cirsium inerme, foliis scabris, inferioribus ex sinuato-dentatis; squamis calicum subrotundis, membranaceis*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 72. tab. 29.

Cette plante a le port du *Serratula alpina*. Ignorant si le réceptacle de ses fleurs est garni ou non de paillettes, j'ai cru devoir en attendant la conserver dans ce genre, devant passer parmi les veronica si elle n'a point de paillettes.

Ses tiges sont droites, anguleuses, divisées en rameaux alternes, roides, garnis de feuilles alternes, lancéolées; les inférieures linéaires, dentées à leurs bords; les supérieures plus étroites, entières à leur contour, rudes, particulièrement vers leurs bords.

Les fleurs sont pédonculées, réunies, au nombre de deux ou trois, à l'extrémité de chaque rameau; elles sont de la grandeur du *cyathus ruber*. Leur calice est composé d'écailles imbriquées, larges, un peu arrondies, membranaceuses, molles, colorées, scarieuses à leurs bords, semblables à celles des centaureas, obtuses à leur sommet, sans épines. Les semences sont couronnées d'une aigrette fine, d'un beau blanc.

Cette plante croît naturellement dans la Sibirie. (Descript. ex Linn.)

16. SARRÊTE ailée. *Serratula alata*.

*Serratula foliis amplis, laxè pinnatis, subulis tomentosis; squamis calicinis apice reflexis*. (N.)

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes d'environ deux pieds, cylindriques, finement & profondément striées, presque glabres, tomenteuses à leur base. Les feuilles sont amples, profondément ailées, blanches & tomenteuses en dessous, vertes & glabres en dessus; les pinnules très-ouvertes, lancéolées, entières, obtuses à leur sommet, longues de trois à quatre pouces & plus, larges de six lignes au moins, irrégulièrement confluentes à leur base, décurrentes sur le pétiole commun; les feuilles caulinaires & supérieures à pinnules beaucoup plus étroites, un peu courbées en dehors, aiguës, mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux. Leur calice est ovale, oblong, com-

poisé d'écaillés imbriquées, inégales, oblongues, à peine scarieuses à leurs bords, terminées par une pointe roide, piquante, recourbée souvent à son sommet. La corolle est purpurine, formée de demi-fleurs tous hermaphrodites; les semences surmontées d'une aigrette sessile, pileuse; le réceptacle garni de paillettes assez semblables aux écaillés calicinales, mais plus étroites.

Cette plante a été cultivée dans le Jardin de Bagatelle en 1789. Je ne connois point son lieu natal. (*V. f. in herb. Lam.*)

17. SARRÈTE à feuilles aiguës. *Serratula acutifolia*.

*Serratula foliis parvis, sparsis, lanceolato-acutis, semiplexicaulis; floribus axillaribus, subsessilibus.* (N.)

Ses tiges sont dures, cylindriques, grêles, divisées en rameaux droits, effilés, pubescens, garnis de feuilles nombreuses, fort petites, éparées, à demi-amplexicaules, très-entières, lancéolées, pubescentes, très-aiguës, longues de trois à quatre lignes, larges à peine de deux.

Les fleurs sont presque sessiles, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, très-rapprochées, peu nombreuses. Leur calice est oblong, cylindrique, un peu rétréci à son sommet, composé d'écaillés imbriquées, roussâtres, glabres, membranées, oblongues. La corolle est jaune, filiforme; les semences surmontées d'une aigrette sessile, sétacée, point plumbeuse; le réceptacle garni de paillettes étroites, quelques-unes un peu spatulées, coriaces.

Cette plante a été recueillie, par Commerçon, à Monte-Video; elle a le port d'un stachelina. (*V. f. in herb. Lam.*)

18. SARRÈTE à petites fleurs. *Serratula parviflora*.

*Serratula foliis superioribus ovato-lanceolatis, sessilibus, obtusis; floribus corymbosis, parvis.* (N.)

Cette plante, dont je ne connois pas la partie inférieure, a des rameaux roides, droits, lins, glabres, presque anguleux, garnis de feuilles alternes, sessiles, entières, glabres à leurs deux faces, ovales, lancéolées, obtuses à leur sommet, surmontées d'une très-petite pointe; quelquefois un peu ondulées à leurs bords; les dernières longues d'environ un pouce, sur trois à quatre lignes de large.

Les fleurs sont fort petites, disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux, soutenus par des pédoncules grêles, anguleux, glabres, médiocrement ramifiés. Les calices sont glabres, ovales, composés de quelques écaillés courtes, ovales, concaves, un peu purpurines à leur sommet. La

corolle est petite, de couleur purpurine; les semences surmontées d'une aigrette sessile, dont les poils sont très-fins, blanchâtres, un peu plumeux.

Cette plante a été recueillie en Sibérie par M. Patr. (*V. f. in herb. Lam.*)

19. SARRÈTE à feuilles de centauree. *Serratula centaurioides*.

*Serratula foliis pinnatifidis, obliquis, acutis, glabris, incrimibus; squamis calicinis mucronatis, interioribus scariosis.* Linn. Syst. Plant. vol. 3, pag. 673. n°. 13.

*Jacea serpens, flore triplicato.* Zanon. Hist.

*Carduus caule ramoso, foliis pinnatifidis, foliolis dentatis, squamis ex lanceolato-sinosis.* Gmel. Sibir. vol. 2, pag. 44. n°. 38. tab. 17.

*p. Eadem, calicibus subglobosis, squamis breviter mucronatis.* (N.)

Cette espèce a le port & une partie des caractères de la centauree musquée, mais elle n'a point de fleurs neutres; elle lui ressemble par la forme & les écaillés de ses calices légèrement mucronés, en quoi elle s'écarte des *ferratula*.

Ses tiges sont cylindriques, droites, glabres, médiocrement striées, jaunâtres, très-souvent vertes sur les stries, hautes au moins d'un pied, divisées en rameaux alternes, roides, presque glabres, garnis de feuilles toutes profondément pinnatifides, alternes; les supérieures sessiles, glabres à leurs deux faces, dans une position verticale, ayant leur côté & non leur face tourné vers le ciel. Les pinnules sont très-étroites, oblongues, linéaires, presque lancéolées, aiguës à leur sommet, lâchement & irrégulièrement incisées à leurs bords, & munies de quelques petites dents aigées, très-courtes, presque épineuses; les feuilles caulinaires & inférieures amples, plus grandes, pétiolées, légèrement veinées.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux; leur calice ovale, un peu oblong, obtus, composé d'écaillés imbriquées, inégales, très-glabres, sèches, presque membranées, vertes en dehors, un peu scarieuses & jaunâtres à leurs bords, terminées par une pointe courte, roide, mais à peine piquante; les écaillés extérieures & situées vers la base, plus courtes, ovales; les intérieures scarieuses & plus longues. La corolle est purpurine, composée de fleurs tous égaux, fertiles; le style presque une fois plus long que les fleurs. Les semences sont surmontées d'une aigrette sessile, & le réceptacle est garni de paillettes sèches, oblongues, d'un blanc-jaunâtre, assez longues que le calice & même d'avantage.

Cette plante croît naturellement dans la Sibérie.

On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (P. v.)

La plante ♀, que j'ai recueillie sur les côtes de Barbarie, dans les environs de la Calle, diffère de la précédente par ses calices un peu plus petits, presque globuleux. Leurs écailles sont plus épaisses, plus ferrées, terminées par une petite pointe roide, jaunâtre, droite, piquante. Les feuilles, vues à la loupe, sont un peu pubescentes & ciliées à leurs bords; les supérieures des rameaux sont entières, très-étroites, oblongues, lancéolées, sessiles, alternes, très-aiguës. Ne l'ayant trouvée qu'en fruit, j'ignore quelle est la couleur des fleurs & le caractère des fleurons. Le réceptacle est garni de paillettes longues, scarieuses, patriciellement à sa circonférence; les semences couronnées d'une aigrette pileuse, d'un blanc-cendré, féssile, plus courte que les paillettes.

20. SARRÊTE du Japon. *Serratula japonica*. Thunberg.

*Serratula foliis lyrate-pinnatifidis, f. abris; squamis calicinis apice dilatatis, membranaceis.* Thunb. Flor. Japon. pag. 305. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1645. n°. 17.

Ses tiges sont droites, anguleuses, filonnées, rudes, hautes de trois pieds, garnies de feuilles éparées, pétioles, en lyre, presque pinnatifides; les pinnules aiguës, dentées, vertes à leur face supérieure, de couleur cendrée en dessous, rudes, hérissées à leurs deux faces, longues de deux ou trois pouces, les supérieures insensiblement plus petites.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, fastigiée, composée. Les calices sont composés d'écailles imbriquées; les intérieures dilatées vers leur sommet, obtuses, membraneuses, incarnates.

Cette plante se rencontre au Japon. (Description de Thunb.)

21. SARRÊTE à feuilles luisantes. *Serratula lucida*.

*Serratula foliis angustis, lanceolato-acuminatis, serratis lucidis, subulis tomentosa-incanis, basi spinulosis; calicinis squamis subulato-spinosis.* (N.)

Cette espèce peut avoir des rapports avec le *Serratula ciliata*; elle s'en distingue par ses feuilles glabres & luisantes en dessus, par ses tiges velues dans toute leur longueur, cotonneuses, droites, rameuses, brèves, blanchâtres, hautes d'environ deux pieds. Les feuilles sont alternes, éparées, denses, féssiles, très-étroites, lancéolées, acuminées, terminées par une pointe épineuse; longues d'environ trois pouces, un peu roides, luisantes & très-glabres à leur face supérieure, to-

menteuses & blanchâtres en dessous, point rétrécies à leur base, entières, un peu roulées à leurs bords, garnies à leur base de quelques cils rares, distans, spinuliformes, allongés.

Les fleurs sont solitaires, terminales, formant une sorte de corymbe lâche par leur ensemble. Les calices sont pubescens, un peu cotonneux & blanchâtres, composés d'écailles imbriquées, un peu lachés, lancéolées, entières, subulés & presque épineux à leur sommet. La corolle est d'un pourpre rougeâtre, formée de fleurons hermaphrodites; les semences sont couronnées par une aigrette blanche, foyeuse & plumueuse; le réceptacle garni, surtout vers la circonférence, de paillettes coriaces, lancéolées, aiguës.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. J'ignore son lieu natal. ♀ (P. v.)

22. SARRÊTE de Numidie. *Serratula numidica*.

*Serratula foliis ovato-lanceolatis, superiioribus oblongis, spinulosa-ciliatis, subulosis; calicinis squamis apice subulato-spinosis.* (N.)

Cette plante me paraît avoir des rapports avec le *Serratula ciliata* de M. Vahl, dont elle diffère par les feuilles vertes à leurs deux faces, à peine velues, & par ses écailles calicinales, terminées par une longue épine subulée.

Ses tiges sont hautes d'environ deux pieds, presque glabres, droites, rameuses, fortement cannelées, garnies de feuilles alternes, féssiles; les inférieures entières, ovales, oblongues, très-obtuses; les supérieures lancéolées, plus étroites, entières, vertes à leurs deux faces, munies de quelques poils courts & rares, un peu rétrécies vers leur base, aiguës à leur sommet, garnies à leurs bords de quelques petites dents courtes, écartées, spinuliformes, blanchâtres, longues au moins de deux pouces.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité de chaque rameau; leur calice est ovale, un peu globuleux, composé d'écailles très-ferrées, imbriquées, glabres, jaunâtres, un peu noirâtres vers leur sommet, terminées par une longue épine roide, droite, subulée, jaunâtre. Les fleurs font toutes stériles; les fleurons filiformes, tubulés, de couleur jaune; les semences courtes, surmontées d'une aigrette féssile, plumueuse. Le réceptacle garni, particulièrement vers la circonférence, de paillettes coriaces, entières, linéaires, au moins de la longueur du calice, terminées par une épine droite, subulée.

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, dans les prés, aux environs de la Calle. ♀ (P. v.)

23. SARRÊTE foyeuse. *Serratula foveola*. Willd.

*Serratula foliis oblongis, glabris, serrulatis, setu-*  
A 222 2

*ero-ciliatis, obtusis, mucronatis; caule corymbofo.*  
Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1645. n°. 19.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *ferratula arvensis*; elle en diffère par la forme de ses feuilles, & par ses fleurs beaucoup plus petites.

Ses tiges sont glabres, filonées, divisées à leur partie supérieure en rameaux faiblement, & disposées en corymbe; les feuilles nombreuses, alternes, oblongues, glabres à leurs deux faces, longues d'environ un pouce, de couleur verte, très-entières, finement dentées en scie à leurs bords, obtuses, mucronées à leur sommet; les dentelures ciliées, féicées.

Les fleurs sont disposées en corymbe à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules blanchâtres. Les calices sont légèrement pubescens, composés d'écaillés ovales, aiguës, imbriquées, un peu mucronées.

Cette plante croît dans la Silésie, où elle a été découverte par M. Seeliger. ♂ (*Descript. ex Willd.*)

#### 24. SARRÊTE ciliée. *Serratula ciliata*. Vahl.

*Serratula foliis sessilibus, lanceolatis, integris, spinuloso-ciliatis, subtus tomentosis*. Vahl, Symbl. 1. pag. 67. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1645. n°. 18.

Ses tiges sont droites, herbacées, striées, rameuses, nues à leur partie inférieure, blanchâtres vers leur sommet, garnies de feuilles sessiles, lancéolées, rétrécies à leur base, dentées en scie à leur contour, obtuses à leur sommet, vertes & velues à leur face supérieure, tomenteuses & blanchâtres en dessous, longues d'un pouce & demi, les dentelures épineuses, outre une petite épine terminale.

Les fleurs sont solitaires, terminales, à peine de la grosseur d'une noisette, au nombre de deux ou trois, supportées par des pédoncules longs d'environ deux pouces, uniflores, munies d'une ou de deux petites feuilles. Les calices sont composés d'écaillés glabres, imbriquées; les extérieures ovales, relevées en carène vers leur sommet, mucronées; les intérieures lancéolées; les semences couronnées par une aigrette plumeuse.

Cette plante croît en Égypte. (*Descript. ex Vahl.*)

*Observations.* Le *ferratula arvensis* a été placé par M. Lamarck parmi les chardons. (Voyez le CHARDON DES PRÉS dans cet ouvrage.)

#### \*\* *Stahelina*. Linn.

#### 25. SARRÊTE douteuse. *Serratula dubia*.

*Serratula foliis linearibus, denticulatis; squamis calicis lanceolatis, pappo calicibus duplo longiore.* Linn.

*Stahelina dubia*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 176. — Allion. Nicrens. 73. — Gouan, Monip. 430. — Miller, Dict. n°. 2. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 190. tab. 6.

*Stahelina* (dubia), foliis sessilibus, linearibus, denticulatis, subtus tomentosis; calicinis squamis interioribus lanceolatis, elongatis. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1783. n°. 1.

*Gnaphalium caule fruticoso, foliis linearibus denticulatis, capitulis oblongis.* Royen, Lugd. Bat. 151.

*Stachas odorata, purpurea.* Lobel, Icon. 486. — Magn. Monip. 247. 197.

*Stachadi citrina affinis, capitulis longioribus.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 156.

*Elyerisum silvestre, flore oblongo.* C. Bauh. Pin. 265.

*Chama-chrysocome pralongis, purpureisque jacea capitulis.* Bartel. Icon. Var. tab. 406.

*Jacea capitata, rorisamarini folio.* Tournef. Inst. R. Herb. 445.

*Serratula conica.* Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 40. n°. 34.

C'est une plante fort élégante, dont les tiges, basses, dures, presque ligneuses, sont un peu blanchâtres, noueuses, peu épaisses, hautes de six à dix pouces; elles sont munies de rameaux nombreux, grêles, droits, simples, médiocrement anguleux, revêtus d'un duvet blanchâtre, garnis de feuilles très-étroites, sessiles, éparées ou alternes, longues d'environ un pouce, presque glabres en dessus, blanches & coteuses à leur face inférieure, un peu roulées à leurs bords, & munies de quelques dents rares, distantes, très-courtes, à peine aiguës à leur sommet, traversées par une nervure saillante.

Les fleurs sont presque paniculées ou en cime, réunies de deux à trois ou quatre à l'extrémité des rameaux, supportées par des pédoncules inégaux, à peine de la longueur des fleurs. Les calices sont oblongs, cylindriques, un peu coniques, composés d'écaillés imbriquées; les intérieures lancéolées, allongées, aiguës, un peu rougeâtres ou purpurines, particulièrement vers leur partie supérieure; les écaillés inférieures & extérieures, ovales, courtes, blanchâtres, un peu pubescentes. La corolle est purpurine, un peu odorante, composée de fleurons hermaphrodites, étroits, tubulés. Les semences sont ovales, obtuses, glabres, de couleur brune, striées, un peu comprimées, couronnées par une aigrette pileuse, presque aussi

longue que les fleurons, d'un blanc foyeux. Le réceptacle est garni de paillerettes fines, étroites, scarieuses, aiguës, de la longueur des semences.

Cette plante croît en Espagne, en Italie, dans les départemens méridionaux de la France : je l'ai recueillie sur les collines calcaires des environs d'Aix. (V. v.)

26. SARRÊTE arborescente. *Serratula arborescens*.

*Serratula foliis petiolatis, ellipticis, obtusis, integerrimis, subtus sericeo-tomentosis*. Willd.

*Stachelina arborescens*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1783. n° 2.

*Stachelina foliis ovalibus*. Linn. Syst. veget. pag. 615. — Schreb. Dec. 1. tab. 1.

*Centaurea calicibus squamosis; foliis ovatis, subtus tomentosis*. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 187.

*Raponticoides frutescens, styracis folio*. Vaillant, Act. 1799.

*Jacea arborescens, styracis folio*. Tournef. Inst. R. Herb. 445.

*Cyanus arborescens altera, styracis folio*. Prosp. Alpin. Exot. pag. 33. tab. 32.

*Frutex rotundo, argenteo folio, cyani flore*. C. Bauh. A. 452.

Cette plante est un petit arbrisseau rameux qui s'élève d'un à deux pieds, dont les tiges, dures, épaisses, très-sourtes, se divisent, un peu au dessus de leur base, en rameaux droits, nombreux, grêles, élançés, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales ou elliptiques, très-entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, vertes, presque glabres à leur face supérieure, tomenteuses, blanches, foyeuses & un peu luisantes en dessous, nerveuses; les inférieures, ovales, beaucoup plus grandes; les supérieures, bien plus petites, presque sessiles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en un petit corymbe. Les pédoncules sont courts, blanchâtres, pubescens, presque simples, alternes. Les calices sont ovales, oblongs, composés d'écaillés imbriquées, coroneuses dans leur jeunesse, presque glabres après la floraison, coriaces, jaunâtres, ovales, presque obtuses; les intérieures, un peu plus allongées, presque lancéolées. Les corolles sont de couleur purpurine ou un peu rongéâtre, & ne renferment que des fleurons. Les semences sont glabres, allongées, couronnées par une aigrette sessile, dont les poils sont simples & pubescens. Le réceptacle est garni de paillerettes coriaces, linéaires, obuses ou un peu aiguës, presque aussi longues que le calice.

Cette plante croît dans l'île de Crète : on la

trouve aussi dans les départemens méridionaux de la France, particulièrement sur le Mont-Vidolre aux environs d'Aix, où je l'ai recueillie. (V. v.)

27. SARRÊTE frutescente. *Serratula fruticosa*.

*Serratula foliis lanceolatis, obtusis, in petiolum attenuatis, integerrimis, glabris*. Willd.

*Stachelina fruticosa*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1784. n° 3.

*Stachelina (fruticosa), foliis lanceolatis, obtusis*. Linn. Syst. veget. 615. — Schreb. in Nov. Act. A. N. C. vol. 4. pag. 142.

*Centaurea (fruticosa), calicibus inermibus, oblongis; foliis lanceolatis, obtusiusculis, glabris; caule frutescente*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1286.

*Cyanus repens, angustifolius*. C. Bauh. Pin. 274.

*Cyanus repens*. Lobel, Icon. 548.

*Jacea frutescens, planaginifolia, flore albo*. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 32.

*Rhaponticoides frutescens, olea folio*. Vaillant, Act. 1799.

C'est un arbrisseau d'une médiocre grandeur, dont les tiges sont basses; les rameaux courts, ordinairement ferrés, ramifiés, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, un peu épaisses, très-entières, un peu élargies, lancéolées, glabres à leurs deux faces, très-obuses à leur sommet, rétrécies, vers leur base, en forme de pétiole; les feuilles supérieures, beaucoup plus étroites & plus courtes.

Les fleurs sont presque fasciculées à l'extrémité des rameaux; quelques autres, axillaires, un peu plus basses, presque sessiles; les supérieures, médiocrement pédonculées. Les calices sont glabres, cylindriques, oblongs, composés d'écaillés imbriquées, glabres, roussâtres, ovales, obtuses; les supérieures, un peu aiguës; les inférieures, légèrement tomenteuses à leurs bords. La corolle est blanchâtre ou un peu purpurine; elle contient des fleurons tous hermaphrodites. Les semences sont couronnées par une aigrette dont les poils sont simples, un peu velus, réunis à leur base en un anneau court. Le réceptacle est garni, à la circonférence, de paillerettes linéaires, coriaces, obtuses, au moins aussi longues que le calice, & qui peuvent être également considérées comme les écaillés internes de ce même calice.

Cette plante croît dans le Levant & à l'île de Crète. (V. f. in herb. Lamarck.)

28. SARRÊTE halée. *Serratula halsia*.

*Serratula fruticosa, foliis halsia, inanis, sessilibus*. Vahl.

*Serratula hastata*, Vahl, Symbol. 1. pag. 70. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1784. n°. 4.

*Chrysocoma* (spatulata) ; *foliis oblongis, dentatis, tomentosis, sessilibus* ; *floribus terminalibus*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. 147.

C'est un petit arbrisseau à tiges roides, basses, très-rameuses, dont les rameaux sont cylindriques, blanchâtres, obtus, garnis de feuilles sessiles, oblongues, blanchâtres, particulièrement à leur face inférieure, très-obtus à leur sommet, aiguës à leur base, munies, vers leur milieu & de chaque côté, d'un lobe horizontal, longues d'environ un demi-pouce, quelquefois armées d'une petite dent à l'aisselle des lobes.

Les fleurs sont sessiles, solitaires, situées vers l'extrémité des rameaux. Leur calice est cylindrique ; il devient turbiné après la floraison, composé d'écaillés imbriquées, linéaires, en forme de carène. Les semences sont velues, surmontées d'une aigrette filiforme, d'un brun-noirâtre, finement denticulée, roide dans la portion qui dépasse le calice. Le réceptacle n'est que médiocrement garni de paillettes.

Cette plante croît dans l'Arabie heureuse. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

29. SARRÊTE à feuilles d'yeuze. *Serratula ilicifolia*.

*Serratula arborescens, foliis oppositis, brevissimis petiolatis, cordatis, dentatis, supra lucidis, subius tomentosis*. Linn. f.

*Stachelina ilicifolia*. Linn. f. Suppl. pag. 368. — Smith, Icon. inedit. pag. 71. tab. 71. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1785. n°. 5.

C'est un arbre dont les rameaux sont roides, tomenteux, médiocrement cylindriques, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, ovales, en cœur, lâchement dentées à leurs bords, ovales à leur sommet, très-glabres en dessus & comme enduites d'un vernis luisant, chargées à leur face inférieure d'un duvet épais, blanc, tomenteux, longues d'environ un pouce.

Ses fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en une sorte de panicule tomenteuse. Les calices sont hémisphériques, munis d'écaillés imbriquées, lanugineuses. La corolle est jaune, composée de plusieurs touthernaphrodites ; les semences acrotyques, surmontées d'une aigrette plus longue que le calice, piluleuse, dont les soies sont hispides ; le réceptacle garni de paillettes nombreuses, entières, roides, très-souvent bifides ou divisées en trois à leur sommet.

Cette plante croît naturellement à la Nouvelle-Grecade. *h*

30. SARRÊTE subulée. *Serratula subulata*. (N.)

*Serratula fruticosa, foliis subulatis, spinescentibus* ; *basi spinulâ utrinque*. Vahl.

*Stachelina spinosa*, Vahl, Symb. 1. pag. 69. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1785. n°. 6.

*Chrysocoma* (mucronata) ; *foliis serotibus, mucronatis*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 147.

*Conyza ægyptiaca, juniperi folio, tricuspide sapius auriculata* ; *floribus auratis*. Vaillant, Acl. 1719. pag. 397.

Ses tiges sont roides, frutescentes, très-rameuses ; les rameaux alternes, cylindriques, glabres, striés, garnis de feuilles alternes, sessiles, roides, cylindriques, très-entières, subulées, piquantes, très-ouvertes, distantes, légèrement striées, munies d'une petite épine de chaque côté de leur base.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des rameaux, munies à leur base de deux feuillets fort petites. Le calice est cylindrique avant le développement des fleurs ; il devient ensuite turbiné, glabre, imbriqué d'écaillés linéaires, oblongues, mucronées. Les semences sont pileuses, triangulaires, surmontées d'une aigrette griffée, de la longueur du calice, finement dentée lorsqu'on l'examine à la loupe ; le réceptacle est garni de paillettes seracées, très-courtes.

Cette plante croît dans l'Égypte. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

31. SARRÊTE à feuilles de larice. *Serratula chamæpeuce*.

*Serratula foliis linearibus, confertis, longissimis, margine revolutis, subius incanis* ; *ramis tomentosis*. Willd.

*Stachelina chamæpeuce*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1786. n°. 7.

*Stachelina foliis linearibus, confertis, longissimis, revolutis*. Linn. Syst. veget. pag. 615.

*Serratula chamæpeuce*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1147.

*Centaurea calicibus inermibus ; squamis lanceolatis ; foliis linearibus, confertis, integerrimis*. Hort. Cliff. 421. — Roy. Lugd. Bat. 138.

*Jacea fruticosa, pini folio*. C. Bauh. Pin. 271. — Pluk. Almag. pag. 190. tab. 94. fig. 3.

*Chamæpeuce*. Prosp. Alpini. Exot. pag. 77. tab. 76.

*Stache capitata, chamæpinus fruticosa, cretica*. Pon. Ital. 75.

*Stache cretica fruticosa, pini angustis foliis*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 135. f. 7. tab. 26. fig. 8.

*Jacea cretica, frutescens, alychris folio ; flore magno, purpureo*. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 32.



C'est un arbrisseau remarquable par la disposition & par la forme de ses feuilles très-étroites, fort longues, très-ferrées, & qui donne à cette plante l'aspect d'un petit pin.

Ses racines sont dures, épaisses, un peu rameuses, blanchâtres : il s'en élève plusieurs tiges droites, grêles, tomenteuses, alongées, médiocrement rameuses, garnies de feuilles nombreuses, épaisses, très-rapprochées, sessiles, fort longues, un peu aiguës, très-entières & roulées à leurs bords, verdâtres en dessus, blanches & tomenteuses à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées presque en panicule, ou en une sorte de petit corymbe lâche à l'extrémité des tiges. Les calices sont ovales, un peu oblongs, composés d'écailles imbriquées, ovales, obtuses ou un peu aiguës, très-ferrées. Les corolles sont formées de fleurons hermaphrodites, de couleur purpurine ou un peu rougeâtre, presque une fois plus longs que les calices ; les femences aigrettées ; le réceptacle garni de paillettes.

Cette plante croît naturellement dans l'île de Crète. *h* (*V. f.*)

### 32. SARRÊTE imbriquée. *Serratula imbricata*.

*Serratula foliis ovatis, mucronatis, imbricatis.* Thunb.

*Stachelina imbricata.* Thunberg, Prodr. 143. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1786. n°. 8.

*Stachelina foliis subulatis, erectis, tomentosis.* Linn. Mantiss. 181.

*Stachelina (imbricata), calicibus turbinatis; foliis ovatis, acuminatis, imbricatis.* Bergius, Plant. Cap. pag. 233.

Arbrisseau peu élevé, dont les tiges sont droites, rugueuses, presque tomenteuses, munies de rameaux presque ombelliformes, divisés en d'autres de même forme, simples, droits, filiformes, alongés, blanchâtres & tomenteux, garnis de feuilles sessiles, épaisses, ovales, acuminées, d'un vert glauque, un peu rugueuses à leur face supérieure, tomenteuses & blanchâtres en dessous, très-rapprochées, imbriquées, longues d'une ligne & plus.

Les fleurs sont ordinairement au nombre de deux à l'extrémité des rameaux, droites, l'une sessile, l'autre médiocrement pédonculée. Le calice est turbiné, composé d'écailles tomenteuses, linéaires, lancéolées, roides, aiguës, presque glabres dans leur vieillesse, les supérieures un peu plus longues, dominées à leur sommet par d'autres écailles lancéolées, aiguës, d'un blanc-bleuâtre, un peu réfléchies. La corolle est formée de fleurons hermaphrodites, un peu plus courts que les écailles calicinales, divisés à leur sommet en cinq découpures droites, aiguës. L'ovaire est

ovale, à six angles, couronné d'une aigrette simple, sessile, violette, un peu plumeuse, un peu plus longue que la corolle ; le réceptacle est dépouillé de paillettes, seulement hérissé de points élevés ; caractère qui doit rigoureusement faire exclure cette espèce de ce genre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance *h*

### 33. SARRÊTE à corymbes. *Serratula corymbosa*.

*Serratula foliis cuneiformibus, dentatis, subulatis tomentosis; floribus paniculatis.* Thunb.

*Stachelina corymbosa.* Thunb. Prodr. pag. 143. — Willd. Spec. Plant. vol. 3, pag. 1786. n°. 9.

*Stachelina foliis cuneatis, pinnatis; floribus corymbosis.* Linn. f. Suppl. 359.

Arbrisseau dont les rameaux sont prolifères, droits, blanchâtres ; les feuilles alternes, médiocrement pétioolées, distantes, cuneiformes ou linéolées, comme rongées à leurs bords, obtus ou émoussés à leur sommet, quelquefois munies de trois dents, blanchâtres & tomenteuses à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en une sorte de panicule ou en un corymbe composé. Le calice est muni d'écailles très-courtes, imbriquées, blanchâtres ; les femences surmontées d'une aigrette blanche, sessile, plus longue que le calice.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. *h*

### 34. SARRÊTE à feuilles de gnaphale. *Serratula gnaphaloides*.

*Serratula foliis filiformibus, tomentosis; squamis calicinis lanceolatis, apice membranaceis reflexis.* Linn.

*Stachelina gnaphaloides.* Linn. Spec. Plant. vol. 2, pag. 1176. — Miller, Dict. n°. 1. — Bergius, Plant. Capens. pag. 232. n°. 1.

*Gnaphalium foliis linearibus, floribus terminalibus, calicibus cylindricis, squamis reflexis.* Royen, Lugd. Bat. 151.

*Jacaa aethiopica, stachadis citrina majoribus tomentosis foliis; capitulorum spinis & squamis ex auro colore nitentibus.* Pluken. Almag. pag. 193. tab. 332. fig. 3. — Rai, Suppl. 203.

Cette espèce a, dans son port & ses feuilles, l'aspect d'un *gnaphalium*, remarquable par le duvet épais, tomenteux, blanchâtre qui recouvre toutes ses parties.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges sont très-courtes, ligneuses, divisées en rameaux droits, cylindriques, liés, nombreux, presque fascicu-

les, médiocrement ramifiés, couverts d'un duvet blanc, très-épais, garnis de feuilles alternes, sessiles, linéaires, presque filiformes, élargies à un peu décourantes à leur base, longues au moins de deux pouces & plus, assez nombreuses, entières à leurs bords, obtus à leur sommet, chargées à leurs deux faces d'un duvet blanc, tomenteux, très-épais, traversées à leur face supérieure d'un sillon longitudinal.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux, assez nombreuses, supportées par de longs pédoncules nus, cylindriques, simples, tomenteux. Le calice est ovale, oblong, comme tronqué, composé d'écaillés imbriquées, linéaires, alongées, roussâtres, tomenteuses, particulièrement sur leur dos, glabres & membraneuses à leurs bords, aiguës à leur sommet; leur partie supérieure fortement réfléchie & presque appliquée sur l'inférieure; les écaillés du bas graduellement plus courtes. La corolle renferme des fleurs tous égaux, hermaphrodites, à peine aussi longues que le calice. Leur tube est grêle, cylindrique, divisé à son orifice en cinq découpures égales. Les semences sont courtes, presque quadrangulaires, surmontées d'une aigrette simple, sessile, plumbeuse, blanchâtre, un peu plus longue que la corolle. Le réceptacle est garni de paillettes ovales, obtuses, à leur sommet, trois fois plus courtes que les fleurs.

Cette plante croît en Afrique & au Cap de Bonne-Espérance. *h* (*V. f. in herb. Lam.*)

35. SARRÊTE fasciculée. *Serratula fasciculata*.

*Serratula foliis fasciculatis, tereti-subulatis, tomentosis*. Thunb.

*Stachelina fasciculata*. Thunb. Prodr. pag. 143.

*Lachnospermum eriofolium*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1787.

Arbustueux dont les rameaux sont roides, diffus, tomenteux, garnis de feuilles extrêmement petites, longues à peine d'une demi-ligne, cylindriques, fasciculées, obtuses à leur sommet, enveloppées d'un duvet tomenteux.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux, médiocrement pédonculées, quelquefois géminées, de la grandeur de celles du *Serratula frutescens*. Leur calice est cylindrique, tomenteux, composé d'écaillés imbriquées, ovales, acuminées; leur pointe alongée, écartée. Le réceptacle est velu, garni de poils de la longueur des fleurs qui sont tous hermaphrodites. Les semences sont très-vielles, mais dépourvues d'aigrette, caractère qui s'écarte des attributs particuliers à ce genre, & d'après lequel Willdenow en a établi un nouveau sous le nom de *Lachnospermum*.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. *h*

\*\*\* *Cnicus*. Linn.

36. SARRÊTE uniflore. *Serratula uniflora*.

*Serratula foliis pinnatifidis, calice scarioso, villoso*. Linn.

*Cnicus uniflorus*. Linn. Mant. 372. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1685. n°. 51.

*Centaurea calicibus membranaceis, foliis pinnatifidis, dentatis*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 86. tab. 38.

Cette espèce a l'aspect d'une centauree. Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds, légèrement anguleuses, de la grosseur du petit doigt, un peu lanugineuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, un peu blanchâtres, pinnatifides, dont les découpures sont alternes; les feuilles supérieures beaucoup plus petites, très-entières; les radicales très-grandes, pétiolées, laciniées; les découpures lancéolées, dentées en scie.

Il n'existe qu'une seule fleur située à l'extrémité des tiges, sans pédoncule particulier. Le calice est grand, globuleux, composé d'écaillés imbriquées, scarieuses, lâches, ovales, velues, de couleur grisâtre. La corolle est grande, de couleur violette, uniquement formée de fleurs tous hermaphrodites, divisés à leur sommet en six découpures linéaires, aiguës. Les étamines sont blanches, plus longues que la corolle; le style filiforme, violet, plus long que les étamines; les semences surmontées d'une aigrette sessile, plumbeuse; le réceptacle pileux.

Quoique cette plante s'éloigne des sarrêtes par ses calices lâches, très-gros & globuleux, elle y convient mieux qu'à tout autre genre par ses caractères génériques.

On rencontre cette plante dans la Sibérie. *z*

37. SARRÊTE penchée. *Serratula cernua*.

*Serratula foliis subius tomentosis, amplexicaulis, ovatis, dentatis; radicalibus cordatis; petiolis alatis, dentatis; calice scarioso, subsolitario, cernuo, terminali*. Willd.

*Cnicus cernuus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1686. n°. 53.

*Cnicus (cernuus), foliis cordatis; petiolis crispis, spinosis, amplexicaulis; flaribus cernuis*. Hort. Upi. 251.

*Cordus foliis ex cordato-lanceolatis, margine serratis & spinosis; squamis calicum membranaceis, lacinis, spinosis; capitulis nutantibus*. Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 47. tab. 19.

Cette

Cette plante a des tiges droites, presque nues, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, presque en cœur, ovales, dentées, tomenteuses à leur face inférieure; les radicales pétiolées, en forme de cœur, un peu lancéolées; les pétiolées ailes, un peu crépus, dentées; les dentures inégales, un peu épineuses.

Les fleurs sont penchées, presque solitaires à l'extrémité des tiges. Leur calice est composé d'écaillés un peu lâches, membraneuses, imbriquées, scarieuses à leurs bords, un peu déchirées, presque épineuses à leur sommet. La corolle est formée de stamens tous hermaphrodites; les semences surmontées d'une aigrette sessile.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. ♀

38. SARRÈTE à fleurs de carthame. *Serratula carthamoides*.

*Serratula foliis inermibus, sessilibus, oblongis, dentatis; radicalibus indivisis pinnatifidis; calice scarioso, villosa.* Willd.

*Cnicus carthamoides.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1686. n°. 52.

Ses tiges sont droites, épaisses, cylindriques, flétries, garnies de feuilles sessiles, oblongues, dentées; les radicales très-entières, simplement dentées, ou bien quelquefois pinnatifides ou en forme de lyre, à découperes dentées; les feuilles culinaires ovales ou allongées; les unes dentées, d'autres très-entières.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges, grandes, de couleur purpurine; leur calice composé d'écaillés imbriquées, scarieuses, un peu ardoises ou ovales, velues ou pubescentes.

Cette plante croît dans la Sibérie. ♀ (*Descript. ex Willd.*)

39. SARRÈTE à feuilles d'artichaut. *Serratula cynarifolia*.

*Serratula foliis pinnatifidis, calicibus scariosis, squamis acuminatis.*

*Cnicus centaurioides.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1157. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1685. n°. 50.

*Carduus inermis, foliis pinnatifidis, serratis, inermibus; squamis calicinis membranaceis, acuminato-lanceolatis.* Hort. Cliff. 392.

*Centaurium majus, foliis cinara cornuti.* Morif. Hist. 3. pag. 131. & 7. tab. 25. fig. 2.

*Centaurium majus, foliis cinara.* Toutn. Inst. R. Herb. 449.

Il convient de rappeler ici cette espèce, que Linné avoit placée parmi les *Cnicus*, genre dont Botanique. Tome VI.

les limites étoient trop peu circonscrites, & que M. Lamarck a supprimé en faisant rentrer plusieurs des espèces qu'il contenoit, soit dans les *Carduus*, soit parmi les *Astragalus*.

Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, anguleuses, simples ou médiocrement rameuses; garnies de feuilles radicales très-amples, assez semblables à celles des artichauts, pinnatifides; les pinnules lancéolées, confluentes à leur base, dentées à leurs bords, obtuses ou un peu aiguës, point épineuses, vêtues à leur face supérieure, blanchâtres en dessous; les feuilles culinaires supérieures presque sessiles, presque entières ou déchiquetées, laciniées à leur contour.

Les fleurs sont terminales, solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux, un peu globuleuses; les calices composés d'écaillés scarieuses, imbriquées, lancéolées, un peu acuminées, un peu hipides, jaunâtres. La corolle est formée de stamens égaux, hermaphrodites, de couleur purpurine; les semences couronnées d'une aigrette sessile.

Cette plante croît dans les Pyrénées; on la rencontre aussi dans la Sibérie.

40. SARRÈTE à tête épineuse. *Serratula echinocephalus*.

*Serratula foliis sessilibus, rigidis, profunde pinnatifidis, subtus tomentosis; laciniis linearibus, apice spinosis; calicibus globosis, glabris; squamis lanceolatis, spinosis, patulis.* Willd.

*Cnicus echinocephalus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1685. n°. 49.

Ses tiges sont droites, simples, hautes de quatre ou six pouces, tomenteuses, garnies de feuilles alternes, très-rapprochées, sessiles, roides, profondément pinnatifides; les pinnules linéaires, très-entières, distantes, un peu épineuses à leur sommet, vertes & glabres à leur face supérieure, tomenteuses en dessous.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges, quelques-unes supportées par des rameaux très-courts, situés dans l'aisselle des feuilles supérieures. Leur calice est globuleux, parfaitement glabre, composé d'écaillés imbriquées, de couleur purpurine, lancéolées, terminées à leur sommet par une pointe roide, épineuse, un peu rejetée en dehors. La corolle renferme des stamens tous hermaphrodites. Les semences sont surmontées par une aigrette sessile.

Cette plante croît sur les rochers dans la Taurique. ♀

41. SARRÈTE pinnatifide. *Serratula pinnatifida*.

*Serratula foliis petiolatis, oblongis, pinnatifidis.* Bbb

*dentatis, lanatis; calice cylindrico, terminali; squamis adpressis, oblongis, cartilagineo, mucronatis; mucronibus patulis.* Willd.

*Cnicus pinnatifidus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1684. n°. 47.

*Carduus (pinnatifidus), foliis pinnatifidis, tomentosis, nervis lanatis, caule unifloro.* Cavan. Ic. rar. vol. t. pag. 58. tab. 83.

*Jacea hispanica, latifolia, nervis foliorum lanuginosis.* Tournef. Inst. R. Heib. 445. — Boccon. Mus. pars 2. pag. 64. tab. 54.

Ses tiges sont simples, droites, hautes de quatre à cinq pouces, munies d'un duvet tomenteux, garnies de feuilles pétioles, alternes, ovales, oblongues, pinnatifides ou presque en lyre, dentées à leurs bords, point épineuses, revêtues, tant en dessus qu'en dessous, d'un duvet lanugineux, plus épais & tomenteux, tant sur la principale nervure que sur les veines.

Les fleurs sont foliaires à l'extrémité des tiges. Leur calice est un peu oblong, cylindrique, muni d'écaillés imbriquées, ovales, oblongues, cartilagineuses & mucronées à leur sommet; leur pointe élargie. La corolle est composée de fleurons égaux, tous hermaphrodites, & les semences surmontées d'une aigrette sessile.

Cette plante croît naturellement dans l'Espagne. ☉

#### 42. SARRÊTE jaunâtre. *Serratula flavesceus.*

*Serratula foliis lanceolatis, dentatis, inermibus, glabris, obsoletè decurrentibus; calice cylindrico terminali; squamis adpressis, oblongis, obtusis, mucronatis; mucronibus patentibus.* Willd.

*Cnicus flavesceus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1683. n°. 46.

*Carduus (flavesceus), foliis lanceolatis, integris, inermibus, dentatis, glabris; floribus aphyllis, inermi-spinosis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1156. — Cavan. Ic. rar. vol. t. pag. 35. tab. 46.

Cette plante, quoique déjà mentionnée parmi les chardons, est évidemment étrangère à ce genre, & doit en être exclue, ayant un calice cylindrique, muni d'écaillés oblongues, obtuses, point épineuses, mais seulement mucronées à leur sommet. (Voyez le CHARDON JAUNÂTRE, vol. 1. pag. 706.)

Cette plante croît en Espagne. ☉

#### 43. SARRÊTE dentée. *Serratula dentata.*

*Serratula foliis amplexicaulis, lanceolatis, duplicato-dentatis, subhis lanuginosis; caule unifloro; calicinis squamis ovato-lanceolatis, mucronatis, adpressis.* Willd.

*Cnicus dentatus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 681. n°. 41.

Ses tiges sont droites, hautes d'un demi-pied & plus, très simples, carénées, lanugineuses, particulièrement à leur partie supérieure. Les feuilles caulinaires sont peu nombreuses, ordinairement au nombre de quatre; les inférieures, médiocrement pétioles; les feuilles supérieures sessiles, amplexicaules, longues d'un pouce & demi à deux pouces, étroites, lancéolées, rétrécies à leur base, garnies à leur contour d'une dentelure double, vertes à leur face supérieure, lanugineuses en dessous.

Les fleurs sont foliaires, situées à l'extrémité des tiges, à peu près aussi grandes que celles du *carduus defloratus*. Les calices sont composés d'écaillés imbriquées, très-serrées, ovales, lancéolées, mucronées à leur sommet.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ✕ (Descript. ex Willden.)

#### 44. SARRÊTE poragère. *Serratula oleraceus.*

*Serratula foliis amplexicaulis, cordatis, pinnatifidis, ciliatis-serratis; floribus terminalibus, subracemosis, bracteatis; bracteis subcoloratis, ovatis; calicinis squamis lanceolatis, spinosis.* Willd.

*Cnicus oleraceus.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1678. n°. 36.

*Cnicus (oleraceus), foliis pinnatifidis, carinatis, nudis; bracteis concavis, integris, subcoloratis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1156. — Hort. Clifort. 354. — Flor. suec. 711. 723. — Rey. Ged. t. pag. 198. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 998. Sub circio. — Neck. Gallob. pag. 140. — Pollich, Pal. n°. 771. — Matusch. Sil. n°. 592. — Derr. Nass. 83. — Kniph. Centur. 12. n°. 29. — Vailh. Paris, 58. — Wed. Flor. dan. tab. 860. — Hoffm. Germ. 185. — Roth, vol. 1. pag. 344. — vol. II. pag. 280.

*Cirsium foliis ciliatis, amplexicaulis, inermibus, flore comprehentibus.* Haller, Helv. n°. 173.

*Carduus pratensis, latifolius.* C. Bauh. Pin. 376.

*Cnicus pratensis, oenanthifolius; flore flavescente.* Tourn. Inst. R. Herb. 450.

*Carduus pratensis trogi.* Lobel, Icon. pars 2. tab. 11. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 42. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 7. tab. 29. fig. 20.

8. *Cirsium longissimum.* C. Bauh. Pin. 177.

Cette espèce est remarquable par ses grandes feuilles pinnatifides, molles, munies à leurs bords, d'épines souples, & par les calices garnis en dessous de quelques feuilles en forme de bractées, ce qui la rapproche des carthames.

Ses tiges sont droites, hautes de trois à quatre pieds de davantage, ramoules, cylindriques, lisses, glabres, un peu pubescentes, & même légèrement coruscantes à leur sommet, tendres, un peu fistuleuses, garnies de feuilles amplexicaules, en cœur à leur base, approchant de celles des acanthes ; les inférieures, très-amples & longues ; les supérieures, plus étroites, pinnatifides, les découpures, ovales, oblongues, obtuses, glabres, d'un vert-pâle à leurs deux faces, armées à leur contour de cils épineux, peu piquans, inégaux, jaunâtres.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, au nombre de deux ou trois, supportées par des pédoncules courts, simples, cotonneux, un peu inclinés. Les calices sont épais, ovales, un peu cylindriques, glabres, garnis en dessous de deux ou trois folioles entières, un peu sinuées & ciliées à leurs bords, obtuses, sessiles. Les écailles calicinales sont étroites, imbriquées, lancéolées, aiguës, terminées par une petite épine molle. La corolle est jaune, & contient des fleurs tous hermaphrodites. Les semences sont couronnées par une aigrette blanchâtre, sessile & plumule. Le réceptacle est un peu velu, garni, particulièrement vers sa circumscissure, de poils très-longues, linéaires, entières, luisantes, coriaces.

Cette plante croît dans les lieux humides & les prés, au milieu des forêts. (V. v.)

Les feuilles de cette plante, dans leur jeunesse, sont souvent substituées à celles du chou, comme herbe potagère, surtout dans plusieurs contrées de la Russie. Les chevaux, les chèvres & les cochons les mangent ; les chèvres & les moutons les rejettent.

#### 45. SARRÊTE pauciflore. *Serratula pauciflora*.

*Serratula foliis amplexicaulibus, ovatis, sublyratis, ciliatis-ferratis, floribus radicalibus lyratis, floribus glomeratis ; calicinis squamis lanceolatis, interioribus patulis.* Willd.

*Cnicus pauciflorus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1677. n°. 34. — Waldst. & Kitzeib. Planc. rar. Hungar.

Cette plante a des tiges droites, presque simples, nues à leur partie supérieure, garnies inférieurement de feuilles alternes ; les radicales très-amples, longues d'un pied, ovales, alongées, élargies, un peu sinuées en forme de lyre. Les feuilles caulinaires sont oblongues, ovales, rétrécies à leur partie inférieure, élargies & amplexicaules à leur base, ciliées en dents de scie à leurs bords, ridés au toucher, vertes à leur face supérieure, plus pâles en dessous.

Les fleurs sont agglomérées, au nombre de trois

ou quatre, à l'extrémité des tiges. Leur calice est composé d'écailles imbriquées, lancéolées & linéaires élargies, peu ferrées ; les fleurs sig-culculées, hermaphrodites ; les semences couronnées d'une aigrette sessile.

Cette plante croît sur les montagnes, dans la Hongrie. (V. Descript. ex Willden.)

#### 46. SARRÊTE de Carniole. *Serratula carniolica*.

*Serratula foliis cordatis, amplexicaulibus, ovato-oblongis, dentatis, ciliatis ; radicalibus oblongis, obusis, sinuatis, ciliatis ; floribus terminalibus, subcongestis ; calicibus involuacratibus ; squamis linearilanceolatis, patulis.* Willd.

*Cnicus carniolicus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1677. n°. 33. Hoppe.

*Cirsium carniolicum.* Scopul. Carn. n°. 1005. tab. 54.

Cette espèce a quelques rapports avec les carthames, par les bractées qui environnent les calices ; mais elle en diffère par les écailles calicinales.

Les tiges sont droites, striées, hérissées de poils, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, ovales, oblongues, divisées, à leur contour, en grosses denticules inégales, ciliées à leurs bords. Les feuilles radicales sont pétiolées, plus amples, ovales, alongées, sinuées ou médiocrement échancrées, garnies de poils rudes à leurs deux faces.

Les fleurs sont presque agglomérées à l'extrémité des tiges, de couleur jaune, de la grosseur de celles du *Serratula oleracea*. Le calice est garni, à leur base, d'une forte d'involucre composé de trois folioles lancéolées, munies de cils très-longues, fort nombreux ; les écailles calicinales linéaires, lancéolées, étalées.

Cette plante croît sur les montagnes alpines de la Carniole. (V. Descript. ex Willden.)

#### 47. SARRÊTE autaret. *Serratula autaretica*.

*Serratula foliis cordatis, amplexicaulibus, pinnatifidis, apice lanceolatis, ciliato-spinosis, subius sublanuginosis ; floribus glomeratis ; calicinis squamis ovato-lanceolatis, mucronatis.* Willd.

*Cnicus autareticus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1676. n°. 32.

*Carduus autareticus.* Villars, Dauph. vol. 3. pag. 12. tab. 19.

Ses tiges sont droites, couvertes d'un duvet lanugineux, garnies dans toute leur longueur de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, dilatéées à leur base, en forme de cœur, pinnatifides dans leur milieu, lancéolées, alongées vers leur sommet, armées à leurs bords de cils épineux ; les

Bbb 4

découpures terminées par une pointe épineuse, glabres, verdâtres à leur face supérieure, légèrement lanugineuses en dessous.

Les fleurs sont agglomérées à l'extrémité des tiges; leur calice composé d'écaillés imbriquées, ovales, lancéolées, mucronées, & lâches à leur sommet. La corolle est blanche, & renferme des fleurs tous hermaphrodites; les semences, surmontées d'aigrettes sessiles.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, particulièrement dans la ci-devant Dauphiné. x

48. SARRÊTE des montagnes. *Serratula montana*.

*Serratula foliis amplexicaulis, pinnatifidis, scabris, spinoso-ciliatis, laciniis alternis, oblongo-ciliatis, trimeris; caule ramofo; floribus glomeratis; calicinis squamis ovatis, apice patulis.* Willd.

*Cnicus montanus.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1676. n°. 31. — Walld. & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Cette plante a des tiges droites, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, amplexicaules, rudes au toucher, pinnatifides, épineuses & ciliées à leurs bords. Les découpures sont alternes, oblongues, lancéolées, marquées de trois nervures. Les fleurs sont agglomérées à l'extrémité des rameaux; les calices composés d'écaillés ovales, imbriquées, lâches à leur sommet. La corolle est purpurine; elle renferme des fleurs tous hermaphrodites, & des semences à aigrettes sessiles.

Cette plante croît sur les montagnes arides de la Croatie. x

49. SARRÊTE de Salzbourg. *Serratula salisburgensis*.

*Serratula foliis densatis, ciliatis, nudis; caulibus amplexicaulis, pinnatifidis; radicalibus indivisis, oblongis caule bifloro; calicinis squamis ovato-lanceolatis, adpressis.* Willd.

*Cnicus salisburgensis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1675. n°. 29.

*Carduus rivalaris.* Hoppe.

Cette plante peut avoir des rapports avec le *carduus rivalaris* de Jacquin; elle en diffère par ses feuilles radicales, entières, & par plusieurs autres caractères.

Ses tiges sont droites, simples, hérissées de poils roides, garnies de feuilles alternes; les caulinares amplexicaules, pinnatifides; les radicales oblongues, entières, glabres à leurs deux faces, souvent munies en dessous de quelques poils rares & très-courts, dentées & ciliées à leurs bords;

les tiges terminées par deux fleurs dont les calices sont composés d'écaillés imbriquées, très-étroites, ovales, lancéolées, un peu aiguës.

Cette plante croît dans les prés humides, aux environs de Salzbourg. x

50. SARRÊTE moyenne. *Serratula media*.

*Serratula foliis sessilibus, pinnatifidis; laciniis subtrifidis, ciliato-spinosis; caule ramofo; calicibus nudis; squamis ovato-lanceolatis, mucronatis, adpressis.* Willd.

*Cnicus medius.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1675. n°. 27.

*Cicum medium.* Allion. Flor. pedem. n°. 542. tab. 49. (Exclusio synonymo Gouani.)

Cette espèce, d'après l'observation de Willdenow, ne doit pas être confondue avec le *carduus medius* de Gouan, illustr. pag. 61. tab. 24, dont les feuilles sont decurrentes, tandis que dans celles-ci elles sont seulement sessiles.

Ses tiges sont droites, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, pinnatifides; les pinnules presque à trois divisions, munies à leurs bords de cils épineux. Les fleurs sont terminales; les calices nus, composés d'écaillés serrées, imbriquées, ovales, lancéolées, mucronées à leur sommet.

Cette plante croît naturellement en Italie. x

51. SARRÊTE sans épines. *Serratula inermis*.

*Serratula foliis sessilibus, lanceolatis, inciso-dentatis, subtus tomentosis, radicalibus pinnatifidis; calicinis squamis ovato-lanceolatis, margine membranaceis adpressis.* Willd.

*Cnicus inermis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1672. n°. 22.

Ses tiges sont hautes, droites, cannelées, verdâtres, feuillées, légèrement velues. Les feuilles radicales sont grandes, longues d'un pied ou d'un pied & demi, profondément pinnatifides, dentées à leurs bords, glabres à leur face supérieure, blanches & tomenteuses en dessous, presque semblables à celles des arithautes; les feuilles caulinares inférieures sessiles, longues de quatre à six pouces, rétrécies vers leur base, acuminées à leur sommet, pinnatifides dans leur partie moyenne ou fortement incisées, dentées à leur contour, vertes à leur face supérieure, d'un blanc de neige & tomenteuses en dessous; les feuilles supérieures & terminales lancéolées, très-entières, rétrécies à leurs deux extrémités, dentées, blanches & velues en dessous.

Les fleurs sont solitaires & terminales, trois fois plus grosses que celles du chardon lancéolé. Leur calice est composé d'écaillés imbriquées,

ovales, lancéolées, dépourvues d'épines, ainsi que toutes les autres parties de la plante ; les extérieures beaucoup plus courtes, membraneuses & velues à leurs bords, glabres dans leur centre. Les fleurs sont formées de fleurons rous hermaphrodites ; les semences surmontées d'aigrettes fécales.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. ( *Descript. ex Willd.* )

52. SARRÊTE lanugineuse. *Serratula lanata*.

*Serratula foliis sessilibus, lanceolatis, sinuatis, glabris, subtus tomentosis, margine spinosis; calicibus oblongis; squamis ovatis, mucronatis, recurvatis.* Willd.

*Cnicus lanatus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1671. n°. 22.

*Carduus lanatus*. Roxb. in litt.

Cette plante a des tiges droites, glabres, striées, rameuses, garnies de feuilles alternes, sessiles, oblongues, lancéolées, sinuées à leur contour, longues d'environ deux pouces, munies à leurs bords de cils épineux, de couleur jaunâtre; glabres à leur face supérieure, lanugineuses & tomenteuses en dessous.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, supportées par des pédoncules simples, pubescents, uniflores, point feuillés. Leur calice est oblong, pubescent, composé d'écaillés imbriquées, ovales, mucronées & recourbées à leur sommet. La corolle renferme des fleurons rous fertiles : les semences sont aigrettées, les aigrettes fécales.

Cette plante a le port du *serratula arvensis* de l'Inde. Elle croît dans les Indes orientales. ( *Descript. ex Willd.* )

53. SARRÊTE de deux couleurs. *Serratula discolor*.

*Serratula foliis sessilibus, pinnatifidis, hirsutis, subtus tomentosis; laciniis bilobis, divaricatis, spinosis; calicibus globosis, arachnoidea-pubescentibus; squamis ovatis, adpressis, apice spinosis; spinis potentibus.* Willd.

*Cnicus discolor*. Mühlenberg. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1670. n°. 18.

Ses tiges sont brisées, droites, hispides, garnies de feuilles sessiles, alternes, pinnatifides, vertes à leur face supérieure, & recouvertes de quelques poils rares, épars, très-courts; blanches & tomenteuses à leur face inférieure; les découpures divises en deux lobes écartés, épineux à leur sommet.

Les fleurs sont terminales, de la grandeur de celles du *carduus lanceolatus*; leur calice globuleux, pubescent, enveloppé de squames sembla-

bles à une toile d'araignée, composé d'écaillés imbriquées, ovales, très-ferrées, armées à leur sommet d'une épine subulée, rejetée un peu en dehors; les fleurs composées de fleurons hermaphrodites & les semences couronnées d'une aigrette fécale.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale. ( *Descript. ex Willd.* )

54. SARRÊTE du Levant. *Serratula orientalis*.

*Serratula foliis sessilibus, pinnatifidis, supra glabris, subtus tomentosis; laciniis lanceolatis, spinosis; calicibus ovatis, laciniis adpressis, exterioribus subulatis, spinosis; interioribus lanceolatis.* Willd.

*Cnicus orientalis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1670. n°. 17.

Ses tiges sont tomenteuses, garnies de feuilles étroites, pinnatifides, glabres à leur face supérieure, tomenteuses seulement par leur côté principal, d'un blanc de neige & tomenteuses en dessous; leurs découpures sont courtes, lancéolées, armées à leur sommet & un peu au dessus de leur base, d'une pointe épineuse.

Les fleurs sont terminales, une fois plus petites que celles du *carduus lanceolatus*; leur calice est ovale, pubescent, composé d'écaillés imbriquées, fortement ferrées; les extérieures subulées, terminées par une pointe épineuse; les écaillés intérieures lancéolées, épineuses à leur sommet.

Cette plante croît naturellement dans le Levant. ( *Descript. ex Willd.* )

55. SARRÊTE à tête blanche. *Serratula leucocephala*.

*Serratula foliis caulinis sessilibus, pinnatifidis, hispida, subtus tomentosis; laciniis lanceolatis, apice spinosis; calicibus cylindraceis, alternis, villosis, involucriatis; squamis oblongis, adpressis, spinosis; spinis recurvatis.* Willd.

*Cnicus leucocephalus*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 1668. n°. 13.

*Cirsium creticum, elisimum, cardui lanceolati folia; flore albo*. Tournet. Inst. R. Herb. coroll. 32.

Ses tiges sont très-élevées, garnies dans leur longueur de feuilles alternes, sessiles; les radicales sont pétiolées, hispides, tomenteuses à leur face inférieure, glabres en dessus, pinnatifides; les découpures lancéolées, divises en deux lobes écartés, épineux à leur sommet, ciliés à leurs bords; les feuilles caulinaires sessiles, pinnatifides; les découpures lancéolées, entières, roulées à leurs bords, armées à leur sommet d'une forte épine jaunâtre, & dans la sinuosité des découpures.

Les fleurs sont alternes, axillaires, médiocres.

ment p'donculées. Les calices, un peu plus grands que ceux du *carduus casabona*, tout velus, cylindriques, garnis d'écaillés oblongues, serrées, très-nombreuses, aradées à leur sommet d'une épine courte, recourbée en dehors : à la base du calice est un involucre composé de trois à cinq feuilles. La corolle est blanche, formée de fleurons hermaphrodites.

Cette plante croît naturellement dans l'île de Crète. (*Descript. ex Willd.*)

56. SARRÊTE piquante. *Serratula pungens*.

*Serratula foliis decurrentibus, subris lanuginosis, pinnatifidis, spinosis; floribus racemosis glomeratis; fructibus calicibus ovatis, spinosis; spinis patentibus.* Willden.

*Cnicus pungens.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 162. n°. 2.

*Cirsium orientale, acanthifolium; flore obsoletè purpureo.* Tournef. Inst. R. Herb. coroll. 32.

Cette espèce se rapporte, par ses fleurs & son port, au *carduus palustris*, & par la forme de ses feuilles, au *carduus lanceolatus*; peut-être seroit-elle mieux placée parmi les chardons.

Ses tiges sont droites, rameuses, élevées, filonées, un peu lanugineuses dans les endroits où les feuilles sont décurrentes, armées d'épines fortes, subulées, jaunâtres, longues d'un demi-pouce. Les feuilles sont décurrentes à leur base, pinnatifides, vertes, presque glabres en dessus, blanchâtres & légèrement tomenteuses à leur face inférieure; les pinules divisées en deux ou trois decoupures très-entières à leur sommet, terminées à leur sommet par une épine jaunâtre.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en petites grappes ou paquets agglomérés, de la grosseur de celles du *carduus palustris*; leur calice est muni d'écaillés ovales, très-serrées, armées à leur sommet d'une forte épine roide, jaunâtre, écarlate. La corolle est blanche, toute composée de fleurons fertiles.

Cette plante croît dans l'Arménie. (*Descript. ex Willd.*)

**SARRIÈTE.** *Satureia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs labiées, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les hyssopes, & qui comprend des herbes ou sous-arbrisseaux, tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont verticillées, axillaires ou réunies en têtes terminales, ayant des feuilles opposées, ponctuées dans quelques espèces.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice firié, à cinq dents; une corolle labiée à

quatre lobes; le lobe supérieur presque plane; quatre étamines à peine aussi longues que la corolle.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, droit, firié, persistant, divisé à son orifice en cinq dents droites, presque égales.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière, labiée, dont le tube est cylindrique, plus court que le calice; l'orifice simple, divisé en deux lèvres; la lèvre supérieure droite, presque plane, obtuse, médiocrement échancrée, de la longueur de la lèvre inférieure; celle-ci divisée en trois lobes obtus, presque égaux; le lobe du milieu un peu plus grand.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont fécacés, écartés, de la longueur de la lèvre supérieure, les deux inférieurs un peu plus courts, terminés par des anthères conniventes.

L'ovaire est partagé en quatre lobes, surmontés d'un style fécacé de la longueur de la corolle, terminé par deux stigmates fécacés.

Les semences sont nues, arrondies, au nombre de quatre, renfermées dans le fond du calice persistant & connivent.

*Observations.* Ce genre est déterminé particulièrement d'après la forme du calice & de la corolle. Il diffère peu de l'hyssope. Les calices ne sont pas divisés en deux lèvres, mais terminés à leur orifice en cinq petites dents aiguës, presque égales; ils sont d'ailleurs roides, tubulés ou campanulés, assez fortement firiés, quelquefois dépourvus de firiés. La corolle, ordinairement assez petite, se partage à l'extrémité du tube en deux lèvres courtes; la supérieure entière, presque plane, quelquefois légèrement échancrée; l'inférieure à trois lobes entiers, presque égaux. Dans les hyssopes les calices sont peu firiés, le lobe intermédiaire de la lèvre inférieure de la corolle est crénelé; les étamines saillantes hors de la corolle. Il y a aussi des différences dans le port. En général, les hyssopes sont plus élevées, & quelques espèces ont des feuilles grandes & larges.

Les *calina* ont également de très-grands rapports avec les *sarrètes*, mais ils en diffèrent en ce qu'ils n'ont que deux étamines fertiles. D'ailleurs, l'orifice de leur calice est fermé par une touffe de poils.

Tournefort avoit borné le genre SARRIÈTE à une seule espèce, la *sarrète des jardins*, appuyant le caractère générique sur la disposition des fleurs dans les aisselles des feuilles, mais point verticillées; les autres genres, *thymus*, *tymbra*, *calamintha*, avoient également pour caractère distinctif, la disposition particulière des fleurs, en tête terminale.



dans le *thym*, verticillées dans les *thymra*, axillaires & portées sur des pédoncules rameux dans les *calamaria*. Plusieurs espèces de ces trois genres doivent appartenir dans les *sarrîètes*, d'après le caractère essentiel que j'ai exposé plus haut.

Moench a divisé ce genre en deux, d'après la considération du calice, qui n'est pas le même dans toutes les espèces. Il a conservé le nom de *saturia* à celles dont les calices sont campanulés, point striés, terminés par cinq dents, & qui ne sont point fermés par des poils à l'époque de la maturité. Il a donné le nom de *sabattia* à celles qui ont le calice cylindrique, marqué de stries, & fermé par des poils à son orifice, à l'époque de la maturité.

## E S P È C E S.

1. SARRIÈTE julienne. *Saturia juliana*. Linn.

*Saturia verticillis fsgigatis, foliis linearilanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 793. — Miller, Dict. 1.<sup>o</sup>. 6. — Lam. Illustr. Gener. tab. 304. fig. 2.

*Saturia floribus verticillatis, foliis lanceolatis, glabris*. Royen, Lugd. Bat. 314.

*Saturia spicata*. C. Bauh. Pin. 218.

*Thymra fontis Juliani, sive saturia vera*. Tourn. Inst. R. Herb. 198. — Lobel. Icon. 425. *Mediocris*. — Idem, Advers. pag. 182. Icon.

*Saturia perennis, verticillis spicatis & densius dispositis*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 412. §. 11. tab. 17. fig. 4.

*Thymra vera*. Tabern. Icon.

*Saturia foliis tenuibus, sive tenuifolia, fontis Juliani quondam*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 273. Icon.

*Thymra vera* Pena. Dalech. Hist. 1. pag. 897. Icon.

*Sabattia corymbosa*. Moench. Method. 300.

Cette plante varie beaucoup, par la culture, tant dans la grandeur que dans la forme de ses feuilles; elle est particulièrement caractérisée par ses fleurs en verticilles axillaires, très-serrés; par ses calices hispides; par ses feuilles lanceolées, plus ou moins étroites.

Dans son sol natal cette plante s'élève peu; elle a des tiges grêles, presque ligneuses, médiocrement tetragones; glabres, munies de rameaux droits, nombreux, à peine pubescens, cendrés, garnis de feuilles sessiles, opposées, très-étroites, linéaires ou lanceolées, aiguës, un peu rétrécies à leur base; ces feuilles, par la culture, sont souvent plus larges, ovales, lanceolées ou linéaires, longues de deux à trois lignes, un peu rudes, particulièrement à leur face inférieure; plus ou moins nerveuses, un peu roulées à leurs bords.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en paquets verticilles, en forme de petits corymbes opposés, très-denses, pédunculés, tantôt plus courts, quelquefois plus longs que les feuilles: souvent les verticilles des rameaux tardifs sont peu garnis. Le calice est tubulé, cylindrique, strié, hérissé de poils très-courts, divisé à son orifice en cinq dents droites, presque égales, très-aiguës, fermées par des poils à l'époque de la maturité des semences. La corolle est fort petite, légèrement purpurine ou un peu rougeâtre; son tube plus court que le calice.

Cette plante croît dans l'Étrurie, sur le mont Saint-Julien & sur les bords de la mer de Toscane. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (V. v.)

2. SARRIÈTE nerveuse. *Saturia nervosa*. Desf.

*Saturia caule fruticoso, filiformi; foliis ovatis, fimbriis nervosis; pedunculis multifloris, folio brevioribus; calicibus ciliatis*. Desfont. l'hor. atlant. vol. 2. pag. 9. tab. 121. fig. 2.

*Saturia (nervosa), verticillis congestis; calicibus villosis; foliis ovatis, acutis, fimbriis nervosis, glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 42. n.<sup>o</sup>. 2.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *saturia juliana*, dont elle diffère par ses feuilles ovales, nerveuses en dessous, & par ses calices très-velus.

Il s'élève, d'une souche commune, un grand nombre de tiges grêles, ligneuses, droites, hautes d'environ un pied, revêtues d'un duvet très-court, divisées en rameaux droits, effilés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, roides, ovales, très-entières, glabres à leurs deux faces, nerveuses en dessous, très-aiguës à leur sommet, longues d'environ quatre lignes, sur deux ou trois de large.

Les fleurs sont petites, disposées en verticilles, les uns axillaires, opposés; d'autres terminaux, épais, confluents; supportées par des pédoncules communs, opposés, plus courts que les feuilles. Leur calice est grêle, cylindrique, velu, divisé à son orifice en cinq dents scabres, garnies de cils très-fins, nombreux, alongés; l'orifice fermé par des poils. La corolle est petite, de couleur rose, pubescente, un peu plus longue que le calice, divisée à son orifice en deux lèvres; la supérieure un peu plus courte, plane, obtuse; la lèvre inférieure partagée en trois lobes entiers; celui du milieu plus large, en ovale renversé.

Cette plante a été recueillie, par M. Desfontaines, dans les fentes des rochers sur le mont Atlas. b (V. f.)

3. SARRIÈTE de la Grèce. *Saturia graeca*. Linn.

*Saturia pedunculis axillaribus, tri-steris; bracteis calice brevioribus; foliis ovatis, hispids*,

*felix venosa*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 43. n°. 4.

*Satureia pedunculata subtriflora, lateralibus; involucella calice brevioribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 6. 794. — Miller, Dict. n°. 7.

*Satureia annua, orientalis, tenuior, ad singulos nodos florifera*. Morif. Oxon. Hill. 3. pag. 411. §. 11. tab. 17. fig. 2.

*Clinopodium orientale, origani folio, flore minimo*. Tournef. Coroll. pag. 121.

*Clinopodium minus, exoticum, thymifolio majore, inodorum*. Pluken. Almag. 110. tab. 84. fig. 8.

*Clinopodium ereticum*. Prof. Alpin. Plant. exot. pag. 260. tab. 264.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *Satureia montana*; elle en diffère par ses feuilles presque point mucronées, plus particulièrement par les petits corymbes, la plupart deux à deux & non solitaires dans l'aisselle des feuilles; par quelques bractées en forme de collerette, beaucoup plus courtes que les fleurs, tandis qu'elles sont de la longueur des corymbes dans le *Satureia montana*; enfin par les calices fermés par des poils à la maturité des semences.

Ses tiges sont droites, glabres, presque cylindriques, divisées en quelques rameaux étiles, légèrement pubescents, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées; les inférieures ovales, assez semblables à celles du thym, un peu purpurines à leur face inférieure; les supérieures presque linéaires, entières, longues d'environ trois lignes, étroites, aiguës ou à peine mucronées à leur sommet, un peu roulées à leurs bords, munies à leur face supérieure de quelques poils extrêmement courts, qui paroissent autant de points luisans; nerveuses en dessous.

Les fleurs sont disposées, par verticilles opposés, dans l'aisselle des feuilles, en forme de petits corymbes, ordinairement deux à deux dans chaque aisselle, supportant chacun de trois à six fleurs, munies de petites bractées tubulées, pubescentes, environ une fois plus courtes que le calice, formant une sorte d'involucre. Les calices sont petits, droits, roides, tubulés, cylindriques, striés, hispides, terminés par cinq dents sétacées, presque égales, droites, légèrement ciliées. La corolle est un peu plus longue que le calice, de couleur purpurine en dehors, d'un blanc teint de pourpre en dedans, marquée vers la base de trois taches purpurines plus foncées; celle du milieu beaucoup plus grande.

Cette plante croît dans les îles de l'Archipel & aux environs de Nice. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Elle est à peine odorante. (P. v.)

4. SARRIÈRE filiforme. *Satureia filiformis*. Desfont.

*Satureia villosa, ramulis cretella, filiformibus; foliis inferioribus ovatis, superioribus lanceolatis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 8. tab. 121. fig. 1.

*Satureia (filiformis), pedunculis axillaribus, uniterisive, nudis; foliis ovato-lanceolatis, villosis*. Willd. Spec. I. aut. vol. 3. pag. 43. n°. 5.

Il y a beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Satureia graca*; elle en est distinguée par les poils dont toutes ses parties sont recouvertes; par ses feuilles ovales, lancéolées; par ses pedoncules moins garnis de fleurs & par l'absence des bractées.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges droites, presque ligneuses, velues, filiformes, presque simples, hautes à peine d'un pied, garnies de feuilles fort petites, opposées, presque sessiles ou à peine pétiolées, un peu roulées à leurs bords, très-entières, aiguës, velues à leurs deux faces, ciliées à leur contour; les inférieures ovales; les supérieures lancéolées.

Les fleurs sont disposées, dans l'aisselle des feuilles, en petits corymbes opposés, pedonculés, à peine aussi longs que les feuilles; les pedoncules supportant d'une à trois fleurs. Les calices sont grêles, cylindriques, velus, striés, terminés à leur orifice en cinq dents droites, roides, presque égales, sétacées. La corolle est fort petite, velue, couleur de rose; le tube plus court que le calice, partagé en deux lèvres à son orifice; la lèvre supérieure plane, plus courte, entière; l'inférieure divisée en trois lobes; celui du milieu plus grand, en ovale renversé.

Cette plante a été recueillie, par M. Desfontaines, sur le mont Atlas, dans les sentes des rochers. (P. f.)

5. SARRIÈRE de montagne. *Satureia montana*. Linn.

*Satureia pedunculata lateralibus, solitariis; floribus fasciculatis, sessilibus; foliis mucronatis, linearilanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 794. — Miller, Dict. n°. 3. — Sabbat. Hort. t. tab. 62. — Willden. Arb. 338. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 418. n°. 453. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 275. n°. 3. — Gouan, Monsp. pag. 273.

*Satureia pedunculata axillaribus, cymosis subsessilibus; calicinis segmentis acuminatis, mucronatis; foliis linearilanceolatis, integerrimis, mucronatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 44. n°. 6.

*Satureia racemis lateralibus, solitariis; foliis linearilanceolatis, paniculatis, duris*. Scop. Carn. 1. n°. 738. tab. 30. Mala.

*Satureia*

*Satureia pedunculis foliatis, lateralibus, bis terve dichotomis; foliis linearis-lanceolatis, integerrimis, mucronatis, subulatis, subtus carinatis, punctato-foveolatis.* Wulf. in Jacq. Collect. 2. pag. 132.

*Satureia pedunculis lateralibus, foliatis, trifloris; foliis carinatis, punctatis, ciliatis, mucronatis.* Zinn. Gart. 313. — Willch. Oberv. 109.

*Satureia pedunculis dichotomis, verticillis concaenatis.* Virid. Cliff. 57. — Hort. Upsal. 161. — Royen, Lugd. Bat. 324.

*Satureia pedunculis dichotomis.* Sauv. Monsp. 142.

*Satureia montana, flosculis candidis.* Bot. Monsp. 230.

*Calamintha frutescens, satureia folio, facit & odore.* Tournef. Inst. R. Herb. 194.

*Satureia montana.* C. Bauh. Pin. 218.

*Satureia perennis.* Rivin. Monopet. 41.

*Hyssopus gortensis, floribus verticillatis ambien-  
tibus.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 276. Icon.

*Malissa foliis linearibus, integerrimis.* Hort. Cliff. 108.

*Saxifraga secunda.* Camet. Epitom. 717. B.

*Satureia five thymra altera.* Lobel. Icon. 426. — Idem, Oberv. 232. Icon.

*Thymra.* Dodon. Pempt. 288. Icon.

*Thymra effigies Dodonai.* Dalech. Hist. 1. pag. 898. Icon.

*Satureia trifida.* Mzsch. Method. 386.

On distingue cette espèce du *satureia gracilis* à ses feuilles ponctuées, glabres à leurs deux faces, spinuliformes à leur sommet.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, cylindriques, glabres, hautes d'environ un pied, divisées en rameaux effilés, glabres, blanchâtres ou cendrés, obscurément tétragones, quelquefois un peu hispides, particulièrement les plus jeunes; garnis de feuilles opposées, sessiles, étroites, presque linéaires, très-aiguës, dures, entières, glabres & ponctuées à leurs deux faces, de la longueur ou plus longues que les entre-nœuds. Quelques-unes sont légèrement ciliées dans leur jeunesse.

Les fleurs sont axillaires; elles forment de petits corymbes opposés, pédonculés, peu garnis de fleurs. Les calices sont courts, filés, durs, roides, un peu ouverts, légèrement hispides, à cinq dents écartées, très-roides, subulées, presque égales. La corolle est blanchâtre, quelquefois un peu purpurine, assez grande, un peu pubescente, divisée en deux lèvres assez profondes; la supérieure entière; l'inférieure à trois lobes.

Botanique. Tome VI.

Cette plante croît sur les rochers stériles & dans les lieux montagneux des départements méridionaux de la France, dans l'Italie, la Carniole, la Toscane, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

6. SARRIÈTE DE CRÈTE. *Satureia thymra.* Linn.

*Satureia verticillis subrotundis, hispida; foliis obovato-oblongis, acuminatis, avenis, punctatis, hispida.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 41. n° 3.

*Satureia verticillis subrotundis, hispida; foliis oblongis, acutis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 702. — Royen, Lugd. Bat. 324. — Blackw. tab. 318. — Sabbat. Hort. 3. tab. 71.

*Satureia cretica.* C. Bauh. Pin. 218.

*Thymus frutescens, verticillis ferè nudis, globosis; foliis ovato-lanceolatis.* Hort. Cliff. 306.

*Thymra legitima.* Clus. Hist. 1. pag. 358. — Tournef. Inst. R. Herb. 197.

*Thymum creticum, pona verticillatum.* Barl. Ic. rar. n° 279. tab. 898.

*Satureia cretica, legitima* Diosc. pona. Motif. Ox. Hist. 3. pag. 412. §. 11. tab. 17. fig. 6.

Une corolle plus grande, des feuilles hispides & ponctuées, distinguent cette espèce de la précédente.

C'est un petit arbrisseau dont les tiges & les tiges sont ligneuses, grêles, obscurément tétragones, presque cylindriques, glabres inférieurement, divisées en rameaux nombreux, pubescents, cendrés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, ovales ou ovales-oblongues, fermes, entières, ponctuées, rudes, hérissées, particulièrement à leur face inférieure, de poils courts, roides, cendrés, terminés la plupart par une pointe roide, subulée, spinuliforme.

Les fleurs sont disposées par verticilles globuleux, d'autant plus épais & denses qu'ils sont plus inférieurs, axillaires, opposés, à peu près aussi longs que les feuilles. Les pédoncules sont courts, opposés, un peu rameux. Les calices sont petits, droits, roides, pileux, divisés à leur orifice en cinq dents très-aiguës, presque égales. La corolle est purpurine ou blanchâtre; son tube une fois plus long que le calice, divisé à son orifice en deux lèvres; l'inférieure partagée en trois lobes.

Cette plante croît en Crète, en Syrie, dans les environs de Tripoli, aux environs de Nice, dans les lieux pierreux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. SARRIÈTE DES ROCHERS. *Satureia rupestris.* Jacq.

Cccc

*Satureia pedunculis axillaribus, cymosis, secundis; calicinis segmentis obtusis, mucosis; foliis subrotundis, basi attenuatis, dentatis, obtusiusculis.* Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 44. n°. 7.

*Satureia pedunculis foliariis, lateralibus bifidichotomis, secundis; foliis ovato-lanceolatis, serrulatis, subius foveolato-punctatis.* Wuffen. in Jacq. Collect. pag. 130. — Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 494.

*Satureia pedunculis ramosis, lateralibus, foliariis; foliis ovato-lanceolatis, serrulatis.* Hoff. Synopf. 322.

*Satureia racemis lateralibus, foliariis; foliis ovatis, dentatis.* Scopol. Carn. edit. 1. p. 460. b°. 1.

*Satureia (thymifolia), racemis lateralibus, foliariis; foliis ovatis, raris dentatis.* Scopol. Carn. edit. 2. n°. 737. tab. 29.

Cette plante est distinguée du *satureia montana* par ses feuilles ovales, légèrement denticulées à leurs bords, & par les découpures obtuses de ses calices.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses, droites, un peu rougeâtres, quadrangulaires, à angles mouffus, glabres, divilées en rameaux grêles, effilés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, ovales, courtes, un peu arrondies, glabres à leurs deux faces, ponctuées à leur face inférieure, médiocrement denticulées à leur contour; les dents très-écartées, obtuses à leur sommet, un peu rétrécies en pétiole à leur base.

Les fleurs sont situées dans l'aisselle des feuilles, disposées en petits corymbes opposés, ordinairement plus courts que les feuilles, dont le pedoncule est très-court, rameux, presque en grappe, de six à dix fleurs; chaque pedicule muni d'une petite bractée. Le calice est droit, tubulé, un peu rétréci vers sa base, glabre, strié, divisé à son orifice en cinq dents droites, un peu obtuses, presque égales. La corolle est un peu plus longue que le calice; le tube, un peu courbé, aminci à sa base; l'orifice, marqué de taches rougeâtres, divisé en deux lèvres; la supérieure, ovale, légèrement bisée à son sommet, réfléchie à ses côtés; laèvre inférieure, à trois lobes; les latéraux, ovales & entiers; celui du milieu, médiocrement étalé.

Cette espèce croît sur les rochers, dans la Carniole; son odeur approche beaucoup de celle du *satureia hortensis*.

S. SARREÏTE des jardins. *Satureia hortensis*. Linn.

*Satureia pedunculis axillaribus, subcymosis; foliis lanceolatis, integerrimis; caule brachyoto.* Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 45. n°. 8.

*Satureia pedunculis bifloris.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 794. — Virid. Cliffort. 87. — Hort. Upsal. 162. — Maser. medic. 145. — Roy. Lugd. Bat. 324. — Sauvag. Monsp. 142. — Miller, Dict. n°. 1. — Ludw. Fd. tab. 199. — Kniph. Centur. 3. n°. 80. — Sabbat. Hort. n°. 70. — Regnault, Botan. Icon. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 418. n°. 453. — Gouan, Monp. 273. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 275. n°. 2. — Lam. Illustr. Gen. tab. 504. fig. 1.

*Salvia hortensis.* C. Bauh. Pin. 218. — Blachw, tab. 419. — Boran. Monsp. 130. — Lobel, Icon. 426. — Idem, Observ. 232. Icon.

*Satureia sativa.* Tournef. Inst. R. Herb. 197. — Garidel, Aix. 426. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 272. Icon.

*Satureia.* Dodon. Pempt. 289. Icon.

*Satureia vulgaris, hortensis.* Dalech. Hist. 1. pag. 898. Icon.

*Satureia annua, cunila diaba, vulgaris.* Motif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 17. fig. 1.

*Satureia altera.* Camer. Epitom. 487. Icon.

*Thymus eribus, annuus, foliis lanceolato-linearibus.* Hort. Clus. 306.

Cette plante, si bien connue par ses usages, est caractérisée par ses feuilles glabres, linéaires-lancéolées, & par ses fleurs disposées, la plupart, deux ensemble sur le même pedoncule.

Ses racines sont grêles, médiocrement rameuses, à peine chargées de chevelus: il s'en élève des riges droites, hautes de huit à dix pouces, un peu rougeâtres, pubescentes, dures, un peu tudes au touché, munies d'un grand nombre de rameaux opposés, disposés en une touffe un peu arrondie, garnis de feuilles opposées, légèrement pétioleées, distantes, ouvertes, plus courtes que les entre-nœuds, linéaires, lancéolées, longues d'environ un pouce, presque obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, un peu blanchâtres ou cendrées; les plus jeunes, légèrement pubescentes, à peine ponctuées.

Les fleurs sont axillaires, supportées deux ensemble, quelquefois plus, sur des pedoncules opposés, longs d'environ deux lignes. Leur calice est court, rude, strié, fort petit, un peu renflé, divisé, presque jusqu'à sa moitié, en cinq découpures droites, très-étroites, presque tubuleuses. La corolle est d'un pourpre tendre, rougeâtre ou blanche; le tube, de la longueur du calice, divisé à son orifice en deux lèvres; l'inférieure, à trois lobes.

Cette plante croît naturellement dans les lieux arides des départements méridionaux de la France, en Italie, &c. (V. v.)

Cette plante a une odeur forte, pénétrante, assez agréable; elle est aromatique, stomachique, diurétique, tonique. Son infusion dans le vin est recommandée dans les maux de poitrine, l'asthme, &c. Mais elle n'est guère employée que comme assaisonnement, surtout dans les fèves de marais, dont elle relève le goût. Les Allemands la mêlent à leur choukaut.

9. SARRIÈTE capitée. *Satureia capitata*. Linn.

*Satureia floribus spicatis; foliis carinatis, punctatis, ciliatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 795. — Marer. medic. 145. — Gronov. Orient. 71. — Miller, Dict. n°. 8. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 417. n°. 453. — Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 9. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 275. n°. 1.

*Thymus capitatus, qui Dioscoridia*. C. Bauh. Pin. 119. — Tournef. Infl. R. Herb. 196. — Gattidel, Aix. 463.

*Thymum legitimum*. Cluf. Hist. 1. pag. 357. Icon.

*Thymum creticum, sive antiquorum*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 262. Absque Icon. — Gerard, Hist. 574. Icon.

*Thymum creticum*. Dalech. Hist. 1. pag. 910. Icon.

*Thymum cephalotum*. Dodon. Pempt. 276. Ic.

*Thymum creticum, incanum, capitatum*. Bartel. Icon. nat. tab. 897. Bona.

*Thymum*. Camer. Epitom. 455. Icon. — Matth. Comm. 531. Icon. — Lobel. Icon. 424. — Idem, Observ. 231. Ic.

*Hyssopus capitatus minor, thymi odore*. Morif. Hist. 5. pag. 362. 5. 11. tab. 18. fig. 14.

On reconnoît aisément cette espèce à la disposition de ses fleurs réunies en une tête terminale.

C'est un petit arbrisseau peu élevé, très-rameux, dont les tiges sont droites, glabres, ridées dans leur vieillesse, hautes d'environ un pied; les rameaux, nombreux, diffus, tétragones, à angles moussus, pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles courtes, opposées, sessiles, roides, très-rapprochées, presque de la longueur des entrenœuds, linéaires, relevées en carène sur leur dos, criblées d'un grand nombre de pores à peine sensibles, quelquefois légèrement ciliées vers leur base, contenant dans leur aisselle d'autres feuilles plus petites, fasciculées.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges & des rameaux, en un épi capité, ovale, oblong, obtus, très épais, garni de bractées imbriquées, ovales, oblongues, munies de pores très-fins,

ciliées à leurs bords, plus longues que les calices. La corolle est de couleur purpurine; les étamines, plus longues que la corolle.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines, sur les collines arides & incultes de la Barbarie. On la trouve également dans les départements méridionaux de la France, dans la Grèce, la Palestine, l'île de Crète, &c. : ses feuilles, broyées, ont une odeur des plus agréables. (V. f.)

Elle passe pour stomachique, incisive, cordiale, céphalique, carminative, résolutive, &c.

10. SARRIÈTE effilée. *Satureia viminea*. Linn.

*Satureia pedunculis axillaribus, trifloris; foliis lanceolato-ovatis, integerrimis*. Linn. Syst. veget. pag. 528. n°. 8. — Amoen. Academ. vol. 5. pag. 399. — Swartz, Observ. 226.

*Satureia floribus axillaribus, ternis, subsessilibus; bracteis linearibus; foliis oblongis, integerrimis, basi attenuatis, glabris, subtus hispida*. Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 46. n°. 11.

*Mentha viminea, foliis minoribus, obovatis; pedunculis trifloris, alaribus*. Brown, Jam. 258.

Cette plante a le port d'un canila, dont elle ne diffère que par quatre étamines au lieu de deux: c'est un arbrisseau dont on rencontre deux variétés très-remarquables par la différence de leur grandeur, d'après M. Swartz. L'une est sous un arbrisseau bas, à tiges roides, dont les feuilles sont oblongues, plus petites; l'autre est un arbrisseau de douze à quinze pieds de haut, ayant des tiges divisées en rameaux lâches, effilés; les feuilles, plus grandes, plus arrondies, très-entières, rétrécies en pétiolo vers leur base, glabres en dessus, hispides en dessous.

Les fleurs sont axillaires, opposées, ordinairement au nombre de trois dans chaque aisselle, presque sessiles, munies, à leur base, de bractées linéaires, en forme de collerette ou d'involucre.

Cette plante se rencontre sur les montagnes, dans les contrées septentrionales de la Jamaïque. (V.)

11. SARRIÈTE d'Amérique. *Satureia americana*.

*Satureia foliis linearibus, obtusa, subarcuatis; floribus foliariis, sessilibus; caule fruticoso, subaculeato*. (N.)

*Satureia condia*. Juss. Herb.

*Condia frutescens, satwera foliis; flore albo*. Desportes, Mss. Descript. Plant. Amer.

Cette plante a des tiges glabres, ligneuses, cylindriques, divisées en rameaux grêles, un peu anguleux, nombreux, rougeâtres, hérissés sur leurs angles de très-petites pointes épineuses, ga-

nies de feuilles opposées, presque sessiles, linéaires, lancéolées, étroites, longues d'environ un pouce, entières, la plupart obtuses à leur sommet, rétrécies en un pétiole court à leur base, vertes & glabres à leurs deux faces, un peu courbées en arc, munies sur leur dos, le long de la principale nervure, de très-petites pointes épineuses : des aisselles de ces mêmes feuilles sortent, ou de petits rameaux courts, ou d'autres feuilles plus courtes, presque fasciculées. Les fleurs sont très-petites, blanchâtres, solitaires, sessiles, axillaires, opposées.

Cette plante a été recueillie en Amérique par Desportes. *h* (*V. f. in herb. Juss. & Lam.*)

12. SARRIÈRE épineuse. *Satureia spinosa*. Linn.

*Satureia ramis spinosis, foliis hispida*. Linn. Syst. veget. pag. 528. — Amcen. Acad. vol. 4. pag. 317. — Willd. Spec. Plant. vol. 3. pag. 45. n°. 10.

*Satureia cretica, frutescens, spinosa*. Tournef. Coroll. pag. 13.

*Satureia cretica, spinosa*. Pon. Bald. Ital. 21.

C'est un arbrisseau très-rameux, dont les tiges sont hautes d'environ un pied, divisées en rameaux diffus, terminés par une pointe épineuse, garnis de feuilles opposées, oblongues, hispides, ciliées à leurs bords, veinées & ponctuées à leur face inférieure, rétrécies à leurs deux extrémités, mucronées à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires, opposées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules simples, unisoles, munis de deux bractées opposées ; les calices sont striés & ponctués.

Cette plante croît dans l'île de Crète. *h* (*Descript. ex Linn.*)

SARRIOLE à fleurs bleues. *Ianthus ceruleus*. Mich.

*Ianthus subviscido-puberulus, foliis ovali-lanceolatis, utrinque acutis, trinerviis ; pedunculis uni seu bifloris*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 3. tab. 30.

Cette plante constitue seule un genre établi par Michaux, à fleurs labiées, presque régulières, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les sarrières, & dont le caractère essentiel consiste dans :

Un calice campanulé, à cinq découpures ; une corolle labiée, à cinq lobes presque égaux ; quatre étamines courtes, didynames.

C'est une plante annuelle, dont les tiges sont droites, presque cylindriques, pubescentes, un peu visqueuses, divisées en rameaux ouverts, opposés, grêles, offrant le port du *satureia hortensis* ;

garnis de feuilles opposées, à peine pétioles, assez larges, ovales, lancéolées, presque glabres à leurs deux faces, entières, légèrement ciliées à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies en pétiole à leur base, munies de trois nervures longitudinales.

Les fleurs sont opposées, situées dans l'aisselle des feuilles, supportées par un pédoncule solitaire, pubescent, un peu glutineux, ainsi que les calices ; plus court que les feuilles, terminé par une ou deux fleurs presque sessiles, d'un bleu clair.

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice persistant, campanulé, un peu ouvert, divisé jusque vers sa moitié en cinq découpures presque égales, lancéolées ; les deux inférieures plus rapprochées que les trois supérieures, surtout après la floraison.

2°. Une corolle monopétale, labiée, presque régulière, à peine plus longue que le calice, dont le tube est droit, étroit, cylindrique, divisé à son orifice en cinq lobes presque égaux, planes, presque en roue, ovales, un peu arrondis ; celui du milieu des trois inférieurs un peu plus long que les autres, marqué de deux taches à sa base.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont droits, un peu plus courts que la corolle, presque égaux, terminés par des anthères ovales, échan-crées à leur base.

4°. Un ovaire supérieur, divisé en quatre lobes, surmonté d'un style de la longueur des étamines, recourbé à sa partie supérieure, terminé par deux stigmates écartés, rééchis, linéaires, lingués, inégaux ; l'inférieur un peu plus long.

Le fruit consiste en quatre semences nues, situées au fond du calice, dont elles remplissent le tube agrandi ; globuleuses, un peu ovales, ridées, réticulées, réunies seulement par leur base.

Cette plante croît dans les terrains crayeux, dans la Caroline & la Virginie ; elle a été découverte par Michaux. *o*

SASSIE. *Sassa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptalées, dont la famille & les rapports naturels ne sont pas encore bien connus, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont toutes radicales, les hampes à une ou plusieurs fleurs.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre folioles ouvertes ; quatre pétales ; huit étamines courtes ; un style ; une capsule à deux loges, à deux semences.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles oblongues, ouvertes.

2°. Une corolle formée par quatre pétales lancéolés.

3°. Huit étamines, dont les filaments sont sétacés, plus courts que la corolle, terminés par des antères arrondies.

4°. Un ovaire en ovale renversé, surmonté d'un style filiforme, plus court que le calice, terminé par un stigmate ovale.

Le fruit consiste en une capsule ovale, à deux loges, contenant deux semences.

Observations. Ce genre a été établi par Molina dans son *Essai sur l'histoire naturelle du Chili*, & admis par Jussieu. On distingue deux espèces de *Sassa*, sur lesquelles nous avons peu de détails. Je vais les présenter d'après Molina.

## E S T À C E S.

1. *SASSIE des teinturiers. Sassa tinctoria.* Molin.

*Sassa foliis ovatis, scapo multiflora.* Molin. *H. fl. du Chili*, édit. franç. pag. 117. — Juss. Gen. Plaut. 431. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 615.

C'est une petite plante, dont les feuilles sont toutes radicales & ovales : de leur centre s'élève une hampe nue, qui supporte trois ou quatre fleurs couleur de pourpre.

Cette plante croît au Chili, dans les campagnes; elle se montre après les premières pluies de l'automne.

Les habitants du pays emploient les fleurs de cette plante pour colorer en pourpre une sorte de liqueur spiritueuse, à laquelle elles donnent en même temps une odeur agréable. Une seule fleur, quoique très-petite, & rarement plus grosse que les fleurs du rhum, peut colorer plus de six livres de liqueur. Les ébénistes s'en servent aussi pour donner aux boîtes une couleur agréable. Il parait, d'après ces faits, que le suc de cette plante pourroit être avantageusement employé pour la teinture des laines, d'autant mieux qu'il s'attache fortement aux draps, & qu'on ne peut l'enlever que très-difficilement. (Molina.)

2. *SASSIE aux perdrix. Sassa perdicaria.* Molin.

*Sassa foliis cordatis, scapo uniflora.* Molin. *H. fl. du Chili*, édit. franç. pag. 117.

Rimu. Chili.

Cette espèce diffère de la précédente par ses

feuilles en cœur, toutes radicales, & par ses hampe, terminées par une seule fleur d'un jaune doré.

Cette plante croît au Chili; c'est fait, au commencement de l'automne, l'ornement des prairies, où elle se trouve en grande quantité. Les habitants du pays lui ont donné le nom de *rimu* ou *fleur de perdrix*, parce que ces oiseaux l'aiment beaucoup. Les noms des mois d'avril & de mai sont pris de cette plante : *avril* porte le nom de *unen-rimu*, premier *rimu*, & mai celui de *inan-rimu*, ou second *rimu*. (Molina.)

SATAJO. *Tiri-iti-canni. Satayo.* Rheed, Hort. malab. vol. 7. pag. 57. tab. 30.

Plante parasite du Malabar, dont les fleurs paroissent dioïques, munies d'une corolle à cinq pétales & de cinq étamines, qu'il est difficile de rapprocher d'aucun des genres connus, à moins que ce ne soit des *toranthus* ou des *guis* (*viscam*).

Elle croît sur l'écorce des vieux arbres. Ses rameaux sont noueux, revêtus d'une écorce épaisse & de couleur cendrée; ils sont armés, autour de chaque nœud, de deux épines très-aiguës, opposées, garnies de feuilles médiocrement pétioles, épaisses, fermes, charnues, très-rapprochées, surtout vers l'extrémité des rameaux; grandes, ovales, oblongues, glabres, entières à leurs bords, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, presque opposées, marquées de nervures latérales simples, alternes.

Les fleurs mâles sont petites, nombreuses, sessiles, disposées en chatons oblongs, cylindriques, obtus, foliaires, ou bien réunis deux par deux ou trois par trois aux nœuds des rameaux. La corolle est d'un jaune-orangé, composée de cinq pétales ovales, aiguës; les étamines sont également au nombre de cinq; les filaments extrêmement courts, terminés par des antères blanchâtres. Les fleurs femelles & les fruits ne sont pas connus.

Cette plante croît dans les îles, au Malabar.

SATIRE. *Phallus.* Genre de plantes cryptogames, de la famille des champignons, qui a de très-grands rapports avec les morilles que Linné y avoit réunies, mais que des auteurs plus modernes en ont séparées, les morilles (*boletus*) étant dépourvues de coiffe, & n'ayant point leur sommet perforé comme la plupart des satires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un chapeau ovale, conique, supporté par un pédoncule recouvert d'une coiffe qui se déchire, & enveloppe ensuite, en forme de collet, la base du pédoncule; le chapeau perforé ou fermé à son sommet, marqué de crevasses irrégulières, réticulées, d'où découle une liqueur visqueuse, dans laquelle on soupçonne que les semences sont contenues.

\* *Chapeau ombiliqué. Umbilic perforé.*

1. SATIRE fétide. *Phallus impudicus*. Linn.

*Phallus pileo conico, margine crenulato, vertice perforato, stipite basi volutato.* Schæff. Jung. vol. 2. tab. 196, 197, 198.

*Phallus volutus, fipitatus; pileo cellulofo.* Linn. Spec. Plant. vol. 2 pag. 1648. — Reyg. Ged. t. pag. 260. n°. 1. — Œt. Flor. dan. tab. 175. — Bulliard, Champ. pag. 276. tab. 182. — Lam. Illust. Gener. tab. 885. — Sterb. tab. 30. A. B. C. D. — Bart. tab. 11.

*Phallus fetidus.* Lam. Flot. franç. vol. 1. pag. 121. n°. 1284.

*Phallus volva exceptus; pilei apice pervio.* Hort. Clifort. 478. — Royen, Lugd. Bat. 517. — Guett. Stamp. vol. 1. pag. 17.

*Phallus volva exceptus capituli, apice parulo.* Gled. Fung. 55. n°. 1. — Hill. Helv. n°. 2248.

*Phallus volutus, pileo cellulofo, utrinquè pervio.* Scop. Carn. pag. 48. n°. 1. — Édit. 2. n°. 1605.

*Phallus vulgaris, totus albus; volva rotundâ; pileo cellulato, ac summâ parte umbilico pervio ornat.* Michel, Gener. 201. tab. 33.

*Phallus hollandicus seu batavicus.* Dalech. Hist. 2. pag. 1398. Icon.

*Fungus phalloides.* Rai, Catal. Plant. angl. tab. 2. fig. 1, 2, 3, 4.

*Fungus fetidus, penis imaginem referens.* C. Bauh. Pin. 374.

*Bolæus phalloides.* Tournef. Inst. R. Herb. 561.

*Fungus phalloides.* J. Bauh. vol. 3. pag. 843.

*Pernicioforum fungorum quinta species.* Cluf. Hist. 286.

*Fungus virilis, penis arctelli facie.* Lobel. Icon. tab. 309.

*Bolæus phallum referens.* Rupp. Flor. jen. 203.

β. *Phallus volva exceptus, capituli apice clauso.* Gledit. Fung. 54. n°. 1.

Ce champignon se présente sous différentes formes, & n'est parfaitement reconnoissable que dans son entier développement; d'abord il se montre sous la figure d'une masse molle, un peu charnue, presque ovale, de couleur jaune, enveloppée entièrement d'une coiffe lisse, qui se creève & s'ouvre à son sommet, pour donner passage à un pédoncule long de six à huit pouces, d'un blanc-falo ou un peu verdâtre, creux, cylindrique, épais, néré d'un grand nombre de petits trous, un peu rétréci vers son sommet.

Ce pédoncule supporte un chapeau on forme de tête ovale, conique, auquel il n'adhère que par son extrémité supérieure. Ce chapeau est ombiliqué à son sommet, creulé par des cellules très-irrégulières: il en découle une liqueur livide, verdâtre, d'un odeur très-infécie, qui se fait sentir au loin, & dont dépendant les mouches font fort avides.

Cette plante dure peu; elle croît dans les bois à la fin de l'été ou dans l'automne. (V. v.)

La conformité de ce *phallus* avec l'organe de la génération dans les animaux mâles, a fait soupçonner qu'il pourroit être utile pour exciter, soit pour réveiller les feux de l'amour; aussi les habitants de plusieurs pays ont-ils grand soie de récolter les individus de cette espèce avant leur maturité. Ils les font sécher en plein air ou à la fumée; ils les réduisent en une poudre qu'ils mêlent avec quelque liqueur spiritueuse, & ils en font prendre une certaine dose aux animaux mâles & femelles dont ils desirant multiplier la race.

2. SATIRE à double coiffe. *Phallus Hadriani*. Vent.

*Phallus stipite tereti, maculis cinereis distincto; pileo brevi, non cellulato.* Vent. Mém. de l'Inst. vol. 1. pag. 517.

*Phallus Hadriani Julii, capitulo non cellulato, sed umbilico pervio donato.* Mich. pag. 202. — Cluf. Hist. rar. plant. 295. — J. Bauh. Hist. vol. 3. pag. 845. — Sterb. tab. 30. E. F.

Ce champignon, dit M. Ventenat, que les anciens botanistes regardoient comme une des merveilles de la nature, croît en abondance dans la Hollande. Clusus dit aussi l'avoir trouvé près de Blois, sur les bords de la Loire.

Il est d'abord renfermé dans une coiffe turbinée ou pyriforme, de couleur blanchâtre, & muni à sa base d'une racine courte, fusiforme. Cette coiffe, qui contient une liqueur visqueuse, féide est formée de deux membranes. Lorsque le champignon s'est fait jour à travers, la membrane extérieure se renverse, & celle qui est plus intérieure engaine sa base d'un pédicule cylindrique, aminci à sa partie inférieure, lisse, parsemé de petites taches cendrées, creux dans l'intérieur, long de six pouces, & large d'environ un pouce.

Le chapeau est presque campaniforme, marqué de quelques stries légères; un peu ridé, déchiré à son limbe, libre dans toute son étendue, couronné à son sommet d'un ombilic saillant, en forme de cupule, & perforé. Il est d'abord d'une couleur laiteuse; mais en vieillissant il devient d'un brun roussâtre.

Le genre auquel on doit rapporter ce champignon, ajoute M. Ventenat, ne nous paroît pas encore suffisamment déterminé. A la vérité, il se



rapproche, par une foule de caractères, du *phallus*; mais comme son chapeau n'est point celluleux, il pourroit le faire que les semences fussent renfermées dans l'intérieur, & alors ce champignon seroit congénère du *lycoperdon*.

Cette plante se rencontre en France, aux environs de Blois, & dans la Hollande.

Clusius nous apprend qu'on lui avoit présenté à Amsterdam plusieurs individus de cette espèce, & que toutes les fois qu'il les feroit dans la main, il éprouvoit un engourdissement. On croyoit, du tems de ce botaniste, que la liqueur contenue dans la coiffe de ce champignon pouvoit être employée avec succès contre la goutte.

### 3. SATIRE de la Guiane. *Phallus indusatus*. Vent.

*Phallus stipite tereti, celluloso, indusato; pileo brevi, reticulato.* Vent. *Mém. de l'Inst.* vol. 1. pag. 510. tab. 7. fig. 3.

C'est encore à M. Venteran que nous sommes redevables de la connoissance de ce champignon. Il se rapproche beaucoup du *phallus impudicus*; mais il en diffère essentiellement par la présence d'un organe d'une structure tout-à-fait remarquable, & dont aucun champignon ne présente d'exemple.

Il s'élève à la hauteur d'environ six pouces; son pédicole est cylindrique, droit, simplement contigu avec le chapeau, d'une blancheur laiteuse, creux dans son intérieur, large d'environ un pouce dans sa partie inférieure, & d'un demi-pouce dans sa partie supérieure. On remarque sur toute sa superficie des bulles qui se crevent à mesure qu'il avance en âge, de sorte que, parvenu au période de son développement complet, il est parsemé de lacunes, parmi lesquelles on distingue encore quelques bulles. Le pédicule paroît, dans sa jeunesse, faire corps avec le chapeau. Ces deux organes sont réunis par le moyen d'un bourrelet frangé, qu'on prendroit d'abord pour un collet; mais à mesure que ce bourrelet se développe, les fibres dont il est formé s'allongent, se croisent, & présentent un tissu qui se renverse, & qui, semblable à une chemise, recouvre en entier le pédicule du champignon. La couleur de ce tissu est d'abord la même que celle du pédicule; mais en vieillissant cette couleur s'altère & tire sur le rouffâtre. Les alvéoles ou mailles, formées par le croisement des fibres, sont très-nombreuses; elles ont des formes différentes, cependant elles sont le plus généralement oblongues.

Le chapeau, qui est en cône évasé à sa base, ou presque campaniforme, est libre dans toute son étendue, & il n'a thère avec le pédicule que par le limbe de l'ombilic petit réquil le couronne. Toute sa surface extérieure est remarquable par des al-

véoles de grandeur & de forme différentes, qui correspondent chacun à autant de callosités rubeculeuses, dont la surface intérieure est parsemée. Ces alvéoles, dans lesquelles doivent être contenues les semences, ont une couleur de bleu de tourmésol, tandis que les nervures saillantes qui les forment, sont d'une blancheur assez éclatante.

Cette espèce croît abondamment dans la Guiane hollandoise, sur les bords de la mer; elle paroît dans la saison des grandes ploies, & se plaît de préférence sur un sable fin, recouvert d'une légère couche de terreau. (*Venteran*.)

**\*\* Chapeau dépourvu d'ombilic, ou à ombilic fermé.**

### 4. SATIRE de chien. *Phallus caninus*. Hudf.

*Phallus stipite celluloso; pileo transversum rugoso, impervio.* Vent. *Mém. de l'Inst.* vol. 1. pag. 513.

*Phallus caninus, volutus, stipitatus; pileo rubro, celluloso, acuto, apice clauso.* Hudson, *Flor. angl.* edit. 2. pag. 630.

*Phallus exilis, maratta.* Batt. *Fung. arim.* pag. 76. tab. 40. F.

*Phallus (caninus), volutus, stipitatus; stipite celluloso; capitulo impervio, rubro, rugoso.* Curt. *Flor. lond.* Fasc. 39. tab. 235.

Ce champignon sort d'une coiffe coriace & blanchâtre, formée par deux lames entre lesquelles est contenue une liqueur mucilagineuse. Son pédicule, qui est cylindrique, rétréci à la base, celluleux, d'un jaune-pâle, filuleux, s'élève à la hauteur d'environ deux pouces. Il soutient un chapeau oblong, presque acuminé, dépourvu d'ombilic, fermé à son sommet, & adhérent dans toute son étendue. Ce chapeau est d'abord recouvert d'une croûte calleuse qui se résout insensiblement en une liqueur verdâtre, & c'est alors qu'il paroît ridé transversalement.

Ce champignon croît en Italie & en Angleterre. (*Descript. ex Vent.*)

### 5. SATIRE mokufin. *Phallus mokufin*. Linn. f.

*Phallus stipite pentagono; pileo acuto, impervio, quinquepartito; laciniis connatis.* Vent. *Mém. de l'Inst.* vol. 1. p. 514. — Linn. f. *Suppl.* p. 452.

*Phallus mo-hu-fin.* Ad. Petrop. vol. 19. p. 373. tab. 5.

Ce champignon, d'une substance blanche & molle, sort d'une coiffe blanchâtre, de la grosseur d'une noisette, & tendu irrégulièrement à son limbe, s'élève à la hauteur d'environ deux pouces. Son pédicule, creux dans l'intérieur, revêtu d'une écorce épaisse & d'une belle couleur de chair, est remarquable par les cinq angles dont il est relevé. Il soutient un chapeau oblong, subulé, presque anguleux, de couleur rouge, dépourvu

d'ombilic, clos à son sommet, & se divisant en cinq découpures conviventes.

Ce champignon, ajoute M. Ventenat, que l'on trouve dans différentes provinces de la Chine, croît sur les racines & sur les feuilles presque pourries du mûrier : il parvient, selon la description qu'en a donnée le missionnaire Cibot, à son parfait développement dans l'espace de douze heures ; alors il s'affaît & exhale une odeur désagréable. Les Chinois en font un grand usage en médecine, pour guérir les ulcères cancéreux ; ils le servent aussi quelquefois sur la table ; mais ils choisissent les individus qui n'ont pas encore été attaqués par les insectes. (Ventenat.)

#### 6. SATIRE ridé. *Phallus corrugatus*. Vent.

*Phallus vulvæ multipartitæ ; stipite tereti ; pileo corrugato, umbilicato ; umbilico impervio*. Vent. Mém. de l'Inst. vol. 1. pag. 514.

*Phallus qui fungus phalloides, major, germanicus, pileo corrugato*. Michel, pag. 201. — Sterb. tab. 30. fig. K. L. M.

Ce champignon se distingue de toutes les espèces de ce genre, par sa coiffe fondue en cinq ou six découpures ovoïdes, presque égales, & fixées à peu près dans la moitié de sa hauteur, qui est d'environ six pouces. Son pédicule est cylindrique & d'une grosseur égale dans toute sa longueur. Son chapeau est conique, ridé, celluleux, long d'environ un pouce, & à peu près de la même largeur ; il est surmonté d'un ombilic mamelonné, très-faillant & non perforé. (Ventenat.)

Ce champignon croît dans l'Allemagne.

#### 7. SATIRE grillé. *Phallus cancellatus*. Vent.

*Phallus stipite cylindrico, levi ; pileo cancellato, impervio*. Vent. Mém. de l'Inst. vol. 1. pag. 515.

*Phallus vulvatus, pileo apice clauso*. Linn. Flor. suec. edit. 1. n°. 1101. — Edit. 2. n°. 1261. — Act. Stock. 1742. tab. 2. fig. 1.

*Phallus alpinus, vulvæ subrotundæ, albæ ; pileo cancellato, umbilico pervio carente*. Michel, Nov. Gener. pag. 202.

Linnaeus, dit M. Ventenat, cite, dans sa Flore de Suède, comme synonyme du *phallus impudicus*, le champignon que nous décrivons ; cependant il en diffère par un si grand nombre de caractères, qu'on ne peut hésiter à le regarder comme une espèce très-distincte.

Ce champignon s'élève à la hauteur d'environ huit pouces. Sa coiffe est de forme orbiculaire, ridée, plissée, communément rongée par les insectes, & terminée par une petite rouffe de racines ; sa longueur & sa largeur font environ de deux pouces & demi. Le pédicule est cylindrique, lisse,

blanchâtre, fistuleux, de manière à contenir une forte plume à écrire ; long de quatre pouces sur un de large. Le chapeau qui le surmonte, est conique, oblong, creusé de plusieurs petites cavités disposées en lignes parallèles, de couleur brune, excepté au sommet, qui est blanchâtre, ombiliqué & parfaitement clos. Ce chapeau, adhérent dans toute son étendue au pédicule qui le supporte, a près de deux pouces de long, sur environ quatorze lignes de largeur à sa base. Tout ce champignon a une odeur agréable & vive, comme un *orchis*, selon la remarque de Rothman.

Il a été trouvé à Smoland, dans un terrain maigre & couvert de mousse, par Jean Rothman, docteur en médecine.

**SATIRION.** *Satyrium*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, gynandriques, de la famille des orchidées, qui a des rapports avec les *orchis*, & qui comprend des herbes tant odoriques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont alternes, vaginales, & les fleurs disposées en épis.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Le pétale inférieur pendant, étroit, alongé, renflé en bourse à sa base ; deux éperons inférieurs sur le pistil.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Point de calice.

2°. Une corolle à six pétales, ou profondément divisée en six découpures, dont cinq supérieures, conviventes, trois extérieures, deux intérieures rapprochées à leur partie supérieure en forme de calice ; la sixième pendante, en forme de bourse à sa base, prolongée en éperon souvent très-court, & à trois divisions inégales.

3°. Deux éperons, dont les filaments sont très-courts, insérés sur le pistil dans sa partie concave ; terminés par des anthers ovales, recouvertes par le bord supérieur du pétale inférieur.

4°. Un ovaire inférieur, contourné, oblong ; un style concave, adhérent sur le bord supérieur du pétale inférieur, surmonté d'un stigmate comprimé, obtus.

Le fruit est une capsule oblongue, à une seule loge, à trois côtés en carène, à trois valves, s'ouvrant à ses angles, qui restent adhérentes à leur sommet & à leur base.

Les semences sont petites, nombreuses.

**Observations.** Les satirions sont si rapprochés des *orchis*, qu'il est difficile de les regarder comme susceptibles de former un genre séparé. ils en

s'en distinguent guère que par la partie du sixième pétale, à laquelle Linné a donné le nom d'éperon, assez courte & renflée en bourse, dont elle a plutôt la ressemblance que celle d'un éperon. Ce caractère n'est pas toujours constant, & les espèces dans lesquelles il existe paroissent rentrer parmi les elleborines (*serapias*). Au reste, il a été fait sur ce genre, & sur plusieurs autres de la famille des orchidées, des changemens sur lesquels nous ne pouvons revenir, la plupart de ces genres ayant été déjà décrits dans cet ouvrage.

## E S P È C E S.

1. SATIRION fétide. *Satyrion hircinum*. Linn.

*Satyrion bulbis indivisis; foliis lanceolatis; nectarii labio trifido; intermedia lineari elongata, obliquo, praeorsifida*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. p. 1337. — Act. Upsal. 1740. tab. 18. — Dalib. Paris. 275. — Gouan, Monsp. 471. — Miller, Dict. n.º 2. — Jacq. Flor. austr. tab. 367. — Pollich, Pal. n.º 851. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 510. n.º 1104. — Idem, Ill. Gen. tab. 726. fig. 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. 129. n.º 1.

*Orchis radicibus subrotundis; labello longissimo, tripartito, plicato*. Haller, Helv. n.º 1368. tab. 25.

*Orchis hircina*. Scop. Carn. edit. 2. n.º 1113. — Crantz, Austr. pag. 484.

*Orchis barbata, fetida*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 756. Ic. — Vaillant, Paris. tab. 30. fig. 6. — Segui. Plant. ver. tab. 15. fig. 1. — Rivin. Hexap. tab. 18.

*Orchis barbata, odore hirci, brevioris latioreque folio*. C. Bauh. Pin. 20. — Moris. Hist. 3. pag. 491. §. 12. tab. 12. fig. 9. — Tournef. Infl. R. Herb. tab. 433. — Garidel, Aix. 340.

*Tragorchis, testiculus hirci*. Dodon. Pempt. 237.

*Testiculus hircinus, vulgaris seu tragorchis, orchis fauroides vel scincophora, lacertarum emulatione*. Lobel. Icon. 177. — Idem, Observ. pag. 83 & 90. Icon.

*Orchis fauroides vel scincophora gemma; testiculus hircinus vulgaris*. Dalech. Hist. 2. pag. 1553. Icon.

Cette belle espèce est facile à distinguer de ses congénères par la lèvre inférieure du pétale inférieur, divisée en trois lanières; celle du milieu très-longue & fort étroite.

Ses racines sont munies de deux bulbes arrondis, très-entiers, surmontés de plusieurs fibres simples, un peu épaisses, charnues: il s'en élève une tige droite, ferme, cylindrique, feuillée, glabre, fistuleuse, un peu striée, haute d'environ deux pieds, garnie de feuilles alternes, vaginales, élargies, glabres à leurs deux faces, très-lisses, lancéolées, aiguës, d'un vert luisant; les supé-

Botanique. Tome VI.

rieures, presque membraneuses, paroissent être des bractées sans fleurs, très-étroites, allongées.

Les fleurs forment un très-long épi simple, droit, sur lequel ces fleurs sont sessiles, éparées, un peu distantes, d'un blanc-roussâtre, d'une odeur de bouc très-désagréable, munies de bractées minces, très-étroites, membraneuses, plus longues que les fleurs, excepté le pétale inférieur. Les cinq pétales supérieurs de la corolle (ou les cinq divisions) sont connivens, égaux, réunis en forme de casque, & l'inférieur est très-long, pendant, tacheté de pourpre à sa base, divisé inférieurement en trois découpures, dont deux latérales plus courtes, fort petites, tubulées, un peu ondulées; celle du milieu très-étroite, longue d'un pouce & demi à deux pouces, linéaire, bifide ou presque frangée à son extrémité, roulée sur elle-même avant l'épanouissement de la fleur. Le fruit est une capsule ovale, allongée, droite, un peu aiguë ou rétrécie à ses deux extrémités, légèrement membraneuse sur ses angles, renfermant des semences fort petites.

Cette plante croit en France, en Allemagne, dans les montagnes alpines, dans les prés montagneux & sur le bord des bois. (V. v.)

2. SATIRION à fleurs verdâtres. *Satyrion viride*. Linn.

*Satyrion bulbis palmatis; foliis oblongis, obtusis; nectarii labio lineari, trifido; intermedia obsoleta*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1337. — Act. Upsal. 1740. pag. 18. — Flor. fusc. 750. 804. — Dalib. Paris. 276. — Miller, Dict. n.º 3. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 21. — Pollich, Pal. n.º 852. — Flor. dan. tab. 73. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 512. n.º 1104. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 130. n.º 2. — Lam. Illustr. Gener. tab. 726. fig. 2.

*Orchis radicibus palmatis, galea connivente, labella trifido, calcare brevissimo*. Haller, Helv. n.º 1269. tab. 26. — Seguier, Plant. veron. vol. 2. tab. 16. fig. 18.

*Orchis viridis*. Crantz, Austr. pag. 491. — Scop. Carn. 2. n.º 1122. — Allion. Flor. pedem. n.º 1846.

*Satyrion foliis oblongis, caulinis*. Flor. lappor. 1313.

*Orchis palmata, flore viridi*. C. Bauh. Pin. 86. Prodr. 30. — Tournef. Infl. R. Herb. 435. — Vaill. Bot. Paris. tab. 31. fig. 6, 7, 8.

*Orchis palmata, flore galericulato, dilute viridi*. Lœf. Pruss. 192. tab. 59.

*Orchis palmata, batrachites*. C. Bauh. Pin. 86. — Pollich, L. c.

*Serapias batrachites, vel myoides*. Lobel. Icon. 193.

D d d d

Dans cette espèce, le pétale inférieur & pendant à ses trois divisions courtes, celle du milieu plus courte que les deux latérales, caractère suffisant pour la distinguer des autres espèces, ainsi que ses fleurs verdâtres.

Ses racines ont des bulbes médiocrement comprimés, palmés ou divisés à leur extrémité en plusieurs lobes terminés par un prolongement filiforme, garnis à leur collet de fibres charnues.

Ses tiges sont droites, glabres, striées, fistuleuses, tendres, hautes de six à huit pouces, munies de feuilles alternes, presque ovales, un peu lancéolées; les supérieures plus étroites, lancéolées, toutes vaginales à leur base, un peu aiguës à leur sommet, vertes, glabres à leurs deux faces, marquées de plusieurs nervures longitudinales, dont l'intervalle est occupé par des veines agréablement réticulées.

Les fleurs sont sessiles, éparées, d'un vert-pâle; un peu distantes, disposées en un épi alongé, simple, muni de bractées presque ensiformes, étroites; les inférieures plus longues, les supérieures plus courtes que les fleurs. Les trois pétales supérieurs sont ovales, aigus, réunis en casque, recouvrant deux autres pétales intérieurs, filiformes, élargis à leur base. Le pétale inférieur est pendant, oblong, à trois divisions courtes, les deux latérales plus longues, étroites, aiguës, recourbées en dedans; celle du milieu plus courte, un peu élargie, pointue; un renflement en forme de bourre à la base de ce pétale & en dessous.

Cette plante croît dans les pâturages & les lieux humides, dans les contrées septentrionales de l'Europe. Je l'ai recueillie en fleur à la fin du mois de prairial, dans les environs de Lyon, dans les prés, chemin de Mons-Launoy. ♀ (V. v.)

### 3. SATIRION à fleurs noirâtres. *Satyrium nigrum*. Linn.

*Satyrium bulbis palmatis, foliis linearibus, nectarii labio resupinato, indiviso*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1338. — Mantiss. 488. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 511. n°. 1104. III. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 130. n°. 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 726. fig. 3.

*Satyrium bulbis palmatis, foliis linearibus, foribus resupinatis; nectarii labio indiviso, ovato, acuminato*. Linn. Act. Ups. 1740. pag. 19. — Flor. suec. 731, 805. — Mill. Dict. n°. 1. — Jacq. Hort. Vindeb. 193. — Idem, Flor. austr. tab. 368. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1123, sub orchide.

*Satyrium foliis linearibus*. Royen, Prodr. 14.

*Orchis radicibus palmatis, spica densissima, flore resupinato, calcare brevissimo*. Hall. Helv. n°. 1271. 130. 27.

*Orchis nigra*. Allion. Flor. pedem. n°. 1845.

*Orchis miniata*. Crantz & Ault. pag. 487. n°. 7.

*Orchis palmata, angustifolia, alpina, nigro flore*. C. Bauh. Pin. 86. — Seguier, Plant. vern. pag. 133. tab. 15. fig. 17. — Tournef. Infl. R. Herb. 436.

*Palmata minor, odoratissima, purpurea, fve nigra*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 778. Icon.

*Palma Christi minor*. Camer. Epit. 627. Icon.

*Palmata angustifolia, flore resupinato, calcare brevissimo*. Haller, Opusc. 228.

8. *Orchis palmata, angustifolia, alpina, resfo flore*. Tournef. Infl. R. Herb. 430.

On distingue aisément cette espèce à ses feuilles linéaires, étroites; à ses fleurs réunies en un épi ovale, & dont le pétale inférieur est entier.

Ses racines sont palmées, charnues, munies de quelques fibres épaisses, simples, alongées. Ses tiges sont grêles, molles, très-lisses, cylindriques, hautes de six à sept pouces, médiocrement feuillées; les feuilles occupent particulièrement la partie inférieure; elles sont étroites, linéaires, un peu plus courtes que les tiges, vaginales, presque membraneuses à leur base, glabres, lisses, vertes à leurs deux faces, médiocrement aiguës ou obtuses à leur sommet; les supérieures plus courtes, peu nombreuses, presque filiformes.

Les fleurs sont petites, d'un pourpre-foncé, noirâtre, quelquefois de couleur rose, d'une odeur d'œillet très-agréable, souvent dans une situation renversée, formant un épi dense, court, ovale, conique. Leur pétale inférieur est ovale, lancéolé, court, presque entier ou un peu crénelé. Parmi les cinq pétales supérieurs, deux sont plus étroits que les autres. Les étamines sont rougeâtres à leur insertion; les anthères jaunes. L'ovaire est court, un peu élargi, ovale, anguleux.

Cette espèce croît dans les départements méridionaux de la France, dans la Suisse, les Alpes, en Laponnie. Elle m'a été communiquée par M. Foucault, qui l'a recueillie dans les pâturages des hautes montagnes, aux environs de Grenoble: ♀ (V. f.)

### 4. SATIRION blanchâtre. *Satyrium albidum*.

*Satyrium bulbis fusculatis, foliis lanceolatis; nectarii labio trifido, auro; laciniâ intermedia obtrusâ*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1338. — Act. Upsal. 1740. pag. 19. — Flor. suec. 733, 806. — Jacq. Vind. 249. — Miller, Dict. n°. 4. — Pallas, Iter 2. pag. 124. — W&Aet, Flor. dan. tab. 115. — Scnp. Carn. edit. 2. n°. 1124, sub orchide. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 512. n°. 1104. VI. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 130. n°. 4.

*Orchis albida*. Althion. Flor. pedem. n°. 1838.

*Satyrium scanense*. Iter, Scan. 153.

*Orchis palmata, alpina; spica densa, albo viridi*. Haller, Opusc. 149.

*Orchis radicebus confertis, teretibus; calcar brevissimo, labello trifido*. Haller, Helv. n°. 1270. tab. 26.

*Orchis alpina*. Crantz, Austr. 486.

*Orchis palmata, palmis inversis, flore albo*. Lœf. Truff. 182.

*Helixine broccenbergensis*. Rivin. Hex. t. 3.

*Pseudo-orchis alpina, flore herbaceo*. Michel, Gen. 30. tab. 26.

*Limodorum montanum, flore albo, dilute virescente*. Chom. Act. Paris. 1705. pag. 517.

Cette espèce est distinguée par ses racines divises en grosses fibres simples, charnues, fasciculées & non palmées, & par ses fleurs blanchâtres, petites, disposées en épis grêles, allongés; elle se rapproche un peu, par son port, de l'*aphrys monachis*, surtout par la petitesse & l'arrangement de ses fleurs.

Ses tiges sont grêles, hautes de huit à dix pouces, cylindriques, glabres, fistuleuses, feuillées, assez roides, garnies de feuilles alternes, lancéolées, vaginales à leur base, médiocres, vertes, un peu plus pâles en dessous, obtuses ou aiguës à leur sommet, marquées de nervures fines, longitudinales; les feuilles caulinaires supérieures raies & fort petites.

Les fleurs forment un épi long d'un à deux pouces au plus, grêle, cylindrique, un peu dense ou lâche, obtus; elles sont petites, sessiles, blanchâtres, un peu purpurines, munies de bractées étroites, lancéolées, plus longues que les fleurs. Les trois pétales supérieurs sont rapprochés, un peu en calque; les deux latéraux ouverts. Le pétales inférieur est fort court, à peine pendant, à trois petites divisions aiguës; celle du milieu un peu plus large, presque obtuse. L'ovaire est court, glabre, ovale, un peu membraneux sur ses angles.

Cette plante croît en Suisse & dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Grenoble, dans les pâturages des forêts, où elle a été recueillie par M. Foucault, qui m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

5. SATIRION orchidé. *Satyrium orchioides*. Linn. f.

*Satyrium bulbis fasciculatis, oblongis; foliis lato-lanceolatis; scapo vaginato; nectario cornuto; labio lanceolato, acuminato*. Swartz, Prodr. pag. 118.

Cette espèce a tellement le caractère d'un orchis

par le prolongement, en forme de corne, de la partie inférieure du pétales pendant, qu'elle auroit dû être renvoyée dans ce genre. Ses racines sont composées de bulbes oblongues, fasciculées; ses riges garnies de feuilles élargies, lancéolées, vaginales à leur base. Le pétales inférieur est lancéolé, acuminé, prolongé en corne.

Cette plante croît dans les Indes orientales.

6. SATIRION hérissé. *Satyrium hirtellum*. Sw.

*Satyrium bulbis filiformibus; caule hirsuto; foliis ovatis, trinerviis; petiolaris vaginantibus; nectario cornuto, labio trilobo*. Swartz, Prodr. pag. 118.

Cette plante a des racines composées de bulbes filiformes, d'où s'élève une tige un peu velue, garnie de feuilles ovales, pétiolées, marquées de trois nervures longitudinales, en gain à leur partie inférieure. Le pétales inférieur divisé en trois lobes, avec un appendice en forme de corne.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique.

7. SATIRION cohérent. *Satyrium adnatum*. Sw.

*Satyrium bulbis fasciculatis, foliis radicalibus, oblongis; petiolaris longissimis; scapo vaginato; nectario cornuto, adnato; labio deflexo, trilobo, emarginato*. Swartz, Prodr. pag. 118.

Ses racines sont formées de bulbes réunies en faisceau. Les feuilles sont radicales, oblongues, soutenues par de très-longs pétiolés; elles engainent les riges par leur partie inférieure. Le pétales inférieur est rabattu, à deux lobes, échancré, avec un prolongement en forme de corne.

On trouve cette plante dans l'Amérique.

8. SATIRION maculé. *Satyrium maculatum*. Desfont.

*Satyrium floribus dense spicatis; lacinis connatis; acutis; labello trilobo; lobis linearibus, angustissimis, intermedio longiori*. Desfont. Flor. atlant. vol. 2. pag. 319.

Cette espèce a des feuilles glabres, lancéolées, maculées, alternes, vaginales à leur base; elles enveloppent une tige haute de six à huit pouces, cylindrique, droite, terminée par un épi très-dense, court, épais, obois, garni de bractées ovales, oblongues, aiguës, plus courtes que l'ovaire. Les fleurs sont petites; les découpures supérieures de la corolle pâles, conniventes, aiguës; la découpure ou le pétales inférieur pendant, allongé, partagé en trois divisions linéaires, très-étroites; celle du milieu plus large & plus allongée.

Cette plante a été découverte, par M. Desfontaines, dans le mont Atlas, proche Bétis. (V. f. in herb. Desfont.)

D d d d

9. SATIRION bâillant. *Satyrion hians*. Linn. f.

*Satyrion corolla galea calcaratâ, hians; nectario ovato; foliis linearibus, radicalibus*. Linn. f. Suppl. pag. 401.

Cette espèce a des tiges droites, cylindriques, hautes d'un pied environ, munies de quelques gaines mucronées, sans expansion. Toutes les feuilles sont radicales, linéaires, de la longueur des tiges, l'épi excepté.

Les fleurs, au nombre de seize environ, sont disposées en un épi oblong. Le pétale supérieur est très-large, creusé en capuchon, bâillant, terminé postérieurement par un prolongement très-court, en forme de corne; les deux pétales latéraux en ovale renversé; deux intérieurs petits, recourbés, situés sous le pétale supérieur; enfin le pétale inférieur est pendant, ovale, aigu.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

10. SATIRION à feuilles d'orobanche. *Satyrion orobanchoides*. Linn.

*Satyrion foliis bifariis, corolla galea posticâ bilobâ, subcorruptâ*. Linn. f. Suppl. pag. 402.

Cette plante a plutôt le port d'un orobanche que d'un satirion, surtout par la disposition de ses feuilles & de ses fleurs.

Ses tiges sont droites, simples, garnies de feuilles caulinaires, étroites, linéaires, placées sur deux rangs. Ses épis sont beaucoup plus longs que les tiges, composées de fleurs imbriquées, serrées, disposées sur deux rangs. Les divisions supérieures de la corolle ne forment qu'une seule pièce obtuse, en forme de casque, séparée en deux lobes sur le devant, se prolongeant par derrière en deux petites cornes très-courtes, presque obtuses. Le pétales inférieur est concave, en cœur renversé; la partie de sa base qui supporte les étamines, est oblongue, s'avancant sous le casque; le sommet, divisé en deux lobes, munis à leur base de deux dents subulées. L'ovaire est inférieur, contourné; les anthères, au nombre de deux.

Cette plante a été recueillie par M. Sparmann, au Cap de Bonne-Espérance.

11. SATIRION pélicellé. *Satyrion pedicellatum*. Linn. f.

*Satyrion scapo subnudo, racemo pedicellis filiformibus, laxis*. Linn. f. Suppl. pag. 402.

Ses tiges sont hautes d'un pied, & n'offrent qu'une seule feuille vaginale, lancéolée, subulée, située dans le milieu de la tige. Les fleurs sont pédonculées, disposées en un épi alongé, lâche, garni dans toute sa longueur de bractées subulées,

paléacées. La corolle est composée de cinq pétales presque égaux.

Cette plante a été recueillie par M. Sparmann, au Cap de Bonne-Espérance; elle auroit besoin d'un nouvel examen, ainsi que le *Satyrion orobanchoides*, pour être bien certain que toutes deux appartiennent à ce genre.

12. SATIRION en spirale. *Satyrion spirale*. Sw.

*Satyrion bulbis fasciculatis, oblongis; foliis linearibus, scapo vaginato, floribus spirali-secundis, labio trilobo, medio majori crenulato*. Swartz, Prodr. pag. 118.

Ses bulbes sont oblongues, fasciculées, d'où s'élève une tige droite, cylindrique, garnie de feuilles linéaires, vaginales à leur partie inférieure. Les fleurs sont unilatérales, disposées en un épi contourné en spirale. Le pétale inférieur est divisé en trois lobes; celui du milieu est plus grand & un peu crénelé.

Cette plante croît dans l'Amérique.

13. SATIRION à feuilles de plantain. *Satyrion plantaginum*. Linn.

*Satyrion bulbis subprostratis; foliis caulinis ovatis, petiolatis, vaginantibus; nectarii labio integro*. Linn. Spec. Plant. vol. 4. pag. 20. n°. 6. — Jacq. Amer. 221.

*Orchis elatior latifolia, aphroditi radice; spica strigosa*. Sloan, Jam. 119. Hist. 1. pag. 250. tab. 147. fig. 2.

*Helleborine foliis liliaceis, radice aphroditi, minor*. Plum. Spec. 9. Icon. 190.

*Satyrion erectum minus, aphroditi radice; foliis oblongo-ovatis, radicalibus; scapo assurgente*. Brown, Jam. 314.

Cette espèce est remarquable par ses larges feuilles assez semblables à celles du plantain commun, & distinguée par le pétale inférieur très-entier.

Ses racines sont composées de plusieurs fibres épaisses, simples, charnues. Les tiges s'élèvent à la hauteur d'environ deux pieds; elles sont garnies, dans une grande partie de leur longueur, de feuilles alternes, pétiolées, ovales, très-grandes, entières, acuminées à leur sommet, glabres & lisses à leurs deux faces, marquées de cinq nervures principales, supportées par des pétioles de deux tiers plus courts que les feuilles, canaliculées, & en gaine à leur base.

Les fleurs sont disposées en un long épi simple, très-droit; elles sont très-rapprochées, presque sessiles, de couleur blanche. Les cinq pétales supérieurs sont réunis en une sorte de casque à cinq

pointes; le pétale inférieur, pendant, étroit, entier, plus court que l'ovaire, renflé à sa base en une vésicule oblongue. Les anthères sont conniventes, & les spathes, ovales, lancéolées, de la longueur de l'ovaire.

Cette plante croît dans les forêts humides & ombragées de la Martinique, & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale.

14. SATIRION épipogée. *Satyrium epipogium*. Linn.

*Satyrium bulbis compressis, dentatis; caule vaginato; nectarii labio resupinato, indiviso*. Linn. Syst. veget. pag. 676. — Jacq. Austr. tab. 84. — Web. Spicil. pag. 23.

*Satyrium bulbis compressis, dentatis; caule vaginato, corollis resupinatis; nectarii labio albo, indiviso*. Linn. Spec. Plant. 2. pag. 1338.

*Epipactis epipogium*. Crantz, Austr. pag. 477. n°. 10.

*Epipogium*. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 12. tab. 2. fig. 1.

*Epipactis caule aphyllis; flore supinato; labello ovato, lanceolato; calcar ovato, turgido*. Haller, Helv. 1289. — Aët. Bernet. 5. pag. 309.

*Limodorum epipogium*. Swartz, pag. 243.

Ses bulbes sont plates, comprimées, charnues, divisées en dents à leur base: il s'en élève des tiges simples, droites, cylindriques, recouvertes seulement par des gaines ou des feuilles sans expansion.

Les tiges sont terminées par des fleurs retournées, dont le pétale inférieur est entier, ovale, lancéolé, de couleur blanche, renflé à sa base en une sorte de bourse ovale.

Cette plante se trouve dans la Sibérie: on la rencontre également, d'après Haller, dans la Suisse, l'Allemagne & l'Autriche, dans les lieux stériles & ombragés. ☞

15. SATIRION du Cap. *Satyrium capense*. Linn.

*Satyrium bulbis* — nectarii labio, longitudine petalorum latiore, obtuso, emarginato, utrinque undulato. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 20. n°. 8. — Amœn. Academ. vol. 6. — Afric. n°. 93. p. 110.

Cette plante est munie de quelques feuilles radicales linéaires, lancéolées, médiocrement striées, droites, fermes. Les tiges sont garnies de feuilles alternes, vaginales, amplexicaules, entières, plus courtes vers la partie supérieure des tiges, acuminées à leur sommet.

Les fleurs forment une grappe ou un épi lâche, terminal, garni de bractées lancéolées, insensibles

ment plus petites. Les pédoncules sont de la longueur des fleurs. Les cinq pétales supérieurs de la corolle sont presque égaux, lancéolés; le pétale inférieur, plus large & plus long que les supérieurs, très-obtus à son sommet; échanuré, muni, vers son milieu & à chaque côté, d'une dent obtuse; garni, à la partie postérieure, d'un éperon très-court & obtus.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (Description, ex Linn.)

16. SATIRION rampant. *Satyrium repens*. Linn.

*Satyrium bulbis fibrosis; foliis ovatis, radicalibus; floribus secandis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 20. n°. 7. — Aët. Upsal. 1740. pag. 20. — Flor. suec. 732. 807. — Dalib. Paris. 278. — Gunn. Norv. n°. 321. tab. 6. fig. 1. — Jacq. Flor. austr. tab. 369. — Reich, Flor. mœno-franc. n°. 651.

*Epipactis foliis petiolatis, ovato-lanceolatis; floribus tetrapetalis, hirsutis*. Haller, Helv. n°. 1295. tab. 22. — Aët. Helv. 4. pag. 114.

*Epipactis repens*. Crantz, Austr. p. 473. n°. 6.

*Satyrium (repens), radice fibrosa, repente; foliis radicalibus ovalibus, venoso-maculosis; scapo aphyllis spicisque pubescentibus*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 157.

*Neottia repens*. Swartz, Observ. p. 126.

*Helleborine radice repente; foliis maculis nigris suffulatis*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 287. §. 12. tab. 11. fig. 10. ?

*Orchioides*. Trew. Comm. Noric. 1736. tab. 6. fig. 7.

*Satyrium foliis ovatis, radicalibus*. Flor. lappon. 314.

*Orchis minor, flosculis albis, seu radice repente*. Camer. Hort. III. tab. 35.

*Pseudo-orchis*. C. Bauh. Pin. 84.

*Palma Christi, radice repente*. Ger. Hist. Plant.

*Pyrola angustifolia, polyanthos; radice geniculata*. Loef. Pruff. 210. tab. 68.

*Epipactis, foliis ovatis, radicalibus*. Gmel. Sib. 1. pag. 13.

*Orchis repens*. Eyfser. Hort.

§. *Orchis radice repente, foliis maculis nigris & albis adpressis*. Mentz, Pug. tab. 3. fig. 4, 5.

Ses racines sont fibreuses, charnues, rampantes, point palmées. Les feuilles, presque toutes radicales, sont ovales, médiocrement pétioles, glabres, marquées de taches noirâtres, brunes & blanchâtres, disposées presque en quadrille, rétrécies, à leur base, en un pétiole court, vaginal.

Les tiges sont droites, simples, & peuvent être regardées comme de véritables hampes, si l'on considère, comme autant de spathes, les feuilles courtes, alternes, vaginales qui les enveloppent.

Les fleurs sont disposées en un épi grêle, alongé, terminal, sur lequel elles sont rangées toutes du même côté, soutenues par un pédoncule d'une longueur médiocre. La corolle est blanche; les pétales supérieurs, ovales, aigus, rapprochés en forme de calque; le pétale inférieur, entier, lancéolé ou ovale-oblong, crénelé, vers sa base, en une carène oblongue.

Cette plante croît en Suède, en Angleterre, en Suisse, dans l'Allemagne & la Sibirie, sur les montagnes alpines, dans les forêts de pins.

\* *Espèces bien moins connues.*

\* *Satyrium (triste)*, bulbis indivisis, galeâ uniculcatâ, labello integro. Linn. f. Suppl. pag. 402.

\* *Satyrium (tabulare)*, bulbis rotundis, caule folioso, labello triplo, lacinia emarginatâ. Linn. f. Suppl. pag. 402.

\* *Satyrium (gigantum)*, bulbis rotundis, caule nudo, labello sagittato. Linn. f. Suppl. pag. 402.

\* *Satyrium (aculeatum)*, bulbis rotundis; caule folioso; labello integro, inermi, aculeato. Linn. f. Suppl. pag. 402.

\* *Satyrium (elatum)*, bulbis fasciculatis, caulis tomentosis; foliis radicalibus, ovatis, petiolatis; caule subnudo; neârio quadrilobo. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 56. — Plum. Icon. 190.

SATURIER de Bourbon. *Psatura borbonica*. Comerrf.

*Psatura foliis oppositis, petiolatis, ovato-oblongis; paniculâ terminali.* (N.)

*Psatura*. Juss. Gener. Plant. pag. 206. — Lam. Illustr. Gener. tab. 26c. — Commerf. Herb.

*Psatura borbonica*. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 577. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 229.

Vulgairement bois cassant.

Genre de plantes, établi par Commerf. qui ne renferme encore qu'une seule espèce, & qui appartient à la famille des rubiacées; il a de grands rapports avec les *erubalis*, & comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, à rameaux noueux & cassants, dont les feuilles sont opposées, & les fleurs disposées en corymbes terminaux, paniculés.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice supérieur à six dents; une corolle campanulée, à six lobes, barbue en dedans; six étamines;

un stigmate lamelleux; un drupe sec, strié, à six loges, chaque loge monosperme.

C'est un arbruste peu élevé, dont les tiges sont glabres, droites, divisées en rameaux étalés, noueux, très-fragiles, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, rétrécies en pétiole alongé à leur base, marquées de quelques nervures fines & latérales.

Les fleurs forment, à l'extrémité des rameaux, des panicules étalées, à ramifications opposées, qui présentent chacune autant de petits corymbes dont les pédoncules sont glabres, presque capillaires, soutenant de petites fleurs globuleuses.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, divisé à son orifice en six petites dents courtes, rapprochées, aiguës.

2°. Une corolle campanulée, dont le tube est très-court, le limbe divisé en six découpures ovales, aiguës, barbues en dedans.

3°. Six étamines, dont les filaments sont très-courts, insérés sur le tube de la corolle, terminés par des anthères droites, ovales, plus courtes que la corolle.

4°. Un ovaire inférieur, globuleux, surmonté d'un style droit, un peu plus long que les étamines, terminé par un stigmate composé de trois ou quatre lames.

Le fruit est un drupe sec, de la grosseur des semences de la coriandre, sphérique, strié, couronné par les dents du calice, divisé en six loges, chacune d'elles renfermant une semence concave d'un côté, convexe de l'autre.

Cet arbruste croît à l'île Bourbon, où il a été recueilli par Commerf. (V. f. in herb. Juss.)

SAUGE. *Salvia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées, qui a des rapports avec les romarins, & qui comprend des herbes ou sous-arbrustes, les uns exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, à feuilles opposées, entières ou quelquefois pinnatifides; les fleurs verticillées, en épis, munies de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à deux lèvres; une corolle en guele; les filaments des étamines attachés transversalement sur un pétaule, & comme fourchus.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :



1°. Un *calice* d'une seule pièce, un peu campanulé, strié, à deux lèvres; la supérieure à trois dents; l'inférieure bident.

2°. Une *corolle* monopétale, irrégulière, dont le tube est élargi & comprimé à sa partie supérieure, le limbe divisé en deux lèvres; la supérieure concave, comprimée, courbée en dedans; l'inférieure, élargie, à trois découpures; celle du milieu plus grande, échancrée ou arrondie.

3°. Deux *étamines*, dont les filamens sont très-courts, semblables à un pivot, sur lequel est attaché presque transversalement un autre filament portant une glande à son extrémité inférieure, & une anthère à l'extrémité supérieure.

4°. Un *ovaire* supérieur, à quatre divisions, surmonté d'un style filiforme, très-long, terminé par un stigmate bifide.

Les *semences* sont dépourvues de périscarpe, renfermées au nombre de quatre, arrondies, situées dans le fond du calice persistant.

*Observations.* Les sauges forment un très-beau genre dans l'ordre des familles naturelles, remarquable surtout par la disposition & la forme des étamines, dont le filament est porté transversalement sur un pivot ou un autre filament fort court, inféré sur la corolle. Dans les sauges proprement dites, telles que le *salvia officinalis*, le filament est placé exactement dans son milieu sur le pivot, & forme une sorte de balance, dont une des extrémités est terminée par une anthère fertile, l'autre extrémité par une glande ou une anthère stérile. Ce caractère, joint à celui de la lèvre inférieure de la corolle à trois lobes, mais point concave, constitue les *salvia* de Tournefort.

Dans d'autres espèces, les filemens des étamines offrent bien le même caractère, mais leur insertion sur le pivot est plus latérale, tellement qu'un de leur côté est plus long que l'autre; ce qui forme les *scalaria* de Tournefort, en y ajoutant quelques autres particularités présentées par la corolle, dont la lèvre supérieure est comprimée latéralement & courbée en faucille; l'inférieure trilobée, concave ou creusée en forme de coquille de limaçon.

Enfin dans plusieurs espèces la lèvre supérieure est droite ou presque droite, médiocrement allongée, peu comprimée, recourbée & creusée à son sommet en forme de casque, entière ou légèrement bifide. Ce caractère a déterminé Tournefort à établir son genre *horminum*.

Ces considérations sont d'autant plus importantes, qu'elles pourront servir par la suite à établir des divisions très-utiles dans un genre aussi nombreux en espèces; mais il faudroit auparavant les connoître toutes parfaitement, & être surtout bien certain des caractères de leur fructification. Comme je n'ai pu observer un grand nombre d'en-

tr'elles que dans les herbiers, & que je m'en suis rapporté, pour d'autres qui me sont inconnues, à la description souvent très-facile des auteurs qui en ont parlé, je n'ai pas voulu hasarder une distribution qui bien certainement n'eût pas été très-exacte.

On peut encore ajouter que les espèces qui composent les trois genres de Tournefort, ont un port assez souvent relatif au genre auquel elles appartiennent. Les *salvia* ont leurs feuilles très-épaisses, entières ou légèrement finies, allongées, plus ou moins étroites, quelquefois auriculées à leur base. Ces mêmes feuilles sont amples, larges, souvent très-grandes, ovales ou en cœur, à grosses dents, crénelées, acuminées dans les *horminum*; elles sont plus allongées, lancéolées, laciniées, pinatifides dans les *scalaria*. Ces caractères généraux & secondaires ne sont cependant point constants dans toutes les espèces; plusieurs *scalaria* se rapprochent beaucoup des *horminum* par leur port.

### ES P È C E S.

#### 1. SAUGE d'Égypte. *Salvia aegyptiaca*. Linn.

*Salvia foliis linearilanceolatis, denticulatis, angustis; spicis tenuibus, stridis, subuliformibus.* Lam. illust. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 282.

*Salvia foliis linearilanceolatis, denticulatis, ramosis; bracteis ovatis, mucronatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 221. n°. 1.

*Salvia foliis lanceolatis, denticulatis; floribus pedunculatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 33. — Syst. veg. pag. 64. — Jacq. Hort. tab. 108. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 19.

*Salvia foliis linearilanceolatis, denticulatis; floribus pedunculatis.* Hort. Cliff. 13. — Roy. Lugd. Bat. 309. — Gouan, illust. pag. 2.

*Horminum aegyptium, minimum, ramifissimum.* Boech. Ind. 166.

*Salvia foliis lanceolatis, denticulatis; verticillis subtrifloris; bracteis minutis, mucronatis.* Etling. de *Salvia*, 22.

*Melissa* (perennis), *floribus verticillatis, utrinque ternis, pedunculatis; foliis oblongis, serratis.* Forsk. Flor. aegypt.-arab. pag. 108. n°. 30.

Cette espèce, très-voisine du *salvia cretica*, est distinguée par ses fleurs très-petites, médiocrement pedunculées.

Ses racines sont presque ligneuses, & produisent des tiges très-dures à leur partie inférieure, droites, tétragones, de couleur cendrée ou un peu verdâtres, chargées de quelques poils couchés, divisées en rameaux très-nombreux, gîles, hérissés de poils courts, inversés; garnies de feuilles étroites, linéaires, lancéolées, rétrécies en pé-

tiolo à leur base, ridées, ondulées, denticulées à leur contour, longues d'environ un demi-pouce, un peu velues, ciliées, blanchâtres.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, composés de verticilles, dont les inférieurs contiennent six fleurs, les supérieures deux; ces dernières avortent très-fréquemment; elles sont garnies de bractées fort petites, ovales, aiguës, plus courtes que le pédoncule. Leur calice est velu, strié, cilié à ses bords, divisé en deux lèvres; la supérieure plus courte, à deux dents. La corolle est petite, blanche ou bleuâtre, ponctuée; la lèvre supérieure très-courte. Le stigmate, d'après Forsk. est simple, non bifide, recourbé.

Cette plante croît dans l'Égypte, aux îles Canaries, & dans la Barbarie, où M. Desfontaines l'a recueillie dans les plaines sablonneuses proche Caffa. ☉ (P. f.)

#### 2. SAUGE de Crète. *Salvia cretica*, Linn.

*Salvia foliis angustifolius lanceolatis, undatis, in petiolum attenuatis; calicibus profundissime bisectis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 67. n°. 183.

*Salvia foliis linearilanceolatis, floribus digynis, calicibus diphyllis.* Willd. Arb. Berol. pag. 352. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 128. n°. 3. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 222. n°. 2.

*Salvia foliis lanceolatis, calicibus diphyllis.* Linn. Spec. Plant. 33. — Schreb. Nov. Act. Acad. N. C. III. pag. 479. — Eting. *Salvia*. n°. 3.

*Salvia foliis perangustis, sinuatis, longis petiolis infundensibus, lanuginosis.* Pluken. Phytogr. tab. 57. fig. 1, sine flore. — Schreb.

*Salvia cretica, angustifolia.* Clus. Hist. pag. 343.

*Salvia angustifolia, ferrata.* Tourn. Inst. R. Herb. 181. — Moris. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 15. fig. 16.

*Salvia tenuifolia.* Rivin. Monop. tab. 128. Bona. — J. Baul. Hist. 3. pag. 306. Icon.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le *salvia aegyptiaca*, & même avec le *salvia officinalis*. On la distingue par ses fleurs plus grandes que celles du *salvia aegyptiaca*, presque sessiles, & du *salvia officinalis*, par les calices profondément divisés en deux, & par les feuilles bien moins ridées, moins épaisses, très-entières à leurs bords.

Ses tiges sont ligneuses, cylindriques, couvertes d'un duvet court, tomenteux, blanchâtre ou cendré; divisées en rameaux très-nombreux, droits, distichés, tomenteux, simples, garnis de feuilles opposées, pétiolées, étroites, lancéolées, presque linéaires, médiocrement ridées, entières à leurs bords ou un peu denticulées & sinuées, obtuses à leur sommet, quelquefois aiguës, un peu velues,

particulièrement à leur face inférieure, vertes en dessus, presque cendrées ou un peu blanchâtres en dessous, longues d'un à deux pouces; leur pétiole long d'environ un pouce.

Les fleurs forment un épi terminal, composé de verticilles distans, peu garnis, contenant chacun six, quatre ou deux fleurs à peine pédunculées, dont le calice est pubescent, un peu blanchâtre, profondément divisé en deux lèvres, l'inférieure bifide, la supérieure à trois dents très-aiguës; la corolle un peu purpurine, assez grande; le style bifide ou partage en deux stigmates très-longs. Les bractées sont très-petites, velues, subulées, très-caduques. Les semences avortent très-souvent.

Cette plante croît naturellement dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes. ☿ (P. v.)

#### 3. SAUGE à feuilles de lavande. *Salvia lavandulifolia*, Vahl.

*Salvia foliis linearilanceolatis, crenulatis, subsinuatis; pedunculis elongatis, caule frutesco.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 212. n°. 3.

*Salvia hispanica, lavandulifolia.* Tourn. Inst. R. Herb. 181.

Ses tiges sont droites, ligneuses, hautes à peine de trois à quatre pouces, dépourvues de feuilles, cylindriques, divisées à leur partie supérieure en rameaux roides, droits, un peu tétragones, blanchâtres, garnis de feuilles pétiolées, longues à peine d'un pouce, larges au plus de trois lignes, très-obtuses à leur base, un peu aiguës à leur sommet, linéaires-oblongues, crénelées à leur contour, très-rapprochées à la base des rameaux; les deux paires supérieures distantes, glabres & finement ridées en dessus, chargées en dessous d'un léger duvet tomenteux & blanchâtre; les supérieures un peu plus grandes, ridées à leurs deux faces, velues.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des rameaux en un épi simple, quelquefois trifide, composé de verticilles distans, à quatre ou cinq fleurs sessiles, munis de bractées ovales, petites, aiguës. Les calices sont tubulés, fortement striés, d'un vert-pourpre, un peu blanchâtres, à cinq dents aiguës, trois fois plus longs que les bractées; la corolle une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît sur le mont Moncago, dans l'Espagne. ☿ (*Descript. ex Vahl.*)

#### 4. SAUGE cultivée. *Salvia officinalis*, Linn.

*Salvia frutescens, foliis oblongo-ovatis, crenulatis, tenuiter rugosis; verticillis laxis, spicatis; calicibus acutis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 287.

*Salvia*

*Salvia foliis lanceolato-ovatis, crenulatis; verticillis paucifloris, calicibus mucronatis, bracteis longioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 213. n° 4.

*Salvia foliis lanceolato-ovatis, crenulatis; verticillis paucifloris, calicibus mucronatis.* Elting. *Salvia*, n° 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 129. n° 7.

*Salvia foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis; floribus spicatis, calicibus acutis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 34. — Hort. Cliffort. 12. — Hort. Upfal. 10. — Mater. medic. pag. 39. — Blackw. tab. 10. — Miller, Dict. n° 1. — Hoffm. Germ. 10. — Bergeret, Phytogr. 2. pag. 89. Icon. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 428. n° 459. XIII. — Destont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 20.

*Salvia major. Asphacalus Theophrasti?* C. Bauh. Pin. 237. — Tournel. Inst. R. Herb. 180.

*Salvia major.* Dalech. Hist. 1. p. 279. Icon. — Dodon. Pempt. 350. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 304. Icon. — Matth. Comment. 124. le. — Tabern. Ic. 370. — Fuchs. Hist. 248. Ic. — Lobel, Ic. 554. — Idem, Obseiv. 299. Ic.

*Salvia latifolia.* Tragus, 52. Ic. — Camer. Epitom. 475. Ic. — Rivin. 1. tab. 71.

*Salvia minor, aurita & non aurita.* C. Bauh. Pin. 237. — Blackw. tab. 71. — Gmel. Sibir. 3. pag. 226. — Tournel. Inst. R. Herb. 181.

*Salvia minor, auriculata.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 305. Icon.

*Salvia minor.* Dodon. Pempt. 290. Icon. — Lobel, Ic. 555. — Idem, Obseiv. 299. Ic. — Fuchs. Hist. 249. Icon.

*Sphacalus verus Theophrasti.* Dalech. Hist. 1. pag. 880. Icon.

*Salvia major, foliis variegatis.* C. Bauh. Pin. 237. — Tournel. Inst. R. Herb. 180.

*Salvia major, foliis ex lateo & viridi variegatis.* Tournel. Inst. R. Herb. 180.

2. *Salvia (tom-nofa), foliis infimis, cordatis; summis longo-ovatis, serratis, tomentosis; floribus verticillato-spicatis.* Miller, Dict. n° 2.

*Salvia (grandiflora), foliis cordato-oblongis, crenatis; verticillis multifloris, calicibus acutis.* Elting. de Sav. 2. n° 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 138. n° 8.

*Salvia flore magno.* Riv. Monopet. tab. 127.

*Salvia latifolia, ferrata.* C. Bauh. Pin. 237. *Valguirement fruge balsmique.*

3. *Salvia ferrata, crisp.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 305. Icon.

*Salvia crisp.* Riv. Monopet. tab. 126.

*Salvia major, crisp, folio subrotundo.* Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 15. fig. 7.

Cette espèce, cultivée dans tous les jardins, & Botaniqu. Tome VI.

si connue, tant par ses usages économiques, que par son emploi dans la médecine, a des tiges dures, ligneuses, qui produisent un très-grand nombre de rameaux presque quadrangulaires, droits, velus, un peu blanchâtres, haurs d'environ deux pieds, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, lancéolées, tidees, à rides latérales, très-légèrement crénelées à leurs bords, épaisses, de couleur un peu cendrée, d'un vert-foncé en dessus, un peu blanchâtres en dessous, pubescentes à leurs deux faces, supportées par des pétioles presque aussi longs que les feuilles, plus courts aux feuilles supérieures.

Les fleurs sont disposées en verticilles assez rapprochés, au nombre de six ou huit, sur un épi droit, simple, alongé, terminal; garnies de bractées ovales, aiguës, caduques, mucronées à leur sommet, élargies. Leur calice est étiré, à deux lèvres, à cinq dents très-aiguës; les trois supérieures presque égales, plus petites. La corolle est assez grande, d'un bleu tourteâtre, à deux lèvres; la supérieure obuse, échancrée; l'inférieure à trois lobes; les lobes latéraux échancrés; celui du milieu plus grand, échancré.

Cette plante offre plusieurs variétés remarquables, tant dans la forme, que dans la grandeur des feuilles. Quelquefois ces feuilles sont larges, presque ovales ou étroites, lancéolées; elles sont, dans la variété 2, ordinairement plus petites, munies la plupart d'un ou de deux lobes ou oreillettes à leur base; les verticilles plus caillés, les calices souvent colorés: ces feuilles dans la variété 3 se penchent de diverses couleurs; ce qui produit plusieurs autres variétés très-agréables. Enfin, la plante 2 formoit presque une espèce séparée par la blancheur de neige de ses feuilles à leurs deux faces, surtout aux feuilles inférieures. Quant à la variété 1, ses feuilles larges, quelquefois crépues, tomenteuses, la distinguent des autres variétés. Comme nous ne la connoissons que cultivée, & que son pays natal est encore inconnu, on peut soupçonner qu'elle a été produite par le *salvia officinalis*, quoiqu'il affez bien caractérisée pour la distinguer comme espèce.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe méridionale. On la cultive dans tous les jardins. (V. v.)

Cette plante est regardée comme tonique, cordiale, céphalique, stomachique, attringente & netvine; elle possède la plupart de ces qualités à un si haut degré, suivant les auteurs anciens, que l'École de Salerne a dit, en parlant de la sauge:

*Cum moriatur homo, cui salvia crescit in horto?*

Et ailleurs, en la considérant comme un excellent contre-poison:

*Salvia cum ruta faciunt tibi pocula ista. Ecco*

« On s'en sert en infusion pour rétablir l'appétit, ranimer la circulation dans les pâleurs, les ligueurs, les trax-urs ; on la recommande dans l'asthme humide, la toux catarrhale. Infusée dans du vin, elle arrête les sueurs qui épuisent les convalescents. Extérieurement, la sauge est un bonferrimitaire. On l'emploie en gargarisme pour guérir les aphres des enfans, les ulcères de la bouche, & pour fortifier les genives. Appliquée en sachet, elle est tonique & relolutive.

« Les Chinois aiment tant la sauge, qu'ils s'étonnent comment les Européens viennent chercher le thé dans leur pays, pendant qu'ils ont chez eux une plante aussi excellente ; aussi les Hollandais ont-ils grand soin d'enlever, à bon marché, toute la récolte de la sauge qui croit sur les côtes des d-pattemens méridionaux, & de la porter en Chine, où ils la vendent très-cher, tant aux Chinois qu'aux Japonais. On prétend que dans l'échange d'une caisse de sauge, ils en obtiennent deux caillis & sucent trois ou quatre.

« On fume de la sauge comme du tabac, pour débarrasser le cerveau. La décoction des feuilles & des fleurs est très-utile pour fortifier les nerfs, ramollir les tumeurs & dissiper les enflures.

« On prépare avec les fleurs de sauge, une conserve & une eau distillée ; avec la plante entière, une huile distillée, & une huile par infusion & par coction. L'on fait aussi un vinaigre avec les fleurs & les feuilles. Cette huile aromatique est bonne dans les rhumatismes.

« Comme les sauges conservent leurs feuilles pendant l'hiver, elles sont très-propres à décorer les bosquets pendant cette saison, surtout les variétés à feuilles panachées. Toutes sont un bel effet dans l'éto quand elles sont en fleurs ; c'est pour cela qu'on en fait des bordures dans les potagers. Ces plantes ne sont pas délicates sur la nature du terrain.

« Tournefort nous apprend qu'il a vu au Levant des galls fort grosses sur certaines sauges, qu'elles font bonnes à manger, qu'on les porte au marché, & qu'on les confit au sucre. » (*Bom. Did.*)

5. SAUGE à feuilles de marrube. *Salvia marrubifolia*. Vahl.

*Salvia incano-tomentosa, foliis cordato-ovatis, rugosis; floribus axillaribus, solitariis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 223. n°. 5.

Ses tiges se divisent en rameaux quadrangulaires, garnis de feuilles pétiolées, ovales, en cœur, longues à peine d'un pouce, légèrement cannelées dans leur entier développement, obtuses à leur sommet, blanches, tomenteuses, très-veinées en dessus, beaucoup plus blanches à leur face inférieure ; les jeunes feuilles très-entières. Il

fort des aisselles de toutes les feuilles des rudimens de jeunes rameaux.

Les fleurs sont axillaires, solitaires, supportées sur des pédoncules simples, très courts, unifiés. Les calices sont quatre fois plus courts que les feuilles, étroits, à cinq dents égales, chargés de poils glanduleux à leur sommet. La corolle est de moitié plus longue que le calice ; le style plus long que la corolle.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On la suppose originaire du Levant. 5

6. SAUGE pomifère. *Salvia pomifera*. Linn.

*Salvia foliis lanceolato-ovatis, integris, crenulatis; floribus spicatis, calicibus obtusis*. Linn. Syll. Plant. vol. 1. pag. 62. n°. 5. — Hort. Cliff. 12. — Roy. Lugd. Bat. 307. — Miller, Dict. n°. 6. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 286.

*Salvia foliis cordato-ellipticis, obtusis, tomentosis, marginibus crenulatis; verticillis confertis; calicibus trifidis*. Willd. Arb. Berol. pag. 553. — Idem, Spec. Plant. vol. 1. pag. 130. l°. 10.

*Salvia foliis ovato-lanceolatis, rugosis, crenulato-undulatis; calicibus amplius, obtusis; bracteis ovatis, longioribus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 225. n°. 8.

*Salvia (fragifera), foliis cordato-oblongis, crenulatis, obtusis, tomentosis; floribus spicatis, calicibus trifidis*. L'Herminier, *Salvia*, n°. 5.

*Salvia cretica, frutescens, pomifera; foliis longioribus, incanis & crispis*. Tournet. Cor. 10. lin. 1. pag. 92. tab. 92.

*Salvia crispifolia*. Riv. Monopet. tab. 125.

On distingue cette plante du *salvia effinitis*, à ses feuilles plus allongées, & surtout à ses calices r-nés, obtus, & aux paquets globuleux qui forment les fleurs avant leur épanouissement, souvent occasionnés par des piqures d'insectes.

Ses tiges sont droites, presque ligneuses, un peu tétragones, d'une couleur cendrée forcée, à peine pubescentes, hautes de deux à trois pieds, divisées en rameaux assez nombreux, droits, allongés, quadrangulaires, garnis de feuilles longuement pétiolées ; les inférieures souvent en cœur, plus larges ; les supérieures & caulinaires lancéolées, presque elliptiques, épaisses, très-ri-deuses, longues de deux ou trois pouces, crénelées, crépues ou un peu ondulées à leur contour, obtuses à leur sommet, légèrement tomenteuses, d'un vert un peu cendré ou foncé en dessus, blanchâtres en dessous ; les pétioles plus courts que les feuilles.

Les fleurs présentent souvent avant leur épanouissement une sorte de tête presque globuleuse

ou ovale; elles forment un épi touffu, verticillé, dont les fleurs sont médiocrement pedunculées, munies de bractées courtes, oval s., obtuses, caduques. Leur calice est ample, veiné, glabre, un peu coloré, surtout vers son sommet, à deux levres; l'inférieure à deux lobes ovales, obus; la supérieure presque égale, à trois lobes arrondis; celui du milieu très-petit, tous terminés par une petite pointe très-courte. La corolle est grande, d'un blanc-jaunâtre; la lèvre supérieure allongée, droite, concave; l'inférieure élargie, à trois grands lobes arrondis, inégaux; le style glabre, très-long; le stigmate bifide.

Cette plante croît dans le Levant, dans la Syrie, la Palestine, & dans l'île de Crète. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

7. SAUGE à tiges nombreuses. *Salvia multicaulis*. Vahl.

*Salvia tomentosa, foliis subcordato-oblongis, obtusissimis, crenatis; calicibus hirtis, bracteis lanceolatis, caule herbaceo.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 225. n°. 9.

Cette plante a des tiges nombreuses, droites, hautes d'un demi-pied, feuillées particulièrement à leur base; blanches, tomenteuses, pileuses à leur partie supérieure entre les verticilles, garnies de feuilles pétiolées, oblongues, presque en cœur, longues d'un pouce & demi, blanchâtres & tomenteuses à leurs deux faces, veinées, légèrement ridées, crénelées à leur contour, très-obtus à leur sommet, soutenues par des pétiolés pileux, blanchâtres.

Les fleurs, disposées en épis terminaux, sont composées de verticilles distans, à six fleurs, garnis de bractées lancéolées, plus courtes que le calice. Celui-ci est grand, campanulé, membraneux, veiné, hérissé de poils, & dont les découpures sont arrondies.

Cette plante croît dans le Levant. (Vahl, ex herb. Desfont.)

8. SAUGE à trois lobes. *Salvia triloba*. Linn. f.

*Salvia tomentosa, foliis petiolatis, rugosissimis, trilobis; lobo intermedio producto, oblongo; lateralibus ovatis, obtusis.* Linn. f. Suppl. pag. 88. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 130. n°. 9. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 224. n°. 7.

*Salvia (auriculata), foliis lanceolatis, serratis auriculatis, subius tomentosis; floribus spicato-verticillatis, calicibus ventricosiss.* Miller, Dict. n°. 6.

*Salvia (baecifera), foliis ovato-lanceolatis, crenulatis, obtusis, tomentosis; verticillis paucifloris, calicibus acutis.* Felling. *Salvia*, n°. 4.

*Salvia* (Clusii), foliis lanceolato-ovatis, inte-

gris, crenulatis; floribus spicatis; calicibus acutis, cernitibus, aequaliter dentatis. Jacq. Hort. Schœnbo. vol. 2. pag. 37. tab. 195.

*Salvia cretica, pomifera.* Clus. Hist. 343. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 399. 5. 11. tab. 15. fig. 4. — Pluken. Almag. 329. tab. 57. fig. 2.

*Salvia baecifera.* C. Bauh. 237. — Tournef. Inst. R. Herb. 181. — Rivin. Monopet. tab. 125.

*Salvia coccifera, sive baecata, crenensis.* Lobel. Adv. pag. 239. Icon.

*Salvia cretica, baecifera.* Camer. Epitom. 476. Icon. B.

*Salvia gattifera, cretica.* J. Bauh. Hist. 3. p. 306.

*Salvia quinquefolia.* Rivin. Monopet. tab. 131.

*Salvia* (syplea), frutescens, tomentosa; foliis petiolatis, lanceolatis, auriculatis, rugosissimis; verticillis plicatis primis, pilosis, obtusissimis. Lam. l. l. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 183.

*Salvia albifera.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 224.

*Salvia cretica, pomifera, flore albo.* Tourn. Coroll. 12.

Cette sauge n'est peut-être qu'une des variétés du *salvia officinalis*, dont elle diffère par les calices très-obtus, pilés, & qui se distingue encore à ses feuilles auriculées à leur base, à ses bractées ridées.

Ses tiges sont dures, ligneuses, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, très-épaisses, étroites, lancéolées, marquées à leurs deux faces de très-grosses rides, divisées à leur base, très-ordinairement en deux petits lobes ou oreilles courtes, obtuses, crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet, blanches, tomenteuses, particulièrement à leur face inférieure, un peu verdâtres en dessus, supportées par des pétiolés au moins une fois plus courts que les feuilles, excepté les radicales & inférieures, où ils sont plus longs.

Les fleurs sont petites, d'un bleu-foncé, formant, à l'extrémité des rameaux, des épis allongés, composés de verticilles peu garnis, presque sessiles. Les calices ont une seule pièce, à deux levres, pilées, striées, velues, un peu obus. Les bractées sont nulles ou très-caduques. Les fleurs, avant leur épanouissement, forment une sorte de tête arrondie.

Cette plante croît dans le Levant, la Syrie, sur le mont Syple, dans l'île de Crète. (V. f.)

9. SAUGE dentée. *Salvia dentata*. Ait.

*Salvia foliis linear-oblongis, serratis; verticillis*  
Eccc 2

*bifloris*, *calicibus obtusis*, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 232. n°. 22.

*Salvia foliis linearilobis, dentato-pinnatifidis; verticillis bifloris, laciniis calicinis obtusis*, Anton. Hort. Kew. vol. 1. pag. 37. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 128. n°. 2.

*Salvia (rigida), fruticosa; foliis lanceolatis, dentatis, tomentosis; ramis erectis, virgatis*, Thunb. Prodr. 96.

Arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'environ un pied & demi, dont les rameaux sont légèrement blanchâtres, tétragones à leur partie supérieure, garnis de feuilles pétiolées, opposées, linéaires-oblongues, profondément dentées en scie à leurs bords, étroites, longues d'environ six lignes, blanchâtres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, composés de verticilles qui ne contiennent chacun que deux fleurs munies de bractées rhomboïdales. Le calice est campanulé, point coloré, de la grandeur de celui du *salvia africana*, chargé de poils touffus, surtout à sa base; divisé en deux lèvres, dont les découpures sont obtuses; il devient membraneux avec l'âge.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. h

10. SAUGE ciliée. *Salvia ciliata*, Hort. Paris.

*Salvia foliis oblongo-lanceolatis, subserratis; bracteis subrotundis, ciliatis, mucronatis*, (N.)

Ses tiges se divisent en rameaux opposés, verdâtres, tétragones, rudes au toucher, fortement cannelés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, très-ouvertes, étroites, oblongues, lancéolées, légèrement dentées en scie à leur contour, obtus à leur sommet, légèrement ciliées à leurs bords, couvertes à leurs deux faces de quelques poils rares & couchés; les feuilles supérieures longues d'un à deux pouces, un peu rétrécies à leur base; les pétiols au moins une fois plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, à peine pédonculées, munies de bractées assez larges, presque planes, ovales ou un peu arrondies, rayées, velues, ciliées à leurs bords, mucronées ou terminées par une pointe sétacée, spinuliforme. Les calices sont petits, rubulés, blanchâtres & pubescents, aigus à leur sommet. Je n'ai point vu la corolle.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Je ne connois pas son lieu natal. (V. v.)

11. SAUGE crénelée. *Salvia circinnata*, Cavan.

*Salvia foliis cordatis, ovate-acutis, crenatis; cali-*

*cinis lobis obtusis*, Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 9. n°. 347. tab. 318.

Cette plante a, par la forme de ses corolles, de grands rapports avec le *salvia angustifolia*; mais elle en diffère entièrement par ses feuilles, qui lui donnent bien plus de ressemblance avec le *salvia amarissima*.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, quadrangulaires, chargées de quelques poils, divisées en rameaux opposés, un peu velus. Les feuilles sont pétiolées, opposées, ovales, échan-crées en cœur à leur base, molles, crénelées régulièrement à leur contour, aigues à leur sommet ou obtuses, presque glabres à leurs deux faces; les pétiols légèrement velus, ainsi que la principale nervure.

Les fleurs sont disposées en épis à l'extrémité des rameaux, composés de verticilles d'environ six fleurs pédonculées, munies de bractées opposées, ovales, acuminées, ciliées à leurs bords. Les calices sont velus, courts, rubulés, divisés en deux lèvres obtus; la supérieure entière, l'inférieure médiocrement bise ou échan-crée. La corolle est de couleur bleue, semblable à celle du *salvia angustifolia*, mais la lèvre supérieure est échan-crée & non pas entière; les étamines plus courtes que la corolle; le style non saillant, pubescent dans toute sa longueur.

Cette plante croît naturellement dans la Nouvelle-Espagne; elle est cultivée dans le Jardin botanique de Madrid; elle fleurit dans le courant de l'automne. x

12. SAUGE amère. *Salvia amarissima*, Na. Orteg.

*Salvia foliis cordatis, acutis, crenatis, rugosis; spicis erectis, corolla lobis infusiori amplis*, Orteg. Plant. Decad. 1. pag. 4.

*Salvia foliis cordatis, crenatis; prius bicallosis; caule calicibusque hirsutis; bracteis ovatis, ciliatis*, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 242. n°. 46.

C'est une plante herbacée, velue, d'une faveur très-amère, dont les racines produisent plusieurs tiges droites, à quatre angles mouffes, à quatre sillons, chargées de poils blancs & glanduleux, divisées en rameaux opposés; les supérieures de couleur purpurine, garnies de feuilles longuement pétiolées, en cœur, ouvertes, ridées, crénelées à leur contour, aigues à leur sommet; les pétiols canaliculés en dessus, munis en dessous & à leur base de deux callosités.

Les fleurs sont disposées en épis droits, terminaux, allongés, rangés par verticilles; chaque verticille de six à dix fleurs droites & pédicellées, garnies de bractées ovales, très-aigues, caduques, réfléchies, plus longues que les calices: ceux-ci sont divisés en trois dents. La corolle est violette;

son tube blanc, de la longueur du calice; la lèvre inférieure ample, une fois plus grande que la supérieure. Le style est velu vers son sommet, de la longueur de la lèvre supérieure; le stigmar violet. Les semences sont ovales, d'un brun-obscure.

Cette espèce croît au Mexique; elle fleurit dans le Jardin botanique de Madrid, dans les mois d'août & de septembre. (Descript. ex Orteg.)

### 13. SAUGE en lyre. *Salvia lyrata*. Linn.

*Salvia foliis radicalibus lyratis, densatis; calatularum galea brevissimâ*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. p. 61. n°. 3. — Spec. Plant. 33. — Erling. *Salvia*, n°. 25. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 128. n°. 4. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 68. n°. 287.

*Salvia foliis radicalibus lyratis, densatis; corollarum galea brevissimâ; caule subaphylla, retrosum pilosa*. Vahl. Enum. Plant. vol. 1. p. 257. n°. 83.

*Salvia caralaram, labio superiore brevior, fauce patente*. Gronov. Virgin. 8.

*Salvia foliis sinuato-ferratis, glabris; calice pilosissimo, corollâ vix calicem superante*. ? Zinn. Goett. 298.

*Horminum (lyratum), foliis pinnato-sinuatis, rugosis; calicibus corollâ longioribus*. ? Miller, Dict. n°. 2.

*Horminum virginianum, caule aphyllâ, foliis quercinis, tubulosa longâ flore*. Morif. Oron. Hist. 5. pag. 395. 6. 11. tab. 14. fig. 27.

*Salvia erecta, hirsuta; foliis radicalibus lyrato-sinuatis, obtusis; caulibus simplicibus, subaphyllis; spica remotè interruptâ; calicibus quinquefidis spiniferis; corollis promissè exsertis*. Mich. Flor. bot. Amer. vol. 1. pag. 14.

*Salvia lyrata*. Var.  $\beta$ . *Subaphylla*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 258. L. c.

*Horminum (virginicum), foliis cuneiformi-oblongis, caule bifolia*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 32.

*Meiss's asperubens, bugula folia*. Dillen. Eicham. 219 tab. 175. fig. 216.

*Sideritis bugula folio, mariana; floribus purpureis, Tanco rubo donatis*. Pluken. Mantill. 171.

Des feuilles découpées en lyre, surtout les inférieures; des corolles à longs tubes, dont les lèvres sont courtes, forment les principaux caractères distinctifs de cette espèce.

Ses tiges se divisent, presque dès leur base, en longs rameaux presque simples, droits, quadrangulaires, hauts d'environ un pied, velus, rudes, d'un vert-foncé, peu garnis de feuilles caulinares. Les radicaux sont nombreuses, pétiolées, ovales, oblongues, vertes en dessus, quelquefois rougeâ-

tres en dessous, chargées à leurs deux faces de poils courts, blanchâtres, couchés; les unes entières, sinuées à leur contour; d'autres échancrées en forme de lyre, dentées, obtuses à leur sommet, variées dans les sinuosités de leurs bords, quelquefois un peu pinnatifides. Il n'existe souvent que deux feuilles caulinares, opposées, médiocrement pétiolées.

Les fleurs sont disposées, par verticilles, sur un épi droit, lâche; les verticilles distans, composés de trois, quatre ou six fleurs pédonculées, munies de bractées ovales, lancéolées, aiguës, plus courtes que les calices, ciliées, caduques. La corolle est court, anguleux, à deux lèvres, à cinq dents aiguës, presque épineuses. La corolle est purpurine; son tube allongé, renflé à son orifice; la lèvre supérieure très-courte.

La variété  $\beta$  est remarquable par ses tiges plus élevées, par les feuilles radicales ovales, sinuées ou goudronnées; celles des tiges oblongues, très-entières.

Cette plante croît dans la Virginie, & depuis le Canada jusque dans la Caroline; elle y fleurit vers le milieu du printemps. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.  $\gamma$  (V. v.)

### 14. SAUGE sauvage. *Salvia silvestris*. Linn.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, crenatis, rugosis, subsessilibus; spicis longis; bracteis coloratis, flore brevioribus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 68. n°. 290.

*Salvia cordatis, rugosis, biferratis; bracteis coloratis, flore brevioribus, acuminatis; pilis, caulis calicisque simplicibus*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 39. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 133. n°. 19.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, undulatis, biferratis, maculatis, acutis; bracteis coloratis, flore brevioribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 34. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 32. — Scholl. Barb. n°. 25. — Jacq. Austr. 3. pag. 7. tab. 212. — Rorh. Germ. vol. 1. pag. 11. — II. pag. 29. — Hoffm. Germ. 9. — Etling. *Salvia*, n°. 37. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 426. n°. 459. VIII.

*Salvia foliis ovato-lanceolatis, acutis; bracteis flore brevioribus*. Crantz, Austr. pag. 241.

*Scarea foliis cordato-lanceolatis, acutis; bracteis coloratis, flore brevioribus*. Mill. Dict. n°. 7.

*Horminum silvestre, salvifolium, majus, maculatum*. C. Bauh. Pin. 239.

*Scarea folio salvia, major vel maculata*. Tournef. Inst. R. Herb. 179.

*Horminum silvestre quintum, altera species*. Clus. Hist. 2. pag. 31.

*Horminum silvestre*. Matth. 888.

Cette espèce se distingue à ses épis longs, munis de bractées colorées, plus courtes que les fleurs, & à ses feuilles lancéolées, aiguës, pétiolées, souvent tachetées.

Ses tiges sont droites, hautes de deux à trois pieds, quadrangulaires, vertes, pubescentes, divisées en rameaux étiles, alunges; les feuilles sont opposées, pétiolées; les inférieures un peu plus larges, ovales, lancéolées, échancrées en cœur à leur base; les caulinaires très-distantes; les supérieures presque sessiles, allongées, lancéolées, vertes en dessus, un peu pubescentes en dessous, & marquées souvent de taches blanchâtres; ridées, crénelées à leur contour, aiguës à leur sommet; les pétioles velus, presque cylindriques.

Les fleurs forment des épis grêles, assez longs, composés de verticilles distans, surtout les inférieurs; ils réunissent environ six fleurs presque sessiles, munies de bractées un peu élargies, colorées, plus courtes que le calice. Celui-ci est strié, velu, court, divisé en deux lèvres; l'inférieure biseulée, presque obtuse; la supérieure à trois divisions lancéolées, aiguës. La corolle est bleue, peu allongée; sa lèvre supérieure un peu velue, moins longue que le tube.

Cette plante croît naturellement dans les départements méridionaux de la France, sur le bord des chemins, dans les vignes; on la rencontre aussi en Autriche & dans la Bohême. (V. v.)

#### 15. SAUGE des bois. *Salvia nemorosa*. Linn.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, planis, inaequalibus, crenatis; inferioribus subsinuatis; bracteis coloratis, longitudoine florum.* Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 68. n°. 190.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, serratis, planis; bracteis coloratis; corolla labio infimo reflexo.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 64. n°. 11. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 226. — Roth. Gerin. vol. 1. pag. 11. — H. pag. 30. — Hoffm. Germ. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 134.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, aequaliter serratis; bracteis longitudoine calicis; corolla labio infimo reflexo.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 267.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, simpliciter serratis; spaminibus galiam aequantibus.* Linn. Gœtt. 297.

*Scalaria (nemorosa), foliis cordato-oblongis, crenatis, glabris; floribus verticillato-spicatis.* Miller, Dict. n°. 6.

*Horminum silvestre, salvifolium, minus.* C. Bauh. Pin. 239.

*Silva sativa silvia, minor seu glabra.* Tournef. Lib. II. Herb. 180.

*Gallitricum glabrum, folio salvia, flore purpureo.* J. Pauh. Hist. 3. pag. 372. Icon.

*Horminum silvestre quintum, species prior.* Clus. Hist. pag. 31.

*Salvia nemorosa.* Var. *β carulea*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 267. n°. 205.

*Horminum orientale, betonica folio acutissimo, flore caruleo.* Tournef. Coroll. pag. 10.

*Salvia nemorosa.* Var. *γ albiflora*. Vahl, Enum. Plant. L. c.

*Horminum orientale, betonica folio acutissimo, flore albo.* Tournef. Coroll. pag. 10.

Cette espèce a quelques rapports avec le *salvia silvestris*; elle en diffère par les bractées presque aussi longues que les fleurs, par les feuilles à crenelures arrondies, inégales.

Ses tiges sont dures, fortes, quadrangulaires, vertes ou légèrement purpurines, velues ou presque glabres, hautes de trois pieds & plus, divisées en rameaux nombreux, allongés, opposés, garnis de feuilles opposées, pétiolées; les racines échancrées en cœur à leur base, un peu sinuées & beaucoup plus grandes; les caulinaires ovales, lancéolées, planes, très-ulièrement crenelées à leur contour, aiguës à leur sommet, un peu ridées, velues, glabres à leur face supérieure, un peu plus pâles, & quelquefois légèrement tomenteuses en dessous.

Les fleurs présentent avant leur développement un épi parfaitement quadrangulaire par la disposition des bractées opposées, colorées, au moins de la longueur des fleurs, ovales, aiguës, acuminées. Les verticilles sont assez rapprochés; les fleurs sessiles. Les calices sont courts, glabres, colorés de pourpre vers leur sommet. La corolle est petite, d'une couleur bleu-rougeâtre foncée; le tube à peine plus long que le calice. La lèvre supérieure courte; l'inférieure à trois lobes, le lobe du milieu fortement réfléchi.

Cette plante se rencontre dans l'Autriche & la Tartarie. (V. v.)

Observations. Crantz & Eslinger regardent cette espèce comme une variété du *salvia silvestris*, qui en diffère par ses rameaux moins nombreux, par ses tiges & les calices bien moins pileux; par ses feuilles plus étroites, également dentées en scie, moins tomenteuses; par les bractées de la longueur du calice. Quoique, dans les plantes *β* & *γ*, les feuilles soient très-étroites, comme elles s'offrent d'ailleurs tous les caractères de cette espèce, elles n'en peuvent être séparées. Avant la floraison, les épis sont tétragones, les bractées colorées, les calices chargés de glandes jaunâtres & résineux.

#### 16. SAUGE de Valence. *Salvia valentina*. Vahl.



*Salvia foliis cordato-lanceolatis, inaequaliter crenatis; bracteis cordatis, attenuatis, basi coloratis, calice longioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 268. n°. 108.

*Horminum hispânicum, foliis herba venti, flore caruleo.* Bartel. Icon. rat. tab. 1317.

Cette plante a l'aspect du *salvia nemorosa*; ses tiges sont droites, herbacées, rameuses, quadrangulaires, velues, blanchâtres à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, oblongues, lancéolées, en cœur à leur base, inégalement crenelées à leur contour; les inférieures pétiolées; les supérieures sessiles, en cœur, un peu élargies, lancéolées, veinées, légèrement ridées, glabres à leur face supérieure, velues en dessous, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, formés par des verticilles distans entr'eux, composés de six fleurs, munis de bractées colorées, en cœur, velues, fortement rétrécies à leur base. Le calice est velu, strié, coloré, divisé en deux lèvres; la supérieure ovale, ascendante; l'inférieure bisfilée, à découpures pointues. La corolle est petite, de couleur bleue, à deux lèvres; la supérieure en casque, velue en dehors.

Cette plante croît en Espagne, dans le royaume de Valence. (V. f. in herb. Juss.)

#### 17. SAUGE hormin. *Salvia horminum*. Linn.

*Salvia foliis obtusa, crenatis; bracteis summis sterilibus, majoribus coloratis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 63. n°. 9. — Virid. Cliffort. 4. — Hort. Cliffort. 11. — Mater. medic. pag. 40. — Royen, Lugd. Bat. 210. — Lam. Illustr. vol. 1. pag. 68. n°. 292. — Willdén. Spec. Plant. vol. 1. pag. 132. n°. 17.

*Salvia foliis oblongis, crenatis, obtusis; calicibus frutifloris, apiculis; bracteis summis sterilibus, majoribus coloratis.* Erting. *Salvia*, n°. 16.

*Horminum sativum.* C. Bauh. Pin. 238. — Mill. D. C. n°. 5.

*Horminum verum Matthioli.* Gesn. Fasc. 17. tab. 11. fig. 21.

*Horminum comâ purpureo-violacée.* Tournef. Inf. R. Herb. 178. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 309. Icon.

*Horminum creticum.* Prop. Alpin. Exor. pag. 113. Icon. 112.

*Horminum creticum, comâ purpureo-violacée.* Bartel. Obicrv. 226. & Icon. 1233.

*Horminum.* Dodon. Pempt. 293. Icon. — Tabern. Hist. 764. — Lobel. Icon. 555.

*Salvia minor, comâ violacée.* Buxb. Centur. 4. pag. 24. tab. 39. fig. 2.

*Horminum comâ rubra.* Tournef. Inf. R. Herb. 178. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 309. — Riv. Monop. tab. 59. fig. 2.

*Horminum comâ viridi.* Tournefort, Inf. R. Herb. 178.

*Horminum sativum, alterum; foliis totis viridibus.* Tournef. Hort. Paris. L. c.

Des bractées assez larges, stériles & agréablement colorées à l'extrémité des épis, rendent cette plante facile à distinguer.

Ses tiges sont fermes, dures, quadrangulaires, velues, hautes de deux pieds & plus, divisées en rameaux droits, nombreux, élancés, garnis de feuilles opposées, pétiolées; les inférieures élargies, oblongues, très-obtus; les supérieures plus étroites, vertes à leurs deux faces, légèrement velues, un peu ciliées, crénelées à leur contour, longues de deux ou trois poices, supportées par des pétioles velus; les feuilles terminales sessiles.

Les feuilles sont disposées en verticilles distans, six à chaque verticille, formant un épi grêle, alongé, garni de bractées larges, ovales, aiguës, presque glabres, au moins aussi longues que les fleurs; les supérieures & terminales plus grandes, réunies en touffes, sans fleurs, d'un bleu très-vert ou de couleur pourpre, d'une belle couleur de rose dans la variété  $\beta$ , quelquefois entièrement vertes. Le calice est velu, étroit, à cinq dents aiguës. La corolle est à peine une fois plus longue que le calice dans lequel son tube est entièrement renfermé; la lèvre supérieure est droite, un peu velue, de couleur de rose ou purpurine; l'inférieure d'un bleu pâle; souvent les étamines rougeâtres.

Cette plante croît dans la Grèce, dans l'île de Crète, &c. On la cultive dans beaucoup de jardins. (V. v.)

Elle passe pour aphrodisiaque; elle étoit autrefois recommandée dans les maux d'yeux. On n'en fait aujourd'hui presque aucun cas.

#### 18. SAUGE lancéolée. *Salvia lanceolata*. Lam.

*Salvia foliis lanceolatis, integerrimis, brevissimis; tomentosis; calicibus obtusis, corollarum tubo brevioribus.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 327.

*Salvia (nivea), fruticosa; foliis lanceolatis, integerrimis, albo tomentosis; ramis divaricatis.* Thunb. Prodr. pag. 96. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 231. n°. 21.

Ses tiges sont blanchâtres, ligneuses, presque cylindriques, divisées en rameaux obscurément tétragones, articulés, opposés, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, simples, très-entières; lancéolées, blanchâtres, médiocrement tomentueuses ou pubescentes, épaisses, aiguës à leur som-

met, rétrécies en pétiole à leur base; les inférieures pétioleées.

Les fleurs sont terminales, disposées en épi, simplement opposées, médiocrement pédonculées; les pédoncules droits, articlés, appliqués contre les tiges, velues, cylindriques, nœuds de bractées fort caduques, petites, velues, linéaires. Les calices sont libres, un peu évasés, pubescents, divisés à leur orifice en deux lèvres obtuses, presque égales, chacune divisée en deux lobes. La corolle est rougeâtre; son tube égal au calice, ou un peu plus long; son orifice s'élargit en deux lèvres écartées; la supérieure plus grande, obtuse, pubescente, concave; l'inférieure pendante, presque entière; le style plus long que la lèvre inférieure.

Cette plante a été rapportée par M. Sonnerat du Cap de Bonne-Espérance. (V. f. in herb. Lam.)

19. SAUGE verte. *Salvia viridis*.

*Salvia foliis cordato-ovatis, obtusis, aequaliter crenatis; calicibus quadridentatis, terribus; fructiferis nutantibus.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. p. 20. tab. 1.

*Salvia foliis oblongis, crenatis; corollam paulo semiorbiculata; calicibus fructiferis, reflexis.* Jacq. Miscell. 2. pag. 366. & Icon. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 69. n° 293.

*Horminum salvia foliis ac sativi facie, viscosum, purpureo-violaceum, rigidius.* Hott. cathol. Suppl. a. t. 38. — Vaill. Herb.

*Salvia foliis ovato-oblongis, obtusis, aequaliter crenatis; corollam paulo semiorbiculata.* Hort. Upf. 11. — Kniph. Orig. VIII. n° 80. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 152. n° 16.

*p. Horminum orientale, annuum, sativo simile, con. à carens; flore violaceo.* Tourn. Coroll. 10. — Aubriet, Pictur.

Cette espèce diffère du *salvia horminum*, avec laquelle elle a de grands rapports, par ses bractées non colorées & point fertiles.

Ses tiges sont droites, un peu couchées à leur base, quadrangulaires, rameuses, chargées de poils blanchâtres assez longs, garnies de feuilles opposées, pétioleées, ovales, quelquefois échancrées en cœur à leur base, crénelées également à leur contour, obtuses à leur sommet, ridées à leurs deux faces, pubescentes, longues d'un à deux pouces & plus, supportées par des pétioles velus, beaucoup plus longs aux feuilles radicales; les feuilles terminales sessiles ou presque sessiles.

Les fleurs forment des épis terminaux, allongés, composés de verticilles contenant six fleurs un peu pédonculées; les verticilles intérieurs très-écartés; les supérieurs rapprochés, garnis de bractées

grandes, élargies, en forme de cœur, velues, ciliées à leurs bords, aiguës à leur sommet; les inférieurs crénelés, plus longs que les calices; elles recouvrent souvent quatre autres bractées intérieures linéaires, subulées, ciliées. Les calices sont velus, allongés, profondément flicés, terminés par quatre dents courtes, aiguës; réfléchis à l'époque de la maturité des semences. La corolle est petite, couleur de rose, d'un tiers plus longue que le calice, divisée à son orifice en deux lèvres; la supérieure à demi-orbiculaire, obtuse; l'inférieure à trois lobes (celui du milieu concave), échancrée, plus élargie. Les filaments sont arqués, supportés transversalement par un pivot; le style plus court que la corolle; deux stigmates fort petits; quatre semences brunes, un peu comprimées.

Cette plante croît dans l'Italie; elle a été recueillie par M. Desfontaines sur les collines, aux environs de Tunis. (V. v.)

20. SAUGE d'Espagne. *Salvia hispanica*. Linn.

*Salvia foliis ovatis, serratis; petiolis utrinque mucronatis; spicis imbricatis; bracteis ovatis, ciliatis, attenuatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 254. n° 75.

*Salvia foliis ovatis, utrinque acuminatis, serratis; spicis imbricatis, tetragonis; calice trifido.* Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 71. n° 310. tab. 20. fig. 2.

*Salvia foliis ovatis, petiolis utrinque mucronatis; spicis imbricatis, calicibus trifidis.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 67. n° 22. — Kniph. Orig. tab. 2. n° 78. — Scop. Caro. edit. 2. n° 35. — Sabbat. Hort. rom. 3. tab. 22. — Erting. de Salvia, n° 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n° 45.

*Salvia foliis cordato-ovatis, serratis, rugosis; bracteis saevitioribus, florum sevis; calicibus tridentatis.* Arduin, Spec. 10. tab. 2.

*S. larea hispanica.* Tabern. Hist. 764. Icon. 374.

On distingue cette espèce à ses épis très-serrés, blanchâtres, presque sans interruption, & à ses feuilles pubescentes, ovales, aiguës à leurs deux extrémités.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, ses quatre angles arrondis, les quatre faces profondément cannelées, hautes d'environ un pied & demi, blanchâtres & pubescentes particulièrement vers leur partie supérieure, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétioleées, ovales, un peu molles, légèrement pubescentes à leurs deux faces, verdâtres en dessus, un peu blanchâtres en dessous, dentées en scie & ciliées à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies & médiocrement decurrentes à leur base, supportées par des pétioles longs, un peu comprimés, velus.

Les

Les épis sont imbriqués, quadrangulaires, point interrompus, verticillés, blanchâtres, allongés, simples, les uns terminaux, d'autres axillaires, garnis de bractées ovales, ciliées, pubescentes, de la longueur des calices, acuminées. Les calices sont pubescens, blanchâtres, tubuleux, divités à leur orifice en trois, quelquefois en cinq dents aiguës, & égales, dont deux à la lèvre inférieure, une seule ou trois à la lèvre supérieure. La corolle est bleue, le tube un peu plus court que le calice; l'orifice divisé en deux lèvres de la longueur du calice au plus; la supérieure velue, formant à son sommet un casque court; la lèvre inférieure à trois découpures obtuses, très-entières, marquées à leur base de deux taches pales.

Cette plante croît naturellement en Italie & en Espagne. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ ( *V. v.* )

21. SAUGE sans tiges. *Salvia acaulis*. Vahl.

*Salvia foliis radicalibus obovato-oblongis, petiolatis; scopio piloso*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 157. n°. 81.

Les feuilles radicales de cette plante sont nombreuses, ovales, oblongues, pétiolées, obscurément crénelées, chargées, tant en dessus qu'en dessous & sur leurs bords, ainsi que le long des nervures, de poils blanchâtres. Du centre de ses feuilles s'élève une hampe droite, grêle, haute d'un demi-pied, à l'extrémité de laquelle sont disposés des fleurs par verticilles, environ au nombre de cinq; les inférieures distans, composés de six fleurs, munis de bractées oblongues, de la longueur des calices; ceux-ci sont campanulés, nerveux, médiocrement pileux, à deux lèvres; la lèvre supérieure divisée en trois dents; l'inférieure, en deux dents mucronées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. ( *Descript. ex Vahl.* )

22. SAUGE d'occident. *Salvia occidentalis*. Sw.

*Salvia foliis ovatis, serratis; spiciis laxis; bracteis cordatis, aristatis; calicibus glanduloso-pilosis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 234. n°. 26.

*Salvia foliis ovatis, serratis; spiciis laxis; bracteis cordatis, subrisiformis*. Swartz, Prodr. n°. 14. — Idem, Flor. Ind. occid. vol. 1. pag. 43. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 151. n°. 12.

*Salvia spicata, repens, melissa minoris folio; floribus subsiculatis, alternis*. Brown, Jam. pag. 117.

Cette plante a des racines fibreuses, des tiges ascendantes, rameuses, hautes d'un pied; les rameaux opposés, diffus, tétragones, lisses, nouveaux, garnis de feuilles opposées, ovales, médiocrement acuminées, dentées en scie à leurs bords, hispides à leur face supérieure, lisses en dessous, Botanique. Tome VI.

supportées par des pétioles quadrangulaires, rugueuses & pubescentes. Les fleurs sont disposées en épis lâches & terminaux, munies de bractées opposées, alternes, en cœur, arillées, entre chacune desquelles sont placées deux ou trois petites fleurs bleuâtres.

Leur calice est tubulé, anguleux, strié, chargé de poils glanduleux, droit, & divisé, à son orifice, en deux lèvres; la lèvre inférieure à trois dents; la supérieure obtuse. Le tube de la corolle s'élargit à sa partie supérieure; son limbe est partagé en deux lèvres; la supérieure courte, comprimée, concave, un peu courbée & éhancrée à son sommet; l'inférieure plus large, à trois lobes; le lobe du milieu un peu arrondi, plus grand & bifide. Les anthères sont simples & fort petites; l'ovaire, ovale à quatre lobes; le style filiforme, de la longueur de la lèvre supérieure; le stigmate bifide; il leur succède deux semences noires, comprimées, dont une avorte très-ordinairement.

Cette plante croît aux Indes occidentales, parmi les haies, dans les champs. ○ ( *Descript. ex Swartz.* )

23. SAUGE couchée. *Salvia procumbens*. Lam.

*Salvia foliis ovato-rhomboidibus, serratis; spiciis gracilibus; calicibus pilis glandulosis, hispida; caule procumbente*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 323.

*Verbena minima, chamadryos folio*. Sloan, Jam. Hist. 1. pag. 172. tab. 107. fig. 2. — Rai, Suppl. pag. 286. n°. 15.

Cette espèce paroît avoir tant de rapports avec la *salvia occidentalis* de Swartz, qu'elle pourroit bien n'en être qu'une simple variété.

Ses tiges sont couchées, lisses, presque lufantes, quadrangulaires, grêles, rameuses, garnies de feuilles petites, opposées, pétiolées, ovales, rhomboidales, glabres à leurs deux faces, médiocrement incisées ou dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet.

Les fleurs forment des épis grêles à l'extrémité des tiges & des rameaux; elles sont fort petites, au nombre de quatre ou six à chaque verticille, à peine pédonculées, munies de petites bractées ovales, mucronées, caduques. Les calices sont courts, hispides, chargés de poils glanduleux; la corolle petite, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît à la Jamaïque & aux Antilles; elle a été communiquée par M. Richard, à M. Lamarck. x ( *V. f. in herb. Lam.* )

24. SAUGE à fleurs courtes. *Salvia parviflora*. Vahl.

FFFF

*Salvia foliis cordato-ovatis, crenatis, rugosis; racemis terminalibus, compositis; bracteis cordatis, calice brevioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 268. n° 107.

*Horminum orientale, foliis setacea; flore albo, parvo.* Tournef. Coroll. pag. 10.

Ses tiges sont droites, herbacées, blanchâtres, tétragones, à angles tranchans, garnies de feuilles pétiolées, opposées, ovales, échancrées en cœur à leur base, inégalement crénelées à leur contour, ridées, velues, veinées, longues d'environ deux pouces. Les fleurs sont disposées en grappes terminales, rameuses, garnies de verticilles de deux à six fleurs, munis de bractées en cœur, aiguës, plus courtes que le calice : celui-ci est velu, divisé, à son orifice, en dents subulées. La corolle est courte, petite, à deux lèvres ; la supérieure droite, plus courte que le style.

Cette plante croît dans le Levant. (V. f. in herb. Jussieu.)

25. SAUGE à feuilles de calament. *Salvia calaminthifolia.* Vahl.

*Salvia foliis ovatis, crenatis, incanis; pedunculis axillariibus, verticillatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 233. n° 25.

Ces arbrisseaux, dont les rameaux sont grêles, un peu blanchâtres vers leur sommet, tétragones, garnis de feuilles pétiolées, ovales, molles, longues d'environ six lignes, légèrement pubescentes, & blanchâtres en dessous, à trois ou cinq nervures obtuses, médiocrement crénelées à leurs bords.

Les fleurs sont axillaires, verticillées, au nombre de trois ou quatre dans chaque aisselle, trois fois plus courtes que les feuilles. Le calice est blanchâtre, un peu élargi à son orifice, strié, à deux lèvres ; la supérieure entière, l'inférieure à deux dents aiguës.

La corolle est bleue, une fois plus longue que le calice : sa lèvre inférieure est pubescente en dehors, à trois lobes ; les latéraux linéaires-oblongs ; celui du milieu, plus large, plus allongé, en cœur renversé ; les étamines, un peu plus longues que la corolle ; le style, barbu à sa partie supérieure, bifide ; une des deux découpures plus courte, un peu roulée ; l'autre droite.

Cette plante croît à Saint-Domingue. (Vahl, ex herb. Desfont.)

26. SAUGE des Antilles. *Salvia dominica.* Linn.

*Salvia foliis cordatis, obtusis, crenatis, rugosis; subtus incanis; calicibus villosis-villosis, corollam subaequantibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 233. n° 24.

*Salvia foliis cordatis, obtusis, crenatis, submentis; corollis calice angustioribus.* Linn. Syst. veget. pag. 70. n° 18. — Miller, Dict. n° 9. — Swartz, Observ. 18. tab. 1. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 137. n° 27.

C'est une plante à peine distinguée de la *salvia feretina*, dont les tiges sont peu élevées, divisées, dès leur base, en rameaux nombreux, touffus, droits, hauts de huit à dix pouces, presque simples, velus, un peu blanchâtres, légèrement tétragones, grêles, garnis de feuilles petites, opposées, pétiolées, ovales, en cœur, longues d'environ dix lignes sur huit de large, molles, pubescentes & cendrées à leur face inférieure, presque glabres en dessus, légèrement crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet ; les pétioles velus, filiformes, au moins de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont fort petites, & forment de petits épis très-grêles, pubescens à l'extrémité des rameaux, composés de verticilles qui ne contiennent que très-peu de fleurs, deux ou quatre au plus, soutenues par des pédoncules inégaux, très-courts, capillaires, velus, très-simples, garnis, à leur base, de très-petites bractées velues, opposées, ovales, sessiles. Les calices sont très-petits, velus, tubulés, de couleur cendrée, à peine divisés en deux lèvres à leur orifice ; l'inférieure bifide. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, à peine plus longue que le calice, tubulée ; son limbe, à deux lèvres très-courtes ; la supérieure, plus courte, un peu concave, échancrée ; l'inférieure plusieurs fois plus grande, à trois découpures ; celle du milieu plus grande, à deux lobes ; les étamines, de la longueur de la corolle ; le stigmate lancéolé, à deux lobes inégaux ; les semences glabres, lisses & oblongues.

Cette plante croît aux Antilles, dans les champs & parmi les broussailles. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

27. SAUGE tardive. *Salvia feretina.* Linn.

*Salvia foliis subcordatis, obtusis, glaberrimis, inaequaliter obtusis serratis; calicibus villosis-villosis, corollam subaequantibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 232. n° 23.

*Salvia foliis cordatis, serratis, mollibus; floribus racemosis-spicatis; corollis vix calicem excedentibus.* Linn. Mantiss. 25. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 69. n° 294. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 131. n° 14. — Jacq. Collect. 1. pag. 140. — Id. Ic. rar. 1. tab. 3. — Eting. de Salvia, n° 12.

*Salvia foliis cordato-ovatis, serratis, rugosis; bracteis subverticillatis, sessis; calicibus tridentatis.* Arduin, Spec. 1. pag. 10. tab. 1.

Ses tiges sont grêles, presque ligneuses, fur-

cœur à leur base; quadrangulaires, hautes d'environ un pied, quelquefois un peu glabres à leur partie inférieure, velues & tomentueuses vers leur sommet, rameuses presque dès leur base, garnies de feuilles opposées, petites, entières, ovales, en cœur, pétioles, molles, presque ondulées ou légèrement crénelées à leurs bords, vertes en dessus, plus pâles ou blanchâtres en dessous, légèrement tomentueuses, soutenues par des pétioles courts, filiformes.

Les fleurs forment des épis grêles, lâches, terminaux, composés de verticilles de deux à quatre fleurs opposées, presque sessiles, munies de bractées fort petites, velues, courtes, subulées. Le calice est étroit, velu, visqueux, petit, cylindrique, strié, à trois divisions à son orifice; l'inférieure plus large. La corolle est fort petite, un peu bleuâtre, à peine plus longue que le calice; elle répand l'odeur forte & pénétrante du *nepeta*. Ses fleurs font pédunculées, munies de bractées extrêmement petites, à peine sensibles.

Cette plante croit naturellement dans l'île de Chio. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b (P. v.)

28. SAUGE à petites fleurs. *Salvia mierantha*. Vahl.

*Salvia foliis cordatis, crenatis, bullatis, margine undulatis, obtusis, glabris; bracteis ovatis, calice brevioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 255. n°. 29.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied, médiocrement rameuses, vertes ou un peu blanchâtres, garnies de feuilles pétioles, longues d'un pouce, très-veinées; les inférieures plus petites, arrondies, un peu en cœur, glabres, crénelées & ondulées à leur contour, obtuses à leur sommet; les supérieures en cœur, recourbées à leur sommet; il sort de toutes leurs aisselles des rudimens de rameaux.

Les fleurs sont fort petites, disposées par verticilles à l'extrémité des rameaux, au nombre de six à chaque verticille, légèrement pédicellées, munies de bractées ovales. Les calices sont ouverts, striés, velus & glanduleux, divisés en deux lèvres, la supérieure entière, l'inférieure un peu plus longue, à deux dents. La corolle est bleue; la lèvre supérieure à deux découpures rabattues; l'inférieure une fois plus longue, blanche à son disque, à trois découpures; celle du milieu plus allongée & biffée.

On soupçonne cette plante originaire des régions chaudes de l'Amérique. x (Descript. ex Vahl.)

29. SAUGE recourbée. *Salvia incurvata*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis cordatis, acutis, ferratis; labiis calicis incurvis, calice corollâ bifido.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 24. tab. 42. fig. B.

Ses tiges sont droites, herbacées, quadrangulaires, hautes d'environ deux pieds, rameuses à leur partie supérieure, garnies de feuilles opposées, longuement pétioles, rabattues, ovales, en cœur, à peine échancrées à leur base, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet, très-veinées, ridées, légèrement pubescentes & blanchâtres en dessous.

Les fleurs sont disposées en épis droits, terminaux, où elles forment des verticilles composés de quatre à six fleurs étendues, médiocrement pédunculées, munies de bractées ovales, caduques. Les calices font tubulés, presque campanulés, divisés en deux lèvres fortement recourbées, aiguës; la supérieure entière, l'inférieure biffée. La corolle est d'un pourpre bleuâtre, une fois plus longue que le calice, divisée à son orifice en deux lèvres; la supérieure concave & biffée; l'inférieure à trois lobes courts; celui du milieu échancré.

Cette plante croit au Pérou; elle fleurit dans l'été. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

30. SAUGE floette. *Salvia tenella*. Swartz.

*Salvia foliis cordatis, caule filiformi, repente; specie ascendens.* Swartz, Prodr. 14. — Idem, Flor. Ind. occid. pag. 43. Icon. tab. 2.

Espèce aisée à distinguer par la petitesse de toutes ses parties. Ses racines sont longues, capillaires, rampantes; ses tiges couchées, filiformes, longues de quatre à cinq pouces, redressées à leur partie supérieure, tétragones, striées, pubescentes, médiocrement rameuses.

Les feuilles sont fort petites, distantes, opposées, pétioles, simples, nerveuses, dentées en scie ou crénelées, pubescentes, échancrées en cœur à leur base. Les fleurs forment des épis droits, terminaux; disposés par verticilles rapprochés, trois ou quatre à chaque verticille; garnies de bractées fort petites, de deux à quatre sous chaque pedoncule.

Leur calice est monophylle, relevé en bourse en dessous, divisé en deux à son orifice; la découpure supérieure plus courte, émolle; à trois petites dents à peine sensibles; les deux antérieures un peu plus longues & obtuses; toutes les parties chargées de poils glanduleux; les glandes transparentes, azurées. La corolle a son tube cylindrique, de la longueur du calice, qui se divise en deux lèvres; la supérieure petite, creusée en voûte; l'inférieure assez grande, blanchâtre dans son milieu, bleue sur ses bords, à trois lobes; les deux lobes latéraux arrondis; celui du milieu plus

grand, échanuré; l'orifice marqué de quelques lignes bleuâtres; les étamines placées sous la lèvre supérieure; les anthères fort petites, droites, oblongues, bleuâtres; l'ovaire ovale, le style subulé, recourbé, à peine plus long que la lèvre supérieure; le stigmate bifide. Le calice persistant contient deux semences noires, nues, ovales, comprimées.

Cette plante se rencontre sur les hautes montagnes de la Jamaïque & à la Caroline; elle fleurit pendant toute l'année. ☉ (*V. f. in herb. Lam.*)

### 31. SAUGE des Indes. *Salvia indica*. Linn.

*Salvia foliis cordatis, repandis, dentatis; spicis prolongis; verticillis subnudis, remotissimis.* Lam. Illustr. Plant. vol. 1. pag. 69. n°. 298.

*Salvia foliis cordatis, lateralibus, sublobatis; summis sessilibus; verticillis subnudis, remotissimis.* Linn. Mantiss. 318. — Jacq. Hort. 78. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 136. n°. 26.

*Salvia foliis cordatis, sinuato-dentatis; verticillis subnudis, remotissimis.* Etling. de Salvia, n°. 39.

*Salvia foliis cordatis, acutè crenatis; summis sessilibus; verticillis subnudis, remotissimis.* Roy. Lugd. Bat. 13.

### *Scarea indica*. Miller, Dict. n°. 9.

*Horminum hispidum, flore violaceo, punctis aureis notato.* Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 13. fig. 16.

*Scarea indica, flore variegato.* Tournef. Inst. R. Herb. 179.

*Horminum indicum, maximum, flore variegato.* Tournef. Hort. Paris. L. c.

Cette sauge est facile à reconnaître par ses longs épis, dont les verticilles sont très-distants, à calices renflés, & par les taches violettes de la lèvre inférieure de la corolle.

Ses tiges sont droites, herbacées, tétragones, obtusés à leurs angles, hautes d'environ trois pieds, hérissées de poils courts, blanchâtres; divisées en rameaux élanés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, amples, allongées, échanrées en cœur à leur base, ridées, vertes à leurs deux faces, presque nues ou chargées de quelques poils rares, très-courts, plus nombreux sur les principales nervures; les inférieures ou radicales presque divisées en lobes à leur base, sinuées, dentées; les supérieures sessiles, plus étroites, allongées, presque entières, aiguës à leur sommet.

Les épis sont grêles, élanés, longs d'un pied & plus, composés de verticilles distans les uns des autres de quatre ou six poices, garnis de cinq ou six fl. sans pédoncules, munies de bractées très-courtes, pubescentes, ovales, aiguës. Le calice

est monophylle, renflé, médiocrement comprimé, divisé en deux lèvres courtes à son orifice; la supérieure à trois dents; celle du milieu souvent plus petite; l'inférieure à deux découpures pileuses, visqueuses. La corolle est grande, de couleur bleue; la lèvre supérieure comprimée, courbée en faux, échanrée; l'inférieure à trois divisions; celle du milieu beaucoup plus grande, à deux lobes concaves, dont le fond est blanc, marqué de taches violettes, la bordure d'abord blanche, & qui devient jaune ensuite; les deux divisions latérales étendues horizontalement, incurvées, repliées, tellement que cette lèvre inférieure représente assez bien la figure d'une abeille.

Cette plante croît dans l'Inde. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☿ (*V. v.*)

### 32. SAUGE glutineuse. *Salvia glutinosa*. Linn.

*Salvia foliis cordato-sagittatis, serratis, acutis.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 68. n°. 24. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 325. — Hort. Clifort. 13. — Hort. Uptal. 11. — Royen, Lugd. Bat. 308. — Sauvag. Monop. 146. — Haller, Helv. n°. 252. — Scopul. Carn. edit. 2. n°. 33. — Jacq. Vind. 5. — Hoffm. Germ. 10. — Etling. de Salvia, n°. 38. — Roth, Germ. 1. pag. 12. — Vol. II. pag. 33. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 259. n°. 5. — Lamarck, Flor. franç. vol. 2. pag. 427. n°. 459. IX.

*Salvia villosa-viscida, foliis cordato-sagittatis, grosse serratis, acuminatis.* Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 162. n°. 97.

### *Scarea glutinosa*. Miller, Dict. n°. 11.

*Salvia foliis cordato-sagittatis, serratis, acutis; dentibus calicinis summis non satis divisis.* Crantz, Auflr. pag. 239.

*Salvia montana, maxima, foliis hirsutis, flore flaviscente.* Tournef. Inst. R. Herb. 180.

*Horminum flore luteo.* Rivin, tab. 57. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 394. §. 11. tab. 13. fig. 18.

*Horminum luteum, glutinosum.* C. Bauh. Pin. 238.

*Horminum silvestre, secundum.* Cluf. Hist. 1. pag. 29. — Idem, Paim. pag. 377.

*Colus Jovis.* Lobel. Ic. 557. — Idem, Observ. pag. 301. Ic.

*Orvola tertia.* Dodon, Pempt. 293. Icon.

*Galceops species lutea, viscida, odorata, nemorosus.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 314. Icon.

*Horminum glutinosum.* Magn. Hort. 98.

Des feuilles amples, cordiformes, glutineuses, des fleurs grandes, jaunâtres, très-visqueuses, caractérisent cette espèce.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, à angles arrondis, médiocrement velues, hautes d'environ deux pieds, d'un vert-foncé ou purpurines, divisées en rameaux opposés, droits, élancés, garnis de feuilles grandes, toutes pétioles, opposées, ovales, fortement échanquées en cœur à leur base, dont les côtés sont prolongés presque en oreillettes, particulièrement aux feuilles inférieures & même agitées, dentées ou crénelées à leur contour, acuminées à leur sommet, vertes à leurs deux faces, presque glabres, glutineuses, supportées par des pétioles pubescents, ainsi que les principales nervures.

Les fleurs forment un épi droit, terminal, simple, allongé, composé de verticilles, dont les inférieurs sont distans, les supérieurs beaucoup plus rapprochés, garnis de six à sept fleurs à chaque verticille; couvertes d'une humeur visqueuse, collante, supportées par des pédoncules velus, munis de bractées lancéolées, velues, acuminées, plus courtes que les calices, opposées, caduques. Les calices sont hispides, striés, campanulés, divisés en deux lèvres un peu comprimées; la supérieure à trois dents courtes, aiguës; l'inférieure bifide. La corolle est d'un jaune-cile, quelquefois tachetée de brun, grande, dont le tube est cylindrique, plus long que le calice; la lèvre supérieure renflée, courbée en faucille, très-écartée de l'inférieure; celle-ci à trois lobes, celui du milieu crénelé; les étamines sont longues, saillantes, aussi bien que le style.

Cette plante croît dans les pâturages montagneux dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, en Alsace. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

### 33. SAUVE des prés. *Salvia pratensis*. Linn.

*Salvia foliis cordato-oblongis, crenatis; summis amplexicaulis, verticillis subnudis, corollis galea glutinosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 35. — Flor. suec. 2. n°. 2. — Poll. Pal. n°. 28. — Crantz, Austr. 243. — Pallas, Iter 1. pag. 73. — Blackw. tab. 218. — Roth, Germ. vol. 1. pag. 12. — Il. pag. 30. — Hoffm. Germ. 9. — Erting. de *Salvia*, n°. 40. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 426. n°. 419. VII. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 238. n°. 4.

*Salvia foliis ovatis, inciso-crenatis; verticillis subnudis*. Hort. Cliff. 12. — Flor. suec. 1. n°. 28. — Hort. Upsal. 10. — Rozen, Lugd. Bat. 310. — Dalib. Paris. 10.

*Salvia foliis cordato-oblongis, inaequaliter serratis, sublobatis; verticillis subnudis, corollarum galea falcata, glutinosa*. Lam. Illust. Genet. vol. 1. pag. 69. n°. 299.

*Salvia foliis imis cordatis, superioribus longe lan-*

*colatis; verticillis nudis, in spicam continuatis*. Haller, Helv. n°. 233.

*Scalaria pratensis*. Millet, Dict. n°. 4.

*Horminum pratense, foliis serratis*. C. Bauh. Pin. 238. — Rivin, tab. 36.

*Horminum silvestre*. Camer. Epitom. 629.

*Orvala silvestris, species quarta*. Dodon. Pempt. 293. Icon.

*Gallitrichum silvestre*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 393. 5. 11. tab. 13. fig. 10.

*Scalaria pratensis, foliis serratis, flore caruleo*. Tourn. Inst. R. Herb. 179. — Garid. Aix. 433.

*Gallitrichum silvestre vulgè, sive silvestris scalaria, flore caruleo, magno*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 311. Icon.

*Salvia pratensis, var. p. incisa*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 263. n°. 96.

*Scalaria major, foliis in profundas lacinias incisis*. Tournem. Inst. R. Herb. 179. — Vaill. Paris. 180.

*Horminum silvestre, foliis profundius incisis*. C. Bauh. Pin. 239.

*Salvia (agrestis), foliis cordatis, summis amplexicaulis, corollarum galea lobum aequante*. Linn. Amén. Acad. vol. 3. pag. 399. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 258. n°. 3.

*Horminum pratense, niveum, foliis incanis*. C. Bauh. Pin. 238. — Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 16. fig. 11.

*Scalaria pratensis, foliis serratis, flore albo*. Tourn. Inst. R. Herb. 179.

*Horminum silvestre, quartum, niveo flore*. Claf. Pann. pag. 380.

Rien de plus commun que cette espèce, qui se distingue à ses feuilles grossièrement ridées, à ses corolles grandes, d'un bleu vif; à son odeur forte, presque féride.

Ses racines sont presque ligneuses, dures, épaisses, noirâtres ou brunes en dehors, blanches en dedans; il s'en élève des tiges droites, hautes d'un à deux pieds, velues, quadrangulaires, presque simples ou médiocrement ramifiées. Les feuilles radicales sont pétioles, nombreuses, étendues sur la terre, ovales, oblongues, obtuses ou quelquefois un peu aiguës, échanquées en cœur à leur base, épaisses, fortement ridées, sinuées & crénelées à leur contour, vertes à leurs deux faces, un peu plus pâles en dessous, presque glabres, légèrement velues à leur face inférieure, supportées par des pétioles un peu comprimés, velus; les feuilles supérieures opposées; sessiles, presque amplexicaules, étroites, aiguës, presque lancéolées.

Les épis sont simples ou ramifiés en panicule ; les ramifications opposées, composées de verticilles de cinq à six fleurs glutineuses, munies de bractées courtes, petites, pubescentes, très-caduques. Les calices sont courts, chargés de poils blanchâtres, striés, souvent colorés, visqueux, divisés en deux lèvres à cinq découpures courtes, presque égales, ovales, obtuses, légèrement mucronées. La corolle est d'un beau bleu, grande, glutineuse ; la lèvre supérieure courbée en faucille ; l'inférieure élargie, à trois lobes ; le style saillant hors de la lèvre supérieure.

Dans la variété  $\beta$  les feuilles, surtout les inférieures, sont finées, presque pinnatifides ; elles sont revêtues d'un duvet blanchâtre, un peu tomenteuses dans la variété  $\gamma$ . La lèvre supérieure est à peine plus longue que l'inférieure.

Cette plante croît partout dans les prés secs de l'Europe.  $\alpha$  (P. v.)

Cette sauge passe pour astringente ; elle est quelquefois employée dans les coliques venteuses, les pâleurs, les langueurs. Les vaches & les chevaux n'en veulent point ; les chèvres & les moutons la mangent.

#### 34. SAUGE sanguine. *Salvia hamatodes*. Linn.

*Salvia foliis cordato-ovatis, rugosis, tomentosis ; calicibus hispids, calice tuberoso*. Linn. Syst. veget. pag. 65. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 36. — Edling. de *Salvia*, n°. 34. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 135. n°. 23.

*Salvia foliis cordato-ovatis, crenatis, repandis, rugosis ; radice tuberosa*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 69. n°. 297.

*Horminum sanguineum, asphodeli radice*. Triumf. Observ. 69. tab. 69.

*Horminum silvestre, majus, hamatodes, glabrum ; flore caruleo, italicum*. Barcl. Icon. rar. pag. 234. tab. 185.

*Horminum silvestre, maculatum, tuberosum*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 394. §. 11. tab. 14. fig. 15.

*Scalarea asphodeli radice*. Tournef. Inst. R. Herb. 179.

Cette espèce est facile à distinguer par ses racines tubéreuses, & par ses feuilles marquées de taches d'un gros rouge.

Ses tiges sont droites, épaisses, dures, quadrangulaires, visqueuses, médiocrement rameuses, garnies de feuilles dont les intérieures sont pétioles, amples, étendues ; les caulinaires presque sessiles, toutes épaisses, à proffes rides ovales, en forme de cœur à leur base, finées à leur contour, presque obtuses à leur sommet, lisses à leur face supérieure, marquées de taches irrégu-

lières, de couleur de rouille ou un peu rougeâtres, souvent un peu tomenteuses ; les terminales petites & sessiles.

Les fleurs sont disposées en épis droits, alongés, composés de verticilles distans, les inférieurs composés de cinq à six fleurs, moindres aux verticilles supérieurs ; munis de bractées presque ovales, petites, plus courtes que les calices. Celui-ci est hispide, & se divise en deux lèvres à son orifice : la supérieure concave à son sommet, en carène obtuse, échancrée ; la lèvre inférieure bifide. La corolle est bleuâtre, assez grande, assez semblable à celle du *Salvia silvestris* ; la lèvre supérieure en forme de faux ; l'inférieure à trois découpures, celle du milieu très-large, échancrée, concave, réfléchie à ses bords ; le style plus long que la lèvre supérieure ; les anthères noires, rapprochées, remplies d'une poussière jaunâtre.

Cette plante croît naturellement en Italie & dans l'Espagne.  $\alpha$

#### 35. SAUGE des Pyrénées. *Salvia pyrenaica*. Linn.

*Salvia villosa-viscosa, foliis dentato-sinuatis, obtusis ; fluminibus corollâ duplò longioribus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 263. n°. 98.

*Salvia foliis obtusis, erosis ; fluminibus corollâ duplò longioribus*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 67. n°. 17. — Royen, Lugd. Bat. 509. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 138. n°. 53.

*Salvia foliis oblongis, erosis, obtusis, viscidis ; racemo terminali*. Edling. de *Salvia*, n°. 42.

*Horminum pyrenaicum, glutinosum, angustifolia*. Herm. Paradis. pag. 187.

*Scalarea pyrenaica, glutinosa, foliis sinuatis*. Tournef. Inst. R. Herb. 179.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de deux ou trois pieds ; elles sont droites, quadrangulaires, velues, divisées en rameaux opposés, ouverts, garnis de feuilles opposées, pétioles, rangées, finées ou crénelées, les inférieures longuement pétioles, très-amples, épaisses, oblongues, ridées, nerveuses, très-irégulièrement finées ou rangées à leur contour, assez semblables à celles de quelques espèces de courge, velues, étendues sur la terre ; les feuilles caulinaires supérieures, plus petites, plus glabres, moins profondément divisées.

Les fleurs sont disposées en épi à l'extrémité des rameaux & des tiges, de couleur bleue ; leur calice est velu, visqueux, glanduleux, comme les autres parties de cette plante ; les étamines sont saillantes, une fois plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans les Pyrénées.  $\alpha$



36. SAUCE visqueuse. *Salvia viscosa*. Jacq.

*Salvia foliis ovato-oblongis, obtusis, rugosis, crenatis, viscidis; spicis nudis, praelongis; bracteis calice brevioribus.* Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 70. n°. 301.

*Salvia villosa-viscosa, foliis cordato-oblongis, rugosis, acutiusculis, crenulatis; bracteis cordato-subrotundis, acuminatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 264. n°. 99.

*Salvia foliis oblongis, obtusis, eroso-crenatis, viscidis; floribus verticillatis; bracteis cordatis, acutis.* Jacq. Ic. rar. vol. 1. tab. 5. — Miscell. 2. pag. 328. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 134. n°. 22.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *salvia bicolor*; mais la première est très-visqueuse, ses fleurs moins grandes, les bractées plus larges & en cœur, les feuilles plus épaisses.

Ses tiges sont hautes de deux à trois pieds, dures, épaisses, droites, quadrangulaires, velues ou hérissées de poils courts, cendres; divisées en rameaux axillaires, opposés, velus. Les feuilles radicales sont pétiolées, amples, ovales, oblongues, obtuses, ridées, rongées à leurs bords; les lobes arrondis, crénelés; les feuilles caulinaires opposées, médiocrement pétiolées, à grosses crénelures, velues, presque tomentueuses en dessous; les supérieures sessiles, amplexicaules, acuminées, prédis en cœur, dentées à leur contour.

Les épis sont terminaux, simples ou à ramifications axillaires, opposées, allongées, droites, garnies de verticilles peu distans vers le sommet, composées de quatre ou six fleurs presque sessiles, munies de bractées en forme de cœur, acuminées; les inférieures larges, longuement acuminées; les supérieures plus courtes, moins longues que les calices, un peu velues, visqueuses. Les calices sont divisés en cinq dents courtes, aiguës, presque égales. La corolle est panachée de blanc & de pourpre; sa lèvre supérieure droite, un peu arquée, obtuse; le pistil saillant, le stigmate à deux divisions courtes.

Cette plante croît naturellement dans l'Italie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 4 (P. v.)

37. SAUCE effilée. *Salvia virgata*. Ait.

*Salvia foliis oblongis, cordatis, rugosis, crenatis; piliis caulis callicijque apice glandulosis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 39. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 133. n°. 18.

*Salvia (virgata), foliis oblongis, erosis, obtusis, glabris; spicis virgatis.* Eting. de Salvia, n°. 43.

*Salvia virgata*. Jacq. Hort. vind. vol. 1. pag. 14. tab. 63.

*Horminum creticum*. Riv. Monop. tab. 63.

*Scalaria orientalis, verbasci folio; flore parum albo, parum florescente.* Tournef. Inst. R. Herb. corol. 10.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ quatre pieds, quadrangulaires, à angles mouffes, marquées d'un sillon à chacune de ses faces, munies de quelques poils glanduleux, divisées en rameaux opposés, élancés; garnies de feuilles opposées, pétiolées, amples, oblongues, ridées à leurs deux faces, glabres, échancrées en cœur à leur base, un peu rongées & crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet; les supérieures sessiles, plus aiguës.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges & des rameaux en très-longes épis grêles, effilées, composées de verticilles de six fleurs, distans à la partie inférieure, très-rapprochés vers l'extrémité de l'épi, munis de bractées en cœur, acuminées, plus longues que les calices. Les calices sont tubulés, velus, labiés, dentés à leur orifice, chargés de poils glanduleux à leur sommet. La corolle est en baluce; son limbe divisé en deux lèvres, mêlées de blanc & de jaune, ou d'un rose-pâle; les deux lobes latéraux de la lèvre inférieure lancéolés.

Cette plante croît dans l'Arménie, où elle a été découverte par Tournefort. 4

38. SAUCE à feuilles concaves. *Salvia bullata*. Orteg.

*Salvia foliis cordatis, obtusis, latiusculis, crenatis, bullatis, infimis minoribus; verticillis approximatis, decemfloris.* Orteg. Plant. Decad. 9. p. 109.

Plante herbacée, extrêmement amère, qui a le port de la mélisse, légèrement pubescente, dont les tiges sont droites, liriées, hautes d'un pied & demi, divisées dès leur base en rameaux ascendants, garnis de feuilles pétiolées, opposées, larges, en cœur, ouvertes, creusées en bulles, crénelées à leur contour, réfléchies & obtuses à leur sommet; celles du bas plus petites, à peine en cœur, soutenues par des pétioles planes, convexes, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées par verticilles à l'extrémité des rameaux, en forme d'épis, chaque verticille composé de dix fleurs légèrement pédonculées, environnées de bractées ovales, verdâtres. Le calice est velu & glanduleux; la corolle d'un blanc-bleuâtre, divisée en deux lèvres; la supérieure un peu arrondie, à peine plus longue que le calice; l'inférieure ample, à trois découpures; les latérales ovales, de la longueur de la lèvre supérieure; les filamens aussi longs que la lèvre supérieure, soutenant les anthères bleuâtres. Le stigmate est également bleuâtre, plus long

que les étamines; les semences sont oblongues & noires.

Cette plante croît à l'île de Cuba.

39. SAUGE de deux couleurs. *Salvia bicolor*. Desfont.

*Salvia foliis cordato-oblongis, ramis virgatis, bracteis reflexis, calicibus nutantibus, corolla labio intermedio fuscato*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 22. — Journ. de Découv. 3. 1792. n°. 20. — Schousb. Observ. botan. 1. pag. 17.

*Salvia foliis cordato-ovatis, inaequaliter dentatis; spicis natis, prolongis; corollae barb. caudicis, fuscatis*. Lamarck, Illustr. Gener. vol. 1. pag. 69. n°. 300.

*Salvia foliis ovatis, eroso-dentatis; floribus nutantibus, lacinia media labii inferioris corolla concava*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 136. n°. 25.

*Salvia (bicolor), foliis radicalibus cordatis, palmatis, integrifolia; caulibus sagittato-lanceolatis, inaequaliter dentatis; bracteis reflexis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 270. n°. 113.

*Salvia (bicolor), foliis rugosis, villosis, inferioribus oblongis, lobatis, crenatis, superioribus dentatis; racemo verticillato*. Jacq. Hort. Schœnbr. vol. 1. pag. 4. tab. 7.

Elle espèce, remarquable par ses longs épis chargés de fleurs grandes & nombreuses, dont les couleurs sont un mélange de bleu & de violet, sur un fond blanc.

Ses tiges sont fortes, droites, épaisses, tétragones, pubescentes, souvent glabres par la culture, à angles obtus, hautes de deux à trois pieds, divisées en longs rameaux élancés, droits, velus, longs de plus d'un pied, terminés par de longs épis de fleurs. Les feuilles sont oblongues, échanquées en cœur à leur base, ridées, légèrement velues; les inférieures & radicales pétiolées, décourtes sur leur pétiole, inégalement sinuées & dentées, quelquefois comme rongées ou déchiquetées en découperures aiguës, inégales; les feuilles supérieures sessiles, connées, aiguës à leur sommet, plus étroites, lancéolées; les terminales courtes, acuminées.

Les épis sont droits, nombreux, longs d'environ un pied & demi, élancés, pubescents, garnis de verticilles peu distans, composés de cinq à six fleurs, dont les pédoncules sont velus, longs d'environ deux lignes, munis de bractées ovales, lancéolées, acuminées, un peu velues, courtes, plus longues que les pédoncules. Le calice est court, campanulé, hispide, strié, élargi & divisé à son orifice en deux lèvres, à cinq dents inégales, acuminées; la dent intermédiaire de la lèvre supérieure très-courte. La corolle est au moins aussi grande

que celle du *salvia pratensis*; la lèvre supérieure courbée en faux à son sommet, d'un pourpre-violet, velue, souvent tachetée de points blancs; l'inférieure est blanche, divisée en trois lobes; les deux latéraux plus allongés, acuminés; celui du milieu grand, élargi, concave, un peu échanqué à son sommet; les filaments aiguis, portés sur un pivot très-court; le style plus long que la lèvre supérieure; deux stigmatis aigus. Les semences sont lisses, un peu arrondies, de couleur brune; les pédoncules recourbés, particulièrement à l'époque de la floraison.

Cette plante a été découverte par M. Desfontaines, en Barbarie, parmi les moissons, aux environs de Tiemsen. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris; elle fleurit dans le printemps. (V. v.)

40. SAUGE fétide. *Salvia fetida*. Lam.

*Salvia foliis cordatis, inaequaliter dentatis, rugosis; bracteis cordato-acutis, ciliatis, longiusculis calicem*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 69. n°. 295.

*Salvia fruticosa, foliis cordato-ovatis, rugosis, villosis; floribus verticillato-spicatis; calicibus fruticosis, compressis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 24.

*An marum aegyptiacum?* Alpin. Egypt. 212. Ic. — Plant. exot. 252. Icon.

*Scarlea tingitana, fetidissima, hirsuta, flore albo*. Tourn. Inst. R. Herb. 179. — Vaill. Herb.

*Horminum salvia folio lanuginoso*. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 16. fig. 3.

*Salvia (tingitana), foliis cordatis, eroso-dentatis; calicibus spinosis, sulcatis; bracteis integerrimis, cordatis, mucronatis, concavis, ciliatis*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 147. n°. 60.

*Salvia (tingitana), foliis cordatis, erosis; calicibus spinosis, sulcatis; bracteis concavis, mucronatis*. Etling. de Salvia, n°. 30. — Roth. Abh. pag. 25.

*Horminum tingitanum*. Riv. tab. 62.

*Salvia (tingitana), foliis cordatis, oblongis, eroso-dentatis, rugosissimis; bracteis cordatis, mucronatis, ciliatis; calicibus spinosis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 274. n°. 121.

Cette espèce a des rapports avec le *salvia scarlea* par la grandeur, la forme de ses feuilles, la largeur de ses bractées, & dans tout son ensemble.

Ses tiges sont presque ligneuses à leur base, épaisses, quadrangulaires, cannelées à chaque face, velues ou pileuses, divisées en rameaux nombreux, opposés, étalés, droits, garnis de larges feuilles pétiolées, opposées, ovales, en cœur, ridées, inégalement dentées à leur contour, obtuses ou plus

plus souvent aiguës à leur sommet, vertes à leurs deux faces, chargées de poils couchés, d'une odeur forte & pénétrante, supportées par des pétioles un peu comprimés, velus.

Les fleurs sont médiocrement pédonculées, disposées en épis droits, roides, composés de verticilles à deux, trois ou cinq fleurs, munies de bractées très-larges, en forme de cœur, un peu denticulées à leur contour ou légèrement ciliées, acuminées, presque piquantes à leur sommet, au moins aussi longues que les calices; opposées, enveloppant en entier les verticilles. Les calices sont oblongs, fortement striés, un peu velus ou pileux, divisés presque à deux lèvres courtes à leur orifice; l'inférieure à deux dents très-aiguës, subulées; la supérieure à trois dents de même forme; celle du milieu plus petite. La corolle est courte, d'un blanc un peu jaunâtre; la lèvre supérieure velue, arquée; la lèvre inférieure d'un jaune plus foncé, divisée en trois lobes; celui du milieu concave, échanuré; le tube un peu plus long que le calice; le style glabre, un peu épaissi vers son sommet; le stigmate à deux divisions réfléchies; les étamines aussi longues que le style.

Cette plante croît naturellement dans le Levant & en Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 41. SAUGE d'Alger. *Salvia algeriensis*. Desf.

*Salvia foliis inferioribus ovatis, crenatis, in petiolum decurrentibus; calicibus dentato-spinosis, nutantibus; bracteis reflexis.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 23. tab. 3.

*Salvia foliis glabris, inferioribus ovato-oblongis, crenatis, superioribus lanceolatis, subsintegerrimis; bracteis reflexis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 271. n° 114.

β. *Scalaria africana, praxos, annua.* Vaill. Herb.

Cette espèce a beaucoup d'affinité avec le *salvia bicolor*, dont elle diffère par les tiges velues, les feuilles ovales, oblongues, crénelées, point laciniées ou sinuées.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, à angles obtus, hérissées de poils roides, hautes de deux ou trois pieds, divisées en rameaux droits, allongés, effilés. Les feuilles sont glabres; les inférieures ovales, oblongues, crénelées à leurs bords, obtuses à leur sommet, larges d'environ deux pouces, longues de quatre à cinq, un peu décurren-tes sur leur pétiole; les caulinaires & les supérieures opposées, sessiles, peu nombreuses, lancéolées, souvent très-entières à leurs bords ou crénelées, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en longs épis droits, terminaux, composés de verticilles à deux, quatre ou six fleurs, supportées par des pédoncules très-Botanique. Tome VI.

courts, réfléchis, munis de bractées fort petites, ovales, aiguës, réfléchies. Les calices sont velus, striés, à cinq dents sétacées, presque épineuses à leur sommet; les trois supérieures plus courtes. La corolle est de couleur bleue, aussi grande que celle du *salvia pratensis*; le tube au moins aussi long que le calice, très-ouvert à son orifice, partagé en deux lèvres; la supérieure comprimée, velue, recourbée en faux; l'inférieure divisée en trois lobes; celui du milieu concave, plus grand; les filaments arqués, soutenus transversalement par un pédicule court; le style plus long que la corolle; les semences brunes, arrondies, recouvertes par le calice.

Cette plante a été découverte, par M. Desfontaines, au royaume d'Alger, dans le mont Arlas, proche Maïne. (V. Desfont. ex Desfont.)

#### 42. SAUGE à larges feuilles. *Salvia latifolia*. Vahl.

*Salvia foliis remotis dentatis, glabris, inferioribus oblongis, basi attenuatis, superioribus cordatis; pedunculis elongatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 271. n° 115.

*Scalaria tingitana, annua, latifolia.* Herb. Juss.

Cette espèce, voisine du *salvia algeriensis*, en diffère par les feuilles à dentelures plus écartées; les supérieures en cœur & non lancéolées, dentées en scie; la lèvre supérieure de la corolle plus petite, à peine pubescente & non velue; les semences plus grandes.

Ses tiges sont droites, herbacées, à peine pileuses, purpurines, rameuses à leur partie supérieure. Les feuilles sont opposées, glabres, à dentelures écartées; les radicales & inférieures pétiolées, oblongues, rétrécies à leur base; les supérieures sessiles, en cœur à leur base, médiocrement rétrécies, longues de deux à trois pouces, un peu aiguës, veinées, nerveuses; les terminales plus petites, veinées, chargées de quelques poils rares.

Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules triâbles, velus, presque visqueux; réunies par verticilles écartés à quatre fleurs, dont les pédicelles sont très-courts; munies de bractées en cœur, velues, acuminées, glabres à leur face extérieure, une fois plus courtes que les calices. Ceux-ci sont campanulés, velus, striés, à deux lèvres; la supérieure ascendante, ovale, aiguë; l'inférieure bifide, à deux dents sétacées. La corolle est beaucoup plus grande que le calice; la lèvre supérieure concave, courbée en faux, légèrement pubescente, étant vue à la loupe; les étamines pendantes; le style faillant.

Cette plante croît en Barbarie, dans les environs de Tanger. (V. f. in herb. Juss.)

Gggg

43. SAUGE à odeur forte. *Salvia graveolens*. Vahl.

*Salvia foliis cordatis, rugosis, crenatis, inferioribus subsinuatis; spicis ramosis, hirsutissimis; bracteis cordatis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 273. n°. 120.

*Scalaria aspiculata, fruticans, fetidissima*. Herb. Juss.

Ses tiges sont droites, ligneuses, divisées en rameaux quadrangulaires, à angles moules; très-velues, garnies de feuilles pétiolées, opposées, en cœur, longues de deux pouces; les inférieures oblongues, légèrement sinuées; les supérieures oblongues, crénélées, obtuses à leur sommet, ridées à leurs deux faces, blanchâtres & velues particulièrement à leur face inférieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en épis longs de six à sept pouces, rameux à leur base, très-velus, composés de verticilles rapprochés, chargés de poils blancs & nombreux, à six fleurs presque sessiles, munies de bractées étroites, en cœur, glabres en dessus, plus courtes que le calice; celui-ci est campanulé, divisé en trois dents; la supérieure ovale. La corolle à deux lèvres; la supérieure en casque, linéaire, courbée en faux, pileuse; le style saillant.

Cette plante croît en Egypte. h? (V. f. in herb. J. f.)

44. SAUGE épineuse. *Salvia spinosa*. Linn.

*Salvia foliis oblongis, repandis; calicibus spinosis; bracteis cordatis, mucronatis, concavis*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 70. n°. 31. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 327. — Mantiss. 311. — Syst. veget. 66. — Jacq. Icon. rar. tab. 7. — Idem, Coll. 2. 1. pag. 149. — Etling, de *Salvia*, n°. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 146. n°. 59.

*Salvia aegyptiaca*. Mantiss. pag. 29. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 276. n°. 126.

*Salvia precox*. Horr. Paris.

*Salvia africana, precox, annua*. Tournef. Inst. R. Herb. 179.

*Salvia* (precox), *foliis ovato-oblongis, subrepandis, levibus, subsessile, bracteis cordatis, venosis, acuminatis, longitudo calicis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 274. n°. 122.

1. *Eadem caule levi, foliis planis, nudisculis*. Lam. Illustr. L. c.

Ses tiges sont droites, velues, quadrangulaires, à angles émoussés, divisées en rameaux étalés, opposés; garnis de feuilles pétiolées, opposées, presque en cœur ou ovales, ridées, sinuées à leurs bords, obtuses à leur sommet; les supérieures sessiles, pileuses à leurs deux faces, particulièrement

à leur face inférieure, crénélées ou dentées en scie.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, allongés, médiocrement rameux; garnis de bractées larges, concaves, en forme de cœur, nerveuses, très-entières, glabres à leur face supérieure, aristées à leur sommet; chaque verticille est composé de six fleurs sessiles, en deux paquets opposés de trois fleurs chacun. Les calices sont tubulés, filonés, un peu élargis à leur orifice, divisés en deux lèvres; la supérieure munie de trois dents rapprochées, inégales; la lèvre inférieure un peu plus courte, bifiée, à deux dents. La corolle est blanche ou bleuâtre, ouverte en deux lèvres à son orifice; la supérieure creusée en casque, droite, un peu courbée en faux, échancrée à son sommet; la lèvre inférieure presque aussi longue que la supérieure, à trois lobes, celui du milieu plus grand, concave, bilobé; les lobes latéraux rabatus extérieurement. Les étamines sont blanches, plus longues que la corolle; les anthères jaunâtres; le style de couleur purpurine. Les semences sont renfermées dans le fond du calice, qui devient sec, dur, comprimé, fortement strié, de la longueur des bractées; les dents subulées, piquantes.

Cette plante croît en Egypte, où elle a été observée par Forskhal. x On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.

Peut-être vaudrait-il mieux rapporter à cette espèce la synonymie de C. Bauhin & de Morison, que nous avons citée au *salvia syriaca*: il en existe une variété β, dont les tiges sont lisses, les feuilles planes, presque glabres.

45. SAUGE comprimée. *Salvia compressa*. Vent.

*Salvia foliis ovato-oblongis, crenatis, rugosis; verticillis summis, sterilibus; calicibus frutiferis, coloratis, compressis*. Vent. Jard. Cels, pag. 59. tab. 59.

*Salvia* (compressa), *sublanata; foliis dentatis; radicalibus cordato-oblongis; bracteis subrotundo-cordatis, mucosis, summis sterilibus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 275. n°. 124.

*An salvia (coarctata), foliis radicalibus oblongo-hastatis, dentatis; bracteis cordatis; calicibus pungentibus, brevioribus, summis sterilibus* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 277. n°. 128.

Cette plante réunit à elle seule les caractères qui distinguent le *salvia spinosa* & l'*argentea*, ayant les fruits comprimés de la première, & les verticilles supérieurs stériles de la seconde, outre d'autres caractères qui lui sont particuliers.

D'une racine pivotante s'élèvent plusieurs tiges droites, tétragones, molles, à angles moussés, creusées d'un sillon sur chaque face, de couleur cendrée, rameuses dans leur partie supérieure; les rameaux opposés, axillaires, grêles, courts, peu

ouverts. Les feuilles sont opposées, ovales, blongues, obtuses, crénelées à leurs bords, cendrées, extrêmement ridées; les inférieures amples, pétiolées; les supérieures sessiles, réunies à leur base, insensiblement plus courtes; les pétioles sont dilatés, & embrassent à demi la tige à leur base; plus courts que les feuilles.

Les épis sont terminaux, composés de quelques verticilles formant par leur ensemble une panicule serrée, presque globuleuse; les verticilles un peu écartés; les inférieurs à huit ou douze fleurs, les moyens à quatre ou six; le supérieur avorté ou stérile. Les fleurs sont droites, presque sessiles, munies chacune d'une bractée lancéolée, blanchâtre; celles des verticilles, opposées, ovales, arrondies, pubescentes, rougeâtres, concaves, ciliées à leurs bords, parsemées en dehors de points dorés peu apparens.

Le calice est tubulé, insensiblement dilaté, comprimé, velu, strié, de la couleur & de la longueur des bractées; la lèvre supérieure à deux divisions ovales, aiguës, entre lesquelles est placée une dent courte; l'inférieure de même forme, mais dépourvue de dents. La corolle est tubulée, labiée à son limbe, d'un bleu tirant sur le violet, parsemé en dehors de points dorés, très-sensibles à la loupe. Le tube est cylindrique, dilaté à son orifice, glabre, blanchâtre, renfermé dans le calice; la lèvre supérieure presque droite, en casque, velue en dehors, échancrée à son sommet; l'inférieure g'abre, à trois lobes; les deux latéraux ovales, réfléchis; celui du milieu plus grand, horizontal, arrondi, concave, échancre; deux filamens stériles, très-courts, attachés au milieu du tube; deux fertiles, comprimés, arqués, portés sur un pivot inséré à l'orifice du tube; les anthères vacillantes, linéaires, & une loge s'ouvrant longitudinalement, d'un jaune-pâle; un ovaire libre à quatre lobes, porté sur un réceptacle globuleux, quatre semences, dont deux ou trois avortent, arrondies, de couleur brune, situées au fond du calice accru du double, extrêmement comprimé & vivement coloré.

Cette plante croît en Perse, sur la route de Mossoul à Bagdad, d'où elle a été rapportée par M. M. Bruguière & Olivier. (Description ex Vent.) Elle fleurit vers la fin du printemps.

#### 46. SAUGE laineuse. *Salvia aethiopis*. Linn.

*Salvia foliis ovatis, dentato-erosi, lanatis; verticillis lanatis; bracteis recurvatis, mucronato-spinulosis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 329.

*Salvia foliis oblongis, erosis, lanatis; verticillis lanatis; bracteis recurvatis, subspinosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 39. — Gouan, Monsp. 469. — Idem, Illustr. pag. 2. — Jacq. Flor. austr. tab. 211. — Sabbat. Hort. rom. vol. 3. tab. 23. — Etling, de

*Salvia*, n°. 28. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 472. n°. 459. XI. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 148. n°. 64. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 24.

*Salvia foliis lanceolatis, sinuato-dentatis; floralibus verticillis comprimentibus*. Hort. Cliffort. 13. — Royen, Lugd. Bat. 308.

*Salvia foliis oblongis, dentato-angularis, hirsutis; verticillis lanatis*. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 259. n°. 7.

*Salvia foliis oblongis, laciniatis, hirsutis; verticillis lanatis; barba laciniis mediâ cucullata*. Crantz, Stirp. austr. pag. 238.

*Sclarea aethiopis*. Mill. Dict. n°. 2.

*Aethiopis foliis sinuosis*. C. Bauh. Pin. 247.

*Aethiopis phlomisii*. H. Eyf. Aët. 8. pag. 3 fig. 1.

*Sclarea vulgaris, lanuginosa, amplissimo folio*. Tournef. Inst. R. Herb. 178. — Garid. Aix. 432. — Schow, Spec. 538.

*Aethiopis multis*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 315. ic.

§. *Aethiopis laciniatis foliis*. Barrel. Icon. rar. 24. tab. 188.

*Sclarea laciniatis foliis*. Tournef. Inst. R. Herb. 179. — Garid. Aix. 432.

Cette espèce diffère du *salvia austriaca* par ses grandes bractées concaves, & par les calices enveloppés d'un duvet cotonneux, épais, très-blanc; par ses tiges rameuses, paniculées.

Ses tiges sont droites, tétragones, hautes de deux ou trois pieds, d'un brun-foncé, revêtues d'un duvet cotonneux, d'un blanc de neige, rameuses & presque paniculées dans leur partie supérieure; les rameaux étalés, ouverts, opposés. Les feuilles sont pétiolées, très-grandes, larges, épaisses, ovales, oblongues, ridées, velues, d'un vert-foncé à leur face supérieure, blanches & tomenteuses en dessous, laciniées, finées, dentées à leurs bords, aiguës à leur sommet; les pétioles épais, canaliculés en dessus, très-velus. Dans la variété § les feuilles sont plus profondément laciniées à leurs bords; les feuilles supérieures sessiles, amplexicaules, presque lancéolées, échan-crées en cœur à leur base, un peu recourbées.

Les fleurs forment une panicule étalée, dont les ramifications sont opposées, nues à leur partie inférieure, tomenteuses, composées de verticilles un peu écartés, de quatre à cinq fleurs pédonculées, environnées de bractées larges, concaves, conniventes, en forme de collerette, droites, verdâtres, à peine pubescentes, cotonneuses à leurs bords, quelquefois munies de quelques dents rares, aiguës, terminées par une longue pointe épineuse, recourbées à leur sommet. Les calices,

saillans hors des bractées, font droites, recouvertes d'un duvet cotonneux, très-épais, d'une grande blancheur, de forme conique, à cinq dents inégales, tubuleuses, roides, épineuses. La corolle est blanche, droite, assez grande; le tube court, renflé à son orifice; les deux lèvres très-rapprochées; la supérieure comprimée, fortement arquée, velue sur sa carène, tachetée de bleu, & bise à son sommet; la lèvre inférieure à trois lobes, les deux latéraux lancéolés, fort petits, roulés à leurs bords; celui du milieu concave, trilobé; les étamines & le pistil à peine plus longs que la corolle. Les semences sont brunes, lisses, comprimées d'un côté, presque triangulaires de l'autre.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, dans l'Autriche, la Grèce, & en Afrique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♂ (P. v.)

47. SAUGE ORVALE. *Salvia sclarea*. Linn.

*Salvia foliis cordatis, crenatis, rugosis, villosis; bracteis coloratis, concavis, acuminatis, calice longioribus.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 326.

*Salvia foliis rugosis, cordatis, oblongis, villosis, serratis; bracteis floralibus calice longioribus, concavis, acuminatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 38. — Hort. Cliffort. 12. — Hort. Upsal. 10. — Roy. Lugd. Bat. 309. — Dalib. Paris. 9. — Ludw. Ed. tab. 171. — Hoffm. Germ. 10. — Roth, Germ. vol. II. p. 33. — Eting. de *Salvia*, n°. 27. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 425. n°. 459. III. — Ger. Flor. gall. Prov. pag. 259. n°. 6.

*Salvia foliis cordato-ovatis, obscure undulatis; foliis floralibus lanceolato-concavis.* Guett. Stamp. 263.

*Sclarea vulgaris.* Miller, Dict. n°. 1.

*Sclarea.* Tabern. Icon. 373. — Garidel, Aix. 433.

*Sclarea Taberna.* Tourn. Inst. R. Herb. 179.

*Sclarea centrum gollii, & officinarum gallicum.* Lobel. Ic. 536. — Idem, Observ. 300. Ic.

*Horminum, sclarea didum.* C. Bauh. Pin. 228. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 16. fig. 1.

*Orvala.* Dodon. Pempt. 292.

*Gallicum sativum.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 319. Icon.

Vulgairement orvale, toute-bonne.

Cette plante à une odeur extrêmement pénétrante, & se distingue à ses grandes feuilles ridées, à ses bractées larges & colorées, à ses fleurs bleuâtres.

Ses tiges sont droites, dures, épaisses, hautes

de deux à trois pieds, quadrangulaires, velues, cannelées, divisées en rameaux étalés, droits, opposés, alongés, garnis de feuilles grandes, élargies, pétioles, opposées, fortement ridées, ovales, oblongues, en cœur à leur base, médiocrement crénelées ou à laches dentelures à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet, d'un gros vert-foncé, légèrement velues, nerveuses, réticulées; les supérieures amplexicaules, opposées, plus fortement échancrées, presque auriculées à leur base; celles des jeunes rameaux, plus petites, étroites, alongées.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, alongés, droits, à ramifications latérales, opposées, composées de verticilles garnis de quatre ou six fleurs, presque sessiles, munies de bractées amples, très-larges, concaves, ovales, lancéolées, acuminées, presque glabres, au moins aussi longues que les fleurs; les supérieures, d'une teinte violette, presque imbriquées. Les calices sont courts, tubulés, un peu campanulés, hispides, striés, à deux lèvres inégales; la supérieure, triside, un peu plus longue; l'inférieure, à deux divisions courtes; les dents inégales, terminées chacune par une pointe spinuliforme. La corolle est bleuâtre, mêlée de blanc, grande, à deux lèvres très-ouvertes; la supérieure longue & arquée; l'inférieure courte, élargie, à trois lobes inégaux; les étamines à peine plus longues que la corolle; le style saillant, recourbé.

Cette espèce croît en Italie, en Espagne, dans les départemens méridionaux de la France, aux environs de Paris: je l'ai également rencontrée dans les environs de Laon, le long des murs de cette ville. ♂ (P. v.)

Cette plante passe pour résolutive, stimulante, tonique, stomachique, détergative, sternutatoire: son suc produit une forte d'ivresse qui tient un peu du spasme; son odeur est très-forte, pénétrante, un peu désagréable: on la prescrit en infusion dans le relâchement de l'estomac, dans les langueurs, les pâleurs; on la donne en lavemens dans les coliques vénéreuses; on l'applique sur le ventre pour les fleurs-blanches: son suc est très-bon pour déterger les ulcères. Dans le Nord, on l'emploie pour la fabrication de la bière, à défaut de houblon; on mange ses jeunes pousses en salade.

48. SAUGE à feuilles de verveine. *Salvia verbenaca*. Linn.

*Salvia foliis serratis, sinuatis, levissimulis; corollis calice angustioribus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 35. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 70. n°. 302. — Virid. Cliffort. 17. — Gronov. Virgin. 8. — Ruyen, Lugd. Bat. 309. — Dalib. Paris. 9. — Sauvag. Monsp. 278. — Hoffm. Germ. 10. — Roth, Germ. vol. I. pag. 12. — vol. II. pag. 32.

— Etling. de *Salvia*, n°. 19. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 429. n°. 469. — Bergeret, Phytogr. 2. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 21. — Poirer, Voyag. en Barbarie. vol. 2. pag. 82.

*Salvia foliis pinnatis incis, glabris*. Hort. Clifort. 12.

*Salvia foliis pinnatifidis sinuatis, corolla labiis a; proximatis*. Gerard, Flor. gall. Prov. p. 258.

*Horminum verbenaceum*. Mill. Dict. n°. 1.

*Horminum silvestre, lavandula flore*. C. Bauhin, Pin. 139. — Tourn. Infl. R. Herb. t. 78. — Schaw, Specim. n°. 335.

A. *Horminum verbenaceum laciniis, angustifolium*. Triumf. Observ. 66. Ic. Bona. — Schaw, Specim. n°. 336.

*Horminum minus, folio sinuato, flore minore, dilutæ calice*. Tourn. Infl. R. Herb. t. 78.

B. *Horminum silvestre minus, incisio folio, flore æquæ*. Barrel. Icon. rar. 208.

C. *Horminum minus, subrotundo, scabro folio*. Barrel. Ic. rar. tab. 207.

Plante distinguée par ses feuilles sinuées, presque lisses; par ses petites fleurs d'un bleu vif, dont il existe quelques variétés.

Ses racines sont dures, épaisses, presque ligneuses, presque simples, de couleur brune; il s'en élève des tiges hautes d'environ un pied, droites, médiocrement velues, simples ou rameuses, quadrangulaires, cannelées, garnies de feuilles ovales, oblongues ou elliptiques, presque lisses ou légèrement velues, rondes ou sinuées à leurs bords, inégalement dentées, en dents obtuses, ridées; celles du bas & les radicales longuement pétioles; les pétioles planes, velus; les feuilles supérieures, sessiles, opposées, plus étroites. Ces feuilles varient dans leur forme; elles sont plus étroites, & plus profondément laciniées dans la variété A; tudes, plus larges, ovales, un peu arrondies, à crénelure plus larges dans la plante C; plus petites, ovales ou ovales-oblongues, sinuées, un peu ridées, & les fleurs couleur d'azur dans la variété B.

Les fleurs forment des épis simples, longs de trois ou quatre pouces, composés de verticilles rapprochés, contenant environ six fleurs garnies de bractées en forme de cœur, pubescentes, aiguës à leur sommet, à peu près de la longueur des fleurs; les supérieures plus courtes. Le calice est court, velu, campanulé, ouvert à son orifice, strié, légèrement comprimé, à deux lèvres; la lèvre supérieure, à deux ou trois dents très-petites, à peine sensibles. La corolle est petite, d'un bleu vif; la lèvre supérieure échancrée, un peu courbée en faux; l'inférieure à trois lobes, le lobe

du milieu concave; le tube à peine aussi long que le calice; quelquefois les fleurs sont presque une fois plus grandes.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de l'Europe, dans les prés secs & montagneux. On la trouve également en Espagne & en Barbarie avec ses variétés. 2 (V. v.)

49. SAUGE clandestine. *Salvia clandestina* Linn.

*Salvia foliis serratis, pinnatifidis, rugosissimis; spica obtusa, corollis calice angustioribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 36. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. p. 70. n°. 303. — Etling. de *Salvia*, n°. 20. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 23. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 138.

*Salvia foliis pinnato-dentatis, asperis, hirsutis; verticillis pilosis, floribus apertis*. Zinn. Goett. 198.

*Horminum silvestre, incisio folio, calice flore, italico*. Barrel. Ic. rar. pag. 24. tab. 220.

Cette plante se rapproche du *salvia verbenaca*, dont elle diffère par ses feuilles plus profondément incisées, presque pinnatifides, & par ses fleurs plus petites.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, velues, à angles obtus, hautes d'environ un pied, rameuses à leur base. Les feuilles radicales & inférieures sont pétioles, oblongues, lancéolées, obtuses à leur sommet, fortement sinuées ou presque pinnatifides, à découpures distinctes, inégales, arrondies ou aiguës, inégalement dentées, fortement ridées à leurs deux faces, un peu rétrécies à leurs bords, vertes, glabres en dessus, velues ou médiocrement tomenteuses en dessous. Les rameaux n'ont guère que deux ou quatre feuilles; les inférieures presque sessiles, opposées; les supérieures un peu amplexicaules, plus petites, moins sinuées, obtuses, crénelées.

Les épis sont droits, terminaux, garnis d'autres épis plus courts, opposés, axillaires, composés de verticilles rapprochés, à six fleurs, munis de bractées ovales, aiguës, pubescentes, un peu plus courtes que les calices, particulièrement celles des fleurs supérieures. Les calices sont courts, velus, partagés en deux lèvres à leur orifice; la lèvre supérieure comprimée, arrondie, échancrée; la lèvre inférieure à deux dents acuminées. La corolle est de couleur bleue ou un peu violette, environ deux fois plus longue que le calice; souvent le lobe du milieu de sa lèvre inférieure est blanchâtre.

Cette plante croît naturellement en Italie, en Espagne, sur les côtes de la Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 3 (V. v.)

50. SAUGE pubescente. *Salvia difformis*. Linn.

*Salvia pilosa & viscida; foliis cordato-oblongis, erectis; spicis nudis, caule frutescente. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 70. n°. 305.*

*Salvia foliis cordato-oblongis, erectis; flaminibus corollam aquantibus. Linn. Spec. Plant. pag. 36. — Mantiss. 318.*

*Salvia foliis cordato-oblongis, erectis; petiolis marginatis. Edling. de Salvia, n°. 32.*

*Salvia caule fruticosa; foliis ovatis, sinuatis, erectis, rugosis, hirsutis. Arduin. Spec. 1. pag. 9. tab. 1.*

*Salvia villosa & viscosa, lanceolato-ovatis, versis petiolum angulatis. Allion. Hort. 49. n°. 4.*

*Horminum silvestre, majus; flore albo, integris foliis. Battel. 1c. rar. 187. Bona.*

Cette plante, un peu rapprochée du *salvia elandifolia*, s'en distingue par toutes les parties pubescentes, visqueuses; par ses feuilles bien moins profondément laciniées.

Ses tiges sont fortes, droites, presque ligneuses, quadrangulaires, chargées de poils très-fins, nombreux, visqueux, ouverts; hautes de deux à trois pieds, divisées en rameaux axillaires, opposés, cubiques, élancés. Les feuilles sont pétiolées, opposées, oblongues, en cœur à leur base, obtuses à leur sommet, ridées, vertes à leurs deux faces, pubescentes, laciniées ou sinuées à leur contour, crénelées; les dernières plus étroites, sessiles, crénelées ou denticulées, obtuses, quelquefois un peu rétrécies à leur base; les pétioles longs, médiocrement comprimés, velus, canaliculés en dessus.

Les épis sont terminaux, & forment par leur ensemble, vers l'extrémité des tiges, une sorte de panicle; les verticilles un peu distans, composés de quatre à six fleurs munies de bractées velues, en forme de cœur, un peu aiguës, presque aussi longues que le calice; les supérieures plus courtes. Le calice est presque tubulé, strié, velu, glutineux, ainsi que les autres parties de la plante; divisé en deux lèvres; la lèvre supérieure partagée en deux dents égales, courtes, aiguës; l'inférieure bifide, aiguë. La corolle est petite, de couleur blanche; le tube à peine aussi long que le calice; son limbe à deux lèvres; la supérieure droite; un peu concave, à peine recourbée à son sommet; l'inférieure à trois découpures; les deux latérales allongées; celle du milieu plus large, concave; les étamines, de la même longueur que la corolle; le style blanc, point faillant.

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

§1. SAUCE de Portugal. *Salvia leucantha.*

*Salvia foliis cordato-oblongis, bullatis; caule piloso; bracteis cordatis, acuminatis; flaminibus corollâ brevioribus. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 265. n°. 101.*

*Salvia bullata. Vahl, L. c.*

Cette espèce a des rapports avec le *salvia dispersa*, mais les feuilles sont plus larges, moins nombreuses, en cœur à la base des ramifications; les bractées en cœur, les fleurs purpurines.

Ses tiges sont hautes d'un demi-pied & davantage, obscurément tétragones, pileuses, à peine rameuses & dépourvues de feuilles, excepté dans les individus cultivés, qui sont souvent munis de deux ou quatre rameaux. Les feuilles inférieures ou radicales sont pétiolées, oblongues, en cœur, concaves, longues de deux pouces & plus, obtuses, inégalement crénelées, très-ridées, glabres en dessus, pileuses en dessous sur leur côté & leur principale nervure; celles de la base des rameaux sessiles, en cœur, aiguës ou acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en grappes allongées, composées de verticilles écartés, à fix fleurs, garnies de bractées de la longueur du calice, velues en dessous, principalement vers leurs bords, glabres en dessus, très-ouvertes; les supérieures colorées, en forme de cœur, acuminées. Le calice est pubescent, pourpre en dessus, cariné par une nervure élevée, striée & d'un vert-pourpre en dessous; la lèvre supérieure est à trois dents aiguës, l'inférieure bifide. La corolle est petite, de couleur purpurine; la lèvre supérieure droite, concave, comprimée, pubescente, marquée, ainsi que le calice, de points blanchâtres; la lèvre inférieure concave, plus courte que la supérieure, à trois lobes, celui du milieu légèrement crénelé, les latéraux plus courts, linéaires-oblongs, obtus; les étamines de la longueur de la lèvre inférieure; le style bifide, un peu plus long que la lèvre supérieure.

Cette plante croît en Espagne. (V. Descript. ex Vahl.)

§2. SAUCE d'Abyssinie. *Salvia abyssinica. Linn. f.*

*Salvia foliis inferioribus lyratis, summis cordatis; floribus verticillatis; calicibus mucronatis, ciliatis. Jacq. Icon. rar. tab. 6. — Colled. 1. pag. 32. — Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 33. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 70. n°. 307. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 142. n°. 47.*

*Salvia (abyssinica), foliis cordato-ovatis, rugosis, erectis; bracteis integerrimis, levibus. Linn. f. Suppl. 88.*

Cette espèce a de grands rapports avec le *salvia nilotica*; elle en diffère par ses feuilles inférieures, divisées en lyre à leur contour.



Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, tétragones, à angles mouffes, simples, rudes au toucher, herbacées. Les feuilles radicales sont pétiolées, alongées, les unes en forme de lyre, d'autres profondément & inégalement crénelées, ridées, vertes à leurs deux faces, obtuses à leur sommet; les feuilles caulinaires presque lancéolées, crénelées à leurs bords, quelquefois un peu laciniées vers leur base, les supérieures sessiles, en cœur.

Les fleurs forment une panicule composée d'épis très-alongés, opposés, simples, droits, garnis de verticilles à quatre ou six fleurs, munis de bractées sessiles, concaves, très-entières, en forme de cœur. Les calices sont tubulés, divisés en deux lèvres peu écartées; la supérieure bifide, l'inférieure à deux dents acuminées. La corolle est de couleur bleue, au moins deux fois plus grande que le calice, ouverte en deux lèvres à son orifice; la lèvre supérieure comprimée, échancrée à son sommet, d'une grandeur médiocre; l'inférieure à trois découpures; les deux latérales très-courtes, peites, réfléchies; celle du milieu concave, plus grande, à deux lobes; les étamines plus courtes que la corolle; le style saillant.

Cette plante croît en Afrique dans les plaines de l'Abydnie; elle répand une odeur forte, assez semblable à celle du houblon. ☞

### 53. SAUGE de Nubie. *Salvia nubia*, Ait.

*Salvia foliis oblongis, subcordatis, inaequaliter-alatis, rugosis, crenatis, basi subauritis*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 42. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 139. n°. 36.

*Salvia (nubia), foliis ovato-oblongatis, duplicato-crenatis; tubo corollae incurvato*. Murr. Comm. Gart. 1778. pag. 90. tab. 3.

*Salvia (nilotica), foliis cordato-ovatis, dentatis, basi subsinuatis; verticillis nudis; calicem dentibus spinosis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 70. n°. 306.

Cette plante a le si grands rapports avec la *salvia nilotica*, qu'elle paroit n'en être qu'une simple variété, & dont elle diffère par la forme de ses feuilles, par les épis velus, mais moins tomenteux, & par les dents des calices plus fortement épineux.

Ses tiges sont droites, hautes au plus d'un pied, quadrangulaires, médiocrement velues, garnies de feuilles pétiolées, opposées, ovales ou ovales-oblongues, en cœur à leur base, inégales à leurs côtés, ridées, crénelées à leur contour; les crénelures presque alternativement plus courtes, quelquefois échancrées, presque auriculées vers leur base, surtout aux feuilles inférieures, obtuses à leur sommet; les supérieures & terminales sessiles,

amplexicaules, presque en cœur, aiguës, légèrement velues.

Les épis sont drois, verticillés; les verticilles garnis de six fleurs pédonculées, munies de bractées un peu plus courtes que les calices, ovales, cordiformes, aiguës, pileuses. Les calices sont anguleux, d'un vert-noirâtre, chargés de poils fins sur leurs angles, armés de cinq dents presque égales, roides, subulées, piquantes; le tube de la corolle un peu courbé.

Cette plante croît dans l'Afrique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ☞ (P. v.)

### 54. SAUGE à tige nue. *Salvia nudicaulis*, Vahl.

*Salvia foliis radicalibus lanceolatis, rugosis, crenato-erofis; caule subnudo; foliis oblongis, rugosis, subcrenatis*. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 10. n°. 29.

*Salvia (merjanie), floribus verticillatis, sessilibus, ceruleis; caule subnudo; foliis oblongis, rugosis, subcrenatis*. Forskhal, Flor. ægypt.-arab. pag. 10. n°. 29.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes d'un demi-pied, velues, blanchâtres, divisées à leur partie supérieure en rameaux garnis seulement de deux feuilles. Les feuilles radicales sont nombreuses, médiocrement pétiolées, lancéolées, oblongues, très-ridées, crénelées, un peu tordues à leur contour, blanchâtres en dessous, aiguës à leur sommet, longues d'un pouce.

Les fleurs sont terminales, disposées en verticilles presque sessiles, distans, à six fleurs, munis de bractées ovales, acuminées, plus courtes que le calice. Celui-ci est nerveux, à deux lèvres; la supérieure plus courte, ovale, presque à trois dents; l'inférieure plus alongée, à deux dents aiguës. La corolle est petite, de couleur bleue.

Cette plante croît dans l'Arabie. (Descript. ex Vahl.)

### 55. SAUGE de Syrie. *Salvia syriaca*. Linn.

*Salvia foliis cordatis, dentatis; inferioribus repandis; bracteis cordatis, brevibus, acutis; calicibus tomentosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 36. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 69. n°. 296. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 134. n°. 21.

*Horminum syriacum*. C. Bauh. Pin. 238. — Idem, Prod. 114. — Eyst. Phytopin. — Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 16. fig. 2.

*Scalaria syriaca, flore albo*. Tourn. Inst. R. Herb. 179.

*Horminum syriacum, scalaria dicto congener, flore albo. An bisfermas Camerarii?* Tourn. Hort. Paris. L. c.

*Salvia caule fruticoso; foliis ovatis, sinuatis, cre-*

*natis, rugosis, hispidis.* Arduin, Spec. 1. pag. 9. tab. 1.

Cette espèce a des rapports avec le *salvia pratensis*; elle en a également avec le *salvia asperma*; cependant elle a des caractères qui la différencient de l'une & de l'autre, tant dans son port, que dans les corolles fort petites.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires; les angles obtus; les rameaux opposés, un peu velus, garnis de feuilles pétiolées, opposées, en forme de cœur, fortement ridées, légèrement tomenteuses, sinuées, dentées ou obtusément crénelées; les inférieures plus grandes, fortement sinuées; les supérieures simplement crénelées ou dentées, presque sessiles.

Les fleurs forment, à l'extrémité de rameaux nombreux, des épis simples, droits, élanés, dont l'ensemble présente une panicule étalée; les bractées sont en forme de cœur, acuminées, plus courtes que les calices. Ceux-ci sont tomenteux, à cinq dents profondes, égales, acuminées. Les corolles sont petites, de couleur blanche; le style une fois plus long que la lèvre supérieure creusée en caïque.

Cette plante croît dans le Levant & la Palestine. *H*

56. SAUGE du Nil. *Salvia nilotica*. Jacq.

*Salvia foliis crotis, rugosis, inferioribus basi sublaetatis; calicibus spinosis, fovea angulifera ciliatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 258. n. 84.

*Salvia foliis sinuatis, angularis, crenato-dentatis, calicibus spinosis, angulis marginque faucis ciliatis.* Murr. Comment. Goett. 1778. pag. 88. tab. 2. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. n. 37.

*Salvia (nilotica), foliis cordato-ovatis, crenatis, rugosis, villosis; floribus verticillatis; calicibus mucronatis.* Jacq. Hort. 3. tab. 92.

Ses tiges sont fortes, épiques, un peu fistuleuses, quadrangulaires, à angles obtus, pubescentes ou légèrement velues, striées, divisées, surtout vers son sommet, en rameaux axillaires, opposés. Les feuilles sont grandes, pétiolées, opposées, longues de six à huit pouces, médiocrement ridées, vertes, un peu velues, sinuées, presque anguleuses à leurs bords, crénelées, obtuses à leur sommet, en cœur à leur base, supportées par des pétioles pubescens; les feuilles supérieures terminales presque sessiles, plus étroites, simplement crénelées.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, à ramifications opposées, composés de verticilles très-rapprochés, imbriqués avant leur développement, munis de bractées ovales, en forme de

cœur, velues, crénelées, un peu aiguës. Les calices sont munis de dents épineuses, crénelées sur leurs angles, à leurs bords & à leur orifice.

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *(V. f.)*

57. SAUGE roncinée. *Salvia runcinata*. Linn. f.

*Salvia scabra, foliis runcinato-pinnatifidis, dentatis; floribus spicatis, verticillatis.* Linn. f. Suppl. pag. 89. — Jacq. Hort. Schenbr. vol. 1. pag. 5. tab. 8. — Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 260. n. 90.

*Salvia (runcinata), herbacea, scabra; foliis runcinato-pinnatifidis, rugosis, dentatis; ramis flexuosis.* Thunb. Prodr. Flor. capenf. 97.

Ses tiges sont droites, rameuses, branchues, pubescentes & visqueuses; les feuilles inférieures pétiolées, obtuses, roncinnées, presque pinnatifides, dentées; les supérieures sessiles, plus aiguës, longues d'un pouce & plus; les découpures alternes ou opposées, dentées; la terminale plus grande que les autres.

Les fleurs sont disposées en épis à l'extrémité des tiges & des rameaux, composées de verticilles écartés, plus ou moins nombreux, d'environ six fleurs, dont les pédicules sont courts, blanchâtres, munis de bractées en cœur, terminées par une petite pointe épineuse, plus courtes que les calices: ceux-ci sont garnis de petites dents épineuses. La corolle est petite & bleuâtre.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. *(Descript. ex Vahl.)*

58. SAUGE verticillée. *Salvia verticillata*. Linn.

*Salvia foliis cordatis, crenato-dentatis; verticillis multifloris, subnullis; stylo deflexo.* Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 308.

*Salvia foliis cordatis, crenato-dentatis; verticillis subnullis; stylo corolla labio inferiori incumbente.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 37. — Hort. Upf. 11. — Scop. Carr. 2. n. 34. — Crantz, Austr. pag. 241. — Etling, de *Salvia*, n. 247. — Kniph. Oid. VI, tab. 79. — Hoffm. Germ. 10. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 12. — vol. II. pag. 32. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 415. n. 459.

*Salvia foliis cordatis, sagittatis, dentatis.* Hort. Clif. 495. — Roy. Lugd. Bat. 309.

*Horminum verticillatum.* Miller, Dict. n. 3.

*Horminum silvestre, latifolium, verticillatum.* C. Bauh. Pin. 338. — Tournef. Inst. R. Herb. 178.

*Horminum silvestre tertium.* Clus. Hist. 2. pag. 29. Icon.

*Horminum silvestre latifolium alterum.* Clus. Pann. pag. 577. tab. 578.

*Salvia*

*Salvia foliis cordatis, serratis; verticillis densifloris, in spicam continuatis.* Hallet, Helv. n.º 251.

*Horminum spurium.* Rivin. Monsp. tab. 60.

*Salvia verticillata*, var. *β*, *lampsanafolia*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 260. n.º 91.

*Gallierico affinis planta; horminum silvestre latifolium Classio.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 314. Icon.

*Horminum silvestre latifolium, serratum, hirsutum, densis verticillatum, flore lavenderula.* Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 14. fig. 29.

*β. Horminum silvestre hirsutum, lampsanafolia; flore casio.* Batsch. Icon. rar. tab. 199.

*Horminum folio rapi.* Buxbaum, Cent. 5. App. 43. fig. 23.

Cette espèce est une de celles dont les verticilles sont le plus garnis de fleurs : elles forment des paquets globuleux ; elles sont petites, d'un beau bleu.

Ses tiges sont épaisses, dures, fibreuses ; les tiges quadrangulaires, fermes, droites, épaisses, velues, hautes d'un pied & demi ou deux pieds, divisées en rameaux opposés, étalés, axillaires ; les feuilles pétiolées, opposées, amples, ovales, échancrées en cœur à leur base, où elles se prolongent presque en oreillettes arrondies, molles, légèrement velues, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, couvertes de poils blanchâtres, un peu finuées, crénelées & dentées à leur contour, ciliées, vertes à leur face supérieure, plus pâles, un peu blanchâtres en dessous. Les pétioles, surtout ceux des feuilles inférieures, sont très longs, velus, un peu comprimés.

Les fleurs forment des épis droits, simples ou à rameaux opposés, disposés en verticilles épais, garnis d'un grand nombre de fleurs pédonculees, munies de bractées ovales, en cœur, velues, acuminées, à peine plus longues que les pédoncules, très-caduques. Leur calice est pubescent, presque cylindrique, étroit, divisé à son orifice en cinq petites dents courtes, aiguës, inégales. La corolle est d'un bleu-vif, petite ; la lèvre supérieure droite, un peu courbée & creusée en casque à son sommet, obtuse ; l'inférieure plus courte, pendante, trilobée ; le tube à peine aussi long que le calice ; le style allongé, incliné sur la lèvre inférieure ; le stigmate bifide.

Cette plante croît dans l'Alsace, l'Autriche, en Suisse, en Allemagne, dans l'Italie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

59. SAUGE à feuilles de navet. *Salvia napifolia*. Jacq.

*Salvia foliis cordatis, crenato-dentatis; verticillis subnudis; corolla lacini superiori cordato-emarginata.* Jacq. Hort. 2. pag. 71. tab. 152.  
Botanique. Tome VI.

*Salvia (napifolia), foliis cordatis, crenato-dentatis; inferioribus hastatis lyratisque; verticillis subnudis, lacini superiore brevioribus.* Ait. Hort. Kew. pag. 44. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 143. n.º 49.

*Salvia (napifolia), foliis inferioribus pinnatifidis; superioribus cordato-fugatis, dentatis; calicibus patulis.* Eting. de *Salvia*, n.º 13.

Il existe si peu de différences tranchées entre cette espèce & la *salvia verticillata*, que plusieurs auteurs ne l'ont regardée que comme une simple variété. Un des caractères les plus remarquables est d'avoir les feuilles inférieures souvent pinnatifides, les autres sagittées, en cœur à leur base ; la lèvre supérieure de la corolle en cœur, échancrée, fort courte.

C'est d'ailleurs une plante dont les tiges sont droites, quadrangulaires, chargées de poils fins, blanchâtres, un peu glanduleux ; les rameaux opposés, axillaires ; les feuilles pétiolées, opposées ; les radicales larges, ovales, échancrées en cœur à leur base, terminées par deux oreillettes arrondies, profondément finuées & crénelées à leur contour, souvent en forme de loge, approchant de celles des navets, tudes, velues ; les supérieures médiocrement pétiolées, crénelées ou dentées ; les terminales sessiles, courtes, ovales, presque amplexicaules, simplement dentées.

Les fleurs forment des épis terminaux & axillaires, composés de verticilles chargés d'un très-grand nombre de fleurs pédonculees, munies de bractées ovales, presque lanceolées, pubescentes, en cœur, aiguës à leur sommet, caduques, plus courtes que les pédoncules ; ceux-ci velus, longs d'environ deux lignes & plus, recourbés à l'époque de la maturité des fruits ; les calices tubulés, courts, un peu colorés, velus, médiocrement élargis vers leur orifice, striés, terminés par cinq petites dents courtes, aiguës, presque égales. La corolle est petite, d'un bleu-violet ; le tube à peine de la longueur du calice ; la lèvre supérieure presque droite, en cœur, échancrée à son sommet, à peine plus longue que l'inférieure ; les étamines non saillantes, de la longueur de la corolle.

Cette plante croît naturellement en Italie & dans les départements méridionaux de la France. (V. f.)

60. SAUGE à feuilles de bétoune. *Salvia betonicaefolia*.

*Salvia foliis ovato-oblongis, obtusis, crenatis; verticillis spicatis, subnudis; corollis calice angustioribus.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. p. 70. n.º 304.

*Salvia (oblongata), foliis lanceolato-oblongis, obtusis, glabris; grosse, aequaliter, obtuse serratis; l h h h*

*corollis calice angustioribus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 256. n°. 81.

On seroit tenté de rapporter cette plante au *salvia viridis* de Linné : des caractères fort tranchés l'en distinguent suffisamment.

Ses tiges sont droites, velues ou pubescentes, simples, striées, quadrangulaires, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, lancéolées, oblongues, glabres ou un peu velues, vertes à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, très-distantes, longues de deux ou trois pouces, assez régulièrement & fortement crénelées à leur contour ; les crénelures obtuses, presque égales ; les feuilles terminales sessiles, plus courtes, presque rondes, presque acuminées ; les crénelures plus aiguës.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal, alongé, presque nu, composé de verticilles, contenant quatre à six fleurs presque sessiles, dont les calices sont courts, striés, velus, ciliés à leur orifice, qui se divise en deux lèvres obtuses, la supérieure plus courte, obtuse, l'inférieure un peu plus longue, bifide, terminée par deux dents aiguës, un peu mucronées. La corolle est petite, bleue ou blanchâtre, à peine plus longue que le calice.

Cette plante a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ignore son lieu natal. ☉ (V. f.)

61. SAUGE à feuilles d'ortie. *Salvia urticifolia*. Linn.

*Salvia foliis ovato-oblongis, duplicato serratis; calicibus tridentatis; laciniis summa tridentatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 62. n°. 6. — Gronov. Virgin. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 131. n°. 11.

*Salvia villosa-viscosa, foliis ovato-oblongis, dentatis, per petiolum decurrentibus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 261. n°. 93.

*Salvia foliis ovato-oblongis, dentatis; petiolis alatis*. Eding. de Salvia, n°. 23.

*Horminum minus, betonica folio, flore purpureo*. Pluken. Almag. pag. 119. tab. 420. fig. 1.

*Horminum virginianum, erectum, urticifolius, flore minore*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 395. §. 11. tab. 13. fig. 31.

*Salvia (urticifolia), foliis rhomboideo-ovalibus, utrinque acutis, inaequaliter serratis, subius crebro punctulosis; spica nudâ; verticillis remotis; calicibus puberulis, brevi tridentis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 15.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, glabres, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, presque rhomboida-

les, la plupart aiguës à leurs deux extrémités, un peu décurrentes sur la partie supérieure de leur pétiole, glabres, tides à leurs deux faces, marquées en dessous de petits points nombreux, entoncées, à double dentelures ou inégalement dentées à leurs bords, aiguës, un peu acuminées à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en un épi simple, droit, nu, alongé, composé de verticilles écartés, de six fleurs environ, munies de bractées petites, presque lancéolées, aiguës, plus courtes que les fleurs. Les calices sont courts, légèrement pubescens, visqueux, divisés en trois découpures à leur orifice. La corolle est petite, blanche ou bleuâtre, à deux lèvres inégales; la supérieure droite, obtuse, l'inférieure à trois lobes; le style plus long que la corolle, saillant hors de la lèvre supérieure.

Cette espèce croît dans les contrées occidentales de la Virginie & de la Caroline. ✕

62. SAUGE amplexicaule. *Salvia amplexicaulis*.

*Salvia foliis cordato-oblongis, duplicato-crenatis, subamplexicaulis; floribus spicatis, bracteis flore brevioribus*. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 68. n°. 188.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, semiamplexicaulis, inaequaliter crenatis; bracteis cordatis, acuminatis, calice brevioribus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 267. n°. 106.

Ses tiges sont droites, pileuses, garnies de feuilles oblongues, en cœur, à double crénelures, ou inégalement crénelées; les feuilles caulinaires à demi-amplexicaules, longues d'environ deux pouces, larges d'un pouce, ridées, légèrement velues lorsqu'elles sont vues à la loupe, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en épis à l'extrémité des rameaux & des tiges, réunies par verticilles distans, d'environ six fleurs; munies de bractées plus courtes que les fleurs. Les calices sont pileux, à deux lèvres; la lèvre supérieure obtuse, plus courte que l'inférieure. La corolle est petite, bleuâtre ou blanche.

Cette plante est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. On ignore son lieu natal. ✕ (V. v.)

63. SAUGE à feuilles de tilleul. *Salvia tiliaefolia*. Vahl.

• *Salvia foliis cordatis, petiolatis, aequaliter crenatis; spicis subsessilibus; corollis vix calice majoribus*. Lam. Ill. Genet. vol. 1. pag. 70. n°. 309.

*Salvia foliis cordatis, rugosis, crenato-aqualiter serratis, acutis; calicibus glabris-sessilibus, aristatis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 7.

*Salvia* (polythachia), *caule orgyali, tetragono; foliis ovato-acutis, inferni glaucis; spicis numerosis, terminalibus*. Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 17. n°. 25. tab. 27.—Ortega, Plant. Decad. 5. pag. 55.

Cette espèce, décrite par M. Vahl sous le nom de *salvia tilisifolia*, & dont on ignore le lieu natal, a été depuis envoyée au Jardin des Plantes de Paris, par M. Ortega, & y a été propagée par des semences recueillies au Jardin de Madrid; elle s'est trouvée la même que celle de M. Vahl. Il est évident que la plante nommée par M. Cavanilles *salvia polythachia*, est la même que celle de M. Vahl, ou du moins une variété qui en diffère très-peu.

Ses tiges sont droites, hautes de quatre à cinq pieds, presque glabres, quadrangulaires, à angles tranchants, divisées en rameaux opposés, légèrement velus, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales ou un peu en cœur vers leur base, aiguës à leur sommet, dentées en scie à leurs bords, molles, verdâtres à leur face supérieure, finement ridées, glauques en dessous, supportées par des pétioles munis de deux glandes à leur base.

Les fleurs sont disposées en plusieurs épis terminaux, opposés, presque fasciculés, dont les verticilles sont nombreux, très-peu distans, composés de quatre à six fleurs, quelquefois un peu unilatérales, munies de bractées caduques, courtes, étroites, presque linéaires, aiguës. Le calice est court, tubulé, velu, strié, comprimé latéralement; point glutineux, à deux lèvres courtes, la supérieure entière & pointue, l'inférieure médiocrement biffée. La corolle est petite, à peine aussi longue que le calice, de couleur rougeâtre ou bleue, dilatée à son orifice, à deux lèvres ouvertes; la lèvre supérieure presque droite, courte, concave, entière à son sommet; l'inférieure divisée en trois lobes, celui du milieu plus large, échancré; les deux latéraux très-petits; les étamines plus courtes que la corolle; le style un peu filant, velu à sa partie supérieure; deux stigmates très-courts.

Cette plante croît naturellement au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

#### 64. SAUGE à fleurs étalées. *Salvia patens*. Cav.

*Salvia foliis subhastatis, crenato-serratis, subtus incanis; floribus axillaribus terminalibusque oppositis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 236. n°. 31.

*Salvia foliis subhastatis, crenato-serratis; floribus oppositis*. Cavan. Icon. rar. vol. 5. pag. 33. n°. 505. tab. 454.

*Salvia grandiflora*. Née, Hort. cum Icone.

Ses tiges sont droites, velues, hautes d'environ

deux pieds, à quatre angles, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, presque linéaires, ctenellées, dentées en scie à leur contour, vertes en dessus, blanches & tomenteuses à leur face inférieure, presque obtuses à leur sommet; les inférieures longuement pétiolées; les supérieures & terminales presque sessiles; celles du milieu aussi longues que les pétioles.

Les fleurs, situées vers l'extrémité des rameaux, sont grandes, axillaires, foliaires, opposées, pédonculées; les pédoncules beaucoup plus courts que les feuilles. Le calice est campanulé, pileux, divisé en deux lèvres; la lèvre supérieure entière, très-velue; l'inférieure biffée. La corolle est fort belle, très-grande, bleuâtre; son tube se partage en deux lèvres très-ouvertes; la supérieure concave, allongée, pileuse extérieurement; l'inférieure pendante, à trois grandes divisions; les deux latérales obtuses, plus courtes; celle du milieu élargie, échancrée en cœur; les anthères longues, saillantes, ovales, jaunâtres; quatre ovaires enfoncés dans un réceptacle quadrangulaire; le style bleuâtre, plus long que la corolle, barbu vers son sommet; deux stigmates inégaux, divergens, auxquels succèdent quatre semences contenues dans le food du calice.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne, dans les lieux ombragés, proche *Real del Monte*; elle fleurit au mois d'août. (Description, ex Cavan.)

#### 65. SAUGE plumeuse. *Salvia plumosa*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis subcordato-ovatis, crenatis; pedunculis axillaribus, verticillatis; caule fruticoso, ferrugineo-subtomentoso*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 235. n°. 30.

*Salvia foliis subcordatis, acutis, crenatis; pedunculis 4-5, axillaribus, unifloris; stylo plumoso*. Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 26. tab. 37. fig. A.

Cette plante a des tiges hautes d'environ cinq à six pieds, droites, frutescentes, revêtues d'un duvet roussâtre, divisées en rameaux tétragones, opposés, lanugineux particulièrement dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, opposées, oblongues ou ovales, lancéolées, un peu en cœur à leur base, très-veinées, crenellées à leurs bords, aiguës à leur sommet, ridées, légèrement lanugineuses à leur face inférieure.

Les fleurs sont pédonculées, disposées par verticilles axillaires, chaque verticille composé de trois, quatre, plus souvent cinq fleurs, dont les pédoncules sont simples, cylindriques, uniflores, plus longs que les pétioles, munis d'autant de petites bractées subulées, quelquefois ovales. Le calice est tubulé, strié, rude en dedans, à deux divisions courtes, aiguës. La corolle est purpurine, velue en dehors, une fois plus longue que le ca-

H h h h 2

lice ; son tube est droit, cylindrique, divisé à son orifice en deux lèvres égales ; la supérieure droite, concave, échancrée à son sommet ; l'inférieure à trois lobes ; celui du milieu élargi, obtus, presque tronqué ; les deux latéraux plus courts, plus étroits, obtus. Les étamines plus courtes que la corolle ; le style plus long, de couleur purpurine, velu & plumeux.

Cette plante croît au Péron, sur les rochers & dans les ravins ; elle fleurit vers la fin de l'automne. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

66. SAUGE à feuilles deltoïdes. *Salvia regia*. Cavan.

*Salvia foliis deltoideis, crenatis ; pedunculis terminalibus, geminis, unifloris ; calicibus tubulosis, coloratis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 236. n°. 32.

*Salvia foliis deltoideis, crenatis ; calicibus tubulosis, coloratis.* Cavan. Icon. rar. vol. 3. pag. 33. n°. 506. tab. 455.

*Salvia.* Née, Herb. & Icon.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à six pieds, munies de rameaux opposés, & garnies de feuilles pétioles, opposées, de forme deltoïde, crénelées à leur contour, légèrement velues, particulièrement dans leur jeunesse, un peu aiguës à leur sommet, au moins aussi larges que longues, presque tronquées à leur base, plus courtes que les pétioles, nerveuses & veinées.

Les fleurs, situées dans l'aisselle des feuilles supérieures, sont opposées, solitaires, presque sessiles. Leur calice est long d'un demi-pouce & plus, d'un pourpre vibrant, tubulé, à trois découpures à son orifice ; les découpures ovales, aiguës, marquées de neuf nervures, veinées. La corolle est grande, d'une belle couleur écarlate ; son tube est ventru entre les divisions du calice, divisé en deux lèvres à son limbe ; la supérieure allongée, concave, échancrée à son sommet ; l'inférieure pendante, à trois lobes courts, arrondis, obtus ; celui du milieu un peu plus allongé, très-entier. Les stigmates sont d'un rouge écarlate.

Cette plante croît au Mexique, dans les basses de *Regla* ; elle fleurit dans le courant des mois d'août & de septembre. (*Descript. ex Cav.*)

67. SAUGE à longues fleurs. *Salvia longiflora*. Ruiz & Pav.

*Salvia pubescenti-viscosa, foliis cordatis, acutis, bicrenatis ; racemis nutantibus, corollis longissimis, caule fruticoso.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 243. n°. 48.

*Salvia foliis cordatis, acutifimis, bicrenatis ; spicis longis, nutantibus ; bracteis, calicibus coloratis ;*

*corollis longissimis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 23. tab. 40. fig. A.

Très-belle espèce, facile à distinguer par ses corolles tubulées, longues de plusieurs pouces, disposées sur des épis allongés & inclinés.

Toute la plante est pubescente, visqueuse ; ses tiges sont droites, hautes de quinze à dix-huit pieds, très-rameuses, chargées de poils, les uns très-longs, setacés, articulés, les autres plus courts, glanduleux ; les rameaux étalés, nombreux, quadrangulaires, très-ouverts, visqueux & pubescents, garnis de feuilles pétioles, opposées, ovales, lancéolées, acuminées à leur sommet, très-longues, ouvertes & réfléchies, à double crénelure à leur contour, échancrées en cœur à leur base, ridées, veinées en dessous, velues, tomenteuses, supportées par des pétioles pubescents & visqueux.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des rameaux, en plusieurs épis allongés & penchés ; disposées par verticilles, soutenues par des pédoncules cylindriques, inégaux, une fois plus courts que les calices ; chaque verticille contient d'une à quatre fleurs, munies de deux bractées opposées, ovales, aiguës, concaves, colorées & caduques. Les calices sont ovales, renflés, colorés, divisés en deux lèvres vers leur sommet ; la lèvre inférieure bifi-  
de sa supériorité entière, aiguë. La corolle est de couleur de laque, environ cinq fois plus longue que le calice, tubulée, cylindrique, velue en dehors, divisée à son orifice en deux lèvres ; la supérieure entière & courbée en faux ; l'inférieure courte, à trois lobes ; celui du milieu concave ; les étamines de la même longueur que la corolle ; une glande renflée, située sur le réceptacle, du même côté que la lèvre supérieure.

Cette plante croît au Péron, dans les gorges des précipices ; elle fleurit dans les premiers mois de l'hiver. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

68. SAUGE léonoroïde. *Salvia leonoroïdes*. Glox.

*Salvia foliis subcordatis, crenulatis, crassifolius ; floribus axillaribus, calice trilobo, caule frutescente.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 71. n°. 312. tab. 20. fig. 3.

*Salvia calicis labio superiore integerrimo ; stylo bifarium barbato ; floribus axillaribus, interruptis verticillatis ; foliis cordato-ovatis, crenatis.* Glox. in Obs. botan. pag. 15. tab. 2.

*Salvia (formosa), foliis subcordatis, corollarum galeâ barbata ; calicibus trilobis, caule frutescente.* L'herit. Stirp. 1. pag. 41. tab. 21.

*Salvia (nodosa), foliis cordatis ; superioribus ovatis, deltoideis ; inferioribus serratis ; pedunculis axillaribus, nodosis ; galeâ bifidâ.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 23. tab. 41. fig. A.

*Salvia* (leonoroides), *foliis cordatis, crenatis; floribus axillaribus, verticillatis; caule fruticoso*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 236. n° 33.

C'est un sous-arbrisseau remarquable par ses fleurs d'une belle couleur écarlate, semblables à celles du *Salvia coccinea*, mais axillaires & non disposées en un épi nu.

Ses tiges sont ligneuses, un peu cylindriques à leur base, tétragones à leur partie supérieure, dont les angles sont arrondis, les faces cannelées, un peu pubescentes, rameuses, hautes de trois à quatre pieds, garnies de feuilles petiolées, opposées, ovales, échancrées largement en cœur à leur base, épaisses, un peu coriaces, lisses à leurs deux faces, d'un vert-foncé à leur face supérieure, presque cendrées en dessous, crénelées à leur contour, obtuses & rétrécies à leur sommet; les pétioles d'environ un tiers plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées par verticilles opposés, au nombre de cinq à six dans chaque aisselle des feuilles, souvenues chacune par des pédoncules courts, glabres, longs de trois lignes & plus. Les calices sont amples, renflés, très-glabres, striés, un peu comprimés, à deux lèvres entières, arrondies à leur sommet, un peu mucronées; la lèvre inférieure quelquefois légèrement bifide. La corolle est d'une belle couleur écarlate, grande, ayant presque l'aspect de celle du *phlomis leonurus*, longue d'environ un pouce; le tube plus long que le calice, un peu renflé vers son milieu; l'orifice divisé en deux lèvres; la supérieure droite, comprimée, obtuse, légèrement bifide; la lèvre inférieure repliée à ses côtés, recourbée vers son extrémité, à trois divisions courtes, un peu inégales; les étamines plus courtes que la corolle, le style saillant hors de la lèvre supérieure, velu vers son sommet; le stigmate bifide.

Cette plante croît au Pérou; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. T. (V.v.)

#### 69. SAUGE luisante. *Solvia fulgens*. Cavan.

*Salvia foliis ovato-ovatis, cordatis, crenatis, rugosis; floribus verticillatis, fulgidis*. Cavan. Icon. vol. 1. pag. 15. n° 21. tab. 23.

*Salvia foliis cordatis, acutis, crenatis, rugosis, subtus tomentosis; verticillis nudis, calicibus trifidis, corollaram calicis villosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. n° 40.

*Salvia foliis cordato-ovatis, crenatis, subtus incanis; corollaram calicis villosis, caule herbaceo*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 237. n° 34.

*Salvia pyrifolia*. Dombey, Mff.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec le *Salvia leonoroides*, dont elle diffère, cette dernière ayant des tiges dures, presque ligneuses; des

feuilles glabres, un peu coriaces; des fleurs plus petites, moins éclatantes.

Ses tiges sont un peu rudes, quadrangulaires, tordues, hautes de trois pieds, divisées en rameaux opposés, droits, étalés, garnis de feuilles petiolées, opposées, presque égales, ovales, échancrées en cœur à leur base, aiguës à leur sommet, crénelées à leurs bords, ridées à leurs deux faces, tomenteuses à leur face inférieure, supportées par des pétioles canaliculés.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, composés de verticilles à six fleurs, garnis de stipules courtes, aiguës, très-caduques. Le calice est campanulé, à deux lèvres, glabre, strié; la lèvre supérieure entière, ovale, mucronée; l'inférieure bifide à son sommet. La corolle est longue d'un pouce & demi, d'une couleur écarlate très-brillante, plus claire en dedans; le tube est renflé vers son orifice, un peu comprimé; la lèvre supérieure longue, concave, entière, velue à son sommet; l'inférieure tridentée, les deux coupures latérales plus courtes, réfléchies; celle du milieu plus large, plissée, à trois crénelures; les filets sont une fois plus courts que la corolle; les anthères ovales, blanchâtres; les ovaires placés sur un réceptacle quadrangulaire, garni à sa partie antérieure d'une membrane aiguë, qui recouvre deux des ovaires. Le style est simple, élargi, comprimé à son sommet, barbu, terminé par deux stigmates saillants, de couleur incarnate, réfléchis; les semences en ovale renversé.

Cette espèce se trouve au Mexique & dans le Pérou. T.

#### 70. SAUGE écarlate. *Salvia coccinea*. Linn. f.

*Salvia foliis cordatis, acutis, serratis, subtus tomentosis; racemo terminali, flaminibus foliorum longioribus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 71. n° 315.

*Salvia (coccinea), foliis cordatis, ovatis, acutis, serratis, subtus mollissimè tomentosis; racemo terminali verticillato*. Linn. f. Suppl. 88. — Murr. Comment. Goert. 1778. pag. 86. tab. 1.

*Salvia foliis cordatis, acutis, tomentosis, serratis; corollis calice duplo longioribus, ovato-obovatis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 45. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n° 44.

*Salvia foliis cordatis, acutis, serratis; verticillis subnudis*. Etling. de *Salvia*, n° 11.

*Solvia (coccinea), suffruticosa; foliis ovali-cordatis, acutis, denticulatis, molliter incano-tomentosis; spica verticillis subnudis; calice oblongo, trifido; corollâ longâ, genitalibus exsertis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 15.

Cette plante, très-approchée par son port, du

*salvia amethystina*, en diffère par la couleur écarlate de ses fleurs, & par la longueur des étamines saillantes hors de la corolle.

C'est une très-belle espèce, dont les tiges sont droites, hautes de deux ou trois pieds & plus, tétragones, pubescentes, blanchâtres ou cendrées, cannelées à chacune de leur face, tameuses, presque ligneuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, en cœur, acuminées à leur sommet, un peu épaisses, souples, vertes, & légèrement pubescentes à leur face supérieure, douces, tomenteuses, blanchâtres en dessous, crénelées à leur contour, supportées par des pétioles médiocres, étroits, comprimés.

Les fleurs forment un très-bel épi droit, alongé, simple, terminal, composé de verticilles peu distans, contenant six ou huit fleurs pédonculées, munies de bractées opposées, étroites, lancéolées, acuminées, plus courtes que les pédoncules, presque glabres; les pédoncules inégaux, presque aussi longs que les calices, pubescens, blanchâtres. Les calices sont un peu velus, légèrement colorés à leur sommet, divisés en deux lèvres courtes; la supérieure entière, ovale; l'inférieure bifide, presque aussi longue que la supérieure. La corolle est d'un rouge d'écarlate très-vif; le tube presque une fois plus long que le calice, renflé vers son orifice, divisé en deux lèvres presque égales; la supérieure un peu pubescente sur le dos, l'inférieure à trois lobes; les étamines & le pistil saillans hors de la corolle.

Cette plante croît naturellement dans la Floride. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. v.)

71. SAUGE scarlatine. *Salvia pseudo-coccinea*. Jacq.

*Salvia pilosa, foliis ovatis, acutis, crenatis; racemo terminali, flaminibus cæspitis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 71. n°. 316.

*Salvia foliis ovatis, acutis, serratis, utrinque villosa; caule piloso*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 136. n°. 36.

*Salvia foliis ovatis, acutis, serratis, utrinque villosa; racemo terminali, verticillato; caule piloso*. Jacq. Collect. vol. 2. pag. 302. — Ic. rar. vol. 2. tab. 209.

*Salvia (pseudo-coccinea). foliis ovatis, acutis, serratis, basi inaequalibus; caule piloso, corollis calice duplo longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n°. 45.

Cette espèce a de tels rapports avec le *salvia coccinea*, qu'il est facile de les confondre au premier aspect; mais elle en diffère par ses feuilles ovales, point sinuées à leur base, chargées de poils fins & alongés.

Ses tiges sont presque ligneuses, droites, rameuses, quadrangulaires, remplies d'une moëlle blanchâtre, hautes d'environ trois pieds, de la grosseur d'une plume ordinaire, chargées de poils mous, longs, cendrés, très-abondans.

Les feuilles sont opposées, longuement pétiolées, ovales, un peu alongées vers leur pétiole, dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, veinées, molles, velues à leurs deux faces, supportées par des pétioles pileux.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, disposées par des verticilles, dont chacun d'eux est composé de six fleurs légèrement pédonculées. Les calices sont un peu plus grands que ceux du *salvia coccinea*; mais la corolle & les autres parties de la fructification n'offrent aucune différence sensible.

Cette plante croît dans les contrées chaudes de l'Amérique; elle fleurit, dans le courant de l'été, dans les terres de l'Europe. h ? (Describe. ex Jacq.)

72. SAUGE à petits calices. *Salvia microcalis*.

*Salvia foliis ovatis, acutis, serratis, glabrisculis; bracteis ovato-lanceolatis, caducis; calicibus brevissimis, quinque-dentatis*.

*Salvia (incarnata), foliis ovato-acutis, serratis; bracteis floralibus brevibus, caducis; calicibus parvis, quinque-dentatis*. Cavan. Annal. Hist. Nat. 2. n°. 4. pag. 112.

*Salvia incarnata*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 238. n°. 37.

Cette espèce est remarquable par le grand nombre & la beauté de ses fleurs, distinguée, de toutes les autres de ce genre, par ses calices extrêmement petits, à cinq dents.

Ses tiges sont droites, glabres, purpurines, hautes de quatre pieds, munies de rameaux nombreux, pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles pétiolées, veinées, d'un vert obscur à leur face supérieure, plus pâles en dessous, un peu velues, ovales, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet, plus longues que les pétioles.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en épis droits, longs d'un demi-pied, composées de verticilles à quatre fleurs médiocrement pédonculées. Le calice est tubulé, velu, extrêmement court, à peine long d'une demi-ligne, à deux lèvres, à cinq ou six dents aiguës. La corolle est de couleur de chair, longue de plus d'un pouce, un peu velue à l'extérieur, divisée en deux lèvres égales; la supérieure entière; les étamines plus longues que la corolle.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Espagne,



où on la cultive comme plante d'ornement. (*Descript. ex Cavan.*)

73. SAUGE améthyste. *Salvia amethystina*. Smith.

*Salvia foliis cordatis, acutis, serratis, subtus lanatis; verticillis nudis; calicibus trifidis; corollis pubescentibus*. Smith, Icon. ined. Fasc. 2. pag. 27. tab. 27. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. p. 71. n°. 314. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. n°. 39.

Ses tiges sont droites, velues, presque ligneuses, tétragones, à angles mousses, garnies de feuilles opposées, pétioles, ovales-oblongues, échancrées en cœur à leur base, ridées, dentées en scie à leurs bords, les dents courtes, très-ferrées, obtuses, à peine aiguës à leur sommet, vertes & velues à leur face supérieure, blanchâtres & chargées en dessous d'un duvet lanugineux très-épais; les pétioles velus, de la longueur des feuilles, anguleux.

Les fleurs sont disposées en une sorte de grappe ou en un épi terminal, allongé, un peu recourbé à son sommet, composé de verticilles écartés, dépourvus de bractées, contenant chacun environ six fleurs soutenues par des pédoncules inégaux, ouverts, de la longueur du calice au moins, cylindriques, velus. Le calice est campanulé, velu, anguleux, coloré à son sommet, rude en dedans, divisé en deux lèvres à son orifice; la supérieure entière, aiguë, terminée par une pointe recourbée en dedans; l'inférieure bifide. La corolle est d'un violet très-vif, une fois plus longue que le calice, rubulée, labiée à son limbe; la lèvre supérieure oblongue, presque droite, concave, fortement velue sur le dos, entière, obtuse; l'inférieure pubescente, à trois lobes; les étamines plus courtes que la corolle; le style saillant, recourbé, velu & violet à sa partie supérieure; le stigmate bifide, à deux découpures glabres, ouvertes, aiguës; quatre semences glabres, ovales.

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade. (*Descript. ex Smith.*)

74. SAUGE à fleurs tubulées. *Salvia tubiflora*. Smith.

*Salvia foliis cordatis, crenatis, subpilosis; calicibus trifidis; corollis longissimis, tubulosis; flaminibus exsertis*. Smith, Icon. ined. Fasc. 2. pag. 26. tab. 26. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n°. 42.

*Salvia foliis cordatis, crenatis, subpilosis; floribus racemosis, secundis, subgeminatis; pedicellis calicibusque lanatis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 239. n°. 40.

Ses tiges sont presque ligneuses, à quatre faces, striées, velues à leur partie supérieure, garnies de feuilles périolées, opposées, ovales, échancrées en cœur à leur base, encadrées à leur contour, un peu glabres à leur face supérieure, vertes,

plus pâles en dessous, velues à leurs bords & sur leurs principales nervures, supportées par des pétioles velus, plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont disposées en un épi droit, terminal, composé de verticilles à environ deux fleurs, munit de bractées opposées, ovales, mucronées, nerveuses, chargées de quelques poils, très-caduques; les pédoncules filiformes, plus courts que le calice, très-lanugineux, tournés du même côté. Le calice est tubulé, un peu ventru, lanugineux en dehors, rude en dedans, à trois découpures aiguës, presque égales. La corolle est trois fois plus longue que le calice, de couleur rouge-écarlate, tubulée, velue en dehors, bifide à son limbe; les découpures presque égales, médiocrement écartées; les étamines glabres, très-longues, les anthères pendantes.

Cette plante croît au Pérou, dans les environs de Lima.

75. SAUGE à deux fleurs. *Salvia biflora*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis cordatis, serratis, tomentosis; floribus racemosis, oppositis, secundis; bracteis ovato-lanceolatis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 241. n°. 45.

*Salvia (biflora), foliis cordatis, serratis, tomentosis; spicis erectis; floribus secundis, binis*. Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 24. tab. 38. fig. A.

Cette plante me paroît avoir beaucoup de rapports avec le *salvia tubiflora*. Ses tiges sont presque ligneuses, droites, hautes de deux pieds, très-velues, garnies de feuilles pétioles, en cœur, profondément dentées en scie à leurs bords, très-veinées en dessous; les dentelures terminées par une petite pointe courte.

Les fleurs forment une grappe terminale, haute d'environ six pouces, garnies de bractées nerveuses, aiguës & caduques. Le calice est tubulé, un peu ventru, à trois découpures, velu, à douze nervures, rude en dedans. La corolle est tubulée, de couleur écarlate, velue en dehors; la lèvre supérieure plus allongée, la lèvre inférieure à trois découpures, celle du milieu concave.

Cette plante croît au Pérou. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

76. SAUGE acuminée. *Salvia acuminata*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis cordatis, serratis, acuminatis; spicis terminalibus, floribus verticillatis, corollâ calice duplo longiori*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 24. tab. 37. fig. B.

*Salvia acuminata, hirsuta, viscosa; foliis cordatis, acutis serratis, attenuatis, rugosis; bracteis coloratis, longitudine calicis*. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 243.

Cette plante a des tiges droites, hautes de cinq à six pieds, cannelées, quadrangulaires, garnies de poils visqueux, & divilées en rameaux très-étalés, chargés de feuilles opposées, longuement pétioles, amples, très-ouvertes, ovales, fortement échanquées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, dentées en scie à leur contour; les dentelures très-aiguës, ridées & veinées à leur face inférieure.

Les fleurs sont pédonculées, disposées en longs épis droits, terminaux; réunis par verticilles, au nombre de six à dix à chaque verticille; garnis de bractées oblongues, ovales, acuminées, opposées, de couleur de chair, caduques, aussi longues que les calices. Ceux-ci sont tubulés, nerveux, divisés à leur orifice en deux lèvres, la supérieure entière, aiguë; l'inférieure à deux découpures aiguës. La corolle est de couleur incarnate, une fois plus longue que le calice; son tube est cylindrique, divisé en deux lèvres, la supérieure droite & concave, l'inférieure à trois lobes, celui du milieu élargi à son sommet, & quelquefois un peu échanqué; les deux latéraux plus courts, obtus, arrondis; les étamines aussi longues que la corolle; le stigmate saillant, plus long que les étamines.

Cette plante se rencontre au Pérou, sur le bord des précipices; à Pillao. Elle fleurit dans l'été. *γ* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

77. SAUGE pileuse. *Salvia pilosa*. Vahl.

*Salvia foliis cordatis, obtusis, serratis, utrinque racemisque pilosis; bracteis linearilanceolatis, pedicellis brevioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 240. n°. 43.

Cette plante a de grands rapports avec le *salvia rhombifolia*.

Ses tiges sont droites, herbacées, bifides à leur partie supérieure, chargées de poils rares, garnis de feuilles médiocrement pétioles, très-distantes, en cœur, longues d'un pouce & plus, à dentelures obtuses, nerveuses en dessus, blanchâtres sur leurs nervures, veinées & plus pâles en dessous, chargées à leurs deux faces de poils rares.

Les fleurs sont disposées en grappes situées à l'extrémité des rameaux & dans leur bifurcation, composées de verticilles de trois à huit fleurs droites, dont les pédoncules sont pileux, ainsi que les calices, longs à peine de six lignes. Le calice est nerveux, de la longueur des pédoncules, à trois découpures ovales, aiguës. La corolle est un peu plus longue que le calice; la lèvre supérieure est pileuse, en calque, un peu courbée, & un peu plus courte que la pilule. Les semences sont glabres, veinées lorsqu'on les examine à la loupe.

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dombey. *γ*? (*V. f. in herb. Juss.*)

78. SAUGE cuspidée. *Salvia cuspidata*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis cordatis, inaequaliter serratis, subula punctatis; verticillis remotis, labiis calicinis tricuspidatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 240. n°. 41.

*Salvia foliis cordato-sagittatis, inaequaliter serratis; spicis longis; verticillis multifloris, remotis; calicibus cuspidatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 23. tab. 40. fig. B.

Ses tiges sont droites, presque ligneuses, hautes d'environ six pieds, obtusément quadrangulaires, munies de rameaux opposés, tétragones, pubescents ou chargés de poils blanchâtres, ramales en petites touffes. Les feuilles sont opposées, médiocrement pétioles, ovales, oblongues, en cœur à leur base, presque sagittées, ridées, veinées, inégalement dentées à leurs bords, aiguës à leur sommet, arrondies à leurs angles inférieurs, chargées en dessous de très-petits points.

Les fleurs sont disposées par verticilles distans, sur un épi terminal, ramifié; celui du milieu très-alongé; chaque verticille composé de six à dix fleurs médiocrement pédonculées, munies de bractées ovales, acuminées, concaves, caduques, ponctuées. Le calice est d'un bleu-foncé, divisé en deux lèvres ponctuées, velues en dehors; la lèvre supérieure tricuspidée, la pointe du milieu plus longue, la lèvre inférieure bifide & acuminée. La corolle est bléâtre, une fois plus longue que le calice.

Cette plante croît au Pérou, sur les collines de Cheuchin; elle fleurit au commencement du printemps. *γ* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

79. SAUGE à feuilles aiguës. *Salvia acutifolia*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis cordato-oblongis, obtuse serratis, utrinque tomentosis; caule fruticoso, floribus secundis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 240. n°. 42.

*Salvia foliis cordatis, acutis, obtuse serratis; spicis verticillatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 24. tab. 38. fig. B.

Ses tiges sont presque ligneuses, hautes d'environ six pieds, droites, à quatre angles mousses, divisées en rameaux tomenteux, opposés, tétragones, creusées en gouttière, garnies de feuilles pétioles, opposées, ovales, oblongues, aiguës, échanquées en cœur à leur base, à crénelures quelquefois doubles, très-ferrées, obtuses, tomenteuses à leurs deux faces, fortement ridées à leur face supérieure, veinées.

Les fleurs sont verticillées, très-approchées, médiocrement

modièquement pétiolées, un peu latérales, de six à douze à chaque verticille, formant un épi terminal, garni de bractées opposées, ovales, lancéolées, creusées en gaine, aiguës à leur sommet, tomenteuses. Le calice est tomenteux, rude en dedans, divisé à son orifice en deux lèvres égales, la supérieure entière, l'inférieure bifide. La corolle est purpurine, une fois plus longue que le calice, tubulée à sa partie inférieure, ouverte à son orifice en deux lèvres presque égales; la supérieure droite, concave; l'inférieure à trois lobes; celui du milieu large, presque orbiculaire, échancré à son sommet; les deux latéraux fort courts, aigus; les étamines un peu plus longues que la corolle; le stigmate bifide, velu, saillant.

Cette plante croît au Pérou, dans les prés humides; elle fleurit au commencement du printemps. Les habitants lui donnent le nom de *faccacha*. *h* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

80. SAUGE incisée. *Salvia incisa*. Ruiz & Pav.

*Salvia hirsuta, viscosa, foliis cordatis, ovatis, obtusis, serratis, racemosa, supra asperis; racemis natis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 241. n°. 44.

*Salvia foliis cordatis, obtusis, basi inaequalibus, serratis; spicis natis; floribus oppositis, binis verticillatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 25. tab. 36. fig. A.

C'est une plante herbacée, dont les tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, munies de poils glanduleux & visqueux; divisées en rameaux quadrangulaires, effilés, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, oblongues, en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour; les dentelures obtuses, un peu mucronées, très-veinées, rudes à leur face supérieure, velues en dessous, la plupart inégalement incisées à leur base.

Les fleurs forment de très-longes épis terminaux, un peu inclinés à leur sommet, médiocrement pédonculées, très-souvent au nombre de deux, opposées, quelquefois réunies quatre, cinq ou six par verticilles presque unilatéraux; munies de deux bractées lancéolées, concaves, caduques, colorées. Les calices sont courts, tubulés, marqués d'une à deux fentes, divisés en deux lèvres aiguës; la supérieure entière, l'inférieure bifide. La corolle est d'une belle couleur écarlate, velue en dehors, presque trois fois plus longue que le calice, ouverte en deux lèvres; la supérieure droite, entière, concave; l'inférieure plus courte, à trois lobes courts, presque égaux; celui du milieu concave; les étamines saillantes hors de la corolle; le style de la même longueur que les étamines.

Cette plante croît sur les montagnes sablonneuses  
Botanique, Tome VI,

du Pérou, à Lomas, où elle fleurit dans le courant de l'été. (Descript. ex Ruiz & Pav.)

81. SAUGE à grappes. *Salvia racemosa*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis cordato-sublanceolatis, serratis; racemis terminalibus, compoitis; bracteis ovatis, acuminatis.* Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 244. n°. 50.

*Salvia foliis cordatis, acutis, sublanceolatis, serratis; racemis terminalibus, compoitis; bracteis ovatis, acuminatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 25.

Cette espèce est velue, presque ligneuse. Ses tiges sont droites, nues à leur partie inférieure, rameuses, presque cylindriques; les rameaux opposés, étalés, à quatre angles, garnis de feuilles opposées, longuement pétiolées, ovales-lancéolées, en cœur à leur base, dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, velues, marquées de taches livides, quelquefois purpurines.

Les fleurs forment des grappes terminales, composées de plusieurs épis ramifiés; elles sont verticillées, médiocrement pédonculées, entièrement recouvertes, avant leur épanouissement, par des bractées ovales, acuminées, caduques. La corolle est d'un bleu-foncé.

Cette plante croît au Pérou, dans les décombres & sur le bord des chemins; elle fleurit dans l'hiver. *h* (Descript. ex Ruiz & Pav.)

82. SAUGE à fleurs de rose. *Salvia rosea*. Vahl.

*Salvia foliis ovatis, glabris, obtuse serratis; verticillis racemosis; corollarum galea labio inferiore, brevior.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 244. n°. 51.

Ses tiges se divisent en rameaux grêles, légèrement velus, à quatre angles tranchants; garnies de feuilles pétiolées, ovales, longues d'un pouce, dentées en scie à leur contour, obtuses à leur sommet ou un peu aiguës, très-entières à leur base, à peine veinées, glabres à leurs deux faces, soutenues par des pétioles filiformes, de la longueur des feuilles.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, longues d'environ trois pouces, composées de verticilles distants; les inférieurs d'environ six fleurs; les supérieurs de deux; les pédoncules pubescents & visqueux, garnis de bractées fort petites, caduques, linéaires. Les calices sont presque campanulés, nerveux, légèrement pubescents, à deux lèvres; la supérieure ovale, entière; l'inférieure bifide, à deux dents aiguës. La corolle est purpurine, à peine pubescente, quatre fois plus longue que le calice. Sa lèvre supérieure est linéaire, échancrée; l'inférieure à trois découpures; celle

du milieu plus longue & plus large; les étamines saillantes hors de la lèvre supérieure.

Cette plante croît dans les Indes orientales; elle est cultivée à Tranguabar, dans le Jardin des Missionnaires. *Th* (*Descript. ex Vahl.*)

83. SAUGE à fleurs opposées. *Salvia oppositiflora*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis ovatis, crenatis, rugosis; spicis terminalibus, floribus oppositis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 26. tab. 43. fig. A.

*Salvia (grata), foliis ovatis, serratis, rugosis, obtusis; racemis terminalibus, floribus oppositis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 241. n°. 52.

C'est une plante d'une odeur très-agréable, presque frutescente, dont les tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, divisées en rameaux quadrangulaires, opposés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, ridées, crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet ou un peu aiguës.

Les fleurs forment des épis simples, terminaux, sur lesquels elles sont simplement opposées, foliaires, pédonculées. Leur calice est divisé en deux lèvres aiguës, la supérieure entière, l'inférieure bifide. La corolle est tubulée, quatre fois plus longue que le calice, d'une belle couleur écarlate; sa lèvre supérieure très-droite; l'inférieure beaucoup plus courte, à trois lobes entiers, arrondis, presque égaux; les étamines saillantes; le pistil plus long que les étamines.

Cette plante croît au Pérou, dans les environs de la ville de Tarma, sur les lieux arides & élevés; elle fleurit dans le printemps & l'été. Les naturels du pays la nomment *chenschelcoma*. *Th* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

84. SAUGE douce. *Salvia mitis*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis ovatis, acutis, serratis, tomentosis; spicis terminalibus, intermediis longiori, aphyllis; verticillis multifloris*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 27.

*Salvia foliis ovatis, acutis, serratis, tomentosis, subulis incanis; verticillis racemosis, secundis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 245. n°. 53.

C'est une plante presque ligneuse, dont les tiges sont droites, hautes de deux pieds; les rameaux opposés, ouverts, tétragones, légèrement pubescents, doux au toucher. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, tomenteuses à leurs deux faces, blanches en dessous, dentées en scie à leurs bords, ridées, fortement veinées, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux; celui du milieu beaucoup plus long & dépourvu

de feuilles; les verticilles latéraux, pédicellés, composés de six à douze fleurs, munis de bractées opposées, ovales, acuminées, pubescentes & caduques; les calices médiocrement campanulés, pubescents, marqués d'une ou deux nervures, divisés à leur orifice en deux lèvres; la supérieure plus courte, entière, aiguë, un peu courbée; l'inférieure à deux divisions aiguës.

La corolle est blanche, avec une teinte légère de bleu; un peu plus longue que le calice, pubescente en dehors, partagée en deux lèvres à son orifice. Les étamines sont aussi longues que la corolle; le style velu à sa partie supérieure; le stigmate saillant; les semences de couleur roussâtre, à trois faces, veinées, renfermées dans le calice.

Cette plante croît au Pérou, dans les gorges des montagnes; elle fleurit une partie de l'hiver. *Th* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

85. SAUGE à long tube. *Salvia tubifera*. Cavan.

*Salvia foliis ovatis, serratis, subtus canescens; corollarum tubo elongato, villosa*. Vahl, Enum. Pl. vol. 1. pag. 245. n°. 54.

*Salvia (longiflora), foliis ovatis, acutis, serratis, pubescentibus; calicibus trifidis; corollis longissimis, tubulosis, pubescentibus; filamentis longiusculis corollae*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. n°. 43.

*Salvia (tubifera), foliis ovatis, acutis, serratis, mollibus; floribus spicatis, erectis; tubo longissimo*. Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 16. n°. 23. tab. 25.

Cette plante a de grands rapports avec la *salvia tubiflora*; elle en diffère par ses feuilles molles, ovales; par ses corolles plus étroites, pubescentes, la lèvre inférieure réfléchie, & par les étamines plus courtes.

Les tiges sont droites, quadrangulaires, presque hautes de cinq à six pieds, rameuses, garnies de feuilles opposées, ovales, aiguës, molles, dentées en scie à leurs bords, plusieurs fois plus longues que leur pétiole.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, par verticilles composés de six fleurs. Leur calice est court, strié, à deux lèvres; la supérieure entière, ovale, mucronée; l'inférieure légèrement bifide; la corolle velue, de couleur écarlate, dont le tube est grêle, cylindrique, long d'un pouce, droit, divisé en deux lèvres; la supérieure entière, en forme de voûte à son sommet; l'inférieure à trois déconures réfléchies; celle du milieu un peu plus longue.

Cette plante croît dans le royaume du Mexique. *Th*

86. SAUGE papilionacée. *Salvia papilionacea*. Cavan.

*Salvia foliis ovato-lanceolatis, serratis, utrinque acutis; corollarum limbo quadrifido.* Cavan. Icon. rar. vol. 4. pag. 9. n°. 384. tab. 319.

*Salvia (nidiifolia), foliis ovatis, utrinque acutis, nitidis; verticillis 12-30 floris; corolla laciniiis lateralibus revolutis.* Orteg. Decad. pag. 53.

*Salvia (papilionacea), foliis subrhombéo-ovatis, serratis; labio inferiore dependente, unipartito; laciniiis lateralibus revolutis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 245. n°. 55.

Ses tiges sont droites, quadrangulaires, hautes d'environ un pied & demi, divisées en rameaux opposés, légèrement tomenteux, garnis de feuilles opposées, pétioles, ovales-lanceolées, dentées en scie à leurs bords, aiguës à leurs deux extrémités, d'un vert-foncé à leur face supérieure, blanchâtres & légèrement pubescentes à leur face inférieure, supportées par des pédoncules médiocres.

Les fleurs, disposées par verticilles, forment un épi terminal; elles ont au nombre de six à chaque verticille, munies à leur base de deux bractées courtes & caduques. Leur calice est oblong, jaunâtre, à deux lèvres; la lèvre supérieure ovale, acuminée; l'inférieure bifide à son sommet. La corolle est d'un bleu-foncé, longue d'un pouce & demi, labiée; la lèvre supérieure entière, creusée en voûte, tomenteuse en dehors; l'inférieure pendante, ovale-oblongue, à trois découpures; celle du milieu échancrée; deux autres découpures plus petites, linéaires, proche l'orifice, souvent étendues en aile de papillon; deux filaments libres à leur base, rapprochés, insérés vers l'orifice de la corolle par deux petits filers courts; un style plus long que la corolle, barbu sur deux tangs vers son sommet; le stigmate bifide & bleuâtre.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne, & se cultive au Jardin royal des Plantes de Madrid. 2.

*Observations.* Plusieurs fleurs sont quelquefois dépourvues des deux petites découpures en aile de papillon. M. Cavanilles a observé de plus que, dans quelques fleurs, il y avoit quatre étamines. (Cavan. L. c.)

#### 87. SAUGE du Mexique. *Salvia mexicana*. Linn.

*Salvia foliis ovatis, utrinque acuminatis, serratis; spiciis laciniiis, caule albissimo.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 71. n°. 311.

*Salvia foliis ovatis, utrinque acuminatis, serratis; petiolis basi externis biglandulosis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 67. n°. 21. — Cavan. Icon. rar. vol. 1. pag. 16. n°. 24. tab. 26.

*Salvia foliis ovatis, utrinque acuminatis, serratis.* Hort. Cliffort. 13. — Royen, Lugd. Bat. 308. —

Eding. de *Salvia*, 35. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 140. n°. 38.

*Salvia foliis subrhombéo-ovatis, serratis, nervosis, foliis mollissimis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 246. n°. 56.

*Sclarea mexicana, eliffima, facie heliotropii.* Dillen, Eltham. pag. 339. tab. 254 fig. 350.

*Jungia.* Heist. Præf. ad Epist. Burkh. 92. tab. 1.

C'est une plante d'un beau port, qui approche du *salvia hispanica*, qui en diffère par la disposition de ses épis à verticilles interrompus, point imbriqués, & dont la corolle est beaucoup plus grande.

Ses tiges sont épaisses, hautes de cinq à six pieds, tétragones, à quatre sillons très-profonds, à angles moules; blanchâtres, pubescentes, rameuses, garnies de feuilles pétioles, opposées, molles, ovales, longues de trois pouces, légèrement dentées en scie à leurs bords, aiguës à leur sommet & même fort souvent à leur base, blanchâtres à leur face inférieure; les pétioles plus courts que les feuilles, munis de deux glandes à leur base.

Les fleurs sont disposées en épis allongés, touffus, simples, droits, composés de verticilles peu distans, interrompus, de six à huit fleurs pédonculées. Les calices sont glabres, striés, tubulés, ouverts en deux lèvres à leur orifice; la lèvre supérieure entière; l'inférieure bifide, à deux dents subulées. La corolle est d'un bleu-foncé, beaucoup plus longue que le calice, à deux lèvres; la supérieure droite, pubescente à son sommet; l'inférieure à trois lobes obtus; les deux latéraux plus courts, plus petits; celui du milieu large, échancré; le style plus long que la corolle, velu à sa partie supérieure.

Cette plante croît au Mexique, dans les lieux humides.

#### 88. SAUGE coiffée. *Salvia involucrata*. Cav.

*Salvia foliis ovato-lanceolatis, serratis; floribus spicatis, terminalibus; bracteis maximis, coloratis.* Cavan. Icon. rar. vol. 2. pag. 3. n°. 114. tab. 105. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 147. n°. 62.

*Salvia foliis ovatis, serratis, glabris; bracteis coloratis, maximis; corollarum tubo superne ventricoso.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 246. n°. 57.

C'est une des plus belles espèces de ce genre, remarquable par le nombre & la grandeur de ses fleurs, par l'élégance de ses grandes bractées de couleur de rose, par la longueur du tube de la corolle, par ses épis touffus, allongés.

Ses tiges sont glabres, hautes de trois ou quatre pieds, tétragones, divisées en rameaux opposés,

alngés, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, médiocrement aiguës à leur sommet; les pétioles plus courts que les feuilles.

Les fleurs forment un épi droit, long au moins d'un demi-pied, composé de verticilles très-rapprochés, d'environ six fleurs médiocrement pédonculées, munies de deux grandes bractées opposées, sessiles, concaves, un peu arrondies, aiguës, de couleur de rose, caduques. Les calices sont rouges, campanulés, filices, divisés à leur orifice en deux lèvres; la supérieure à une seule dent; l'inférieure bifide, à deux dents aiguës. La corolle est longue d'environ un pouce & demi, d'un rose-foncé; la partie du tube renfermée dans le calice, de couleur blanche; la portion extérieure très-ventrue, un peu comprimée, colorée, longue d'un pouce; les deux lèvres courtes; la supérieure concave, comprimée, tomenteuse en dehors; l'inférieure à trois découpures; les deux latérales courtes, ovales; celle du milieu plus large, concave, orbiculaire, crénelée à ses bords; le style un peu saillant, légèrement pubescent à son sommet; les filaments des étamines soutenus par un pédicule attaché à l'orifice de la corolle; dans le fond du tube, vers la base, deux petites dents rapprochées, colorées.

Cette belle espèce croît au Mexique; elle est cultivée dans le Jardin botanique de Madrid, où elle fleurit à la fin de l'automne.  $\gamma$  (*Descript. ex Cavan.*)

89. SAUGE à fleurs purpurines. *Salvia purpurea*. Cavan.

*Salvia foliis ovatis, serratis, attenuatis, glabris; petiolis basi biglandulosis; calicibus tomentosis, coloratis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 247. n°. 58.

*Salvia foliis ovato-acutis, serratis, glabris; calicibus tomentosis, coloratis.* Cavan. Icon. rar. vol. 2. pag. 52. n°. 182. tab. 166.

Ses tiges sont droites, glabres; tétragones, hautes de cinq à six pieds, rameuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ovales, aiguës, dentées en scie à leur contour, la plupart échancrées en cœur & arrondies à leur base, glabres à leurs deux faces; les pétioles longs, munis de deux petites glandes à leur base; les feuilles terminales ovales lancéolées, sessiles, opposées.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en plusieurs épis opposés, courts, composés de verticilles touffus, rapprochés, d'environ dix fleurs, munis de bractées courtes, aiguës, glabres, caduques. Les calices sont tomenteux, tantôt blanchâtres, souvent d'une couleur violette, divisés en deux lèvres; la supérieure entière, aiguë; l'inférieure bifide. La corolle est violette,

plusieurs fois plus longue que le calice; la portion du tube saillante hors du calice, renflée & divisée à son orifice en deux lèvres presque égales, médiocrement écartées; la supérieure droite, concave, comprimée, velue, échancrée à son sommet; l'inférieure à trois lobes courts, arrondis; celui du milieu un peu plus grand; les étamines plus courtes que la corolle; le style saillant hors de la lèvre supérieure; le stigmate bifide; quatre semences glabres, ovales.

Cette plante croît dans le royaume du Mexique; elle est cultivée dans le Jardin botanique de Madrid, où elle fleurit vers la fin de l'automne.  $\gamma$  (*V. f. in herb. Juss.*)

90. SAUGE glanduleuse. *Salvia glandulifera*. Cavan.

*Salvia foliis ovatis, serratis, villis; ramis bracteatis, calicibus pilosis glandulosis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 247. n°. 59.

*Salvia (glandulifera), foliis ovatis, serratis; verticillis subsessilibus; calicibus, bracteis ramisque glanduliferis.* Cavan. Annal. Hist. Nat. 2. n°. 4. pag. 111.

Ses tiges sont droites, hautes d'un à trois pieds, chargées de rameaux aternes, couverts de poils ronds, glanduleux, particulièrement les jeunes rameaux, les calices & les bractées. Les feuilles sont pétiolées, ovales, dentées en scie à leurs bords, longues d'un pouce, larges d'environ cinq lignes, velues à leurs deux faces.

Les fleurs sont terminales, disposées par verticilles composés d'environ six fleurs pédicellées, munies de bractées courtes, aiguës. Le calice est plus long que le pédicelle, à deux lèvres; la lèvre supérieure, entière; l'inférieure bifide, à deux découpures obtuses. La corolle est d'un pourpre-violet, à peine deux fois plus longue que le calice; la lèvre supérieure plus courte que l'inférieure; celle-ci à trois découpures; celle du milieu beaucoup plus longue que les latérales; les étamines très-saillantes hors de la lèvre supérieure.

Cette plante croît dans le Pérou, au Chinobato. (*Descript. ex Cavan.*)

91. SAUGE à fleurs violettes. *Salvia violacea*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis ovatis, serratis, rugosis; floribus verticillato-racemosis, latio inferiore corolla dependente.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 248. n°. 60.

*Salvia foliis ovatis, crenatis; floribus spicatis; verticillis subsessilibus; latio corolla dependente.* Ruiz & Pav. vol. 1. pag. 26. tab. 43. fig. B.

— Plante herbacée, annuelle, haute d'environ

deux pieds, velue, dont les racines sont fibreuses & fasciculées; les tiges droites, rameuses, tétragones, ainsi que les rameaux, garnies de feuilles opposées, pétioolées, ovales, ridées, crénelées à leur contour, à crénelures aiguës, obtuses à leur sommet, entières à leur base.

Les fleurs forment des épis courts, droits, terminaux, disposés par verticilles, au nombre de six à chaque verticille, légèrement pédonculées, munies de bractées opposées, ovales, concaves. Leur calice est court, velu, à deux lèvres aiguës; la supérieure entière, l'inférieure bifide. La corolle est d'un blanc-violet, trois fois plus longue que le calice; sa lèvre supérieure est droite, concave; l'inférieure plus longue, pendante, élargie, divisée en trois lobes; celui du milieu plus élargi, un peu échancré à son sommet; les deux latéraux obtus.

Cette plante croît au Pérou, sur les rochers; elle fleurit vers la fin de l'été. ○ ( *Descript. ex Ruiz & Pavon.* )

92. SAUGE radicante. *Salvia radicans.*

*Salvia foliis ovatis, elliptico-lanceolatisque, serratis; caule ramosissimo, nodoso, radicante; spicis gracilibus, asurgentibus.*

*Salvia procumbens.* Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 1. pag. 27. tab. 39. fig. A.

*Salvia (procumbens), foliis ovatis, ellipticis lanceolatisque, extrorsum serratis, glabris; caule ramosissimo, radicante; verticillis fructibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 248. n.º 62.

Toute la plante a une odeur forte, fétide. Ses tiges sont couchées, très-rameuses dès leur base, striées, quadrangulaires, radicantes & géniculées au dessus des articulations; les rameaux légèrement pubescents, ascendants, grêles, de couleur un peu purpurine, sous-divisés.

Les feuilles sont pétioolées, opposées, ovales ou elliptiques, linéolées, dentées en scie à leurs bords supérieurs, aiguës à leur sommet, veinées, glabres à leurs deux faces, rabattues. Les fleurs sont disposées en épis terminaux, ascendants, grêles, allongés; les épis des rameaux solitaires; ceux des tiges ternés; celui du milieu beaucoup plus long; les verticilles distans, composés de fleurs nombreuses, fort petites, médiocrement pédonculées, munies de deux bractées opposées, petites, ovales, aiguës.

Leur calice est visqueux, pubescent, chargé de poils glanduleux, divisé en deux lèvres; la supérieure entière, arrondie; l'inférieure à deux découpures aiguës. La corolle est une fois plus longue que le calice; son tube est blanc; il se partage à son orifice en deux lèvres; la supérieure blanche, arrondie, très-entière; l'inférieure à trois

lobes, de couleur blenâtre; le lobe du milieu plus allongé, échancré à son sommet. Les étamines sont un peu plus longues que la corolle; le pistil de la même longueur que les étamines; les semences un peu arrondies; deux ou trois avortent.

Cette plante est très-commune au Pérou & au Chili, dans les décombres & les lieux incultes, piétreux, aux environs de Lima; elle est en fleurs toute l'année. x ( *Descript. ex Ruiz & Pavon.* )

Les Péruviens s'en servent en décoction, comme d'un remède très-favorable dans les obstructions.

93. SAUGE à feuilles rhomboidales. *Salvia rhombifolia.* Ruiz & Pav.

*Salvia hirsuta, foliis serratis, inferioribus rhombicis, ovatis, petiolatis; superioribus cordatis, subsulcatis; racemis terminalibus, ternis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 249. n.º 63.

*Salvia foliis rhombicis, cordatisque serratis; spicis terminalibus, ternis; verticillis 4-8 floris.* Ruiz & Pavon, Flor. peruv. vol. 1. pag. 26. tab. 36. fig. B.

Ses racines sont rameuses & fibreuses; il s'en élève une tige droite, herbacée, velue, haute d'environ un pied, divisée en rameaux opposés, très-écartés, d'un pourpre livide. Les feuilles sont opposées, velues à leurs deux faces, veinées, dentées en scie à leur contour; les dentelures obtuses; les inférieures pétioolées, de forme rhomboidale; les supérieures presque sessiles, ovales, aiguës, échancrées en cœur à leur base.

Les fleurs forment des épis terminaux, dont les ramifications sont ternées, courtes, droites, feuillées; celle du milieu plus longue. Les épis qui terminent les principales tiges sont solitaires, dépourvus de feuilles plus longues que les autres. Ces fleurs sont médiocrement pédonculées, verticillées, réunies au nombre de quatre ou six, rarement huit à chaque verticille, munies de deux bractées opposées, grandes, ovales, linéolées, crénelées, pubescentes, caluques. Les calices sont velus, visqueux, un peu violets, tubulés, divisés en deux lèvres; la supérieure plus longue, entière; l'inférieure à deux découpures aiguës. La corolle est violette, trois fois plus longue que le calice, velue en dehors, plissée à son orifice, divisée en deux lèvres presque de même longueur; la supérieure droite, étroite, entière, concave; l'inférieure plane, à trois lobes; celui du milieu échancré; les deux latéraux bien plus courts, obtus, arrondis; les étamines saillantes hors de la corolle; les semences presque triangulaires, veinées, réticulées.

Cette plante croît sur les collines sablonneuses &

les montagnes du Pérou; elle fleurit dans l'été. ( *Descript. ex Ruiz & Pav.* )

• 94. SAUGE hérissée. *Salvia hirtella*. Vahl.

*Salvia foliis oblongis, crenatis, glabris; caule calycibus hirtis-viscosis; fluminibus longissimis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 249. n°. 64.

Ses tiges sont ascendantes, herbacées, chargées de poils longs, articulés, glanduleux, surtout à leur partie supérieure; hutes d'un pied, garnies de feuilles pétiolées, oblongues, distantes, glabres, crenelées, longues d'un pouce, aiguës à leur sommet, très-entières à leur base, sans nervures en dessus, veinées en dessous.

Les fleurs sont terminales, disposées par verticilles composés de quatre à six fleurs, presque unilatérales, pédicellées, garnies de bractées ovales, aiguës, une fois plus courtes que le calice. Ceux-ci sont longs d'un demi-pouce, fortement striés, à deux lèvres; la supérieure entière. La corolle est longue d'un pouce, de couleur écarlate; la lèvre supérieure velue; les étamines presque une fois aussi longues que la corolle.

Cette plante a été recueillie au Pérou, par Joseph de Jussieu. ( *V. f. in herb. Juss.* )

95. SAUGE en casque. *Salvia galeata*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis ovalibus, serratis; calicis labio superiori galeato, corolla labio superiori convolato.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 27. tab. 42. fig. A.

*Salvia foliis oblongo-ovatis, subsessilibus, serratis; corollis labio superiore inflexo involuto, caule fruticoso.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 250. n°. 65.

C'est un petit arbrisseau, haut d'environ trois pieds, très-rameux, dont les tiges sont presque cylindriques, nues à leur partie inférieure; les rameaux étalés, tétragones, acquérant une couleur de rouille par la dessiccation, garnis de feuilles presque sessiles, rabattues, ovales, veinées, rudes au toucher, ridées, légèrement pubescentes, dentées en scie à leurs bords, presque obtuses.

Les épis sont ternés, droits, terminant; celui du milieu beaucoup plus long, composé de verticilles médiocrement pedoncules; chaque verticille garni de six à douze fleurs horizontales, munies de deux petites bractées ovales, caduques, opposées.

Le calice est ventru, dilaté à sa partie supérieure, divisé à son orifice en deux lèvres; la supérieure plus grande, concave, en forme de casque; l'inférieure également concave, b'fide, recourbée. La corolle est d'un blanc-violet, une fois plus longue que le calice, partagée en deux

lèvres; la supérieure étroite, roulée à sa partie inférieure, un peu élargie à sa partie supérieure; la lèvre inférieure, à trois lobes ovales, courts, presque égaux; celui du milieu plus large, entier. Les étamines son entièrement renfermées dans la lèvre supérieure.

Cette plante croît au Pérou, dans les lieux arides, aux environs de Muzna; elle fleurit vers la fin de l'été. h ( *Descript. ex Ruiz & Pav.* )

96. SAUGE à grandes bractées. *Salvia bracteata*. (N.)

*Salvia foliis ovatis, serratis; verticillis scissis; bracteis orbiculato-acutis, ciliatis.* Cavan.

*Salvia phlomidoides.* Cavan. Ic. rar. vol. 4. pag. 10. n°. 349. tab. 320.

*Salvia (sideritis), foliis ovato-oblongis, villosis, serratis; bracteis rhombo-ovatis, acuminatis, ciliatis; floribus subquantibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 250. n°. 66.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec la *salvia phlomidoides* de M. Vahl, quoique décrite sous le même nom par M. Cavanilles. Ses tiges sont droites, velues, hautes de deux pieds, quadrangulaires. Les rameaux sont opposés; les feuilles pétiolées, opposées, ovales, dentées en scie à leur contour, médiocrement aiguës à leur sommet, un peu allongées, légèrement ridées, un peu velues, ciliées à leurs bords; les pétioles plus courts que les feuilles.

Les fleurs, disposées par verticilles, forment des épis oblongs, terminaux; chaque verticille composé de six fleurs, et enveloppé par une grande bractée orbiculaire, aiguë à son sommet, ciliée. Les calices sont campanulés, striés, divisés en deux lèvres; la supérieure entière, très-acuminée; l'inférieure b'fide. La corolle est bleue, quelquefois panachée de blanc, à deux lèvres; la supérieure entière et concave, l'inférieure à trois lobes arrondis; les deux latéraux plus courts; celui du milieu échancré & plus large.

Cette espèce croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Madrid; elle fleurit vers le commencement de l'automne. h ( *Descript. ex Cavan.* )

97. SAUGE ponctuée. *Salvia punctata*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis ovato-oblongis, serratis; spicis multifloris, calice punctato, labio superiore tricuspidato.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 27. tab. 39. fig. 1.

*Salvia villosa-viscosa, foliis oblongis, extrorsum serratis; calicibus glanduloso-punctatis; labio supe-*



*riore truncipitato*, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 250. n°. 67.

Cette espèce est d'une odeur fétide, de couleur de rouille, chargée, surtout à sa partie supérieure, de poils glanduleux. Ses tiges sont droites, un peu ligneuses, hautes de trois pieds, fragiles, nues à leur partie inférieure, à quatre angles mouffes, divisées en rameaux drois, géniculés, pubescens, de couleur purpurine, garnis de feuilles pétiolées, opposées, ovales, oblongues, denrées en scie à leur moitié supérieure, ouvertes, ridées, veinées, pubescentes surtout en dessous, visqueuses en dessus, quelques-unes entières dans leur jeunesse, soutenues par des pétioles courts.

Les fleurs, médiocrement pédonculées, forment des épis allongés, drois, terminaux, solitaires, velus & visqueux, disposés au nombre de six à douze par chaque verticille, munies de bractées opposées, ovales, acuminées, caduques.

Le calice est campanulé, d'un bleu-violet, velu, visqueux, chargé de points glanduleux, divisé en deux lèvres; la supérieure à trois pointes; l'inférieure presque aussi longue, à deux divisions aiguës. La corolle est trois fois plus longue que le calice, de couleur blanchâtre, pubescente en dehors, souvent un peu jaunâtre ou d'un blanc-violet; elle se divise à son orifice en deux lèvres; la supérieure droite, concave, entière; l'inférieure à trois lobes entiers; celui du milieu à peine plus long, les étamines aussi longs que la corolle; le style un peu saillant, plumeux à sa partie supérieure.

Cette espèce croit au Pérou, sur les collines élevées de Huanuco; elle fleurit à la fin du printemps & au commencement de l'été. (Description de Ruiz & Pav.)

98. SAUGE à feuilles de chamédrys. *Salvia chamædrysoides*. Cavan.

*Salvia caule decumbente, foliis ovatis, crenatis, subulsi tomentosis*. Cavan. Icon. rar. vol. 2. pag. 77. n°. 216. tab. 197.

*Salvia foliis ovatis, crenatis, rugulosis, incanis; calicibus bellato-villosis, caule decumbente*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 251. n°. 68.

Ses tiges sont couchées, longues d'environ un pied & demi, tétragones, revêtues d'un duvet tomenteux, blanchâtre; divisées en rameaux opposés, écartés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétiolées, de la même forme & presque aussi petites que celles du *tescium chamædrys*; ovales, ridées, crénelées à leur contour, obtusés à leur sommet, blanchâtres & tomenteuses à leur face inférieure; les feuilles supérieures presque feuilées.

Les fleurs sont disposées en épis courts à l'extrémité des tiges & des rameaux, composés de

verticilles peu distans, d'environ six fleurs; garnies de stipules caduques, ovales, aiguës, presque aussi longues que les calices, élargies, entières. Les calices sont oblongs, tubulés, striés, divisés en deux lèvres; la lèvre supérieure entière, ovale, mucronée; l'inférieure à deux découpures lanceolées, aiguës. La corolle est d'un bleu-foncé, plus clair sur le tube. Celui-ci est un peu plus long que le calice, insensiblement élargi vers son orifice, où il se partage en deux lèvres écartées; la supérieure courte, entière, concave, comprimée; l'inférieure très-ample, à trois lobes arrondis, les deux latéraux fort petits; celui du milieu élargi, arrondi, médiocrement échanuré à son sommet; les étamines plus courtes que la corolle; le style à peine saillant; le stigmate à deux divisions inégales, réfléchies.

Cette plante croit au Mexique; elle est cultivée au Jardin botanique de Madrid, où elle fleurit à la fin de l'été. 37

99. SAUGE à feuilles entières. *Salvia integrifolia*. Ruiz & Pav.

*Salvia foliis ovatis, integerrimis, avenis, subrepandis; spicis brevibus, corollis longis, fluminibus exsertis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 26. tab. 35. fig. B.

*Salvia fruticosa, foliis oblongis, integerrimis, viscoso-resinosus, avenis; bracteis lanceolatis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 251. n°. 69.

Ses tiges sont glabres, presque ligneuses, droites, hautes d'environ deux pieds, très-rameuses, cylindriques, nues, de couleur cendrée; les jeunes rameaux tétragones, visqueux, résineux, feuillés, de couleur purpurine, luisans, garnis de feuilles droites, pétiolées, opposées, ovales, obtuses ou aiguës, très-entières, très-visqueuses, sans nervures apparentes.

Les fleurs sont disposées en épis courts, solitaires, terminaux, réunies par verticilles au nombre de quatre ou six à chaque verticille, médiocrement pédonculées, munies de bractées lanceolées, aiguës. Leur calice est tubulé, de couleur verte, marqué d'une ou de deux nervures; rude intérieurement, divisé en deux lèvres, la supérieure très-entière, l'inférieure à deux divisions aiguës. La corolle est tubulée, couleur d'un jaune de safran, trois fois plus longue que le calice, étroite, chargée extérieurement de puils arriculés; divisée à son orifice en deux lèvres; la supérieure plus longue, en forme de casque, échanurée à son sommet; l'inférieure à trois lobes courts; celui du milieu ovale, aigu, très-entier; les deux latéraux plus courts, arrondis. Les étamines sont plus longues que la corolle; les anthères pendantes, linéaires, à une seule loge; le style glabre, plus long que les étamines; quatre semences luisantes, à

trois côtés, panachés de jaune & de blanc, placés sur un corps glanduleux, à quatre dents.

Cette plante croît au Pérou, dans la province de Caxatambo, sur le bord des eaux thermals de Cheucin, & sur les rochers. (*Descript. ex Ruiz & Pavon.*)

Cette plante, prise en décoction, passe, chez les Péruviens, pour un puissant spécifique dans la pleurésie.

100. SAUGE à grosses rides. *Salvia corrugata*. Vahl.

*Salvia frutescens, foliis subovato-lanceolatis, crenatis, supra rugosissimis, glabris, subius lanatis; calicibus subhirsutis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. p. 252. n°. 70.

Ses tiges se divisent en rameaux roides, médiocrement quadrangulaires, blanchâtres à leur partie supérieure, garnis de feuilles nombreuses, rapprochées sur les rameaux, pétiolées, presque ovales, lancéolées, longues de deux pouces & plus, crénelées à leur contour, aiguës à leur sommet, obtuses à leur base, glabres & chargées de grosses rides nombreuses en dessus, lacuneuses & couvertes d'une laine courte en dessous.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, droites, longues de deux pouces, en forme de cône avant leur développement, composées de verticilles rapprochés, d'environ huit fleurs; garnis de bractées oblongues, caduques, acuminées, longues de six lignes, légèrement velues, ainsi que le calice. Celui-ci est tubuleux, insensiblement renflé vers son orifice, strié, coloré, à trois dents moelles, aiguës. La corolle est velue, un peu plus longue que le calice.

Cette plante croît au Pérou. *Th* (*V. f. in herb. Juss.*)

101. SAUGE à fleurs blanches. *Salvia leucantha*. Cavan.

*Salvia foliis lanceolatis, longis, rugosis, crenulatis; floribus spicatis, calicibus tomentoso-violaceis.* Cavan. Icon. rar. pag. 16. n°. 22. tab. 24.

*Salvia foliis lanceolatis, serratis, rugosis, subius incanis; calicibus densissime incano-violaceo-tomentosis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 252. n°. 71.

*Salvia foliis lineari-lanceolatis, crenulatis, rugosis; floribus verticillato-spicatis, calicibus tomentosis.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 129. n°. 5.

Ses tiges sont quadrangulaires, droites, rameuses, hautes de cinq pieds environ, garnies de feuilles opposées, pétiolées, étroites, lancéolées, longues, ridées, crénelées à leur contour, blanchâtres & tomenteuses en dessous, d'un vert foncé à leur face supérieure, supportées par des

pétioles courts, presque connivens; munis à leur base de glandes très-petites, semblables à des points bruns.

Les fleurs sont disposées en longs épis terminaux, interrompus, composés de verticilles à plusieurs fleurs couvertes d'un duvet tomenteux, lanugineux, violet. Le calice est de même couleur, tres-velu, à deux lèvres; la lèvre supérieure aiguë, entière; l'inférieure légèrement biffée. La corolle est blanche, une fois plus grande que le calice; sa lèvre supérieure en voûte vers son sommet, plissée, entière, velue; l'inférieure à trois découpures arrondies, presque égales, qui offrent en dessous une petite bolle courte.

Cette plante croît naturellement au Mexique. *Th*

102. SAUGE roulée. *Salvia revoluta*. Ruiz & Pavon.

*Salvia foliis lineari-lanceolatis, crenatis; floribus spicatis, verticillis secundis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 28. tab. 41. fig. B.

*Salvia foliis lineari-lanceolatis, crenatis, margine revolutis; floribus secundis, caule fruticoso, calicibus corollisque tomentosis.* Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 252. n°. 72.

Ses tiges sont droites, hautes de trois pieds, ligneuses, très-rameuses, glabres, cylindriques, de couleur brune, ridées à leur partie inférieure; les rameaux opposés, écinés, touffus, obscurément tétragones, tomenteux, garnis de feuilles légèrement pétiolées, lineaires, lancéolées, ridées, crénelées & roulées à leurs bords, très-veinées; les veines de la partie supérieure bien plus profondes.

Les épis sont droits, solitaires, terminaux, longs de cinq à six pouces, composés de fleurs à peine pédonculées, unilatérales, verticillées, au nombre de quatre ou six à chaque verticille, garnies de bractées caduques, ovales, lancéolées. Le calice est tubuleux, nerveux, à deux lèvres; la supérieure ovale, entière, concave; l'inférieure à deux découpures aiguës, très-tomenteuses en dehors, rude en dedans, & quelquefois d'une couleur un peu violette. La corolle est une fois plus longue que le calice, d'un blanc-violet, tomenteuse en dehors, partagée en deux lèvres; la supérieure plus grande, échancrée à son sommet; l'inférieure à trois lobes, les deux latéraux plus courts, roulés; le style velu à sa partie supérieure.

Cette plante croît sur les lieux escarpés, au Pérou. *Th* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

103. SAUGE à feuilles étroites. *Salvia angustifolia*. Cavan.

*Salvia foliis lanceolatis, inferioribus extrorsum serratis,*

*ferratis*, cauleque *caesepitibus*; *labio inferiore latissimo, calicibus acutis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 253. n°. 73.

*Salvia foliis lanceolatis, oblongis; inferioribus parvis serratis, superioribus subintegris, verticillis sex-floris*. Cavan. Icon. rat. vol. 4. pag. 9. n°. 346. tab. 317.

*Salvia (virgata), foliis linearibus, caulibus virgatis, specie gracilibus, floribus oppositis*. Orteg. Plant. Decad. 1. pag. 3.

Cette espèce est singulièrement remarquable par la grandeur & la largeur de la lèvre inférieure de sa corolle, & par ses feuilles étroites, à dents très-écartées.

Ses tiges sont droites, hautes de deux pieds, tétragones, divisées en rameaux opposés, légèrement velus, garnis de feuilles opposées, presque sessiles, très-étroites, lancéolées, les inférieures munies à leurs bords de quelques dents en scie, rares, écartées; les feuilles supérieures presque entières, linéaires, aiguës, presque glabres à leurs deux faces.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, droits, simples, lâches, composés de verticilles distants, d'environ six fleurs médiocrement pédonculées, munies à leur base de deux bractées opposées, plus longues que les pédoncules, très-étroites, acuminées. Le calice est court, tubulé, à deux lèvres; la supérieure entière, aiguë; l'inférieure bise. La corolle est d'un bleu-foncé; le tube comprimé, de la longueur du calice; le limbe très-ouvert, à deux lèvres écartées; la supérieure courte, comprimée, velue, un peu recourbée, entière; l'inférieure très-ample, large, plane; à trois grands lobes arrondis, les deux latéraux plus petits, celui du milieu presque orbiculaire, échancré à son sommet. Les étamines plus courtes que la corolle; le style barbu à son sommet, à peine aussi long que la lèvre supérieure.

Cette plante croît à la Nouvelle-Espagne. On la cultive au Jardin botanique de Madrid, où elle fleurit dans le courant de l'automne. ♀

#### 104. SAUGE azurée. *Salvia azurea*. Lam.

*Salvia foliis linearis-lanceolatis, inferioribus oppositis serratis, cauleque glabris; laciniis calicinis rotundatis*. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 253. n°. 74.

*Salvia azurea*. Lam. Journ. d'Hist. nat. vol. 1. pag. 409.

*Salvia (acuminata), foliis radicalibus cuneatis; caulibus linearis-lanceolatis, utrinque attenuatis, acuminatis; caule altissimo*. Ventenat, Jardin de Cels, pag. 50. tab. 50.

*Salvia mexicana*. Walter. Flor. carol. pag. 65. ex Michaux.

Botanique. Tome VI.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la *salvia angustifolia* Cavan.; mais elle en diffère par sa tige qui est presque glabre, & qui s'élève à plus de six pieds, par les feuilles radicales en forme de coin; par celles de la tige, plus longues, plus étroites, terminées en pointe; par le calice de moitié plus court que le tube, & par la lèvre inférieure de la corolle, dont le lobe moyen est crénelé.

Ses tiges sont droites, tétragones, sillonnées à chaque face, presque glabres, rameuses dans leur partie supérieure, d'un vert-pâle; garnies de feuilles opposées, glabres, d'un vert-tendre; les inférieures pétiolées, en ovale renversé, presque en forme de coin; dentées à leur partie supérieure, ridées; les supérieures & terminales sessiles, insensiblement plus étroites, plus courtes, linéaires, lancéolées, rétrécies à leurs deux extrémités, acuminées, munies de quelques dents courtes, écartées.

Les épis sont terminaux, composés de verticilles plus ou moins nombreux, représentant par leur ensemble une panicle pyramidale; chaque verticille formé de deux à quatre fleurs, rarement fix, un peu écartées, dont les pédoncules sont très-courts, pubescents, recourbés, munis de deux bractées opposées, pubescentes, de la forme des feuilles supérieures, presque de la longueur des fleurs. Le calice est tubulé, légèrement comprimé, pubescent, strié, divisé en trois découpures ovales, droites, pointues: la corolle d'un bleu d'azur, rubulée, pubescente, labiée à son limbe; le tube insensiblement dilaté, un peu comprimé; deux fois plus long que le calice; la lèvre supérieure droite, très-courte; en casque; l'inférieure réfléchie, à trois lobes; les deux latéraux ovales, aigus, de la longueur de la lèvre supérieure; le lobe du milieu très-grand, arrondi, crénelé, échancré, marqué de trois stries, blanchâtre à sa base. Quatre filaments, dont deux stériles; ces derniers très-courts, attachés au milieu du tube; les fertiles un peu aplatis & presque réunis à leur base, portés dans leur partie moyenne sur un pivot inséré à l'orifice du tube: l'ovaire à quatre lobes, porté sur un réceptacle dilaté à son bord, à quatre dents, dont trois très-courtes, une plus grande en forme d'échelle; le style velu à sa partie supérieure, le stigmate à deux divisions inégales & recourbées; quatre femences, dont deux ou trois avortent, ovales, arrondies, de couleur olive, parsemées de points blancs & beillans, vues à la loupe.

Cette plante croît dans la Caroline méridionale. ♀ (Descript. ex Venc.)

#### 105. SAUGE élevée. *Salvia elata*.

*Salvia foliis linearis-oblongis, levibus, subintegris; calice pubescente, brevissimo irishido; caule erecto*. (N.)

*Salvia (angustifolia), cretita, glabra; foliis*  
Kkkk

*longo-linearibus, integrifolius, levibus; spicis nudis; calice pubente, brevissime trifido; corollâ longiusculâ æquali.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 16.

Plante très-voisine du *salvia azurea*, qui n'en est peut-être qu'une variété, dont les tiges sont droites, hautes, élancées, quadrangulaires, divisées en rameaux opposés, très-élancés, glabres, garnis de feuilles opposées, pétiolées, étroites, linéaires, allongées, lisses à leurs deux faces, presque entières à leurs bords, aiguës à leur sommet; les supérieures plus étroites, presque sessiles; les inférieures lancéolées, dentées en scie.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, presque simples, droits, allongés, composés de verticilles médiocrement distans, d'environ six fleurs. Les calices sont très-courts, tubulés, pubescens, divisés en deux lèvres courtes, arrondies; la supérieure presque entière, l'inférieure bifide. La corolle est d'un bleu d'azur, le tube plus long que le calice; le style saillant, bibrû à sa partie supérieure.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de la Nouvelle-Géorgie, au milieu des forêts, dans les clairières; elle fleurit au commencement de l'été. (*Descript. ex Mich.*)

#### 106. SAUGE dorée. *Salvia aurea*. Linn.

*Salvia foliis subrotundis, basi truncatis, subauriculatis; corollarum guttâ maximâ.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 71. n°. 317.

*Salvia foliis incanis, inferioribus basi truncatis, dentatis; superioribus oblongis, integerrimis; calicibus fruticiferis, ampliatâ.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 231. n°. 20.

*Salvia foliis subrotundis, integerrimis; basi truncatis, dentatis.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 69. n°. 27. — Hort. Cliff. 13. — Royen, Lugd. Bat. 308. — Mill. Dict. n°. 10. — Elting. de *Salvia*, n°. 9. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n°. 55.

*Salvia africana frutescens; folio subrotundo, glauco; flore magno, aureo.* Commel. Hort. 2. pag. 183. tab. 92.

On distingue cette belle espèce à ses feuilles arrondies, épaisses, petites, blanchâtres ou glauques; à ses épis courts, & à ses grandes fleurs d'un beau jaune doré.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de cinq ou six pieds & plus, rameux, dont les tiges sont ligneuses, glabres, presque cylindriques, celles des rameaux médiocrement quadrangulaires, blanchâtres, un peu pubescens, garnies de feuilles opposées, nombreuses, à peine pétiolées; les unes presque arrondies, d'autres en ovale renversé, épaisses, fort petites, longues de cinq à six lignes, de couleur glauque ou un peu blanchâtres à leurs

deux faces, entières ou quelquefois un peu sinuées à leur contour, obtuses à leur sommet; les unes sessiles, presque tronquées & même auriculées à leur base, d'autres rétrécies & prolongées en un pétiolo canaliculé, très rapprochées.

Les fleurs forment des épis courts, épais à l'extrémité des rameaux, réunis en une sorte de panicule droite, composés de verticilles peu interrompus, munis de bractées ovales, obtuses. Le calice est d'une seule pièce, campanulé, velu à sa base, divisé à son orifice presque en deux lèvres ou en trois lobes arrondis, presque égaux. La corolle est grande, d'une belle couleur d'or foncée ou tirant sur le roux.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, le long des ruisseaux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Hy (V. v.)*

#### 107. SAUGE d'Afrique. *Salvia africana*. Linn.

*Salvia foliis ovatis, serrato-dentatis, perparvis; subincanis; bracteis acuminatis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 71. n°. 318.

*Salvia foliis inferioribus spatulatis, serratis, basi truncatis, dentatis; superioribus oblongis, subintegerrimis; calicibus hirsutis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 230. n°. 18.

*Salvia foliis subrotundis, serratis; basi truncatis, dentatis.* Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 69. n°. 26. — Hort. Cliff. 13. — Royen, Lugd. Bat. 308. — Mill. Dict. n°. 11. — Icon. 15c. tab. 215. fig. 1. — Elting. de *Salvia*, n°. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. n°. 54.

*Salvia africana frutescens, folio scarodonia, flore violaceo.* Comm. Hort. 2. pag. 181. tab. 91.

On distingue cette espèce du *salvia aurea*, à ses fleurs de couleur violette, & à ses feuilles ovales, dentées en scie; ces deux plantes ont d'ailleurs beaucoup de rapports.

Celle-ci est un arbrisseau dont les tiges cylindriques, purpurines, un peu blanchâtres, s'élèvent à la hauteur de quatre ou cinq pieds, divisées en rameaux nombreux, effilés, opposés, presque cylindriques ou légèrement tétragones, cendrés, un peu blanchâtres, pubescens, garnis de feuilles nombreuses, petites, opposées, pétiolées, ovales, longues de quatre ou six lignes, larges de trois ou quatre, un peu épaisses, ridées, vertes à leur face supérieure, un peu tomenteuses, & d'un blanc de neige en dessous, dentées en scie à leur contour, quelquefois presque laciniées vers leur base, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, soutenues par des pétioles courts, velus, tomenteux; les feuilles supérieures sessiles, moins ovales, quelquefois un peu arrondies, légèrement acuminées.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, presque en grappes, composées de verticilles peu distans, munies de bractées très-courtes, ovales, presque rhomboidales, acuminées, pubescentes, caduques. Les pédoncules sont très-courts; les calices très-velus, campanulés, évasés à leur orifice, divisés en deux lèvres obtuses; la supérieure à trois petit s; des très-courtes, quelquefois peu marquées; l'inférieure légèrement biffée. La corolle est grande, de couleur violette, légèrement velue extérieurement.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans les terrains argileux. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

#### 108. SAUGE colorée. *Salvia colorata*. Linn.

*Salvia foliis ellipticis, subintegerrimis, tomentosis; calicibus limbo membranaceo colorato*. Linn. Syst. veget. pag. 66. — Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 319. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n°. 56.

*Salvia foliis oblongis, subintegerrimis, incanis; calicibus pilosis, fructiferis grandifoliis, venoso-reticulatis*. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 230. n°. 19.

*Salvia (integerrima), foliis oblongo-ovatis, integerrimis; calicibus parvis, coloratis*. Miller, Dict. n°. 12. & Icon. 150. tab. 225. fig. 2.

*Horminum africanum, frutescens, ciliis femina foliis subrotundis*. Morif. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 16. fig. ult.

Cette plante, très-rapprochée du *salvia africana* & du *salvia aurea*, paroît tenir le milieu entre ces deux espèces; elle diffère de la première par ses feuilles entières, arrondies; de la seconde, par ses corolles d'un bleu-pâle, & par la forme de leurs calices.

Ses tiges sont ligneuses, hautes d'environ six pieds, radicantes inférieurement, divisées en rameaux forts, opposés, droits, garnis de feuilles pétioles, opposées, tomenteuses, arrondies ou un peu elliptiques, longues d'un pouce; les inférieures dentées en scie, quelquefois auriculées à leur base; les supérieures très-entières.

Les fleurs forment des épis lâches, droits, alongés, terminaux, composés de verticilles distans. Les calices sont campanulés, à découpures arrondies, amples, scarieuses, colorées en rouge ou en un bleu-clair. La corolle est grande, d'un bleu-pâle; le tube élargi, & divisé à son orifice en deux lèvres.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance, dans le sable, sur le bord de la mer. (V.)

#### 109. SAUGE barbue. *Salvia barbata*. Lam.

*Salvia foliis ovatis, subintegerrimis, rugosis, tomentosis; calicibus dilatatis, venoso-reticulatis, hirsutissimis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 320.

β. *Eadem, foliis minimis, acutioribus*. Lam. L. c.

Cette plante seroit-elle la même que le *salvia colorata*? C'est l'opinion de M. Wahl, qui réunit ces deux espèces; elles paroissent cependant offrir des différences assez essentielles.

Celle-ci est un petit arbrisseau dont les tiges sont droites, divisées en rameaux tétragones, opposés, pubescens, blanchâtres ou cendrés, garnis de feuilles opposées, médiocrement pétioles, petites, ovales, épaisses, coriaces, d'un blanc-cendré à leurs deux faces, très-ridées, entières ou un peu sinuées à leur courrou, tomenteuses particulièrement dans leur jeunesse, obtuses à leur sommet, supportées par des pétioles toides, très-courts. Dans la variété β, les feuilles sont plus petites, très-aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont axillaires, situées vers l'extrémité des tiges, presque solitaires dans chaque aisselle, presque sessiles ou four-nues par des pédoncules courts, très-velus. Les calices sont dilatés, presque campanulés, hérissés de poils toides; 5 blanchâtres, divisés à leur orifice en deux lèvres arrondies, obtuses, denticulées, à dents courtes, aiguës, veinées, réticulées. La corolle est tubulée, à deux lèvres, environ une fois plus longue que le calice, d'un blanc-jaunâtre.

Cette plante a été rapportée par M. Sonnerat, du Cap de Bonne-Espérance, où elle croît naturellement. (V. f. in herb. Lam.)

#### 110. SAUGE paniculée. *Salvia paniculata*. Linn.

*Salvia foliis obovato-cuneiformibus, denticulatis, nudis; caule frutescente*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 69. n°. 29. — Mantiss. 25 & 511. — Erling. de *Salvia*, n°. 10. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 321. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n°. 57.

*Salvia (chamaeagria), foliis cuneiformibus, carinatis, basi attenuatis, supremis serratis; floribus racemoso-paniculatis*. Berg. Plant. Cap. pag. 3. n°. 1.

*Salvia minor, asiopica; foliis chamaeagrii asperis*. Breyn. Cent. pag. 169. tab. 85. Bona. — Moerf. Oxon. Hist. 3. 5. 11. tab. 16. fig. 19.

*Salvia africana, frutescens, hellanthem folio*. Oldenl. Afric. 32. — Tourn. Inst. R. Herb. 180.?

C'est un arbrisseau qui se reconnoît à ses feuilles petites, cunéiformes, velues, remarquables par des points enfoncés, parsemés sur leur superficie, & dont les fleurs sont d'un bleu-tendre, mêlées de blanc.

K k k k

Ses tiges sont droites, ligneuses, tudes, presque cylindriques, striées, divisées en rameaux nombreux, opposés, ouverts, tétragones, striés, hérissés de poils très-courts, d'un vert-foncé, allongés, garnis de feuilles médiocrement pétioles, opposées, en ovale renversé, presque cunéiformes, longues à peine d'un demi-pouce, larges de trois à quatre lignes, crenelées ou dentées en scie particulièrement vers leur sommet, presque glabres ou légèrement pubescentes, finement ridées, veinées, arrondies ou presque tronquées à leur sommet; la plupart mucronées, rétrécies en pétiole à leur base, presque sessiles.

Les fleurs sont disposées en épis nombreux, axillaires, terminaux, paniculés ou presque en grappes; les rameaux opposés, pubescents, composés de verticilles à deux ou quatre fleurs pédonculées. Les calices sont campanulés, un peu velus, à deux lèvres courtes; la supérieure entière, à trois dents très-courtes, aiguës, laèvre inférieure à deux découpures aiguës. La corolle est presque aussi grande que celle du *Salvia pratensis*, d'un bleu-clair; son tube est court, renflé, blanchâtre, élargi à son orifice, divisé en deux lèvres très-ouvertes, grandes; la supérieure comprimée, droite, en casque, échancrée, obtuse à son sommet; l'inférieure plus étroite, presque aussi longue, à trois lobes; les deux latéraux comprimés, réfléchis; celui du milieu plus grand, plane, échancré à son sommet; les anthères droites, le style plus long que la corolle, le stigmate bifide; les semences un peu arrondies, glabres, comprimées, situées dans le fond du calice.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *Th* (V.v.)

111. SAUGE sagittée. *Salvia sagittata*. Ruiz & Pavon.

*Salvia villosa-viscosa, foliis hastatis, inaequaliter crenatis, subius incanis; racemis compositis, secundis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 245, n°. 49.

*Salvia foliis sagittatis, crenatis, acutis*. Ruiz & Pav. Flor. pétruv. vol. 1. pag. 25. tab. 35. fig. A.

C'est une belle espèce, remarquable par ses feuilles grandes, sagittées, & par les poils visqueux dont toutes les parties sont recouvertes; les uns très-longs, sétacés, atténués; d'autres plus courts & glanduleux.

Ses tiges sont droites, tétragones, velues, hautes de cinq à six pieds, très-rameuses à leur partie inférieure; les rameaux quadrangulaires, cannelés; les uns droits, d'autres pendans, opposés, radicaux, divisés en d'autres petits rameaux très-ouverts. Les feuilles sont très-velues, grandes, lancéolées, sagittées, très-aiguës tant à leur sommet qu'à leurs angles, épaisses, ridées, crenelées à leur contour; les inférieures supportées

par de très-longs pétioles; les supérieures plus étroites.

Les fleurs sont opposées, médiocrement pédonculées, réfléchies, disposées en un long épi terminal, droit, rameux, muni de petites bractées lancéolées & caduques. Les calices sont d'un pourpre-violet, presque campanulés, à trois découpures ovales; la supérieure plus longue & plus large, concave, à trois dents. La corolle est d'un bleu-foncé, velue en dehors, environ quatre fois plus longue que le calice; laèvre inférieure pendante, & plus grande que la supérieure; les filaments & les anthères de couleur bleuâtre. Fort souvent il ne mûrit qu'une seule semence placée fut un corps glanduleux.

Cette plante est fort commune au Pérou, tant dans les jardins que dans les champs, aux lieux incultes & parmi les décombres. Les habitants en font le même usage que de la sauge commune. *Æ*

112. SAUGE des Canaries. *Salvia canariensis*. Linn.

*Salvia foliis hastato-triangularibus, oblongis, crenatis; petiolis tomentosis, bracteis calice longioribus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 72. n°. 324.

*Salvia foliis hastato-triangularibus, oblongis, crenatis, obtusis*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 68. n°. 25. — Hort. Cliff. 13. — Hort. Upsal. 10. — Roy. Lugd. Bat. 108. — Kniph. Orig. Centur. 6. tab. 77. — Etling. de Salvia, n°. 36.

*Horminum hastatis amplioribus foliis, seu arimodo alatis; caulibus & pediculis araneosis lanugine villosis*. Pluken. Almag. tab. 301. fig. 2.

*Horminum folio hastato*. Rivin. Monop. tab. 61.

*Horminum canariense, tomentosum, hastato folio*. Motif. Hist. 3. pag. 94. §. 11. tab. 15. fig. 17.

*Sclarea folio triangulari, caule tomentoso*. Tourn. Inst. R. Herb. t80.

C'est une des espèces les plus distinctes de ce genre par ses feuilles amples, hautes ou triangulaires; par ses bractées beaucoup plus longues que les calices.

Ses tiges sont dures, ligneuses, un peu cylindriques, droites, hautes de trois à quatre pieds & plus, chargées d'un duvet tomenteux, très-blanc, divisées en rameaux opposés, à peine quadrangulaires, striés, très-cotoneux, garnis de feuilles opposées, pétioles, oblongues, triangulaires, hautes, crenelées à leur contour, obtuses à leur sommet, ridées, d'un vert-foncé, presque glabres à leur face supérieure, un peu pubescentes, velues le long de leur principale nervure, supportées par des pétioles très-tomenteux; celles de la base des panicules presque sessiles, ovales, oblongues, acuminées.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, étalée, ample, dont les ramifications nombreuses, opposées sont en forme d'épis particuliers, composés de verticilles très-rapprochés, munis de bractées opposées, lancéolées, glabres, entières, plus longues que les calices : ceux-ci sont amples, hispides, striés, un peu comprimés, très-élargis à leur orifice, partagés en deux lèvres obuses, arrondies ; la supérieure plus grande, entière ou légèrement triquée ; l'inférieure partagée assez profondément en deux lobes arrondis. La corolle est assez grande, de couleur purpurine ; la lèvre supérieure allongée, droite, un peu courbée en faux, obtuse ; l'inférieure plus courte, plus large, à trois lobes.

Cette plante croît naturellement aux îles Canaries. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

### 113. SAUGE rustique. *Salvia inamara*. Vahl.

*Salvia canescens, foliis cordato-triangularibus, inaequaliter dentatis ; bracteis cordatis, reflexis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 269. n°. 111.

Ses tiges sont droites, herbacées, rameuses, blanchâtres, chargées de poils nombreux, glanduleux à leur sommet ; garnies de feuilles pétiolées, opposées, grossières, triangulaires, en cœur à leur base, presque semblables à celles du *eucumis sativus* ; longues de trois pouces, inégalement dentées ; les dentelures de la base plus grandes, presque anguleuses, chargées à leurs deux faces de poils courts, crépus & blanchâtres, rudes, particulièrement en dessous ; les feuilles des rameaux lancéolées ; les inférieures longuement pétiolées ; les supérieures sessiles, velues, pulvérentes.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des rameaux, en verticilles nombreux, distans, composés de six fleurs pendans, supportées par des pédoncules partiels velus & visqueux. Le calice est grossier, campanulé, nerveux, à deux lèvres ; les lèvres écartées, à deux dents, terminées par une épine jaunâtre, roide, courte. La corolle est pubescente en dehors, de la grandeur de celle du *salvia sclarea*. Les semences sont lisses, oblongues, presque globuleuses.

Cette plante croît en Espagne. (Description, ex Vahl.)

Observations. M. Vahl soupçonne qu'on pourrait rapporter à cette plante, plutôt qu'au *salvia barrelieri*, le synonyme de Tournefort, *sclarea folio triangulari, dentato*. Tournef. Inst. R. Herb. pag. 180. ?

### 114. SAUGE barrelière. *Salvia barrelieri*. Edling.

*Salvia foliis inaequaliter dentatis, acuminatis, cordatis, basi angulato-hastatis ; verticillis subnullis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 143. n°. 51.

*Salvia foliis hastato-lanceolatis, inaequalibus, serratis ; caule, folio erecto*. Erling. de *Salvia*, n°. 46.

*Horminum silvestre, majas, hastato-folio ; flore caesa, hispida*. Bartel. Icon. rar. pag. 236. tab. 166.

*Horminum majas, hastato, sive lazathi unguis foliis*. Monf. Hist. 3. pag. 393.

*Sclarea folio triangulari, dentato*. ? Tournef. Inst. R. Herb. 180.

C'est une assez belle plante qui a des rapports par la forme de ses feuilles avec le *salvia canariensis*, qui en diffère par ses corolles & surtout par ses petites bractées.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois à quatre pieds ; elles sont droites, quadrangulaires, velues, divisées en rameaux opposés, droits, étalés, peu nombreux, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, hautes, presque auriculées à leur base ; quelques-unes échancrées en cœur, sinuées, anguleuses, inégalement dentées à leur contour, acuminées à leur sommet, ridées, crippées, amples, vertes à leurs deux faces, légèrement velues, particulièrement à leur face inférieure ; les dernières sessiles, très-étroites.

Les fleurs sont en épis terminaux, composés de verticilles peu distans, de quatre à six fleurs pédonculées, munies de bractées courtes, ovales, caduques, plus courtes que les calices, pubescentes, réfléchies. Le calice est campanulé, strié, velu, ouvert à son orifice en deux lèvres écartées ; la supérieure à trois découpures presque égales, ciliées, très-aiguës ; l'inférieure biseillée, à deux dents aiguës. La corolle est grande, de couleur bleue ; le tube de la longueur du calice, divisé à son orifice en deux lèvres ; la supérieure très-longue, un peu courbée en faux, obtuse à son sommet, velue sur le dos ; l'inférieure écartée, beaucoup plus courte, à trois lobes inégaux, celui du milieu concave ; les semences brunes, arrondies, renfermées dans le fond du calice.

Cette plante croît naturellement en Espagne. ?

### 115. SAUGE argentée. *Salvia argentea*. Linn.

*Salvia foliis oblongis, dentato-angulatis, lenatis ; verticillis summis sterilibus, bracteis concavis*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 72. n°. 36. — Lam. Illust. Gen. vol. 1. pag. 73. n°. 330. — Edling. de *Salvia*, n°. 66. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. n°. 66.

*Sclarea argentea*. Miller, Dict. n°. 15.

*Sclarea ficula, folio argenteo, subrotundo*. Boeth. Lugd. Bar. 2. pag. 163.

*Aethiops tota argentea, cretica, lanuginosa*. Cyp. Cath.

*Salvia orientalis*. Hort. Pailf.

Ses tiges sont droites, glutineuses, presque tomenteuses, garnies de feuilles oblongues ; les inférieures pétioolées, longues de trois à six pouces, presque en cœur à leur base, lanugineuses, dentées ; les dentelures anguleuses ; les supérieures filiformes, lancéolées, dentées, presque rongées.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges en une panicule branchue, visqueuse, pubescente, formée de verticilles à six fleurs ; les supérieures stériles ; les pédoncules partiels très-courts, presque unilatéraux pendant la floraison, munis de bractées ovales, mutiques, concaves, plus courtes que le calice. Celui-ci est de couleur pourpre, velu, visqueux, terminé par des dents mucronées. La corolle est grande, blanche, à deux lèvres ; la lèvre supérieure droite, pubescente, légèrement purpurine.

Cette plante croît dans l'île de Ciotte & dans le Levant.

116. SAUGE diffuse. *Salvia patula*. Desf.

*Salvia foliis radicalibus cordatis, lanatis, sinuato-crenatis ; caule calicibus villosis, glutinosis ; bracteis concavis, mucronatis ; floribus summis evanidis.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 25.

*Salvia viscosa, foliis radicalibus cordatis, dentato-sinuatis ; caulibus scissilis, oblongis ; bracteis valicem aequantibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 116.

*Scalaria lusitanica, glutinosa, amplissimo folio.* Tournef. Inst. R. Herb. — Vaill. Herb.

Quoique très-voisine du *salvia athiopis*, cette espèce s'en distingue par ses tiges, ses calices velus, mais non lanugineux ; par les bractées stériles du sommet des épis, par l'humour visqueuse de ses poils, par les corolles plus grandes.

Ses tiges sont fortes, épaisses, quadrangulaires, à angles mouffes, hautes de deux à trois pieds, d'un vert-blanchâtre, garnies de poils simples, un peu cendrés, glutineux ; divisées en rameaux opposés, étalés, presque paniculés, munis de feuilles amples, pétioolées, opposées ; les radicales étendues sur la terre, ovales, en forme de cœur, sinuées, lacinées, épaisses, armées à leurs bords de quelques dents courtes, aiguës, velues à leurs deux faces, très-tomenteuses & blanches, quelquefois presque glabres, supportées par des pétioles épais, larges, un peu comprimés, canaliculés en dessus ; les feuilles caulinaires, & surtout les supérieures, sont filiformes, plus étroites, oblongues, moins lacinées, aiguës à leur sommet, presque acuminées.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, simples, plus souvent rameux, composés de verticilles d'environ six fleurs, médiocrement pé-

donculées, quelquefois unilatérales, munies de grandes & larges bractées conniventes à leur base, concaves, vertes, ridées, réticulées, presque glabres, ciliées, mucronées à leur sommet ; celles de la partie supérieure des épis sont plus petites, sans fleurs. Les calices sont visqueux, velus, verdâtres, striés, un peu élargis, campanulés, comprimés, à deux lèvres presque égales, obtuses, arrondies, terminées par cinq dents roides, tubulées, spinuliformes. La corolle est blanche, grande, à deux lèvres écartées ; la supérieure aioncée, comprimée, médiocrement recourbée en faucille à son sommet, pubescente, mêlée d'un peu de pourpre ; l'inférieure jaunâtre, plus courte, à trois lobes ; le style saillant hors de la corolle.

Cette plante croît naturellement dans le Portugal. M. Desfontaines l'a recueillie dans les champs incultes de l'Afrique septentrionale. (V. v.)

117. SAUGE blanche. *Salvia candidissima*. Vahl.

*Salvia incana, foliis ovatis, suberoso-dentatis ; verticillis supremis sterilibus ; bracteis ovatis, calice brevioribus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 278. n°. 130.

*Scalaria orientalis, foliis rotundioribus, candidissimis.* Tournef. Coroll. 10.

Cette plante a le port du *salvia scalaria* ; mais elle est entièrement blanche & tomenteuse. Ses tiges sont droites, herbacées, de la grosseur d'une plume d'oie, garnies de feuilles pétioolées, ovales, subéreuses, dentées à leur contour, distantes, insensiblement plus petites, point anguleuses, tomenteuses, particulièrement à leur face inférieure ; les radicales deviennent glabres en vieillissant.

Les fleurs sont disposées en épis rameux, composés de verticilles distants, à deux, trois ou quatre fleurs unilatérales, pédicellées, munies de bractées ovales, plus courtes que les calices ; terminées à leur sommet par une pointe sétacée ; les verticilles supérieurs stériles. Le calice est campanulé, strié, velu, divisé en deux lèvres, la supérieure triside, l'inférieure à deux dents terminées par une pointe sétacée. La corolle est glabre, de la grandeur de celle du *salvia scalaria*, chargée de quelques points rélineux ; les étamines & le style plus longs que la corolle.

Cette plante croît dans l'Arménie. (Ex Herbar. Vaillant.)

118. SAUGE à feuilles de phlomis. *Salvia phlomisoides*. Vahl.

*Salvia foliis lanceolatis, subintegris, cauleque lanato-viscoso.* Vahl, Symbol. 1. pag. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 148. n°. 65. — Idem, Enum. Plant. vol. 1. pag. 278. n°. 31.



*Salvia* (philomoides), *foliis lanceolatis, dentatis, hirsutis, viscidis*. Inrod. in Oryct. Arrag. 158. tab. 4. — Kœmer. Script. Plant. Hisp. Lubr. 10. tab. 1. fig. 1.

Cette espèce est très-voisine du *salvia argentea* : elle paroît n'en différer que par son port, & par ses feuilles point laciniées, plus étroites, à peine sinuées ou simplement dentées, légèrement anguleuses ; elle se distingue du *salvia aethiopis* par ses bractées non réfléchies, & par la viscosité de ses calices & de ses tiges.

Ses tiges sont droites, herbacées, hautes de huit à neuf pouces & plus, quelquefois un peu rameuses, couvertes, ainsi que les autres parties de la plante, d'un duvet lanugineux, épais, tomenteux, visqueux, blanchâtre. La plupart des feuilles radicales sont rétrécies en pétiole, obtuses à leur sommet, souvent dentées, quelques-unes sinuées & dentées, la plupart très-entières, longues de deux pouces ; les feuilles caulinaires opposées, de deux à quatre au plus.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en verticilles de quatre à six fleurs, garnis de bractées en cœur, acuminées, un peu piquantes, réfléchies, mais relevées à leur sommet ; les deux bractées terminales sont stériles & plus petites. Le calice est sillonné, de la longueur des bractées, à cinq dents lancéolées, tubuleuses, point piquantes. La corolle est de la grandeur de celle du *salvia sclarea*.

Cette plante croît en Espagne, dans le royaume d'Arragon. (Description. ex Vahl.)

#### 119. SAUGE d'Autriche. *Salvia austriaca*. Linn.

*Salvia foliis cordato-ovatis, erectis, pinnatifidis, supra nudis; caule, bracteis calicibusque hirsutissimis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 328.

*Salvia foliis ovatis cordatisque, erectis sinuatis; radicalibus petiolatis, caule subaphyllo, flaminibus corollâ duplè longioribus*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 41. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 138. n°. 32.

*Salvia foliis cordato-oblongis, erectis sinuatis; caule subaphyllo, verticillis villosissimis, flaminibus longissimis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 272. n°. 117.

*Salvia* (austriaca), *foliis cordato-ovatis, erectis, ad vras incisæ, vel lobatis, supra nudis; caule, calicibus bracteisque hirsutissimis*. Linn. Syst. veget. edit. Murr. pag. 69. — Jacq. Flor. austr. vol. 2. pag. 8. tab. 112.

*Salvia foliis cordato-oblongis, sinuato-pinnatifidis, erectis; racemis villosissimis; flaminibus longissimis*. Eilng. de *Salvia*, n°. 41.

*Salvia foliis rugosis, ferrato-laciniatis, undulatis;*

*caule ferè nudo; flaminibus longissimis, exsertis*. Crantz, Stirp. austr. pag. 238.

Cette plante, remarquable par ses tiges presque nues, se distingue du *salvia aethiopis* par les bractées plus étroites, très-velues ; par ses feuilles nues à leur face supérieure ; par les longues étamines très-faillantes, ainsi que le pistil.

Ses racines sont épaisses, noires : il s'en élève une tige presque simple, rarement rameuse, droite, quadrangulaire, très-velue, tomenteuse, blanchâtre ou cendrée, haute d'un pied & plus. Les feuilles radicales sont pétioles, ovales, oblongues ou un peu en cœur, planes, épaisses, amples, rugueuses, glabres à leur face supérieure, velues en dessous, particulièrement sur les plus fortes nervures, laciniées, crénelées ou dentées en scie à leurs bords, marquées quelquefois de taches purpurines, soutenues par des pétioles planes, élargis, striés, velus ; les feuilles caulinaires presque nulles, d'une à deux, plus petites, quelquefois presque sessiles, souvent très-laciniées.

Les fleurs forment un épi simple, droit, allongé, très-velu, composé de verticilles distans, surtout les inférieurs ; de quatre à cinq fleurs pédunculées, munies de bractées ovales, médiocrement élargies, acuminées, épaisses, velues, à peine de la longueur des calices : ceux-ci sont campanulés, tomenteux, un peu glutineux, striés, divisés en deux lèvres courtes, peu ouvertes, égales ; la supérieure entière, aiguë ; l'inférieure médiocrement bifide. La corolle est d'un blanc-punâtre, ventrue à la partie antérieure de son orifice, divisée en deux lèvres ; la supérieure comprimée, un peu courbée, échancrée à son sommet, un peu pubescente ; l'inférieure à trois lobes ; les deux latéraux allongés ; celui du milieu ample, un peu concave, échancré à son sommet, un peu ondulé à ses bords. Les étamines sont très-longues, faillantes, arquées ; le pistil au moins de même longueur, un peu coloré.

Cette plante croît dans l'Autriche. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P. v.)

#### 120. SAUGE à fleurs panschées. *Salvia varia*. Vahl.

*Salvia foliis cordatis, inaequaliter crenatis, rugosis, subius caulique incano-tomentoso*. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 275. n°. 119.

*Sclarea orientalis, foliis salviae, flore parvum albo, parvum flavo*. Tournef. Caroll. pag. 10.

Ses tiges sont droites, herbacées, blanchâtres, tomenteuses, garnies de feuilles pétioles, opposées, ovales-oblongues, en cœur à leur base, inégalement crénelées à leur contour, longues de trois pouces & plus, obtuses à leur sommet, ridées à leurs deux faces, blanchâtres & tomen-

teuses en dessous, un peu velues en dessus étant examinées à la loupe; soutenues par des pétioles longs d'un ponce & demi.

Les fleurs sont terminales, réunies, sur des pédoncules ternés, en verticilles à six fleurs sessiles, garnies de bractées en cœur, acuminées, de la longueur du calice: celui-ci est blanchâtre, ainsi que les pédoncules & les bractées; terminé par des dents subulées. La corolle est petite, un peu plus longue que le calice, mêlée de jaune & de blanc.

Cette plante croît dans l'Arménie. (*V. f. in herb. Juss.*)

121. SAUGE céatophylle. *Salvia ceratophylla*. Linn.

*Salvia foliis rugosis, pinnatifidis, lanatis, verticillis summis sterilibus*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 71. n°. 33. — Kniph. Orig. Centur. 6. tab. 78. — Edling. de *Salvia*, n°. 44. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 73. n°. 311. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 148. n°. 63.

*Salvia foliis rugosissimis, lanatis, radicalibus bipinnatifidis; verticillis summis sterilibus*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 279. n°. 132.

*Horminum genus angustis, lanuginosis, profundè fectis foliis*. Rauw. Hodep. 1. c. 9. pag. 129.

*Salvia foliis simplicibus, dentato-pinnatis, asperis*. Hort. Cl. f. 13. — Roy. Lugd. Bat. 308.

*Salvia foliis simplicibus, dentato-pinnatis, rugosis, verrucosis*. Hort. Upf. 10.

*Scalaria ceratophylla*. Miller, Dict. n°. 8.

*Horminum rugoso, verrucosae folio, cornu cervi exprimente*. Pluken. Almag. pag. 186. tab. 194. fig. 5. — Herm. Paradis. 186.

*Horminum annuum, ceratophyllum, rugosum, flore sulphureo*. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 11. tab. 13. fig. 6.

On reconnoît cette espèce à ses feuilles pinnatifides, à ses bractées élargies; les supérieures stériles comme celles du *salvia argentea*, & particulièrement à ses calices presque ovales, sessiles.

Ses tiges sont quadrangulaires, à angles mouffes, droites, rameuses, cannelées, striées, hautes de deux pieds environ, velues, presque lanugineuses. Les feuilles sont opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, profondément laciniées, presque pinnatifides; les découpures étroites, allongées, inégales, épaisses, ridées, un peu verdâtres, velues, lanugineuses à leurs deux faces, un peu finuées ou denticulées à leurs bords, acuminées à leur sommet; les supérieures sessiles, plus étroites.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, dont les ramifications sont alternes ou

opposées, velues, composées d'épis particuliers allongés, grêles, stériles à leur partie supérieure; les verticilles écartés d'environ quatre fleurs, munis de bractées larges, en cœur, conniventes, vertes, presque glabres ou à peine velues, ciliées à leur contour, acuminées, mucronées à leur sommet. Les calices font tubulés, presque ovales à l'époque de la maturité des semences, striés, un peu velus, de la longueur des bractées, terminés à leur orifice par cinq dents inégales, roides, presque épineuses. La corolle est blanchâtre ou d'un pourpre-violet, médiocre; le tube à peine de la longueur du calice, divisé à son orifice en deux lèvres écartées; la supérieure arquée, comprimée, légèrement velue sur le dos; l'inférieure plus courte, trifide; les deux découpures latérales courtes, obtuses; l'intermédiaire plus grande, à trois lobes.

Cette plante croît naturellement dans la Perse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (*V. v.*)

122. SAUGE à feuilles chagrinées. *Salvia exasperata*. Cavan.

*Salvia foliis rugosis, exasperatis; radicalibus bipinnatis, petiolatis; superioribus pinnatis, fissilibus, connatis; caule paniculato, ramossissimo*. Cavan. Icon. rar. vol. 6. pag. 38. n°. 639. tab. 558. — Annales d'Hist. Nat. vol. 2. pag. 113.

Cette plante est très-voisine, & à peine distincte du *salvia ceratophylla*.

Ses tiges sont tétragones, à quatre fillons opposés; velues & revêtues d'un duvet blanchâtre, d'un rouge-foncé, hautes d'environ un pied, munies de rameaux longs, opposés, visqueux, ramifiés. Les feuilles radicales & intérieures sont opposées, presque longues d'un pied, deux fois aîlées; les pinnules linéaires, obtuses, soutenues par des pétioles rougeâtres, très-tomenteux, réunis par leur base; les feuilles des rameaux sessiles, simplement aîlées; la pinnule terminale plus longue; les autres insensiblement plus petites à mesure qu'elles se rapprochent de la base, toutes d'un vert-foncé à leur face supérieure, & couvertes d'un grand nombre de points saillans, qui forment autant de vides à la face inférieure.

Les fleurs sont paniculées, disposées par verticilles de quatre à six fleurs, munies de bractées en cœur, aiguës, très-entières, concaves, ordinairement plus courtes que le calice: celui-ci est velu, verdâtre, à deux lèvres; la supérieure trifide; les découpures aiguës; l'inférieure à deux découpures très-profondes, lancéolées, très-aiguës; la corolle longue d'environ un ponce, d'un blanc-pâle; le tube relevé en bolle à sa partie supérieure, un peu comprimé; la lèvre supérieure concave, échancrée, un peu livée de

roso

rose en dedans, velue en dehors; l'inférieure à trois-lobes; les deux latéraux droits, plus courts, plus étroits; celui du milieu large, concave, éhancré; les filaments un peu plus courts que la corolle; les anthères brunes & oblongues; le style simple, glabre; les stigmates divergens, inégaux; quatre semences ovales.

Cette plante, qu'on soupçonne originaire d'Égypte, est cultivée dans le Jardin botanique de Madrid. (*Descript. ex Cavan.*)

123. SAUGE laciniée. *Salvia ceratophyllodes*. Linn.

*Salvia foliis laciniato-pinnatifidis, rugosis, villosis; calicibus obtusis, villosis-lanatis*. Lam. Illustr. Plant. vol. 1. pag. 72. n°. 332.

*Salvia foliis pinnatifidis, rugosis, petiolatis; verticillis omnibus fertilibus, hirsutissimis*. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 279. n°. 133.

*Salvia foliis pinnatifidis, rugosis, villosis; caule paniculato, ramosissimo*. Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 72. n°. 37. — Mantiss. 26. — Erting. de Salvia, n°. 45. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 151. n°. 72.

*Salvia*. Arduin, Spec. 2. pag. 12. tab. 2.

Cette plante a des rapports avec la *salvia ceratophylla*; mais outre qu'elle s'élève bien moins, ses feuilles sont beaucoup plus étroites, pileuses, & non couvertes d'un duvet lanugineux & crépu; ses calices plus courts, point ovales; les épis fertiles dans toute leur longueur.

Ses racines sont grêles, brunes, simples, fusiformes; elles poussent une tige presque simple, droite, haute de huit à dix pouces, grêle, tétragone, striée, rameuse dès sa base, chargée de poils réfléchis. Les feuilles radicales sont très-nombreuses, touffues, étendues en rosette sur la terre, pétiolées, très-étroites, lancéolées, fortement ridées, épaisses, lacuneuses, médiocrement velues, déchiquetées, irrégulièrement laciniées, presque pinnatifides; les pinnules courtes, inégales, simples ou sinuées, obtuses; les feuilles supérieures sessiles, opposées, presque linéaires, peu nombreuses, médiocrement laciniées, ondulées, pileuses à leurs bords.

Les épis sont droits, terminaux, simples ou rameux, à rameaux opposés; les verticilles écartés, presque globuleux, peu nombreux, munis de bractées ovales, opposées, acuminées, plus courtes que les calices, striées, velues, ciliées, entières à leurs bords. Les calices sont courts, campanulés, obtus, velus, presque lanugineux dans leur jeunesse, à deux lèvres courtes, comprimées; la supérieure entière, arrondie; l'inférieure bifide, à deux dents lancéolées, très-aiguës. La corolle

Botanique. Tome VI.

est petite; les semences brunes, globuleuses, un peu ovales.

Cette plante croît naturellement dans la Sicile, en Égypte. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. n°. (V. v.)

124. SAUGE ailée. *Salvia pinnata*. Linn.

*Salvia foliis pinnatis, erenatis; foliolo impari-majore; calicibus inflatis, obtusis, hirsutissimis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 333.

*Salvia foliis lyrato-pinnatis*. Linn. Syst. veget. pag. 67.

*Salvia foliis pinnatis, pinnis serratis*. Erting. de Salvia, n°. 14. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. n°. 68.

*Salvia hirsuta, viscosa, foliis interruptè pinnatis; foliolis oblongis, erosis, inaequaliteratis; calicibus inflatis*. Vahl, Enumer. Plant. vol. 1. pag. 226. n°. 12.

*Salvia foliis compositis, pinnatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 39. — Hort. Clifort. 13. — Royen, Lugd. Bat. 309. — Miller, Dict. n°. 7.

*Salvia orientalis, latifolia, hirsutissima, viscosa, pinnata, flore & calice purpureis, inodora*. Boeth. Lugd. Bat. 1. pag. 167. tab. 167.

*Salvia orientalis, foliis alatis, obscurè virentibus, odore salvia vulgaris*. Tourn. Coroll. 11. secundum Herbar. Vailantii.

Cette espèce a de grands rapports avec la *salvia ceratophylla* & la *salvia ceratophyllodes*, mais distinguée de l'une & de l'autre par ses feuilles ailées & non pinnatifides, ayant la foliole terminale beaucoup plus grande que les autres, & de petites bractées, des calices tendus, très-velus, entiers, presque tronqués.

Ses tiges sont basses, presque couchées, quadrangulaires, à angles tranchants, velues ou pileuses, presque simples, verdâtres, striées, visqueuses, garnies de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, lancéolées, ailées, composées de sept à neuf folioles inégales, presque opposées, pétiolées, ovales, obtuses à leur sommet, crénelées à leurs bords, chargées à leurs deux faces, particulièrement sur les nervures, de poils fins, alongés, centrés; la foliole terminale très-grande, ovale, simple, ou quelquefois un peu laciniée; les pétioles comprimés, pileux; les feuilles terminales, petites, presque entières.

Les fleurs sont disposées en un épi droit, simple ou médiocrement rameux, velu, composé de verticilles distans, épais, munis de bractées très-caduques, petites, ovales, presque orbiculaires, un peu blanchâtres, velues, ciliées. Les calices sont très-velus, visqueux, ovales, renflés, com-

LIII

primés à leur orifice, enriens, presque tronqués à leurs bords. La corolle est blanche ou un peu purpurine, d'une grandeur médiocre; le tube à peine aussi long que le calice, divisé à son orifice en deux lèvres écartées, de même longueur, un peu velues sur leur dos; la supérieure droite, obtuse; l'inférieure à trois lobes; les étamines de la longueur de la corolle; le style plus long que la lèvre supérieure, un peu courbé; le stigmate à deux divisions courtes.

Cette plante croît dans l'île de Crète & dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

115. SAUGE du Japon. *Salvia japonica*. Thunb.

*Salvia foliis inferioribus bipinnatis, foliis ovatis, serrato-dentatis; supremis indivisis, lanceolatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 229. n°. 16.

*Salvia foliis bipinnatis, glabris.* Thunb. Flor. japon. pag. 22. tab. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 150. n°. 71. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 335.

*Tjigugsa*. Kempt. Amoen. Fasc. 5. pag. 887.

Cette espèce, voisine du *salvia pinnata*, en diffère par ses feuilles inférieures deux fois ailées, par ses tiges nues, glabres à leur partie inférieure, par ses fleurs paniculées.

Ses tiges sont simples, droites, glabres, tétragones, marquées de quatre sillons, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles opposées; les inférieures pétiolées, deux fois ailées, glabres; les folioles légèrement pétiolées, ovales, sinuées & dentées à leurs bords, aiguës à leur sommet; les feuilles supérieures bien moins pétiolées, simplement ailées; les dernières lancéolées, enriens.

Les fleurs sont disposées en épis paniculés; la panicule trichotome, composée de verticilles rapprochés, d'environ cinq fleurs; les bractées glabres, lancéolées. Le calice est hispide, à deux lèvres, à cinq dents; la corolle tubulée, de couleur rouge, velue en dehors, une fois plus longue que le calice; elle renferme deux filaments simples, inférés sur le tube, & plus longs que la corolle. Les anthers sont arquées; le style filiforme, plus long que la corolle, terminé par deux stigmates.

Cette plante croît au Pérou. (Description, ex Thunberg.)

116. SAUGE à feuilles de scabieuse. *Salvia scabiosifolia*. Lam.

*Salvia foliis pinnatis, pinnulis bipartitis, subdentatis; verticillis spicatis, lobis reflexis.* Lam. Journ. d'Hist. natur. n°. 14. pl. 27.

*Salvia foliis pinnatis, foliis linearilanceolatis, integerrimis; bracteis ovatis, attenuatis, calicis*

*aguantibus.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 228. n°. 15.

3. *Salvia (tenuifolia), foliis angustissimis, inferioribus subbipinnatis.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 228.

Ses tiges sont ascendantes, redressées, hautes d'environ un pied & demi, presque herbacées, tétragones, à angles mouflés, médiocrement rameuses. Les feuilles sont opposées, ailées, assez semblables à celles du *scabiosa columbaria*; les pinules linéaires, lancéolées, entières ou rarement dentées, quelquefois à deux ou trois divisions, molles, pubescentes, d'un vert-blanchâtre.

Les fleurs forment un épi presque nu & terminal, composé de verticilles peu distans, de six à huit fleurs médiocrement pédonculées, garnies de bractées ovales, acuminées, de la longueur des calices, à peine concaves, velues. Les calices sont presque campanulés, pubescens, ciliés, un peu comprimés à leurs côtes, divisés à leur orifice en deux lèvres; la supérieure plus grande, obtuse, munie de trois petites dents à peine sensibles; l'inférieure plus courte, bispide. La corolle est blanche, assez ample, deux fois plus longue que le calice; son tube est renflé; il se divise à son orifice en deux lèvres inégales; la supérieure plus courte, un peu comprimée, concave, entière, presque droite; l'inférieure beaucoup plus grande, pendante, d'un pourpre-clair, marquée à sa base de lignes purpurines bien plus foncées; elle se divise en deux grands lobes arrondis, garnis à leur base latéralement d'un petit dent de chaque côté.

La plante est une variété de la précédente, qui en diffère par ses feuilles très-étroites; les inférieures presque deux fois ailées, ou les pinules souvent à trois divisions, ayant presque le port du *scabiosa columbaria*. Les calices & les dents sont plus grands & moins velus; les corolles plus grandes; elle paraît avoir de très-grands rapports avec le *salvia pinifolia* de Pallas.

Cette plante croît naturellement dans le Levant. (V. f. in herb. Lam.)

117. SAUGE à feuilles d'anthyllis. *Salvia vulnerariaefolia*. Willd.

*Salvia foliis pinnatis, integerrimis; foliis terminali, maxima.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 149. n°. 67.

*Salvia orientalis, foliis alatis, amplioribus, non crenatis; odore mari.* Tournef. Coroll. pag. 11.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le *salvia pinnata*; elle en diffère par la forme de ses pinules très-entières, & qui ressemblent beaucoup à celles de l'*anthyllis vulneraria*. D'après M. Vahl, cette plante ne diffère pas du *salvia f.*

*biophysolia*. Ne connaissant point la plante de Willdenow, nous nous bornons à en rapporter ce qu'il en dit.

Ses tiges sont droites, presque cylindriques, glabres inférieurement, pubescentes à leur partie supérieure, garnies de feuilles grandes, opposées, pétioles, ailées; les inférieures composées de cinq folioles; les supérieures ternées; les folioles latérales pétioles, lancéolées, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, veinées, pubescentes à leurs deux faces; la foliole terminale une fois plus grande & plus longue que les autres, oblongue, veinée, obtuse, très-entière.

Les fleurs sont disposées en épis alongés, à l'extrémité des tiges, composés de verticilles médiocrement distans, pourvus de feuilles, munis de bractées ovales, acuminées, très-entières, caduques.

Cette plante croît naturellement dans le Levant. *¶ (Descript. ex Willd.)*

128. SAUGE de la Taurique. *Salvia habitziana*. Willd.

*Salvia foliis pinnatis, integerrimis; foliis lanceolatis, subsqualibus; superioribus geminatis.* Willd. Journ. botan. Shrad. 1799, pag. 289. tab. 2.

*Salvia foliis linearibus, integerrimis, pubescentibus, sessilibus; floribus verticillato-spicatis; bracteis ovatis, acuminatis.* Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 129. n°. 6.

*Salvia taurica.* Hablitz, Taur. pag. 207. n°. 33.

C'est une très-belle espèce, dont les tiges sont droites, pubescentes, tétragones, garnies de feuilles pétioles, opposées, ailées, très-entières; les folioles lancéolées, linéaires, très-étroites, glabres à leur face supérieure, pubescentes en dessous.

Les fleurs forment des épis droits, terminaux, composés de verticilles munis chacun de deux bractées opposées, ovales, acuminées, plus longues que les calices; ceux-ci ressemblent aux calices du *salvia officinalis*, mais ils sont plus grands, de couleur verte. La corolle est bleuâtre, de même forme, plus ample que celle du *salvia officinalis*; souvent il sort deux rameaux feuillés de l'aisselle des feuilles supérieures.

Cette plante croît dans la Chersonèse Taurique. *¶ (Descript. ex Willd.)*

Nota. M. Vahl regarde cette espèce comme la même que le *salvia scabiosifolia*. Willdenow, qui en parle deux fois, lui attribue, dans ses deux phrases spécifiques, deux caractères différens. Comme je n'ai pu consulter le journal où il la cite pour la seconde fois, j'ignore ce qu'il en dit pour justifier sa dernière description.

129. SAUGE à feuilles de rose. *Salvia rosfolia*. Smith.

*Salvia foliis pinnatis, incanis; foliis ferratis, calicibus ringentibus.* Smith, Icon. med. Fasc. 1. pag. 5. tab. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 150. n°. 70. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 73. n°. 334.

*Salvia orientalis, foliis alatis, minoribus & crentis; odore mari.* Tournef. Coroll. pag. 11.

*Salvia foliis ebuli.* Buxbaum, Centur. 2. pag. 41. tab. 46.?

Ses tiges sont basses, presque ligneuses, blanchâtres, cylindriques, chargées de poils blancs & rares, un peu rameuses, garnies de feuilles opposées, pétioles, ailées, médiocrement pétioles, en ovale renversé, nerveuses, dentées en scie vers leur sommet; l'impair un peu plus grande; le pétiole commun canaliculé.

Les épis sont terminaux, composés de verticilles peu distans; les inférieurs munis de deux bractées foliacées, entières; les fleurs presque sessiles, ayant chacune à leur base une bractée ovale, aiguë, entière, blanchâtre, plus courte que le calice; celui-ci est strié, divisé en deux lèvres à son orifice; la supérieure à trois dents; l'inférieure à deux dents très-profondes, toutes très-aiguës, presque épineuses. La corolle est de couleur purpurine, une fois plus longue que le calice, tubulée, renflée & ventrue à son orifice, divisée à son limbe en deux lèvres; la supérieure concave, écharcée à son sommet, velue en dehors; la lèvre inférieure ample, élargie, ondulée. Le style est recourbé, un peu plus long que la lèvre supérieure de la corolle; le stigmate bifide, aigu.

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été découverte par Tournefort. *¶ (Descript. ex Smith, & herb. Tournesf.)*

130. SAUGE à fleurs incarnates. *Salvia incarnata*. Etlinger.

*Salvia foliis pinnatis, ferratis; caulibus procumbentibus, hirsutis.* Etling. de Salvia, n°. 15. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 150. n°. 69.

*Horminum chalcense, alato foliis; flore majore, rubicundo.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 394. 5. 11. tab. 13. fig. 19.

*Horminum arabicum, alatis foliis, flore rubello.* Pluken. Almag. pag. 186. tab. 194. fig. 6.

*Salvia (bracteata), foliis pinnatis, hirsutis; calicibus laevibus subulatis; bracteis foliaceis, calice longioribus; verticillis multifloris.* ? Russ. Hist. Nat. Alep. Vett. Germ. vol. 2. pag. 145.

Quoique très-rapprochée du *salvia rosfolia*,  
L 111 2

cette espèce en est distinguée par la forme de ses folioles, par celle de ses feuilles, & par ses longues bractées lancéolées.

Ses tiges sont couchées, quadrangulaires, quelquefois relevées, hautes d'un à deux pieds, garnies de feuilles opposées, pétioles, ailées, les inférieures composées de cinq à sept folioles; les supérieures ternées, ovales, oblongues, dentées en scie à leur contour, aiguës, un peu acuminées à leur sommet; la foliole terminale plus grande, obuse ou aiguë; les latérales étroites, sessiles, un peu pubescentes à leur face inférieure; les pétioles allongés, un peu velus; les deux feuilles terminales sessiles, simples, étroites.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux, droits, allongés, composés de verticilles épais, distans, de quatre à six fleurs, munies de bractées opposées, lancéolées, beaucoup plus longues que les calices, entières, souvent réfléchies. Les calices sont presque campanulés, à cinq divisions inégales, lancéolées, aiguës. La corolle est grande, d'une belle couleur incarnate; le tube renflé à la partie qui saille hors du calice, divisé à son orifice en deux lèvres écartées. Les semences sont noirâtres, arrondies.

Cette espèce croît dans plusieurs contrées de l'Orient. ✕

131. SAUGE à feuilles interrompues. *Salvia interrupta*, Schousb.

*Salvia foliis interrupte pinnatis; caule frutescente, erecto*, Schousb. Pl. Maroc. pag. 6. tab. 1.

Ses tiges sont simples, droites, frutescentes, hautes de trois à quatre pieds, glabres inférieurement, velues à leur partie supérieure & sur les rameaux, garnies de feuilles pétioles, ailées, à folioles inférieures très-carrées, oblongues, rugueuses, un peu aiguës, crénelées, velues, blanches & tomenteuses en dessous; la terminale une fois plus grande que les autres: il existe entre chaque paire de folioles, deux ou trois autres paires extrêmement petites, ovales, arrondies.

Les fleurs sont terminales, disposées par verticilles écartés, composés chacun d'environ six fleurs médiocrement pédonculées, munies de trois bractées plus courtes que le calice. Les deux latérales sont courtes, ovales, obuses; celle du milieu plus longue, acuminée. Le calice est ample, ouvert, à deux lèvres velues, visqueuses, glanduleuses; la supérieure à trois dents, l'inférieure bident.

La corolle est grande, blanche ou bleuâtre, dont le tube, à peine plus long que le calice, se divise en deux lèvres très-ouvertes; la supérieure est droite, lancéolée, obuse, bident, velue en dehors, chargée de points noirs, glanduleux; l'in-

férieure est plus longue, à trois divisions; les latérales sont oblongues, planes, entières; celle du milieu plus allongée, grande, arrondie, échancrée & quelquefois crénelée. Les anthers sont brunes, le pollen blanc; le stigmate bifide & bleuâtre: souvent deux des quatre semences avortent; elles sont noires, un peu globuleuses & luisantes.

Cette plante est voisine du *salvia pinnata*; mais cette dernière est herbacée, & ses folioles sont ovales, arrondies, obuses.

On rencontre cette espèce dans l'empire de Maroc; elle répand une odeur forte & désagréable. b

132. SAUGE en coupe. *Salvia acetabulosa*, Linn.

*Salvia foliis inferioribus, trifoliatis; foliolo impari majore; verticillis remotis, subspectatis; calicibus campanulatis, patentibus*, Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 336.

*Salvia foliis oblongis, crenatis, rugosis; inferioribus ternatis, superioribus simplicibus; calicibus campanulatis, patentibus*, Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 227. n°. 13.

*Salvia foliis obovatis, dentatis; calicibus campanulatis, patentibus, pilosis; caule fruticoso*, Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 70. n°. 30. — Mantiss. 25. — Etling, de *Salvia*, n°. 6. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n°. 58.

*Salvia foliis ovatis, calice turbinato, limbo amplissimo*, Gronov. Virgin. 10.

*Salvia friana, cisti semina foliis, acetabulis molucca*, Morif. Hist. 3. pag. 399.

*Salvia peregrina Rauwolfii*, Gefn. apud. Schmid. edit. 1. pag. 121. tab. 12. fig. 103.

*Salvia orientalis, frutescens, foliis circinnatis, acetabulis molucca*, Tournef. Coroll. pag. 10. — Salbey, Rauwolf, Hod. 1. pag. 121.

Ses tiges sont ligneuses, divisées en rameaux courts, pileux, ascendants, ouverts, garnis de feuilles ovales; les inférieures pétioles, ailées, composées de trois folioles oblongues, en ovale renversé, dentées à leur partie inférieure, tomenteuses en dessous; la foliole impaire beaucoup plus grande que les deux autres qui sont fort petites. Les feuilles supérieures sont simples, sessiles, ovales, lancéolées.

Les fleurs sont disposées en épis terminaux & axillaires, droits, allongés, composés de verticilles écartés, visqueux, contenant six fleurs, quelquefois huit, trois ou quatre de chaque côté, supportées par des pédoncules courts, munies de bractées ovales, en cœur, très-entières, acuminées à leur sommet, un peu plus courtes que les calices, caduques, opposées. Les calices sont cam-

panulés, très-ouverts, semblables à ceux du *molucella* ou du *marrubium pseudo-silvestris*, divisés en deux lèvres à leur orifice; la supérieure à deux lobes élargis, pileux extérieurement; l'inférieure à trois lobes inégaux. La corolle est blanche, plus grande que le calice, partagée en deux lèvres écartées; la supérieure droite, allongée, bifide, étalée, point arquée; l'inférieure à trois lobes, le lobe du milieu plus grand que les latéraux; les étamines aussi longues que la corolle; le style une fois plus long que la lèvre supérieure.

Cette plante croît dans le Levant.  $\gamma$  ( *V. f. in herb. Lam.* )

133. SAUGE de Forskall. *Salvia Forskalei*. Linn.

*Salvia foliis lyrato-auriculatis, caule subaphyllo; corollâ gateâ semibifidâ*. Linn. Syll. Plant. vol. 1. pag. 72. n°. 38. — Mantiss. pag. 26. — Erling. de *Salvia*, n°. 26. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 73. n°. 337. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 151. n°. 73.

*Salvia* (bifida), foliis radicalibus, hastato-lyratis, dentatis, hispida. Forskh.

Cette sauge a beaucoup de rapports avec la *salvia nutans*, surtout par son port; elle en diffère par ses feuilles auriculées en forme de lyre, par ses épis droits.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, tétragones, velues, peu garnies de feuilles, quelquefois nues, divisées ordinairement en deux rameaux opposés. Les feuilles radicales sont pétiolées, ovales, en forme de lyre; les lobes sinués, crénelés à leur contour, obtus à leur sommet, verts à leurs deux faces, velus; les deux lobes inférieurs beaucoup plus petits que les autres.

Les tiges & les deux rameaux sont chargés de fleurs dans toute leur partie supérieure, disposées en épis composés de verticilles de trois à cinq fleurs à chacun des deux fascicules opposés, médiocrement pédonculées, munies de bractées plus courtes que le calice, très-entières, en forme de cœur, aiguës. Les calices sont chargés de poils visqueux, divisés en deux lèvres à leur orifice. La corolle est de couleur bleue, trois fois plus grande que le calice, partagée en deux lèvres; la supérieure courbée en faux, velue, hispide, glanduleuse, glauque, bifide ou à deux lobes rabattus à leur sommet; l'inférieure à trois divisions, marquée de quelques taches violettes; la division du milieu plus grande, à deux lobes crénelés à leur contour; le style une fois plus long que la corolle.

Cette plante croît dans le Levant, au milieu des prés, aux environs de Constantinople.  $\gamma$

134. SAUGE penchée. *Salvia nutans*. Linn.

*Salvia foliis cordatis, obsoletè quinquelobis, erectis; caule subrotundo, racemis nutantibus*. Erling. de *Salvia*, n°. 47. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 151. n°. 74.

*Salvia foliis cordatis, inaequaliter basi excisis; caule subnudo, spicis ante florescentiam cernuis*. Linn. Spec. Plant. pag. 39. — Kniph. Centur. 7. tab. 79. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 74. n°. 338.

*Salvia foliis cordatis, obtuse crenatis; spicis florum nutantibus*. Nov. Act. Petrop. vol. 1. pag. 378. tab. 14.

*Salvia caule nudo, spicis florentes pendulâ*. Haller, Comm. Gœtt. 1. pag. 210. tab. 11.

$\beta$ . *Salvia* (betonicifolia), foliis lanceolatis, crenatis; caule subnudo, racemis cernuis. Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 281. n°. 136. — Erling. de *Salvia*, n°. 49.

*Salvia* (acutifolia), cordato-lanceolatis, acutis, crenatis; spicis cernuis, nudis; bracteis brevissimis. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 683. ?

On distingue cette espèce du *salvia Forskalei*, à ses épis inclinés, surtout avant l'entier développement des fleurs; à ses feuilles médiocrement incisées ou lobées, mais non pas en lyre; à ses tiges moins nues, munies de deux ou trois paires de feuilles distantes.

Ses tiges sont droites, hautes d'un pied & plus, presque quadrangulaires, striées, pubescentes, rugées au toucher, un peu blanchâtres ou cendrées, très-simples, très-rarement ramifées. Les feuilles radicales & inférieures sont longuement pétiolées, allongées, lancéolées, élargies, presque hautes, tronquées ou échancrées en cœur à leur base, vertes à leur face supérieure, pubescentes, blanchâtres, presque tomenteuses en dessous, médiocrement lobées, ou légèrement & irrégulièrement incisées à leur contour, acuminées à leur sommet; les feuilles supérieures & caulinaires sessiles, opposées, lancéolées, presque glabres.

Les fleurs sont terminales, disposées en une sorte de panicule composée d'épis opposés, inclinés, blanchâtres, pubescents, garnis de verticilles peu distants, de six ou huit fleurs sessiles, serrées, munies de bractées fort petites, un peu ovales, acuminées, caduques. Les calices sont courts, tubulés, striés, rugés, hérissés, divisés à leur orifice en deux lèvres courtes; la supérieure à trois dents aiguës; l'inférieure presque de même longueur, légèrement bifide. La corolle est petite, d'un bleu-foncé; le tube plus court que le calice; les deux lèvres presque de même longueur; la supérieure droite, à peine recourbée vers son sommet; l'inférieure élargie, à trois lobes; les étamines de la longueur de la corolle;

le pistil un peu saillant; le stigmate à deux divisions très-courtes.

Cette plante croît naturellement dans la Russie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v)

*Observations.* La plante a de si grands rapports avec celle-ci, qu'il est difficile de l'en séparer. Ses tiges n'ont que des feuilles radicales & inférieures; les premières longuement pétiolées, lancéolées, inégalement découpées ou crénelées à leurs bords, obtuses; les autres un peu aiguës, ridées, lisses en dessus, légèrement pubescentes en dessous. Il paroît qu'il convient de rapporter à la même plante le *salvia acutifolia* de M. Lamarck.

135. SAUCE haflée. *Salvia haflata*. Etling.

*Salvia foliis haflato-lanceolatis, crenatis; caule subnudo, racemis cernuis.* Etling. de *Salvia*, n°. 48.—Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 151. n°. 75.—Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 280. n°. 135.

Cette espèce a des rapports avec le *salvia nutans*. Ses tiges sont droites, à angles mouflés, pubescentes, rameuses, feuillées seulement à leur partie inférieure. Les feuilles du bas sont haflées, lancéolées, inégalement découpées, à trois pointes inégales à leurs deux lobes inférieurs, doublement crénelées, un peu aiguës, ridées, glabres en dessus, légèrement pubescentes en dessous, soutenues par des pétioles élargis; les feuilles situées à la base des rameaux, sont petites, étroites, lancéolées, échancrées en cœur, presque entières, pubescentes.

Les fleurs sont disposées en grappes, les unes latérales, d'autres terminales, droites en partie, un peu recourbées en dehors, composées de verticilles à six fleurs, munies de bractées plus petites que les calices, nerveux, en cœur, aiguës, pubescentes. La corolle ressemble à celle du *salvia nutans*.

Le lieu natal de cette plante est inconnu. (Description ex Etling.)

136. SAUCE pendante. *Salvia pendula*. Vahl.

*Salvia foliis cordato-lanceolatis, crenulatis; racemo nutante.* Vahl, Enum. Plant. vol. 1. pag. 281. n°. 137.

*Salvia nutans*. Walldt.

Cette plante diffère du *salvia nutans* par ses feuilles point decurrentes sur leur pétiole, point échancrées à leur base; par leurs crénelures égales, & par les grappes de fleurs courtes & solitaires.

Ses tiges sont droites, simples, hautes d'un pied & demi, tétragones, à angles tranchans, pubescentes, marquées de plusieurs lignes purpurines. Les feuilles radicales sont nombreuses, en cœur,

lancéolées; celles des tiges au nombre de deux ou trois paires, distantes, pétiolées, larges d'un pouce, longues de deux ou trois pouces; les supérieures plus étroites, en cœur, mais point échancrées, régulièrement crénelées, glabres à leur face supérieure, velues en dessous, obtuses.

Les fleurs sont disposées en une grappe solitaire, terminale, longue de trois pouces, pendante avant la floraison, redressée ensuite, composée de verticilles à six fleurs, munie de bractées en cœur, acuminées, de la longueur du calice, ciliées, colorées. Le calice est libre, à deux lèvres; la supérieure obtuse, à trois dents mouflées; l'inférieure à deux dents aiguës. La corolle est de couleur violette, de la grandeur de celle du *salvia silvestris*; sa lèvre supérieure comprimée, un peu pubescente, marquée de petits points blanchâtres; la lèvre inférieure à trois découpures; celle du milieu arrondie, comprimée, concave, très-entière; les deux latérales linéaires, obtuses, un peu redressées; le style saillant hors de la lèvre supérieure.

La patrie de cette plante n'est pas bien connue: on la soupçonne originaire de la Russie. Elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. ♀ (V. v)

\* Espèces moins connues ou douteuses.

\* *Salvia* (aurita), villosa; foliis ovatis, dentatis, auriculatis; floribus verticillato-spicatis. Linn. f. Suppl. pag. 88.

Cette espèce, qui croît au Cap de Bonne-Espérance, paroît se rapprocher du *salvia canariensis*. Elle est velue; ses feuilles sont ovales, auriculées à leur base, dentées à leur contour. Les fleurs sont disposées en épis verticillés.

\* *Salvia* (scabra), foliis lyratis, dentatis, rugosis; caule paniculato-ramoso. Linn. f. Suppl. pag. 89.

Cette sauge a des feuilles découpées en lyre à leurs bords, scabres, ridées; ses tiges se divisent à leur partie supérieure en rameaux paniculés. Elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Salvia* (rugosa), foliis cordatis, oblongo-lanceolatis, eroso-crenatis, rugosis, pilosiusculis; flaminibus corollâ brevioribus. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 42.

Cette espèce, qui croît au Cap de Bonne-Espérance, a de tels rapports avec le *salvia diffusa*, qu'elle n'en paroît être qu'une variété. Elle n'en diffère presque par ses éminences plus courtes, qui parviennent à peine à l'orifice du tube de la corolle. Les fleurs sont blanches; les feuilles oblongues, lancéolées, échancrées en cœur à leur base, ridées & munies de quelques poils, rongées & crénelées à leur contour.

\* *Salvia* (collinea), foliis cordatis, acutis, sub-



*tus mollissimè tomentosis; racemo terminali-verticillato.* Murr. Comment. Goett. 1778. tab. 1.

Ses feuilles sont ovales, en forme de cœur à leur base, aiguës, garnies à leur face inférieure d'un duvet tomenteux, très-mou. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en grappes composées de verticilles.

\* *Salvia* (spielmanni), *caule ramisque verticillato terminalibus, flore medio erecto, ceteris horizontaliter patentibus.* Scopol. Del. Infr. 3. pag. 31. tab. 15.

\* *Salvia* (obtusata), *villosa; foliis ovatis incisis, crenatis; ramis flexuosis.* Thunb. Prodrum. Flor. capenf. 97.

Ses tiges sont herbacées, velues; ses feuilles ovales, incisées, ciliolées, velues; les rameaux sont flexueux. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Salvia* (triangularis), *villosa-hispida; foliis triangularibus, dentatis; ramis patulis.* Thunb. Prodrum. Flor. capenf. pag. 96.

Elle se rapproche du *salvia canariensis*. Toutes ses parties sont chargées de poils hérissés; ses feuilles sont triangulaires, dentées à leur contour; ses tiges herbacées, divises en rameaux étalés. On trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

SAULE. *Salix*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des amentacées, qui a de grands rapports avec les peupliers, & qui comprend des arbres ou arbustes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont disposées en chatons axillaires ou terminaux, renfermés pendant leur jeunesse dans une écaille simple, en forme de coiffe.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Dans fleurs dioïques, disposées sur des chatons chargés d'écailles imbriquées, à une seule fleur. Dans les fleurs mâles, deux étamines (quelquefois de 1 à 5) sous chaque écaille le rudiment d'un ovaire en forme de glande. Dans les fleurs femelles, deux stigmates; une capsule uniloculaire, à deux valves, polysperme; les semences aigrettées à leur base.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles offrent :

1°. Un chaton commun, oblong, couvert d'écailles imbriquées de toutes parts, renfermé avant son épanouissement dans une écaille simple. Chaque écaille continue le calice pour chaque fleur.

2°. Point de corolle.

3°. Deux étamines (quelquefois d'une à cinq), dont les filaments sont droits, filiformes, plus longs que le calice, terminés par des anthères à deux lobes, à quatre loges.

Le rudiment d'un ovaire constitué par une glande fort petite, cylindrique, tronquée, située dans le centre de chaque fleur.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un chaton semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Un ovaire ovale, rétréci à son sommet en un style très-court, à peine plus long que l'écaille calicinale, terminé par deux stigmates droits, bifides.

Le fruit est une capsule ovale, subulée, à une seule loge, à deux valves réfléchies en dehors après la maturité des semences. Celles-ci foliaires, ovales, fort petites, enfoncées à leur base par une aigrette simple & velue.

Observations. J'ai exposé, à l'article PEUPLIER, la différence qui existoit entre ce genre & celui des saules, différence peu sensible dans les parties de la fructification, mais très-remarquable entre les autres parties de ces deux genres, surtout dans leur port, celui des peupliers renfermant de très-grands arbres, celui des saules n'étant presque composé que d'arbrisseaux, parmi lesquels se rencontrent les plus petits des végétaux ligneux connus.

Les saules forment un genre très-naturel, mais qui offre de si grandes difficultés pour la détermination des espèces, que tous les botanistes qui en ont traité, se sont désespérés de l'impossibilité de pouvoir les caractériser convenablement. Je ne peux pas espérer un plus heureux succès de mon travail, n'ayant pu le faire en partie que d'après leurs propres recherches, en partie d'après des plantes conservées en herbier, ou d'après quelques observations sur la nature vivante, mais qui ne portent que sur un certain nombre d'espèces.

On conçoit que ce n'est pas d'après des individus desséchés dans les herbiers, que l'on peut décrire exactement des arbres, surtout quand ces arbres sont dioïques, & qu'il s'agit d'y chercher les individus mâles & femelles, où souvent manque l'un ou l'autre. L'apparition des fleurs avant les feuilles, dans un grand nombre d'espèces, est une autre source de difficultés. Enfin, ces plantes varient tellement selon la nature du sol & de l'exposition où elles se trouvent, que la culture, qui en multiplie encore les variétés, augmente souvent les difficultés, bien loin de les lever. Ce n'est donc qu'en suivant long-temps, & avec soin, ces espèces dans leur lieu natal, que l'on pourra parvenir par la suite à fixer avec quelque certitude les bornes & les caractères les plus constants de chacune de ces espèces. Il restera encore un bien grand travail, l'accord de la synonymie, travail qu'on sera peut-être forcé d'abandonner en partie pour éviter la confusion.

Les sous-divisions établies par Linné, pour la distribution des espèces, offrent plusieurs inconvénients, dont le plus essentiel est de séparer quelques espèces qui devraient se trouver placées à la suite les unes des autres par leurs rapports naturels ; & elles ne sont pas d'ailleurs parfaitement tranchées. Par exemple, il se rencontre, parmi les espèces à feuilles glabres, des variétés qui sont ou légèrement pubescentes ou velues, mais dont le duvet disparaît à mesure que les feuilles vieillissent. Dans la division des feuilles simples, on en trouve qui sont obscurément dentées, &c. Malgré cela j'ai conservé ces sous-divisions, faute de pouvoir y en substituer de meilleures, étant propres d'ailleurs à faciliter la distinction du plus grand nombre des espèces.

Les saules, dit Duhamel, sont des arbres très-utiles. Une belle *fauissie*, bien entretenue de fossés, & dont les arbres sont vigoureux, bien netoyés du menu bois inutile qui dérobe la sève aux perches, une telle *fauissie*, quoique plantée de têtards, c'est-à-dire, d'arbres qu'on érige tous les huit ou neuf ans, produit un très-bel effet. D'ailleurs, il y a peu d'arbres d'un plus beau port qu'un saule vigoureux, à qui l'on a ménagé une belle tige, & que l'on n'a point étêté. Nous avons des plants de ces saules, d'un aspect extrêmement agréable. Cet arbre peut donc servir à décorer les parties marécageuses des parcs ; & si le lieu est trop humide pour qu'on puisse s'y promener, on a du moins l'agrément d'avoir de beaux points de vue.

Quant à l'utilité des saules, celui que l'on nomme *osier*, & qu'on plante ordinairement dans les vignes, sert à accoler les ceps. On l'emploie encore à plusieurs autres usages pour le jardinage, mais on ne se sert ordinairement que des menues branches. On fend en deux ou trois les gros brins, suivant leur grosseur, & ils servent alors aux tonneliers pour lier leurs cerceaux. Les vigneronnes s'occupent, pendant l'hiver, à refendre l'*osier* de leur récolte quand la rigueur de cette saison ne leur permet pas de se livrer à d'autres travaux.

L'*osier*, particulièrement celui à écorce jaune, sert aux vanniers pour différents ouvrages. Les osiers menus ou d'espèce sujette à rompre, s'emploient avec leur écorce aux ouvrages les plus communs. L'*osier* jaune, qui est de belle venue, ne s'emploie qu'écorcé, & pour cela les vanniers conservent ces osiers en botte dans leur cave jusqu'à ce qu'ils puissent & qu'ils soient en pleine sève ; alors ils en portent facilement l'écorce en les passant dans une machoïse de bois, & ils assujettissent avec des liens ces osiers écorcés par bottes, pour empêcher qu'ils ne se contournent en divers sens. Lorsqu'ils veulent les employer, ils les mettent tremper dans l'eau pour les rendre plus souples.

Les saules fragiles, c'est-à-dire, qui rompent

au lieu de ployer quand on veut en faire des liens, tels que les saules marceaux, fournissent de grandes & de petites perches. Ces dernières sont livrées aux vanniers, qui les refendent en lattes pour en faire la charpente de leurs ouvrages. Les plus grosses perches sont refendues en deux ou en trois, & l'on en fait des cerceaux qui ne sont pas à la vérité de longue durée ; enfin, les plus grandes perches sont refendues en trois ou quatre, pour servir d'échelles dans les vignes, ou bien on les refend pour en faire des échelles pour les tromages, ou des serches qui servent de bordure aux cribles.

Pour tirer parti de ces échelles, il faut les conserver pendant un an en bottes bien liées, afin d'empêcher qu'ils ne se recourbent ; autrement, étant courbés, ils se rompent quand on les enfonce en terre : au bout de ce tems ils sont presque d'un aussi bon usage que ceux de chêne. Les gros saules qu'on a laissé venir en futaie sans les ériger, servent à faire des planches, que l'on emploie comme celles du tilleul & du peuplier. L'écorce que les vanniers enlèvent de dessus l'*osier*, sert aux jardiniers, dans le tems de la greffe, pour lier leurs écussions.

#### ES PÈ C E S.

\* Feuilles glabres & dentées.

1. SAULE à une étamine. *Salix monandra*, Hoff.

*Salix foliis serratis, glabris, linearilanceolatis, superioribus obliquis*. Hoffm. Hist. falic. pag. 18. tab. 1. fig. 1, 2 ; tab. 5. fig. 1.

2. *Salix (purpurea), foliis serratis, glabris, lanceolatis ; inferioribus oppositis*. Linn. Syst. veget. pag. 879. n°. 12. — Flor. suec. 2. n°. 884. — Iter Scan. 252. — Miller, Dict. n°. 7. — Scholl. Barb. n°. 750. — Pollich. Pal. n°. 919. — Deccr. Nass. pag. 270. — Retz. Prodr. Flor. scand. n°. 1087. — Huds. Flor. angl. edit. 2. pag. 427. — Leers, Herborn. n°. 751. — Scnpel. Carn. edit. 1. n°. 1209. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 216. n°. 241.

*Salix rubra, minima, fragilis, folio longo, angustulo*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 215.

*Salix folio longo, subulneo, non auriculata ; viminalis rubris*. Rai, Angl. 3. pag. 450.

*Salix americana*. Dalech. Hist. 1. pag. 174.

*Salix monandra*. Arduin. Mémoire 1. Spec. 97. tab. 11. — Flor. lappon. tab. 8. fig. U. 2

*Salix vulgaris, rubens*. C. Bauh. Pin. 473. n°. 3. Tournef. Inst. R. Herb. 350. — DuRoi. Arb. vol. 2. pag. 244. n°. 17.

3. *Salix (helix), foliis serratis, glabris, lanceolato-linearibus, superioribus oppositis, obliquis*. Linn. Syst. veget. pag. 879. n°. 11. — Roym. Lugd. Bat. 83. n°. 4. — Dalib. Paris. 199. — Miller, Dict.

Diâ. n°. 12. — Müller, Fridr. n°. 791. — Necker, Gallob. pag. 397. — Durol, Observ. botan. n°. 5. — Idem, Haïbk. 2. pag. 398. — Gouan, Illustr. 76. — Leers, Herbort. n°. 752. — Doerr, Nass. pag. 270. — Pollich, Palat. n°. 920. — Light, Flor. Scot. pag. 597. — Mattusch. Sil. n°. 712. — Idem, Enum. n°. 931. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 427. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 226. n°. 241.

*Salix monoilemon, foliis glabris, lineari-lanceolatis, serratis, superne conjugatis; iulis tomentosis.* Haller, Hist. n°. 1640.

*Salix humilis, foliis angustis, subcaruleis, ex adverso binis.* Rai, Hist. 1421. — Cantab. 144.

*Salix humilis, capitulo squamoso.* C. Bauh. Pin. 474. n°. 11. — Tourn. Inst. R. Herb. 591. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 8.

*Salix helice Theophrasti.* Dalechamp, Hist. 1. pag. 279. Icon.

*Salix tenuior, folio minore, utrinque glabro, fragilis.* J. Bauh. Hist. 1. pag. 213. fig. 2.

Vulgairement osier rouge des vignes, petit saule à tête écaillée.

Ce saule, un des plus communs dans les contrées méridionales de l'Europe, varie tant par la couleur de ses rameaux, que par sa grandeur & son port. Linné avoit cru pouvoir y distinguer deux espèces, que des observations plus suivies ont fait disparaître, & ont à peine réduites à de simples variétés.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de six à sept pieds, quelquefois moins; d'autres fois aussi il prend la forme d'un arbre de médiocre grandeur. Son tronc est glabre, centré; les rameaux très-nombreux, effilés, très-allongés, fort souples, glabres, alternes; les supérieurs quelquefois opposés. Ils sont, dans leur jeunesse, d'une couleur rouge ou purpurine. Ils deviennent jaunâtres avec l'âge, & cendrés dans leur vieillesse; revêtus d'un vernis luisant. Les feuilles sont pétiolées, alternes ou opposées, ovales, lancéolées ou linéaires, élargies & dentées en scie à leur partie supérieure, rétrécies & entières à leur partie inférieure, glabres en dessus, d'un vert glauque & bleuâtre en dessous, quelquefois revêtues d'un duvet fugace, longues d'environ trois pouces, sur un de large; traversées par une nervure blanche ou roussâtre; les feuilles supérieures très-souvent opposées; les pétioles glabres, courts, canaliculés.

Les fleurs sont dioïques, disposées en chatons mâles ou femelles, sur des pieds séparés. Les chatons mâles sont alternes ou opposés, cylindriques, tomenteux, obus, médiocrement pédonculés, composés d'écaillés imbriquées, ouvertes, réfléchies, concaves, ovales ou un peu arrondies, ciliées à leurs bords, particulièrement vers leur

Botanique. Tome VI.

sommet; noires ou rougeâtres, blanches à leur base. Il n'y a qu'une étamine pour chaque fleur, dont le filament est pubescent à sa base, deux ou trois fois plus long que l'écaillé, terminé par une anthère à quatre lobes, à huit loges.

Les chatons femelles, plus courts que les mâles, médiocrement pédonculés, cylindriques, obus, munis à leur base, ainsi que les chatons mâles, de deux ou trois feuilles linéaires, lancéolées; l'ovaire est ovale, foveux ou un peu globuleux, d'un vert-pâle; le style très-court, presque nul; deux stigmates à deux ou quatre divisions obuses, jaunes ou rougeâtres, noires en vieillissant; une petite écaille intérieure, très-courte à la base de l'écaille extérieure, quelquefois bifide. Le fruit est une capsule ovale, foveuse, un peu cendrée, comprimée de chaque côté, s'ouvrant par son sommet en deux valves réfléchies, à une seule loge, renfermant une seule semence ovale, linéolée, un peu brune, environnée à sa base d'une aigrette courte, composée de poils flexueux, entortillés.

Les piqures d'un insecte, qui est probablement le cynips du saule, occasionnent vers l'extrémité des rameaux de cette plante une excroissance en forme de tête écaillée, qu'on nomme *rose de saule*.

Cette plante croît naturellement dans les lieux humides, sur le bord des fossés, le long des haies, en France, en Allemagne, en Italie, &c.

On se sert avantageusement de cet arbrisseau pour empêcher l'éboulement des terres sur le bord des rivières, pour fixer la mobilité du sable. Ses rameaux, longs, souples & plans, procurent un osier employé, ou comme ligature, ou pour fabriquer des papiers, des corbeilles & plusieurs autres instruments économiques. Son usage est très-répandu; l'arbre sert aussi à faire de très-bonnes haies.

#### 1. SAULE fendu. *Salix fissâ.* Hoffm.

*Salix foliis integris, oblongo-lanceolatis, acuminiatis, glabris.* Hoffm. Hist. Salic. vol. 1. pag. 61. n°. 9. tab. 13, 14. fig. 1, 2, 3, 4.

*Salix elagnos, filamentis unico, bifido; ramis antheriferis.* Scopoli. Carn. edit. 2. n°. 1210. ?

Ce saule, qui fleurit en même temps que le *salix monandra*, pourroit être confondu avec lui; il en est distingué par les filaments des étamines fendus, & surtout par ses feuilles oblongues, lancéolées, à peine denticulées, ou dont les dentelures semblent être autant de petites glandes.

Cet arbrisseau ne s'élève qu'à cinq ou six pieds de haut; quelquefois cependant il parvient à la hauteur de quinze ou vingt pieds: son écorce est glabre, cendrée; ses rameaux épars, distichs, sou-

M m m n

ples, élançés, les supérieurs plus allongés, d'un vert-jaunâtre ou cendré, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, oblongues, linéaires, ou lancéolées, glabres & d'un vert-obscure à leur face supérieure, plus pâles en dessous, à peine garnies de quelques poils rares & courts, longues de trois pouces, sur un demi-pouce de large, rétrécies à leurs deux extrémités, acuminées à leur sommet, entières à leurs bords, ou munies de quelques petites dents glanduleuses sensibiles à la loupe, supportées par des pétioles glabres, courts, cylindriques, dépourvus de stipules & de glandes.

Les fleurs sont renfermées dans un bourgeon à une seule valve ovale, aiguë, scabieuse, entière, glabre, brune ou de couleur châtaigne, marquée de quelques veines roussâtres. Les chatons mâles sont alternes, ovales, cylindriques, obtus, horizon-taux, longs d'un pouce, médiocrement pédonculés; le pédoncule ferme, tomenteux, feuillé; les feuilles souvent opposées, linéaires, lancéolées, foyeuses en dessous & à leurs bords. Ces chatons sont rouges avant leur épanouissement, puis jaunâtres, légèrement velus, garnis d'écaillés imbriquées, ovales, un peu concaves, chargées de poils noirs ou rougeâtres. Chaque écaille renferme deux étamines, dont les filaments, d'abord adhérens, se détachent peu à peu, deviennent divergens à leur partie supérieure, réunis à leur base. Les anthères présentent le même caractère; elles sont à quatre loges, ovales, un peu arrondies, planes au côté de leur adhésion. L'appendice est verdâtre, presque cylindrique, obtus, élargi & ventru à sa base, sessile, situé à la base de l'écaille, appliqué contre les filaments.

Les chatons femelles, au nombre de six à douze, sont alternes, épars, cylindriques, plus petits que les mâles, un peu velus, à peine pédonculés; les pédoncules tomenteux, foyeux, feuillés; les écailles calicinales planes, ovales, un peu arrondies, obtuses, un peu noires, velues; l'ovaire ovale, oblong, presque turbiné, velu; le style court & jaunâtre, surmonté de deux stigmates plus longs que le style; un appendice linéaire, plane, tronqué, verdâtre, situé à la base de l'ovaire. Le fruit est une capsule ovale, fubulée, d'un blanc-cendré, comprimée & anguleuse à ses côtés, à une loge, à deux valves réfléchies; les semences verdâtres, fort petites, linéaires, oblongues, environnées à leur base d'une aigrette simple, touffue, courte & droite.

Cet arbrisseau croît en Europe, dans les sols sablonneux, sur le bord des ruisseaux & des sources. *h* (*Descript. ex Hoffm.*)

L'écorce de ce saule a une saveur amère, astringente : son bois est flexible, mais faible, sans consistance, & ne peut être facilement employé comme osier.

3. SAULE hermaphrodite. *Salix hermaphroditi*. a. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris; floribus hermaphroditis, diandris*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 222. n°. 1. — Flor. suec. edit. 2. n°. 878. — Spec. Plant. pag. 1015.

Ce saule présente un caractère particulier, qui consiste dans des fleurs hermaphrodites & non dioïques. Il se rapproche, d'après Linné, du *Salix pentandra* par ses feuilles glabres à leurs deux faces, dentées en scie à leurs bords, & dont les dentelures sont glanduleuses : ces feuilles sont alternes, pétiolées, roulées, ovales, lancéolées, un peu jaunâtres, souvent au nombre de six à chaque bourgeon, veinées à leur face supérieure; les veines creusées en sillons linéaires; les pétioles sont munis à leur base de glandes sail-lantes.

Les bourgeons sont formés de deux valves opposées : il en sort un chaton velu, légèrement pédonculé, garni de quelques feuilles à sa base. Les tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à six pieds, chargées de rameaux alternes, élançés, roussâtres, & non de couleur purpurine.

Cet arbre est couvert très-ordinairement d'un très-grand nombre de sautes-insectes rouges, extrêmement petits, à peine sensibles à l'œil nu. Il croît dans les environs d'Upsal; il n'est pas commun. *h* (*Descript. ex Linn.*)

4. SAULE à cinq étamines. *Salix pentandra*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, floribus pentandris*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 223. n°. 3. — Hort. Cliff. 454. — Flor. suec. 792. 879. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 153. tab. 34. fig. 1. — Miller, Dict. n°. 3. — Durol, Harbk. 2. pag. 392. — Matrukh. Sil. n°. 708. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 127. n°. 241. — Villars, Dauph. vol. 4. pag. 764.

*Salix floribus glabris, ovato-lanceolatis; petiolis glandulosis, floribus hexastemonibus*. Haller, Helv. n°. 1639.

*Salix pentandra*. Flor. lappon. 370. tab. 8. fig. 3. — Spec. Plant. vol. 2. pag. 1442.

*Salix vulgaris, rubens*. C. Bauh. Pin. 473.?

*Salix montana, major, foliis laurinis*. Tournef. Inst. R. Herb. 591.

*Salix folio laureo, seu lato, glabro, odorato*. Rai, Hist. 1420.

*Salix frontanea, folio amygdalino, fragilis, non auriculato*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 214.

Vulgairement saule odorant, saule à feuilles de laurier.

Cette espèce, très-voisine du *Salix hermaphrodita*, s'en distingue par ses fleurs dioïques, & par le nombre de ses étamines, qui varie de cinq, six ou sept, & par d'autres caractères faillants.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur d'environ six pieds, quelquefois beaucoup plus; elles sont chargées de rameaux alternes, élançés, fragiles, dont l'écorce est odorante, visqueuse, un peu jaunâtre & purpurine, glabre, lisse. Les feuilles sont pétiolées, alternes, ovales, lancéolées, assez semblables à celles de l'amandier, point auriculées, glabres à leurs deux faces, d'une couleur jaunâtre, surtout en vieillissant; fermes, luisantes, assez larges, dentées à leurs bords; les dentelures glanduleuses, d'où s'échappe une liqueur visqueuse, jaunâtre, odorante. Leur pétiole est court, chargé de quelques petites glandes blanchâtres, ordinairement dépourvues de stipules.

Les fleurs sont disposées en chatons alternes, pédonculés, jaunâtres, cylindriques, obus, épais, sortant de deux valves opposées, dioïques, les chatons mâles renfermant assez ordinairement, sous chaque écaille calicinale, ci q étamines, quelquefois six ou sept. Les pédoncules sont glabres, allongés, quelquefois un peu velus & garnis d'environ six feuilles. Les écailles calicinales sont brunes, ovales, velues à leur base, longuement subulées & les semences enveloppées par une aigrette épaisse, très-fine & d'une grande blancheur.

Cette plante croît dans les lieux humides & montagneux, dans les contrées septentrionales de l'Europe, en France, en Suisse, en Suède, &c. *h* (*P. v.*)

Ses rameaux sont trop fragiles pour être employés à beaucoup d'usages économiques: le bois décrépite au feu comme celui du saïn, & beaucoup plus. Ses feuilles fournissent une teinture jaune, & l'aigrette de ses semences est, dans quelques contrées du Nord, substituée au coton.

*5. SAULE à feuilles de phyllica. Salix phyllicifolia. Linn.*

*Salix foliis ferratis, glabris, lanceolatis; crenatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1016. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 221. n°. 4. — Flor. lapp. pag. 351. tab. 8. fig. 11. — Flor. suec. 793. 880. — Leers, Herborn. pag. 115. n°. 746.

*Salix phyllica humilioris folia. Rudb. Lapp. 100.*

*6. Salix foliis ferratis, glabris, oblongo-ovatis.* Flor. lapp. 350. tab. 8. fig. C.

Arbre dont le bois est tendre, le tronc droit, haut de huit à dix pieds, muni de rameaux glabres, alternes, -filés, de couleur brune, garnis de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées, glabres à leurs deux faces, plus pâles, presque glau-

ques en dessous, dentées en scie à leurs bords; les dentelures un peu ondulées, médiocrement écartées entr'elles. Les chatons sont alternes, pédonculés, cylindriques; leur pédoncule velu, garni de quelques folioles lancéolées, un peu ciliées, crénelées à leurs bords. Les écailles calicinales sont ovales-obtusées, brunes, ciliées. Les chatons mâles varient par le nombre des étamines; chaque écaille en renferme deux assez ordinairement, quelquefois trois, plus rarement quatre. Les ovaires sont subulés, allongés, glabres; les capsules légèrement pédonculées, oblongues, à deux valves réfléchies.

Cette plante croît dans les contrées septentrionales de la Suède, dans les Alpes & dans l'Allemagne. *h* (*P. f.*)

*6. SAULE osier jaune. Salix vitellina. Linn.*

*Salix foliis ferratis, ovato-lanceolatis, acutis, supra glabris; serratis cartilagineis.* Hoffm. Hist. Salic. vol. 1. pag. 57. n°. 8. tab. 11, 12. fig. 11, 2, 3.

*Salix foliis ferratis, ovatis, acutis, glabris; serratis cartilagineis, petiolis corollae pusillatis.* Linn., Syst. Plant. vol. 4. pag. 224. n°. 5. — Hort. Ups. 295. — Mill. Dict. n°. 4. — Necker, Gallieb. 394. — Duroi, Harbk. 2. pag. 393. — Murrich. 81. n°. 709. — Durr. Naff. pag. 270. — Weig. Flor. pomer. n°. 619. — Leers, Herborn. n°. 747. — Retz. Prodr. Flor. scand. n°. 1183. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 426. — Alton, Flor. ped. m. n°. 1960. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 227. n°. 241.

*Salix foliis linearilanceolatis, acuminatis.* Guetard, Stamp. vol. 1. pag. 206.

*Salix sativa, lutea, folio crenato.* C. Bauh. Pin. pag. 473. — Tourn. Inst. R. Herb. 530.

*Salix tenuifolia, densata.* Munting. Icon. 12.

*Salix lutea, tenuior, sativa, viminea.* J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 214.

*Salix lenso vimine & squamâ floralis flavia, foliis elliptico-lanceolatis, subius sericeis.* Haller. Enum. pag. 552.

*Salix arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, subius sericeis, dentibus crassifloribus.* Hall. Hist. n°. 1635. var. *h*

*Salix, alteram genus.* Fuchs, Hist. pag. 335.

*Salix vitellina.* Val. Cord. in Diosc. 137.

*7. Salix (hippophæfolia), glabra, foliis longolinaribus, sensim in acutissimum unguatum, membranaceis, lucidis, leviter serratis; nervo fuso, amentis squamis oblongis; pistillo, stylo longiusculo.* Thuid. Paris, édit. 2. pag. 515. n°. 12.

M m m m 2

Vulgairement amatiser, bois jaune, olier jaune.

Les rapports de cette espèce avec le faule blanc avoient porté Haller à ne la considérer que comme une variété de ce dernier, produite sans culture, & qui prenoit insensiblement, par la culture, les caractères du faule blanc. J'ai souvent observé ce dernier dans les forêts, abandonné à lui-même, & j'y ai toujours remarqué les caractères qui en forment une espèce particulière.

Cette espèce a un tronc droit, cylindrique, s'élevant à la hauteur d'un arbre de médiocre grandeur, pourvu vers son sommet de rameaux droits, nombreux, courts, diffus, plus alongés dans les individus femelles, un peu pendans, d'un vert-jaunâtre ou orangé, légèrement pubescens à leur partie supérieure. Les feuilles sont droites, alternes, pétiolées, ovales ou lancéolées, presque elliptiques, acuminées, un peu dentées en scie à leurs bords ; les dentelures brunes & glanduleuses ; les feuilles supérieures un peu pubescentes en dessus, blanchâtres, presque soyeuses en dessous & à leurs bords ; les inférieures très-entières, glabres & luisantes en dessus, un peu glauques à leur face inférieure, traversées par une forte nervure jaunâtre, longues de trois à quatre pouces, larges d'environ un demi-pouce. Les pétioles sont courts, comprimés, canaliculés, un peu pubescens, rarement glanduleux, dépourvus de stipules.

Les fleurs mâles sont réunies sur des chatons grêles, alternes, au nombre de six ou sept, cylindriques, légèrement velus, un peu aigus, longs de deux pouces & plus, supportés par des pédoncules longs d'un demi-pouce, cylindriques, tomenteux, munis de quelques folioles ovales, oblongues, réfléchies, pileuses, les unes lancéolées, d'autres plus courtes, élargies vers leur sommet. Les écailles calicinales sont lâches, imbriquées, ovales-lancéolées, un peu concaves, acuminées, légèrement pileuses, contenant chacune deux étamines, dont les filamens sont filiformes, d'un jaune-blanchâtre, un peu plus longs que les calices ; réunies & légèrement pileuses à leur base. Les anthères sont petites, arrondies, jaunâtres, à deux lobes ; un double appendice entre les filamens & le calice ; l'antérieur petit, un peu ovale, arrondi, tronqué, souvent bifide, jaunâtre ; le postérieur linéaire, un peu plus long, côtelé avec le premier, formant entre eux un vide pour y recevoir les filamens.

Les chatons femelles sont droits ou un peu inclinés, cylindriques, longs d'environ trois pouces, pédonculés ; les pédoncules longs d'un pouce, un peu tomenteux, garnis de trois ou quatre folioles ; les deux supérieures opposées, ovales, oblongues, entières, un peu velues à leurs bords ; les écailles calicinales linéaires, lancéolées, acuminées à leur sommet, d'un blanc-jaunâtre, bru-

nes à leur sommet, tomenteuses à leur base, un peu pileuses extérieurement. L'ovaire est ovale, oblong, presque sessile, ventru à sa base, glabre, d'un jaune-pâle, plus long que le calice ; le style est court ; les deux stigmates épais, obtus, jaunâtres. La capsule est ovale, oblongue, légèrement pédonculée, acuminée à son sommet, d'un vert-jaunâtre ou un peu brune, à deux valves réfléchies, renfermant des semences solitaires, fort petites, verdâtres, linéaires-lancéolées, environnées d'une aigrette sessile, courte, droite.

La plante  $\beta$ , présentée comme une espèce par M. Thuiller, a trop de rapports avec le *Salix vitellina* pour en être autrement distinguée que comme une simple variété. Les rameaux & les chatons femelles sont jaunes & luisans comme dans le faule fragile ; les feuilles longuement linéaires, très-aiguës, dentées en scie, membraneuses, luisantes, marquées de nervures jaunes, roussâtres ; les écailles calicinales oblongues, le style alongé, les fleurs jaunâtres. Il croît sur les bords de la Seine, près Longchamp, & fleurit en avril & en mars. (Thuill.)

Cet arbre croît dans les contrées tempérées de l'Europe, le long des chemins, des rivières & des fossés humides. (V. v.)

Son bois est blanc, tenace, flexible ; l'écorce cendrée ou de couleur cannelle ; le liber jaunâtre. On fait avec ses rameaux, des corbeilles, des liens, & beaucoup d'autres ouvrages économiques. Schaeffer a fabriqué, avec les aigrettes des semences, un papier grossier. On présume qu'elles peuvent être employées aussi, comme celles du coton, dans la fabrique des étoffes communes. Son écorce peut également servir dans la teinture, étant traitée convenablement. Son extrait est amer, astringent, fébrifuge.

7. SAULE à feuilles d'amandier. *Salix amygdalina*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, lanceolatis, petiolatis stipulis trapaeiformibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1445. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 224. n° 6. — Royen, Lugd. Bat. 81. — Flor. lucc. 794. 881. — Dalib. Paris. 157. — Mill. Dict. n° 8. — Duroi, Harbk. 2. pag. 394. — Pollich. Palat. n° 917. — Martusch. Sil. n° 710. — Derr. Nass. pag. 269. — Necker, Gallob. pag. 354. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 225. n° 241.

*Salix stipulis serratis; foliis lanceolatis, serratis, glabris*. Hall. Helv. n° 1636.

*Salix spontanea, fragilis, amygdalino folio, auriculata*. J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 214. Icon. 215.

*Salix foliis serratis, glabris, acuminatis, appendiculatis*. Flor. lappon. 349. 7

*Salix folio amygdalino, utrinque virente, aurito.* C. Bauh. Pin. 473. Tournet. Int. R. Herb. 591.

*Salix silvestris, latifolia.* Tabern. Icon. 1037.

*Salix purpurea, nigra, viminalis.* Dalech. Hist. vol. 1. pag. 276.

*Vulgairement saule amandier.*

Ce saule a de grands rapports avec le *salix triandra*, dont il diffère par la forme de ses feuilles & de ses stipules, ainsi que par le nombre de ses étamines.

Ses tiges sont droites, d'une hauteur médiocre, munies de rameaux alternes, très-flexibles, revêtus d'une écorce glabre, noirâtre ou purpurine, quelquefois d'un vert-clair.

Les feuilles sont alternes, pétiolées, lancéolées, très-rapprochées, par leur forme, de celles des amandiers, aiguës à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, longues de deux à trois pouces, larges d'environ un pouce, d'un vert-luisant, dentées en scie & point glanduleuses à leurs bords; munies, surtout les supérieures, à la base de leur pétiole de deux stipules ou oreillettes sessiles, amplexicaules, petites, trapézoïdes, dentées en scie à leur contour, dépourvues de glandes. Les fleurs sont dioïques, à deux étamines.

Cette plante croît aux lieux humides, dans les forêts de l'Europe. *h* (V. f.)

Ses rameaux, souples, très-flexibles, sont propres à faire des paniers & plusieurs autres ouvrages de vannerie.

#### 8. SAULE triandrique. *Salix triandra.*

*Salix foliis serratis, glabris; floribus triandris.* Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 223. n°. 2. — Gort. Incred. 156. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1214. — Necker, Gallob. 494. — Duroi, Harbk. 2. pag. 384. — Leers, Herborn. n°. 745. — Pollich. Palat. n°. 916. — Matfusch. Sil. n°. 707. — Gouan, Illustr. pag. 76. — Retz. Prodrom. n°. 1080. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 425. — Hoffm. Hist. Sal. vol. 1. pag. 45. n°. 7. tab. 9, 10. fig. 1, 2, 3, 4. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 225. n°. 241.

*Salix foliis glabris, elliptico-lanceolatis, serratis; fl. v. denatis; iulis graeilibus, triandris.* Hallet, Herb. n°. 1637.

*Salix foliis elliptico-lanceolatis, utrinque glabris, serratis, appendiculatis.* Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 155. tab. 34. fig. 3.

*Salix folio auriculato, splendente, flexilis.* Rai, Hist. 1420.

*g. Eadem, foliis serratis, glabris, angustioribus; amentis triandris, tenuissimis.* Mas. Hoffm. Hist. Sal. vol. 1. pag. 47.

*g. Salix (aucticulata), foliis serratis, glabris, lanceolatis, omnibus alternis.* Mill. Dict. n°. 9.

*Salix triandra.* Var. *g.* Duroi, Observ. botan. pag. 51.

*Salix folio amygdalino, utrinque aurito, corticem abjiciens.* Rai, Synops. 3. pag. 448.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *salix amygdalina*. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de six, huit ou dix pieds, rarement au-delà. Elles sont droites, revêtues d'une écorce brune, jaunâtre ou cendrée, pourvues, dans presque toute leur longueur, de rameaux droits, alternes, souples, tenaces, fragiles à leurs nœuds; les supérieurs plus courts, d'un vert-jaunâtre ou cendré, marqués de taches rougeâtres. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales ou elliptiques, lancéolées, acuminées; les inférieures ovales, plus grandes, un peu épaisses, d'un vert-foncé en dessus, plus pâles en dessous, glabres, luisantes, dentées en scie à leur contour; les dentelures cartilagineuses, chargées à leur base de glandes nombreuses, & sur leur pétiole de deux stipules amples, trapézoïdales, légèrement dentées, glanduleuses à leur face supérieure.

Les fleurs mâles sont disposées sur des chatons alternes, droits, coniques & puis cylindriques, légèrement velus dans leur jeunesse, pédonculés; les pédoncules cylindriques, longs d'un demi-pouce, un peu tomenteux, munis de quelques folioles ovales, lancéolées, réfléchies & caduques. Les écailles calicinales sont lâches, distantes, ouvertes, d'un vert-jaunâtre, ovales, obtuses, concaves, légèrement velues. Elles renferment ordinairement trois étamines, quelquefois deux, dont les filaments sont filiformes, velus à leur base, une fois plus longs que les deux autres calices; celui du milieu plus long que les deux autres, terminés par des anthères arrondies, d'un jaune-orangé.

Les chatons femelles sont droits, alternes, linéaires, verdâtres, à peine velus, pédonculés; les pédoncules chargés de trois ou quatre folioles ovales-oblongues, dentées en scie, un peu élargies & pointues à leur sommet, munies à la base de leur pétiole de stipules fort petites. Les écailles calicinales sont ovales, linéaires, d'un vert-blanchâtre, un peu velues, obtuses à leur sommet. L'ovaire est oblong, comprimé, glabre, verdâtre, pédicellé; le style à peine sensible; deux stigmates écartés fort petits. La capsule est ovale, un peu comprimée, d'un jaune-verdâtre, à une loge, à deux valves réfléchies en dehors. Les semences oblongues, environnées à leur base d'une aigrette blanche, courte, très-épaisse, touffue.

Cette plante offre plusieurs variétés remarquables. La variété *g* porte des fleurs mâles. Ses tiges s'élèvent bien moins; ses chatons sont grêles, longs de deux pouces; leur pédoncule chargé de quel-

ques feuilles très-étroites; les ambrères sont jaunes, fort petites. La plante y perd tous les ans son écorce; ses rameaux sont très-fragiles, & de couleur jaunâtre.

Cet arbre croît dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, dans l'Allemagne & la Sibirie. (V. v.)

Son bois est blanc, d'une dureté médiocre; ses rameaux plus ou moins fragiles. Les chatons sont odorans. On se fait de ses rameaux les plus forts pour former des haies, des digues sur le bord des rivières: on construit avec les plus minces & les moins fragiles, des paniers, des corbeilles, &c. L'écorce est amère & astringente; elle est employée utilement dans les fièvres tierces; elle fournit une teinture d'un jaune-foncé, qui noircit lorsqu'on y mêle du vitriol.

#### 9. SAULE haillé. *Salix heptana*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, subovatis, acutis, sessilibus; stipulis subcordatis*. Linn. Spec. Plant. 1017. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 225. n°. 7. — Cmel. Sibir. vol. 1. pag. 156. n°. 10. — Leers, Herborn. 749.

*Salix foliis serratis, glabris, subovatis, sessilibus, appendiculatis*. Flor. lappon. 334. tab. 8. fig. G. — Flor. suec. 797. 882.

*Salix foliis glabris, ovatis, serratis; stipulis latissimis*. Hall. Helv. n°. 1694.

*Salix latifolia, non hirsuta*. J. Bauhin, Hist. 1. pars 2. pag. 216. Icon.

Cette espèce se distingue à ses feuilles assez larges, ovales, sessiles, médiocrement dentées, très-glabres.

Arbusteau d'une médiocre grandeur, dont les tiges se divisent en rameaux alternes, effilés, souples, très-glabres, revêtus d'une écorce noirâtre, garnis de feuilles alternes, sessiles ou presque sessiles, ovales, élargies, acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, d'un vert un peu foncé, finement dentées à leur contour, les dents à peine en scie; la plupart des feuilles garnies à leur base de deux stipules assez grandes, sessiles, presque en cœur ou haltées. Les fleurs sont dioïques; les chatons alternes, médiocrement pédicellés, cylindriques, obtus, à peine velus; les capsules un peu ovales, subulées, à deux valves; les semences environnées à la base, d'une aigrette sessile, blanche, simple; très-fine.

Cette plante se rencontre en Suisse, en Allemagne & dans la Lapponie. (V. f.)

#### 10. SAULE d'Égypte. *Salix aegyptiaca*. Linn.

*Salix foliis subserratis, lanceolato-ovatis, nudis, verrucosis; pericarpis simplicibus, crispulatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 225. n°. 8. — Amoen. Acad.

vol. 4. pag. 285. — Spec. Plant. 1444. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 126. — Desf. Flor. atlant. vol. 2. pag. 361.

*Salix syriaca, folio oleagineo, argenteo*. C. Bauh. Pin. 274.

*Calas, feu ban*. Prosp. Alpin. Egypt. pag. 61. tab. 62.

*Biedmusk*. Brun. Iter, 191. tab. 71.

C'est un très-bel arbre, à grandes & larges feuilles, d'une moyenne grosseur, dont le tronc s'élève à vingt-cinq ou trente pieds de haut & plus, revêtu d'une écorce lisse, d'un vert-cendré; muni à sa partie supérieure de branches étalées & de rameaux allongés, un peu cassans, cylindriques, très-glabres, de couleur rougeâtre ou un peu purpurine, striés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, oblongues, très-minces, presque membraneuses, grandes, longues de six à huit pouces sur trois pouces de large, glabres à leurs deux faces, d'un vert-jaunâtre en dessus, plus pâles, légèrement blanchâtres en dessous, larges, obtuses à leur sommet, un peu acuminées, à peine rétrécies vers leur base, un peu ondulées ou crénelées à leurs bords; les crénelures petites, inégales, distantes, la plupart aiguës, supportées par des pétioles nus, cylindriques, recourbés, longs d'environ un pouce & plus; les nervures fines, latérales, presque simples, un peu jaunâtres.

Cette plante croît en Égypte. Je l'ai également observée dans la Barbarie, aux environs de la Calle, sur les collines, à mi-côte, dans un terrain un peu humide. Je n'ai pas vu les fleurs. (V. v.)

#### 11. SAULE fragile. *Salix fragilis*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, ovato-lanceolatis; pericarpis centaro-glandulosis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1017. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 225. n°. 9. — Flor. lappon. 349. tab. 8. fig. B. — Flor. suec. 795. 883. — Miller, Dict. n°. 6. — Duroi, Harbk. 2. pag. 395. — Leers, Herborn. n°. 750. — Pollich, Palat. n°. 918. — Martusch. n°. 711. — Oert. Nass. pag. 270. — Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 225. n°. 241.

*Salix stipulis dentatis; foliis glabris, ovato-lanceolatis; glumis ovatis, pilosis*. Haller, Helv. n°. 1638. ?

*Salix foliis serratis, glabris, lanceolatis, acuminatis, appendiculatis*. Roy. Lugd. Bat. 83.

*Salix fragilis*. C. Bauh. Pin. 474. — Idem, Prodr. 159. — Dill. Giff. 42. — Tourn. Inf. R. Herb. 591. — Duham. Arb. vol. 2. p. 244. n°. 7.

*Salix folio longo locoque, splendente, fragilis*. Rai, Aigl. 5. pag. 445. — Cantab. 143. — Itos Scan. 200.



*Fuligineusement saule craquant, saule fragile.*

Cet arbre s'élève à peu près à la même hauteur que le *salix alba*. Son tronc se divise en branches étalées, touffues, munies de rameaux alongs, de couleur brune ou un peu rougeâtre, glabres, fragiles, qui se cassent aisément à leurs nœuds; garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, lancéolées, longues de quatre à cinq pouces sur environ un pouce de large, glabres & d'un vert luisant à leurs deux faces, dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, rétrécies à leurs bords; les pétioles courts, munis de quelques dents glanduleuses, qui tiennent lieu de stipules.

Les fleurs sont disposées en chatons pédonculés, cylindriques, alongs; les pédoncules presque glabres, oblongs, garnis de deux ou trois folioles caduques. Les écailles calicinales sont alongées, à peine velues, aiguës à leur sommet, imbriquées avant la floraison, puis très-ouvertes, contenant chacune deux étamines. La capsule est ovale, très-glabre, légèrement pédonculée, un peu subulée, verdâtre, bivalve, à une loge; une semence solitaire, environnée à sa base, d'une aigrette blanche, feilée.

Cet arbre croît aux environs de Paris, sur le bord des marais & des prés, dans les départements méridionaux de la France, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe. Fr. (P.v.)

Son écorce est astringente, & a été recommandée comme un affez bon fébrifuge. On peut aussi l'employer pour tanner les cuirs. Les racines fournissent une couleur pourpre à l'aide d'une forte décoction. Les fleurs plaisent beaucoup aux abeilles: les vaches en mangent les feuilles & les fleurs. Les branches & les plus forts rameaux, trop cassans pour être employés dans la vannerie, peuvent servir à faire de grandes & de petites perches. Il peut, ainsi que le *salix alba*, être cultivé comme un arbre d'ornement.

12. SAULE de Babylone, ou SAULE pleuteur. *Salix babylonica*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, linearilanceolatis; ramis pendulis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1443. — Hort. Cliff. 454. — Roy. Lugd. Bar. 84. — Gronov. Orient. 307. — Mill. Dict. n.º 11. — Duroi, Harbk. 2. pag. 397. — Medic. in Observ. Soc. œconom. Lutr. 1774. pag. 297. — Gouan, Illustr. pag. 77. — Gmel. Iter 3. pag. 309. tab. 34. fig. 2. — Desfont. Flot. atlant. vol. 2. pag. 361.

*Salix orientalis, flagellis densum pulchris pendentibus*. Tourn. Coroll. pag. 41. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 20.

*Salix arabica, foliis atriplicis*. C. Bauh. Pin. 475. *Garb arahum*. Rauw. Iter, pag. 183. — Dalech. Append. 30.

*Fuligineusement saule pleuteur, parasol du grand-seigneur.*

Cette belle espèce de saule est aujourd'hui cultivée dans tous les jardins anglais; elle est même devenue l'emblème des larmes que nous répandons sur la perte des personnes qui nous sont chères; elle remplace, auprès des tombeaux, le furibère cyprès. Ce n'est point que cet arbre ait quelque chose de triste dans son aspect; il est au contraire d'une forme agréable, & ses feuilles d'un vert gai; mais il a un port particulier qui le rend très-facile à distinguer, & produit l'idée de longs cheveux épars & pendans, qui expriment si bien l'extrême douleur.

Son tronc s'élève à peu près à la hauteur de vingt pieds. Ses rameaux sont très-longs, fort grêles, presque simples, pendans de tous côtés, très-floppés, revêtus d'une écorce glabre, d'un brun noirâtre; garnis de feuilles longues, alternes, pétiolées, étroites, lancéolées, longues de quatre à cinq pouces sur un demi-pouce de large, aiguës à leurs deux extrémités, glabres à leurs deux faces, d'un vert tendre en dessus, presque glauques en dessous, finement dentées en scie à leur contour, acuminées à leur sommet, traversées par une nervure d'un blanc-jaunâtre; les nervures latérales très-fines, simples, obliques; les pétioles courts, munis ordinairement à leur base de deux petites stipules un peu lancéolées, aiguës, remplacées quelquefois par deux points glanduleux.

Les fleurs sont d'innées, disposées sur des chatons grêles, cylindriques, longs d'environ deux pouces, un peu lâches, pubescens, d'un vert-jaunâtre, pédonculés; les pédoncules munis de quelques feuilles alternes, semblables à celles des rameaux, mais plus petites. Les écailles calicinales sont glabres, verdâtres, un peu lancéolées, aiguës, au moins de la longueur des ovaires. Les capsules sont petites, ovales, aiguës, presque en forme de poire, glabres, à deux valves roulées en dehors après l'émission des semences. Celles-ci sont petites, solitaires, environnées d'une aigrette blanche, feilée.

Cette plante croît dans le Levant, en Égypte, & dans les jardins des environs d'Alger, où elle a été observée par M. Desfontaines. Fr. (P.v.)

13. SAULE myrsinite. *Salix myrsinites*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, ovatis, venosis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. — Flor. lappon. 353. tab. 8. fig. F. & tab. 7. fig. 6. — Flor. suec. n.º 799. 885. — Gouan, Illustr. pag. 76. — Leers, Herb. n.º 753. — Villars, Dauph. vol. 4. pag. 769. — Sut. Flor. helv. 2. pag. 281.

*Salix foliis ovato-lanceolatis, venosis, serratis; iulis tomentosis*. Hall. Helv. n.º. 1645.

*Salix alpina*, *pumila*, *myrsinites*. Pont. Comp. 149.

*Salix alpina*, *foliis angustioribus*, *splendens*, *ferratis*. Scheuch. Alp. 340.

*Salix alpina*, *pumila*, *repens*, *foliis oblongis*, *exiguis*, *superioribus splendens*, *inferioribus cinereis*, *creberrimis*, & *tenuissimis arenis*. Till. Pif. 151.

*Salix foliis subferratis*, *glabris*, *subdiaphanis*, *subtus glauca*; *caule suffruticoso*. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 166. ?

*Salix* ( *myrsinites* ), *foliis serratis*, *glabris*, *ovatis*, *subdiaphanis*. Hoffmann, Hist. Sal. vol. 1. pag. 71. n°. 11. tab. 17-19. fig. 1-f. & tab. 24. fig. 2. ?

Je doute que cette plante, dont je vais donner la description, que j'ai recueillie dans les Alpes, soit la même que celle qu'Hoffmann décrit, & qu'il rapporte au *Salix myrsinites* de Linné, à moins qu'on ne la considère comme une variété très-remarquable.

C'est un petit arbruste, dont les tiges glabres, d'un brun-noirâtre, ne s'élèvent ordinairement qu'à la hauteur de deux ou trois pieds, quelquefois plus, & qui se divisent en rameaux diffus, inégaux, revêtus d'une écorce roussâtre, glabre, légèrement velue dans les jeunes rameaux, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ovales, lancéolées, assez épaisses, glabres à leurs deux faces, revêtues, dans leur jeunesse, de quelques poils fins & soyeux, dentées en scie à leur contour, aiguës à leur sommet, munies de nervures latérales, blanchâtres, un peu réticulées, d'une couleur verte, presque luisantes à leur face supérieure, un peu plus pâles, presque cendrées en dessous.

Les fleurs sont réunies sur des chatons alternes qui se montrent avec les feuilles, pédonculés, épais, cylindriques; les pédoncules allongés, rommenteux, munis de quelques petites feuilles semblables à celles des rameaux. Les écailles calicinales sont d'un brun-noirâtre, ovales, oblongues, velues; chaque écaille renfermant deux étamines. L'ovaire est ovale, velu, surmonté d'un style allongé, divisé en deux stigmates épais, obtus. Les chatons femelles sont plus longs & plus grêles que les mâles.

Dans la plante décrite par Hoffmann, les feuilles sont plus grandes, plus larges, ovales, point lancéolées, minces, presque transparentes, orbules; les chatons femelles plus courts que les chatons mâles; les pédoncules courts; l'ovaire très-glabre; le style court, &c. caractères opposés à ceux que nous avons reconnus dans le *Salix myrsinites*.

Cette plante croît sur les montagnes alpines, en

Suisse, & dans les départements méridionaux de la France, le ci-devant Dauphiné, &c. & ( V. f. )

#### 14. SAULE arbruste. *Salix arbuscula*. Linn.

*Salix foliis subferratis*, *glabris*, *subdiaphanis*, *subtus glauca*; *caule suffruticoso*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1445. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 227. n°. 14. — Flor. succ. 798. 886. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 166. n°. 21. — Gouan, Illust. pag. 76. — Jacq. Flor. austr. tab. 408. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 215. n°. 241. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 528.

*Salix foliis serratis*, *glabris*, *obovatis*. Flor. lapp. 352. tab. 8. fig. E.

*Salix foliis ovato-lanceolatis*, *teneris*, *serratis*; *stipulis lanceolatis*. Haller, Helv. n°. 1647. ?

β. *Salix foliis integris*, *glabris*, *ovatis*, *confertis*, *pellucidis*. Flor. lapp. 356.

γ. *Salix foliis serratis*, *glabris*, *lanceolatis*, *utrinque acutis*. Flor. lapp. 360. tab. 8. fig. M.

C'est un petit arbruste dont les tiges parviennent à peine à la hauteur de deux ou trois pieds, & dont les rameaux sont alternes, un peu diffus, grêles, très-glabres, un peu cassans, revêtus d'une écorce brune, garnis de feuilles alternes, pétiolées, en ovale renversé, un peu obtuses, quelquefois un peu lancéolées, très-nombreuses & rapprochées, glabres à leurs deux faces, minces, presque transparentes, d'un vert-clair, & presque luisantes à leur face supérieure, de couleur glauque en dessous, légèrement dentées à leur contour, médiocrement pétiolées, & dépourvues de stipules.

Les fleurs sont disposées en chatons alternes, cylindriques, oblongs, médiocrement pédonculés; les pédoncules velus, munis de quelques feuilles semblables à celles des rameaux. Les écailles calicinales sont roussâtres, velues, soyeuses, chacune renfermant deux longues étamines. Les capsules sont toutes velues & un peu soyeuses, petites, ovales, aiguës, à une seule loge, & dont les deux valves sont roulées en dehors après la maturité des semences.

Cette plante offre quelques variétés remarquables. Dans la variété β, les feuilles sont parfaitement ovales, très-entières, point dentées, transparentes. Ces mêmes feuilles sont lancéolées dans la plante γ, aiguës à leurs deux extrémités, dentées en scie à leurs bords, glabres à leurs deux faces. Cultivée dans les jardins, cette plante devient presque méconnaissable. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à six pieds; ses feuilles sont plus grandes, plus épaisses, & varient dans leur forme.

On

On rencontre cet arbrisseau dans les plaines sablonneuses de la Laponnie, en Suède, dans la Sibérie. (V. f.)

15. SAULE herbacé. *Salix herbacea*. Linn.

*Salix foliis serratis, glabris, orbiculatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 228. n°. 15. — Flor. lapp. 355. tab. 8. fig. H. & tab. 7. fig. 3 & 4. — Flor. suec. n°. 800. 887. — Royen; Lugd. Bat. 82. — Jacq. Vind. 196. — Gouan, Illustr. 77. — Pallas, Iter, vol. 3. pag. 31. — Oeder. Flor. dan. tab. 117. — Hoffm. Hist. Sal. vol. 1. p. 74. n°. 12. tab. 20. fig. 1, 4. — Allion. Flor. pedem. 1967. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. n°. 427. — Light. Flor. scot. 600. — Retz. Prodrum. 1090.

*Salix foliis orbiculatis, serratis, glabris; iulis paucifloris*. Haller, Helv. n°. 1649.

*Salix saxatilis, minima*. C. Bauh. Pin. 474. & Prodrum. 159.

*Salix alpina, lucida, repens, alni rotundifolia*. Boccon. Mus. 2. pag. 19. tab. 1. fig. ult. — Rai, Suppl. 12. Angl. 3. pag. 428.

*Herba scie pyrola*. Mart. Spitsb. 47. tab. 5. fig. B.

*Salix retusa*. Var. β. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 229. n°. 241.

*Salix alpina, betula nana folio glabro, repens*. Rudb. Lappoon. 100.

*Salix alpina, alni rotundo folio, repens*. Tourn. Inst. R. Herb. 591.

*Pyrola mariana, subrotundo ulmi folio glabro*. Pluken. Phytogr. 436. fig. 7.

Cet arbrisseau est un des plus petits que nous connoissons; il pousse, hors de terre, des tiges hautes à peine de quelques pouces, & qui ne portent souvent que deux feuilles & un ou deux chatons; mais ces tiges peuvent être considérées comme des rameaux, si d'ailleurs l'on fait attention aux fourches de ses racines, longues souvent de plusieurs pieds, qui rampent ordinairement à la surface du sol, surtout lorsque celui-ci est pierreux, peu profond. Ces fourches produisent des rameaux nombreux, tortueux, fort petits, presque droits, d'un brun-noirâtre, inégalement ramifiés. Les jeunes pousses de l'année n'ont ordinairement que deux feuilles qui sortent du même bourgeon avec les chatons. Ces feuilles sont pétiolées, arrondies ou orbiculaires, entières ou légèrement dentées en scie à leurs bords, obtuses ou un peu échan-crées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, ayant à peine un pouce de diamètre, soutenues par des pétioles à demi-cylindriques, canaliculés, pubescens, un peu allongés, dépourvus de stipules & de glandes.

Botanique. Tome VI.

Les chatons, souvent solitaires, sortent dans les pousses de l'année, quelquefois au nombre de deux ou trois pour les deux sexes sur chaque arbrisseau, sont droits, courts, pédonculés, garnis de très-peu de fleurs, & de quelques feuilles à leur base. Les écailles calicinales sont lâches, distantes, ovales, un peu allongées, obrufes, un peu pubescentes à ins les fleurs mâles; glabres ou légèrement ciliées dans les fleurs femelles. Les étamines, au nombre de deux, ont des filaments droits, filiformes, réunis à leur base, plus longs que les calices, terminés par des anthères jaunâtres, fort petites, arrondies, bilobées. L'ovaire est glabre, oblong, un peu comprimé; le style court; deux stigmates jaunâtres & réfléchis; les capsules ovales, aigues, glabres, rouissantes, s'ouvrant en deux valves réfléchies en dehors, & contenant des semences solitaires, linéaires, environnées d'une aigrette droite, soyeuse, luisante.

Ce petit arbrisseau croît sur les hautes montagnes des Alpes, parmi les pelouses, où la végétation est interdite aux autres arbres & arbrulles. (V. f.)

16. SAULE émoussé. *Salix retusa*. Linn.

*Salix foliis subseratis, glabris, obovatis, obtusissimis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 228. n°. 16. — Gouan, Illustr. pag. 76. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 229. n°. 241. — Villars, Dauph. vol. 4. pag. 771.

*Salix foliis g'abris, ovatis, nitentibus; iulis paucifloris*. Haller, Helv. n°. 1648.

*Salix foliis levibus, ovatis; spica rarissima*. Haller, Opuscul. 301.

*Salix alpina, angustifolia, repens, non incana*. C. Bauh. Pin. 474. — Idem, Prodr. 159. — Tournef. Inst. R. Herb. 591.

*Salix alpina, serpyllifolia, lucida*. Boccon. Mus. 2. pag. 18. tab. 1.

*Salix pusilla, humilis*. Camer. Epitom. 104.

*Salix sepillifolia*. Scop. Carn. n°. 1207. tab. 61.

Cet arbrisseau est fort petit. Ses tiges, épaisses & tortueuses, se divisent presque dès leur base, en rameaux couchés, longs à peine de huit à dix pouces, glabres, revêtus d'une écorce un peu rougeâtre on d'un brun-verdâtre, garnis de feuilles alternes, assez nombreuses, petites, médiocrement pétiolées, ovales, assez fermes, vertes, glabres à leurs deux faces, un peu luisantes, d'un vert un peu plus pâle en dessous, obtuses, arrondies & quelquefois légèrement échan-crées à leur sommet, entières ou un peu dentées vers leur base, médiocrement rétrécies vers leur partie inférieure; les feuilles du bas plus arrondies, marquées à leur face inférieure de quelques nervures fines, simples, parallèles.

Nnn

Les fleurs sont dioïques, disposées, vers l'extrémité des rameaux, sur des chatons fort petits, souvent peu nombreux, feuillés à leur base; les mâles longs à peine d'un demi-pouce, composés d'écaillés calicinales glabres, d'un vert-pâle, sous chacune desquelles se trouvent deux étamines, dont les filaments sont saillans, les anthères rougeâtres à leur sommet. Les chatons femelles sont moins nombreux que les mâles, plus courts, & ne contiennent que très-peu de fleurs lâches, auxquelles succèdent des capsules verdâtres, droites, coniques, parfaitement glabres, qui se divisent, par leur sommet, en deux valves roulées en dehors.

Cette plante croît sur les hautes montagnes & les Alpes, dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, dans l'Italie & l'Autriche. (V. f.)

\* \* Feuilles glabres, très-entières.

17. SAULE réticulé. *Salix reticulata*.

*Salix foliis integerrimis, glabris, ovatis, obtusis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 129. n°. 17. — Jacq. Vind. 256. — Gouan, Illustr. pag. 77. — Æler. Flor. dan. tab. 112. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 228. n°. 241.

*Salix foliis integris, glabris, ovatis, subius reticulatis*. Flor. lappon. 359. tab. 8. fig. L. & tab. 7. fig. 1, 2. — Flor. suec. 801. 888. — Spec. Plant. vol. 2. pag. 1018.

*Salix foliis rotundis, integerrimis, subius tomentosis; iuligracilibus, longi petiolatis*. Haller, Helv. n°. 1650.

*Salix pumila, folio rotundo*. Tournef. Inst. R. Herb. 591. — J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 217. Icon. — Scheuch. Alp. 43. 340. — Rai, Hill. 1425.

Cette espèce, qui paroît avoir beaucoup de rapports avec le *salix retusa*, en diffère par ses feuilles constamment entières à leurs bords, réticulées en dessous, & non munies de nervures parallèles, plus longuement pétiolées.

Ses tiges sont épaisses, tortueuses, couchées, longues à peine d'un pied; elles se divisent en rameaux gibres, courts, dissimulés, épars, diffus, revêtus d'une écorce verte ou un peu grisâtre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, petites, ovales, obtuses à leur sommet, très-entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, pubescentes & soyeuses dans leur jeunesse, vertes en dessus, un peu blanchâtres en dessous, & agréablement marquées de petites veines réticulées, point parallèles, fourues par des pétioles assez longs, dépourvus de stipules.

Les chatons sortent du même bourgeon avec les feuilles. Ces chatons sont allongés, grêles, cy-

lindriques, garnis d'écaillés calicinales, imbriquées, concaves, obtuses, pileuses, un peu rougeâtres, renfermant chacune deux étamines plus longues que les calices, surmontées d'anthères de couleur incarnate. Le pédoncule est garni de trois feuilles ovales, obtuses, pétioles, épaisses, très-entières, pileuses dans leur jeunesse, vertes & ridées à leur face supérieure, glauques en dessous, marquées de veines d'abord rougeâtres, puis vertes & réticulées; l'ovaire ovale, garni de poils soyeux; les capsules un peu rouillâtres, légèrement pubescentes.

Cet arbrisseau se rencontre dans les départemens méridionaux de la France, dans les Alpes, en Suisse, & dans la Laponie. (V. f.)

18. SAULE myrtille. *Salix myrtilloides*. Linn.

*Salix foliis integris, glabris, ovatis, acutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1019. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 229. n°. 19. — Pallas, Iter 3. pag. 33. — Gouan, Illustr. pag. 77. — Lam. Flor. franç. vol. 2. p. 229. n°. 241.

*Salix foliis ovato lanceolatis, glabris, obscurè serratis, venosis*. Haller, Helv. n°. 1646.

*Salix foliis integris, glabris, ovatis, alternis*. Flor. lappon. 357. tab. 8. fig. I, K. — Flor. suec. 804. 889.

*Salix pumila, foliis utrinque glabris*. J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 217. 1c. — Tournef. Inst. R. Herb. 591.

*Salix humilis, repens*. Lobel. Icon. 138

*Salix humilis, repens*. Lobel. Icon. 138

*Salix humilis, repens*. Lobel. Icon. 138

Arbuste dont la hauteur n'excede pas ordinairement huit à dix pouces, dont les tiges sont presque couchées, & produisent plusieurs rameaux diffus, glabres, d'un brun-rougeâtre, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, ovales, ou ovales oblongues, un peu pubescentes dans leur jeunesse, parfaitement glabres dans leur entier développement, un peu épaisses, vertes à leurs deux faces, veines, réticulées en dessous, presque luisantes en dessus, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, dépourvues de stipules.

Les fleurs sortent des mêmes bourgeons que les feuilles; elles sont disposées en chatons courts, cylindriques, jaunâtres, pédonculés; les pédoncules garnis de quelques feuilles. Les écaillés calicinales sont un peu acuminées; les capsules pédonculées, glabres, ovales, aiguës, d'un vert-jaunâtre, à deux valves un peu recourbées; les semences enveloppées à leur base d'une aigrette très-épaisse, très-blanche, plus longue que les capsules.

La plante  $\beta$ , que je possède des Alpes de la Suisse, diffère de la précédente par ses feuilles obuses & arrondies à leur sommet, un peu alongées, presque rétrécies en coin à leur base.

Ces plantes croissent dans les départements méridionaux de la France, en Suisse; dans la Suède, la Laponnie; dans les pâturages des montagnes.  $\beta$  (V. f.)

19. SAULE glauque. *Salix glauca*. Linn.

*Salix foliis integerrimis, subtus tenuissimè villosis, ovato-oblongis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1019. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 229. n°. 19. — Flor. lappon. 165. tab. 7. fig. 5. & tab. 8. fig. P. — Flor. suec. 802. 890.

*Salix alpina, pyrenaica*. C. Bauh. Pin. 474. & Prodr. 159. — Burt. XXIV. 120. — Tourn. Insl. R. Herb. 591.

*Salix alpina, humilis, vitis idea folio, subtus incano*. Rudbk. Lapp. 99. ?

Ses tiges sont un peu tortueuses, glabres, noires, hautes d'environ deux ou trois pieds, pourvues de rameaux alternes, diffus, très-inégaux, d'un rouge-foncé, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ovales, oblongues, ou un peu lanceolées, chargées à leur face supérieure de quelques poils rares, & en dessous de poils blanchâtres, glabres dans leur entier développement, un peu luisantes en dessus, de couleur glauque en dessous, nerveuses, un peu réticulées, très-entières à leur contour, dépourvues de stipules.

Les chatons mâles sont courts, ovales, pédonculés, velus, tellement lanugineux, que les écailles calicinales sont cachées par ce duvet; les pédoncules sont garnis de quelques feuilles.

Je possède une plante des Alpes de la Suisse, que je soupçonne être l'individu femelle de cette espèce. Ses chatons sont glabres, courts, ovales, un peu cylindriques, garnis de quelques feuilles sur leur pédoncule; les capsules un peu pédonculées, alternes, glabres, jaunâtres, ovales, acuminées, à deux valves, un peu rétrécies à leur sommet. Les feuilles sont ovales, oblongues, presque elliptiques, obtuses, arrondies à leur sommet, un peu rétrécies à leur base, glauques en dessous, luisantes en dessus, assez semblables à celles du *Salix myrtilloides*, var.  $\beta$ , mais plus petites.

On rencontre cet atrifriseau dans les Alpes, les Pyrénées, & en Laponnie.  $\beta$  (V. f.)

\*\*\* Feuilles velues, très-entières.

20. SAUGE auriculé. *Salix aurita*. Linn.

*Salix foliis integerrimis, utrinquè villosis, ovatis,*

*appendiculatis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 219. n°. 20. — Flor. lapp. 369. tab. 8. fig. Y. — Flor. suec. n°. 810. 891. — Royen, Lugd. Bat. 84. — Necker, Gallob. 395. — Pollich. Pal. n°. 921. — Leers, Herb. n°. 754. — Light. Flor. scot. p. 602. — Matt. Sil. Suppl. 1216. — Retz. Prodr. Flor. scand. n°. 1094. — Hudf. Flor. angl. 430. var.  $\beta$ . *Salix caprea*. — Hoffm. Hist. Salic. vol. 1. pag. 4. tab. 4. fig. 1, 2, & tab. 5. fig. 5.

*Salix foliis rugosis, reticulatis, integerrimis, inflexis tomentosis, utris ovatis*. Hall. Helv. n°. 1612.

*Salix folio rotundo minore*. Dillen. Append. 37. — Rai, Angl. 3. pag. 450.

*Salix foliis stipulatis, ovatis, subtus tomentosis, filamentis duobus basi coarctatis*. Scop. Carn. edit. 1. pag. 406. & edit. 2. pag. 254. var. 2. *Salix caprea*. ?

*Salix latifolia, minor*. C. Bauh. Pin. pag. 474. — Rupp. Jenens. 2. pag. 333. — Gerard, Enac. 390. fig. 3.

Vulgairement petit saule ou marceau à feuilles velues.

$\beta$ . *Salix foliis integris, utrinquè villosis, verticaliter ovatis, appendiculatis*. Flor. lapp. 369. tab. 8. fig. Y.

Atrifriseau qui approche du saule marceau, & ne s'élève qu'à la hauteur de quelques pieds, & qui parvient souvent à celle de six ou huit, dont les rameaux nombreux & étalés partent de la partie inférieure des tiges; ils sont très-longs, diffus, glabres, revêtus d'une écorce cendrée, un peu tomenteuse & rongée sur les plus jeunes rameaux; garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, droites, rapprochées, ovales ou un peu arrondies, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, entières à leurs bords ou légèrement ondulées & crénelées, d'un vert-foncé & un peu pubescentes en dessous, particulièrement le long de leurs nervures; tomenteuses & agréablement réticulées en dessous. Les pétiols sont courts, cylindriques, tomenteux, munis à leur base de deux stipules réniformes, sessiles, finées & dentées à leurs bords, tomenteuses en dessous. Les jeunes feuilles sont molles, souples, longues d'un pouce, une fois plus petites que les autres. Les plus anciennes sont souvent ovales, oblongues, fermes, ridées.

Les chatons mâles sont alternes, ovales, obtus, un peu velus, longs d'un demi-pouce, légèrement pédonculés; les supérieurs munis à leur base de quelques petites folioles lanceolées. Les écailles calicinales sont planes, imbriquées, ovales, lanceolées, d'un brun-pâle. un peu velues, contenant chacune deux étamines, dont les filaments sont réunis à leur base, un peu velus; les antières petites, arrondies, jaunâtres, à quatre loges; un

N n n n 2

appendice très-court, ovale, cylindrique, d'un vert-jaunâtre.

Les chatons femelles sont ovales, oblongs, cylindriques, longs d'environ un pouce, un peu velus, pédonculés, munis à leur base de quelques feuilles alternes, ovales; les supérieures sont petites, lancéolées. Les écailles calicinales sont planes, imbriquées, linéaires-lancéolées, petites, velues, brunes à leur sommet. L'ovaire est lancéolé, cylindrique, foveux, d'un vert-pâle, un peu pédicellé; le style presque nul; deux stigmates sessiles, épais, cylindriques, bifides, connivens, d'un jaune-pâle. Les capsules sont ovales, oblongues, pubescentes, à deux valves; les semences linéaires, solitaires, environnées à leur base d'une aigrette simple, fétille, blanchâtre, aussi longue que les capsules.

Cette plante offre plusieurs variétés. Dans celle  $\beta$ , les rameaux sont noirs ou d'un brun-foncé; les feuilles ovales, oblongues, plus larges à leur côté antérieur, rétrécies vers leur base, entières à leurs bords, souvent velues à leurs deux faces; les chatons mâles plus grands & cylindriques.

Cer arbrisseau est commun dans les forêts de l'Europe septentrionale.  $\gamma$  (V. v.)

## 21. SAULE laineux. *Salix lanata*. Linn.

*Salix foliis utrinque lanatis, subrotundis, acutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1019. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 230. n°. 21. — Flor. lapp. 368. tab. 8. fig. X, & tab. 7. fig. 7. — Flor. suec. 809. 892. — Pallas, Iter 3. pag. 449.

*Salix foliis integerrimis, ovato-lanceolatis, subius sericeis, iulis ovatis*. Haller, Helv. n°. 1651.

*Salix humilis, latifolia, erecta*. C. Bauh. Pin. 474, & Prodr. 159. — Rai, Hist. 1426. — Tourn. Inst. R. Herb. 591.

$\beta$ . *Salix* (depressa), *foliis integris, subius villosis, lanceolato-ovatis, utrinque acutis*. Flor. lapp. 361. tab. 8. fig. 30. — Flor. suec. edit. 2. n°. 899.

Cette plante a quelques rapports avec le *salix lapponum*; elle en diffère par la forme de ses feuilles. C'est un petit arbrisse dont les tiges sont droites, glabres; les rameaux courts, diffus, revêtus d'un duvet lanugineux & blanchâtre, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, nombreux, très-rapprochés, ovales, un peu arrondies, très-entières à leurs bords, lanugineuses à leurs deux faces, presque sessiles en dessous, aiguës à leur sommet, quelquefois un peu rétrécies à leur base, dépourvues de stipules. Les chatons sont courts, alternes, un peu pédonculés, ovales, velus ou plutôt chargés d'une laine blanchâtre, entortillée; les pédoncules munis souvent de deux ou trois petites feuilles. Les écailles calicinales sont ovales, aiguës, brunes vers leur sommet.

La plante  $\beta$ , que Linné avoit d'abord considérée comme une espèce, ne lui a paru ensuite qu'une variété obtenue par la culture. Ses rameaux sont éralés, diffus, couchés sur la terre. Ses feuilles sont plus grandes, plus épaisses, ovales-lancéolées, aiguës à leurs deux extrémités, velues en dessous.

Cette plante croît dans les lieux humides & marécageux, en Europe & dans la Laponie. On la trouve, d'après Thuiller, aux environs de Paris, à Saint-Leger & à Chaville.  $\gamma$  (V. f.)

## 22. SAULE de Laponie. *Salix lapponum*. Linn.

*Salix foliis integerrimis, hirsutis, lanceolatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1447. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 230. n°. 22. — Flor. lapp. 366. tab. 8. fig. T. — Flor. suec. 808. 893. — Pallas, Iter 3. pag. 33. — Gouan, illustr. pag. 78.

*Salix foliis crassis, elliptico-lanceolatis, integerrimis, utrinque sericeis*. Hall. Helv. n°. 1643.?

*An potius salix foliis integerrimis, ovato-lanceolatis, subius sericeis, iulis tomentosis?* Hall. Helv. n°. 1642. tab. 14.

Il est douteux que le saule de Laponie, que nous trouvons tant dans les Alpes du ci-devant Dauphiné, qu'en Suisse, soit la même plante que celle de Linné. Celle dont je vais parler me paraît la même qui se trouve figurée dans Haller, tab. 14.

C'est un arbrisseau qui s'élève à deux ou trois pieds. Ses tiges sont un peu tortueuses, glabres, d'un brun-tougeâtre-foncé, pourvues de rameaux diffus, inégaux, fortement velus & même lanugineux à leur partie supérieure, garnis de feuilles assez nombreuses, alternes, médiocrement pétiolées, longues d'un à deux pouces, forment un demi-pouce de large; ovales-lancéolées, presque elliptiques, velues à leurs deux faces dans leur jeunesse, pubescentes & presque luisantes en dessous lorsqu'elles sont plus avancées, tomentueuses, blanchâtres & foveuses en dessous, ciliées à leurs bords, très-entières, aiguës ou arrondies à leur sommet, quelquefois un peu rétrécies vers leur pétiole.

Les fleurs sont disposées sur des chatons alternes, peu nombreux, épais, tomenteux, très-blancs, cylindriques, longs presque de deux pouces, obtus, pédonculés; les pédoncules un peu plus courts que les chatons, très-velus, munis de quelques feuilles semblables à celles des rameaux, mais plus courtes. Les capsules sont serrées, ovales, presque turbinées, chargées d'un duvet épais & tomenteux.

Cette plante croît sur les hautes montagnes des départements méridionaux de la France, en Suisse,

dans les Pyrénées & dans la Lapponie.  $\bar{h}$  (Commun. Foucault.)

23. SAULE des sables. *Salix arenaria*. Linn.

*Salix foliis integris, ovatis, acutis, supra subvillosa, subtus tomentosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1447. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 237. n°. 23. — Flor. suec. 806. 894. — Iter, Gott. 106. — Neck.-r. Gallob. 395. — Pall. Iter 3. pag. 33. — Pollich. Pal. n°. 922. — Eder. Flor. dan. tab. 197. — Gart. Flor. belg. 163.

*Salix foliis integris, subtus villosa, ovatis, acutis*. Flor. lappon. 362. tab. 8. fig. O, Q.

*Salix foliis integris, ovatis, acutis, supra subvillosa; stipulis ovatis, acutis*. Duroi, Harbk. 2. pag. 408.

*Salix pumila, foliis utrinque candelatis & lanuginosis*. C. Bauhin, Pin. 474. — Rai, Angl. 3. pag. 44. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 164. tab. 36. fig. 1. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 10.

Ce saule, qui a beaucoup de rapports avec le *salix lapponum*, est un petit arbrisseau, dont les tiges sont droites, glabres, hautes de trois à quatre pieds, pourvues de rameaux diffus, inégaux, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, un peu oblongues, très-entières à leurs bords, glabres ou un peu velues à leur face supérieure, blanchâtres & tomenteuses en dessous, velues à leurs deux faces dans leur jeunesse, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en chatons alternes, presque sessiles, tomenteux, ovales, un peu cylindriques, courts, serrés, munis à leur base de deux ou trois petites folioles très-courtes, en forme de bractées. Les écailles calicinales sont ovales, obtuses, brunes, velues, contenant chacune, dans les fleurs mâles, deux étamines, dont les filaments sont plus longs que les calices. Les ovaires sont ovales, pyriformes, remplacés par une capsule un peu pédoncelée, entièrement recouverte par un duvet épais, blanc, tomenteux & soyeux.

Cette plante croît dans les marais de l'Europe, en Hollande, dans la Belgique. On la trouve aussi aux environs de Paris, à Saint-Léger.  $\bar{h}$  (V. f.)

24. SAULE des Pyrénées. *Salix pyrenaica*. Gouan.

*Salix foliis integerrimis, lanceolatis, subius serratis; caule prostrato*. Gouan, Illustr. pag. 77. 1°. 10.

*Salix repens*. Camer. Epitom. Icon. 108.

*Salix latifolia, prima*. Clus. Hist. pag. 85. Icon.

*Salix latifolia, repens*. C. Bauh. Pin. 7. — Tournef. Inst. R. Herb. 591.

Ce saule, très-voisin du *salix lapponum*, est un

fort petit arbrisseau, dont les tiges, couchées, presque rampantes, sont longues d'environ un pied ou un pied & demi, divisées en rameaux épais, diffus, très-inégaux, dont les feuilles sont minces, alternes, un peu ovales ou lancéolées, souvent rétrécies en coin à leur base, très-entières à leur contour, un peu aiguës à leur sommet, glabres à leur face supérieure, légèrement soyeuses en dessous, pubescentes à leurs deux faces dans leur jeunesse.

Les chatons se montrent peu après les feuilles; ils sont alternes, un peu grêles, alongés, pédonculés; les pédoncules très-longs, un peu velus, munis de feuilles semblables à celles des rameaux. Les écailles calicinales sont courtes, un peu velues, de couleur brune, renfermant deux étamines; les capsules alongées, fusiformes, sessiles, revêtues d'un duvet blanc & coroneux, à une seule loge, à deux valves réfléchies & roulées en dehors.

Cette plante croît sur les hautes montagnes des Pyrénées, presque dans la région des neiges.  $\bar{h}$

25. SAULE des dunes. *Salix incubacea*.

*Salix foliis integerrimis, lanceolatis, subius villosa, nitidis; stipulis ovatis, acutis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 1447. — Syst. Plant. vol. 4. par. 231. n°. 24. — Flor. suec. 807. 895. — Scholl. Barb. n°. 792. — Dalib. Paris. 199. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 233. n°. 241.

*Salix foliis ovato-lanceolatis, integerrimis; ramis decumbentibus, radice reptatrice*. Royen, Lugd. Bat. 84.

*Salix foliis integris, ovatis, aliquot linearum longis; caulibus vix assurgentibus*. Guetard, Stamp. 416.

*Salix pumila, foliis ellipticis, integerrimis, subius glaucis; spica rotundiore*. Hall. Helv. 1. pag. 153.

Cette espèce se rapproche beaucoup du *salix arenaria*; elle en diffère par son port, & un peu par la forme de ses feuilles & de ses chatons.

Ses tiges sont longues de deux ou trois pieds, divisées en rameaux très-nombreux, diffus, presque couchés, pendans, entoilés, étalés, junonâtes, glabres, pubescens sur les jeunes pouties, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, ovales, un peu élargies, presque elliptiques, très-entières à leurs bords, lisses, pubescentes, presque glabres à leur face supérieure, luisantes, blanches & velues en dessous, un peu aiguës à leur sommet, munies à leur base de stipules ovales, aiguës, particulièrement les feuilles supérieures. Les chatons femelles sont courts, épais; les mâles plus grêles, plus alongés, tomenteux & blanchâtres; les capsules velues, ovales, un peu aiguës.

Cette plante croît en Europe, dans les prés humides & marécageux. On la trouve aussi à Saint-Léger, dans les environs de Paris. *h* (V. f.)

26. SAULE foyeux. *Salix sericea*. Willd.

*Salix foliis urinqu candidis, lanceolatis, integerrimis; caule prostrato; iulis cusfolisque crassis, sericeis.* Villars, Dauph. vol. 4. pag. 782. n°. 27. tab. 51. fig. 27. — Hoffm. Germ. pag. 264.

Cet arbrisseau a les tiges couchées, longues d'environ un pied & demi ou deux pieds, quelquefois plus, lisses, de couleur brune, divisées en rameaux alternes, un peu étalés, velus, garnis de feuilles alternes, ovales-oblongues ou lancéolées, très-entières à leurs bords, foyeuses, tomenteuses de blanchâtres à leurs deux faces, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en chatons alternes, épais, courts, cylindriques, pédonculés, très-velus; les pédoncules allongés, tomenteux, munis de quelques folioles assez semblables à celles des rameaux, mais plus petites. Les écailles calicinales sont presque ovales, blanches, tomenteuses, d'un brun roussâtre, renfermant deux étamines, dont les filaments sont beaucoup plus longs que les calices. Les capsules sont filiformes, ovales, subulées, couvertes d'un duvet blanc & coronées.

Cette plante, très-voisine du *salix lapponum*, se rencontre dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Grenoble, sur les hautes montagnes & les roches humides. On la trouve aussi dans l'Allemagne. *h* (V. f.)

27. SAULE de Suisse. *Salix helvetica*. Villars.

*Salix foliis lanceolatis, superat atro-viridibus, reticulatis, inferat nervis; iulis oblongis, basi foliifis; cusfolis sericeis.* Villars, Dauph. vol. 4. p. 783. n°. 27.

Cette espèce est un petit arbrisseau dont les tiges sont droites, à peine hautes de deux pieds, médiocrement rameuses, lisses, d'un brun-clair ou rougeâtre, légèrement velues sur les jeunes pousses, garnies de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, oblongues, lancéolées, fermes, très-entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, d'un vert-foncé & glabres à leur face supérieure, velues, luisantes & d'un blanc de neige en dessous; les jeunes feuilles sont tomenteuses à leurs deux faces.

Les fleurs sont réunies en chatons alternes, peu nombreux, médiocrement pédonculés, cylindriques, un peu liches; le pédoncule tomenteux, garni de quelques folioles lancéolées, foyeuses à leurs deux faces. Les écailles calicinales sont velues, d'un brun noirâtre, un peu ovales, contenant deux étamines beaucoup plus longues que les

calices; les capsules oblongues, un peu ventrues à leur base, subulées vers leur sommet, blanches & tomenteuses.

Cette plante croît en Suisse, dans les Alpes, & dans les départements méridionaux de la France. *h* (V. f.)

28. SAULE comprimé. *Salix depressa*. Hoff.

*Salix foliis integerrimis, ovato-oblongis, supra globosis, fimbriis sericeis.* Hoffm. Hist. Salic. vol. 1. pag. 63. n°. 10. tab. 15. fig. 1-4.

*Salix (repens), foliis integerrimis, lanceolatis, utrinque nudiusculis; caule repente.* Linn. Syst. veget. pag. 880. n°. 27. — Light. Flor. scot. 606. — Retz. Prodr. Scand. n°. 1099. ?

*Salix repens, foliis integerrimis, lanceolatis, utrinque subulosis; caule repente.* Linn. Syst. Nat. pag. 646. — Spec. Plant. pag. 1020. n°. 23. — Flor. succ. edit. 2. n°. 896. — Gunn. Norweg. n°. 989. ?

*Salix repens.* Scop. Carn. edit. 2. n°. 1213.

*Salix repens, foliis integerrimis, lanceolatis, fimbriis villosis, nitidis.* Hudt. Flor. angl. edit. 2. 428. var. 5. ?

*Salix alpina, pumila, rotundifolia, repens, inferat subcinerea.* C. Bauh. Pin. 474. ? Tourn. Inst. R. Herb. 591.

*Salix pumila latifolium genus, I & II.* Cluf. Hist. 1. pag. 85.

Hoffman regarde comme douteux que le *salix repens* de Linné, ainsi que la synonymie de cet auteur, convienne parfaitement à cette espèce, synonymie qui d'ailleurs pourroit presque convenir également aux *salix arenaria*, *incubacea*, *scissa*, &c. la plante de Linné étant de plus présentée par lui, tantôt avec des feuilles entièrement glabres, tantôt un peu pileuses à leurs deux faces. Quoi qu'il en soit, je me bornerai ici à décrire la plante d'Hoffman, que j'ai vue sèche dans plusieurs herbiers.

Ses racines sont noirâtres, épaisses, rampantes, noueuses; elles produisent une tige comprimée, qui se divise dès la base en plusieurs rameaux épars, les uns couchés, d'autres redressés, glabres, nouveaux, roussâtres ou d'un vert-jaunâtre, longs de quatre à six ou huit pouces, un peu pubescens, chargés d'un grand nombre de bourgeons ovales, un peu arrondis, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolées, droites, entières à leurs bords, longues d'un pouce, sur un demi-pouce de large; les inférieures ovales-lancéolées; les supérieures ovales, oblongues ou quelquefois parfaitement ovales, presque aiguës à leur sommet, glabres à leur face supérieure, médiocrement



foyeuses, presque glauques en dessous, les pétiolés courts, épais, un peu foyeux.

Les chatons mâles sont ovales-oblongs, un peu velus, longs d'un demi-pouce, alternes, épais, rapprochés, au nombre de dix à douze, à peine pédonculés, munis à leur base de quelques folioles ou écailles droites, ovales, très-glabres, un peu foyeuses à leurs bords. Les écailles calicinales sont imbriquées, arrondies à leur sommet, étroites à leur base, brunes, un peu velues, très-courtes, presque planes. Chacune d'elles contient deux étamines dont les filaments sont blancs, filiformes, à l'ins avec l'appendice, qui est droit, conique & verdâtre; les anthères petites, arrondies, à quatre loges, un peu rougeâtres à leur sommet.

Les chatons femelles sont ovales, oblongs, droits, alternes, plus courts que les mâles, munis à leur base de quelques folioles ovales-lancéolées, velues à leurs bords & à leur face inférieure, souvent rougeâtres à leur sommet, vertes en dessus; les écailles calicinales sont oblongues, imbriquées, un peu velues, obtuses à leur sommet, brunes ou d'un vert-pâle. L'ovaire est pédonculé, lancéolé, d'un vert-blanchâtre, un peu velu, plus long que l'écaille, surmonté d'un style court, d'un vert-jaunâtre, terminé par deux stigmates fort petits. Le fruit est une capsule ovale, subulée ou acuminée, ventrée à sa base, presque glabre, à deux valves réfléchies, à une seule loge contenant une semence linéaire, verdâtre, tronquée, environnée à sa base d'une aigrette blanche, luisante, très-fine.

Cet arbruste croît dans les forêts de l'Europe septentrionale, dans les terrains tourbeux & humides. h (P. f.)

#### 29. SAULE brun. *Salix fusca*. Linn.

*Salix foliis integrimis, ovatis, subius pubescentibus*. Linn. Spec. Plant. 1020. — Syst. veget. pag. 717. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 232. n. 26. — Miller. Illust. — Jacq. Austr. tab. 409.

*Salix foliis integrimis, ovatis, subius villis nitidis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 144. — Flor. japon. 365. tab. 8. fig. R. — Flor. suec. 802. 837. — Rozen, Lugd. Bat. 84. — Jacq. Vind. 294. Pallas, Iter 3. pag. 33. — Necker, Gallob. pag. 356. — Scholl. Barb. n. 793. — Gouan. Pl. 78.

*Salix alpina, myrti tarraensis foliis*. Rudb. Lappon. 100. ?

Cette plante se rapporte tellement avec le *Salix incubraea*, *arenaria*, *repens*, qu'il est difficile de lui assigner des caractères spécifiques bien constants. Peut-être n'est-elle qu'une variété d'une des espèces précédentes; elle n'est d'ailleurs encore connue que très-imparfaitement.

C'est, d'après Linné, un petit arbrusteau rap-

pant, rameux, dont les feuilles sont alternes, à peine pétiolées, fort petites, ovales, entières à leurs bords, glabres à leur face supérieure, garnies en dessous de quelques poils rares, épars, foyeux, luisants. Les chatons sont tomenteux, dépourvus de feuilles à leur base. Ils forment d'un bourgeon à une seule valve ou écaille, qui se divise en deux parties. Ces chatons, ainsi que la face supérieure des feuilles, prennent très-souvent une couleur noire.

Cette plante croît en Europe, dans les pâturages & les lieux humides. h

#### 30. SAULE bleuâtre. *Salix caesia*. Vill.

*Salix foliis elliptico-lanceolatis, glabris, inferius caesis, integrimis*. Vill. Dauph. vol. 4. pag. 768. n. 21. tab. 50. fig. 11.

Ce saule a des rapports avec le *Salix arbuscula*; il en diffère par ses tiges beaucoup plus élevées, par ses feuilles glabres, très-entières.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à quatre pieds, très-rigides; les rameaux courts, diffus, un peu rougeâtres ou verdâtres, très-glabres, garnis de feuilles alternes, lancéolées, un peu ovales ou elliptiques, glabres à leurs deux faces, d'une couleur glauque ou bleuâtre à leur face inférieure, très-entières à leurs bords, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs ne paraissent qu'après la pousse des feuilles: elles sont disposées en chatons courts, alternes, peu garnis de fleurs, à peine pédonculés; les pédoncules munis de quelques folioles ou petites velues. Les écailles calicinales sont à peine pubescentes, un peu allongées, obtuses, jaunâtres: les capsules ovales, subulées, étroites, légèrement pubescentes & foyeuses.

On rencontre ce saule dans les Alpes, le long des ruisseaux, & dans les départements méridionaux de la France. h

#### 31. SAULE à feuilles de romarin. *Salix rosmarinifolia*. Linn.

*Salix foliis integrimis, lanceolato-linearibus, brevibus, sessilibus, subius tomentosis*. Linn. Spec. Plant. pag. 1020. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 231. n. 27. — Rozen, Lugd. Bat. 84. n. 13. — Flor. suec. n. 898. — Lam. Flor. franc. vol. 2. pag. 232. n. 241.

*Salix procumbens, foliis lanceolatis, subius scissis*. Haller, Helv. n. 1644.

*Salix foliis lanceolato-linearibus, subius villis, flexuosis*. Corr. Ing. pag. 156.

*Salix humilis, angustifolia*. C. Bauh. Pin. 474. — Tournef. Inst. R. Herb. 391. — Duham. Arb. 2. pag. 244. n. 5.

*Salix humilis, repens, angustifolia*. Lobel. Icon. pars 1. tab. 137. — J. Bauh. Hist. 1. pars 2. pag. 214. lc.

On distingue cette espèce à ses tiges basses, couchées; à ses feuilles sessiles, presque linéaires; à les charbons dépourvus de bractées.

Ses racines sont rampantes, dures, fibreuses, un peu noires. Les tiges n'ont souvent pas un pied de long, & se divisent en rameaux diffus, assez nombreux, revêtus d'une écorce brune, pubescents dans leur jeunesse. Les feuilles sont alternes, presque sessiles, très-étroites, linéaires, lancéolées, alongées, fermes, glabres à leur face supérieure, excepté dans les jeunes feuilles; revêtues en dessous d'un duvet soyeux, argenté; un peu aiguës à leur sommet, entières & un peu roulées à leurs bords, dépourvues de stipules. Les fleurs sont diques, disposées sur des charbons courts, presque sessiles, sans feuilles à leur base; les capsules ovales, presque aiguës.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, & dans plusieurs autres contrées de l'Europe. h

\*\*\* Feuilles velues, plus ou moins dentées.

### 32. SAULE MARCEAU. *Salix caprea*. Linn.

*Salix foliis ovatis, Agostis, subius tomentosis, supernè denticulatis*. Linn. Syst. Planr. vol. 4. pag. 231. n°. 28. — Royen, Lugd. Bat. 83. — Flor. suec. n°. 811. 900. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 157. — Dalib. Paris. 298. — Miller, Dict. n°. 13. — Necker, Gallob. pag. 395. — Duroi, Harbk. 2. pag. 424. — Gouan, Illustr. 78. — Poll. Pal. n°. 923. — Matrusch. Sil. n°. 713. — Dextr. Nass. pag. 271. — Cæder. Flor. dan. tab. 245. — Light. Flor. scor. pag. 607. — Rerz. Prodrum. n°. 1101. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 429. — Hoffm. Hist. Sal. vol. 1. pag. 25. n°. 3. tab. 3. fig. 1, 2, & tab. 5. fig. 4. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 230. n°. 241.

*Salix foliis subcrenatis, utringue villosis, ovato-oblongis*. Flor. lapp. 365. tab. 8. fig. 5. — Royen, Lugd. Bat. 83.

*Salix foliis ovatis, rugosis, subius reticulatis, tomentosis; iulis ovatis; stipulis amplexicaulis, serratis*. Haller. Helv. n°. 1653.

*Salix caprea, latifolia*. Tabern. Icon. 1038.

*Salix latifolia, infernè hispida*. J. Bauh. Hist. 1. pag. 215. Icon.

*Salix latifolia, rotunda*. Bauh. Pin. 474. — Raj, Angl. 3. pag. 449. — Duham. Arbr. 28. — Dillen. Append. 37. — Tournef. Indl. R. Herb. 591.

*Salix folio rugoso, oster ferrato, subius lanuginoso; solo crassissimo*. Hall. Helv. pag. 153. n°. 17.

*Salix caprea, foliis signatis, ovatis, subius tomentosis; filamentis duobus distinctis*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 1205, & edit. 1. pag. 407.

*Salix folio ex rotunditate acuminato*. Tourn. Inst. R. Herb. 591. — C. Bauh. Pin. 474.

g. *Salix foliis oblongis, subius villosis, inferioribus crenatis, superioribus integris*. Flor. lapp. 367. tab. 8. fig. U. — Hoffm. Salic. L. c. tab. 21. fig. D.

*Salix foliis oblongis, integerrimis, acuminatis, supernè villosis, subius tomentosis*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 1205. var. 2. 3.

*Salix sphaulata*. Smith, Flor. britan. 3. pag. 1066.

γ. *Salix foliis elliptico-lanceolatis, subius sericeis, appendiculatis*. Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 163. n°. 19.

*Salix foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, subius pubescentibus*. Hoffm. Hist. Salic. vol. 1. pag. 28. var. 2.

*Salix foliis integerrimis, ovato-lanceolatis, subius sericeis; iulis ovatis*. Haller. 1651. 7. — Hudf. Angl. pag. 429. var. 2.

δ. *Salix ulmifolia*. Hort. Paris.

Il n'est, parmi les saules, aucune espèce qui offre un plus grand nombre de variétés que celle-ci, surtout dans la forme de ses feuilles: il n'en est d'ailleurs aucune qui se plaise davantage dans les sols secs, arides, un peu élevés. Si ce saule étoit moins commun, & que cette grande variété de formes ne s'offrit point habituellement à nos observations, il en résulteroit peut-être l'établissement de plusieurs espèces, qui cependant appartienneroient toutes à la même. Au reste, on peut en général la reconnoître à ses feuilles épaisses, un peu molles, presque toujours légèrement ondulées à leurs bords, pubescentes ou tomenteuses en dessous, tantôt ovales & larges, tantôt plus ou moins étroites, lancéolées.

Cet arbre, d'une hauteur médiocre, ne s'élève qu'à dix ou douze pieds. Son tronc est droit, revêtu d'une écorce glabre, grise, de couleur cendrée. Les rameaux sont nombreux, élancés, un peu cassans, un peu pendans, presque diffus, glabres, d'un jaune-verdâtre. Les feuilles sont alternes, pétiolées, épaisses, un peu molles, ovales ou arrondies, aiguës ou acuminées, d'un vert foncé, glabres ou légèrement pubescentes en dessous, blanchâtres, velues ou cotoneuses à leur face inférieure, ondulées & crénelées à leurs bords, quelquefois entières, & les crénelures orbiculaires; les nervures latérales, simples, alternes, dont l'intervalle est rempli par un réseau de veinules plus ou moins saillantes. Les pétioles sont courts, tomenteux, munis de stipules sessiles, amplexicaules, dentées,

dentées, caduques, qui ne persistent ordinairement que sur les feuilles supérieures.

Les fleurs paroissent un peu avant les feuilles; elles sont réunies en chatons alternes, distans. Les chatons mâles sont courts, ovales, épais, à peine pédicellés, tomenteux, garnis à leur base de bractées en forme d'écailles jaunâtres, velues, fortement ciliées à leurs bords. Les écailles calicinales sont oblongues, plus larges vers leur sommet, chargées de poils soyeux, abondans & touffus; chacune d'elles renferme deux étamines, dont les filamens sont très-longs, presque capillaires; les anthères petites, jaunâtres.

Les chatons femelles sont presque une fois plus longs que les mâles, cylindriques, moins serres, tomenteux, pédonculés; les pédoncules presque longs d'un demi-pouce dans leur entier développement, beaucoup plus courts avant la fécondation, garnis de quelques petites folioles lancéolées, tomenteuses & soyeuses à leurs deux faces. Les écailles calicinales sont ovales, un peu aiguës, d'un brun-noirâtre à leur sommet, très-velues; les ovaires oblongs, aigus, renflés à leur base; les capsules pédicellées, presque subulées, couvertes d'un duvet court, cendré, divisées en deux valves fortement roulées en dehors; les semences linéaires, foliaires, environnées d'une aigrette touffue, soyeuse, à peine aussi longue que les valves.

Les principales variétés de cette plante portent particulièrement sur la forme des feuilles, qui ressemblent quelquefois à celles de l'orme, tandis que d'autres sont ovales ou arrondies, ou lancéolées plus étroites, ainsi que je l'ai dit plus haut.

Cet arbre croît en Europe, presque partout sur les collines sèches, arides, & dans les bois.  $\text{H}$  (V. v.)

Son bois est tendre, léger, flexible: on l'emploie pour faire des boîtes, des arcs, des manches de hache, du couteau, & des paniers avec les jeunes rameaux. L'écorce est astringente: les Lapons en font un grand usage pour tanner les cuirs; ils l'emploient aussi en décoction pour guérir la cardialgie, accompagnée de salivation. L'odeur assez agréable des chatons mâles attire les abeilles. Les feuilles sont recherchées par les chèvres, les vaches, les moutons & les chevaux.

### 33. SAULE pédicellé. *Salix pedicellata*. Desfont.

*Salix foliis lanceolatis, rugosis, subtus tomentosis; capsulis pedicellatis, glabris.*

An *salix caprea*? Var. Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 261.

Cette espèce a de grands rapports avec le *salix caprea*. Ses feuilles sont ovales, oblongues, lan-

céolées, glabres & ridées à leur face supérieure, tomenteuses & de couleur cendrée en dessous. Les capsules sont glabres, pédicellées. Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines, dans le royaume de Tunis, sur les bords de la rivière *Sibou*.  $\text{H}$

J'ai mentionné, dans mon *Voyage en Barbarie*, une espèce de saule que j'ai rapportée comme variété au *salix caprea*, & qui me paroit avoir au moins autant de rapports avec l'espèce décrite par M. Desfontaines, qui en diffère néanmoins par quelques caractères particuliers, ainsi qu'on pourra l'observer par la description que je vais en donner.

Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de trois à quatre pieds, & quelquefois davantage; il se divise en rameaux nombreux, très-longs, plums, effilés, dont l'écorce est d'un brun un peu rougeâtre, revêtue d'un duvet court, cendré. Les feuilles sont alternes, pétiolées; les inférieures ovales, obtuses, quelquefois un peu arrondies, inégalement dentées en scie à leurs bords; les supérieures plus longues, plus étroites, lancéolées, aiguës, longues de deux à trois pouces sur un de large; les dents plus fines, plus distantes. Ces feuilles sont toutes fermes, membraneuses, glabres à leur face supérieure, un peu ridées, d'une couleur glauque, & légèrement pubescentes en dessous; munies de nervures saillantes latérales, alternes, presque simples, un peu jaunâtres, dont l'intervalle est rempli par des veines saillantes, transverses, presque réticulées. Les pétioles sont courts, pubescens, garnis de deux petites stipules arrondies, dentées, caduques.

Les chatons paroissent un peu avant les feuilles; les femelles sont cylindriques, épais, longs d'environ un pouce, obtus, pédonculés, à peine pubescens; les pédoncules tomenteux. Les capsules sont oblongues, aiguës, un peu pédicellées, velues dans leur jeunesse, presque glabres à l'époque de leur maturité. Je ne connois pas les fleurs mâles.

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, dans les environs d'Hyppone, sur les collines, le long des ruisseaux qui en descendent.  $\text{H}$  (V. v.)

### 34. SAULE acuminé. *Salix acuminata*. Hoffm.

*Salix foliis ovato-oblongis, subtus tomentosis, superioribus integris, inferioribus crenatis.* Hoffmann, Hist. Sal. vol. 1. pag. 39. n°. 5. tab. 6. fig. 1. 2.

*Salix (acuminata), foliis oblongo-ovatis, acuminatis, rugosis, subtus tomentosis.* Miller, Dict. n°. 14. — Dutoit, Observ. Botan. p. 55. n°. 9. ?

*Salix foliis ovato-lanceolatis, supra pubescentibus, subtus tomentosis.* Leyf. Hal. edit. 2. n°. 991. 7 ?

O o o o

*Salix foliis oblongis, urinque tomentosis, obtusis, modice acuminatis, obtusis ferratis.* Scopul. Carn. edit. 2. n°. 1205. var. 2. d. ?

*Salix caule erecto, foliis ellipticis, apicibus rectis.* Scopul. Carn. edit. 1. pag. 407. var. 3. ?

*Salix foliis oblongis, subtus villosis, inferioribus crenatis, superioribus integris.* Flor. Lppon. n°. 367.

*Salix caprea, cauto longoque folio.* Rai, Synop. 450. — Hudf. Angl. Var. 3. *Sal. caprea* ?

*Salix folio ex rotunditate acuminato.* C. Bauh. Pin. 474. — Rupp. J. n. n. 2. pag. 333.

Cette espèce tient le milieu entre le *salix caprea* & le *salix aurita*; & comme ces deux espèces sont soumises à beaucoup de variétés, il est aussi difficile de déterminer le caractère de cette plante, que de lui rapporter une synonymie bien certaine.

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de six à huit pieds, & forment quelquefois un arbre d'une médiocre grandeur, dont les branches sont glabres, cendrées, diffusées; les rameaux droits, très-nombreux; les inférieurs roides, tomenteux, d'un brun-cendré, alongés; les supérieurs plus courts, tachetés, lanugineux, blanchâtres dans leur jeunesse, garnis de feuilles droites ou ouvertes, alternes, pétiolées, rapprochées, ovales, oblongues, un peu aiguës, émousées à leur sommet, entières ou légèrement dentées en scie à leurs bords ou crénelées, d'un vert-foncé à leur face supérieure, planes, légèrement pubescentes, & un peu ridées, glauques ou pâles, & tomentueuses en dessous, longues d'environ trois pouces; les pétiolés très-courts & tomenteux, munis à leur base de stipules réniformes, filiformes, dentées & sinuées, très-souvent nulles aux feuilles supérieures.

Les chatons mâles sont alternes, ovales, oblongs, pédoncules, obtus à leur sommet, cylindriques, longs d'un pouce, velus, munis, sur leur pédoncule, de quelques écailles droites, lancéolées, foy-ales en dehors, brunes en dedans. Les écailles calicinales sont oblongues, imbriquées, élargies à leur sommet, obtuses ou un peu acuminées, pileuses, d'un brun noirâtre; elles renferment deux étamines; les filaments une fois plus longs que les écailles, un peu velus à leur base; les anthères droites, ovales, à quatre lobes, d'un jaune-brun; un appendice verdâtre, filiforme, ventru à sa partie intérieure, situé à la base de l'écaille calicinale.

Les chatons femelles sont cylindriques, blanchâtres, tomenteux, pédoncules, munis, sur leur pédoncule, de quelques folioles ovales-lancéolées. Les écailles calicinales sont oblongues, brunes, velues, obtuses ou un peu acuminées à leur sommet. L'ovaire est ovale, subulé, velu, d'un vert-

blanchâtre, pédicellé, surmonté d'un style court, terminé par deux stigmates droits, cylindriques, souvent bifides. Le fruit est une capsule ovale, subulée, bivalve, à une seule loge; les valves réfléchies en dehors; les semences lancéolées, foliiformes, environnées d'une aigrette très-fine, droite, longue, très-blanche.

Cette plante croît dans les lieux humides, parmi les buissons, dans les contées septentrionales de l'Europe. (V. f.)

35. SAULE à longues feuilles. *Salix viminalis*. Linn.

*Salix foliis subintergerimis, lanceolato-linearibus, longissimis, acutis, subtus sericeis; ramis virgatis.* Linn. Syst. veget. pag. 880 n°. 31. — Flor. suec. 2. n°. 901. — Hoffm. Hist. Salic. pag. 22. n°. 2. tab. 2. fig. 1. 2. — Rob. f. fig. 2. — Dalib. Parif. 297. — Mill. Dict. n°. 8. — Mull. Fridr. n°. 797. — Neck. Gallob. pag. 357. — Duroi, Observ. boran. n°. 7. — Idem, Harbk. 2. pag. 403. — Dorr. Naff. pag. 272. — Leers, Herborn. n°. 757. — Polich. Palat. n°. 924. — Light. Flor. Scot. pag. 668. — Matr. Sil. n°. 714. — Idem, Enum. n°. 936. — Reiz. Prodr. Scand. n°. 1103. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 430.

*Salix longifolia*. Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 232. n°. 241.

*Elagnus*. Dalech. Hist. 2. pag. 278. Icon. — Munting. Icon. 122.

*Salix foliis angustis & longissimis crispis, subtus albicantibus.* J. Bauh. Hist. t. pag. 212. Icon. — Dil. Append. p. 8. 43.

*Salix folio longifolmo, angustissimo, utrinque albedo.* C. Bauh. Pin. 474. — Tournet. Inst. R. Herb. 591. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 4.

*Salix folio longifolmo.* Rai, Angl. 3. pag. 450.

*Salix foliis undulatis, linearis-lanceolatis, subtus tomentosis.* Royen, Lugd. Bat. 84.

*Salix viminalis, foliis eximul-tis, lanceolato-linearibus, dentatis, rug-fis, i' frâ tomentosis, marginibus reflexis.* Scopul. Carn. edit. 2. n°. 1211. — Edit. 1. pag. 410.

*Salix foliis pratensis, obscurè dentatis, subtus tomentosis & albicantibus.* Hall. Helv. n°. 1641.

*Salix foliis ex linearis-lanceolatis, integris, subtus incanis.* Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 162. n°. 16. — Linn. Syst. veget. vol. 4. pag. 234.

C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur de quinze à vingt pieds, quelquefois davantage, dont les tiges sont quelquefois assez fortes, glabres, revêtues d'une écorce cendrée, & qui se divisent en rameaux effilés, alternes, très-alongés, fort simples, d'un vert jaunâtre ou cendré, quelquefois

un peu tomenteux à leur partie supérieure, & souvent ponctués, dont les feuilles sont alternes, assez rapprochées, droites, linéaires, lancéolées, très-longues, un peu ondulées à leurs bords, roulées dans leur jeunesse, acuminées à leur sommet, glabres, d'un vert-foncé ou un peu pubescentes à leur face supérieure, revêtues en dessous d'un duvet soyeux, argenté; soutenues par un pétiole cylindrique, canaliculé, un peu tomenteux, court, muni souvent, sur les rameaux de l'année, de stipules à demi-lancéolées.

Les fleurs sont renfermées dans des bourgeons univalves, ovales, acuminés, échancrés à leur sommet, un peu recourbés, d'une couleur livide, d'un jaune un peu cendré, souvent légèrement tomenteux en dehors, marqués de quatre veines parallèles. Les chatons mâles alternes, droits ou inclinés, ovales, oblongs, un peu velus, médiocrement pédonculés, garnis à leur base de deux ou trois folioles lancéolées, sessiles, soyeuses en dessous, réfléchies, quelquefois remplacées par des écailles brunes, lancéolées; celles des fleurs sont brunes, planes, un peu arrondies, pileuses à leur sommet, rétrécies & velues à leur base. Les étamines sont au nombre de deux, les filaments droits, filiformes, une fois plus longs que l'échelle calicinale; les anthères arrondies, comprimées, à quatre loges, jaunes, souvent de couleur écarlate à leur sommet.

Les chatons femelles sont alternes, ovales-oblongs, cylindriques, un peu velus, longs d'environ un pouce & demi; leur pédoncule court, velu, feuillé. Les écailles calicinales sont planes, imbriquées, plus longues que celles des fleurs mâles, garnies à leurs bords de cils noirâtres; un appendice sessile, comprimé, appliqué contre l'ovaire, une fois plus court que lui. L'ovaire est ovale, lancéolé, sessile, soyeux; le style très-long, filiforme, jaunâtre; le stigmate bifide. Le fruit est une capsule ovale, subulée, tétragone, à une loge, à deux valves roulées en dehors; les semences oblongues, enveloppées à leur base par une aigrette sessile, simple, pileuse.

Dans la plante g., les rameaux sont entièrement glabres; les feuilles roides, linéaires, lancéolées, luisantes & soyeuses en dessous; les bourgeons très-glabres; les chatons droits, ouverts, longs de deux pouces; le stigmate à deux ou quatre divisions réfléchies; c'est d'ailleurs un petit arbrisseau qui ne s'élève pas au-delà de trois à quatre pieds, & qu'on rencontre dans la Sibérie.

On rencontre quelques autres variétés de ce saule, surtout parmi les individus femelles, dont les feuilles sont plus ou moins blanchâtres en dessous; mais constamment argentées; les stigmates plus courts ou plus épais.

Cette espèce croît en Europe, dans les lieux humides & marécageux. (P. v.)

Ses branches, qu'on peut couper fréquemment & qui repoussent très-vite, fournissent des pieux que l'on emploie pour enclore les terrains cultivés, en écartant les troupeaux, & les abriter contre les grands vents. On fait avec les rameaux plusieurs ouvrages en osier, des corbeilles, des liens pour les ceils des tonneaux. Ses jeunes feuilles sont bonnes pour la nourriture des bœufs, & son bois, quoique d'une médiocre qualité, peut être employé au four.

### 36. SAULE cendré *Salix cinerea*. Linn.

*Salix foliis subferratis, oblongo ovatis, scabris subvillosis; stipulis dimidiato-cordatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 449. — Syst. Plant. vol. 4. pag. 234. n°. 31. — Flor. fu. c. 875. 902. — Leers. Herborn. pag. 219. n°. 738. — Smith. Flor. britann. 3. pag. 1063.

*Salix foliis integris, glabris, lanceolato-ovatis*. Flor. lappon. 356.

*Salix daphnoides*. ? Villars, Dauph. vol. 4. pag. 765. tab. 50. fig. 7. — Sut. Flor. helv. 2. pag. 281.

Ses tiges sont droites, glabres, hautes de trois à cinq pieds, divisées en rameaux diffus, souples, plans, d'une couleur plumeuse, en partie revêtus dans leur jeunesse d'un duvet cendré, garnis de feuilles alternes, pétioles, ovales, oblongues ou un peu lancéolées, un peu épaisses, velutées, luisantes à leur face supérieure, plus pâles, presque glauques ou un peu velues en dessous, légèrement dentées en scie à leurs bords, garnies par leur pétiole de stipules à demi en cœur, un peu dentées, & souvent de trois glandes de chaque côté.

Les chatons sont alternes, sessiles, épais, serrés, courts, cylindriques, ovales, obtus, garnis à leur inférieure de quelques bractées presque en écailles. Les écailles calicinales sont d'un brun-marron, couvertes de très-longues poils, renfermant chacune deux étamines. Les ovaires sont ovales, oblongs, très-glabres; le style allongé, divisé en deux stigmates courts, épais; les capsules élargies, un peu ventrues ou pyriformes à leur base, allongées, à deux valves, recourbées en dehors; les semences petites, presque linéaires, munies à leur base d'une aigrette blanche & soyeuse.

Cet arbrisseau croît dans les lieux humides & les pâturages des forêts en Europe, & dans les départements méridionaux de la France. (P. f.)

### 37. SAULE blanc. *Salix alba*. Linn.

*Salix foliis lanceolatis, acuminatis, serratis, utrinque pubescentibus; serraturis infimis, glandulosis*. Linn. Syst. Plant. vol. 4. pag. 234. n°. 31. — Hort. Cliffort. 475. — Flor. fu. c. n°. 812. 903. — Mart. medic. 214. — Dabb. Persif. 197. — Roven, Lugd. bat. 83. — Mill. Dict. n°. 1. — Gmel. Sibir. vol. 1.

O o o o

pag. 158. — Necker, Gallob. pag. 396. — Scopol. Carn. edit. 2. n°. 1112. — Gouan, ill. pag. 78. — Duroi, Harb. 2. pag. 400. — Poll. h. Palat. n°. 925. — Mattusch. Sil. n°. 715. — Dœrr. Natf. pag. 272. — Blackw. tab. 327. — Regnault, Botan. 1c. — Hoffm. Hist. Sal. vol. 1. pag. 41. n°. 6. tab. 7. 8. fig. 1, 2. — Leers, Herborn. n°. 759. — Light. Flor. Scot. pag. 609. — Reiz. Prodr. n°. 1105. — Hudf. Flor. angl. edit. 2. pag. 430. — Leyfer. Halens. edit. 2. n°. 995. — Thunb. Flor. japon. pag. 25. — Lam. Flor. franç. vol. 2. pag. 231. n°. 241. — Idem, Illustr. Ganer. tab. 802.

*Salix arborea, foliis ellipticis, lanceolatis, subius sericeis, dentibus crassiferviis.* Haller, Helv. n°. 1635.

*Salix vulgaris, alba, arborescens.* C. Bauh. Pin. 473. — Dillem. Append. pag. 41. — Rupp. Jen. edit. 2. pag. 131. — Tournet. Inst. R. Herb. 590. — Duham. Arbr. vol. 2. pag. 244. n°. 1. tab. 64.

*Salix alba.* Iter Scan. 100.

*Salix arborea, angustifolia, alba, vulgaris.* Rai, Hist. n°. 1419.

*Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta.* J. Bauh. Hist. 1. pag. 112.

*Salix.* Lobel. Icon. pars 2. tab. 136.

Vulgairement le saule commun.

Cette espèce est une des plus communes, des plus généralement cultivées, & porte presque exclusivement le nom de saule. Elle forme un assez bel arbre, qui s'élève à la hauteur de treize pieds environ, remarquable par ses feuilles, qui offrent même d'assez loin un éclat argenté, soyeux, d'un blanc luisant, ondule.

Son tronc est épais, droit, revêtu d'une écorce cendrée & ridée; ses rameaux droits, ouverts, touffus, très-nombreux, de couleur purpurine ou d'un brun-verdâtre, plus courts sur les individus mâles, légèrement pubescens vers leur sommet, garnis de feuilles alternes, pétiolées, oblongues, lancéolées, acuminées à leur sommet, rétrécies à leur base, finement dentées en scie à leur contour, pubescentes & luisantes à leur face supérieure, d'un blanc soyeux en dessous, particulièrement les feuilles supérieures; les inférieures quelquefois glabres en dessus, glauques en dessous, les dentelures brunes & glanduleuses; la nervure du milieu blanchâtre, les latérales parallèles, presque simples; le pétiole court, comprimé, canaliculé, un peu pubescent. Ces feuilles sont roulées dans leur jeunesse; celles des individus mâles plus étroites, plus soyeuses, longues de deux à trois pouces, sur un demi-pouce de large.

Les chatons mâles sont épars, cylindriques, légèrement velus, obtus, pédonculés, munis sur

leur pédoncule de trois ou quatre folioles ovales, lancéolées, médiocrement pédonculées. Les écailles calicinales d'abord imbriquées, puis réfléchies, ovales, lancéolées, concaves, aiguës, un peu velues, d'un vert jaunâtre ou un peu brunes; elles contiennent deux étamines, dont les filaments sont droits, filiformes, d'un blanc-jaunâtre, cônes, velus à leur base, une fois plus longs que les étamines, surmontés par des anthères arriérées, à quatre loges, jaunâtres, souvent de couleur purpurine à leur sommet.

Les chatons femelles sont grêles, alternes, cylindriques, longs de deux pouces; leur pédoncule tomenteux, cylindrique, presque long d'un pouce, muni de quelques feuilles ovales, lancéolées; les écailles calicinales oblongues, un peu aiguës à leur sommet, à peine velues, d'un blanc-verdâtre. L'ovaire est sessile, ovale-oblong, glabre, verdâtre, surmonté d'un style court, bifide à son sommet, terminé par quatre stigmates obtus, d'un jaune-pâle, verdâtres. Les capsules sont ovales, oblongues, ventrues à leur base, à peine pédonculées, jaunâtres quand elles sont mûres, à une loge, à deux valves s'ouvrant à leur sommet; les valves fortement réfléchies en dehors; les semences environnées à leur base d'une aigrette filiforme. Les fleurs sont quelquefois monoïques sur le même chaton, dont les fleurs femelles occupent la base, & les fleurs mâles la partie supérieure.

Cet arbre se rencontre dans les forêts de l'Europe, le long des chemins & dans les environs des bourgs & villages. (V. v.)

L'écorce un peu avancée de cet arbre est astringente, mais point balsamique. On peut s'en servir pour tanner les cuirs. Sa décoction est antiputride; celle des jeunes rameaux, prise en infusion, est employée dans les fièvres intermittentes, & contre les vers lombriques. L'extracte se donne dans le cours de ventrie, les coliques vénéreuses, le vomissement séreux. On fait des bains fortifiants contre le rachitisme avec la décoction des feuilles & de l'écorce. On obtient de la même écorce une couleur rouge, sanguine. Dans les pays chauds, les branches coupées distillent une liqueur mielée, qui devient une sorte de manne par la dessiccation. Souvent les feuilles sont toutes couvertes de l'écume blanchâtre du *citada fumaria*.

Le bois est blanc, lisse, fibreux, fort tenace. Il donne une chaleur médiocre, brûle également, rend peu de fumée. Ses rameaux flexibles sont employés à faire des liens. C'est d'ailleurs un arbre dont la culture facile est agréable; il fournit un bel ombrage, & se plaît aux yeux par la beauté de son feuillage argenté. Les chèvres, les vaches & les moutons en mangent les feuilles. On ramasse, dans plusieurs pays, le duvet renfermé dans les capsules des chatons, qui approche beaucoup de l'édredon. On en fait des mèches, & l'on

soupçonner qu'il pourroit servir pour la fabrique de certaines étoffes. On fait des cercles & des corbeilles avec les grosses branches, & des liens avec les petits rameaux. Le charbon est bon pour les crayons & la poudre à canon.

18. SAULE à feuilles d'olivier. *Salix oleaefolia*. Villars.

*Salix foliis oblongis, subintegerrimis, superne splendens, inferne laevigatis; iulis ellipticis*. Villars, Plant. Dauph. vol. 4. pag. 784. n°. 28. tab. 51. fig. 18.

*Salix incana*. Hoffm. Germ. 4. pag. 265.

Cette plante a des riges droites, vertes ou un peu roussâtres, qui s'élèvent à la hauteur de huit à dix pieds, & se divisent en rameaux diffus, allongés, glabres, un peu pubescens à l'extrémité des jeunes pousses, garnis de feuilles alternes, médiocrement pétioles, allongées, très-étroites, presque lineaires, glabres, vertes & un peu luisantes à leur face supérieure, blanchâtres & cotonneuses en dessous, presque entières ou légèrement dentées à leur contour, aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont disposées sur des chatons alternes, courts, cylindriques, à peine pédonculés, obtrus; le pédoncule velu, muni à sa base de quelques petites folioles pubescentes. Les écailles calicinales sont glabres, un peu ovales, courtes, obtuses, d'un brun-jaunâtre, contenant chacune deux étamines dont les filaments sont réduits à leur base. Les capsules sont glabres, un peu pédicellées, ovales, allongées, presque subulées, d'un vert-jaunâtre, s'ouvrant en deux valves roulées en dehors, & contenant des semences solitaires, petites, munies d'un duvet foible.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, le long des ruisseaux. On la rencontre aussi dans l'Allemagne. (V. f.)

Observations. Il existe encore d'autres espèces de saul mentionnées par plusieurs auteurs, ou existantes dans les herbiers que j'ai vus. Ces plantes ont, ou trop d'analogie avec celles que j'ai décrites, ou sont trop peu connues, ou en trop mauvais état dans les herbiers, pour les rapporter ici. La crainte de faire de doubles emplois ou d'ajouter à l'obscurité d'un genre déjà si difficile à traiter, m'a déterminé à laisser le soin de les décrire à ceux qui pourront les observer avec les détails convenables. Je me bornerai à en mentionner quelques-unes.

Michaux, dans sa *Flore de l'Amérique septentrionale*, cite les espèces suivantes :

SAULE ériocéphale. *Salix eriocephala*.

*Salix diandra, ramulis minimis tomentosis; foliis oblongo-ovalibus, basi subretusis, serrulatis; amennis*

*ovalibus, conferim villosissimis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 225.

Ce saule a beaucoup de rapports avec le *salix caprea* : ses jeunes rameaux sont légèrement tomenteux, garnis de feuilles alternes, ovales-oblongues, aiguës à leur sommet, un peu émousées à leur base, médiocrement dentées à leur contour. Les chatons sont ovales, ferrés, très-velus; chaque écaille calicinale ne renferme que deux étamines.

Cette plante se trouve en Amérique, dans le pays de l'Illinois. (V.)

SAULE en cœur. *Salix cordata*.

*Salix ramulis foliisque villosis; floribus cordato-ovalibus, acuminatis, argute serrulatis; stipulis foliaceis, maximis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 225.

Les rameaux de cette plante sont velus; les feuilles alternes, ovales, velues, échanquées en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, finement & légèrement dentées en scie à leur contour. Les chatons sont munis sur leurs pédoncules, de bractées très-grandes, semblables aux feuilles.

Cette plante croît au Canada, sur les bords du lac de Saint-Jean. (V.)

SAULE blanchâtre. *Salix incana*.

*Salix foliis lanceolato-oblongis, integerrimis, utrinque tomentosis, subulis candidioribus; petiolis brevibus, basi auriculatis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 225.

Ce saule a des feuilles pétioles, alternes, oblongues, lancéolées, très-entières à leurs bords, tomenteuses à leurs deux faces, plus blanches à leur face inférieure, supportées par des pétioles courts, garnis d'oreillettes à leur base.

Cette plante se trouve au Canada, dans les environs du lac de Saint-Jean. (V.)

SAULE à long bec. *Salix longirostris*.

*Salix pumila, diandra; foliis subfistibus, longiusculis lanceolatis, subcuneatis, integris, serratis, utrinque tenuiter tomentosis; amennis oblongo-ovalibus, cinereis; capsulis divergentibus, longissime rostratis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 226.

*Salix alpina*. ? Walter. Flor. carolin.

Arbrisseau fort petit, voisin du *salix arenaria*, dont les feuilles sont alternes, à peine pétioles; lancéolées, un peu allongées, presque rétrécies en coin à leur base, presque entières à leurs bords, légèrement tomenteuses à leurs deux faces. Les fleurs sont réunies en chatons ovales-oblongs, de couleur cendrée; les fleurs mâles munies de deux étamines. Les capsules sont divergentes, longuement subulées, en forme de bec.

On rencontre cette plante dans l'Amérique septentrionale, depuis la Nouvelle-Angleterre jusque dans la Caroline; elle est surtout abondante dans les buissons, sur les rochers arides de l'ennallée. h

SAULE de la Caroline. *Salix caroliniana*.

*Salix foliis lanceolatis, subulterior argenteo ferrulatis, subsessilibus, flaminibus quatuor aut sex; amentis femineis squamis oblongis, minutissimis pariterque lanuginosis; ovario oblongo, glabris.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 226.

*Salix pennsylvanica*. ? Walter. Flor. carolin.

Ce saule a des rapports avec le *salix triandra* de Linné. Ses feuilles sont lancéolées, alternes, presque sessiles, finement dentées en scie à leurs bords. Les étamines sont au nombre de quatre à six. Les écailles calicinales des chatons femelles sont oblongues, en partie recouvertes d'un duvet fin, lanugineuses; les ovaires glabres, allongés.

Cet arbrisseau croît à la Caroline & dans la Géorgie. h

Especies moins connues ou douteuses.

\* *Salix (trifida), exstipulata; foliis lineari-lanceolatis, petiolatis, rugosis, subtus tomentosis.* Aiton, Hort. Kew. vol. 3. pag. 393.

\* *Salix (flava), foliis lanceolatis, acutis, petiolatis, supra pubescentibus, subtus tomentosis, glaucis.* Schæpf. Mater. medic. Amer. pag. 147.

\* *Salix (berberifolia), foliis ovatis, rigidis, reticulato-venosis, serrato-dentatis.* Pall. Iter, vol. 3. pag. 759. tab. K k. fig. 7.

\* *Salix (excella), foliis sessilibus, ovato-oblongis, acuminatis, subtus villosis, inferioribus integris.* Gmel. Iter 3. tab. 34. fig. 1.

\* *Salix (serotina), foliis ovato-lanceolatis, subtus venosis, inaequalibus.* Pallas, Iter, vol. 3. pag. 759. tab. N.

\* *Salix (nitida), foliis integris, ovatis, obtusis, mucronatis, utrinque subvillosis.* Gmel. Iter, vol. 3. tab. 18.

\* *Salix (chilensis), foliis integerrimis, lanceolatis, acuminatis.* Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 73. — Molina, Hist. Nat. Chili. pag. 145.

\* *Salix (integra), foliis integris, lineari-oblongis, obtusis.* Thunb. Flor. japon. pag. 24.

\* *Salix (japonica), foliis lanceolatis, subtus glaucis, junioribus villosis.* Thunb. l'lot. japon. pag. 24.

\* *Salix (antiseptilis), foliis lineari-lanceolatis, subsessilibus.* Schæpf. Mater. medic. Amer. p. 47.

\* *Salix (olivacea), glaberrima; ramis nuda*

*olivacea; stipulis lanceolatis; foliis oblongo-lanceolatis, serratis, subtus subglauca; amentis squamis promissis villosissimis.* Thuill., Flor. parif. edit. 2. pag. 514. n°. 11.

Cette plante a de très-grands rapports avec le *salix helix*, & paroît n'en être qu'un variétés.

\* *Salix (membranacea), foliis lanceolatis, utrinque subaequaliter angustatis, acutis, cum minuto mucrone, tenuissimis membranaceis, rariterque serrulatis; amentis femineis cylindricis, villos breviter densoque canescentibus; capsula erectis.* Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 515. n°. 13.

\* *Salix (rostrata), foliis lineari-lanceolatis, planis, acutissimis, vix manifeste rariterque serrulatis, subtus subserico-glaucis; amentis femineis subglobosis; capsula argenteis, longo-rostratis, divergentibus.* Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 517. n°. 19.

SAVONIER. *Sapindus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polyptères, de la famille du même nom, qui a des rapports avec les *paullinia*, les *litchi* (*cajuputa*), & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, ailées, ordinairement sans impaire, quelquefois ternées; les fleurs disposées en une panicule terminale.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à quatre folioles; quatre pétales doubles; les intérieurs glanduleux à leur base; huit étamines; un seul style; un stigmate; trois capsules charnues, globuleuses, dont deux avortent souvent.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice à quatre ou cinq folioles ouvertes, colorées, ovales, presque égales, planes, caduques; deux de ces folioles extérieures.

2°. Une corolle composée de quatre ou cinq pétales ovales, ongiculés, dont deux plus rapprochés; quatre autres pétales intérieurs droits, oblongs, concaves, insérés vers la base des pétales extérieurs; quatre glandes anodines, à la base des mêmes pétales.

3°. Huit étamines, dont les filaments sont quelquefois velus à leur partie intérieure, aussi longue que la corolle, terminés par des anthères droites, échanrées en cœur à leur base.

4°. Un ovaire triangulaire, supérieur, surmonté de trois styles & de trois stigmates.

Le fruit consiste en trois capsules globuleuses, charnues, rapprochées, dont très-souvent deux avortent; elles contiennent chacune une seule semence sphérique.



*Observations.* Ce genre est distingué des lichis (*esphoria*) par les pétales doublés intérieurement; ce qui n'a pas lieu dans les lichis, dont le fruit d'ailleurs consiste en une seule capsule. Très souvent, à la vérité, on n'en observe qu'une seule dans les *sapindus*; mais cela n'arrive que par avortement, ainsi que l'indiquent très-évidemment les trois lobes de l'ovaire, les trois styles & les trois stigmates.

Le *sapindus chinensis* de Linné fils offroit des caractères suffisans pour le faire passer dans un autre genre, qui en effet a été établi sous le nom de *koeleruteria*. Il n'a qu'une seule capsule divisée en trois loges, & chaque loge renferme deux semences.

## E S P È C E S.

1. SAVONIER moussieux. *Sapindus saponaria*. Linn.

*Sapindus inermis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, rachis alata.* Art. Hort. Kew. vol. 1. pag. 35. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 468. n° 1. — Lam. Illustr. Gen. pl. 307. fig. 1.

*Sapindus foliis impari-pinnatis, caule inermi.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 526. — Mater. med. pag. 105. — Miller, Dict. n° 1.

*Sapindus.* Hort. Cliffort. 152. — Royen, Lugd. Bat. 464.

*Sapindus foliis oblongis, vix petiolatis, per costam amplex. alatum.* Brown, Jam. 306.

*Sapindus foliis costis alatis inaequantibus.* Tournef. Inst. R. Herb. 659.

*Prunifera racemosa, folio alato, costis mediis, membranulis utrinque exstantibus donata.* Sloan, Jam. 184. Hist. 2. pag. 131.

*Nax americana, foliis alatis, bifidis.* Commel. Hort. 1. pag. 183. tab. 94.

*Sapindus foliis glabris, abrupte pinnatis; foliolis ovatis-lanceolatis; f. subulis sphericis, teretibus.* Michx. Flor. borcal. Amer. vol. 1. pag. 242.

Vulgairement arbre à savonnettes, savonnier.

C'est un arbre d'une grandeur médiocre, dont le tronc se divise, à quelques pieds de terre, en plusieurs grosses branches étalées, & en rameaux dont l'écorce est d'un brun-grisâtre, marquée de petites raches ovales, blanchâtres. Le bois est blanc, gommeux, d'une odeur & d'un saveur approchant de la résine coral. Les feuilles sont alternes, ailées, fort amples, sans impaire; composées de quatre paires de folioles lancéolées, inégales, longues de trois à quatre pouces & plus, d'un vert-gai, glabres en dessus, un peu pubescentes en dessous, particulièrement dans leur jeunesse, entières à leurs bords, acuminées; la der-

nière paire souvent très-longue, irrégulière, confluenne à sa base; routes traversées par une côte jaunâtre, avec des nervures fines, latérales, & des veines réticulées. Les pétioles sont munis d'une aile de la même substance que les feuilles, nerveuse, plus ou moins élargie.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, la corolle est petite; les fruits sont pendans, du la grosseur d'une cerise, globuleux, d'un rouge jaunâtre, luisans, d'un saveur douce & astringente, renfermant sous l'écorce une pulpe gluante, jaunâtre, très-amère, adhérente à un noyau noir, arrondi, dans lequel est renfermée une amande presque aussi savoureuse que la noisette. La liqueur visqueuse qui découle de ces fruits les a fait nommer, par les Espagnols, *cerifes gommeuses*.

Cet arbre croît dans l'Amérique, aux Antilles. On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v. *fr. flor.*)

Les habitans des Antilles se servent de la racine, & surtout des fruits de cet arbre, pour produire le même effet que le savon. On met quelques-uns de ces fruits dans de l'eau chaude, & l'on en savonne le linge & les habits. L'eau devient blanchâtre, très-moussieuse, & nétoie fort bien. On doit éviter l'usage trop fréquent de cette espèce de savon, qui à la longue gâte & brûle le linge. Les fruits se fondent peu à peu dans l'eau, jusqu'à ce qu'il n'y demeure plus rien que les noyaux qui sont très-durs, & qui, étant percés, servent à faire des grains de chapelets aussi noirs & même plus luisans & plus beaux que ceux d'ébène. On les appelle *perles de savon*. On prétend que la liqueur gluante des fruits a la propriété d'arrêter les pertes de sang, & même la fièvre. On les recommande dans les pâles-couleurs. (*Bomare, Dict.*)

2. SAVONIER roide. *Sapindus rigida*. Vahl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis; rachis simplicibus, corollis frutibusque glabris.* Vahl, Symbol. 3. pag. 55. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 470. n° 8.

*Sapindus inermis, foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis; rachis simplicibus.* Aiton, Hort. Kew. vol. 2. pag. 36. — Cætern. de Fruct. & Sem. v. 1. pag. 341. tab. 70. fig. 3. — Lam. Illustr. Gen. tab. 307. fig. 2 & 3.

*Naciprunifera, arbor americana, fructu saponario, orbiculato, monococco, nigro.* Pluken. Almag. pag. 255. tab. 217. fig. 7.

Arbre dont les rameaux, dépourvus d'épines, sont glabres, cy-indriques, de couleur cendree, marqués souvent de petites raches ou de petits tubercules ovales, linéaires; garnis de feuilles alternes, pétioles, ailées, sans impaire, dont les

folioles, au nombre de six à huit, sont opposées, légèrement pétiolées, ovales, oblongues, lancéolées, entières à leurs bords, acuminées à leur sommet, glabres & luisantes à leur face supérieure, légèrement pubescentes en dessous, longues d'environ trois pouces, sur un & plus de la largeur, veinées en dessous, réticulées en dessus. Les pétioles sont pubescents, striés, cylindriques.

Les fleurs sont petites, disposées en une grappe terminale, ramulée, paniculée, longue d'environ un pied; les rameaux étalés; les pédoncules courts, épais, garnis de petites bractées caduques. Le calice est à peine velu; les pétales glabres, concaves, arrondis; l'ovaire glabre & ovale; des trois capsules, une seule mûrit; elle est globuleuse, charnue, de la grosseur d'une petite cerise, très-glabre.

Cette plante se trouve à l'île Bourbon; elle y a été recueillie par Commerçon. (V. f. in herb. Jussieu.)

### 3. SAVONIER épineux. *Sapindus spinosus*. Linn.

*Sapindus foliis abruptis pinnatis, caule spinosissimo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 526. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469.

*Sapindus fruticosus, caudice & ramis spinosissimis; foliis ovatis, pinnatis*. Brown, Jam. 207. tab. 20. fig. 2.

Arbuste assez élevé, dont les tiges sont droites, épaisses, divisées en rameaux distus, épineux, garnis de feuilles ailées, sans impaire, alternes, pétiolées, composées de folioles ordinairement opposées, légèrement pétiolées, glabres, ovales, élargies, très-obtusées, à peine rétrécies à leur base, veinées, réticulées. Le calice est persistant, composé de cinq folioles ovales, concaves, obtuses; les fruits sont globuleux, surmontés d'une portion du style persistant.

Cette plante croît à la Jamaïque. (V.)

### 4. SAVONIER à longues feuilles. *Sapindus longifolius*. Vahl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, glabris; unico terminali, rachi simpliciter*. Vahl, Symbol. 3. pag. 53. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 2.

Cet arbre a ses branches & ses rameaux privés d'épines, garnis de feuilles ailées, avec une impaire; les folioles au nombre de onze, pétiolées; les inférieures opposées, plus petites, lancéolées, oblongues; les supérieures alternes, longues de quatre à cinq pouces, élargies, lancéolées, toutes glabres, très-entières, veinées, luisantes à leur face supérieure, plus pâles en dessous, un peu rudes au toucher; les pétioles médiocrement arrondis.

Les fleurs sont nombreuses, situées à l'extrémité des rameaux, & disposées en une panicule touffue, très-ramifiée; les pédoncules partiels très-courts. Le calice est blanchâtre, tomenteux, composé de quatre folioles ovales, aiguës. La corolle est de même longueur que le calice.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (V. Description, ex Vahl.)

### 5. SAVONIER à feuilles de laurier. *Sapindus laurifolius*. Vahl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis ovato-oblongis, attenuatis, glabris; rachi simpliciter, petalis marginatis tomentosis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 54. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 4.

*Sapindus* (trifoliatus), *foliis ternatis*. Flor. zeyl. n°. 603.

*Pocrensi seu verticopoclongi*. Rheed, Malabar. vol. 4. pag. 43. tab. 19.

Vulgairement manipongou.

C'est un grand arbre, dont les rameaux sont glabres, cylindriques, striés, un peu pubescents à leur sommet, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées, sans impaire, composées ordinairement de six folioles presque opposées, pétiolées, longues d'environ quatre à cinq pouces, sur environ deux pouces de large; ovales, oblongues, obtuses à leur sommet, quelques-unes rétrécies à leur base, entières à leur contour, coriaces, glabres à leurs deux faces, presque luisantes, un peu cendrées, veinées, réticulées. Les pétioles communs sont cylindriques, presque glabres; les partiels un peu comprimés.

Les fleurs sont disposées en une panicule touffue, terminale, dont les rameaux sont courts, nombreux, inégaux, un peu pubescents, ainsi que les pédoncules, qui sont fort petits, munis de bractées courtes, ovales. Le calice est composé de cinq petites folioles ovales, arrondies. La corolle est blanchâtre, à cinq pétales oblongs, velus, ongiculés, renfermés à leurs ongles, garnis à leurs bords d'un duvet tomenteux, très-blanc; les filaments velus, au nombre de huit. Les fruits sont petits, arrondis, velus.

Cet arbre croît dans les Indes orientales, à la côte de Coromandel. (V. f. in herb. Juss. ex herb. Commerçon.) Ses fruits servent à blanchir les soies & les toiles.

### 6. SAVONIER à feuilles échanquées. *Sapindus emarginata*. Vahl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis oblongis, emarginatis, subius villosis; rachi simpliciter, petalis marginatis tomentosis*. Vahl, Symbol. 3. pag. 54. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 5.

Cet

Cet arbre a des rapports avec le *Sapindus laurifolia*; il en diffère par ses feuilles plus étroites, plus courtes, très-obtus, un peu échancrées à leur sommet, velues en dessous.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, de couleur cendrée, de la grosseur du petit doigt, garnis de feuilles pétiolées, alternes, ailées sans impaire, composées de quatre ou six folioles médiocrement pétiolées, les unes opposées, d'autres alternes, longues de deux ou trois pouces; les inférieures plus petites, oblongues, un peu rétrécies à leur base, entières à leurs bords, obtuses, échancrées à leur sommet,roides, veinées, coriaces, glabres à leur face supérieure, velues en dessous, soutenues par des pétioles cylindriques.

Les fleurs forment une ample panicule terminale, dont les rameaux sont nombreux, les pédoncules ouverts, pubescents; les pédoncules propres garnis à leur base de petites bractées ovales. Le calice est pubescent, à cinq folioles ovales, concaves, la corolle composée de cinq pétales oblongs, un peu plus longs que le calice, velus en dehors, glabres en dedans, munis à leurs bords d'un duvet tomenteux très-blanc. Les filaments sont velus, de la longueur de la corolle, au nombre de huit. Le fruit consiste en trois capsules un peu rubinées ou globuleuses, couvertes de poils épais & jaunâtres; elles contiennent des semences noires.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *Hy (Descript. ex Vahl.)*

#### 7. SAVONIER rouillé. *Sapindus rubiginosa*. Roxb.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis, acutis, subtus villosis; rachi simplicibus, petalis glabris.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n.º 6.

*Sapindus rubiginosa*. Roxb. Corom. 1. pag. 44. tab. 62.

C'est un arbre dont le tronc s'élève à une hauteur assez considérable, dont les rameaux sont droits & nombreux, garnis de feuilles alternes, amples, ailées, dont les folioles sont oblongues, lancéolées, aiguës, entières à leurs bords, velues en dessous, au nombre de huit à dix, opposées, légèrement pétiolées, marquées de nervures latérales, simples, alternes, inégales.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, étalée, droite; les rameaux simples, élançés; le calice court, à quatre folioles ovales, obtuses. La corolle est glabre, petite, composée de quatre pétales obtus; huit étamines droites, glabres, plus longues que la corolle; un style simple, presque de moitié plus court que les filaments des étamines; un ovaire à trois lobes, auquel succèdent trois capsules ovales, chacune à une

Botanique. Tome VI.

seule semence de même forme, dont deux avortent très souvent.

Cet arbre croît sur les montagnes, à la côte du Coromandel. *Hy*

#### 8. SAVONIER à fruits anguleux. *Sapindus angulata*.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis lato-ovatis, subtus pubescentibus; capsulis dorso angulato-arinatis.* (N.)

Quoique cette plante ne me soit connue que par quelques-unes de ses feuilles & par ses fruits, ces parties annoncent suffisamment qu'elle doit être distinguée, comme espèce, de ses congénères.

Ses rameaux sont cylindriques, fortement striés, ridés, d'un gris-noirâtre, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées de trois paires de folioles presque opposées, pédicelées, larges, ovales, longues de quatre à cinq pouces, sur trois de large, coriaces, glabres, luisantes en dessus, un peu pubescentes en dessous, entières, arrondies à leur base, obtuses, à peine aiguës à leur sommet, marquées de nervures saillantes, latérales, simples, inégales, alternes. Leur pétiole commun est glabre, cylindrique, strié.

Les fruits sont composés de trois capsules, dont une ou deux avortent; elles sont globuleuses, glabres, de la grosseur d'une cerise, pulpeuses, ridées, marquées sur leur dos d'une carène saillante, anguleuse, & d'une large cicatrice ovale, anguleuse dans son milieu, qui distingue la partie par laquelle ces capsules sont réunies. Chacune de ces capsules renferme un noyau sphérique, d'un noir luisant.

J'ignore la patrie de cette plante, que j'ai observée dans l'herbier de M. de Jussieu. *Hy (V. f. in herb. Juss.)*

#### 9. SAVONIER de Surinam. *Sapindus surinamensis*.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis elliptico-lanceolatis, glaberrimis; paniculis divaricatis.* (N.)

*Pruno affinis, fraxini folio alato; fructu corymboso & cerasiformi.* Herb. Surin. n.º 827.

*Chiptika*. Surin. & Juss. Herb.

Cet arbre a les rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées, composées d'environ six à huit paires de folioles sans impaire; les inférieures opposées, les supérieures alternes, lancéolées, elliptiques, longues de six à huit pouces, larges de deux, minces, membraneuses, vertes, glabres à leurs deux faces, luisantes, entières, arrondies à leur base, obtuses ou un peu acuminées à leur sommet, marquées

P p p p

de nervures fines, alternes, simples, réticulées. Le pétiole commun est très-long, glabre, cylindrique, d'un brun-foncé; les partiels très-courts.

Les fleurs sont disposées en une panicule diffuse, rameuse, noueuse, flexueuse; les rameaux courts, nombreux, inclinés en divers sens, glabres, cylindriques; les pédoncules propres très-courts, soutenant de petites capsules globuleuses, de la grosseur d'une très-petite cerise, glabres, ridées, un peu pulpeuses, à une seule loge. Je ne connois pas les fleurs.

Cette plante croît à Surinam. *Th* ( *V. f. in herb. Jussieu.* )

10. SAVONIER arborescent. *Sapindus arborescens*. Aubl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis ovatis, acuminatis, glabris; panicula axillari, simpliciter.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 470. n°. 9.

*Sapindus fructu parvo, rubro.* Aubl. Guian. vol. 1. pag. 357. tab. 139.

Vulgairement maca-apa-ipou des Galibis.

Cet arbre ressemble, par ses fruits, au *sapindus frutescens*; mais ils sont plus petits. Son tronc s'élève à sept ou huit pieds de haut, sur huit à neuf pouces de diamètre: son bois est blanchâtre, revêtu d'une écorce raboteuse & cendrée; il pousse, à son sommet, quelques branches noueuses & rameuses, garnies de feuilles alternes pétiolées, composées de trois paires de folioles sans impaire, ovales, lisses, coriaces, glabres, vertes à leurs deux faces, entières, acuminées, longues d'environ six pouces, sur deux pieds de large; portées sur un pétiole commun, profondément canaliculé, convexe en dessous; les pétioles partiels très-courts.

Les fleurs forment des grappes axillaires, & produisent des fruits composés de trois capsules, dont deux avortent; ovoïdes, de couleur rouge, pédicellées, conservant, à la base de leur pédicelle, un calice à quatre folioles aigues. La corolle & les étamines ne sont point connues.

Cette arbre croît à la Guiane, dans les grandes forêts qui bordent la crique des Galibis. *Th* ( *Descript. ex Aubl.* )

11. SAVONIER. frutescent. *Sapindus frutescens*. Aubl.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis alternis, lanceolatis, acuminatis, glabris; panicula axillari, simpliciter.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 470. n°. 10.

*Sapindus foliis pinnatis, fructu coccineo.* Aubl. Guian. vol. 1. pag. 355. tab. 138.

Arbrisseau dont le tige est simple, droite, haute de sept à huit pieds, sur deux pouces de diamè-

tre, revêtu d'une écorce cendrée & raboteuse; le bois cassant & blanchâtre. Les feuilles sont pétiolées, alternes, ailées, composées de sept à huit paires de folioles sans impaire, ovales, lancéolées, presque alternes, lisses, coriaces, luisantes, entières à leurs bords, acuminées, de huit à onze pouces de longueur sur environ trois de largeur, médiocrement pédicellées; le pétiole commun canaliculé en dessus, convexe en dessous.

Les fleurs sont en grappes axillaires, & donnent pour fruit des capsules sèches, coriaces, d'un beau rouge, sphériques, marquées d'un filon à un de leur côté, par lequel elles s'ouvrent en deux parties, & contiennent une semence noire, luisante, enveloppée d'une membrane; l'intérieur de la capsule est jaune.

Cet arbrisseau croît à Cayenne, sur le bord des terrains défrichés: on le rencontre également dans les grandes forêts de la Guiane. *Th* ( *Descript. ex Aubl.* )

12. SAVONIER du Sénégal. *Sapindus senegalensis*. Juss.

*Sapindus foliis abruptè pinnatis; foliolis ovato-lanceolatis, glaberrimis, utrinque nervosis; petiolis complanato-friatis, subpubescentibus.* (N.)

Cahouart. Adanf. Herb. Kewer.

Ses rameaux sont droits, effilés, cylindriques, garnis dans leur jeunesse d'un léger duvet d'un roux-foncé un peu ferrugineux, qui disparaît avec l'âge. Les feuilles sont alternes, amples, rapprochées, ailées, sans impaire, composées de quatre à huit folioles, glabres à leurs deux faces; les unes larges, ovales, obtuses; d'autres plus étroites, lancéolées, rétrécies à leur base, un peu acuminées à leur sommet, d'un vert-cendré ou un peu glauque à leur face supérieure, plus pâles en dessous, très-entières à leurs bords, marquées de nervures saillantes des deux côtés, un peu rameuses, & confluentes à leur sommet, & dont l'intervalle est rempli par un réseau saillant. Le pétiole commun est glabre ou un peu pubescent, aplati en dessous & fortement strié. Le fruit est ovale, un peu globuleux, & de la grosseur d'une fraise. Je ne connois point les fleurs.

Cette plante a été observée au Sénégal par MM. Adanson & Geoffroi fils. *Th* ( *V. f. in herb. Juss. ex herb. Adanf. & Geoff.* )

13. SAVONIER à quatre folioles. *Sapindus tetraphylla*. Vahl.

*Sapindus foliis pinnatis; foliis lanceolato-oblongis, glabris; rachis simpliciter, racemis subsimplicibus, petalis glabris.* Vahl, Symbol. 3. pag. 54. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 469. n°. 7.

Ses rameaux sont glabres, cylindriques, de couleur cendrée, garnis de feuilles pétioles, alternes, ailées, sans impaire, composées de quatre folioles médiocrement pétioles; les deux inférieures alternes; les deux supérieures opposées, longues de trois pouces, lancéolées, oblongues, un peu obtuses à leur sommet, entières à leurs bords, d'un vert-pâle, très-glabres à leurs deux faces, veinées, point rétrécies à leur base.

Les fleurs offrent une panicule composée de plusieurs grappes simples, droites, longues de trois à quatre pouces, dont les pédoncules communs sont blanchâtres, droits, presque anguleux, hérissés d'aspérités ou de petites dents par la chute des pédoncules partiels; ceux-ci très-courts, munis à leur base de bractées ovales, fort petites. Le calice est foveux, luisant, à cinq folioles ovales, arrondies; la corolle glabre, composée de cinq pétales glabres, allongés, plus longs que le calice. Les filaments des étamines sont velus, au nombre de huit.

Cette plante se rencontre dans les Indes-Orientales. *h* (Descript. ex Vahl.)

#### 14. SAVONIER des Indes. *Sapindus indica*.

*Sapindus foliis linearilanceolatis, simplicibus seu subternatis, venoso-reticulatis.* (N.)

Arbrisseau dont les tiges se divisent en rameaux cylindriques, glabres, effilés, garnis de feuilles alternes, presque sessiles, très-variables dans leur forme; la plupart entières, simples, très-étroites, linéaires, lancéolées, longues de six à huit pouces, larges de six à huit lignes, obtuses ou acuminées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, plus ou moins rétrécies en pétiole à leur base, munies de nervures latérales, confluentes, & de veines assez saillantes, réticulées; quelquefois ces feuilles se divisent, vers leur partie intérieure, en deux ailes opposées, ovales, lancéolées, & alors elles deviennent presque ternées: ces divisions sont très-irrégulières. Quand elles ont lieu, la partie inférieure des feuilles se rétrécit ordinairement à un tel point, que ce n'est plus alors qu'une portion de feuille décurente sur le pétiole. Je n'ai point vu la fructification.

Cette plante croît dans les Indes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. f.)

\* SAVONIER de Chine. *Sapindus chinensis*, Linn.

*Sapindus foliis pinnatis, foliolis laciniatis*, Linn. Syst. veget. 315. — Linn. f. Suppl. pag. 228.

*Koelreuteria paniculata*, Laxman. Nov. Comment. Petrop. t. 6. pag. 561. tab. 18. — Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 7. — Willd. Arb. 163. — Idem, Spec. Plant. vol. 2. pag. 330. — Lam. Illustr. Gener. tab. 308.

*Koelreuteria paullinoides*, Lhérit. Sertor. Angl. pag. t8. tab. 19.

Nous nous bornerons à mentionner rapidement ici cette espèce, dont on a fait depuis un nouveau genre sous le nom de *koelreuteria*, & qui n'a pas été insérée dans cet ouvrage en son lieu. Il se distingue des *sapindus* par un calice à cinq folioles, une corolle à quatre pétales irréguliers, quatre écailles bifides; un ovaire pédonculé; un style trigone; une capsule à trois loges, deux semences dans chaque loge.

C'est un arbrisseau dont les feuilles sont alternes, pétioles, ailées avec une impaire, composées de folioles oblongues, rétrécies en coin à leur base, presque sessiles, laciniées & dentées à leur contour, obtuses à leur sommet, glabres à leurs deux faces. Les fleurs sont jaunes, petites, disposées en une longue panicule axillaire & serrée.

Cette plante croît à la Chine; on la soupçonne également naturelle au Pérou. Elle se cultive au Jardin des Plantes de Paris. *h* (V. f.)

SAVONNIERS (Les). *Sapindi* Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend un certain nombre de genres qui ont beaucoup de rapports avec le savonier, *sapindus*, qui s'y trouve lui-même renfermé.

Les plantes contenues dans cette famille sont des arbrisseaux ou arbrusts, rarement des herbes; dont les feuilles sont alternes, ailées ou ternées; les fleurs solitaires, ou plus ordinairement en grappes.

Le calice est, ou composé de plusieurs folioles, ou bien il est monophylle, à plusieurs découpures. La corolle est formée par quatre ou cinq pétales insérés sur un disque hypogyne, tantôt nus, tantôt intérieurement velus ou glanduleux vers leur milieu. Quelquefois les pétales sont doubles, ayant chacun un second pétale: intérieur vers leur onglet; les étamines, très-souvent au nombre de huit, ayant les filaments séparés, dont l'insertion est la même que celle des pétales.

L'ovaire est simple, solitaire ou triple, terminé par un, deux ou trois stigmates. Le fruit consiste en un drupe ou une capsule à une, deux ou trois loges, ou bien à une, deux ou trois coques, chaque loge ou chaque coque ne contenant qu'une seule semence attachée à l'angle intérieur des loges, dont l'embryon n'a point de perispermie; la radicule courbée en lobes souvent arqués.

Cette famille renferme les genres suivants:

#### 1. Pétales doubles, chaque pétale muni vers sa base d'un second pétale intérieur.

Les cardiospermes. . . . . *Cardiospermum*.  
Les paulinies. . . . . *Paullinia*.

Pppp 2

Les favoniers. .... *Sapindus*.  
 Les talifiers. .... *Tulipa*.  
 Les aparetica. .... *Aparetica*.

### II. Pétales simples.

Les ufubes. .... *Schmidelia*.  
 Les ornitrophes. .... *Ornithophora*.  
 Les litchis. .... *Euphorbia*.  
 Les mélicoques. .... *Melicococa*.  
 Les rouliciers. .... *Toulicia*.  
 Les moliniers. .... *Molinaa*.  
 Les colligniers. .... *Collignia*.

### III. Genres affiliés aux favoniers.

Les mataybes. .... *Matayba*.  
 Les enourous. .... *Enouria*.  
 Les cupanis. .... *Cupania*.  
 Les pekis. .... *Pekia*.

**SAURURE.** *Saururus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des niades, qui paroît, par son port, se rapprocher beaucoup des poivriers, &c, par la fructification, des aroides; qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à tiges droites, à feuilles alternes, dont le pétiole est vaginal; les fleurs disposées en chaton pendant, opposé aux feuilles.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un chaton garni d'écaïlles à une seule fleur; point de corolle; de six à sept étamines; quatre ovaires; point de style; quatre baies monospermes.

### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont disposées sur un chaton allongé, pendant. Chacune d'elles offre :

1°. Un calice formé par une écaïlle entière, oblongue, colorée, persistante.

2°. Point de corolle.

3°. Six à sept étamines, dont les filaments sont capillaires, allongés, terminés par des anthères droites, oblongues.

4°. Quatre ovaires ovales, acuminés; point de style, mais munis de quatre stigmates allongés, adnés vers le sommet des ovaires, à leur côté intérieur.

Le fruit consiste en quatre baies ovales, à une seule loge, qui ne renferme qu'une seule semence ovale.

**Observations.** L'on n'est pas encore très-assuré que les semences de cette plante n'aient qu'un seul lobe ou cotylédon; ce qui donne quelques incertitudes sur la famille qui doit la recevoir. Il paroît que le nombre des étamines varie de six à sept, &c peut-être le nombre des stigmates de trois à quatre. Il est possible que ce soit là la cause qui

l'a fait méconnaître par Walthérius, qui en a fait un genre nouveau sous le nom de *matufschkia*, à six étamines, à trois ou cinq ovaires. Michaux, dans la *Flora de l'Amérique septentrionale*, rapporte sans hésiter le *matufschkia* de Walthérius au *saururus cernuus* de Linné, qu'il place dans l'hexandrie.

### ES P È C E.

1. SAURURE inclinée. *Saururus cernuus*. Linn.

*Saururus acule folioso, polytachio*. Linn. Syst. Plant. pag. 297. — Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 218. — Lam. Ill. Genor. tab. 276. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 292.

*Saururus foliis cordatis, petiolatis; amensis solitariis, recurvis*. Horr. Upfal. 91. — Spec. Plant. vol. 2. pag. 489. — Miller, Dict. n°. 1. & illustr. Icon. — Gilck. Icon. Falc. t. n°. 7.

*Saururus foliis profunde cordatis, ovato-lanceolatis; spicis solitariis*. Hort. Clif. 139. — Gronov. Virgin. 40. — Royen, Lugd. Bat. 8.

*Serpentaria repens, floribus flammis spicatis; dryonia nigra folio ampliore, pingin*. Pluk. Almag. pag. 343. tab. 117. fig. 3. 4.

*Matufschkia aquatica*. Walthér. Flor. carolin. pag. 127.

C'est une plante dont les racines sont fibreuses, les tiges relevées, sinuées, grêles, hautes d'un à deux pieds, un peu striées, presque simples, glabres, garnies de feuilles alternes, pétioles, ovales, en cœur à leur base, acuminées à leur sommet, un peu charnues, glabres à leurs deux faces, entières à leurs bords, marquées de veines rameuses; les pétioles sont longs d'environ dix lignes; les feuilles de trois pouces, sur deux de large.

Les fleurs sont disposées sur un chaton pédonculé; le pédoncule est long, presque droit, opposé aux feuilles, glabre, cylindrique, terminé par un épi cylindrique, étroit, allongé, un peu subulé, pendant ou recourbé, long d'environ deux pouces, couvert d'écaïlles blanchâtres, médiocrement pédonculées, qui verdissent après la floraison, &c s'inclinent sur le rachis. Les étamines varient de six à sept; les ovaires sont au nombre de quatre, subules par les stigmates.

Cette plante croît à l'ombre, dans les lieux humides de la Virginie &c de la Caroline, où elle est fort commune. ♀ (V. f.)

**SAUVAGÈSE.** *Sauvagea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, munies de stipules ciliées; les fleurs solitaires, axillaires, pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq folioles ; cinq pétales alternes avec les folioles du calice ; cinq écailles entourées de cils nombreux, glandulifères ; cinq étamines ; un style ; une capsule à une loge , à trois valves.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice composé de cinq folioles droites, concaves, ouvertes, lancéolées, aiguës, persistantes.

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, obtus, caducs, de la même longueur que le calice, alternes avec ses divisions.

Cinq écailles une fois plus petites que les pétales, persistantes plus long-temps, alternes avec eux, situées autour de l'ovaire, environnées extérieurement de poils nombreux, surmontés de glandes, imitant les étamines, mais beaucoup plus courts.

3°. Cinq étamines, dont les filaments, alternes avec les écailles, sont très-courts, subulés, terminés par des anthères fort longues, à quatre faces, s'ouvrant à leur sommet.

4°. Un ovaire supérieur, ovale, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule ovale, acuminée, à une seule loge (à trois loges selon Jusseu), à trois valves, dont les bords sont recourbés en dedans, contenant des semences nombreuses, fort petites, attachées par séries aux bords rentrants des valves.

#### E S P È C E S.

1. SAUVAGÈSE de Cayenne. *Sauvagesia adima*. Aubl.

*Sauvagesia caule ramosissimo, foliis ovato-lanceolatis*. Lam. III. Gener. vol. 2. pag. 119. n°. 2767. tab. 140. fig. 1.

*Sauvagesia (adima), caulibus ramosis*. Gmel. Syll. Nat. vol. 1. pag. 422. n°. 2. — Aubl. Guian. vol. 1. pag. 251. tab. 100. fig. 4.

2. *Eadem, minor*. Lam. Illustr. L. c. tab. 140. fig. 2.

*Iron herbaceus, minor; foliis oblongis, tenuissimis crenatis; stipulis ciliatis; floribus singularibus ad alas*. Brown, Jam. 179. tab. 12. fig. 2.

Cette plante a des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, grêles, cylindriques, glabres, un peu tétragones & striées à leur partie inférieure, divisées en rameaux nombreux, alternes, presque filiformes; garnies de feuilles alternes,

presque sessiles, ovales, lancéolées, longues à peine d'un pouce, glabres à leurs deux faces, un peu acuminées à leur sommet, aiguës ou réticées en un pétiolo court à leur base, légèrement dentées en scie à leurs bords; munies de nervures latérales, obliques, presque simples, un peu sail-lantes; garnies de stipules axillaires, courtes, filiformes, longuement ciliées de cils fins, opposés; ce qui les fait paroître presque ailées.

Les fleurs sont solitaires dans l'aisselle des feuilles, supportées par de longs pédoncules capitulaires, simples, glabres, droits pendant la floraison, réfléchis ensuite. Les calices sont glabres, d'un vert-tendre, très-lisses, à cinq folioles lancéolées, concaves, très-aiguës. La corolle est blanche; les pétales à peine aussi longs que le calice.

La variété 2 est beaucoup plus petite, moins rameuse; les feuilles plus courtes, ovales, à peine lancéolées. Brown l'a observée & recueillie à la Jamaïque.

La première plante croît à la Guiane. J'en possède un exemplaire que M. Ledru a recueilli à Porto-Ricco, & qu'il a bien voulu me communiquer. ○ (V. f.)

2. SAUVAGÈSE des Antilles. *Sauvagesia erecta*. Jacq.

*Sauvagesia caule subsimplici, foliis angustolanceolatis, stipulis prolongis*. Lam. III. Gener. vol. 2. pag. 119. n°. 2768. — Jacq. Strip. Amer. pag. 77. tab. 51. fig. 3. — & edit. 2. pict. pag. 41. tab. 77. — Gmel. Syll. Nat. vol. 1. pag. 412. n°. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1185.

Cette espèce, qui n'est peut-être qu'une simple variété du *Sauvagesia adima*, en diffère néanmoins en ce qu'elle est beaucoup plus petite, que ses tiges sont presque simples, ses stipules plus allongées. Ses feuilles sont alternes, sessiles, étroites, lancéolées, glabres à leurs deux faces, légèrement denticulées en scie à leurs bords, munies dans leurs aisselles de stipules allongées, étroites, ciliées ou pinnatifides à leurs bords.

Les fleurs sont axillaires, longuement pédunculées, blanchâtres; les pédoncules longs, setacés, uniflores; les calices aigus, plus longs que la corolle; les capsules réfléchies sur les pédoncules.

Cette plante croît à Saint-Domingue & aux Antilles; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. ○ (V. f.)

3. SAUVAGÈSE fluette. *Sauvagesia tenella*. Lam. *Sauvagesia caulesciformi, simpliciflora; foliis oblongis, rariter dentatis, sessilibus; stipulis minimis*. Lam. III. Gener. vol. 2. pag. 119. n°. 2769.

Il est difficile de ne pas regarder cette plante comme une espèce distincte des deux précédentes, quand même on les réunirait comme variétés.

Ses tiges sont fort petites, n'ayant pas plus de quatre à cinq pouces de haut, filiformes, droites, glabres, très-simples, garnies de feuilles alternes, parfaitement sessiles, glabres à leurs deux faces, à dens rares à leurs bords, oblongues, étroites, aiguës, munies dans leurs aisselles de stipules très-courtes, ciliées à leurs bords. Les fleurs sont solitaires, axillaires; les pédoncules presque stériles.

Cette plante a été recueillie en Amérique par M. Richard, qui en a communiqué un exemplaire à M. Lamarck. (V. f. in herb. Lam.)

**SAXIFRAGE.** *Saxifraga*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille du même nom, qui a des rapports avec les *heuchera*, & qui comprend des herbes, les unes exotiques, d'autres indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont alternes, quelquefois opposées, toutes radicales dans certaines espèces; la disposition des fleurs très-variée.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice persistant, à cinq divisions; une corolle à cinq pétales insérés sur le calice; dix étamines; deux styles; une capsule supérieure, s'ouvrant à son sommet en deux valves crochues à leur extrémité.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice court, persistant, divisé en cinq découpures aiguës.

2°. Une corolle composée de cinq pétales ouverts, un peu rétrécis à leur base, insérés sur le calice.

3°. Dix étamines, dont les filaments sont subulés, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire supérieur, libre ou plus souvent à demi-adhérent avec le calice, presque globuleux, acuminé, surmonté de deux styles courts, terminés par des stigmates obtus.

Le fruit est une capsule presque ovale, terminée par deux pointes courbées en forme de bec, s'ouvrant en deux valves à son sommet, renfermant, dans une seule loge, des semences nombreuses, fort petites.

**Observations.** Ce genre diffère, par ses dix étamines, des *heuchera*, qui n'en ont que cinq : on le distingue aussi des *tiarella*, ce dernier ayant une des valves capsulaires beaucoup plus grande que l'autre. C'est d'ailleurs un assez beau genre, très-naturel, & dont aucune des espèces ne laisse de doutes sur la place qu'elle doit y occuper, cha-

cune d'elles offrant tous les caractères qui constituent ce genre ; aussi, quoique nombreux en espèces, nous ne voyons pas qu'aucune en ait été tranchée, pas même par ces auteurs qui étendent volontiers un genre de chaque espèce.

Il se trouve cependant divisé en deux dans Tournefort, qui a établi le genre *geum*, & qui y a renfermé toutes les espèces dont l'ovaire étoit libre ou parfaitement supérieur, réservant pour celui des saxifrages toutes celles dont le calice environne par sa base, presque jusque vers la moitié, les ovaires qui alors paroissent presque inférieurs. Cette légère différence nient peut-être à la profondeur des divisions du calice. Lorsqu'il est divisé presque jusqu'à sa base, l'ovaire se trouve entièrement libre ; lorsque les divisions sont courtes, la partie inférieure du calice, qui est d'une seule pièce, entoure l'ovaire, & même il est alors adhérent avec lui. Voilà pour les auteurs un nouveau genre à établir, d'après la position de l'ovaire.

Les capsules sont constamment terminées par deux pointes égales, subulées, très-ordinairement réfléchies ou recourbées en dehors. Ces capsules se séparent à leur sommet en deux valves, qui paroissent former deux loges, surtout dans celles qui s'ouvrent presque jusqu'à leur base. Cependant le plus grand nombre des botanistes ne regarde ces capsules que comme uniloculaires, à deux valves.

Quant aux espèces, elles ont toutes un air de famille très-remarquable. Ce sont, quelques-unes exceptées, de très-petites plantes habitant les hautes montagnes des Alpes, dont les feuilles radicales forment des gazons touffus. Les tiges sont grêles, filiformes, peu ou point rameuses, à peine feuillées. Les fleurs sont terminales, quelquefois solitaires, plus ordinairement formant de petites panicules un peu étalées ; un grand nombre sont munies de poils courts, glanduleux, plus ou moins visqueux.

#### ESPÈCES.

\* Feuilles entières ; tiges presque nues.

1. **SAXIFRAGE** cotylédone. *Saxifraga cotyledon*. Linn.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, cartilagineo-dentatis ; caule paniculato-folioso ; calicibus glanduloso-pilosis.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 638. n°. 1.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, cartilagineo-serratis ; caule paniculato.* Linn. Spec. Plant. 570. — Miller, Dict. n°. 2. — Scop. Carp. edit. 2. n°. 489. — Matfusch. Sil. n°. 298. — Kniph. Centur. 1. n°. 79. — Jacq. Collect. 4. pag. 291. — Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 524. n°. 1113.



IV. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 421. n°. 1. — Gouan, Monsp. pag. 209. n°. 1. — Lam. Illustr. Gener. tab. 372. fig. 3.

*Saxifraga foliorum ora cartilaginea, ferrata; petiolis paniculatis, petalis punctatis.* Hall. Helv. 978.

*Saxifraga foliis lingulatis, radicalibus margine cartilagineo acutis ferratis; floribus paniculatis.* Flor. Suec. 356. 366.

*Saxifraga foliorum marginibus cartilagineo-crenatis.* Hort. Cliff. 168. — Roy. Lugd. Bat. 453.

*Sanicula montana, crenata, folia langiore, pediculo folioso.* Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. 1.

*Sedum ferratum.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 689. Ic.

*Saxifraga sedi folio, angustiore, ferrato.* Tournef. Inst. R. Herb. 252. — Garid. Aix. pag. 418. *An ad speciem sequentem referenda?*

*Saxifraga foliarum marginibus cartilagineo-ferratis.* Sauvag. Monsp. pag. 52 & 116.

*Cotyledon media, foliis oblongis, ferratis.* C. Bauh. Pin. 285.

*Sedum ferratum, album, bice, marginibus argenteis.* Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 478. 5. 12. tab. 9. fig. 19, 20.

*Umbilicus veneris minor 1 & 2.* Tabern. Ic. 847.

*Aizoon ferratum.* Valer. Cord. Hist. pag. 92. Ic.

*Cotyledon minor, foliis subrotundis, ferratis.* C. Bauh. Pin. 285. — Prodr. 133. — Hall. Helv. n°. 978. v. 2. p.

*Saxifraga foliis subrotundis, ferratis.* Tournef. Inst. R. Herb. 252. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 690. *Sine icone.*

*Saxifraga (paniculata), foliis radicatis, aggregatis, cuneiformibus, cartilagineo-ferratis; caule paniculato.* Miller, Dict. n°. 3.

*Saxifraga sedi folio, flore alba; multiflora.* Tournef. Inst. R. Herb. 252.

*Saxifraga foliarum ora cartilaginea, caule triptico-ramoso, petalis immaculatis.* Hallet, Helv. n°. 977.

*Saxifraga (pyramidata), foliis radicatis, aggregatis, lingulatis, cartilagineo-ferratis; caule pyramidata.* Miller, Dict. n°. 4.

*Saxifraga pyramidata.* 1 apery. Saxifr. pag. 32.

*Sedum ferratum, flore albo, multiflorum.* Dodart. Mem. pag. 131.

*Saxifraga cotyledon.* Oler. Flor. dan. tab. 241.

*Saxifraga sedi folia, pyrenaica, ferrata.* Tourn. Inst. R. Herb. 252.

*Sedum pyrenaicum, ferratum, minus; flore guttata.* Idem, H. R. Par. ●

*Saxifraga multiflora.* Dodart. Mem. 137. Icon.

Cette plante est une des belles espèces de ce genre; elle fournit plusieurs variétés remarquables, mais qui offrent tous les caractères communs à cette espèce; savoir: des tiges plus ou moins paniculées & feuillées; des feuilles cartilagineuses & dentées à leurs bords; des calices légèrement pileux & glanduleux.

Les feuilles radicales sont disposées en une belle rosette touffue; elles sont sessiles, épaisses, charnues, glabres, oblongues, d'un vert un peu glauque, de la forme d'une langue, obtuses à leur sommet, bordées à leur contour de dents cartilagineuses, blanchâtres, très-fines. De leur centre s'élève une tige droite, cylindrique, simple, haute au moins d'un pied, chargée de poils courts, visqueux; garnie de feuilles alternes, beaucoup plus petites que les feuilles radicales.

Les fleurs sont disposées en une belle panicule, qui occupe ordinairement plus de la moitié supérieure des tiges; elle est composée de pédoncules partiels très-longs, axillaires, filiformes, simples ou médiocrement rameux, munis, ainsi que les calices, de poils glanduleux & visqueux. La corolle est blanche; les pétales oblongs, obtus, souvent ponctués, d'une grandeur médiocre.

Les différentes variétés de cette plante consistent dans la forme des feuilles, & dans les panicules plus ou moins ramifiées. Dans la première, les feuilles sont plus étroites, allongées; les tiges moins élevées; la panicule médiocrement rameuse; la plupart des ramifications presque simples; la corolle d'une grandeur médiocre.

Dans la variété 2, les tiges sont plus hautes; les feuilles plus courtes, plus larges, un peu ovales ou arrondies; les fleurs sont aussi plus nombreuses; mais la variété 3 est une plante d'une si grande beauté, si agréable par le grand nombre de ses fleurs, qu'on a de la peine à ne la regarder que comme une simple variété. Ses feuilles radicales sont longues de deux pouces & plus, linguées ou un peu spatulées. Les tiges, hautes d'un pied & demi & plus, sont garnies, dans presque toute leur longueur, de fleurs paniculées, très-nombreuses, dont l'ensemble forme une sorte de pyramide rouffue, obtuse. Les pétales sont presque une fois plus grands que dans la première variété, un peu onguiculés ou rétrécis à leur base, d'une grande blancheur, & ne sont jamais ponctués. Les pédoncules sont très-rameux; leurs divisions capillaires, munies chacune d'une petite foliole ou bractée courte, étroite, presque subulée, denriculée & ciliée de poils glanduleux.

Si donc l'on veut regarder cette plante comme

une espèce distincte, on en trouvera les caractères dans la corolle d'une blancheur de neige, jamais ponctuée; dans les pétales presque cuneiformes, ongiculés; dans le nombre & la disposition des fleurs en une ample panicule pyramidale.

Ces différentes variétés se rencontrent toutes dans les montagnes alpines de l'Europe, & dans les départements méridionaux de la France. La variété y est cultivée dans tous les jardins comme une très-belle plante d'ornement, dont on garnit les croisées & les cheminées.

2. SAXIFRAGE aizoon. *Saxifraga aizoon*. Jacq.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, cartilagineo-dentatis; caule simplici, racemosa, foliis; calicibus glabris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 639. n°. 2.

*Saxifraga (aizoon), foliis radicatis aggregatis, lingulatis, cartilagineo-ferratis; caule subracemosa, calice glabro*. Murr. Syst. veget. edit. 4. pag. 411. — Jacq. Flor. austr. 5. tab. 438. — Lapeyr. Saxifr. pag. 33.

*Saxifraga coryledon*. Var. 1. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 370.

*Saxifraga foliis radicalibus, in arhem positis; ferratis cartilagineis*. Flor. lapp. 177. tab. 2. fig. 2.

*Saxifraga fidi folio, angustiore, ferrato*. Seguiet, Plant. veron. vol. 1. pag. 448. tab. 9. fig. 1.

*Coryledon pyramidale, lata, crenata & retusa foliis polyanthos*. Boccon. Mus. 2. pag. 109. tab. 86.

*Aizoon ferratum, alterum*. Valer. Cord. Hist. pag. 92. Icon. Bona.

*Saxifraga rella*. Lapeyr. Saxifr. pag. 33. tab. 15.

Il existe de très-grands rapports entre cette plante & le *Saxifraga coryledon*, que l'inné avoit présenté en être comme une simple variété; elle en diffère cependant par des caractères qui lui sont particuliers, & qui doivent l'en faire distinguer. Ses fleurs sont plutôt disposées en grappes que paniculées; ses calices & ses pédoncules dépourvus de ces poils glanduleux & villoses qui caractérisent l'espèce précédente.

Les tiges sont droites, d'une hauteur médiocre, simples, feuillées, glabres, cylindriques; les feuilles radicales étendues en rosettes sur la terre, épaisses, étroites, lingulées, très-nombreuses, glabres à leurs deux faces, entières, cartilagineuses & finement dentées à leurs bords; les caulinaires alternes, sessiles, plus petites.

Les fleurs sont disposées presque en grappes latérales, un peu pendantes dans l'aiselle des feuilles supérieures, & leur ensemble même forme plutôt une grappe un peu pyramidale, composée, qu'une panicule. Les pédoncules sont glabres, rameux,

filiformes; les calices, également glabres, sont divisés en cinq folioles ovales, aiguës. La corolle est blanche; les pétales ovales, obtus.

Cette plante croît sur les montagnes alpines de l'Europe, & dans les départements méridionaux de la France. 7 (V. f.)

3. SAXIFRAGE métamorphosée. *Saxifraga mutata*. Linn.

*Saxifraga foliis radicalibus rosulatis, cartilagineis, basi ciliata-plumosis; apicibus hyalinis, petalis lanceolato-acutis*. Lapeyr. Saxifr. 31. n°. 7.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, margine cartilagineis, repandis; caule racemosa, foliis; calicibus glanduloso-pilosis; petalis linearilanceolatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 640. n°. 3.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, lingulatis, cartilagineo-ferratis; caule racemosa, foliosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 370. — Jacq. Icon. rar. vol. 3. tab. 466. — Idem, Collect. pag. 284. — Curt. Mag. 351. — Allion. Flor. pedem. n°. 1518.

*Saxifraga foliarum aris cartilagineis, variegatis dentatis; petalis maculatis*. Haller, Helv. n°. 979. tab. 16. — Seguiet, Plant. veron. vol. 3. pag. 199. n°. 2. — Burf. XVI. 98.

*Gum alpinum majus, viscosum; foliis ablongorundis, atrorubentibus & croceis floribus*. Scheuzer, Iter 2. pag. 124. — Haller.

Cette plante réunit tellement les caractères des deux espèces précédentes, qu'on pourroit presque la regarder comme une plante hybride, formée par le concours de ces deux espèces, dont néanmoins elle diffère par un port & des caractères particuliers qui la rendent facile à distinguer. La couleur rembrunie de toute la plante, dit M. Lapeyrouse, la force & la hauteur de sa tige, peu proportionnées avec la médiocrité de la rosette; la figure des feuilles arrondies à leur sommet, & terminées par une pointe étranglée; leur surface lisse; la membrane mince & transparente qui les borde, divisée en cils plumeux à la base, entiers & rarement avec quelques dents vers la pointe; les pétales longs, très-étroits, lancéolés, aigus, d'un jaune-foncé: tels sont les traits nombreux qui doivent faire reconnoître cette espèce.

Ses racines sont grêles, fibreuses, noirâtres: il s'en élève une tige droite, roide, épaisse, glutineuse, cylindrique, parfaitement simple. Les feuilles radicales sont sessiles, nombreuses, disposées en rosette, lingulées, épaisses, un peu charnues, cartilagineuses, à dents rares & fort petites, disposées en scie, un peu ciliées & velues vers leur base; les feuilles caulinaires alternes, sessiles, plus petites, assez rapprochées.

Les fleurs sont disposées en grappes courtes, alternes,

alternes, dans l'aisselle des feuilles, vers l'extrémité des tiges. Leur calice est chargé de poils glanduleux & visqueux ; la corolle presque quatre fois plus grande que dans les deux espèces précédentes, les pétales allongés, linéaires, lancéolés, de couleur de safran, marqués quelquefois de taches d'un rouge-pourpre, qui deviennent aussi confluentes, & ne laissent presque paroître que cette seule couleur.

Cette espèce croît dans les Alpes, sur les montagnes de la Suisse ; dans la Carniole, l'Italie, &c. (V. f.)

4. SAXIFRAGE à longues feuilles. *Saxifraga longifolia*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis radicalibus rosulatis, linearibus, longissimis, integris, basi subteretibus ; caule paniculato, nudo.* Lapeyr. Saxifr. pag. 26. n°. 1. tab. 11.

*Sedum pyrenaicum, pyramidale, longifolium, elongatissimum.* Tourn. Sch. Botan. 29.

*Saxifraga montana, pyramidata, foliis longiore.* Tourn. Herb. & Inst. R. Herb. 253.

*Saxifraga lingulata.* B.L. Aët. Tur. 5. pag. 226.

Cette plante paroît être, au premier aspect, une des belles variétés du *Saxifraga ciliolata*, à laquelle elle ressemble beaucoup par l'apparence de ses fleurs, mais dont elle diffère par les feuilles très-longues, entières, & qui d'ailleurs, d'après l'observation de M. Lapeyrouse, ne se trouve jamais qu'à des hauteurs où l'on ne rencontre plus aucune des variétés du *Saxifraga ciliolata*.

Ses racines sont épaisses, nouées, fusiformes, presque simples ; elles produisent un grand nombre de feuilles radicales, linéaires, imbriquées, disposées en rosettes serrées & plusieurs ensemble, longues de trois à six pouces, larges d'environ trois lignes, dures, coriaces, rougeâtres, & presque cylindriques à leur base, très-entières, aigées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, un peu glauques, ciliées à leur base, bordées par une membrane poreuse. Les feuilles caulinaires sont alternes, d'un vert noirâtre, point membraneuses à leurs bords, garnies, à leurs deux faces, de poils glanduleux. Du centre de chaque rosette s'élève une tige simple, cylindrique, épaisse, un peu rougeâtre, très-simple, chargée de poils glanduleux, rougeâtres & visqueux, garnis de fleurs dans toute sa longueur.

Les fleurs sont extrêmement nombreuses, disposées en une grande panicule pyramidale, obtuse, très-serrée, inclinée, dont les pédoncules sont longs, axillaires, ramifiés à leur extrémité, munis chacun d'une petite stipule à leur base. Les divisions du calice sont triangulaires, visqueuses, glanduleuses. La corolle est grande, de couleur

Botanique. Tome VI.

blanches les pétales ovales, un peu arrondis, obtus, marqués de points d'un pourpre-vif, fortement striés en dessous ; les capsules presque sphériques, surmontées de deux cornes, renfermant des semences noires, nombreuses, fort petites.

Cette belle espèce croît dans les Pyrénées, sur les escarpemens des montagnes, à une hauteur considérable ; elle fleurit tard, dure longtemps, & n'a point d'odeur. (V. f.)

5. SAXIFRAGE moyenne. *Saxifraga media*. Gouan.

*Saxifraga foliis radicalibus, aggregatis, lingulatis, cartilagineis, margine supra punctatis ; caule racemoso.* Gouan, Illustr. pag. 27. — Lam. Illustr. Genet. tab. 372. fig. 6.

*Saxifraga (caliciflora), foliis radicalibus, rosulatis, lingulatis, integerrimis ; petalis & staminibus intra calicem clavis.* Lapeyr. Saxifr. pag. 28. n°. 2. tab. 12.

*Saxifraga alpina, parva, sessifolia, non serrata.* Mich. Plant. Ram. & Neap. n°. 704.

Cette espèce, distincte, fort belle, rare, un peu voisine du *Saxifraga nutans*, en diffère par ses fleurs d'un pourpre-violet, par les pétales ovales, obtus, plus courts que les calices ; par les grappes simples, les pédoncules étant uniflores, très-courts ; les feuilles très-petites.

Il pousse, de ses racines, un grand nombre de tiges très-simples, velues, hautes de quatre à six pouces, un peu rougeâtres, glanduleuses, visqueuses, droites, un peu inclinées à leur sommet. Les feuilles radicales sont nombreuses, petites, disposées en rosettes épaisses, très-glabres, presque glauques, dures, cartilagineuses à leurs bords, linéaires, presque en forme de languettes, ciliées vers leur base, mucronées à leur sommet, chargées à leur face supérieure, vers les bords, d'une série simple de petits points concaves ; les feuilles caulinaires en petit nombre, alternes, très-velues, glutineuses, courtes, linéaires.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une grappe simple, un peu courbée, composée de pédoncules alternes, simples, uniflores, quelques-uns axillaires, nus ou munis quelquefois d'une petite bractée vers leur milieu, très-velus, de couleur purpurine. Les calices sont colorés, velus, à cinq découpures lancéolées, obtuses ; la corolle d'un pourpre-azuré ; les pétales en ovale renversé, à peine aussi longs que les calices ; les capsules grosses, velues, surmontées de deux cornes courtes, écartées, aiguës.

Cette plante croît dans les Pyrénées, sur les grandes roches calcaires. (V. f. in herb. Lam.)

Q999

6. SAXIFRAGE de Pensilvanie. *Saxifraga pensilvanica*. Linn.

*Saxifraga foliis oblongo-lanceolatis, pilosiusculis, denticulatis; caule nudo; pedunculis alternis, corymbo capitatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 604. n°. 4.

*Saxifraga foliis lanceolatis, denticulatis; caule nudo, paniculato; floribus subsessilibus*. Linn. S. ec. Plant. vol. 1. pag. 570. — Miller, Dict. n°. 8.

*Saxifraga foliis radicalibus, lanceolatis, denticulatis; caule subnudo, piloso, corymbo; floribus confertis, capitatis*. Gronov. Virgin. 49.

*Saxifraga noveboracensis*. Cold. Nov. 105.

*Saxifraga pensilvanica, floribus muscosis, racemosis*. DuRoi. Elrh. pag. 337. tab. 253. fig. 328.

*Saxifraga (pensilvanica), elatior, lanuginosopubens; foliis ovato-oblongis, denticulatis; caule nudo, panicula oblonga, ramis summis sessilibus; floribus parvis, viridi-lanceolis*. Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 268.

On distingue cette espèce à ses tiges élevées, presque lanugineuses; à ses feuilles ovales, oblongues, un peu velues; à ses fleurs petites, d'un vert jaunâtre, disposées par paquets, en panicule.

Ses racines sont fibreuses, vivaces, &c produisent des tiges droites, simples, non feuillées, hautes d'environ un pied & demi, couvertes d'un duvet lanugineux. Toutes les feuilles sont radicales, ovales, oblongues ou lancéolées, de cinq à six pouces de long, sur environ deux de large vers leur sommet; d'une consistance épaisse, d'un vert-loncé, denticulées en très-petites dents de scie à leur contour, munies, à leur face supérieure & à leurs bords, de poils très-courts, articulés.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une panicule allongée, composée de rameaux alternes, qui supportent de petits corymbes en tête, plus ou moins étalés, quelquefois fasciculés. Les calices sont garnis de poils courts, à cinq divisions aiguës. La corolle est petite, de couleur herbacée ou d'un vert-jaunâtre.

Cette plante croît à l'ombre & dans les lieux un peu humides, dans les prairies de la Pensilvanie, dans la Virginie & le Canada. (V. f.)

7. SAXIFRAGE à feuilles d'épervière. *Saxifraga hieracifolia*. Willd.

*Saxifraga foliis oblongo-lanceolatis, glabris, repando-dentatis; caule nudo; pedunculis unifloris, aggregatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 641. n°. 5.

*Saxifraga hieracifolia*. Waldstein & Kitaib. Plant. rar. Hungar.

Cette espèce a les plus grands rapports avec la *saxifraga pensilvanica*; elle en diffère par ses feuilles globes, par les fleurs agrégées, dont les pédoncules sont uniflores.

Les tiges sont nues, hautes d'environ un pied, très-simples, cylindriques, pubescentes, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur. Les feuilles sont radicales, oblongues, lancéolées, glabres à leurs deux faces, sinuées & dentées en scie à leurs bords, légèrement ciliées à leur contour par des poils courts, articulés.

Les fleurs sont agrégées, situées à l'extrémité des tiges, au nombre de quatre ou six; alternes, supportées par des pédoncules simples, uniflores; les fleurs supérieures presque stériles & plus rapprochées; l'intervalle des fleurs garni de bractées lancéolées.

Cette plante croît sur les hautes montagnes de Hongrie. (V. Descript. ex Willden.)

8. SAXIFRAGE androface. *Saxifraga androfacea*. Linn.

*Saxifraga foliis lanceolatis, obtusis, pilosis; caule nudo, bifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 571. — Pluk. n. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. 2. — Jacq. Flor. austr. vol. 4. tab. 389. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 325. n°. 1113. VIII. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 641. n°. 6. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 423. n°. 7.

*Saxifraga foliis hirsutis, ellipticis & tridentatis; caule paucifloro*. Haller, Helv. n°. 984.

*Saxifraga alpina, subhirsuta, foliis longis, repando-dentatis, parvis trifloris*. Haller, Opuscul. pag. 292. tab. 2.

*Saxifraga pyrenaica*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 498. tab. 16.

*Sedum alpinum tertium*. Colum. Ephr. 2. pag. 66. tab. 67. fig. ultima. — Moris. Oxon. Hist. 3. n°. 12. tab. 9. fig. 2.

*Saxifraga alpina, habitu androfacea, villosa*. Haller, Comm. nov. 1746. tab. 1. fig. 3.

9. *Eadem, minima, foliis linearibus, obtusis, glaberrimis*. (N.)

Cette espèce a le port d'un androface; elle est petite, distinguée par ses tiges nues, par ses feuilles un peu allongées, entières ou dentées à leur sommet, & par le petit nombre de ses fleurs, d'une à trois.

Ses racines sont grêles, divisées en quelques fibres noirâtres, filiformes; elles produisent un assez grand nombre de petites feuilles en touffes,

oblongues, lancéolées, presque elliptiques, vertes, point charnues, garnies à leur partie inférieure de quelques poils ou cils très-fins, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, quelquefois cependant divisées en deux ou trois crénelures, un peu rétrécies en pétiole vers leur base.

Les tiges sont simples, grêles, pubescentes ou légèrement velues, hautes de deux à trois pouces, nues ou garnies d'une ou de deux petites feuilles, terminées par une ou deux fleurs, rarement trois, pédoncules ; les pédoncules simples, courts, inégaux, pubescents. Les calices sont chargés de quelques poils fins, un peu glanduleux à leur sommet. La corolle est d'un blanc-verdâtre, petite ; les pétales ovales, obtus, rayés de quelques lignes. Ils renferment dix étamines, dont cinq sont un peu plus courtes que les autres.

On rencontre cette plante en Suisse, dans les Alpes, & sur les hautes montagnes des départements méridionaux de la France, aux lieux pierreux. Elle croît également dans la Sibirie, l'Austrie & la Carniole. (V. f.)

Je possède dans mon herbier une petite plante recueillie en Suisse, qui ne me parait être qu'une variété de la précédente. Ses tiges sont plus grêles & plus courtes ; ses feuilles plus étroites, linéaires, obtuses, parfaitement glabres, très-entières.

9. SAXIFRAGE de Virginie. *Saxifraga virginica*, Mich.

*Saxifraga tata minus pubens ; foliis ovalibus, obtusis, quasi petiolatis, crenatis ; caule subaphyllo, paniculoso ; ramulis subsessilibus alternis ; calicibus erectis.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 269. — Lam. Illustr. Gener. tab. 372. fig. 4.

*Sanicula virginiana, alba ; folia oblonga, mucronata.* Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. 5.

Cette plante a des rapports avec le *saxifraga punctata* ; elle ressemble aussi par son port, au *saxifraga stellaris* ; elle doit être distinguée du *saxifraga pensylvanica*, par ses feuilles bien plus petites, rétrécies en un long pétiole ; par toutes ses parties légèrement pubescentes & non velues, & par ses fleurs blanches.

Ses racines sont un peu épaisses, presque droites, garnies de quelques fibres capillaires, noires ; elles produisent des tiges peu élevées, simples, grêles, ordinairement dépourvues de feuilles, légèrement pubescentes, surtout à leur partie supérieure.

Les feuilles radicales sont assez nombreuses, peu épaisses, ovales, vertes, presque glabres à leurs deux faces, ou munies de quelques poils rares, surtout vers leur base ; obtuses à leur sommet,

crênelées à leur contour, rétrécies à leur base en un long pétiole plane, comprimé.

Les fleurs sont, à l'extrémité des tiges, une panicule courte, dont les ramifications peu éralées supportent des fleurs aternes, presque sessiles. Les calices sont droits, pubescents, à cinq petites divisions un peu ovales. La corolle est petite, de couleur blanchâtre.

Cette plante croît parmi les montagnes & sur les rochers, dans la Pensilvanie, la Caroline & la Virginie. Elle m'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

10. SAXIFRAGE à feuilles d'orpin. *Saxifraga sedoides*, Linn.

*Saxifraga foliis aggregatis, alternis oppositifoliae, subnecolatis ; flore pedunculata.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. — Jacq. Miscell. 2. pag. 114. tab. 21. fig. 22. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 643. n°. 9.

*Saxifraga muscoides.* ? Allion. Flor. pedem. n°. 1528. tab. 61. fig. 2.

*Saxifraga trichodes.* Scopol. Catn. edit. 2. n°. 496. tab. 15.

*Saxifraga foliis mollibus, ellipticis, subhirsutis ; caule paniculoso.* Hallet, Helv. n°. 985.

*Saxifraga alpina, minima ; foliis lingulatis, in orbem actis ; flore achroeuca.* Sg. Act. Plant. venet. pag. 450. tab. 9. fig. 3.

Il existe quelques rapports entre cette espèce & le *saxifraga androsacea* ; elle en diffère par ses feuilles glabres, entières ; par ses tiges rameuses, par ses corolles jaunâtres.

C'est une fort petite plante, dont les tiges sont filiformes, presque glabres, un peu comprimées, très-rameuses, couchées en partie, & garnies à leur base de feuilles nombreuses, agrégées, disposées en tosettes, molles, un peu charnues, linéaires, presque elliptiques, planes, presque obtuses, lisses à leurs deux faces, ou quelquefois munies de quelques poils, ciliées à leurs bords ; les feuilles caulinaires aternes ou opposées, un peu lancéolées. Les fleurs sont jumaires, les pédoncules simples, uniflor. s. ou plus rarement supportant deux ou trois fleurs ; la corolle une fois plus courte que le calice ; les pétales ovales, aigus.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse & en Italie. (V. f.)

11. SAXIFRAGE d'un jaune-pourpre. *Saxifraga luteo-purpurea*, Lapeyr.

*Saxifraga foliis radicalibus, rosulatis, integris ; floribus paniculatis ; calice campanulato ; sepalis in-*

*argis, conniventibus.* Lapeyr. Saxifr. pag. 29. n.º 4. tab. 14.

M. Lapeyrouse regarde cette plante comme une hybride, qui a pour père le *Saxifraga califlora* Lapeyr., & pour mère le *Saxifraga arctioides*, d'autant plus qu'il a trouvé leurs gazons mêlés les uns avec les autres, dans le seul endroit où il l'a rencontrée plusieurs fois.

Cette plante a le port du *Saxifraga califlora*, ainsi que la tige & les panicules : les feuilles & les rosettes se rapprochent davantage du *Saxifraga arctioides*. Le calice est mixte, campanulé & renflé comme dans le père, mais ouvert, & à segments triangulaires, aigus, comme dans la mère. Les pétales dépassent un peu le calice ; ils sont connivens, entiers, & ne s'ouvrent jamais. Les étamines sont de la longueur du calice ; les filaments sphériques ; la tige, les feuilles caulinaires, les calices & leurs pédoncules sont pourpres, velus & glanduleux ; les pétales d'un beau jaune doré.

Cette plante croît dans les Pyrénées, sur les roches calcaires, à las Grottes, au dessus de la fontaine de Bernadous. ( Desj. ex Lapeyr. )

## 12. SAXIFRAGE arctioides. *Saxifraga arctioides*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis radicalibus, rosetatis, ellipticis, integris ; floribus capitatis ; petalis linearibus, obtusis, crenulatis.* Lapeyrouse, Saxifr. pag. 28. n.º 3. tab. 13.

*Saxifraga pyrenaica, lutea, minima, foliis densè congestis.* Tournef. Inst. R. Herb. 253. & Hurbar.

Cette espèce forme de petits gazons serrés, courts, durs & compacts. On la distingue à la couleur constante de ses pétales d'un jaune-vif, à ses feuilles elliptiques, allongées, membraneuses à leurs bords ; elle a beaucoup de rapports avec le *Saxifraga cassa* de Linné.

Ses racines sont simples, grêles, longues & nouées : elles produisent un grand nombre de feuilles radicales, disposées en rosettes ; elles sont coriaces, très-entières, petites, elliptiques, glabres à leurs deux faces, vertes, obtus, un peu mucronées à leur sommet, droites, légèrement concaves, bordées d'une membrane avec quelques pores en dessus. Il s'élève du centre de chaque rosette une tige simple, ferme, un peu coude à sa base, haute d'un à deux pouces, garnie de feuilles alternes, linéaires, obtus, purpurines, chargées de poils blancs, un peu glanduleux.

Les fleurs sont peu nombreuses, terminales, presque en tête, soutenues par des pédoncules simples, foliaires, très-courts. Les calices sont veus & glanduleux, de couleur purpurine, à cinq di-

visions court-s. La corolle est d'un jaune-vif, nœ fois plus longue que le calice ; les pétales linéaires, crénelés à leurs bords, obtus à leur sommet ; marqués de trois à cinq nervures parallèles. Les filaments sont droits, plus longs que les calices, de couleur purpurine ; les anthères grosses, jaunâtres ; le style conique, de la longueur du calice ; les stigmates pourpres ; la capsule grosse, sphérique, renfermée en grande partie dans le calice ; les semences fort menues.

Cette espèce croît dans les montagnes des Pyrénées, à une élévation médiocre. Elle fleurit de bonne heure au printemps. ( Desj. ex Lapeyr. )

## 13. SAXIFRAGE bleuâtre. *Saxifraga cassa*. Linn.

*Saxifraga foliis linearibus, perforato-punctatis, aggregatis, recurvatis ; caule subnudo, multifloro.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 571. — Jacq. Flor. austr. tab. 374. — Scop. Carn. edit. 2. n.º 495. tab. 15. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 525. n.º 1113. VII. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 641. n.º 7. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 413. n.º 8. — Villus, Dauph. vol. 3. pag. 665. — Schum. Fascicul. tab. 11. n.º 30. Icon. Malt. — Allion. Flor. pedem. n.º 1521.

*Saxifraga (recurvifolia), foliis linearibus, aggregatis, recurvatis ; caule subnudo ; petalis patentibus, unguiculatis.* Lapeyr. Saxifr. pag. 30. n.º 5.

*Saxifraga foliis crassis, duris, recurvis, subulis falcatis, basi ciliatis.* Hall. Helv. n.º 982.

*Sedi species minima.* Gess. Fascicul. 24. tab. 11. fig. 30.

*Saxifraga alpina, minima ; foliis cassis, desum incurvis.* Tournef. Inst. R. Herb. 255. — Saguier, Plant. veron. pag. 49. tab. 9. fig. 2. — Schuch. Itin. 2. tab. 21. fig. 1.

*Sedum alpinum album, foliis compatis.* C. Bauh. Pin. 284. — Morif. Oxon. Hist. 3. n.º 12. tab. 7. fig. 32.

*Sedum alpinum minimum, foliis cinereis, flore canado.* Schuch. Iter. Alpin. 2. pag. 141. tab. 21. fig. 1.

*Sedum alpinum tertium.* Clus. Stirp. Pann. pag. 486. tab. 483.

*Sedum minus, novum, sive alpinum tertium.* Clus. Hist. 8. f. Icon.

1. *Saxifraga diaphenoides.* Bell. Aq. acad. Tar. 3. pag. 227.

Cette plante est assez facile à distinguer par ses feuilles fort petites, dures, épaisses, recourbées & d'une couleur glauque, & par ses fleurs blanches peu nombreuses.

C'est une fort petite espèce, dont les racines

sont simples inferieurement, grêles, subulées, nocturnes, divisées à leur collet en plusieurs petites fouches dures, presque ligneuses, garnies d'un grand nombre de petites feuilles très-entassées, disposées en petites touffes épaisses, arrondies; ces feuilles sont fermes, dures, presque linéaires, d'une couleur glauque assez agreable, sessiles, entières à leurs bords, obtuses ou un peu acuminées, fortement recourbées à leur sommet, quelquefois un peu ciliées vers leur base, légèrement ponctuées à leur face inferieure.

Les tiges sont grêles, cylindriques, hautes de trois à quatre pouces au plus, très-simples, à peine hispides ou lisses, garnies dans leur longueur de quelques petites feuilles très-courtes, distantes, alternes, pubescentes. Les fleurs, au nombre de quatre ou six, sont terminales, supportées par des pédoncules courts, simples, inégaux, un peu velus, munis à leur base d'une petite bractée. Le calice est hispide; la corolle d'un blanc de lait, assez petite, à cinq pétales rétrécis en onglet à leur base, arrondis à leur limbe, marqués de nervures divergentes.

Linné fait mention d'une variété de cette plante, qui croît sur les montagnes alpines de l'Italie, dont les tiges sont une fois plus élevées, velues & visqueuses; les feuilles presque quatre fois plus grandes, étendues, approchant de celles du *Saxifraga corydodon*, mais reconnoissables aux points entassés dont elles sont munies. Les calices sont amples, très-velus. N'est-ce point un étiolement de la plante qui croît à l'ombre?

Cette plante croît dans les montagnes alpines, sur les rochers, en Suisse, dans les Pyrénées, l'Autriche, ainsi que dans les départements méridionaux de la France. (V. f.)

14. SAXIFRAGE à feuilles planes. *Saxifraga planifolia*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis cuneatis, integris, lineatis, planis; petalis fuscoviridis, calicem superantibus*. Lapeyr. Saxifr. pag. 31. n°. 6.

*Sedum alpinum, tertio simile, alterum*. Column. 2. pag. 66.

*Saxifraga alpina, pallide lutea; foliis latiusculis, non incis; radice crassa*. Mich. Plant. rom. & nepol. n°. 829.

*Saxifraga muscoides*. Allion. Flor. ped. n°. 1528. tab. 61. fig. 2. *Exclusis synonymis*.

C'est une très-jolie espèce qu'on pourroit confondre au premier aspect avec le *Saxifraga cespitosa* à feuilles entières.

Elle forme de petits gazons durs, très-serrés, composés de feuilles droites, coriaces, en forme de coin, planes, entières, marquées de trois

nervures, glanduleuses & velues, fort petites. De leur centre s'élèvent des tiges uniformes, hautes d'environ un pouce, un fleure.

Les fleurs sont petites, terminales, solitaires. Le calice est divisé en cinq découpures élargies, obtuses; la corolle d'un jaune-citron; les pétales arrondis, à peine échancrés, une fois plus longs que les calices; les étamines plus courtes que les pétales; les anthères jaunâtres, arrondies; les styles très-courts.

Cette plante croît sur les Alpes du Piémont, & sur les montagnes des départements méridionaux de la France. (V. f.)

15. SAXIFRAGE burserienne. *Saxifraga burseriana*.

*Saxifraga foliis aggregatis, imbricatis, triquetris, subulatis, levibus; caule subnaso, unifloro*. Linn. Syst. Nat. pag. 305. & Syst. veget. pag. 471. — Wulfen, in Jacq. Miscell. 1. p. 152. tab. 17. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 644. n°. 8.

*Saxifraga foliis roseatis, imbricatis, spiroso-ciliatis, triquetris; floribus fuscigatis; petalis crispato-reflexis*. Lapeyr. Saxifr. pag. 35. n°. 11.

*Saxifraga foliis compatis, plicatis, pungentibus; caule viscido, paucifloro*. Hall. Helv. n°. 983.

*Saxifraga foliis crassis, pungentibus; caule viscido, paucifloro*. Hall. Act. Helv. 6. pag. 10. tab. 39.

*Saxifraga alpina, foliis glaucis, acutis, monanthos; caule folioso*. Seguiet. Plant. veron. Suppl. pag. 201. tab. 5. fig. 2. Bona.

*Sedum alpinum, Saxifraga alba flore vel granatiformum*. C. Bauh. Pin. 184. — Barlet. XVI. 6.

5. *Eadem, caule subquinque floro, sessigato*. N. Linn.

*Sedum minimum, tertium*. Lobl. Icon. 204. — Dalech. Hist. 2. pag. 1135. Icon.

*Sedum ferratum*. Dod. Pempt. 131. Icon. Non descriptio.

*Sedum minimum, syriacum, luteo flore Saxifraga alba*. J. Buh. Hist. 3. pag. 656. Icon. — Moris. Oxon. Hist. 5. pag. 476. 5. 12. tab. 8. fig. 1.

Cette espèce, assez remarquable, ressemble beaucoup à un *Sedum*, tant par la consistance de ses feuilles, que par leur disposition & leur forme.

Ses racines sont grêles, un peu fibreuses, & se divisent, à leur partie supérieure, en plusieurs petites fouches garnies de feuilles nombreuses, fortement serrées & imbriquées; charnues, épaisses, à trois côtes, assez semblables à celles du genévrier; subulées, lisses, glabres à leurs deux faces, sessiles, relevées en carène sur le dos, entières à

leurs bords, aiguës à leur sommet, un peu piquantes, de couleur glauque.

Les tiges sont simples, hautes de trois à quatre pouces, hérissées de poils courts, roussâtres, glutineux; garnies seulement de quatre à cinq petites feuilles sessiles, alternes, linéaires, terminées souvent par une ou deux fleurs, dont la corolle est d'une grandeur médiocre, d'un blanc de lait, marquée de lignes d'un blanc plus pâle.

Quant à la plante  $\beta$ , dont les tiges ont de quatre à cinq fleurs, que Linné rapporte à l'espèce que je viens de mentionner, elle devoit former, d'après Jacquin, une espèce distincte, & il faut y rapporter le synonyme d'Haller. Comme elle ne m'est point connue, je n'ai pas cru devoir m'écarter de l'opinion de Linné; elle paroît d'ailleurs, d'après la description de Linné, & la synonymie de Gaspard Bauhin, être la même que la plante dont Lobel, Dodonée, &c. ont donné une figure assez bonne.

Cette plante croît dans les montagnes alpines, en Suisse, en Italie.  $\gamma$

16. SAXIFRAGE fluette. *Saxifraga tenella*. Jacq.

*Saxifraga foliis lanceolatis, mucronatis, boscicatis, imbricatis; caule nudifloro, paucifloro; calicibus mucronatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 643. n°. 10.

*Saxifraga* (tenella), *stolonibus prostratis, imbricato foliolis, à latere cauliferis; caulibus erectis, subnatis, paucifloris; foliis linearis-fimbriatis, ciliatis, spinulato-terminatis*. Wulfen, in Jacq. Collect. 3. pag. 144. tab. 17.

Cette espèce se rapproche beaucoup par son port, du *Saxifraga bryoides*; on l'en distingue particulièrement par ses fleurs beaucoup plus petites, par ses calices mucronés, & par les ovaires presque inférieurs, munis de poils glanduleux.

Elle pousse de ses racines plusieurs rejetons rampans, chargés de feuilles imbriquées, petites, lancéolées, presque linéaires, ciliées principalement vers leur base, fimbriées, mucronées, ou terminées à leur sommet par une pointe épineuse. Les tiges sont courtes, presque nues, ou munies de quelques petites feuilles alternes, fimbriées. Il n'y a qu'un très-petit nombre de fleurs, dont le calice se divise en cinq découpures presque lancéolées, mucronées à leur sommet. La corolle est fort petite, blanchâtre. L'ovaire paroît presque inférieure, chargé de poils très-courts, un peu glanduleux.

Cette plante croît sur les montagnes alpines de la Carinthie, en Allemagne.  $\gamma$

17. SAXIFRAGE bryocide. *Saxifraga bryoides*. Linn.

*Saxifraga foliis lanceolatis, mucronatis, marginis*

*cartilagineis, ciliatis; caule nudifloro, paucifloro; calicibus obtusis*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. p. 643. n°. 11.

*Saxifraga foliis ciliatis, inflexis, imbricatis; caule nudifloro, paucifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 497. tab. 15. — Jacq. Miscell. 2. pag. 49. tab. 5. fig. 1. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 526. n°. 1113. IX. — Lapeyr. Sixier. pag. 35. n°. 12. — Schuch. Iter 2. tab. 21. fig. 2.

*Saxifraga foliis lanceolatis, ciliatis, compatis; caule usifloro*. Hall. Helv. n°. 969.

*Saxifraga pyrenaica, minima, lutea, muscoformis*. Tourn. Inst. R. Herb. 253.

*Sedum muscosum*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 695.

*Sedum alpinum quartum*. Colum. Ecphr. 2. p. 66. tab. 67. fig. 1, 2.

On distingue cette espèce à ses feuilles fort petites, d'un vert jaunâtre, mucronées, ciliées; à ses fleurs presque solitaires, jaunâtres, & à ses calices obtus.

Elle forme de très-jolis gaxons sur les rochers qu'elle recouvre. Ses racines sont grêles, petites, d'un brun noirâtre; elles se divisent en rejetons nombreux, rapprochés, garnis de feuilles serrées, imbriquées, sessiles, fort petites, un peu ovales, lancéolées, luisantes, d'un beau vert tirant sur le jaune, cartilagineuses à leur contour; munies de cils assez roides, tant à leurs bords que sur leur nervure du milieu, aiguës, presque mucronées à leur sommet; elles ont l'aspect des feuilles d'un bryum, & la roideur des cils inférieurs les fait paroître comme dentées.

Les tiges sont simples, latérales, grêles, presque filiformes, hautes d'environ deux pouces, glabres ou un peu pubescentes, cylindriques, munies de quelques feuilles alternes, fort petites, terminées par une seule fleur, quelquefois par deux ou trois, médiocrement pédonculées. Leur calice est inférieur, presque glabre, à cinq découpures ovales, obtusés. La corolle, d'une grandeur médiocre, est d'un jaune-pâle, marquée de taches roussâtres; les pétales oblongs, obtus; l'ovaire renflé, environné à sa base d'un cercle brun; les capsules lisses & rougeâtres.

Cette plante croît dans les lieux pierreux & couverts sur les montagnes des Alpes, en Suisse, & dans les départemens méridionaux de la France.  $\gamma$  (V. f.)

18. SAXIFRAGE rude. *Saxifraga aspera*. Linn.

*Saxifraga foliis cordatis, lanceolatis, alternis, ciliatis; caulibus procumbentibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 375. — Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 423. n°. 6. — Jacq. Flor. aust. vol. 5. p. 44.



Append. tab. 31. — Mill. Dict. n°. 14. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 530. n°. 1113. XXV. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 649.

*Saxifraga foliis caulinis, lanceolatis, alternis, spinoso-ciliatis; caule inferne procumbente.* Linn. Spec. Plant. 402.

*Saxifraga foliis duris, ciliatis; caule ramoso, paucifloro.* Hall. Helv. n°. 970.

*Saxifraga sedi foliis crenatis, asperis.* Scheuchz, Iter 2. pag. 140. tab. 20. fig. 3.

*Saxifraga alpina, foliis crenatis & asperis.* Tourn. Inst. R. Herb. 252.

*Sedum alpinum, foliis crenatis, asperis.* C. Bauh. Pin. 284. — Idem, Prodr. 132. — Gesn. Fasc. 22. tab. 6. fig. 27.

*Sedum alpinum, hispidum, ferè spinosum; flore pulchro.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 695. Icon. — Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 479. 5. 12. tab. 10. fig. 25.

*Sedum minimum alpinum, villosum, alternum.* Parkins, Theatr. 738.

On distingue cette espèce à ses feuilles étroites, sèches, très-lisses, lancéolées, munies à leurs bords de cils durs, roides, assez longs, semblables à de petites épines, mais moins piquans; un peu rapprochée du *Saxifraga bryoides*, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

Les racines sont grêles, un peu traçantes, dures, d'un brun-noirâtre; elles produisent des riges longues de cinq à six pouces, en partie couchées, surtout à leur base; dures, grêles, cylindriques, presque simples, feuillées, d'un blanc-jaunâtre. Les feuilles sont sessiles, alternes, étroites, lancéolées, fermes, glabres à leurs deux faces, aiguës à leur sommet, armées à leurs bords de cils distans, très-roides, presque épineux; les feuilles inférieures très-rapprochées, presque disposées sur deux rangs; celles des tiges alternes, distantes; les supérieures très-étroites, & dont les cils sont beaucoup plus fins & plus courts.

Les fleurs sont frisées à l'extrémité des tiges, au nombre de trois ou quatre, quelquefois un peu plus; portées sur de longs pédoncules alternes, presque simples, munies de quelques petites bractées. Le calice est glabre, divisé en cinq découpures ovales, obtuses, d'un vert-blanchâtre, presque membraneuses à leurs bords. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, d'une grandeur médiocre, presque supérieure à l'ovaire; ses pétales ovales, quelquefois un peu mucronés à leur sommet, souvent obtus, la plupart marqués vers leur onglet d'une tache d'un jaune-foncé.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, dans les Alpes. 2. (V. f.)

19. *SAXIFRAGE* de Gmelin. *Saxifraga brachialis.* Gmel.

*Saxifraga foliis imbricatis, subulatis, ciliatis, spinosis; caule subnudo, multifloro.* Linn. Syst. veget. pag. 412. n°. 10. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 164. tab. 65. fig. 2.

Cette plante a quelque affinité avec le *Saxifraga bryoides*; mais elle est beaucoup plus élevée, & ses fleurs forment une petite panicule.

Ses racines produisent un grand nombre de rejets rampans, très-ferrés, garnis de feuilles planes, dures, nombreuses, imbriquées, disposées en gazons rousus, subulées, munies à leurs bords de cils durs, blanchâtres, & terminées par une petite épine blanche. Ses tiges sont simples, assez élevées, presque nues, munies seulement de quelques feuilles alternes, fort petites, mucronées à leur sommet, entières à leurs bords, presque point ciliées. Les fleurs sont terminales, peu nombreuses, disposées en une petite panicule dont les ramifications sont courtes, presque simples, glabres, filiformes; les calices à cinq divisions très-courtes; la corolle blanche; les pétales ovales, oblongs, élargis & obtus à leur sommet, rétrécis à leur base, presque deux fois plus longs que le calice.

Cette plante croît dans la Sibirie, où elle a été découverte par Gmelin. (V. f. in herb. Lam. ex Patrin.)

20. *SAXIFRAGE* à feuilles de leucanthème. *Saxifraga leucanthemifolia.* Lapeyr.

*Saxifraga foliis spathulato-dentatis; caulibus pluribus dichotomis; petalis pedunculatis, inaequalibus.* Lapeyr. Saxifr. pag. 49. n°. 28. tab. 25.

*Sanicula alpina aliquatenus affinis.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 718. Icon. Mula.

*Sanicula myosotis, alpina; floribus albicantibus, ferè umbellatis.* Pluken. Phytogr. tab. 38.

*Cotyledon hirsuta.* C. Bauh. Pin. — Rai, Synops. 213.

*Cotyledon aquatica, hirsuta.* Rai, Hist. 1046.

*Sanicula montana alterius, secunda species.* Claf. Hist. 1. pag. 308.

*Gum palustre minus, foliis oblongis, crenatis.* Tournef. Inst. R. Herb. 252.

*Gum palustre, lustranum, minus & ramosum.* Tournef. Inst. R. Herb. 252.

*Saxifraga* (Clusii), *foliis curciformibus, semidentatis; caule paniculato, folioso.* Gouan, Obs. 28. (Exclusis synonymis.)

*Saxifraga* (leucanthemifolia), *hirsutissima; foliis acutè dentatis; caulibus divaricato-dichotomis; paniculis capillaribus, laxis; calice reflexo; petalis*

*inæqualibus*, Mich. Flor. borcal. Amer. vol. 1. pag. 268.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Saxifraga stellata* ; elle en diffère par son port & par plusieurs caractères qui lui sont propres.

Ses racines sont fibreuses, un peu traçantes ; elles produisent un grand nombre de feuilles radicales, droites, grandes, longues de trois pouces, d'apex par pequets, entières jusque vers leur milieu, fortement dentées à leur partie supérieure, spatulées, rétrécies à leur base en un pétiolo assez long, d'un vert jaunâtre ; munies, surtout à leur face supérieure, de poils qui sortent d'une petite glande. De leur centre s'élèvent plusieurs tiges, nues à leur partie inférieure, un peu rotteuses, paniculées, dichotomes, très-rameuses, extrêmement fragiles, légèrement velues ; chaque bifurcation garnie d'une semelle ; les deux ou trois premières semblables aux radicales ; les supérieures petites, lancéolées, entières ou munies d'une ou de deux dents à leur sommet.

Les fleurs sont nombreuses, paniculées, d'une médiocre grandeur. Les panicules sont lâches, étalées, dichotomes. Le calice est inférieur, persistant, de couleur purpurine, à cinq divisions profondes, aiguës, réfléchies ; les pétales blancs, inégaux, lancéolés ; les trois supérieurs redressés, marqués d'une double tache jaune à leur onglet ; les deux inférieurs plus petits, réfléchis, sans taches ; les étamines de moitié plus courtes que les pétales. Le fruit consiste en deux capsules purpurines, assez croissantes, allongées, séparées, s'ouvrant dans leur longueur, & contenant des semences ovales, fort petites.

Cette plante croît dans les Pyrénées, aux endroits frais, à six ou sept cents toises de hauteur. Michaux l'a également recueillie dans l'Amérique septentrionale. ( *Descript. ex Lapeyr.* )

21. SAXIFRAGE écailée. *Saxifraga stellata*. Linn.

*Saxifraga foliis serratis ; caule nudo, ramofo ; petalis acuminatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 572. — *Eder*. Flor. dan. tab. 25. — *Gmel*. Sibir. vol. 4. pag. 163. n°. 75. — *Scop*. Carn. edit. 2. n°. 492. tab. 13. — *Jacq*. Collect. 1. par. 202. tab. 13. — *Lam*. Flor. franc. vol. 3. pag. 328. n°. 1113.

*Saxifraga foliis rosulatis ; scapo subunico ; petalis pedunculatis, æqualibus*. Lapeyr. Saxif. pag. 49. tab. 27.

*Saxifraga foliis lanceolatis, dentato-serratis ; caule nudo, simpliciter*. Flor. succ. 335. 367.

*Saxifraga caule nudo, simpliciter ; foliis lanceolatis, dentatis ; petalis ovatis*. Flor. lapp. 175.

*Saxifraga foliis rhomboideis, acutè serratis ; caule nudo, ramofo*. Haller, Helv. n°. 973.

*Saxifraga myosotis, foliis albicanibus, fere umbellatis*. Pluken. Almag. pag. 331. tab. 38. fig. 2. & tab. 222. fig. 4.

*Sedum montanum hirsutum, mucronato & dentato folio ; flore albo, guttato*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 470. §. 12. tab. 9. fig. 13.

*Saxifraga montana, minor*. Clus. Stirp. Pann. pag. 441. Sine icon.

2. *Saxifraga* ( *comefi* ), *paniculè foliatè*.

*Saxifraga*. Flor. lapp. 175. tab. 2. fig. 3.

Plusieurs caractères saillans rendent cette plante bien reconnaissable, tels que : ses feuilles planes, presque anguleuses ou dentées, surtout vers leur sommet ; les pétales très-étroits, acuminés, blancs, marqués de deux taches rouges ; les calices réfléchis sur les pédoncules. D'ailleurs, elle varie beaucoup par son port, par la grandeur, par ses feuilles glabres ou pubescentes, ou ciliées ; par le nombre de ses fleurs, &c.

Ses racines sont fines, noirâtres, fibreuses ; elles poussent plusieurs tiges couchées, garnies de feuilles disposées en garou ou en rosette ; lâches. Ces feuilles sont planes, presque conformes, oblongues, élargies faiblement vers leur sommet, médiocrement charnues, d'un vert gris, presque anguleuses ou sinueuses, particulièrement vers leur sommet, de dents écartées, très-aiguës, quelquefois légèrement ciliées ou pubescentes.

Les tiges sont fort grêles, presque filiformes, parfaitement nues, simples, un peu pubescentes, particulièrement vers leur sommet, hautes de cinq à six pouces au plus, terminées par une petite panicule lâche, dont les ramifications sont presque capillaires ; munies, à la base de leurs divisions, d'une petite bractée linéaire. Les fleurs sont petites, peu nombreuses ; les calices glabres, à cinq découpures profondes, oblongues, orbiculés, réfléchis sur les pédoncules. La corolle est blanche, un peu plus longue que le calice ; les pétales oblongs, étroits, acuminés à leur sommet, rétrécis, & marqués vers leur onglet de deux taches rougeâtres. La capsule est un peu allongée, étroite, terminée par deux pointes recourbées, fort courtes.

Cette plante croît dans les Alpes, en Suisse, dans la Sibirie, la Japonie, aux lieux humides & aux bords des ruisseaux, sur les rochers ; on la rencontre également dans les départemens méridionaux de la France. ( *V. f.* )

22. SAXIFRAGE ombragée. *Saxifraga umbrosa*. Linn.

*Saxifraga foliis obovatis, subretusis, corymbico-crenatis ; caule nudo, paniculato*. Linn. Soc. Plant. vol. 1. pag. 574. — *Miller*, Icon. 141. fig. 2. — *Lam*,

Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 527. n°. 1113. XIII.  
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 647. n°. 20. —  
Lam. Illust. Genet. tab. 372. fig. 5.

*Saxifraga (umbrosa), foliis obovatis, subretusis, cartilagineo-crenatis; petiolis dilatatis; caule nudo, paniculato.* Lapeyr. Saxifr. p. 44. n°. 20. tab. 22.

*Saxifraga foliis cuneiformibus, retusis, radialis, sinuato-ferratis, margine acutis; caule paniculato.* Hort. Upsal. 108.

*Geum folio subrotundo, minori; pistillo floris rubro.* Tournef. Infl. R. Herb. 251.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Saxifraga stellaris*, dont elle diffère par ses feuilles plus larges, à lâches crénelures arrondies, point anguleuses.

Ses racines sont très-grêles, dures, presque simples, noirâtres; elles poussent, outre des tiges fertiles, des rejets stériles, rougeâtres, couchés & rampans. Les feuilles, toutes caulinaires, forment des rosettes assez larges, étendues sur la terre; elles sont cuneiformes, presque spatulées, rétrécies à leur base en un assez long pétiole plane, presque arrondies & émoussées à leur sommet, cartilagineuses & blanchâtres à leur contour, glabres à leurs deux faces, dures, coriaces, chargées de points argentés fort petits, d'un vert un peu jaunâtre, très-souvent rougeâtres en dessous, crénelées à leurs bords; les crénelures distantes, arrondies, rarement anguleuses.

Les tiges sont droites, presque filiformes, hautes de quatre à six pouces, simples, nues, glabres, légèrement pubescentes à leur partie supérieure, terminées par une panicule médiocre, composée de six à dix fleurs supportées par des pédoncules courts, rameux, presque sétacés, à peine pubescents. Les calices sont courts, réfléchis sur le pédoncule après la floraison. La corolle est blanche; les pétales médiocres, allongés, marqués d'une tache jaune vers leur onglet; les capsules ovales, oblongues, petites, terminées par deux pointes subulées, un peu recourbées.

Cette plante croît dans les lieux couverts des montagnes alpines; elle n'a été communiquée par M. Desfoucault, qui l'a recueillie sur les hautes montagnes des environs de Grenoble. (V. f.)

23. SAXIFRAGE à feuilles en coin. *Saxifraga cuneifolia*. Linn.

*Saxifraga foliis cuneiformibus, obtusissimis, repandis; caule nudo, paniculato.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 574. — Scop. Carn. n°. 490. tab. 15.  
— Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 647. n°. 22.  
— Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 527. n°. 1113. XIV. — Schimied. Fasc. n°. 37. tab. 12.

*Saxifraga punctata.* Gunn. Norv. n°. 1076. — Act. Hafn. 10. pag. 445. tab. 3. fig. 10.  
Botanique. Tome VI.

*Saxifraga foliis petiolatis, obtusis; caule fragili, nudo, ramofo.* Haller. Helv. n°. 974.

*Geum folio subrotundo, minimo.* Tournef. Infl. R. Herb. 251.

*Geum foliis cuneiformibus, obtusis; caule paniculato, nudo.* Getard, Flot. gall. Prov. pag. 424. n°. 2.

*Coryledon altera, olim Matthioli.* J. Baub. Pin. Hist. pag. 684. Icon.

*Coryledon aut scilicet species quadam.* Gfñ. Fasc. 19. tab. 12. fig. 37. Benè.

Il existe beaucoup de rapports entre cette espèce & le *Saxifraga umbrosa*, mais elle est plus petite; ses feuilles sont plutôt sinuées que crénelées, point anguleuses: elle pourroit aussi, dans les variétés, avoir quelques rapports avec le *Saxifraga stellaris*; mais les feuilles de cette dernière ne sont cuneiformes que vers leur base, rhomboïdales à leur sommet, dentées en scie & non pas sinuées.

Ses racines sont grêles, fibreuses, petites, un peu noirâtres; elles produisent un grand nombre de petites feuilles toutes radicales, étendues sur la terre en rosettes, pétioles, coriaces, plus longues que rondes, parfaitement cuneiformes, chargées souvent de quelques points argentés, ordinairement entourées d'un rebord cartilagineux & blanchâtre, glabres à leurs deux faces, sinuées à leurs bords, supportées par des pétioles courts.

Les tiges sont simples, grêles, presque filiformes, nues, légèrement pubescentes, hautes de trois à cinq pouces, terminées par une petite panicule lâche, composée de quelques taveaux capillaires, presque simples ou médiocrement rameux, munis de petites bractées fines, très-étroites, subulées. Les calices sont petits, à cinq découpures obtuses, entièrement réfléchies après la floraison. La corolle est blanche, un peu plus grande que le calice; les filaments droits, un peu élargis, comprimés, subulés à leur sommet, terminés par des anthères d'un rouge-vif; les capsules petites, un peu ovales, à deux pointes à leur sommet.

Cette plante est quelquefois fort petite: j'en possède un individu recueilli en Suisse, dont les tiges ont à peine deux pouces; les feuilles trois à quatre lignes de long.

On rencontre cette espèce sur les rochers, dans les lieux couverts, sur les montagnes alpines & dans les départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. f.)

24. SAXIFRAGE velue. *Saxifraga hirsuta*. Linn.  
R. f. f.

*Saxifraga foliis cordato ovalibus, retusis, cartilagineo-crenatis; caule nudo, paniculato* Linn. Spec. Pl. ant. vol. 1. pag. 574. — Mill. Dict. n.º 6. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 528. n.º 1113. XVI. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 647. n.º 21. — Lapeyr. Saxifr. pag. 44. tab. 22.

*Geum folio circinato, aculeo crenato; pifillo floris rubro*, Tourn. Inst. R. Herb. 251. — Magn. Hort. Monip. pag. 87. tab. 87.

Id. *Sanicula montana, crenata; umbilico pallido*. Idem. Hort. Paris. L. c.

*Geum folio circinato, pifillo floris pallido*. Tourn. Inst. R. Herb. 251.

C'est une plante fort élégante, quoique ses fleurs soient petites, peu éclatantes; elles sont assez nombreuses, forment une panicule lâche, & se font remarquer par leur couleur blanche, chargées de points rougeâtres. Cette espèce a de grands rapports avec le *Saxifraga geum*; mais cette dernière s'élève beaucoup moins; ses fleurs sont entièrement blanches; & ses feuilles en forme de reins, tandis que celle dont il est question a ses feuilles ovales, presque rondes, crénelées & non dentées, soutenues d'ailleurs par des pétioles très-longs.

Ses racines sont brunes, un peu épaisses, presque simples, pivotantes, munies de peu de fibres; elles produisent plusieurs rejets garnis de feuilles routes radicales, longuement pétiolées, ovales ou un peu arrondies, obtuses, point ou presque point échancrées à leur base, d'un vert foncé en dessus, plus pâles à leur face inférieure, à rebords blanchâtres, quelquefois rougeâtres, crénelées; les crénelures assez égales, arrondies, longues d'un pouce au moins, marquées de veines latérales très-rameuses, presque glabres à leurs deux faces, supportées par des pétioles au moins une fois aussi longs que les feuilles, velus, comprimés.

Ses tiges sont droites, hautes de huit à dix pouces, simples, non feuillées, grêles, striées, légèrement velues, paniculées à leur partie supérieure. Cette panicule est lâche; les premières ramifications allongées & filiformes, pubescentes, munies, à leur base, de petites bractées très-étroites, les pédoncules partiels courts, inégaux, souvent d'un rouge-foncé, velus, glauqueux, ainsi que les calices. Ces derniers sont divisés en cinq découpures courtes, presque linéaires, obtuses, réfléchies sur les pédoncules après la floraison; les fleurs petites, les pétales très-ouverts, ovales, aigus, de couleur blanche, marqués de raches rougeâtres; le pistil coloré en rouge ou quelquefois un peu jaunâtre; les capsules ovales, terminées par deux petites cornes très-écartées, un peu recourbées.

Cette plante croît sur les Alpes, dans les Pyrénées,

& sur les hautes montagnes dans les départemens méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres. (V. v.)

25. SAXIFRAGE mignonette. *Saxifraga geum*; Linn.

*Saxifraga foliis reniformibus, dentatis; caule nudo, paniculato*. Linn. Spec. Pl. ant. vol. 1. pag. 574. — Pallas, Iter 2. pag. 35. — Scopol. Carn. edit. 2. n.º 491. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 528. n.º 1113. XVI. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 648. n.º 23. — Gouan, Monip. pag. 209. n.º 2. — Lam. Ill. Gener. tab. 372. fig. 2. — Lapeyr. Saxifr. pag. 46. tab. 24.

*Geum folio subrotundo, minori; pifillo floris rubro*. Magn. Hort. Monip. pag. 88. tab. 88.

*Geum rotundifolium, minus*. Tournef. Inst. R. Herb. 251.

*Sanicula montana, rotundifolia, minor*. C. Bauh. Pin. 143.

*Sanicula montana alterius species secunda*. Clus. Hist. 308.

*Sedum montanum, rotundifolium, minus, album, non guttatum*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 478. an 5. 12. tab. 9. fig. 12. ? *Sed petalis punctatis*.

*Sanicula minor, non guttata*. Parkinson.

Cette espèce ne peut se confondre avec le *Saxifraga hirsuta*, ayant ses feuilles échancrées fortement en rein & bien plus arrondie, la corolle d'ailleurs n'étant point chargée de points rouges. Est-il bien certain que ses pétales sont toujours blancs? La figure que donne Morifon, d'une plante qui, d'après lui-même, ne diffère de la nôtre que par ses pétales tachetés, peut laisser quelques doutes. Aussi j'ai hasardé de rapporter cette figure, parce qu'en effet, ce caractère excepté, elle peint fidèlement la plante dont il est ici question, qu'il ne faut pas confondre avec le *Saxifraga rotundifolia*, dont les tiges sont feuillées.

Ses racines sont grêles, traçantes & noirâtres. Les feuilles qui en sortent, sont longuement pétiolées, routes radicales, arrondies, échancrées en rein à leur base, vertes à leurs deux faces; mais un peu plus pâles en dessous, crénelées à leur contour; les crénelures presque obtuses, supportées par des pétioles velus, beaucoup plus longs que les feuilles.

La tige ne s'élève guère qu'à la hauteur de cinq à six pouces; elle est grêle, simple, à peine velue, un peu rougeâtre vers son sommet, & se termine par une panicule médiocre, lâche, dont les ramifications sont filiformes, pubescentes; les pédoncules propres courts, inégaux. Les calices se di-

vifent en cinq découpures rabattues fur les pédoncules. La corolle eft petite, entièrement blanche; les pétales oblongs, le piftil de couleur rougeâtre, & la capfule ovale, terminée par deux petites cornes très-ouvertes.

Cette plante croît fur les montagnes des provinces méridionales de la France, dans les Alpes, &c.  $\frac{x}{2}$  (V. f.)

26. SAXIFRAGE à grandes feuilles. *Saxifraga crassifolia*. Linn.

*Saxifraga foliis ovalibus, retufis, obfoletis serratis, petiolatis; caule nudo, paniculâ conglomeratâ.* Linn. Syft. veget. pag. 412. n°. 12. — Dec. 12. pag. 27. tab. 14. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 644. n°. 14.

*Saxifraga foliis ovalibus, crenulatis; caulibus nudis.* Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 166. tab. 66.

*Gaum faxatile, rotundifolium, majus; flore purpureo.* Amm. Ruth. n°. 90.

Cette belle plante, que les caractères de fa fructification ne permettent pas de fortir de ce genre, en eft bien éloignée par la grandeur de fon port. On n'eft pas peu furpris de trouver, à côté des prites plantes alpinas qui compofent le plus grand nombre des efpeces de ce genre, une plante étonnante par l'ampleur de fes feuilles, la grandeur & le nombre de fes flurs. De femblables phénomènes annoncent à l'obfervateur de la nature, qu'il doit moins s'arrêter à la grandeur des formes, qu'aux caractères des organes effentiels, lorsqu'il s'agit de placer les objets naturels dans la férie qui leur convient. En effet, que l'on réduife la plante dont il s'agit, qu'on en faffe une plante en miniature, & l'on aura une efpecé qui conviendra parfaitement aux efpeces alpines, tant par fes caractères effentiels, que par tous fes caractères fecondaires.

Ses racines font fortes, épaiffes, & s'enfoncent affez profondément en terre. Elles poulfent de leur collet quelques feuilles amples, coriaces, un peu grâffes, glabres, & très-liffes à leurs deux faces, d'un vert-foncé, ovales, pétioles, obtusifs à leurs deux extrémités, un peu finuées ou obfcurément crénelées à leur contour, longues de quatre à fix pouces & plus, larges de deux ou trois, marquées de nervures latérales prefqu'opposées, dichotomes ou rameufes vers leur fommet, fupportées par des pétioles longs d'environ un pouce, un peu comprimés, charnus. Ces feuilles fortent de très-gros bourgeons ovales, concaves, dans lefquels elles font roulées en dedans. L'un de ces bourgeons s'élève avec la tige: il contient les flurs.

La tige eft une hampe nue, épaiffe, de la groffeur du petit doigt, très-glabre, cylindrique, charnue, très-fimple, terminée par un beau bouquet

de flurs nombreux, rouges, grandes, mafles, un peu paniculées, dont les ramifications font courtes, pendantes; les calices campanulés, glabres, divifés jufque vers leur moitié en cinq découpures linéaires, très-obtufes. La corolle eft grande, en forme de cloche, à cinq pétales en ovale renverfé, obtus, un peu rétrécis à leur bafe.

Cette plante croît fur les montagnes alpines de la Sibérie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, & dans plusieurs autres, comme une belle plante d'ornement.

27. SAXIFRAGE des hautes montagnes. *Saxifraga nivalis*. Linn.

*Saxifraga foliis obovatis, crenatis, fubfiffilibus; caule nudo, floribus congestis.* Linn. Syft. veget. pag. 412. n°. 13. — Miller, Dict. n°. 9. — Guan. Norv. n°. 545. — Light. Flor. scot. 1. pag. 121. — Cæder. Flor. dan. tab. 28. — Vahl, in A&C. Soc. Hift. Nat. Hafn. 2, 1. pag. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 645. n°. 15.

*Saxifraga foliis fubovatis, crenatis; caule nudo, floribus capitatis.* Flor. fucc. n°. 354. 368.

*Saxifraga caule nuda, fimplici; foliis elliptico-fubrotundis, crenatis; floribus capitatis.* Flor. lappon. pag. 176. tab. 2. fig. 5, 6.

*Saxifraga foliis cordato-ovalibus, crenatis; corollâ albâ; caule hirsuta, aphyllâ.* Cronov. Virg. 160.

*Saxifraga foliis oblongo-rotundis, dentatis; floribus compatis.* Rai, Angl. vol. 3. pag. 354. tab. 16. fig. 1.

*Sempervivum minus, dentatum.* Mart. Spitzb. 43. tab. F. fig. A. — Pluk. Phytogr. tab. 222. fig. 2.

*Sedum ferratum, fofculis compatis, immaculatis.* Rai, Hill. 507.

Cette plante a quelques rapports avec le *saxifraga crassifolia*, furtout par la difpofition de fes flurs; mais elle eft bien plus petite; fes corolles font blanches, fes feuilles prefque fiffiles, en ovale renverfé.

Ses racines font fibreufes, affez fortes, & produifent des feuilles radicales ovales, oblongues, prefque fiffiles ou médiocrement rétrécies en pétiole vers leur bafe, quelquefois un peu arrondies, crénelées à leur contour, obtufes à leur fommet, longues d'environ deux pouces, fur un demi-pouce de large; glabres à leurs deux faces, d'un vert-foncé.

Ses tiges font droites, fimples, médiocrement épaiffes, dépourvues de feuilles, hautes d'environ un pied; un peu velues, terminées par une affez belle touffe de flurs blanches, nombreuses,

R r r 2

rwprochées, qui forment presque une tête arrondie ; composées de petites grappes courtes, rameuses. Elles paroissent vers le milieu de l'été, &c. et se conservent dans toute leur beauté pendant près d'un mois lorsqu'on les tient à l'ombre.

Cette plante croît sur les hauteurs montagneuses alpines du Spitzberg, dans la Lapponie, la Suède : on la rencontre également dans la Virginie & au Canada. On la cultive dans quelques jardins d'Europe. x

28. SAXIFRAGE farmenteuse. *Saxifraga farmentosa*. Linn. f.

*Saxifraga foliis subrotundis, dentatis, pilosis; floribus reptantibus; petalis duobus elongatis.* Air. Hort. Kew. vol. 2. pag. 79. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 646. n°. 18.

*Saxifraga* (farmentosa), foliis radicalibus subrotundis, cordatis, crenatis; farmentis axillaribus, radiconicis; corollis irregulari, racemo composito. Linn. f. Suppl. pag. 240. — Schreb. Monogr. Diognæ. pag. 16. tab. 2. 3.

*Saxifraga foliis inciso-lobatis, pilosis; caule subnudo, erecto, paniculato.* Thunb. Flor. japon. pag. 182.

*Saxifraga* (stolonifera), foliis subrotundis, basi cordatis, crenatis; farmentis axillaribus, corollis inæqualibus. Jacq. Icon. rar. 1. tab. 80. — Idem, Miscell. 2. pag. 327. — Meerb. Icon. 23.

*Saxifraga* (ligulata), foliis subrotundis, subius papilloso; panicula secundæ; petalis binis, inferioribus longissimis. Murr. in Comment. Goett. 1781. pag. 26. tab. 1.

Cette plante a de grands rapports avec les *heuchera*, dont elle offre le port, mais dont elle diffère par le nombre de ses étamines, remarquable d'ailleurs par deux pétales plus grands que les autres, &c. par de longs rameaux farmenteux, ainsi que par les larges feuilles grasses, arrondies, velues.

Ses racines produisent un grand nombre de feuilles radicales pétioles, amples, un peu arrondies, presque orbiculaires, échancrées en cœur, pileuses, crénelées à leur contour; les crénelures obscures, marquées à leur face supérieure de veinules blanchâtres, d'une substance tendre, pulpeuse, d'un vert-brun ou d'un rouge-foncé en dessous, soutenues par des pétioles cylindriques, plus longs que les feuilles.

Du centre des feuilles s'élève une tige droite, herbacée, cylindrique, haute d'environ un pied & demi, simple, presque dépourvue de feuilles, pileuses; il sort de l'aisselle des feuilles radicales de longs rejetons rameux, farmenteux, très-nombreux, rampans, qui poussent des racines à leurs

nœuds, &c. produisent de nouvelles tiges. Les fleurs sont disposées en une panicule composée de grappes presque unilatérales, qui occupent une grande portion des tiges, très-rameuses. La corolle est blanche, composée de cinq pétales inégaux, dont trois plus petits, tachetés de rouge, deux plus grands, tout-à-fait blancs, munis en outre d'un appendice jaunâtre. Les filaments sont de couleur blanche, un peu épaissis à leur partie supérieure, de la longueur des plus petits pétales; les styles aussi longs que les étamines. Deux de ces étamines se réfléchissent derrière les pétales, après la floraison.

Cette plante croît à la Chine & au Japon. x (Descript. ex Linn. f.)

29. SAXIFRAGE de Bellard. *Saxifraga Bellardi*. Allion.

*Saxifraga acutis, foliis subrotundis, repandis; flore sessili.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 645. n°. 16.

*Saxifraga* (Bellardi), acutis; foliis cuneiformibus, trilobis & quinquelobis. Allion. Flor. pedem. n°. 1536. tab. 88. fig. 1.

Cette espèce, très-remarquable par sa petitesse & par ses fleurs sessiles, sans tiges, forme sur la terre de petites rosettes de feuilles sessiles, cunéiformes, d'un vert-obscure, quelquefois à trois lobes; d'autres fois à cinq lobes obtus; celui du milieu beaucoup plus grand, velu.

Au centre de ces feuilles paroît une petite fleur, rarement deux ou trois, blanche, sessile, dont les pétales sont elliptiques. Les racines sont grêles, fibreuses, &c. produisent un grand nombre de ces petites rosettes, qui forment par leur ensemble un gazon touffu & serré.

Cette plante croît dans le Piémont, sur les rochers humides, parmi les mousses. x

30. SAXIFRAGE de la Daourie. *Saxifraga daourica*. Willd.

*Saxifraga folio cruciformi-rhombis, apice dentatis, glabris, petiolatis; caule nudo.* Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 645. n°. 17.

*Saxifraga pandata.* Pallas, Itin. 3. Append. n°. 91. tab. P. fig. 2.

Cette plante a des tiges droites, nues, cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétioles, glabres à leurs deux faces, presque cunéiformes & un peu rhomboidales, rétrécies à leur partie inférieure, presque anguleuses à leur partie supérieure, dentées vers leur sommet. Les corolles sont légèrement ponctuées.

Cette espèce se rencontre dans les contrées les

plus septentrionales de l'Europe, sur les hautes montagnes de la Daurie, presque sous la neige. 2.

31. SAXIFRAGE ponctuée. *Saxifraga punctata*. Linn.

*Saxifraga foliis subrotundis, densatis, longis petiolatis; caule nudo.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 574. — Mill. Dict. n°. 7. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 646. n°. 19. — Georg. Iter, pag. 521.

*Sedum bicorne, ferratum, pallidioris folio rotundior; floribus punctatis.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 478. §. 12. tab. 9. fig. 17.

Cette espèce est d'un aspect élégant & agréable par ses fleurs, petites à la vérité, mais ponctuées de rouge sur un fond blanc; distinguée de quelques autres espèces par ses feuilles un peu arrondies, incisées à leur contour en dents aiguës.

Ses racines produisent un grand nombre de feuilles radicales, étendues en rosettes sur la terre, pétiolées, un peu ovales ou arrondies, d'un vert-pâle, point cartilagineuses à leurs bords, glabres à leurs deux faces, presque incisées à leur contour, ou munies de dents anguleuses, très-aiguës, point émoussées à leur sommet, supportées par des pétioles lisses, presque trois fois aussi longs que les feuilles, insensiblement élargis vers leur sommet.

Les tiges s'élèvent du centre des feuilles à environ huit à dix pouces & plus de haut; elles sont roides, simples, cylindriques, un peu velues, dépourvues de feuilles, quelquefois de couleur purpurine, soutenant une petite panicule lâche, rameuse, peu garnie de fleurs, dont les pédoncules sont courts, inégaux, pubescents; les fleurs petites; le calice court; à cinq découpures; la corolle d'un blanc de lait, marquée de taches rougeâtres; les pétales étroits, lancéolés, aigus; les étamines un peu plus longues que la corolle; les pistils de même longueur que les étamines; les stigmates ordinairement un peu rougeâtres; la capsule allongée, terminée par deux pointes réfléchies en dehors.

Cette espèce croît dans la Sibirie. Quelques auteurs pensent qu'on la rencontre aussi dans les Alpes. 2.

\*\* Feuilles entières, tiges feuillées.

32. SAXIFRAGE à feuilles opposées. *Saxifraga oppositifolia*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis ovatis, quadrifariam imbricatis, oppositis; summis ciliatis; flore subsolitario, terminali.* (N.)

*Saxifraga foliis caulinis ovatis, oppositis, imbricatis; summis ciliatis.* Linn. Syst. Plant. pag. 413. n°. 20. — Flor. suec. 159. 369. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 168. — Mill. Dict. n°. 11. — Gunn.

Norr. 53. — Oeder. Flor. dan. 34. — Hohenwarth & Reinar, Iter 1. pag. 133. tab. 3. — Vahl, in Act. Hist. Nar. 2, 1. pag. 31. — Allion. Flor. pedem. n°. 1529. tab. 21. fig. 3. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 424. n°. 10.

*Saxifraga (oppositifolia), foliis confertis, ovatis, ciliatis, oppositis; flaminibus & pistillis corollâ brevioribus.* Lapeyr. Saxifr. pag. 36. n°. 14. tab. 16.

*Saxifraga imbricata.* Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 531. n°. 1133. XXVI.

*Saxifraga caulibus repensibus, furculiferis; foliis obovatis, margine leproso-cartilagineis ciliatisque; furculorum quadrifariam imbricatis, peduncularum oppositis.* Wulfen, in Jacq. Coll. 2. pag. 286.

*Saxifraga foliis ovatis, quadrangulo-imbricatis; ramis procumbentibus.* Flor. lappon. 179. tab. 2. fig. 1.

*Saxifraga caule repente; foliis quadrifariam imbricatis, cartilagineis, ciliatis.* Hall. Helv. n°. 980.

*Sedum alpinum, ericoides, purpurascens.* C. Bauh. Pin. 284. — Idem, Prodr. 132. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 480. §. 12. tab. 10. fig. 36.

*Saxifraga alpina, flore caruleo.* Scheuchz, Iter 2. pag. 140. tab. 20. fig. 3.

*Saxifraga alpina, ericoides; flore purpurascens.* Tourn. Inst. R. Herb. 253.

*Sedum montanum, ericoides.* C. Bauh. Prodr. 132.

*Saxifraga alpina, ericoides; flore caruleo.* Tourn. Inst. R. Herb. 253.

*Sedum alpinum ericoides, caruleum.* C. Bauh. Prodr. 132. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 694. Icon.

3. *Saxifraga (biflora), caulibus repensibus, furculiferis; foliis amplexifolius, obovatis, ciliatis; furculorum rariter imbricatis; pedunculis subsistis; calicinis segmentis, ovato-obtusis; petalis lanceolatis.* Hohenwarth & Keiner, Iter 1. pag. 138. tab. 2. fig. 2.

*Saxifraga foliis imbricatis, ovatis; caulibus repensibus, bifloris.* Hall. Helv. n°. 981.

*Saxifraga (biflora), foliis obovatis, oppositis, distantibus; corollâ & pistillis, calicem & stamina duplo superantibus.* Lapeyr. Saxifr. pag. 37. n°. 15. tab. 17.

4. *Saxifraga (retusa), propaginibus prostratis; foliis oppositis, quadrifariam imbricatis, punctatis, triquetris, acutis, plano exstantibus; floribus terminalibus geminatis.* Gouan, Illustr. 28. tab. 18. fig. 1.

*Saxifraga (retusa), foliis imbricatis, acutis, trigonis, basi ciliatis; pistillis & flaminibus exsertis.* Lapeyr. Saxifr. pag. 38. n°. 16. tab. 18.

*Saxifraga (purpurea)*. Allion. Flot. pedem. n°. 1531. tab. 21. fig. 2.

*Varietas sterilis*. Gefner. Fasc. 26. tab. 9. fig. 3.

De petites feuilles sessiles, ovales, disposées par imbrication sur quatre rangs très-serrés sont le caractère qui stappe le plus dans cette espèce, & la rend très-facile à distinguer de toutes ses congénères. Plusieurs auteurs ont cru reconnoître deux ou trois espèces, soit dans le nombre, soit dans la couleur des fleurs, & dans les légères différences de la disposition des feuilles: ce sont à peine des variétés fort peu tranchées, qui n'ont rien de constant, & qu'on retrouve souvent sur le même individu, ainsi que je m'en suis assuré par moi-même, en ayant observé un grand nombre. Cependant M. Lapeyrouse, qui a étendu plus loin son travail, y a reconnu, surtout dans les proportions des parties de la fructification, des caractères qui lui ont paru suffisants pour ne laisser aucun doute sur ces trois espèces. On peut consulter à ce sujet son bel ouvrage sur les saxifragées.

Ses tiges sont dures, presque ligneuses; elles poussent un très-grand nombre de tiges toutes étendues sur la terre, où elles forment un gazon dense, longues d'un à trois ou quatre pouces, courbées, dans presque toute leur longueur, de feuilles extrêmement petites, sessiles, ovales, épaisses, presque tuberculées, entières, légèrement cartilagineuses à leurs bords, obtuses, d'un vert-foncé, très-rapprochées les unes des autres, & imbriquées sur quatre faces; fort souvent les supérieures & terminales sont simplement opposées, ciliées à leur contour, particulièrement à leur base.

Les fleurs sont terminales, sessiles, solitaires ou géminées, quelquefois même au nombre de trois; leur calice divisé en cinq découpures ovales, obtuses; la corolle purpurine dans sa jeunesse, prenant ensuite une couleur bleuâtre; les pétales linéolés, aigus; la capsule ovale, remarquable par deux pointes allongées, très-aiguës.

Cette plante croît sur toutes les montagnes alpines, dans la Suisse, les Pyrénées, au Spitzberg, dans la Laponie; elle se rencontre également dans les départements méridionaux de la France. (V. f.)

*Observations*. M. Lapeyrouse a établi, pour les trois plantes citées dans cet article, les différences suivantes:

1. *Saxifraga à feuilles opposées*. Tiges; gazons avec ou sans des rejets pendans; 5 milles ovales, aiguës, garnies de cils spinuliformes; une corolle grande & inférieure; des pétales onguiculés, arrondis, deux fois plus grands que le calice, plus longs une fois que les étamines & les pistils; le limbe réfléchi; les étamines égales aux pistils, renfermées dans la corolle.

2. *Saxifraga biflore*. Tiges nues, diffuses, grêles, tortueuses; feuilles arrondies, couvertes de poils glanduleux; une corolle médiocre & inférieure; les pétales droits, linéaires, obtus, deux fois plus grands que le calice, égaux aux pistils, plus longs que les étamines; celles-ci plus courtes que les pistils.

3. *Saxifraga étalée*. Tiges rampantes & rameuses; feuilles aigues, trigones, glabres, ciliées à leur base, poreuses en dessus; la corolle médiocre & supérieure; les pétales onguiculés, aigus, étalés, un peu plus grands que le calice, plus courts que les étamines & les pistils; les étamines égales aux pistils, saillantes hors de la corolle.

33. SAXIFRAGE de Magellan. *Saxifraga magellanica*. (N.)

*Saxifraga caulis capitis, procumbentibus; foliis linearibus, confertissimis, glabris; ramis floriferis, nudis, axillaribus, brevissimis, unifloris*. (N.)

Ses racines produisent un grand nombre de tiges courtes, étendues en gazons sur la terre, chargées dans leur longueur de beaucoup de feuilles entières, réunies par paquets, glabres, linéaires, obtuses, très-entières. Les tiges le divisent quelquefois presque dès leur base en rameaux courts, de même forme, également garnis de feuilles longues de deux à trois lignes.

Les fleurs sont solitaires sur d'autres petites rameaux ou sur des pédoncules axillaires, nus, simples, très-courts, terminés par une seule fleur, dont le calice est glabre, divisé en cinq découpures linéaires, obtuses. La corolle est une fois plus longue que le calice.

Cette plante a été recueillie au détroit de Magellan par Commerçon. (V. f. in herb. Lam.)

34. SAXIFRAGE à fleurs jaunes. *Saxifraga hirculus*. Linn.

*Saxifraga foliis caulibus lanceolatis, alternis, nudis, inermibus; caule erecto*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 576. — Flor. fucc. n°. 370. — Flor. dan. tab. 100. — Gmel. Sibib. vol. 4. pag. 165. fig. 3. — Weber. Spicil. Flor. Goett. pag. 13. — Hoff. Germ. 144. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 184. — II. 468. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 649. n°. 26.

*Saxifraga flava*. Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 529. n°. 1113. XXII.

*Saxifraga foliis ellipticis, caule unifloro*. Hall. Helv. n°. 972. tab. 11.

*Saxifraga angustifolia, autumnalis; flore lutea, guttata*. Breyn. Cent. 106. tab. 48.

*Hirculus* qui chamacisti genus. Clus. Cur. 5.



*Hirculus veterum*. ? Dalech. Hist. 1. pag. 925. Icon. Sine flore.

*Chamaecissus friscus, foliis nardi celtica*. C. Bauh. Pin. 466.

*Geum palustre, luteum, bicorne, nardi celtica similis*. Morif. Oxon. II. lib. 3. pag. 477. §. 12. tab. 8. fig. 5. 2. *Caulis multiflori*.

*Hirculus*. ? Plin. Hist. Nat. lib. 12. cap. 12.

Cette plante approche beaucoup du *Saxifraga autumnalis*, mais les feuilles sont plus larges, point ciliées; ses tiges plus élevées, bien moins garnies de fleurs, ordinairement d'une à deux; la corolle plus grande. La plupart des anciens botanistes s'accordent à la regarder comme la même plante mentionnée dans Pline sous le nom d'*hirculus*. Linné lui-même paroît être de cet avis, d'après le nom spécifique qu'il lui a donné, & la synonymie qu'il y rapporte, & que j'ai citée en partie d'après lui; cependant on ne peut disconvenir qu'il ne reste beaucoup d'incertitudes sur l'identité de cette plante avec celle de Pline, à laquelle il attribue une légère odeur de bouc; ce que je n'ai pu vérifier, n'ayant vu cette plante que sèche. La figure donnée par Morifon la représente avec un plus grand nombre de fleurs qu'elle n'en a ordinairement.

Ses racines sont dures, épaisses, noires, fibreuses; il s'en élève une tige simple, feuillée, droite, quelquefois un peu purpurine, haute d'environ un pied, un peu velue à sa partie supérieure. Les feuilles radicales & inférieures sont éparfes, sessiles, serrées, lancéolées, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies presque en pétiole à leur base, glabres à leurs deux faces, point ciliées; les feuilles caulinaires alternes, plus étroites, sessiles.

Les fleurs sont terminales, souvent solitaires, quelquefois au nombre de deux ou trois; ce qui donne des doutes sur la synonymie de Morifon, qui représente cette plante avec quatre à cinq fleurs longuement pédonculées. Le calice est partagé en cinq découpures ovales, réfléchies sur le pédoncule. La corolle est grande, d'un assez beau jaune; les pétales élargis, marqués de quelques lignes brunes & de points ou de taches de même couleur.

Cette plante croît aux lieux humides, sur les montagnes des départemens méridionaux de la France, en Suisse, en Italie, dans l'Allemagne, la Sibérie, la Lapponie. 2. (V. f. in herb. Lam.)

35. SAXIFRAGE aizoïde. *Saxifraga aizoides*. Linn.

*Saxifraga foliis caulibus linearibus subulatis, sparsis, nudis, intermixtis; caulibus decumbentibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 576. — Willch. Illustr. n. 25. — Gunn. Norveg. n. 541. — Weder. Flor. dan.

tab. 72. — Flor. suec. n. 471. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 650. n. 27. — Gouan, Monsp. pag. 209. n. 3. — Gerard, Flor. gall. Prov. p. 415. n. 9.

*Saxifraga foliis linearibus, sparsis, glabris*. Flor. suec. n. 357.

*Saxifraga foliis subulatis, sparsis*. Flor. lapp. 178.

*Saxifraga autumnalis*, var. 2. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 530. n. 1113. XXIV.

*Sedum alpinum, flore pallido*. C. Bauh. Pin. 284. — Magn. Botan. Monsp. 235. — Tourn. Inst. R. Herb. 263. — Garid. Aix. 438. *Excluso icon.*

*Sedum minus sextum, five alpinum*. Cluf. Hist. 2. pag. 60. Icon.

*Sedum parvum, montanum, luteum*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 693. Icon.

*Sedum alpinum primum, flore pallido*. Cluf. Pann. pag. 484. tab. 485. — Morif. Oxon. Hist. 3. p. 477. §. 12. tab. 6. fig. 3.

Cette espèce a de tels rapports avec le *Saxifraga autumnalis*, que plusieurs auteurs ne la regardent que comme une variété; elle en est distinguée par ses tiges plus basses, par ses feuilles plus étroites, point ciliées à leurs bords; par sa corolle à peine plus longue que le calice.

Ses racines sont grêles, roussâtres, & poussent quelques rejets courts, d'où s'élèvent des tiges hautes de quatre à cinq pouces, foibles, cylindriques, feuillées, légèrement pubescentes, simples ou un peu rameuses, garnies de feuilles alternes, dissuses, sessiles, étroites, linéaires, un peu subulées ou obuses à leur sommet, médiocrement charnues, glabres à leurs deux faces, entières, longues d'un demi-pouce, ordinairement point ciliées à leurs bords; quelques-unes cependant offrent des cils très-courts, rares, à peine sensibles; les feuilles inférieures très-rapprochées, confuses, un peu plus larges.

Les fleurs sont peu nombreuses, de trois à cinq; situées vers l'extrémité des tiges, supportées par des pédoncules allongés, pubescens, axillaires, quelquefois feuillés, un peu réfléchis après la floraison. Le calice est glabre, à cinq découpures ovales, un peu larges, ouvertes, presque aiguës. La corolle est d'un jaune-pâle, marquée de points oranges, à peine plus longue que le calice, presque supérieure à l'ovaire; les pétales allongés, aigus, marqués de quelques taches jaunâtres.

Cette plante croît dans les montagnes alpines, aux lieux humides, & dans les départemens méridionaux de la France. 2. (V. f.)

16. SAXIFRAGE d'automne. *Saxifraga autumnalis*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis linearibus, alternis, ciliatis, radicalibus aggregatis.* Linn. Spec. Plant. pag. 575. — Miller, Dict. n°. 10. — Jacq. Vind. 37. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 493. tab. 14. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 530. n°. 1113. XXIV. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 650. n°. 18.

*Saxifraga foliis ellipticis, ciliatis; caule simpliciter, folioso, pauciflora.* Haller, Helv. n°. 971.

*Geum autumnalis.* Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 424. n°. 1.

*Sedum alpinum, floribus luteis, maculosis.* C. Bauh. Pin. 284.

*Geum angustifolium, autumnale, flore luteo, guttato.* Tournef. Inst. R. Herb. 232. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 477. §. 12. tab. 8. fig. 6.

*Sedum montanum, pulchrum.* Con. Gefn. Op. post. tab. ultim. fig. accell.

Cette plante, quoique très-voisine du *saxifraga hirculus*, s'en distingue aisément par ses tiges moins hautes, par ses feuilles plus étroites, ciliées à leurs bords; par ses fleurs plus petites, plus nombreuses; elle se rapproche davantage encore du *saxifraga aizoides*, mais cette dernière a ses feuilles entièrement glabres, sa corolle courte.

Ses racines se divisent en longs rejets rampans, grêles, roussâtres, d'où s'élèvent des tiges droites, un peu couchées à leur partie inférieure, un peu velues, cylindriques, hautes de sept à huit pouces, presque simples, garnies de feuilles fasciculées à la base des tiges, éparfes, alternes, sessiles dans la longueur de ses mêmes tiges, oblongues, linéaires, obtuses & légèrement mucronées à leur sommet, glabres à leurs deux faces, un peu grasses, d'un vert-foncé, ciliées à leurs bords.

Les fleurs sont presque solitaires, ou réunies deux ou trois sur de petits rameaux ou des pédoncules feuillés, axillaires, un peu velus, filiformes, médiocrement inclinés. Les calices sont glabres, de couleur verte, à cinq découpures ovales, obtuses, plus courtes que la corolle: celle-ci est jaune, supérieure, une fois plus grande que le calice; les pétales lancéolés; les capsules ovales, à deux cornes.

Cette plante croît le long des ruisseaux, dans les départements méridionaux de la France, en Suisse, dans les Alpes. (V. f.)

*Observations.* Je possède quelques individus de cette plante, recueillis en Suisse, qui n'ont pas deux pouces de haut, & dont les tiges ne supportent que deux ou trois fleurs; ils ressemblent d'ailleurs parfaitement à la plante que je viens de décrire. On cite encore une variété à fleurs purpurines que je ne connois pas, mais qui mérite un examen attentif, d'autant mieux qu'il est rare de voir de semblables variétés, à moins que les co-

rolles ne soient mélangées d'abord de ces deux couleurs.

37. SAXIFRAGE à feuilles rondes. *Saxifraga rotundifolia.* Linn.

*Saxifraga foliis caulinis reniformibus, dentatis, petiolatis; caule paniculato.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 576. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 162. — Miller, Dict. n°. 5, & Icon. tab. 141. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 488. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 531. n°. 1113. XXVIII. — Gouan, Monsp. pag. 209. n°. 4. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 651. n°. 29. — Bull. Herb. franç. tab. 327.

*Saxifraga foliis reniformibus, acutis serratis, hirsutis, petiolatis; caule ramoso.* Hall. Helv. n°. 975.

*Saxifraga foliis reniformibus, acutis crenatis; caule ramoso, folioso.* Hort. Cliff. 167. — Royen, Lugd. Bat. 453.

*Geum rotundifolium, majus.* Tournef. Inst. R. Herb. 251.

*Geum rotundifolium.* Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 225. n°. 3.

*Sanicula montana, rotundifolia, major.* C. Bauh. Pin. 243.

*Sedum flore albo, guttato, five sanicula montana, &c.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 477. §. 12. tab. 8. fig. 10.

*Sanicula alpina.* Camer. Epitom. 764. Icon. — Gefn. Fascicul. 19. tab. 10. fig. 15.

*Sanicula alpina, guttata.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 707. Icon.

*Sanicula montana grima.* Clus. Pann. pag. 439. tab. 40. — Idem, Hist. 307. Icon.

*Caryophyllata, five geum alpinum recensiorum, folio hederaceo.* Lobel. Icon. 613. Mala quoad tenuitatem.

*Caryophyllata, five geum alpinum pena.* Dalech. Hist. 1. pag. 687. Icon.

*Confer cum coryleone tertium Dalechampi.* Dalech. Hist. 2. pag. 1322. Icon.

La forme des feuilles, la disposition des fleurs, rapprochent singulièrement cette espèce du *saxifraga geum* & du *saxifraga hirsuta*; il est aisé de la distinguer de toutes deux par les tiges feuillées.

Ses racines sont grêles, dures, un peu fibreuses, de couleur brune; elles produisent des tiges droites, hautes d'environ un pied, cylindriques, fistuleuses, un peu striées & comprimées à leur partie supérieure, chargées de poils courts & distans, garnies de feuilles longuement pétiolées, réniformes, médiocrement velues, vertes en dessus, plus pâles ou blanchâtres à leur face inférieure, bordées de grandes crénelures ou de dents

assez

affez larges, dont la pointe est souvent glanduleuse & rougeâtre, ciliées à leur contour, portées sur des pétioles comprimés, velus, un peu glanduleux.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges, en une panicule lâche, dont les ramifications sont filiformes, pubescentes, médiocrement rameuses, munies de petites bractées subulées. Le calice se divise en cinq découpures ovales, aiguës. La corolle est blanche, inférieure; les pétales lancéolés, aigus, marqués de points rougeâtres; les capsules ovales, terminées par deux longues pointes aiguës.

Cette plante croît en Suisse, dans les Alpes, & sur les montagnes des départements méridionaux de la France. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

\*\*\* Feuilles lobées; tiges droites.

38. SAXIFRAGE granulée. *Saxifraga granulata*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis reniformibus, lobatis; caule ramoso, radice granulata.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 176. — Hort. Cliff. 167. — Flor. suec. 350. 372. — Mater. medic. 116. — Royen, Lugd. Bat. 453. — Pollich. Pal. n. 402. — Miller, Ill. Icon. — Coder. Flor. dan. tab. 514. — Blackw. tab. 56. — Ludw. Eft. tab. 120. — Kniph. Cent. 1. n. 80. — Berger. Phytogr. 2. pag. 47. Icon. — Curtis, Lond. Icon. — Hoffm. Germ. 145. — Roth. Germ. 1. pag. 184. — Il. 468. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 532. n. 1113. XXIX. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 341. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 651. n. 30. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 412. n. 2. — Gouan, Monip. pag. 210. n. 5. — Lam. Illustr. Gener. tab. 372. fig. 1.

*Saxifraga foliis radicalibus reniformibus, obtusif dentatis; caulinis palmatis.* Hall. Helv. n. 976.

*Saxifraga rotundifolia, alba.* Tournef. Inst. R. Herb. 252. — C. Bauh. Pin. 309. — Dodart. Icon. — Schaw. Specim. n. 527. — Garidel, Aix. pag. 428.

*Saxifraga alba.* Dodon. Pempt. 316. Icon. — Trag. 535. Icon. — Gerard, Hist. 841. Icon.

*Saxifraga alba Fuschii, seu Saxifraga quarta Martialis.* Dalech. Hist. 2. pag. 1113. Icon.

*Saxifraga alba chelidonioides.* Lobel. Icon. 612. — Idem, Observ. pag. 355. Icon.

*Saxifraga quarta.* Camer. Epitom. 719. — Matth. Comm. 694. Icon.

*Saxifraga major & alba.* Fusch, Hist. 747. Icon.

*Saxifraga alba, bulbifera.* Parkinson, Theatr. 424. Icon.

Botanique. Tome VI.

*Saxifraga alba, radice granulosa.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 706. Icon.

*Sedum rotundifolium, erectum, radice granulosa.* Morif. Oxon. 5. 12. tab. 9. fig. 23. — Gess. Icon. Lign. tab. 17. fig. 146. \*

Outre les petits tubercules nombreux qui garnissent les racines de cette plante, les feuilles réniformes, divisées en petits lobes à leur contour, & les grandes fleurs blanches, constituent le caractère distinctif de cette espèce.

Ses racines sont composées de fibres rougeâtres, déliées, munies d'un grand nombre de petites bulbes arrondies, serrées, rapprochées par paquets; elles produisent des tiges droites, cylindriques, simples ou médiocrement rameuses, hautes au moins d'un pied, peu feuillées, rudes, légèrement velues, d'un vert pâle, quelquefois divisées, vers leur partie supérieure, en rameaux étalés, nus, alongés. Les feuilles inférieures sont longuement pétioolées; les caulinaires en petit nombre, élargies, en forme de rein à leur base, à grandes crénelures ou en lobes irréguliers à leur contour, vertes à leurs deux faces, un peu velues; les feuilles supérieures presque sessiles, profondément incisées, presque palmées.

Les fleurs forment, vers l'extrémité des tiges, une panicule lâche, étalée, médiocrement rameuse; les rameaux alongés, quelquefois unifiés ou divisés en pédoncules courts, inégaux, chargés de poils courts, un peu glanduleux & visqueux. Le calice offre les mêmes caractères; il est d'un vert foncé, divisé, jusque vers sa moitié, en cinq découpures ovales, oblongues, obtuses. La corolle est grande, entièrement blanche, composée de cinq pétales en ovale renversé, obtus à leur sommet, marqués de veinules verdâtres, renfermant dix étamines persistantes, deux styles, dont les stigmates sont capités.

Cette plante croît communément en Europe, dans les bois taillis. (V. v.)

Observations. M. Desfontaines, qui a recueilli cette espèce au mont Atlas, a observé quelques variétés remarquables, telles que les feuilles caulinaires sessiles ou pétioolées, ovales ou flabelliformes; les supérieures entières & presque linéaires dans certains individus; les tiges très-velues; les feuilles caulinaires profondément dentées dans d'autres; enfin les corolles une fois plus petites dans quelques autres.

La saxifrage étoit renommée chez les Anciens par ses propriétés diurétiques; mais il n'est pas très-certain que celle dont je viens de parler soit la même plante. Elle a peu de saveur; elle est d'abord douceâtre, puis amère, un peu âcre & astringente. Les bestiaux n'en veulent point, excepté les vaches, qui la mangent quelquefois.

SSS

39. SAXIFRAGE bulbifère. *Saxifraga bulbifera*. Linn.

*Saxifraga foliis palmato-lobatis; caulinis fissilibus; caule ramofo, bulbifero*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 577. — Gunn. Norv. n°. 1066. — Oeder. Flor. dan. tab. 390. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 651. n°. 31.

*Saxifraga ad folia bulbos gerens*. C. Bauh. Pin. 309. — Tournef. Inst. R. Herb. pag. 352.

*Saxifraga bulbosa, altera, bulbifera, montana*. Colum. L'eph. 1. pag. 318. tab. 317.

*Scelum bicorne, rotundifolium, erectum; radice granulata, & ad caulem tubercula proferens*. Morit. Oxon. Hist. 3. pag. 474. §. 12. tab. 9. fig. 24.

Il est douteux que cette plante soit réellement une espèce distincte de la précédente, avec laquelle elle a les plus grands rapports, & dont elle ne diffère que par les petites bulbes qui croissent dans l'aisselle de ses pédoncules, & par quelques légères différences dans la forme de ces mêmes feuilles.

Ses racines sont remarquables par la disposition particulière de leurs bulbes ; elles ne sont point par paquets inégaux, épais, comme celles du *saxifraga granulata*, mais les unes sont rapprochées autour du collet de la racine, où elles forment presque une seule bulbe, composée de beaucoup d'autres petites, un peu comprimées, ovales, aiguës, se recouvrant par imbrication ; la partie inférieure offre un amas de quelques autres petites bulbes arrondies, d'où sortent plusieurs fibres grêles, allongées. Les tiges sont droites, épaisses, velues, moins élevées, rameuses à leur partie supérieure ; les rameaux presque ombellés. Les feuilles caulinaires & les inférieures sont pétiolées, arrondies, à peine échancrées en rein à leur base, entourées de crénelures profondes, obtuses, irrégulières ; les feuilles caulinaires supérieures sessiles, crénelées, incisées, dentées ou légèrement palmées, velues, ciliées à leurs bords, portant dans leurs aisselles de petites bulbes arrondies.

Les rameaux sont terminés par des fleurs presque solitaires ou médiocrement paniculées, presque sessiles ou supportées par des pédoncules courts, pubescens, munis également de petites bulbes axillaires. Leur calice est à cinq découpures presque droites, un peu obtuses, pubescentes, un peu glutineuses. La corolle est blanche, assez grande, supérieure, à cinq pétales obtus, point tachetés ; les étamines jaunâtres, persillantes ; les capsules ovales, un peu obtuses, terminées par deux fortes pointes allongées, écartées.

Cette plante croît en Italie, sur les montagnes, dans les lieux pierreux & ombragés. On la rencontre également dans la Norvège ; elle n'est, selon Segui (Plant. veron. vol. 1. pag. 207), qu'une variété du *saxifraga granulata*. ♀

40. SAXIFRAGE à fleurs penchées. *Saxifraga cernua*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis palmatis, petiolatis; caule simplicissimo, unifloro, bulbifero*. Linn. Syst. veget. pag. 413. n°. 29. — Oeder. Flor. dan. tab. 22. — Gunn. Norv. n°. 528. tab. 8. fig. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 652. n°. 32.

*Saxifraga foliis palmatis, caule simplici, unifloro*. Linn. Flor. lappon. 172. tab. 2. fig. 4. — Flor. Cliffort. 167. — Flor. suec. 351. 373.

§. *Saxifraga foliis reniformibus, acutis, digitatis; caule ramofo, folioso*. Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 165. n°. 74.

Cette espèce a d'un côté quelques rapports avec le *saxifraga hibernica* par son port ; elle en a encore davantage, par ses bulbes, avec les deux espèces précédentes ; peut-être même pourroit-on rigoureusement les considérer comme trois variétés ; cependant, comme elles ont chacune leur lieu natal particulier, que leurs différences paroissent constantes, il vaut mieux, en attendant un plus ample examen, les séparer, ainsi que l'a fait Linné.

Celle-ci a ses racines chargées de petites bulbes, comme le *saxifraga granulata*. Ses tiges sont droites, simples, feuillées, médiocrement velues, garnies de feuilles alternes, toutes pétiolées, vertes à leurs deux faces, glabres, un peu échancrées en rein à leur base, assez fortement palmées, ou profondément incisées ou lobées à leur contour, munies, dans leurs aisselles, de petites bulbes à peine de la grosseur & de la forme des semences de la cotinandre.

Les fleurs sont penchées, blanches, solitaires à l'extrémité des tiges, presque à demi-inférieures, assez ressemblantes d'ailleurs, dans toutes leurs parties, à celles des deux espèces précédentes. Gmelin en a observé en Sibérie une variété dont les tiges sont rameuses, les feuilles reniformes, digitées, les digitations aiguës.

Cette plante est commune dans les hautes montagnes de la Laponie ; mais on n'y rencontre pas les deux autres espèces. ♀

41. SAXIFRAGE rivulaire. *Saxifraga rivularis*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis palmatis, summo florali ovato; caule simplici, subulifero*. Linn. Syst. veget. pag. 414. n°. 30. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 170. — Gunn. Norv. n°. 479. — Oeder. Flor. dan. tab. 118. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 652. n°. 33.

*Saxifraga foliis radicalibus quinquelobis, florali ovato*. Flor. lappon. 174. tab. 2. fig. 7. — Flor. suec. 352. 374.

*Saxifraga foliis palmatis, supremi cordato.* Acl. Uplal. 1735. pag. 55.

Ses racines sont fibreuses : il s'en élève une ou deux tiges grêles, filiformes, presque droites, très-glabres, petites simples, hautes de trois à quatre pouces. Les feuilles radicales sont longuement pétiolées, un peu échancrees à leur base, ovales à trois, d'autres à cinq lobes glabres, les unes ; les pétioles presque aussi longs que les tiges. Les feuilles caulinaires sont rares, toujours à cinq lobes ; la terminale & florale très-entière, ovale, médiocrement pétiolée.

Les fleurs sont terminales, d'une à deux, quelquefois plus, supportées par des péduncules simples, très-courts, pubescents, indigaux. La corolle est blanche, petite, les pétales ovales.

Cette plante croît dans les Alpes de la Lapponie, sur le revers de montagnes, le long des ruisseaux. ( *Descript. ex Linn.* )

42. SAXIFRAGE ladanifère. *Saxifraga ladanifera.* Lapeyr.

*Saxifraga foliis multilobis, integris ; petiolis campestribus, amplicaulibus ; floribus tubulosis, calicibus conicis.* Lapeyr. Saxifr. pag. 65. n°. 43. tab. 42.

1. *Eadem, minor, lobis omnibus trifidis ; scapo nudo, simplici ; floribus capitatis.* Lapeyr. L. c.

Cette saxifrage se rapproche beaucoup du *saxifraga geranioides* par son port & par les fleurs tubuleuses ; mais les divisions de son calice courtes, étroites, écartées, la consistance des feuilles, les pétioles comprimés & amplicaulaires, le filon dont toutes ses découpures sont marquées, éloignent cette espèce, d'après les observations de M. Lapeyroule, du *saxifraga geranioides*. Il faut y ajouter cette gomme d'un rouge-foncé, d'une odeur pénétrante & aromatique dont toute la plante, & particulièrement les feuilles, sont recouvertes par petits lacets.

Ses racines sont simples, ligneuses, rouffâtres, garnies de quelques fibres ; elles produisent des tiges frutescentes, rameuses, de couleur rougeâtre, hautes de huit à dix pouces. Les feuilles sont pétiolées, disposées par paquets, réfléchies dans leur jeunesse, d'un vert-foncé ; divisées en plusieurs lamères, de trois à sept, très-entières, lancéolées ou linéaires, obtuses, quelquefois aiguës : celle du milieu, toujours très-écartée, manque quelquefois ; les deux latérales sont souvent bifides, ou muries d'une seule dent. Les pétioles sont grêles, longs, comprimés, marqués d'un filon longitudinal, qui règne également sur les découpures des feuilles.

Les fleurs sont petites, médiocres, un peu inclinées, de dix à quinze, disposées en panicules sur des hampes grêles, tortueuses, étalées, dont

les ramifications sont munies, à leur point d'insertion, de bractées foliées, simples ou à trois découpures écartées, linéaires, tubuleuses. Le calice est conique, à cinq découpures écartées, linéaires, aiguës, courtes, profondes. La corolle est blanche, étalée ; les pétales anguleux, obtus, deux fois plus longs que le calice, marqués de trois ou cinq nervures. Les étamines sont droites, de la longueur du calice ; les anthères rondes, aplaties, de couleur jaune ; le pistil court ; un petit ombilic vert, luisant, visqueux. Les capsules sont fort petites.

Cette plante croît dans les Pyrénées, parmi les mousses, sur les rochers escarpés, & de grandes élévations. h ( *V. f. Lapeyr.* )

Nota. M. Lapeyroule prend pour les tiges ce que l'on considère dans plusieurs espèces comme les fouches des racines, & pour hampe ce que l'on regarde comme de véritables tiges.

43. SAXIFRAGE à feuilles de géranium. *Saxifraga geranioides.* Linn.

*Saxifraga foliis radicalibus reniformibus, quinquelobis, multifidis ; caulibus linearibus ; caule sabundo, ramofo.* Linn. Syst. veget. pag. 414. n°. 31. — Amoenit. Acad. vol. 4. pag. 271. — Gmel. Sibir. vol. 4. pag. 171. n°. 85. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 652. n°. 34.

*Saxifraga foliis radicalibus reniformibus, quinquelobis, multifidis ; petiolis simplicibus, floribus tubulosis, calicibus urceolatis.* Lapeyr. Saxifr. pag. 66. n°. 44. tab. 43.

*Saxifraga pyrenaica, tridactylites, latifolia.* Tournef. Herb. & Infl. R. Herb. 253.

*Saxifraga quinquefida.* Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 535. n°. 1115. XXXII.

*Saxifraga foliis radicalibus palmato-quinquelobis, trifidis, lateralibus caulescentibus ; ramis subulatis, laciniis calicinis ailatatis.* Gouan, Ill. 28. tab. 18. fig. 2.

1. *Eadem, rigidior, viscosa & odorata.* Lapeyr. L. c.

*Scdum ex Cantabria montibus, circa cenobium Aranzu & saxifraga cantabrica, latifolia, tridactylites, rigidior.* Tournef. Herb. & Infl. R. Herb. 253.

2. *Eadem, scapo simplici, nudo ; floribus capitatis.* Lapeyr. L. c.

3. *Eadem, foliis pellucidis, brevissimis.* Lapeyr. L. c.

On distingue cette espèce à ses feuilles glabres, réniformes, à cinq lobes profonds, les supérieures linéaires, au prolongement des caïces après la floraison, à les fleurs blanches ; elle a quelque

resemblance avec le port de plusieurs espèces de *geranium*.

Ses tiges sont droites ou un peu couchées à leur base, grêles, souvent un peu rougeâtres, cylindriques, glabres ou légèrement pubescentes, peu garnies de feuilles, hautes de huit à dix pouces, presque simples. Les feuilles forment la plupart immédiatement du collet de la racine, ou sont disposées sur les jeunes pousses non fleuries; elles sont pétiolées, glabres, reniformes à leur base, profondément découpées en cinq lanières, ou bien en trois principales divisions, les deux latérales bifides, supportées par des pétioles grêles, longs d'un à deux pouces. Les feuilles caulinaires, peu nombreuses, sont courtes, sessiles, la plupart simplement trifides; les supérieures linéaires, entières. Ces tiges sont regardées comme des hampes dans l'ouvrage sur les saxifragas de M. Lapeyrouse.

Les fleurs sont grandes, tubulées, disposées en une panicule terminale, composée de rameaux partiels, axillaires, droits, étalés, supportant chacun de deux à trois ou quatre fleurs, dont les pédoncules sont allongés, inégaux, filiformes, pubescents, munis de bractées subulées. Les calices sont ovales, oblongs, coniques, visqueux, d'un vert-blanchâtre, divisés à leur orifice en cinq découpures linéaires, obtuses, qui se prolongent après la floraison. La corolle est blanche, supérieure; les pétales arrondis, obtus à leur limbe, marqués d'environ trois lignes verdâtres, munis de longs onglets; les anthères citrines, en cœur; les styles courts, droits; les stigmates simples; les capsules uniloculaires, s'ouvrant entre deux cornes aiguës & divergentes, entièrement renfermées dans le calice; les semences noirâtres, très-fines.

Cette plante croît dans les Pyrénées. On la rencontre également dans les départements méridionaux de la France. (V. f.)

Observations. Cette saxifrage, dit M. Lapeyrouse, varie beaucoup pour la hauteur, la direction, la ramification ou la simplicité des hampes, le nombre & la disposition des fleurs, la grandeur, la consistance, la figure des bractées, des feuilles; la découpure de leurs lobes, jamais dans les parties de la fructification. Toutes ces variétés se trouvent souvent dans la même touffe.

44. SAXIFRAGE palmée. *Saxifraga palmata*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis palmatis, nerviis, glandulosis; petiolis basi marginatis, floribus tubulosis*. Lapeyr. Saxifr. pag. 64. tab. 42.

A ne considérer que son port, dit M. Lapeyrouse, cette plante ne paroîtroit pas différer essentiellement du *saxifraga geranioides*; mais elle est beaucoup plus petite dans toutes les parties; elle ne s'élève qu'à deux ou trois pouces.

Sa racine est ligneuse, forte, profonde & pivotante; les feuilles petites, planes, épaisses, sans nervures, à cinq lobes linéaires, obtus, entiers, munis souvent d'une dent à la base des deux lobes extérieurs; celui du milieu plus long; les pétioles allongés, bordés à leur base, dilatés à leur insertion.

Les fleurs forment une petite panicule lâche, garnie, à la base de ses divisions, de bractées entières. Les divisions du calice sont plus obtuses, plus linéaires que celles du *saxifraga geranioides*; les pétales lancéolés, plus aigus; les éamines plus longues que les piltis, réunies en faisceaux un peu en spirale. Toute cette plante est d'ailleurs couverte de glandes visqueuses, luisantes & comme argentées, entre-mêlées de poils ras & nombreux.

Cette espèce croît dans les Pyrénées, sur les roches escarpées & humides du Canigou; elle fleurit à la fin de l'été. Elle est peu commune. (V. Lapeyr.)

45. SAXIFRAGE à feuilles de bugle. *Saxifraga ajacifolia*. Linn.

*Saxifraga foliis radicalibus palmato-quinquepartitis; caulinis linearibus, indivisis; calicibus ascendentibus*. Linn. Curt. Plast. n°. 28. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 271. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 224. n°. 11. — Willd. n. Spec. Plant. vol. 2. pag. 653. n°. 35. — Lapeyr. Saxifr. pag. 56. tab. 31.

β. *Saxifraga capitata*. Lapeyr. Saxifr. pag. 55. tab. 30.

Cette plante a des tiges un peu couchées à leur base, ascendantes, filiformes, pubescentes, peu feuillées, produisant de sa racine des rejets velus avant l'apparition des feuilles: ces dernières sont presque toutes radicales, pétiolées, palmées, à trois ou cinq lobes, ou à cinq découpures profondes, glabres ou un peu velues, ovales, lancéolées; celles des tiges, à peine au nombre de deux ou trois, sont linéaires, très-simples, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges, au nombre de trois à cinq, soutenues par des pédoncules simples, alternes. Le calice enveloppe l'ovaire jusqu'à sa moitié. Les pétales sont blancs, une fois plus longs que le calice, oblongs, elliptiques.

Cette plante croît, d'après Linné, sur les montagnes des départements méridionaux de la France, dans la ci-devant Provence, dans les Pyrénées. (V. f.)

La plante β ne me paroît être qu'une variété de la précédente, dont les rameaux plus rapprochés forment presque une tête arrondie.

46. SAXIFRAGE spatulée. *Saxifraga spatulata*. Desfont.

*Saxifraga foliis spatulatis, obtusis, ciliatis, indivisis; pedicellis axillaribus, unifloris.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 342. tab. 96. fig. 2.

Cette plante pousse des tiges grêles, médiocrement rameuses, étendues sur la terre, où elles forment des gazons; longues de trois à quatre pouces & plus, garnies de feuilles alternes, très-fermées, nombreuses, petites, en forme de spatule, presque sessiles, souvent linéaires, verdâtres, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, ciliées à leur contour, rétrécies à leur base en un pétiole très-court.

Les tiges & les rameaux portent, vers leur sommet, des fleurs solitaires, dont les pédoncules sont courts, axillaires, filiformes, simples, uniflores. Les calices sont petits, divisés, jusque vers leur milieu, en cinq découpures ovales, ciliées, aiguës, persistantes. La corolle est blanche, petite, une fois plus longue que le calice; les pétales ovales, obtus à leurs deux extrémités; les étamines plus courtes que la corolle; les étamines jaunes, arrondies; les stigmates capités.

Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines en Barbarie, sur le sommet du mont Atlas, proche Bélide, où elle fleurit dans les premiers jours du printemps. (V. f.)

47. SAXIFRAGE de Sibérie. *Saxifraga sibirica*. Linn.

*Saxifraga foliis reniformibus, palmatis, pilosis; caule pedunculisque filiformibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 577. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 653. n°. 36.

Cette espèce diffère du *Saxifraga cernua* par le défaut de bulbes, par ses feuilles pileuses, par ses tiges bien plus délicates & constamment multiflores.

Ses racines sont capillaires; elles produisent des tiges ascendantes, très-grêles, filiformes, hautes de cinq à six pouces, presque simples, médiocrement feuillées. Les feuilles radicales sont pétioles, échancrées en rein à leur base, divisées à leur contour en main ou en sept lobes, couvertes de quelques poils rares, supportées par des pétioles velus; les feuilles caulinaires alternes, palmées, sessiles, au nombre de deux ou trois.

Les fleurs sont terminales & latérales, soutenues par de très-longes pédoncules filiformes, dépourvues de bractées, bifides à leur sommet. La corolle est d'une grandeur médiocre, de couleur blanche, placée sous l'ovaire.

Cette plante se rencontre dans la Sibérie. (Discription. ex Linn.)

48. SAXIFRAGE des rochers. *Saxifraga rupestris*. Willd.

*Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus, trilobis, dentatis, glanduloso-hirsutis; pedunculis unifloris, longissimis; caule ascendente, basi ramofo.* Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 653. n°. 37.

*Saxifraga (petraea), foliis petiolatis, palmato-tripartitis; laciniis subtrihatis; caule flaccido, ramossimo, decumbente; pedunculis longissimis, monophoriz petalis emarginatis.* Wulfen, in Jacq. Collect. 1. pag. 200. — Jacq. Icon. rar. 1. tab. 81. — Hoffm. Germ. 145.

Cette espèce se rapproche singulièrement de deux ou trois autres dont elle paroît être une espèce intermédiaire, particulièrement du *Saxifraga geranioides*, & du *Saxifraga petraea*; mais elle est également distinguée de toutes deux, ainsi que du *Saxifraga ascendens*, par son port, par la forme de ses feuilles, dont les lobes sont dentés; par ses fleurs, dont les pétales sont échancrés; par ses tiges foibles, très-rameuses; enfin par les poils glanduleux qui recouvrent plusieurs de ses parties.

Il s'élève, de ses racines, des tiges très-foibles, couchées à leur partie inférieure, redressées, & souvent inclinées à leur partie supérieure, très-rameuses à leur base, garnies de feuilles pétioles, palmées, à trois divisions très-profondes, chacune d'elles laciniée, à trois découpures environ; les feuilles caulinaires presque sessiles, cuneiformes, découpées en trois lobes velus, glanduleux & dentés en scie à leur contour.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des tiges & des rameaux, où elles forment une sorte de panicule lâche, supportées par de très-longes pédoncules axillaires, simples, solitaires, terminés par une seule fleur dont le calice est partagé en cinq découpures; la corolle composée de cinq pétales un peu échancrés à leur sommet.

Cette plante croît sur les montagnes en Allemagne, parmi les Alpes de la Carinthie. ☉

49. SAXIFRAGE tridactyle. *Saxifraga tridactylites*.

*Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus, trifidis, alternis; caule erecto, ramofo.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — For. succ. 353, 375. — Gunn. Norv. n°. 544. — Scop. Carn. 550. — Pollich. Pal. n°. 403. — Hoffmann, Germ. 146. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 184. — Il. 469. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 654. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 636. n°. 1113. XXXVIII. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 422. n°. 5. — Gouan, Monsp. pag. 210. n°. 6. — Curtis, Lond. tab. 129.

*Saxifraga foliis trifidis, basi angustatis; caule erecto.* Royen, Lugd. Bat. 457. — Sauvag. Monsp. 2:8.

*Saxifraga foliis omnibus trilobis, basi angustis; caule erecto.* Flor. lappon. 173. — Hort. Clifton. 168.

*Saxifraga foliis petiolatis, trilobatis; caule erecto, ramoso & folioso.* Haller, Helv. n°. 986.

*Paronychia rutaceo folio.* Blackw. tab. 112.

*Paronychia altera.* Dodon. Pempt. 113. Leon. Tertiz. Mediciensis.

*Sedum tridactylites testorum.* C. Bauh. Pin. 285. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 478. 8. 12. tab. 9. fig. 31. Hott.

*Saxifraga verna, annua, humilior.* Tourn. Infl. R. Herb. 152. — Seguier, Plant. veron. vol. 1. pag. 448.

*Tridactylites testorum, flore albo.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 762. Sine icen.

*Paronychia altera, rutaceo folio, Lobelii.* Dalech. Hist. 2. pag. 1214. lc.

*Paronychia tertia.* Tabern. pag. 805. lc.

C'est une petite plante qui paroît dès les premiers jours du printemps, & se rencontre très-communément sur les toits, les pelouses & les vieux murs; remarquable par ses feuilles cunéiformes, à trois lobes aigus; par ses petites fleurs blanches & ses pédoncules vilqueux.

Ses tiges sont droites, hautes de deux à cinq pouces, presque simples dans leur jeunesse, plus ou moins rameuses à mesure que leur végétation se développe; quelquefois un peu rougeâtres, chargées de poils courts, glanduleux; souvent les ramifications sont nombreuses, étalées, dissuses. Les feuilles sont toutes cunéiformes, médiocrement velues, vertes à leurs deux faces, élargies & divisées, à leur partie supérieure, en trois lobes inégaux, aigus ou quelquefois obtus, presque linéaires; celui du milieu plus alongé; les feuilles inférieures plus longues, rétrécies en pétiole à leur base, quelques-unes entières; les supérieures plus courtes, également trilobées; quelquefois les lobes latéraux bifides.

Les fleurs sont groupées à l'extrémité des tiges & des rameaux, supportées par des pédoncules filiformes, inégaux, alongés, pubescens, visqueux, très-simples, uniflores. Les calices sont chargés de poils courts & glanduleux, à cinq découpures droites, ovales, obtuses. La corolle est blanche, fort petite, à peine plus longue que le calice.

Cette plante croît partout en Europe, sur les vieux murs & dans les terrains arides. ☉ (P. v.)

On prétend que l'infusion de cette plante, dans la bière, est bonne dans la jaunisse. Dans certaines contrées, on la mange en salade quand elle est jeune.

50. *SAXIFRAGE des pierres. Saxifraga petraea.* Linn.

*Saxifraga foliis caulinis palmato-tripartitis; laciniiis subtriangis; caule ramosissimo, luxu.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — Gunn. Norw. n°. 427. tab. 9. fig. 1. 3. — Æder. Flor. dan. tab. 680. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 533. n°. 1113. XXXIII. var. 8.

*Saxifraga foliis cuneiformibus; radicalibus integris tridentatisque; caulinis quamquedentatis, superioribus trifidis; pedunculis subtrifloris.* Vahl, in Act. Hort. Nat. Hafn. 2. 1. pag. 167. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 654. n°. 39.

*Saxifraga tridactylites.* Var. 8. Linn. Spec. Plant. edit. t. pag. 404. — Flor. succ. 353. 375. — Flor. lappon. 173.

*Saxifraga (adscendens), caule erecto, firmo, foliisque subcoriaceis, cuneiformibus; apice tri aut quinquedentatis, villosis viscidis.* Wulfen, in Jacq. Collect. vol. 1. pag. 197. tab. 11. & tab. 12. fig. 1, 2.

*Saxifraga adscendens.* Allion. Flor. pedem. n°. 1537. tab. 22. fig. 3.

*Saxifraga hipnoides.* Scopul. Carn. edit. 2. n°. 499. tab. 16.

*Saxifraga (scopuli), foliis inferioribus integris, caulinis trifidis, caule suberecto.* Villars, Pro p. 47.

*Saxifraga foliis palmatis, caule densè folio & florifero.* Allion. Spéc. pedem. pag. 17. tab. 3. fig. 1.

*Saxifraga caule folioso, multifloro; foliis palmatis, hirsutis.* Haller, Helv. n°. 987.

*Sedum tridactylites, alpinum, caule folioso.* C. Bauh. Pin. 284.

*Saxifraga pyrenaica, tridactylites, latifolia.* Tournef. Inst. R. Herb. 215.

Cette espèce a presque les mêmes caractères que le *Saxifraga tridactylites*, mais bien plus en grand; la plupart des lobes de ses feuilles plus nombreux, ses fleurs bien plus grandes. Au reste, il y a bien de l'obscurité sur cette espèce, sur le *Saxifraga adscendens* & sur quelques autres voisines; obscurité qu'on doit moins attribuer aux auteurs qui en ont parlé, qu'aux variétés qui existent entre ces différentes espèces, & dont il est très-difficile d'assigner les limites: de là il résulte de très-grandes difficultés pour la synonymie, & pour donner de cette espèce une description complète, tant elle varie dans sa grandeur, dans la forme de ses feuilles, surtout dans leurs découpures, dans ses fleurs plus ou moins nombreuses.

Ses tiges sont un peu couchées à leur partie inférieure, redressées, ascendantes, hautes de



quatre à six pouces, assez fermes, chargées de rameaux nombreux, cales, munies de poils courts & visqueux. Les feuilles radicales & inférieures sont en assez grand nombre, larges, pétiolées, cunéiformes, palmées, plus souvent tridentées, incisées ou entières; les caulinares également cunéiformes, à trois lobes; les deux lobes latéraux souvent bides, un peu coriaces; velues & visqueuses; les supérieures plus étroites, seulement trifides.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges & des rameaux, d'où résulte de leur ensemble une panicule lâche; chaque pédoncule commun est chargé d'environ deux ou trois fleurs inégalement pédiculées, visqueuses, ainsi que les calices. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre, presque quatre fois plus grande que celle du *Saxifraga tridactylites*; les pétales ovales, obtus, rétrécis vers leurs onglets.

Cette plante croît sur les rochers, en Suisse, dans les Alpes, dans la Lapponie, la Norvège; elle se rencontre également sur les montagnes des départemens méridionaux de la France. (V. f.)

51. SAXIFRAGE ascendante. *Saxifraga ascendens*. Linn.

*Saxifraga foliis palmato-tripartitis; laciniis subtrifidis; caule ramoso, ascendente*. Vahl, in Acl. Hist. Nat. Hafn. 2, 1. pag. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 655. n°. 40.

*Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus, apice dentatis; caule ascendente, subvillosa*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 579. — Gouan, Monsp. 210.

*Saxifraga* (petraea), *foliis radicalibus palmato-quinquepartitis, lobis lateralibus cotulescentibus, multifidis; caule paniculato, laxo*. Gouan, Illustr. 29. tab. 17. fig. 3.

*Saxifraga* (decipiens). Ehrh. Beitr. 6. pag. 31. — Hloftm. Germ. 145.

*Saxifraga caule folioso, ramoso; foliis glabris, palmatis*. Haller, Helv. n°. 990.

*Saxifraga alba, petraea*. Pan. Bald. in Cjuf. Hist. 2. pag. 337.

*Sedum tridactylites, alpinum, majus album, primum*. ? C. Bauh. Prodrum. 131. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 79. 5. 12. tab. 9. fig. 28.

*Saxifraga alba, petraea pona*. Tournef. Inst. R. Herb. 252.

*Sedum tridactylites, alpinum majus, tertium*. C. Bauh. Prodr. 131. — Burf. XVI. 89.

*Sanicula aizoides, alpina, trifido folio, major, albo*. Pluken. Almag. pag. 331. tab. 222. fig. 3.

*Saxifraga aquatica*. Lapeyr. Saxifrag. pag. 53. tab. 28 & 29.

Cette espèce n'offre pas moins de difficulté que le *Saxifraga petraea*, avec laquelle elle a été confondue par quelques auteurs, mais dont elle est assez distincte par ses tiges beaucoup plus élevées, & dont les rameaux sont rapprochés des tiges & non diffus; les racines stolonières, les feuilles presque glabres, la plupart irrégulièrement lobées ou incisées, les fleurs plus grandes & plus nombreuses, moins longuement pédonculées.

Les tiges sont fortes, cylindriques, souvent un peu rougeâtres, pubescentes, visqueuses, courbées à leur base, redressées, ascendantes, roides, très droites, munies à leur partie supérieure de rameaux axillaires, droits, nombreux, rapprochés des tiges, presque fasciculés, presque simples. Les tiges poussent de leur base plusieurs jets garnis de feuilles nombreuses, diffusées, pétiolées, larges, palmées, la plupart à trois divisions profondes, cunéiformes, chacune d'elles découpées en plusieurs lobes irréguliers, ou incisées; ces feuilles varient dans leurs divisions; il en est d'entières, de très larges, terminées à leur sommet en huit ou dix crénelures courtes, ovales, inégales, presque obtuses, presque glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords, rétrécies en coin à leur base, qui se prolonge en un pétiole comprimé, long au moins d'un demi-pouce. Les feuilles caulinares supérieures sont sessiles, profondément & très irrégulièrement incisées, à découpures aiguës, quelquefois médiocrement dentées, ou trifides.

Les fleurs sont nombreuses, disposées à l'extrémité de chaque rameau, au nombre de deux à cinq; soutenues par des pédoncules courts, inégaux, velus, glutineux. Les calices sont hispides, visqueux, divisés à leur orifice en cinq découpures courtes, ovales, obtuses. La corolle est grande, blanchâtre; les pétales un peu oblongs, obtus, rétrécis à leur base, marqués de trois lignes roussâtres; les étamines droites, persistantes; les filamens un peu élargis, subulés, un peu plus courts que les pétales; les styles pubescens; les stigmates capités, inclines.

Cette plante croît sur les hautes montagnes & dans les rochers, dans les Alpes, les Pyrénées, en Suisse, & dans l'Allemagne. ? (V. f.)

52. SAXIFRAGE musqué. *Saxifraga moschata*. Willd.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, integris trifidisque, acutis, linearibus; caule viscoso, subracemoso; petalis calicis aequalibus*. Willd. Spec. Plant. pag. 656. n°. 41.

*Saxifraga* (moschata), *foliis radicalibus aggregatis, linearibus, integris, trifidisque, una cum caule glutinoso, hispidis; floribus longe pedunculatis*. Murr. Syst. veg. p. 414. n°. 38. — Wulf. in Jacq. Mitteil. 1. pag. 128. tab. 21. fig. 21.

*Saxifraga* (moschata), foliis cuneatis, integris, bi-trifidisve, hirsuta, odorata; petalis ellipticis, carinatis, calice longioribus. Lapeyr. Saxifr. pag. 61. n°. 39. tab. 37.

*Tridactylides alpina*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 267. Icon. Mala.

*Saxifraga* (exarata), foliis palmato-trifidis, superne lineatis, hirsutis; caule ascendente, multifloro; petalis trinerveis. Allion. Flor. pedem. n°. 1539. tab. 85. fig. 2.

*Sedulum, quod moscatella alpina, latea vocari potest*. Gefn. Fasc. pag. 25. tab. 6. fig. 31.

β. *Eadem, foliis omnibus integris, linearibus*. Lapeyr. L. c. tab. 38.

Cette espèce, assez voisine du *saxifraga muscoides*, en diffère par toutes les parties très-visqueuses; par la légère odeur de musc qu'elle répand; par ses fleurs plus nombreuses, disposées presque en une grappe terminale.

Sa racine est rampante, rameuse, de couleur roussâtre, produisant un grand nombre de feuilles radicales disposées par rosettes très-touffues, nombreuses, formant des gazons fort épais; elles sont linéaires, petites, entières ou à trois lobes à leur sommet; visqueuses, odorantes, chargées de poils adués: il s'en élève des tiges grêles, fermes, hautes de deux à trois pouces & plus, simples, glutineuses, velues, munies de quelques feuilles alternes, éparées, ligulées ou linéaires, entières, quelquefois à trois ou cinq lobes courts.

Les fleurs sont terminales; elles forment presque une petite grappe composée de trois à six fleurs, portées sur des pédoncules d'une longueur médiocre, simples, inégaux, très-visqueux, ainsi que les calices: ceux-ci sont grands, campanulés; leurs divisions courtes, obtuses, écartées, de couleur pourpre. La corolle est d'un jaune-pâle ou de couleur de citron, odorante, à peine plus longue que le calice; les pétales ovales, elliptiques, obtus, sans lignes ni veines apparentes; réfléchis après la floraison.

Cette plante croît dans les montagnes alpines, dans les Pyrénées, en Suisse, & dans les provinces méridionales de la France; elle m'a été communiquée par M. l'abbé Pourret, qui l'avoit recueillie dans la ci-devant province de Languedoc. 7 (V. f.)

53. SAXIFRAGE nerveuse. *Saxifraga nervosa*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis lobatis, utrinque nervosis; calicibus globosis, corollis patenteris, pilis subulatis*. Lapeyr. Saxifr. pag. 63. n°. 40. tab. 39.

*Saxifraga* (exarata), caule asurgente; foliis ciliatis, segmentis obtusis, pectatisque superne c. ar. tis,

*calicibus hirsutis*. Villars, Dauph. vol. 3. pag. 674. tab. 45. Non Allioni.

*Saxifraga hypnoides*. All. Flor. pedem. n°. 1538. tab. 21. fig. 4. Excluse synonymia.

Ses racines sont simples, pivotantes, jaunâtres, ligneuses, munies de quelques fibres. Les tiges sont droites, un peu ligneuses, médiocrement ramifiées; les feuilles disposées en petits paquets lâches à l'extrémité des rameaux; les unes droites, d'autres réfléchies, depuis trois jusqu'à cinq lobes; linéaires, obtuses, marquées de fortes nervures saillantes, d'un vert-foncé, glutineuses, d'une douce odeur de musc, munies quelquefois de poils courts & rares.

Les fleurs forment de petites panicules lâches, droites, terminales; les ramifications presque simples, munies à leur base de bractées sessiles, entières, quelquefois à une ou deux divisions. Les calices sont presque globuleux, velus; à divisions courtes, aiguës, visqueuses. La corolle est blanche; les pétales étalés, ovales, une fois plus longs que le calice, souvent avec trois nervures vertes; les étamines de même longueur que le calice; les anthères jaunes, apiques; les pistils très-courts; les stigmates en tête de clou; les capsules grosses, sphériques, surmontées de deux cornes très-obtuses, renfermées dans les divisions du calice, contenant des semences noirâtres, apiques, réniformes.

Cette plante croît dans les Pyrénées, sur les rochers escarpés, parmi les mousses; elle a des rapports avec le *saxifraga moschata*. 7 (Descript. ex Lapeyr.)

54. SAXIFRAGE à cinq digitations. *Saxifraga pentadactylis*. Lapeyr.

*Saxifraga foliis quinquelobis, lobis elongatis, linearibus, obtusis; fluminibus longitudine calicis; pilis subulatis*. Lapeyr. Saxifr. pag. 64. n°. 41. tab. 40.

Cette saxifrage, d'après M. Lapeyrouse, n'est peut-être qu'une variété du *saxifraga nervosa*, dont elle a le port, les habitudes, les caractères; elle est plus tardive dans la floraison, & ne se montre que vers le milieu de l'été. Son odeur est légèrement aromatique.

Ses fleurs sont moins nombreuses, moins droites; ses pétales n'ont point de nervures; ses étamines sont égales entr'elles, & ne dépassent point les divisions courtes du calice. Elle est remarquable par ses feuilles: les plus basses sont sessiles, réfléchies, fortement marquées de nervures saillantes; les autres sont droites, divisées assez régulièrement en cinq découpures longues, linéaires, obtuses, de la largeur du pétiole; la découpure du milieu simple; les deux latérales écartées, profondément biniées.

Cette

Cette plante croît dans les Pyrénées, à l'ombre, sur les rochers élevés. *h* (Lapeyr.)

55. SAXIFRAGE muscoïde. *Saxifraga muscoides*. Willd.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, integris, trifidijs, oblongis, obtusis; caule filiformi, subulifloro; petalis vix calice longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 656. n°. 42.

*Saxifraga (muscoides), foliis radicalibus aggregatis, linearibus, integris, trifidijs; scapo gracili, subulifloro, pousifloro; floribus citrins, subsessilibus*. Wulf. in Jarq. Miscell. 2. pag. 125.

*Saxifraga caespitosa*. Scop. Carn. edit. 2. n°. 494. tab. 14.

*Saxifraga foliis integris & trifidijs; caule subnudo, paucifloro*. Haller, Helv. n°. 988.

*Saxifraga pyrenaica, foliis parim integris, parim trifidis*. Haller, Oulic. pag. 292. tab. 2. — Seg. Plant. veron. vol. 3. pag. 205, & vol. 1. pag. 45. tab. 9. fig. 4.

Cette plante, quoique très-vivace du *saxifraga caespitosa*, avec lequel plusieurs auteurs paroissent l'avoir confondue, doit cependant en être distinguée par ses feuilles bien plus petites, par ses tiges filiformes, & surtout par ses fleurs en très-petit nombre, de deux à trois, & dont la corolle n'est guère plus grande que le calice.

Ses racines sont grêles, un peu traçantes, & produisent de petites feuilles extrêmement nombreuses, très-étroites, formant des gazons touffus; elles sont étroites, sessiles, presque linéaires, longues de trois à quatre lignes; les unes entières & obtuses, d'autres divisées à leur sommet en deux ou trois petits lobes inégaux, aigus ou obtus, un peu velus. Du milieu de ces feuilles s'élèvent, à la hauteur de deux à quatre poires, des tiges presque simples, droites, filiformes, cylindriques, un peu pubescentes, munies de deux ou trois petites feuilles distantes, sessiles, linéaires, quelques-unes parfaitement nues.

Les fleurs, au nombre de deux ou trois, sont terminales, soutenues par des pédoncules courts, simples, pubescents, garnis de petites bractées. Les calices sont hispides, un peu glanduleux & visqueux, divisés, jusqu'au-delà de leur moitié, en cinq découpures obtuses. La corolle est d'un jaune-citron, à peine plus longue que le calice; les pétales ovales, oblongs, obtus à leur sommet, un peu rétrécis à leur base, marqués, dans leur milieu, de trois lignes roussâtres.

Cette plante croît dans les montagnes alpines, en Suisse, dans les Pyrénées, la Carniole. On la trouve aussi dans les départements méridionaux de la France, aux environs de Grenoble, dans la ci-devant d'Auvergne, &c. x (V. f.)

Botanique. Tome VI.

56. SAXIFRAGE en gazon. *Saxifraga caespitosa*. Linn.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, linearibus, obtusis, trifidis, incisjs; caule erecto, submultifloro; petalis calice dupl. longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 656. n°. 43.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, linearibus, integris & hisque; caule erecto, subnudo, subulifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — Flor. suec. 2. n°. 376. — Oeder. Flor. dan. tab. 71. — Gunn. Norv. n°. 1047. tab. 7. fig. 3, 4. — Wulfen, in Jacq. Collect. 1. pag. 200. — Linn. Flor. franc. vol. 3. pag. 335. n°. 1113. XXXVII. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 422. n°. 4. — Gouan, Monsp. pag. 210. n°. 7.

*Saxifraga foliis petiolatis, trifidis; caule subulifloro, viscido*. Hall. Helv. n°. 989.

*Sedum tridactylites, alpinum, minus*. C. Bauh. Pin. 284. — Idem, Prodr. 131. — Magn. Botan. Monsp. 238.

*Saxifraga tridactylites, alpina, minor & villosa*. Tourn. Inst. R. Herb. 252. — Garid. Aix. 428.

*Sedum hirsutum, alpinum, luteum*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 480. §. 12. tab. 8. fig. 3.

*Sedum sextum alpinum alterum, flore luteo*. Cluf. Pann. pag. 490. tab. 491. ?

a. *Saxifraga tridactylites, alpina, pallide lutea*. Tourn. Inst. R. Herb. 252. ?

*Sedum tridactylites, alpinum, pallide luteum*. C. Bauh. Pin. 284.

b. *Sedum (groenlandica), foliis caulinis palmato-multifidis, sparsis; lacinias acutis, caule erecto*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 578. — Gunn. Norv. n°. 689. tab. 7. fig. 1.

*Saxifraga (groenlandica), foliis imbricatis, cucinato-palmatis, ciliatis; petalis rotundis, stylis aversicatis, stigmaribus complanato-lanatis*. Lapeyr. Saxifr. pag. 39. n°. 17. tab. 19.

*Saxifraga tridactylites, groenlandica; caulis valde foliosis*. Dill. Eltham. pag. 337. tab. 353. fig. 3, 9.

*Saxifraga pyrenaica, alba, minima; foliis densissimis congestis*. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 253.

γ. *Saxifraga (pedemontana), caule erecto, subnudo; foliis trilobis & tridentatis, caulinis palmatis*. Allion. Flor. pedem. n°. 1547. tab. 21. fig. 5, 6.

*Saxifraga hypnoïdes*. All. Flor. pedem. n°. 1538. tab. 21. fig. 4.

En séparant de cette plante le *saxifraga muscoides*, elle devient moins embarrassante à reconnaître, quoique ces deux plantes aient de grands rapports entr'elles. On la distingue à ses fleurs plus nombreuses, médiocrement paniculées; à sa corolle

T t t t

plus grande, d'un jaune plus foncé ; elle est néanmoins fûtée à quelques variétés dans les proportions de sa grandeur, qui peuvent embarrasser.

Ses racines, divisées en plusieurs ramifications, produisent un grand nombre de toisettes composées de feuilles rousues, serrées, qui forment des gazons denses, étendus. Ces feuilles sont linéaires, ordinairement plus grandes que celles du *Saxifraga muscoides*, sessiles ou rétrécies en pétiole à leur base ; les unes entières, obtuses à leur sommet ; d'autres un peu élargies à leur partie supérieure, médiocrement tridées, à lobes inégaux, obtus ou aigus, glabres ou un peu velus.

Les tiges sont grêles, droites, cylindriques, presque glabres, hautes de trois à cinq pouces, médiocrement feuillées, rameuses ou légèrement paniculées à leur partie supérieure. Les feuilles sont alternes, distantes, petites, au nombre de deux ou trois, linéaires, entières, obtuses, quelquefois à trois dents à leur sommet. Les fleurs forment une panicule médiocre, un peu étalée ; sont nues par des pédoncules assez longs, filiformes, pubescens, légèrement visqueux, presque simples & uniflores. Les calices sont plus ou moins hispides & glanduleux, à cinq découpures obtuses ; la corolle de couleur jaune, une fois plus grande que le calice ; les pétales ovales, obtus, étroits vers leur base.

Cette espèce fournit quelques variétés remarquables. Celle que l'on recueille sur les montagnes du Groënland à ses tiges bien plus garnies de feuilles, éparées, presque palmées, souvent incisées, à découpures aiguës : une autre décrite par Allioni sous le nom de *Saxifraga piedmontana* offre des feuilles inférieures à trois lobes ou tridentées, & des feuilles caulinaires palmées.

Cette plante croît sur les Hautes-Alpes, en Suisse, dans le Piémont, & dans les départements méridionaux de la France, sur les montagnes les plus élevées du Dauphiné, où elle a été recueillie par M. Desfontaine, qui n'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

Observations. M. Lapeyrouse, qui a trouvé, sur les plus hautes montagnes des Pyrénées, le *Saxifraga groenlandica*, croit qu'il faut nécessairement la séparer du *Saxifraga cespitosa*. Il y trouve ces principales différences ; savoir : une ou deux fleurs très-petites dans le *Saxifraga cespitosa* ; quatre à douze grandes fleurs en tête dans le *Saxifraga groenlandica* ; des pétales linéaires, égaux aux divisions du calice, dans la première ; ronds, avec trois nervures, deux fois plus grands que le calice, dans la seconde ; feuilles tendres, sans nervures, un peu linéaires, dans l'une ; sèches, coriaces, velues, glanduleuses, marquées de nervures, dans l'autre.

17. SAXIFRAGE à trois pointes. *Saxifraga trispinata*. Willd.

*Saxifraga foliis radicalibus aggregatis, cuneiformibus, ciliatis, acutè tridentatis ; caule ascendente, racemoso ; petalis lanceolatis, calice trifido longioribus*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 637.

*Saxifraga foliis lanceolatis ; radicalibus congestis, tricuspidatis ; caulibus adscendentibus, multisporis*. Retz. Prodr. Flor. scand. edit. 2. n. 522.

*Saxifraga foliis radicalibus densissimè imbricatis, concavo-cuneiformibus, ciliatis, tricuspidatis ; caule ascendente, nudifloro, paniculato*. Rottb. Acl. Hafn. 10. pag. 446. tab. 6. — Æder. Flor. dan. tab. 976. — Gunn. Norv. n. 1046.

Ses racines sont grêles, médiocrement rameuses, courtes, garnies de très-peu de fibres ; elles produisent une tige simple, un peu couchée & très-feuillée à sa base, ascendante & murie dans la partie supérieure de quelques feuilles alternes. Les racines & inférieures sont très-nombreuses, petites, entières, imbriquées, sessiles, un peu cunéiformes & rétrécies à leur base, ciliées à leur contour, tronquées & terminées à leur sommet par trois pointes inégales, distantes. Les feuilles caulinaires supérieures plus étroites, dentées.

Les fleurs sont peu nombreuses, & forment une petite grappe terminale, dont les pédoncules sont glabres, inégaux, presque simples ou médiocrement ramifiés. Le calice est glabre, verdâtre, à cinq découpures ovales, obtuses ; la corolle d'un blanc-jaunâtre, trois fois plus longue que le calice ; les pétales lancéolés, obtus ; les étamines plus courtes que la corolle.

Cette plante se rencontre dans le Groënland.

18. SAXIFRAGE hypnoïde. *Saxifraga hypnoides*. Linn.

*Saxifraga foliis coulinis linearibus, integris, trifidisve ; stolonibus procumbentibus ; caule erecto, nudifloro*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 579. — Æder. Flor. dan. tab. 348. — Mill. Dict. n. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 618. — Gouan. Monsp. pag. 210. n. 8. — Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 422. n. 3. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 514. n. 1113. XXXV. — Lapey. Saxifr. pag. 57. tab. 32.

*Saxifraga procumbens, foliis linearibus, integris, trifidisve*. Hort. Cliff. 168. — Royn. Lugd. Bar. 453. — Sauvag. Monsp. 208. — Gort. Geln. 248.

*Saxifraga muscosa, trifido folio*. Tournef. Inst. R. Herb. 151.

*Sedum alpinum, trifido folio*. C. Bauh. Pin. 284. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 479. §. 12. tab. 5. fig. 26. Optima.

*Sedum alpinum septimann*. Clus. Pann. pag. 491. *Sedum minus* XIII. Clus. Hist. 62.

*Sedis affinis trifurca, alpina, flore alio. J. Bauh. Hist. 3. pag. 696. Sine icone.*

*A. Saxifraga procumbens, foliis linearibus, integris, trifidis & quinquifidis. Roy. Lugd. Bat. 454. — Sauvag. Monsp. 228.*

Cette espèce est assez facile à reconnoître par ses grandes fleurs portées sur de longs pédoncules; par ses feuilles à trois divisions linéaires, très-étroites, ouvertes, quelquefois entières; enfin par ses rejets rampans.

Ses racines sont fibreuses, rameuses, presque filiformes; elles produisent, outre la tige principale, un grand nombre de rejets rampans, ou de tiges stériles, couchées, grêles, très-garnies de feuilles, & tellement entrelacées les unes dans les autres, qu'elles forment un gazon très-dense, semblable à une mousse épaisse. Les feuilles sont étroites, linéaires; les unes simples, d'autres divisées à leur partie supérieure en trois linéaires linéaires, aiguës, très-ouvertes, quelquefois plus courtes, & semblables à trois dents, glabres ou légèrement pileuses, d'un vert-jaunâtre.

Les tiges fleuries sont couchées à leur base, redressées, droites, hautes de trois à six pouces, grêles, cylindriques, presque nues, glabres ou légèrement pubescentes à leur partie supérieure, garnies vers leur sommet de deux à cinq fleurs alternes, portées sur de très-longes pédoncules droits, simples, filiformes, uniflores, munis à leur base d'une petite feuille linéaire, un peu mucronée.

Les calices sont presque glabres, divisés à leurs bords en cinq découpures étroites, lanceolées, aiguës. La corolle est grande, d'un blanc-jaunâtre; les pétales ovales, obtus, marqués de trois lignes pâles ou verdâtres.

Cette plante croît sur les montagnes, dans les départemens méridionaux de la France, dans les Alpes, en Suisse, en Autriche, dans les Pyrénées, &c. *¶ (V. f.)*

59. SAXIFRAGE globulifère. *Saxifraga globulifera* Desfont.

*Saxifraga caule bulbifero; foliis nervosa, imis spatulatis, integerrimis, superioribus palmatis sive aut quinquifidis, in ramo florifero remotis, linearibus. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 342. tab. 96. fig. 1.*

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Saxifraga hypnoides*, dont elle n'est guère distincte que par les petites bulbes situées dans les aisselles des feuilles inférieures, par les pédoncules très-courts, & par ses corolles moins grandes; peut-être même ne devoit-on la regarder que comme une simple variété.

Ses tiges sont disposées en gazons épais, très-rampans, couchés à leur partie inférieure, rele-

vées, glabres, presque nues à leur partie supérieure, ou produisant des rameaux droits, simples, allongés, florifères. Les feuilles inférieures sont nombreuses, ramassées en touffes, entières, obtuses, spatulées à leur base; les feuilles caulinaires rapprochées, nerveuses, glabres ou à peine pubescentes; les supérieures longuement pétioles, élargies, presque palmées à leur sommet, ou ciliées en trois ou cinq lobes inégaux, obtus ou un peu aigus; la plupart de ces feuilles sont munies dans leurs aisselles, de bulbes ovales, un peu arrondies, velues; les feuilles des rameaux qui portent des fleurs, sont rares, distantes, linéaires, fort petites, très-entières, à peine pubescentes.

Les fleurs sont disposées en un petit corymbe terminal, supportées par des pédoncules presque simples ou bifides vers leur sommet, avec quelques autres fleurs presque sessiles, surtout dans la dichotomie des rameaux. Leur calice est petit, pubescent, divisé en cinq découpures ovales, obtuses. La corolle est blanche, d'une grandeur médiocre, composée de cinq pétales en ovale renversé, au moins une fois plus longs que le calice; élargis, obtus à leur sommet, un peu recouverts à leur base, contenant dix étamines plus courtes que la corolle, deux styles, auxquels succède une capsule ovale, dentée à deux loges polyspermes.

Cette plante a été recueillie sur le sommet de l'Atlas par M. Desfontaines, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. Elle fleurit pendant l'hiver & au commencement du printemps. *¶ (V. v.)*

60. SAXIFRAGE à feuilles de cymbalaire. *Saxifraga cymbalaria* Linn.

*Saxifraga foliis caulinis cordatis, trilobis integrisque; caulibus procumbentibus. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 579. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 657. n°. 45.*

*Saxifraga exigua, foliis cymbalaria. Buxb. Centur. 2. pag. 40. tab. 45. fig. 2.*

*Geum orientale, cymbalaria folio molli & glabro; flore magno, albo. Tournef. Cotoll. pag. 18. — Voyage dans le Levant, vol. 3. pag. 348. tab. 32.*

C'est une fort petite plante, dont les tiges sont grêles, faibles, couchées, presque simples, glabres, garnies de feuilles alternes, longuement pétioles, distantes, un peu arrondies, tendres, élargies à leurs deux faces, en cœur à leur base, divisées vers leur sommet en trois lobes inégaux, courts, ovales, obtus; les feuilles terminales, entières, lanceolées, aiguës, fort petites.

Les fleurs sont axillaires, situées vers l'extrémité des tiges, portées sur de très-longes pédoncules simples, uniflores, glabres, filiformes; le calice divisé en cinq découpures courtes; la cor-

rolle blanche, beaucoup plus grande que le calice, ouverte; les pétales ovales, lancéolés, à peine aigus.

Cette plante se rencontre dans le Levant, sur les montagnes, le long des ruisseaux qui en descendent.

61. SAXIFRAGE à feuilles de lierre. *Saxifraga hederacea*. Linn.

*Saxifraga foliis caulinis ovatis, lobatis; caule filiformi, Racciao*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 579. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 658. n°. 46.

*Saxifraga cretica, annua, minima; hederaceo folio*. Tournef. Corol. pag. 18.

Cette espèce, fort petite, a des rapports avec le *saxifraga cymbalaria*. Ses tiges sont couchées, grêles, filiformes, molles, garnies de feuilles alternes, pétioolées; celles des tiges ovales, divisées à leurs bords en plusieurs lobes, assez semblables à celles du lierre.

Cette plante se rencontre dans l'île de Crète. ○

62. SAXIFRAGE d'Orient. *Saxifraga orientalis*. Willden.

*Saxifraga foliis subrotundis, quinquelobis; caule ramossimo, procumbente*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 658. n°. 47.

*Saxifraga foliis radicalibus ramisque quinquelobis, septemlobisve. summis integerrimis, bifidisve; caule ramossimo, basi procumbente*. Jacq. Oberv. 2. pag. 9. tab. 34.

*Gram orientale, rotundifolium, supinum, flore aurco*. Tournef. Coroll. pag. 18.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *saxifraga cymbalaria*; elle paroît même tenir le milieu entre cette plante & le *saxifraga hederacea*; mais elle est bien plus grande que cette dernière, plus rameuse que la première.

Ses tiges sont grêles, couchées sur la terre à leur partie inférieure, très-rameuses; les rameaux dressés. Les feuilles sont alternes, distantes, longuement pétioolées, larges, un peu arrondies, point échanquées en cœur à leur base, partagées à leur contour en cinq ou sept lobes courts, ovales, à peine aigus; les feuilles supérieures & terminales entières, presque sessiles, lancéolées, quelquefois bidentées.

Les feuilles sont solitaires dans l'aisselle des feuilles supérieures, de couleur jaune-doré, portées sur de très-longs pédoncules simples, uniflores; les pétales lancéolés, presque elliptiques, obtus, plus longs que les calices; les capsules terminées par deux pointes courtes, recourbées en dehors.

Cette plante croît dans le Levant, où elle a été observée par Tournefort.

63. SAXIFRAGE cunéiforme. *Saxifraga cuneata*. Willd.

*Saxifraga foliis inferioribus petiolatis, cuneiformibus, quinquelobis; caulinis sessilibus, lanceolatis; caule ascendente, paniculato*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 658. n°. 48.

*Saxifraga (cuneifolia), foliis cuneatis, quinquelobis; caulinis lanceolatis, floribus paniculatis*. Cav. Icon. rar. vol. 3. pag. 25. tab. 248.

De ses racines s'élèvent plusieurs tiges hautes d'un demi-pied, grêles, paniculées; les stériles couvertes de feuilles éparées, pétioolées; les tiges fleuries, bien moins feuillées; les feuilles sessiles, lancéolées. Toutes ces feuilles sont glabres, un peu charnues; les inférieures pétioolées, rétrécies en coin à leur base, divisées en cinq lobes à leur sommet, plus courtes que les pétioles.

Les fleurs sont disposées en une panicule lâche, terminale, dont les ramifications sont munies de bractées courtes, lancéolées. Le calice est divisé en cinq découpures supérieures, ovales, aigües. La corolle est blanche; les pétales oblongs, obtus; leurs onglets très-étroits; les filaments des étamines plus courts que la corolle; les anthères ovales. L'ovaire est à demi-inférieur, ovale, tronqué, surmonté de deux styles subulés, avec des stigmates obtus; la capsule ovale, uniloculaire, polysperme.

Cette plante croît en Espagne, sur les montagnes proche Castellor; elle fleurit au commencement de l'été. ( *Descript. ex Cavan.* )

SAXIFRAGES ( Les ). *Saxifraga*. Famille de plantes, ainsi nommée parce qu'elle comprend, parmi les genres qui la composent, celui des saxifragées.

Les plantes renfermées dans cette famille ont, la plupart, des tiges herbacées, souvent fort peu élevées, presque simples; des feuilles alternes, rarement oppoïées, quelquefois un peu charnues.

Leur calice est supérieur, assez souvent inférieur, à cinq découpures. La corolle est composée de quatre ou cinq pétales attachés à l'orifice du calice, alternes avec ses divisions; ils manquent quelquefois. Les étamines sont en même nombre que les pétales ou en nombre double, attachées au même point d'insertion.

L'ovaire est simple, supérieur ou quelquefois inférieur, surmonté de deux styles & de deux stigmates. Le fruit est très-ordinairement une capsule à plusieurs semences, qui s'ouvre en deux valves à son sommet; à une seule ou à deux loges,

le bord rentrant des valves servant de cloison. L'embryon est courbé, environné d'un péricarpe farineux ou un peu charnu.

Les principaux genres qui composent cette famille sont les suivans :

I. Le fruit constitué par une capsule supérieure, divisée, à son sommet, en deux pointes en forme de bec.

Les heuchères.....*Heuchera*.  
Les saxifrages.....*Saxifraga*.  
Les tiarcelles.....*Tiarella*.  
Les mitelles.....*Mitella*.

II. Le fruit inférieur, constitué par une capsule ou une baie.

Les dorines.....*Chrysosplenium*.  
Les moscatellines.....*Adoxa*.

#### Genres affiliés aux saxifrages.

Les ranoncles.....*Weinmannia*.  
Les canoues.....*Canonia*.  
Les hydrangelles.....*Hydrangea*.

Observations. Un ovaire simple, supérieur, surmonté de deux styles ; un fruit capsulaire à deux valves, dont les bords sont rentrants, constituent la famille des saxifrages. Les *Weinmannia* & les *Canonia* ne s'en écartent que par leurs tiges arborescentes & leurs feuilles opposées. Les *Chrysosplenium* & les *Adoxa*, qui ont l'ovaire inférieur & qui sont dépourvus de corolle, n'appartiennent qu'imparfaitement à cette famille, & cependant il n'en est aucune avec laquelle ils aient plus d'affinité. (Jussieu.)

SCABIEUSE. *Scabiosa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, agrégées, monopérales, de la famille des dialycées, qui a des rapports avec les *Knautia*, & qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les feuilles sont opposées, simples ou pinnatifides ; les fleurs très-ordinairement terminales ; les tiges presque ligneuses dans quelques espèces.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs agrégées ; un calice commun à plusieurs folioles ; un calice propre double, couvrant la semence ; une corolle monopétale, à quatre ou cinq divisions à son limbe ; quatre ou cinq étamines ; une semence enveloppée par les deux calices propres ; un réceptacle commun, nu ou plus souvent chargé de poaillottes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont agrégées, réunies sur un réceptacle commun, convexe, chargé de poaillottes ou de filamens roides, ou nu ; munies d'un calice com-

muni ouvert, persistant, composé de folioles disposées sur un ou plusieurs rangs.

Chaque fleur séparée offre :

1°. Un calice propre double ; l'extérieur souvent plus court, membraneux, plissé, persistant ; l'intérieur terminé par cinq découpures subulées, presque capillaires.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, à quatre ou cinq divisions régulières ou irrégulières, insérée sur le calice interne.

3°. Quatre étamines, quelquefois cinq, dont les filamens sont subulés, foibles, capillaires, attachés au bas du tube de la corolle, terminés par des anthères oblongues, horizontales.

4°. Un ovaire environné par une gaine propre en forme de petit calice, surmonté d'un style filiforme, de la longueur de la corolle, terminé par un stigmate échancré.

Les semences sont enveloppées par les deux calices propres, foliaires, ovales-oblongues, diversément couronnées par les calices.

Observations. Ce genre, dont les *Knautia* sont peu distincts, présente une réunion d'espèces nombreuses, qui viennent toutes naturellement se placer à la suite les unes des autres, & dont aucune ne s'écarte des caractères constitutifs de ce genre. Quoique plusieurs des espèces établies soient tellement rapprochées, qu'elles peuvent faire douter si elles ne sont pas de simples variétés, le plus grand nombre offre cependant l'avantage de pouvoir être très-bien distinguées par les différences dont je vais exposer les plus importantes.

Le calice commun est composé de plusieurs folioles simples, tantôt sur un seul rang, tantôt sur plusieurs, plus longues ou plus courtes que les cotolles ; quelquefois ce sont presque des écailles imbriquées. Les corolles sont, ou toutes égales, ou celles de la circonférence sont plus longues que celles du centre & ouvertes en rayons ; ce qui leur donne presque l'aspect des fleurs radieuses. Leur limbe se divise en quatre ou cinq lobes réguliers ou irréguliers ; mais comme ces divisions ne sont pas très-constantes, & que l'on connoît des espèces dont les corolles sont à quatre ou cinq lobes, la subdivision établie par Linné sur le nombre de ces découpures devient quelquefois embarrassante.

La forme des deux calices propres varie beaucoup & fournit de bons caractères spécifiques, ainsi que le réceptacle garni de poaillottes de formes différentes, quelquefois remplacées par des poils toides. La forme du réceptacle lui-même ne doit pas être négligée.

Il est d'essence de ne pas regarder comme une

forte de capsule la gaine particulière qui enveloppe les semences, & qui presque toujours en est détachée. Cette gaine appartient réellement au calice propre extérieur; elle en forme la partie inférieure, tubulée; la partie supérieure s'évase en une lame campaniforme. Ce que l'on a appelé calice propre intérieur est une seconde enveloppe plus intérieure, laquelle, au lieu de s'évaser, se resserre à son orifice, recouvre le sommet de la semence, & se prolonge en une sorte d'aigrette à cinq filets, souvent péduncule.

## E S P È C E S.

\* Corolle à quatre divisions.

1. SCABIEUSE des Alpes. *Scabiosa alpina*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, aequalibus; calicibus imbricatis; floribus cernuis; foliis pinnatis; foliolis lanceolatis, serratis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 141. — Hort. Cliffort. 30. — Hort. Upsal. 16. — Royn, Lugd. Bat. 188. — Miller, Dict. n° 10. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 349. n° 936. X. — Gouan, Monspel. pag. 61. n° 1. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 119. n° 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. n° 1. — Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 249. n° 299.

*Disfacus foliis pinnatis, pinnis serratis, capsulis globosis*. Hallet, Helv. n° 100.

*Scabiosa alpina, foliis cernuis majoris*. C. Bauh. Pin. 270. — Tournef. Inst. R. Herb. 464. — Morif. Oxon. Hill. 3. pag. 46. § 6. tab. 13. fig. 10.

*Scabiosa alpina, maxima*. Lobel. Icon. pag. 537. — Idem, Adv. pag. 235.

On peut reconnaître cette plante à ses rapports avec la grande centauree, dont elle offre presque le port & les feuilles, qui sont ailées; les folioles lancéolées, dentées en scie à leurs bords; les fleurs globuleuses, un peu penchées.

Ses tiges sont fermes, épaisses, fistuleuses, cylindriques, hautes de trois à quatre pieds, velues, médiocrement rameuses, garnies de feuilles opposées, pétioles, fort grandes, d'un vert-blanchâtre, ailées, composées de folioles lancéolées, décurrentes à leur base, dentées en scie à leurs bords; la foliole terminale beaucoup plus grande que les autres.

Les fleurs sont un peu penchées, solitaires à l'extrémité de chaque rameau, formant une tête atrondie, presque globuleuse, soutenue par un pédoncule droit, alongé, velu. Le calice commun est imbriqué, plus court que les corolles, composé d'écailles velues & pointues. La corolle est de couleur jaunâtre; le réceptacle globuleux, garni de pailettes velues, lancéolées, un peu canaliculées, persistantes; les semences quadrangulaires, couronnées par un calice extérieur, gai-

de quatre dents plus grandes & quatre plus petites, alternes avec les premières, & d'un calice intérieur en forme d'aigrette, composée d'une vingtaine de rayons roides, subulés, très-ouvertes.

Cette plante croît sur les montagnes des départemens méridionaux de la France, sur les Alpes, en Suisse, dans l'Italie. x (V. f.)

2. SCABIEUSE à têtes de centauree. *Scabiosa centauroides*.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, subaequalibus; foliis radicalibus, integerrimis; caulinis decursivis pinnatis, calice imbricato*. Lam. Ill. Gen. vol. 1. pag. 250. n° 1312.

Cette plante offre tellement l'aspect d'une centauree, tant par la forme de ses têtes de fleurs & par les écailles imbriquées qui composent le calice commun, que par les larges feuilles pinnatifides, qu'on s'y tromperoit aisément sans l'examen des parties de la fructification.

Ses tiges sont dures, pleines, cylindriques, fortement striées, presque glabres ou munies de quelques poils rares, hautes d'environ quatre pieds, divisées en rameaux très-ouverts, roides, alongés, opposés, un peu quadrangulaires, de couleur verte. Les feuilles radicales font entières, longuement pétioles; les feuilles caulinaires inférieures opposées, très-rapprochées, amples, fort longues, pinnatifides, légèrement velues, d'un vert-tendre, ciliées à leurs bords; les pinnales décurrentes, profondes, très-distantes, entières, oblongues, lancéolées, aiguës, la terminale plus grande, ovale-lancéolée; les pétioles comprimés, pileux, très-longs, un peu ailés surtout à leur partie supérieure, élargis, cônés, presque en gaine à leur base; les feuilles supérieures & terminales presque sessiles; les pinnales plus étroites, plus alongées, moins nombreuses, presque linéaires.

Les fleurs sont disposées en têtes terminales, presque globuleuses, soutenues par des pédoncules simples, alongés, roides, striés, presque quadrangulaires, très-glabres. Le calice commun est composé d'un grand nombre d'écailles imbriquées, concaves, très-serrées, ovales, obtuses, un peu verdâtres dans leur milieu, d'un blanc-jaunâtre & scarieuses à leurs bords; les écailles intérieures aiguës. Les corolles font d'un jaunâtre, tubulées, divisées à leur limbe en quatre lobes presque égaux; les étamines plus longues que la corolle; le pistil droit, saillant; les semences un peu velues, légèrement comprimées, à quatre côtes, couronnées par les quatre dents courtes, aiguës du calice propre extérieur; l'intérieur est petit, campanulé, noirâtre à sa base, déchiré inégalement à ses bords en filets blancs, sétacés,



nombreux, inégaux. Le réceptacle est parti de pailettes coriaces, linéaires, très-aigues, d'un blanc-argente, plus longues que les semences, assez semblables aux écailles latérales du calice commun.

Cette plante croît naturellement sur les montagnes alpines des départements méridionaux de la France, dans la ci-devant Provence. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 7 (V. v.)

### 3. SCABIEUSE roide. *Scabiosa rigida*. Linn.

*Scabiosa corollulis quadrisidis, subradiatis; calicibus imbricatis, obtusis; foliis lanceolatis, serratis, auriculatis*. Linn. Mantiss. 328. — Amoenit. Académ. vol. 6. Afric. 4. — Syst. veget. pag. 143. n°. 2. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 546. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1300.

*Scabiosa corollis quadrisidis, inaequalibus; calicibus squamis obtusis; foliis oblongis, serratis, scabris*. Thunb. Prodr. 28.

*Scabiosa africana, frutescens; foliis rigidis, splendens; & serratis; flore albicantem*. Commel. Hort. 1. pag. 155. tab. 93. — Rai, Suppl. 137.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles dures, roides, lancéolées, dentées en scie & souvent auriculées à leur base, ainsi que par ses corolles à quatre divisions inégales, celles de la circonférence presque étalées en rayons; les écailles du calice commun obtuses.

Ses tiges sont droites, dures, striées ou cannelées, rudes, presque anguleuses, rameuses, un peu frutescentes, garnies inférieurement de feuilles pétiolées, très rapprochées, ovales, lancéolées, épaisses, coriaces, crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet, longues de deux à trois pouces & plus, larges d'environ un pouce & demi, nerveuses, à peine velues, ciliées à leurs bords, vertes à leurs deux faces, supportées par des pétioles planes, striés, roides, longs au moins d'un pouce; les feuilles supérieures plus petites, souvent auriculées ou divisées en deux lobes irréguliers à leur base.

Les fleurs sont terminales, un peu globuleuses, solitaires, situées à l'extrémité de longs pédoncules opposés, roides, striés, presque quadrangulaires, très-allongés. Le calice commun est composé d'écailles concaves, courtes, imbriquées, glabres, coriaces, ovales, un peu arrondies, obtuses, blanchâtres & membraneuses à leurs bords, assez semblables à celles de quelques espèces de centauree. La corolle est d'un blanc-jaunâtre, à peine radiée, divisée à son orifice en quatre découpures à peine irrégulières; les étamines saillantes; le calice propre extérieur court, membraneux; le réceptacle garni de pailettes larges, scarieuses, un peu concaves, obtuses.

Cette plante croît dans l'Éthiopie. 7 (V. f. in herb. Lam.)

### 4. SCABIEUSE amincie. *Scabiosa attenuata*. Linn.

*Scabiosa corollulis quadrisidis, aequalibus; calicibus imbricatis; squamis oblongis, obtusis; foliis linearibus, glabris, integris, basi pinnatifidis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 134. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 546. n°. 4.

*Scabiosa (attenuata), corollis quadrisidis, aequalibus; foliis linearibus, integris trifidisque*. Linn. f. Suppl. pag. 118.

*Scabiosa (trifida), corollis quadrisidis, aequalibus; calicibus squamis obtusis; foliis linearibus, integris trifidisque*. Thunb. Prodr. pag. 28.

5. *Scabiosa (verbenacea), corollis quadrisidis, aequalibus; calicibus imbricatis; squamis obtusis; foliis oblongis, dentatis basi pinnatifidis*. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1314.

Cette espèce se distingue à ses rameaux très-grêles, à ses corolles toutes égales, aux écailles de son calice commun, allongées, obtuses; à ses feuilles étroites, linéaires, entières, trifides ou pinnatifides à leur base.

Ses tiges sont droites, glabres, divisées en rameaux opposés, filiformes, élancés, cannelés, glabres, un peu pubescents dans leur jeunesse. Les feuilles sont opposées, longues, étroites, linéaires, entières à leurs bords, glabres à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, quelquefois trifides ou presque pinnatifides à leur base; les découpures solitaires, linéaires, une fois plus courtes que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges & des rameaux, soutenues par des pédoncules simples, filiformes. Le calice commun est composé d'écailles imbriquées oblongues, obtuses, légèrement pubescentes; il ne renferme qu'un petit nombre de fleurs, dont les corolles sont blanches, pubescentes à l'extérieur, à quatre divisions égales.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. 7

La plante 5, rapportée par Sonnerat du Cap de Bonne-Espérance, ne paraît être qu'une variété de la précédente, dont elle diffère par ses tiges presque simples, velues; par ses feuilles oblongues, légèrement dentées à leur contour, & presque pinnatifides à leur base.

### 5. SCABIEUSE rude. *Scabiosa scabra*. Linn. f.

*Scabiosa corollis quadrisidis, aequalibus; calicibus squamis obtusis; foliis bipinnatifidis, scabris, rigidis*. Thunb. Prodr. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 546. n°. 5.

*Scabiosa corollis quadrifida, aequalibus; calicibus imbricatis, obtusis; foliis subpinnatis, scabris, rigidiusculis.* Linn. f. Suppl. 118. — Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1315.

Cette plante paroît avoir beaucoup de rapports avec le *scabiosa rigida* ; elle en diffère cependant par des caractères assez prononcés pour l'en tenir séparée.

Ses tiges sont herbacées, simples, rudes au toucher, cylindriques, garnies de feuilles sessiles, opposées, fermes, linéaires, deux fois ailées, rudes à leurs deux faces, obtuses à leur sommet, renfermant dans leurs aisselles d'autres feuilles, qui ne sont que le rudiment de rameaux non développés.

Les fleurs sont solitaires, situées à l'extrémité des tiges, portées sur de très-longes pédoncules simples. Le calice commun est composé d'écaillés imbriquées, ovales, obtuses. Les corolles sont blanches, inégales entr'elles, divisées en leur limbe en quatre découpures égales.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Linn. f.*)

#### 6. SCABIEUSE de Syrie. *Scabiosa syriaca*. Linn.

*Scabiosa corollis quadrifida, aequalibus; calicibus imbricatis, patulius aristatis; caule dichotomo, foliis lanceolatis.* Linn. Syst. veget. pag. 120. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 547.

*Scabiosa corollis quadrifida, aequalibus; calicibus aristatis, caule dichotomo, foliis lanceolatis.* Linn. Spec. Plant. 2. vol. 1. pag. 141. — Hort. Cliff. 30. — Roy. Lugd. Bat. 188.

*Scabiosa fruticans, latifolia, alba.* C. Bauh. Pin. 269. — Tournef. Inst. R. Herb. 464. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 46. 5. 6. tab. 14. fig. 14.

*Scabiosa nona, sive aestivalis.* Clus. Hist. 5.

1. *Scabiosa perfoliata folio amethystino.* Vaill. Act. Académ. Paris. 1721. pag. 233.

2. *Scabiosa fruticans, latifolia, floribus ad caruleum inclinantibus.* Tournef. Inst. R. Herb. 464. — C. Bauh. Pin. 269.

3. *Scabiosa (dichotoma), corollis quadrifida, aequalibus; calicibus imbricatis, aristatis; caule dichotomo; floribus in dichotomis subsistibus.* Lam. III. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1303.

Cette scabieuse se rapproche beaucoup par ses fleurs, surtout par les écaillés aristées de son calice commun, du *scabiosa transylvanica* ; mais outre que les écaillés sont pubescentes dans l'espèce dont il s'agit ici, les feuilles sont entières, seulement incisées ou crénelées à leur contour.

Ses tiges sont roides, droites, hautes de trois

à quatre pieds, cannelées, anguleuses, vertes, très-rudes sur les angles & piluleuses, divisées en rameaux opposés, allongés, effilés, dichotomes à leur sommet. Les feuilles sont très-longues, lancéolées, d'un vert gai ; les radicales à peine pétiolées, longues de huit à dix pouces & plus, sur deux de large, presque glabres à leurs deux faces, ciliées à leurs bords, presque entières ou médiocrement pinnatifides à leur base, à pinnules courtes, lancéolées, à fortes crénelures inégales dans le reste de leur longueur, presque obtuses à leur sommet ; les feuilles linéaires sessiles, opposées, très-entières, lancéolées, garnies à leurs deux faces de quelques poils rares & couchés ; traversées par une grosse nervure blanchâtre, à crénelures courtes, lâches, aiguës à leur contour ; les supérieures très-étroites, plus courtes, munies de quelques dents rares, distantes, aiguës.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des rameaux, portées sur de très-longes pédoncules, quelquefois presque sessiles dans la bifurcation des rameaux. Les pédoncules sont rudes, striés, très-simples, uniflores ; le calice commun composé d'écaillés imbriquées, cartilagineuses, ovales, plus courtes que les corolles, blanches, pubescentes, ciliées, terminées par une très-longue pointe roide, subulée, épaisse ; les paillettes du réceptacle membraneuses, oblongues, pubescentes, épineuses à leur sommet, un peu convexes. Les corolles sont blanches ou d'un bleu-foncé dans la variété  $\beta$ , à quatre découpures égales, velues en dehors, particulièrement sur leur tube ; les semences anguleuses, presque quadrangulaires, velues, couronnées par plusieurs dents subulées, inégales, ciliées, roides, qui composent le calice propre extérieur ; l'intérieur court, pédicellé, campanulé, velu, denticulé, cilié à ses bords.

Cette plante croît dans le Levant & la Syrie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Son réceptacle est ovale, conique. ☉ (V. v.)

#### 7. SCABIEUSE de Sibérie. *Scabiosa sibirica*.

*Scabiosa corollis quadrifida, aequalibus; calicibus imbricatis, aristatis; foliis lanceolatis, pedunculis brevioribus.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1302.

Cette espèce est remarquable par ses feuilles simples, par les calices arides, & par ses fleurs bleuâtres ; elle a des rapports avec le *scabiosa syriaca*.

Ses tiges sont droites, roides, anguleuses, striées, hérissées de pointes sur leurs angles, glabres, trichoromes à leur sommet ou très-simples. Les feuilles sont opposées, médiocrement pétiolées, fermes, lancéolées, presque obtuses ; les inférieures plus grandes, souvent crénelées à leur contour ; les supérieures très-entières, point dentées, obtuses à leur sommet, vertes, glabres à leurs

leurs deux faces, un peu rétrécies en pétiole à leur base, médiocrement cônées, longues d'un pouce & demi, sur à peine six lignes de large.

Les fleurs sont solitaires, terminales, disposées en têtes ovales, d'une grosseur médiocre, soutenues par des pédoncules très-droits, roides, beaucoup plus longs que les feuilles, rudes, velus, anguleux. Le calice commun est formé par des écailles imbriquées, très-coriaces, blanches, un peu pubescentes, concaves, courtes, ovales, terminées par une pointe droite, très-roide, épineuse; ce qui donne à cette plante l'aspect d'une centaurée. Les corolles sont d'un bleu-vif, toutes égales, point radiées, divisées à leur orifice en quatre lobes presque égaux. Le réceptacle est muni de paillettes presque semblables aux écailles calicinales; le calice propre est ovale, court, velu, resserré & très-court à son orifice, armé de quelques pointes droites.

Cette plante croît dans la Sibérie. ☉ (*V. f. in herb. Lam.*)

8. SCABIEUSE à fleurs blanches. *Scabiosa leucantha*. Linn.

*Scabiosa corollalis quadrifida, subaequalibus; squamis calicinis ovatis, imbricatis; foliis pinnatifidis*. Linn. Syst. veget. pag. 120. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 547. n°. 8. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. p. 249. n°. 1304. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 108.

*Scabiosa corollalis quadrifida, aequalibus; squamis calicinis ovatis, obtusis; foliis pinnatifidis*. Linn. Spec. Plant. 142. — Hort. Cliff. 30. — Royen, Lugd. Bat. 188. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 349. n°. 936. IX. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 219. n°. 2. — Gouan, Monip. pag. 161.

*Scabiosa flore globoso, nivea*. C. Bauh. Pin. 207.

*Scabiosa fruticans, angustifolia, alba*. C. Bauh. Pin. 270. — Tourn. Inst. R. Herb. 464. — Garid. A'x. pag. 429. — Morif. Oxon. Hill. 3. pag. 46. 5. 6. tab. 13. fig. 12. *Medicaris*.

*Scabiosa montana calidarum regionum*. Lobel. Ic. 538. — Idem, Oberv. pag. 291. Icon.

*Scabiosa montana calidarum regionum, major*. Lobelii. J. Bauh. Hist. 3. pag. 8. Icon. — Dalech. Hist. 2. pag. 1110. Icon.

*Scabiosa (rigida), corollalis quadrifida, aequalibus; calicibus ovatis, obtusis; foliis pinnatifidis*. Miller, Dict. n°. 7.

Cette espèce se distingue aux écailles glabres, ovales, obtuses, qui composent son calice commun; à ses fleurs blanches, réunies en une tête globuleuse; à ses feuilles pinnatifides.

Ses tiges sont droites, presque cylindriques, Botanique, Tome VI.

finement striées, munies de quelques côtes plus saillantes, un peu anguleuses, glabres, lisses, fermes, divisées en rameaux opposés, dressés, élançés, pubescents dans leur jeunesse. Les feuilles sont grandes, profondément pinnatifides, composées de pinnules étroites, lancéolées, un peu dentées, presque incisives, aiguës, vertes à leurs deux faces, glabres, assez fermes; la principale nervure très-blanche. Quelquefois les feuilles terminales, celles qui occupent la base des pédoncules, sont fort étroites, très-longues, entières, linéaires, lancéolées, aiguës.

Les fleurs sont presque globuleuses, portées sur de très-longes pédoncules glabres, striés, simples; uniflores. Leur calice commun est plus court que les fleurs, composé d'écailles imbriquées, ovales, concaves, obtuses, un peu membranées à leurs bords, glabres ou légèrement pubescentes, vertes, d'un vert-blanchâtre ou tout-à-fait blanches. Les corolles sont blanches, nombreuses, divisées à leur limbe en quatre découpures presque égales; l'inférieure rabattue, un peu plus longue; le tube velu. Le réceptacle est hémisphérique, garni de paillettes linéaires, membranées, obtuses; les semences presque quadrangulaires, pubescentes, surmontées d'une très-petite couronne campanulée, fort courte, ciliée à ses bords.

Cette plante croît sur les montagnes crétacées, dans les départements méridionaux de la France, aux environs d'Aix & de Narbonne, où je l'ai recueillie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. x (*V. v.*)

9. SCABIEUSE corniculée. *Scabiosa corniculata*. Waldst.

*Scabiosa corollalis quadrifida, aequalibus; squamis obtusis, seminum angulis in corniculis excavatis*. Walst. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. pag. 11. tab. 13. — Perfoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 119. n°. 9.

Cette espèce paroît avoir des rapports avec la *scabiosa leucantha*. Ses tiges sont droites, rameuses, garnies de feuilles opposées, pinnatifides. Les fleurs sont terminales; les corolles tubulées, divisées à leur orifice en quatre découpures égales. Les calices sont composés d'écailles imbriquées, obtuses. Les semences sont anguleuses; chaque angle prolongé & terminé par un filament en forme de corne.

Cette plante croît dans la Hongrie & la Transylvanie, dans les sols arides.

10. SCABIEUSE de Transylvanie. *Scabiosa transylvanica*. Linn.

*Scabiosa corollalis quadrifida, aequalibus; calicibus paleisque aristatis, foliis radicalibus lyratis, caulibus pinnatifidis*. Linn. Syst. veget. pag. 142. n°. 3. — Roy. Lugd. Bat. 189. — Hort. Upland. 26.

V v v

— Mill. Dict. n°. 3. — Jacq. Hort. tab. 111. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1301. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 547. n°. 6. — All. Flor. pedem. n°. 504. tab. 48.

*Scabiosa altissima, annua, foliis agrimonia non-nihil similibus.* Herm. Lugd. Bat. 539. — Tourn. Inst. R. Herb. 464.

*Scabiosa annua, procerior, agrimonia folio; flore albo, globose.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 46. §. 6. tab. 13. fig. 13.

Ses tiges sont très-élevées, droites, hautes de trois à quatre pieds & plus, glabres, anguleuses, divisées en rameaux opposés, striés ou anguleux, très-ouverts, élancés, un peu rudes sur leurs angles, munis quelquefois de poils rares, plus nombreux à la base. Les feuilles radicales sont pétiolées, allongées, lancéolées, pinnatifides ou échan-crées en forme de lyre à leur contour, vertes à leurs deux faces, presque glabres; les lobes divisés à leurs bords en larges crénelures irrégulières. Les feuilles caulinaires sont plus profondément pinnatifides, opposées, cônées à leur base; les pinnules ovales, lancéolées, entières ou munies de quelques lobes ou crénelures; la foliole terminale beaucoup plus grande, allongée, étroite, très-aiguë, surtout au feuilles supérieures.

Les fleurs sont solitaires, terminales, portées sur de très-longs pédoncules roides, durs, striés, chargés d'aspérités sur leurs angles, presque glabres. Le calice commun est composé d'écaillés imbriquées, ovales, presque membraneuses, d'un vert-blanchâtre, marquées dans leur milieu d'une ligne purpurine, ciliées, scarieuses à leurs bords, très-aiguës & aristées à leur sommet. Les corolles sont blanches ou un peu jaunâtres, plus longues que le calice commun, à quatre découpures égales, obtuses; le tube pubescent extérieurement; le réceptacle convexe, un peu allongé, garni de paillettes aristées, semblables aux écailles du calice commun, mais plus étroites; les semences ovales, striées, anguleuses, couronnées par des dents courtes, aiguës, très-roides, subulées, au nombre de huit ou dix.

Cette plante croît dans la Transilvanie. On la cultive au Jar din des plantes de Paris. (V. v.)

11. SCABIEUSE mors du diable. *Scabiosa succisa*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, aequalibus; caule simpliciter, paucifloro; foliis lanceolato-ovatis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 249. n°. 1305.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, aequalibus; caule simplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 142. — Oeder. l'or. dan. tab. 279. — Hort. Cliff. 30. — Flor. suec. 112. 119. — Mater. medic. 49. — Blackw.

tab. 142. — Pollich. Pal. n°. 140. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 210. — Hoffm. Germ. 45. — Roth. Germ. vol. I. pag. 58. — Il. 161. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 350. n°. 936. XL. — Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 219. n°. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 548. n°. 9. — Gouan. Monip. pag. 62. n°. 3. — Dalib. Parif. 45. — Poir. Voyage en Barb. vol. 2. pag. 108.

*Scabiosa folio integro, glabro; flore caruleo.* Tourn. Inst. R. Herb. 466. — Garid. Aix. 430.

*Scabiosa pratensis, nostras, seu morfus diaboli.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 45. §. 6. tab. 13. fig. 7.

*Succisa glabra.* C. Bauh. Pin 169.

*Succisa, seu morfus diaboli.* Camer. Epit. 397. — Matth. Comm. 623. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 11. Icon. — Magn. Bot. Monsp. pag. 147. — Dalech. Hist. 1. pag. 1066. Icon.

*Succisa caule triflora, floribus convexis, foliis radicalibus ovatis, caulinis lanceolatis.* Hall. Helv. n°. 201.

§. *Scabiosa folio integro, hirsuto.* Tourn. Inst. R. Herb. pag. 466.

*Succisa hirsuta.* C. Bauh. Pin. 169.

γ. *Eadem, foliis subincisif, seu repandis; caule ramosiore.* (N.)

*Morfus diaboli.* Lobel. Icon. 546. — Idem, Observ. 295. Icon.

*Succisa, sive morfus diaboli.* Dod. Pempt. 124. Icon.

Ses racines sont courtes, assez grosses, un peu rudes, striées, fibreuses & comme rongées dans leur milieu; ce qui a fait donner à cette plante le nom de mors du diable, à ce que l'on prétend. Ses tiges sont droites, hautes d'environ deux pieds, feuillées, cylindriques, presque simples, ou munies vers leur sommet de quelques rameaux opposés, très-rapprochés des tiges, pubescents. Toutes les feuilles sont entières, pétiolées; les inférieures ovales, obtuses, assez grandes, glabres ou un peu velues, ciliées, & souvent un peu sinuées; les feuilles supérieures plus étroites, lancéolées, entières, aiguës, rétrécies à leur base, cônées à l'attache de leur pétiole, distantes.

Les fleurs sont peu nombreuses, solitaires, quelquefois au nombre de trois seulement, terminales, réunies en têtes convexes, supportées par des pédoncules simples, allongés, pubescents. Le calice commun est imbriqué de petites folioles vertes, presque planes, lancéolées, aiguës, inégales; les extérieures un peu plus grandes, à peine velues, plus courtes que les fleurs. Les corolles sont d'un bleu-vif, quelquefois blanches, toutes égales, divisées en quatre découpures régulières, chargées extérieurement sur leur tube de quelques poils

blanchâtres; les semences quadrangulaires, courtes, velues, surmontées par les calices propres, très-courts; l'extérieur à quatre petites dents; l'intérieur composé de quatre filets roides, courts, noirâtres; les étamines plus longues que la corolle.

Cette espèce offre plusieurs variétés: j'ai indiqué les plus remarquables. Ses feuilles sont, ou parfaitement glabres, ou plus ou moins velues, ciliées. La plante y a ses feuilles velues; les inférieures légèrement sinuées, ou crénelées, ou légèrement dentées en scie; les supérieures assez souvent plus ou moins profondément incisées, toutes lancéolées. Les fleurs sont aussi beaucoup plus nombreuses; les tiges rameuses presque dès leur base; les rameaux axillaires & opposés. Les fleurs, dans toutes ces variétés, sont quelquefois entièrement blanches, ou d'un bleu plus pâle: on rencontre aussi quelques individus prolifères.

Cette plante croît dans les prés un peu humides, partout en Europe.  $\frac{1}{2}$  (V. v.)

Cette scabieuse, dit M. Durande, est d'une fauve herbacée, un peu amère, astringente; elle a été recommandée contre les fleurs blanches: on s'en sert en gargarisme dans l'équinancie cararale; on l'applique sur les plaies. Les feuilles, avant le développement des fleurs, fournissent une teinture verte. Tous les bestiaux la mangent, excepté les cochons: elle convient dans les pâtures, mais elle tient trop de place dans les prairies, & acquiert, en séchant, trop de dureté. On ramasse cette plante en Suède, au mois de mai, & par la fermentation, comme pour le pissenot, on en retire une fécula qui colore en vert.

12. SCABIEUSE à fleurs entières. *Scabiosa integrifolia*. Linn.

*Scabiosa corollulis quadrifidis, radiantibus; foliis indivisis; radicalibus ovatis, serratis; rameis lanceolatis, caule herbaceo.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 142. — Hoffm. Germ. 45. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 58. — Il. pag. 164. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 548. n°. 10.

*Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis omnibus lanceolatis, serratis.* Linn. Spec. Plant. pag. 99. — Sauvag. Monip. 156. — Gouan, Monip. pag. 62. n°. 5.

*Scabiosa corollulis quadrifidis, caule fistuloso.* Gerard. Flor. gall. Prov. pag. 230. n°. 4.

*Scabiosa annua, integrifolia, seu foliis bellidis.* Magn. Botan. Monip. pag. 237. Tournef. Infl. R. Herb. 465.

*Scabiosa foliis lanceolatis, serratis & integris.* Hall. Helv. n°. 205.

*Scabiosa annua, centauroides, fistulosa.* ? Cupan. Hort. Cathol.

*Scabiosa bellidifolia.* Lam. Flot. franç. vol. 3. pag. 347. n°. 935. IV.

*Scabiosa (ferrata), corollulis quadrifidis, radiantibus; foliis indivisis; inferioribus petiolatis, ovato-acutis, serratis, superioribus lanceolatis.* ? Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 349. n°. 1306.

Lorsque l'on rapproche les caractères de cette espèce avec ceux de quelques variétés du *scabiosa succisa*, il est difficile de prononcer sur ceux qui les séparent: d'où il suit que la plante présentée ici par Linné peut laisser quelques doutes lorsqu'il est question de la reconnaître dans la nature, cet auteur n'en citant d'ailleurs aucune figure. Je la crois cependant distincte du *scabiosa succisa*, à en juger par un individu déficient à la vérité, que j'ai recueilli autrefois dans les environs d'Aix en Provence, qui convient parfaitement à la description de Linné.

Ses tiges sont hautes d'environ deux pieds, très-glabres ou peu velues, striées ou presque cylindriques, divisées en quelques rameaux étalés. Les feuilles radicales sont pétiolées, ovales, approchant un peu de celles de la paquerette, glabres, un peu rudes, médiocrement ciliées à leur partie inférieure, obtuses, entières, légèrement dentées ou crénelées à leur sommet, élargies vers leur partie supérieure, rétrécies insensiblement vers leur pétiole; ce qui les rend presque spatulées, quelquefois pinnatifides à leur base. Les feuilles caulinaires sont peu nombreuses, lancéolées, entières ou quelquefois pinnatifides; les supérieures très-longues, étroites, presque sessiles, entières, à peine dentées, légèrement ciliées.

Les fleurs forment de petites têtes terminales, portées sur de longs pédoncules simples, striés. Le calice commun est composé de plusieurs folioles imbriquées, lancéolées, bien plus courtes que les corolles, aiguës, inégales. Les corolles sont rougeâtres, étalées en rayons, à quatre divisions inégales, tellement qu'elles semblent labiées; la lèvres intérieure entière; l'extérieure à trois découpures linéaires. Le calice propre extérieur est court, denticulé à ses bords; le calice intérieur composé de quatre filets subulés, alongés, fécécés, d'un brun noirâtre, très-ouverts; les semences étroites, glabres, quadrangulaires.

Cette plante se rencontre dans les départements méridionaux de la France, aux environs d'Aix, de Montpellier, en Suisse, &c. (V. f.)

Observations. Le *scabiosa ferrata* des Illustrations de M. Lamarck me paroît appartenir davantage au *scabiosa succisa*, comme variétés, qu'à la plante dont il est ici question. La description que ce même savant en a donnée dans sa *Flore française*, est toute exacte, & convient parfaitement à la plante que j'ai observée en Provence, & que je regarde

V v v v 2

comme le *Scabiosa integrifolia* de Linné, expression qui d'ailleurs n'en donne pas une idée juste.

13. *SCABIEUSE amplexicaule. Scabiosa amplexicaulis*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; foliis amplexicaulis, lanceolatis, integerrimis; radialis trifidis, crenatis*. Linn. *Sylfl. veget.* pag. 144. n°. 9. — Mantiss. 195. — Willd. *Spec. Plant.* vol. 1. pag. 549. n°. 11.

β. *Scabiosa (lyrata), corollatis quadrifidis radiantibus; foliis inferioribus lyratis, obtusis, crenatis; superioribus lanceolatis, sessilibus*. Lam. *Illustr. Gen.* vol. 1. pag. 230. n°. 1310.

*Scabiosa minor, quarta*. Tabern. *Icon.* 162.

Cette espèce diffère du *Scabiosa integrifolia* par ses feuilles radicales, crénelées & incisées surtout vers leur base; par les feuilles caulinaires, élargies à leur partie inférieure, & amplexicaules; enfin par le calice commun plus grand.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied, chargées d'aspérités, rameuses; les rameaux ouverts, étalés. Les feuilles sont opposées; les radicales oblongues, un peu rudes, crénelées à leurs bords, presque pinnatifides à leur base, ou divisées en trois lobes; les latérales opposées, fort petits; les feuilles caulinaires sessiles, amplexicaules, lancéolées, très-entières à leurs bords, rétrécies vers leur sommet, élargies à leur base.

Les fleurs sont globuleuses, disposées en une sorte de panicule dichotome, solitaires, & supportées par de très-longes pédoncules simples. Leur calice commun est composé de plusieurs folioles imbriquées, presque aussi longues que la corolle; celle-ci est de couleur bleuâtre, divisée à son limbe en quatre lobes égaux; les corolles de la circonférence disposées en rayons.

On ignore le lieu natal de cette plante, qui a été cultivée au Jardin d'Upsal; elle parait se rapporter à l'espèce citée de C. Bauhin. ○ (*Descript. ex Linn.*)

La plante β pourrait bien n'être qu'une variété de la précédente, dont elle diffère par la couleur de ses fleurs, & par les divisions de ses feuilles; les feuilles inférieures sont longues, échanquées en forme de lyre; les lobes obtus, crénelés à leur contour; les feuilles supérieures lancéolées, sessiles; les fleurs sont de couleur de chair.

14. *SCABIEUSE des bois. Scabiosa silvatica*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; foliis omnibus indivisis, ovato-oblongis, serratis; caule hispido*. Linn. *Spec. Plant.* vol. 1. pag. 142. — Pollich. *Pal.* n°. 141. — Pallas, *Itiner.* vol. 2.

pag. 316. — Roth. *Germ.* vol. I. pag. 39. — II. 165. — Jacq. *Flor. austr.* vol. 4. tab. 361. — Hoffm. *Geim.* 46. — Lam. *Flor. franc.* vol. 3. pag. 348. n°. 936. — Idem, *Illustr. Gener.* vol. 1. pag. 250. n°. 1307. — Poiret, *Voyage en Barb.* vol. 2. pag. 109.

*Scabiosa caule hispido, foliis ovato-lanceolatis, subhirsutis, inferioribus dentatis*. Haller, *Helv.* n°. 204.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; foliis omnibus indivisis; inferioribus ovatis, serratis; summis lanceolatis, integerrimis; caule hispido*. Jacq. *Observ.* 1. pag. 28. — *Observ.* 3. p. 20. tab. 72.

*Scabiosa pannonica*. Jacq. *Vind.* 22.

*Scabiosa montana, latifolia, non laciniata, rubra & prima*. C. Bauh. *Pin.* 270. — Tourn. *Infl. R.* Herb. 464.

*Scabiosa maxima, dumetorum; folio non laciniato*. J. Bauh. *Hist.* 3. pag. 10. *Icon. Bona.* — Fabric. *Helmsl.* 162. 163.

*Scabiosa latifolia, rubro flore, secunda*. Clus. *Hist.* 2. pag. 1. lc.

*Scabiosa latifolia, purpurascens flore*. Clus. *Hist.* 2. l. c.

*Scabiosa rubra, austriaca*. Lobel. *lc.* 518.

*Scabiosa latifolia, rubro flore, prima*. Clus. *Stirp. Pannon.* pag. 555. tab. 556.

β. *Eadem, foliis minoribus, subdentatis*. (N.)

Cette plante peut avoir des rapports avec le *Scabiosa integrifolia*; mais elle s'en distingue au premier aspect, par ses tiges velues, par ses feuilles larges, également velues, lancéolées, aiguës.

Ses tiges sont droites, fistuleuses, cylindriques, très-finement striées, chargées de poils longs & un peu roides, souvent marquées de points d'un brun-rougeâtre, munies de rameaux étalés, opposés. Les feuilles sont entières, grandes, ovales, lancéolées, pointues à leur sommet, d'un vert-sombre à leurs deux faces, médiocrement velues, citées à leurs bords, quelque fois presque glabres; les radicales pétiolées, lâchement dentées à leurs bords, ainsi que les feuilles caulinaires inférieures; les supérieures sessiles, cônées à leur base, à peine dentées; les terminales étroites, très-entières, presque amplexicaules, toutes traversées par une nervure blanchâtre avec d'autres nervures très-fines, latérales, presque simples.

Les fleurs ressemblent beaucoup à celles du *Scabiosa arvensis*; elles sont d'un bleu un peu rougeâtre, grandes, terminales, soutenues par de longs pédoncules pubescents, un peu rudes. Le calice commun est composé de folioles ovales, oblongues, aiguës, imbriquées, pubescentes, verdâ-

mes, entières, ciliées à leurs bords; les corolles de la circonférence radiées, plus grandes que celles du centre, parragées en quatre lobes presque égaux; le tube en forme d'entonnoir, un peu pubescent extérieurement; les semences velues; les deux calices propres, semblables à ceux du *scabiosa arvensis*; le réceptacle dépourvu de paillettes, garni de poils un peu toides, nombreux.

La plante se diffère de la précédente, par ses tiges à peine rameuses, moins élevées; par ses feuilles plus petites, presque acuminées à leur sommet, à peine dentées à leur contour.

Cette plante croit dans les bois, sur les montagnes, en France, dans les environs de Montpellier, en Allemagne, en Suisse, &c. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. J'ai trouvé la variété  $\gamma$  dans les bois aux environs de Soissons, sur les hauteurs.  $\gamma$  (V. v.)

15. SCABIEUSE à longues feuilles. *Scabiosa longifolia*. Waldst.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; foliis oblongis, lanceolatis, integerrimis; caule inferius glabro*. Waldst. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. p. 4. tab. 5. — Perfoon, Synops. Plant. vol. 1. pag. 120. n°. 21.

Cette plante approche beaucoup du *scabiosa flavatica*, dont elle diffère par ses feuilles plus allongées, entières à leurs bords; elle a des tiges droites, glabres à leur partie inférieure, velues vers leur sommet, rameuses; elles s'élèvent, en assez grand nombre, de racines divisées en plusieurs ramifications. Les feuilles sont opposées, oblongues, lancéolées, très-entières. Les fleurs sont terminales, d'un bleu-pâle; les corolles inégales entr'elles; celles de la circonférence étalées en rayons, à quatre divisions. Les semences sont velues.

Cette plante croît sur les hautes montagnes, dans la Hongrie.

16. SCABIEUSE de Tartarie. *Scabiosa tatarica*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; caule hirsuto; foliis lanceolatis, pinnatifidis; lobis imbricatis*. Linn. Syst. veget. pag. 144. n°. 21. — Crmel. Itiner. vol. 1. pag. 159. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 150. n°. 14.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; caule hirsuto, foliis pinnatifidis, laciniis subimbricatis*. Lam. illustr. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1308.

*Scabiosa altissima*. Mill. Dict. n°. 6.

*Scabiosa fusciculis quadrifidis, foliis pinnatifidis; laciniis lateralibus erectisculis*. Acl. Ups. 1744. pag. 11. tab. 1.

*Scabiosa altissima frigidum, triansecti*. Rai, Si ppl. 136. ?

C'est une des espèces les plus élevées de ce genre, remarquable par ses feuilles pinnatifides, dont les pinnules sont très-rapprochées, & qui quelquefois se recouvrent comme par imbrication. Ses fleurs sont jaunes, & forment de grosses têtes globuleuses.

Ses tiges sont droites, fermes, épaisses, fortement cannelées, hérissées de poils, hautes quelquefois de dix à douze pieds, striées, anguleuses, presque quadrangulaires, munies de rameaux droits, roides, striés, diffus. Les feuilles sont amples, pétiolées, lancéolées, pinnatifides, velues particulièrement à leur base, sur leur pétiole & le long de la nervure du milieu; les pinnules confluentes ou décurrentes à leur base, très-rapprochées, étroites, lancéolées, aiguës, très-entières, pubescentes; les feuilles canaliculées supérieures opposées, cônées à leur base.

Les fleurs sont nombreuses, presque fasciculées à l'extrémité des tiges & des rameaux, où elles forment de grosses têtes globuleuses, supportées par de très-longs pédoncules inégaux, quadrangulaires, striés, roides, pubescents à leur partie supérieure, souvent longs de plus d'un pied, simples, uniflores. Le calice commun est composé d'écales nombreuses, diffères, d'un vert-noirâtre, coriaces, velues, ovales, aiguës & mucronées à leur sommet, blanches en dedans, ciliées à leurs bords. Les corolles sont disposées en rayons à la circonférence, de couleur jaune, infundibuliformes, glabres, divisées à leur limbe en quatre lobes égaux, obtus à leur sommet. Les étamines sont au nombre de quatre, saillantes hors de la corolle; les filaments faibles, presque jetacés; les anthères oblongues, vacillantes, jaunâtres; les semences oblongues, aiguës, striées, noirâtres, enveloppées, dans toute leur longueur, par le calice propre extérieur, velu, qui les domine & les couronne de plusieurs dents courtes, aiguës; le calice extérieur très-court, déchiqueté, à son orifice, en plusieurs filets confus, sèches, blanchâtres, presque en pinceau. Le réceptacle est un peu ovale, oblong, garni de paillettes membraneuses, linéaires, très-aiguës, caduques, au moins aussi longues que les semences.

Cette plante croît dans la Tartarie. On la enlève au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres.  $\sigma$  (V. v.)

17. SCABIEUSE des champs. *Scabiosa arvensis*. Linn.

*Scabiosa corollatis quadrifidis, radiantibus; foliis pinnatifidis, incis; caule hirsuto*. Linn. Syst. veget. pag. 144. n°. 13. — Cæder. Flor. dan. 417. — Poll. Pal. n°. 142. — Hoffm. Germ. 46. — Roth. Germ.

vol. 1. pag. 59. — II. 164. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 550. n°. 15. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 120. n°. 5. — Gouan, Monsp. pag. 62. n°. 6. — Lam. Flor. fr. vol. 3. pag. 348. n°. 936. V. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 108.

*Scabiosa corollulæ quadrifidæ, radiantibus; foliis pinnatifidis, lobis diffusis, caule hispido.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 250. n°. 1309. tab. 57. fig. 1.

*Scabiosa corollulæ quadrifidæ, radiantibus; caule hispido, foliis pinnatifidis, lobis diffusis.* Linn. Spec. Plant. edit. 2. vol. 1. pag. 143. — Hort. Cliff. 31. — Flor. suec. n°. 110. 118. — Mart. medic. 49. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 210. n°. 3. — Gouan, Illustr. pag. 5. — Curtis, Lond. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 119.

*Scabiosa foliis petiolatis, ovato-lanceolatis, dentatis, superioribus semipinnatis.* Hall. Helv. n°. 206.

*Scabiosa pratensis, hirsuta, quæ officinarum.* Tournef. Inst. R. Herb. 464. — Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 45. § 6. tab. 13. fig. 1.

*Scabiosa pratensis, hirsuta.* C. Bauh. Pin. 269.

*Scabiosa.* Traguf. 242. Icon. — Fusch, Hist. 716. Icon.

*Scabiosa silvestris.* Blackw. tab. 185.

*Scabiosa arvensis, sive fgetalis.* Tabern. Icon. 159.

*Scabiosa major, communior, hirsuta, foliis laciniatis.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 2. Icon.

*Scabiosa officinarum, flore purpureo-caruleo.* Vaill. Agr. Academ. Paris. 1722. pag. 177.

β. *Scabiosa calice dilatato, flore longiore.* Willd. L. c.

γ. *Scabiosa (Jubia), corollis quinquefidis, radiantibus, aequalibus, involucri tetraphyllo.* Moench. Hall. n°. 116. tab. 3.

Cette plante a quelques rapports avec le *scabiosa tatarica*; mais outre qu'elle est bien moins élevée, & que les pinnules des feuilles sont plus dilatables entr'elles, elle en diffère encore par le réceptacle de ses fleurs, velu & sans paillettes.

Ses racines sont courtes, presque simples, un peu épaisses, médiocrement fibreuses; il s'en élève une tige droite, plus ou moins rameuse, filuleuse, cylindrique, haute d'environ deux pieds, un peu liliée, chargée de quelques poils rares & fins, tachetée quelquefois de points bruns, oblongs. Les feuilles sont opposées, pétioles; les radicales ovales, oblongues, aiguës, très-souvent entières & lâchement dentées à leur contour; les feuilles caulinaires inférieures lancéolées, médiocrement pinnatifides; la découpure terminale crénelée; les supérieures & terminales presque ailées

ou profondément pinnatifides, à pinnules écartées, confluentes à leur base, oblongues, linéaires, obtuses ou aiguës à leur sommet; la pinnule terminale assez grande, lancéolée, à une peu dentée, aiguë, toutes plus ou moins velues, ciliées, un peu épaisses.

Les fleurs sont disposées en têtes assez fortes, hémisphériques, supportées par de longs pédoncules liliés, velus, scarbes, simples, uniflores. Le calice commun est presque de la longueur des fleurs, composé de folioles verdâtres, velues, inégales, ovales ou lancéolées, munies de longs cils à leurs bords. Les corolles sont d'un bleu-rougeâtre, glabres; celles de la circonférence disposées en rayons, plus grandes que celles du centre, tubulées, évasées à leur limbe, & divisées en quatre lobes presque égaux, obtus, un peu allongés. Les semences sont ovales, linéaires, un peu rétrécies à leurs deux extrémités, velues, comprimées, à quatre côtes; les deux latérales presque en carène; le calice propre extérieur à quatre petites dents courtes; l'intérieur composé de plusieurs filets sétacés, presque fasciculés. Le réceptacle est très-velu, mais dépourvu de paillettes entre les fleurs.

Les feuilles présentent quelques variétés dans leurs découpures; elles sont tantôt très-profondément pinnatifides, quelquefois presque entières, glabres, plus ou moins velues. Les folioles du calice commun sont, dans quelques individus, très-dilatées, & plus longues que les fleurs. Celui-ci varie du blanc au bleu-rougeâtre. La plante y paroît n'être qu'une variété de cette espèce, dont le calice commun est à quatre folioles. Les corolles de la circonférence des fleurs ont cinq divisions égales entr'elles.

On rencontre cette plante assez communément en Europe, dans les prés, les champs, & sur le bord des chemins; elle croît également en Sibérie & sur les côtes de Barbarie. (V. v.)

Cette espèce passe pour détersive, sudorifique, expectorante, vulnéraire & astringente; elle est d'une saveur amère, un peu désagréable. On la recommande, comme dépurative, dans la toux catarrhe, l'asthme piteux, la fausse pulmonie, les dartres, la gale & autres maladies de la peau. Quoique d'une saveur forte & amère, elle est saine. Les bestiaux s'en accommodent très-bien; & comme elle croît volontiers sur les montagnes & qu'elle résiste aux sécheresses, on a proposé d'en faire des prairies artificielles. Les chèvres, les moutons, les chevaux, quelquefois les vaches, la mangent; les cochons n'en veulent point; elle a l'inconvénient de trop durcir en séchant.

\* \* Corolle à cinq divisions.

18. *SCABIEUSE columbaire. Scabiosa columbaria.* Linn.



*Scabiosa corollulæ quinquefidis, radiantibus; foliis radicalibus ovatis, crenatis; caulinis pinnatis, fetacatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 143. — Hort. Cliff. 3. — Flor. suec. n°. 111. 118. — Iter. Gott. 216. 228. — Royen, Lugd. Bat. 139. — Dalib. Parif. 45. — Sauvag. Monfp. 242. — Oeder. Flor. dan. tab. 314. — Pollich. Pal. n°. 143. — Gmel. Sibir. vol. 2. pag. 211. — Hoffm. Germ. 46. — Roth. Germ. 1. pag. 59. — Il. 166. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 352. n°. 936. XVIII. — Idem, Ill. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1317. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 220. n°. 7. — Gouan, Monfp. pag. 63. n°. 8. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 120.

*Succisa foliis imis ovatis, superioribus pinnatis; pinnis semipinnatis, acutis; ciliis flosculorum longitudine.* Haller, Helv. n°. 202.

*Scabiosa corollulæ quinquefidis; receptaculis foliaceis, foliis caulinis pinnatis, pinnis linearibus.* Scop. Carn. edit. 1. pag. 352. — Idem, edit. 2. n°. 140.

*Scabiosa capitulo globofo, major.* C. Bauh. Pin. 270. — Tournef. Infl. R. Herb. 465. — Morif. Oxon. — Hist. 3. pag. 47. §. 6. tab. 14. fig. 20. — Garidel, Aix.

*Scabiosa minor.* Camer. Epitom. 711. Icon. — Matth. Comment. 688. Icon.

*Scabiosa quinta.* Cluf. Hist. 2. pag. 2. Ic.

*Phyteuma.* Col. Phytob. tab. 22.

*Scabiosa media.* Dodon. Pempt. 122. Icon.

*Scabiosa Matthioli, minor.* Dalech. Hist. 1. pag. 1066. Icon.

*Scabiosa minor, five columbaria.* Lobel. Icon. 355. — Idem, Obferv. pag. 290. Ic.

*Scabiosa vulgaris.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 3. Icon.

*Scabiosa glabra, carnofa foliis virentibus.* Herm. Paradif. tab. 221.

*Astercephalus vulgaris, flore caruleo.* Vaill. Aët. Academ. Parif. 1722. pag. 179.

*Scabiosa capitulo globofo, minor.* C. Bauh. Pin. 270. — Tourn. Infl. R. Herb. 465. — Moif. Hist. 3. pag. 48. §. 6. tab. 14. fig. 21.

«. *Scabiosa fœuvelens.* Desf. Catal. Horr. Parif. pag. 110.

*Scabiosa columbaria, odorata.* Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 72.

*Scabiosa capitulo globofo.* C. Bauh. Pin. 271.

*Scabiosa minor.* I, II, III. Tabern. Icon. 160. 161.

*Scabiosa media.* Gerard, Hist. 720. Icon.

1. *Scabiosa profifera.* Lobel. Icon. 359. — Tabern. Hist. 549. Icon. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 5. Icon.

γ. *Scabiosa (asterocephala), foliis ad terram ovatis, ferratis; ad caulem pinnatis, angustifimis.* Thuill. Flor. parif. édit. 2. p. 72. — Haller, Gott. 352. — Dalib. Parif. 73.

δ. *Eadem foliis omnibus fubpinnatifidis; laciniis planis, fublinearibus.* (N.)

Cette plante eft très-variée, particulièrement dans les divifions de fes feuilles, qui tantôt font fimplement ailées, tantôt prefque deux fois ailées, ou du moins les pinnules pinnatifides, étroites, ou médiocrement élargies; ce qui pourroit introduire l'établiffement d'efpèces nouvelles appuyées fur des caractères variables; peut-être même le *Scabiosa graminia* devoit-il être réuni à cette efpece, que l'on diftingue à de groffes rêtes de fleurs bleuâtres; les corolles de la circonférence plus grandes & difpofées en rayons; le réceptacle garni de paillettes; les femences marquées de huit ftries.

Ses tiges font droites, cylindriques, fistuleufes, prefque glabres, finement ftries, hautes de deux à trois pieds & plus, muoies de rameaux diftus, nombreux, oppofés, élançés, quelquefois plus rares.

Les feuilles radicales font longuement pétiolées, entières, ovales ou ovales-oblongues, dentées en fcie à leurs bords plus ou moins profondément, décurrentes à leur bafe fur leur pétiole, pubefcentes, traversées dans leur longueur par une nervure blanchâtre; les feuilles caulinaires inférieures oppofées, fimplement ailées; les pinnules linéaires, médiocrement élargies, un peu confluentes, crénelées ou irrégulièrement dentées; la terminale ovale, obtufe, beaucoup plus large; les feuilles du milieu prefque deux fois ailées; les pinnules étroites, alongées, point confluentes, pinnatifides, leurs découpages linéaires lancéolées, aiguës, inégales, vertes, un peu épaiffes, glabres ou légèrement velues; les feuilles fupérieures fimplement ailées, à pinnules longues, étroites, entières, prefque fétacées.

Les fleurs forment une tête épaiffe, convexe; elles font terminales, aflez nombreuses, fupportées par de très-longes pédofcules fimples, droits, uniflores; leur calice commun eft compofé de dix à douze folioles ou découpages fimples, inégales, linéaires, lancéolées, aiguës ou fubulées, fouvern en partie réfléchies après la floraison, vertes, glabres, moins longues que les fleurs. Les corolles font bleuâtres ou violettes, quelquefois blanchâtres, tubulées, difpofées en rayons à la circonférence; aflez grandes, divifées à leur limbe en cinq lobes irréguliers; les corolles du centre plus petites, leurs lobes prefqu'égaux.

Les semences sont réunies en une tête arrondie, pubescentes, presque cylindriques, marquées d'environ huit cannelures latérales, couronnées par un double calice, l'extérieur court, membracé, campanulé, ouvert, un peu strié; l'intérieur composé de cinq filets pédiculés, ouverts en étoile, noirâtres ou bruns, plus courts que la corolle. Le réceptacle forme une tête oblongue, garni de paillettes étroites, un peu élargies à leur partie supérieure, plus courtes que les semences.

Parmi les variétés les plus remarquables de cette espèce, on peut distinguer :

1°. La plante  $\alpha$ , qui même pourroit en être séparée comme espèce, ayant des tiges plus basses, rameuses seulement vers leur sommet; des feuilles radicales étroites, lancéolées, entières, point dentées, ni ovales; des fleurs odorantes; le réceptacle garni d'écaillés spatulées & non linéaires; les filets qui terminent le calice intérieur, de couleur verdâtre & non noirâtres. On trouve cette plante à Fontainebleau, dans les terrains secs.

2°. La plante  $\beta$ , qui est prolifère tant à ses rameaux qu'à ses fleurs. J'en ai recueilli une fois singulière, dont les rameaux devenoient radicans à leur insertion après les premières pluies de l'automne; il en tortoit des racines & des feuilles, même sans que la plante fût couchée par terre. Ces feuilles étoient simples, ovales, cuneiformes vers leur pétiole, crénelées ou incisées à leurs bords, très-obtusés à leur sommet; les anciennes feuilles caulinaires ailées, à pinnules linéaires, oblongues, garnies de poils très-fins & longs. Je l'ai mentionnée dans mon voyage en Barbarie comme une variété du *Scabiosa graminifolia*; mais elle a bien plus de rapports avec celle dont il est ici question.

3°. La variété  $\gamma$ , qu'Haller regarde comme une espèce distincte, qui croît aux environs de Paris, que j'ai recueillie dans les environs de Marfeille sur des coteaux arides, à ses fleurs blanches, ses feuilles radicales velues, à découpages linéaires, obtusés, toutes les feuilles caulinaires, simplement pinnatifides. Enfin, j'en ai observé dans les environs de Soissons une autre variété  $\delta$ , dont les feuilles très-glabres étoient toutes ou simplement incisées dans certains individus, ou à demi-pinnatifides dans d'autres; les découpages larges, linéaires, très-inégaux: les corolles blanches ou d'un bleu tendre.

Ces plantes croissent dans les lieux secs & montagneux des contrées méridionales de l'Europe, en France, en Suisse, en Allemagne; on les rencontre également sur les côtes de l'Afrique septentrionale.  $\kappa$  (V. v.)

Cette plante est bonne dans les pâturages; elle est recherchée par les chèvres, les moutons & les

chevaux; elle occupe trop de place dans les prairies.

19. SCABIEUSE DE GRAMONT. *Scabiosa graminifolia*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, calicibus brevissimis; foliis caulinis bipinnatis, filiformibus*. Linn. Syst. veget. pag. 145. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 110. — Poir. Voy. en Barb. vol. 2. p. 109. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 551. n°. 18. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1316.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, foliis duplicatopinnatis, foliolis setaceis*. Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 220. n°. 6.

*Scabiosa (gramuntiana), corollulis trifidis; foliis caulinis tripinnatis, filiformibus*. Gouan, Hort. monsp. pag. 62. n°. 7. — Sauv. Monsp. 268.

*Scabiosa corollulis aequalibus quadrifidis, trifidis; foliis caulinis subtripinnatis*. Gouan, Flor. monsp. pag. 15. n°. 8.

*Scabiosa triandra*. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 99.

*Scabiosa capitulo globofo, foliis in tenuissimas laciniis divisis*. C. Bauh. Pin. 271. — Vaill. Herb. — Magnol, Botan. Monsp. 231.

Il est difficile de distinguer cette espèce du *Scabiosa columbaria* autrement que par son port. Ses tiges sont beaucoup plus courtes; ses feuilles inférieures velues, de couleur cendrée; les têtes de fleurs une fois plus petites. Les autres différences sont variables: d'où il suit que cette espèce ne pourroit être qu'une variété de la suivante.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu striées, hautes à peine d'un pied, un peu velues, particulièrement à leur partie inférieure, presque simples ou médiocrement rameuses. Les feuilles radicales sont velues, cendrées, profondément pinnatifides; les pinnules obtuses, point confluentes, dilantes; celles de la partie inférieure linéaires, entières; les supérieures insensiblement plus larges, obtuses, incisées ou dentées; la terminale souvent très-grande, ovale, lancéolée, fortement incisée; les feuilles caulinaires, la plupart deux fois ailées; les folioles linéaires, étroites, inégales, presque glabres.

Les fleurs sont disposées en petites têtes, un peu globuleuses à l'extrémité des tiges, supportées par de longs pédoncules grêles, élancés, filiformes, pubescents. Le calice commun est à plusieurs folioles étroites, linéaires, aiguës, sur un seul rang, réunies à leur base. Les corolles sont blanches ou légèrement bleuâtres, disposées en rayons à la circonférence; celles du centre un peu plus petites, à cinq divisions, quelque fois quatre ou trois. Les semences forment une petite tête

ronde,

ronde, un peu ovale; elles sont agrégées, profondément sillonnées; le calice propre extérieur est court, en forme de petit godet membraneux, scarieux; l'intérieur est composé de cinq à six filets sétacés, pédiculés, bruns ou noirâtres, allongés, très-ouverts; le réceptacle est garni de paillettes très-étroites.

Cette espèce croît dans les terrains secs & montagneux, dans les départements méridionaux de la France, dans la Barbarie. Je l'ai également recueillie dans les environs de Fougères (en Bretagne), département d'Ille & Vilaine. x (V. v.)

10. SCABIEUSE luisante. *Scabiosa lucida*. Vill.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis radicalibus lanceolatis, serratis; caulinis pinnatifidis, subsiliiformibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1318. — Villars, Dauph. 2. pag. 293. n°. 7.

Cette plante n'est peut-être qu'un variétés du *scabiosa columbaria*; elle se rapproche beaucoup de celle que j'ai indiquée par la lettre v.

Ses tiges s'élèvent à un ou deux pieds; elles sont glabres, cylindriques, un peu striées, à peine rameuses. Les feuilles sont très-glabres, luisantes; les radicales pétiolées, ovales-lancéolées, dentées en scie; les feuilles caulinaires opposées, à peine pétiolées, ailées, traversées longitudinalement par une nervure blanche; les pinnules linéaires ou presque filiformes, entières ou un peu incisées vers leur sommet, aiguës, distantes, point confluentes; la terminale élargie, irrégulièrement & profondément incisée.

Les fleurs sont d'un bleu-vif, terminales, portées sur des pédoncules longs, pubescens à leur partie supérieure. Leur calice commun est divisé en plusieurs folioles étroites, longues, inégales, un peu pubescens, plus courtes que les corolles, disposées sur un seul rang. Les corolles sont étendues en rayons à la circonférence, un peu plus grandes que celles du centre, infundibuliformes, divisées à leur limbe en cinq lobes inégaux, un peu velues sur le tube. Le calice propre extérieur est court, membraneux, campanulé, tronqué; l'intérieur composé de cinq filets noirâtres, presque aussi longs que la corolle; le réceptacle garni de paillettes étroites, beaucoup plus courtes que les semences.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, sur les lieux montagneux & ombragés. x (V. f.)

11. SCABIEUSE jaunâtre. *Scabiosa ochroleuca*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis bipinnatis, linearibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 146. — Jacq. Observ. 3. pag. 20. tab. 73. 74. Botanique. Tome VI.

— Gmel. Itin. 1. pag. 118. — Hoffm. Germ. 46. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 352. n°. 936. XIX. — Idem, Illustr. Gener. vol. 1. pag. 231. n°. 1320. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 559. n°. 39. — Gouan, Monip. pag. 63. n°. 10.

*Scabiosa tenuifolia*. Roth, Germ. vol. 1. pag. 59. — Il. pag. 167.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis linearibus pinnatis, radicalibus bipinnatis, petiolis perfoliatis*. Linn. Sp. c. Plant. & Mill. Dict. n°. 13.

*Scabiosa corollulis quadrifidis, foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, supernè incisiss*. Sauvag. Monip. pag. 251.

*Scabiosa multifida folio, flore flavescente*. Tourn. Inst. R. Herb. pag. 464. — C. Bauh. Pin. 270. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 48. 5. 6. tab. 13. fig. 23.

*Scabiosa multifida folio, albo flore, vel potius ochroleuco*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 8. Icon.

*Scabiosa ochroleuca flore, five septima Clusii*. Hist. 2. pag. 3.

*Scabiosa multifida folio, albo flore, tertia*. Clus. Stirp. Pannon. pag. 537. tab. 538.

a. *Scabiosa angustifolia, alba, altera*. C. Bauh. Pin. 270. — Tourn. Inst. R. Herb. 464.

*Scabiosa sulfurea, incisiss foliis*. Batrel. Icon. rar. tab. 770. fig. 2.

*Scabiosa major, alba*. Tabern. Icon. 163.

*Scabiosa major, pannonica, albo flore, quarta*. Clus. Stirp. Pann. pag. 539.

*Scabiosa polymorpha*. d. Weig. Observ. pag. 14.

Cette espèce a, dans la forme de ses feuilles, quelques rapports avec le *scabiosa columbaria*. Ses tiges sont droites, roides, cylindriques, un peu pubescens, hautes d'environ deux pieds, rameuses; les rameaux très-ouverts, étalés, souvent dichotomes. Les premières feuilles radicales sont entières, lancéolées, longuement pétiolées, crénelées à leur contour, obtuses à leur sommet, pubescens; les autres ailées; les pinnules sont pinnatifides; les feuilles caulinaires opposées, ailées, à pinnules étroites, linéaires, ordinairement très-entières; les terminales simples, linéaires, aiguës, cunées.

Les fleurs sont terminales, disposées en têtes convexes, soutenues par de longs pédoncules velus ou pubescens. Le calice commun est composé de plusieurs folioles inégales, linéaires, pubescens, un peu blanchâtres, assez souvent plus longues que les fleurs. Les corolles sont d'un blanc-jaunâtre; celles de la circonférence radiales, à cinq découpures; les fleurs du centre tubulées, à cinq lobes, presque tronquées. Les fruits sont

ovales, velus; le calice propre extérieur court, membraneux, tronqué; l'intérieur composé de cinq filamens noirâtres.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, & dans les prairies sèches de l'Allemagne. (V. v.)

22. SCABIEUSE de Saxe. *Scabiosa banatica*. Waldf.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis radicalibus lyratis, caulinis subbipinnatis, calicibus difformi aequantibus*. Waldf. & Kitaib. Plant. rar. Hungar. pag. 10. tab. 12. — Perfoon, Synop. Plant. vol. 1. pag. 121. n°. 51.

Cette espèce a des rapports avec la *Scabiosa ochroleuca*. Ses tiges sont droites, rameuses; les feuilles radicales oblongues, échancrées en lyte à leur contour; les feuilles caulinaires opposées, presque deux fois pinnatifides. Les fleurs sont terminales, rougeâtres; les corolles inégales; celles du centre étalées en rayons, à cinq découpures à leur limbe.

Cette plante croît dans la Saxe.

23. SCABIEUSE urcéolée. *Scabiosa urceolata*. Desfont.

*Scabiosa calice multifido, urceolato; corollis quinquefidis radiantibus; foliis subcarnosis, pinnatifidis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 122.

*Scabiosa (divaricata), corollulis quinquefidis, calice communi monophyllo, foliis subbipinnatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. n°. 1311.

*Scabiosa maritima, ruga canina foliis*. Boecon. Plant. Sic. pag. 74. tab. 40. fig. 31 & pag. 95. tab. 51. Certe ex herbario Boecon. — Monf. Oxon. Hist. 5. 6. tab. 13. fig. 24. — In herbario Vailantii, diversa species sub eadem denominatione. (Desfont.)

*Scabiosa (tutzfolia), corollulis quinquefidis; foliis pinnatis, summis linearibus; calicibus monophyllis, quinquefidis*. Vahl, Symb. 1. pag. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 553. n°. 22.

Cette plante se distingue particulièrement à ses calices communs, entiers, presque turbinés à leur base, divisés à leur partie supérieure en plusieurs découpures étroites, subulées; elle se rapporte d'ailleurs, par l'ensemble de ses feuilles, au *Scabiosa columbaria*.

Ses tiges sont droites, glabres, cylindriques, hautes de trois à quatre pieds, munies de rameaux nombreux, oppoés, étalés, grêles, dichotomes. Les feuilles sont glabres, opposées, luisantes, épaisses, un peu grasses; les feuilles radicales lancéolées & dentées; les inférieures & celles du milieu des tiges profondément pinnatifides; les

pinnules linéaires, entières ou dentées à leurs bords; les feuilles supérieures & celles des rameaux linéaires, subulées, très-entières.

Les fleurs sont réunies en petites têtes, à l'extrémité des rameaux, supportées par de très-longs pédoncules simples, dépourvus de feuilles, uniflores, striés. Leur calice commun est simple, monophylle, urcéolé, plus court que les corolles, divisé à son bord jusque vers sa moitié en six ou huit découpures étroites, aiguës, souvent alternativement plus petites. Les corolles sont disposées en rayons infundibuliformes, d'un jaune-pâle, divisées à leur limbe en cinq découpures irrégulières dans les fleurs de la circonférence, régulières dans celles du disque. Les étamines sont saillantes, au nombre de cinq; les filamens capillaires, un style; un stigmate. Le calice propre est double; l'extérieur court, à quatre dents obtuses; l'intérieur fort petit, composé de cinq filers étirés; les semences oblongues, glabres, cannelées, à quatre faces; le réceptacle chargé de paillettes convexes d'un côté, mucronées à leur sommet.

Cette plante a été recueillie, par M. Desfontaines, sur les bords de la mer, sur les côtes de l'Afrique septentrionale; elle croît également dans la Sicile & l'Italie. (Descript. ex Desfont.)

Je possède dans mon herbier quelques individus de cette plante, recueillis bien certainement en Barbarie ou dans les départemens méridionaux de la France; je ne me rappelle pas précisément dans lequel de ces deux pays; je les soupçonne des environs d'Aix en Provence. Dans ce cas, nous posséderions cette espèce en France.

24. SCABIEUSE à involucre de carotte. *Scabiosa daucoides*. Desfont.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis bipinnatis; calice communi villosa, pinnatifido*. Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 123. tab. 38.

Cette espèce a de très-grands rapports avec la *Scabiosa columbaria*; elle en diffère particulièrement par son calice commun, composé de folioles velues, rudes au toucher, simples ou médiocrement tamusées; les rameaux droits, effés. Les feuilles sont opposées, pubescentes; les feuilles radicales ovales ou ovales-oblongues, dentées à leur contour, obtuses à leur sommet, pinnatifides à leur base, pétioles; les feuilles caulinaires inférieures pinnatifides; la foliole ou le lobe terminal, ovale, obtus, denté; les feuilles du milieu deux fois ailées; les pinnules inégales, linéaires, aiguës; enfin, les feuilles supérieures simplement ailées; les pinnules linéaires, subulées.

Les fleurs sont solitaires, terminales, supportées par de longs pédoncules striés. Le calice commun est plus court que la corolle, composé de plusieurs folioles velues, pinnatifides. Les fleurs ressemblent

à celles du *scabiosa columbaria*. Les corolles sont bleues ou violettes ; celles de la circonférence disposées en rayons , à cinq divisions irrégulières ; celles des corolles du disque régulières ; le calice propre extérieur court, presque campanulé ; l'intérieur formé par cinq filaments subulés ; l'ovaire oblong, presque tétragone ; le réceptacle convexe, garni de paillettes membraneuses, subulées, convexes d'un côté ; cinq étamines ; un style ; un stigmate.

Cette plante a été recueillie, par M. Desfontaines, sur les collines, aux environs de la ville d'Alger. ( *Descript. ex Desfont. V. f.* )

15. SCABIEUSE à grandes fleurs. *Scabiosa grandiflora*. Desfont.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis racalibus oblongis, crenatis; caulibus pinnatifidis; pinnis lanceolato-linearibus, patulis*. Scop. Infub. 3. pag. 29. tab. 14. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 123.

*Scabiosa pyrenaica, villosa, cinerea, magno flore*. Tournef. Infl. R. Herb. 465.

*A. Atractophalus tomentosus, cinereus, foliis diffusis*. Vaill. Act. Academ. gall. 1722. pag. 180.

*Scabiosa (cinerea), corollulis quinquefidis, radiantibus; calice brevi; foliis pinnatis, cinerea-tomentosis*. Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 551. n°. 1319. — Lapeyr. Mff.

*Scabiosa (pyrenaica), corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis tomentosus, integris, dentatis & pinnatifidis; caule unifloro*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 552. n°. 20.

*Scabiosa pyrenaica*. Allion. Flor. pedem. n°. 512. tab. 25. fig. 2, & tab. 26. fig. 1.

*Scabiosa caule unifloro; foliis tomentosus, imis pinnatis; pinnis dentatis & semipinnatis; caulibus pinnatis*. Haller, Helv. n°. 207.

*Scabiosa multifida, alpina, repens*. Boccon. Muf. pag. 22. tab. 6.

*An scabiosa (Montpelienfis), corollulis quinquefidis, aequalibus; calice brevioribus; foliis omnibus pinnatis, ciliatis* ? Jacq. Icon. rar. 1. tab. 24. — Miscell. 2. pag. 320.

Cette plante diffère du *scabiosa columbaria* par ses corolles au moins d'un tiers plus grandes, par ses feuilles caulinaires simplement ailées ou pinnatifides, souvent cendrées, pubescentes ou tomenteuses.

Ses riges sont rameuses, pubescentes, & produisent plusieurs rejets. Les feuilles sont ou velues ou presque glabres ; les radicales pétiolées, ovales, dentées à leur contour, obtuses à leur sommet ; les feuilles caulinaires opposées, pinnati-

fides ; le lobe terminal très-grand, ovale dans les feuilles inférieures, lancéolé dans les supérieures.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des rameaux & des riges, supportées par de longs pédoncules ; elles sont de la grandeur de celles du *scabiosa atropurpurea*. Leur calice commun est partagé en plusieurs découpures linéaires, inégales, plus courtes que les fleurs. Les corolles sont grandes, disposées en rayons d'un jaune-pâle ou blanchâtres, à cinq divisions ; leur tube légèrement velu. Le calice propre extérieur est membraneux, denticulé ; l'intérieur pédicellé, composé de cinq filets sétacés, longs, bruns ou roussâtres ; les semences réunies en une tère ovale.

Cette plante croît dans les champs, sur les côtes de Barbarie, où elle a été recueillie par M. Desfontaines. ( *Descript. ex Desfont.* )

Observations. Il m'a paru que cette plante, du moins la variété A, étoit la même que celle qui croît dans les Pyrénées, & qu'il falloit y rapporter le *scabiosa cinerea* de Lamarck, & le *scabiosa pyrenaica* d'Allioni. Je n'y ai reconnu aucune différence essentielle, excepté quelques variétés dans les découpures des feuilles. Cette plante, lorsqu'elle croît sur les lieux élevés, est plus ou moins velue ; ses feuilles de couleur cendrée, ses tiges moins rameuses, moins élevées, quelquefois simples, à une seule fleur. ( *V. f.* )

16. SCABIEUSE de Sicile. *Scabiosa sicula*.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, aequalibus, caulice brevioribus; foliis lyrata-pinnatifidis*. Linn. Syst. veget. pag. 145. n°. 17. — Manrif. 196. — Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 551. n°. 1322. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 553. n°. 21.

*Scabiosa divaricata*. Jacq. Hort. 1. p. 5. tab. 15.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *scabiosa maritima*. Distinguez l'une & l'autre par la longueur des folioles de leur calice commun, qui surpassent de beaucoup les corolles, celle dont il s'agit ici en diffère par ses corolles presque toutes égales, celles de la circonférence n'étant point ou presque point ouvertes en rayons.

Ses riges sont grêles, herbacées, cylindriques, hautes d'environ un pied & plus, glabres, dichotomes, divisées en rameaux très-divariqués, roides, de couleur rougeâtre en vieillissant, à peine frisés. Les feuilles sont pétiolées, glabres ou garnies de quelques poils rares, très-fins ; les inférieures échancrées en forme de lyre ; celles qui occupent le milieu des tiges presque pinnatifides, à découpures étroites, linéaires, inégales, souvent très-courtes ; les supérieures & terminales entières, allongées, simples, fort étroites, linéaires.

Les fleurs sont presque globuleuses, supportées  
X x x x

par de longs pédoncules situés dans la dichotomie des rameaux ; roides, cylindriques, rudes, presque accrochans, divariqués, de couleur purpurine, à peine pubescens ou chargés de quelques poils tares & fins.

Le calice commun est composé de huit à dix folioles inégales, beaucoup plus longues que les corolles, ouvertes en étoile, linéaires, étroites, aiguës, verdâtres, un peu velues. Les corolles sont purpurines, un peu rougeâtres, quelquefois blanchâtres, toutes égales, un peu raiées à leur circonférence, d'une grandeur médiocre, pubescentes sur le tube, divisées à leur limbe en cinq lobes irréguliers, obtus. Les étamines sont blanches, plus longues que les corolles. Le calice propre extérieur campanulé, très-mince, membraneux, plissé, denticulé à ses bords, traversé par des lignes rouillâtres. Sa partie inférieure ou tubulée, qu'on regarde comme l'enveloppe propre de la semence, est velue, ovale, tronquée, marquée vers son sommet de plusieurs plis enfoncés, environ un nombre de huit, qui forment intérieurement autant de callosités. Le calice intérieur est pédicellé, formé de cinq filets sétacés, d'un pourpre-foncé, plus longs que les corolles. Le réceptacle est conique, garni de poils nombreux, en touffes, fins, sétacés, & de quelques paillettes rates, très-étroites, plus longues que les poils.

Cette plante croît dans la Sicile. On la cultive au Jardin du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. ○ (V. v.)

27. SCABIEUSE maritime *Scabiosa maritima*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus, calice brevioribus; foliis pinnatis; summis linearibus, integerrimis.* Linn. Syst. veget. pag. 145. n° 18. — Amoen. Acad. vol. 4. pag. 304. — Murray, Prodr. 139. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 252. n° 126. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 554. n° 23. — Lam. Flor. franç. vol. 3. p. 350. n° 936. XIV. — Gouan, Monsp. pag. 63. n° 12.

*Scabiosa maritima, parva.* Tournef. Inst. R. Herb. 465. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 7. Icon. — Magnol, Botan. Monsp. pag. 251.

*Scabiosa stellata, maritima, tenuifolia.* Morif. Oxon. Hist. 3. s. 6. tab. 15. fig. 19.

Il n'existe guère, entre cette espèce & le *Scabiosa ficula*, d'autre différence que dans les corolles disposées en rayons à leur circonférence, & plus grandes que celles du centre, tandis qu'elles sont toutes égales dans le *Scabiosa ficula*, & les rameaux bien plus divariqués.

Ses tiges sont droites, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, blanchâtres, quelquefois purpurines, cylindriques, garnies de quelques poils

diffus, divisées en rameaux nombreux, diffus, étalés, un peu rudes, divariqués, presque paniculés. Les feuilles sont presque glabres, vertes à leurs deux faces, pétiolées; les inférieures, profondément pinnatifides; les pinnules étroites, linéaires, confluentes ou décurrentes à leur base, un peu aiguës à leur sommet, inégales, entières; la pinnule terminale ordinairement plus allongée, plus large, entière ou incisée; les feuilles supérieures & terminales sessiles, opposées, très-longues, linéaires, lancéolées, très-entières, aiguës, fort ouvertes.

Les fleurs sont terminales, supportées par des pédoncules simples, longues, pileux, un peu rudes, grêles, ou opposés aux rameaux, ou situés dans leur bifurcation. Le calice commun est hémisphérique, composé ordinairement de huit folioles presque imbriquées, cinq extérieures, linéaires, plus grandes, plus longues que les fleurs, trois ou cinq intérieures plus courtes, plus étroites, aiguës, vertes, pileuses surtout à leur base, quelquefois obtuses. Les corolles sont blanches ou d'une teinte bleuâtre, grandes; celles de la circonférence disposées en rayons, plus grandes que celles du centre, pubescentes sur le tube, divisées à leur limbe en cinq découpures irrégulières, obtuses. Les semences & les deux calices propres, tant l'extérieur que l'intérieur, ressemblent parfaitement à ceux du *Scabiosa ficula*, ainsi que les réceptacles.

Cette plante croît en Europe, dans les lieux maritimes des contrées méridionales. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

La figure de Morifon conviendrait peut-être mieux au *Scabiosa ficula*, d'autant plus que les corolles y paroissent toutes égales.

28. SCABIEUSE à petites fleurs. *Scabiosa parviflora*. Desfont.

*Scabiosa caule dichotoma; foliis inferioribus obovatis, crenatis; corollulis subaequalibus, quadrifidis; capsulis ovoidis; calice proprio interiore brevissimo.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 119.

*Scabiosa ficula, cardiaca folio.* Tournef. Inst. R. Herb. 465.

*Scabiosa alpina, hieraci folio.* Boccon. Mus. tab. 120.

*Astercephalus annuus, foliis imis senectutis retusis.* Vailant. Ad. Acad. Paris. 1721. pag. 181.

*Scabiosa dichotoma.* Cyrtill.

Ses tiges sont velues, droites, hautes d'environ un pied & demi, dichotomes, garnies de feuilles médiocrement velues, opposées; les inférieures en ovale renversé, incisées ou crénelées à leur contour; les crémélures larges, inégales, obtuses;

tes feuilles supérieures pinnatifides à leur base; la pinnule terminale beaucoup plus grande.

Les fleurs font terminales, disposées en petites têtes denses, allongées à la maturité des fruits; les nues pédonculées & situées dans la bifurcation des rameaux; les autres placées plus bas & sessiles. Le calice commun est composé de plusieurs folioles linéaires, inégales, plus courtes que les fleurs, entièrement rebattues sur les pédoncules à l'époque de la maturité des fruits; les corolles un peu inégales entr'elles, légèrement velues, petites, irrégulières, divisées à leur limbe en quatre ou cinq lobes. Le calice propre extérieur & court, petit, membraneux; l'intérieur extrêmement petit, radié; les semences médiocrement velues & cannelées; le réceptacle grêle, allongé, garni de poils sétacés. Cette plante a été recueillie par M. Desfontaines dans les environs d'Alger; elle croît également en Sicile & dans l'orient. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (*Descript. ex Desfont.*)

29. SCABIEUSE à tige simple. *Scabiosa simplex*. Desfont.

*Scabiosa caule supernè nudo; foliis bipinnatis, villosis; foliolis linearibus, acutis; calice feminis maximo, campanulato.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 125. tab. 39. fig. 1.

*Scabiosa stellata, minima.* Tourn. Inst. R. Herb. 465. — C. Bauh. Pin. 271. & Prodr. 126.

*Scabiosa cum pulchro femine, minor.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 7. Ic.

*Scabiosa tenuifolia, femine membranaceo.* Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 50. §. 6. tab. 15. fig. 42. *Sed pappus membranaceus minor.*

*Phyteuma.* Col. Phyt. 98.

*Scabiosa (stellata).* Var.  $\gamma$ . Linn. Syst. Plant. vol. 1. pag. 282. n°. 16.

Cette espèce a, par sa fructification, des rapports avec la *scabiosa stellata*: elle en diffère par ses tiges ordinairement simples, par les feuilles presque deux fois ailées, velues, à pinnules très-étroites; elle est d'ailleurs remarquable par la grandeur du calice propre extérieur. Quoique M. Desfontaines n'ait pas cru devoir ajouter de synonymie à cette espèce, j'ai hasardé de la rapporter à la plante citée par Tournefort, Gaspard, Bauhin, &c., ayant recueilli moi-même cette plante dans les environs d'Aix en Provence. Jean Bauhin en parle comme l'ayant reçue également du même pays; mais la figure qu'il avoit déjà fait graver & que je cite, appartient à une variété de cette même plante, à tige médiocrement rameuse & plus élevée.

Ses tiges font droites, simples, cylindriques, un peu velues, légèrement striées, rudes au tou-

cher, hautes au plus d'un pied, nues dans leur partie supérieure, quelquefois un peu rameuses, d'un blanc-cendré, garnies de feuilles opposées, médiocrement pétioolées, connées à leur base, velues, d'un vert-cendré; la plupart deux fois ailées; les pinnules étroites, linéaires, inégales, entières, un peu aiguës à leur sommet.

Les fleurs sont solitaires à l'extrémité des tiges, où elles forment une tête globuleuse, à laquelle la partie nue & supérieure des tiges sert de pédoncule. Leur calice commun est plus court que les fleurs ou à peine de même longueur, divisé en plusieurs folioles simples, linéaires, étroites, pubescentes, inégales, un peu subulées. Les corolles sont bleuâtres, divisées en cinq découpures à leur limbe, presque toutes égales, à peine radiées. Le calice propre extérieur est grand, membraneux, campanulé, ouvert, volu intérieurement à son orifice, d'un jaune-pâle, marqué de nervures nombreuses, brunes, en rayons divergens; sa base ou l'enveloppe particulière des semences est profondément striée, couverte de poils droits, fins, touffus, sétacés; elle renferme une semence nue, ovale, blanchâtre; le calice intérieur composé de cinq rayons ouverts en étoile, un peu ovale à leur base, terminé par un filet subulé un peu plus long que le calice extérieur. Le réceptacle est convexe, garni de pailettes ovales, membraneuses, un peu concaves, acuminées à leur sommet.

J'ai recueilli cette plante sur les collines arides des environs d'Aix. M. Desfontaines l'a également observée dans les environs d'Alger. (V. v.)

30. SCABIEUSE étoilée. *Scabiosa stellata*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis diffusis, receptaculis florum subrotundis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. — Hort. Cliffort. 31. — Hort. Upsal. 26. — Royen, Lugd. Bat. 189. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 252. n°. 1328. — Idem, Flor. franç. vol. 3. pag. 351. n°. 936. XVI. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 554. n°. 24. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 124. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 220. n°. 8.

*Scabiosa stellata, folio laciniato, major.* Tourn. Inst. R. Herb. 465. — C. Bauhin, Pin. 271. — Schaw. Specim. n°. 532. — Garid. Aix. pag. 429. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 50. §. 6. tab. 15. fig. 39.

*Scabiosa hispanica Clusii, major.* Dalech. Hist. 2. pag. 1110. Ic.

*Scabiosa major, hispanica, sive prima.* Clus. Hist. 2. pag. 1. Ic. — Tabern. Ic. 159.

*Scabiosa major, hispanica, flore albo.* Lobel, Ic. 539. — Idem, Observ. pag. 292. Ic.

*Scabiosa peregrina*. Dodon. Pempt. 122. Ic.

*Scabiosa major, cum pulchro femina*. J. Bauhin, Hist. 3. pag. 9. Ic.

*Atherocephalus major, annuus, laciniatus, capite pulchro, globofo*. Vaill. Act. Acad. Paris. 1722. pag. 182.

*Scabiosa stellata, folio laciniato, minor*. Tourn. Inst. R. Herb. 465. — C. Bauh. Pin. 271. — Garid. Air. pag. 429. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 50. §. 6. tab. 15. fig. 40.

*Scabiosa minor, hispanica, fve secunda*. Cluf. Hist. 2. pag. 2.

*Scabiosa minima*. C. Bauh. Prodr. pag. 126. n. 5.

Cette espèce est remarquable par la grandeur & l'élégance du calice propre extérieur de ses corolles, & par les feuilles pinnatifides à leur base; le pinnule terminale grande, très-large, dentée ou incisée à son sommet.

Les tiges s'élèvent à la hauteur d'environ deux pieds; elles sont droites, pleines, dures, cylindriques, blanchâtres, rudes, obliquement anguleuses, plus ou moins velues, divisées, surtout vers leur partie supérieure, en ramifications opposées, striées, élançées. Les feuilles sont pétiolées, opposées, molles, d'un vert-blanchâtre, pileuses ou velues; les feuilles radicales entières, en forme de spatule, longuement pétiolées, dentées en scie à leur contour, obtuses à leur sommet, rétrécies & en partie décurrentes sur leur pétiole; les caulinares pinnatifides, ovales, oblongues; les pinnules étroites, lancéolées; les unes entières; d'autres plus ou moins incisées, obtuses ou un peu aiguës; la terminale très-grande, élargie, incisée ou dentée à sa partie supérieure. Les feuilles terminales sont quelquefois simplement découpées en lyre.

Les fleurs forment de grosses têtes globuleuses, terminales, soutenues par des pédoncules très-longs, nus, roides, anguleux, striés, rudes au toucher, un peu velus. Le calice commun est composé de plusieurs folioles linéaires, verdâtres, velues, ciliées, au moins de la longueur des corolles; très-aiguës, rabattues sur les pédoncules après la floraison. Les corolles sont blanches ou d'un bleu-tendre, assez grandes; celles de la circonférence un peu plus grandes que celles du disque, tubuleuses, velues sur leur tube, divisées à leur limbe en cinq découpures inégales; les trois extérieures plus grandes; ces découpures sont plus régulières dans les fleurs du centre.

Le calice propre extérieur est très-grand, scabieux, campanulé, en roue, muni d'un grand nombre de nervures rouffâtres, divergentes. Sa partie inférieure ou l'enveloppe propre des semences

est très-velue, cannelée, terminée par huit cavités à jour; la semence qu'elle renferme est ovale, aiguë, très-velue. Le calice intérieur est ovale, aiguë, ouvert en une étroite noirâtre, à cinq rayons ovales, lancéolés à leur base, terminés par cinq filets plus longs que le calice extérieur. Le réceptacle est globuleux, garni de paillettes très-larges, concaves, minces, diaphanes, blanches, tubuleuses à leur sommet, plus longues que les semences. La variété *s* est beaucoup plus petite; les feuilles sont un peu moins divisées.

Cette plante croît dans les lieux stériles & maritimes des départements méridionaux de la France; on la rencontre également en Espagne & sur les côtes de la Barbarie; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Q (V. v.)

31. SCABIEUSE prolifère. *Scabiosa prolifera*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; floribus sessilibus; caule prolifero; foliis indivisis, subserratis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. — Mantiss. 329. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 554. n. 25. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 121. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 252. n. 1329.

*Scabiosa stellata, humilis, integrifolia, prolifera*. Herm. Paradis. 123. Icon.

*Scabiosa stellata, prolifera, annua*. Act. Acad. Paris. 1666. pag. 12.

*Atherocephalus annuus, humilis, integrifolius*. Vaill. Paris. Act. Acad. 1722. pag. 182.

On distingue cette espèce à ses têtes de fleurs globuleuses, presque sessiles ou médiocrement pédonculées, de couleur jaunâtre; & à ses feuilles simples, dentées en scie ou entières.

Ses tiges sont droites, pleines, d'un blanc-verdâtre, striées, médiocrement velues, hautes d'environ un pied & plus, dichotomes & prolifères, garnies de feuilles simples, opposées, ovales-oblongues, lancéolées, velues, ciliées à leurs bords; les inférieures beaucoup plus larges, ovales, obtuses, décurrentes à leur base sur un pétiole allongé, lâchement dentées en scie à leur contour; les supérieures sessiles, cônées à leur base, oblongues, pubescentes, entières à leurs bords, obtuses & quelquefois échançées à leur sommet, molles, vertes à leurs deux faces.

Les fleurs sont situées dans la bifurcation des tiges presque sessiles, ou supportées par des pédoncules courts, rudes, velus, striés, simples, uniflores. Le calice commun est composé de plusieurs folioles simples, linéaires, inégales, étroites, lancéolées, obtuses, très-velues à leur base, un peu plus longues que les fleurs. Les corolles sont d'un jaune-clair, tubuleuses, pubescentes &



celles de la circonférence disposées en rayons, un peu plus grandes que celles du centre ; divisées à leur limbe en cinq découpures irrégulières ; les trois extérieures plus grandes, crénelées à leur sommet.

Le calice propre extérieur est grand, membraneux, scarieux, campanulé, légèrement denticulé à ses bords, muni de stries nombreuses, divergentes, d'un brun-jaunâtre ; le calice intérieur pédonculé, ouvert en étoile, composé de cinq filets sétacés, velus à leur base, à peine aussi longs que le calice extérieur. Les fruits sont ovales, courts, tronqués, entièrement enveloppés par une aigrette de poils touffus, blanchâtres & soyeux. Le réceptacle est garni de paillottes fines, sétacées, terminées par une aigrette de poils fins, serrés, presque en pinceau.

Cette plante croît dans l'Égypte & sur les côtes de Barbarie, au milieu des campagnes. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. ○ (V. v.)

32. SCABIEUSE des veuves. *Scabiosa atropurpurea*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus ; foliis dissectis, receptaculis forum subulatis*. Linn. Syst. veget. pag. 145. n.º 21. — Hort. Cliff. 31. — Hort. Upi. 26. — Mill. Dict. n.º 15. — Lam. Ill. Genet. vol. 1. pag. 252. n.º 1224. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 555. n.º 26. — Gouan, Hort. Monsp. pag. 63. n.º 9.

*Scabiosa peregrina, rubra ; capite oblongo*. C. Bauh. Pin. 270. — Tourn. Inst. R. Herb. 464. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 48. §. 6. tab. 14. fig. 26.

*Scabiosa sexta, indico*. Clus. Hist. 2. pag. 3. Ic.

*Scabiosa rubra, peregrina, quibusdam indica*. J. Bauh. Hist. 3. pag. 6. Icon. Malo.

§. *Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, nigricante ; odore zibethi*. Tourn. Inst. R. Herb. 465. — C. Bauh. Pin. 270.

γ. *Scabiosa peregrina, capitulo oblongo ; flore carneo*. Tourn. Inst. R. Herb. 464.

δ. *Scabiosa peregrina, capitulo oblongo, flore variegato*. Tourn. Inst. R. Herb. 464.

ι. *Scabiosa rosea*. Hort. Paris.

ζ. *Scabiosa indica, prolifera*. Hort. Edinb. — Tourn. Inst. R. Herb. 465.

*Scabiosa indica, prolifera flore Clusi*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 48. §. 6. tab. 14. fig. 27.

ο. *Scabiosa indica, dupliciter prolifera, Muntingii*. Morif. Hist. 3. pag. 48. §. 6. tab. 14. fig. 28.

C'est une des espèces de scabieuses, que l'on se plaît le plus généralement à cultiver dans tous les

jardins, comme plante d'ornement, & qui procure un grand nombre de variétés par le mélange de ses couleurs. Les unes sont d'un pourpre tirant sur le noir, d'autres d'un pourpre-pâle ; les unes sont rouges ou de couleur de chair, les autres panachées : souvent ces mêmes fleurs deviennent prolifères, & l'on voit sortir du milieu d'une fleur inférieure un grand nombre de pédoncules presque fasciculés, qui soutiennent d'autres fleurs beaucoup plus petites. Nous nous sommes bornés à indiquer les variétés les plus remarquables. Ces fleurs ajoutent, à leurs belles couleurs, l'avantage de durer assez long-temps, & de répandre une odeur douce, agréable.

Leurs tiges s'élèvent à la hauteur de trois ou quatre pieds ; elles sont droites, fermes, cylindriques, glabres, striées, munies de rameaux opposés, nombreux & diffus. Leurs feuilles varient beaucoup, mais en général les inférieures sont oblongues, lancéolées, presque simples, incisées ou dentées à leur contour, pileuses ou légèrement velues, décurrentes à leur base sur leur pétiole ; les supérieures opposées, presque sessiles, profondément pinnatifides à leur base ; les pinnules decurrentes, étroites, linéaires, entières, quelquefois lâchement denticulées ; la pinnule terminale bien plus grande, lancéolée, incisée ou crénelée ; quelquefois entière, obtuse, ou plus souvent aiguë à son sommet.

Les fleurs sont nombreuses, fouettées par de longs pédoncules striés, un peu rudes. Le calice commun est divisé ordinairement en huit ou douze folioles inégales, alternativement plus courtes, au moins de la longueur des corolles ; vortées, pubescentes, ciliées, linéaires, aiguës, réfléchies après la floraison. Les fleurs forment un disque convexe, assez grand ; les corolles de la circonférence radiées, divisées à leur limbe en cinq découpures inégales ; celles du centre plus courtes, plus régulières ; les étamines un peu plus longues que les corolles ; les anthères blanchâtres ou d'un jaune-pâle. Le réceptacle est étroit, subulé, chargé de paillottes linéaires, étroites, très-aiguës, glabres, coriaces. Les fruits sont glabres, presque tétragones, à angles mousses, couronnés par le calice propre extérieur court, un peu campanulé, plissé ou roulé à ses bords. Le calice intérieur est supporté par un pédicule filiforme, & se divise en cinq filets sétacés, ouverts, d'un brun-noirâtre, beaucoup plus long que le calice extérieur.

On soupçonne cette plante originaire des Indes ; elle se cultive depuis long-temps dans les jardins, ○ (V. v.)

33. SCABIEUSE argentée. *Scabiosa argentea*, Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus ; foliis*

*pinnatifidis*; *lacinii linearibus*, *pedunculis longissimis*, *caule tereti*. Linn. Syst. veget. pag. 145. n°. 22.  
— Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1323.

*Scabiosa corollulis quinquefidis*, *foliis pinnatis*; *lacinii lanceolatis*; *pedunculis nudis*, *levibus*, *longissimis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 143.  
— Royen, Lugd. Bat. 190. — Miller, Dict. n°. 14.  
— Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 121.

*Scabiosa orientalis*, *argentea*, *foliis inferioribus incisfis*. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 34.

*Scabiosa argentea*, *major*. Wheel, Itin.

*Astercephalus perennis*, *argenteus*, *laciniiatus*; *caule tenui*, *churneo*. Vaill. Act. Acad. Paris. 1722. pag. 181.

A. *Scabiosa orientalis*, *hirsuta*, *tenuissimè laciniiata*; *flore parvo*, *purpureo* & *caudicante*. Tournef. Coroll. 34. — Vaill. Herb. — Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 122.

Cette plante a des tiges droites, chargées de poils rares & blanchâtres. Les feuilles sont linéaires, pinnatifides; les radicales presque dentées; les feuilles caulinaires entières, ciliées à leur base. Les calices communs sont divisés en huit folioles de la longueur de la corolle, recourbées après la floraison, très-velues à leur base.

Les corolles sont blanches, bleuâtres à la circonférence, où elles sont ordinairement au nombre de six, beaucoup plus grandes que celles du centre, divisées à leur limbe en cinq découpures, presque séparées en deux lèvres; la lèvre supérieure très-courte, à deux lobes; la lèvre inférieure élargie, à trois découpures égales, obtuses, un peu plissées; les corolles du centre plus petites, velues en dehors, à cinq lobes réguliers. (*Descript. ex Linn.*)

M. Desfontaines rapporte à la même espèce la plante A, qu'il a recueillie dans la Barbarie. Voici, d'après ce savant professeur, les caractères qu'elle présente. Ses tiges sont droites, rudes, velues, dichotomes; les feuilles velues; les radicales étroites, spatulées, obtuses à leur sommet, dentées, découronnées sur leur pétiole; les feuilles caulinaires profondément pinnatifides; les pinnales distinctes, linéaires, lancéolées, très-entières ou quelquefois médiocrement dentées.

Les fleurs sont supportées par des pédoncules filiformes, simples, allongés, uniflores. Le calice commun est à plusieurs divisions profondes, velues, plus longues que les fleurs, droites, linéaires, inégales, réfléchies à l'époque de la maturité. Les corolles sont radiales, blanches ou couleur de rose, soyeuses en dehors, à cinq découpures. Les semences sont réunies en une tête arrondie; leur calice propre extérieur campanulé, en roue, scarieux, denticulé, strié; l'intérieur plus long,

composé de cinq filets sétacés & rouffâtres; les semences cylindriques, velues à leur base, marquées de huit à neuf cavités profondes. Quelquefois les tiges & les feuilles sont glabres.

Ces plantes croissent dans le Levant. La variété A se trouve aussi en Barbarie, dans les environs d'Alger. ✕

#### 34. SCABIEUSE tomenteuse. *Scabiosa tomentosa*. Cavan.

*Scabiosa corollulis quinquefidis*, *inaequalibus*; *foliis tomentosis*; *radicalibus pinnatifidis*, *caespitosi*; *caulinis pinnato-linearibus*. Cavan. Icon. rar. vol. 2. pag. 66. tab. 183. — Pers. Synopf. Plant. vol. 1. pag. 120. n°. 28.

Ses racines produisent une tige haute d'environ un pied, glabre, cylindrique, presque nue, dont les feuilles sont tomenteuses, d'un blanc-cendré; les radicales très-nombreuses, étendues sur la terre, la plupart pinnatifides; les pinnales tantôt entières & obtuses, tantôt crénelées; les feuilles caulinaires, au nombre de deux ou quatre au plus, situées à la partie inférieure des tiges, opposées, sessiles, conniventes à leur base, ailées; les pinnales linéaires; la terminale plus allongée.

Les fleurs sont agrégées, situées à l'extrémité des riges. Le calice commun est composé de deux rangs de folioles, au nombre de douze; les extérieures plus longues, linéaires. Le calice propre extérieur est membraneux, strié, ouvert & crénelé à son limbe; l'intérieur terminé par cinq filets noirâtres, subulés, capillaires. La corolle est d'un violet-clair; son tube allongé; le limbe à cinq lobes inégaux, arrondis. Les filaments des étamines sont saillans hors de la corolle; les anthères violettes; le style plus court que la corolle; le stigmate en tête de clou; les semences glabres, striées, couronnées par les calices; le réceptacle chargé de pilules linéaires.

Cette plante croît dans le royaume de Valence, sur les montagnes & au bord des précipices. (*Descript. ex Cav.*)

#### 35. SCABIEUSE d'Afrique. *Scabiosa africana*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis*, *aqualibus*; *foliis simplicibus*, *incisfis*; *caule fruticoso*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. — Hort. Cliff. 31. — Roy. Lugd. Bar. 189. — Kniph. Centur. 7. n°. 182. — Berg. Plant. Capenf. pag. 32. — Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 252. n°. 1330. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 559. n°. 29.

*Scabiosa corollulis quinquefidis*; *foliis inferioribus integris*, *crenatis*; *caulinis inciso-crenatis*, *caule fruticoso*. Miller, Dict. n°. 17.

*Scabiosa africana*, *frutescens*; *rugosis* & *crenatis* *foliis*,

*foliis, capite rotundo.* Herm. Paradis. pag. 219. tab. 219.

8. *Scabiosa africana, frutescens, maxima; foliis rugosa & crenatis, minor.* Herm. Parad. Bar. 210.

*Scabiosa africana, arborescens, maxima; foliis rugosa & crenatis, integris.* ? Herm. Parad. Prodr. — Tournef. Inst. R. Herb. 465.

9. *Scabiosa africana, frutescens, maxima; foliis tenuissimè incisis.* Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 123.

*Scabiosa (cristata), corollulis quinquefidis; foliis inferioribus crenatis; cavinis duplicato-pinnatis; caule stratoso, hirsuto.* Mill. t. D. 2. n. 18.

10. *Scabiosa minor, arthiopica, frutescens; foliis lanuginosis; flore caruleo, purpureo.* etc. Ercyn. Prodrom. 2. pag. 83. — Leon. pag. 33. tab. 26.

Ses tiges sont droites, velues, plus ou moins frutescentes, ramuscules, foibles, munies de feuilles opposées, les inférieures allongées, simples, entières, crenelées ou incisées à leur contour; les feuilles supérieures sessiles, presque amplexicaules, d'un vert-clair, un peu velues, cunéiformes, fortement incisées ou de vrées, presque pinnatifides, longues d'environ deux pouces & plus, nervueuses & veinées; les terminales plus étroites, lancéolées, presque pinnatifides à leur base.

Les fleurs sont terminales, réunies en têtes foliaires, convexes, supportées par de très-longs pédoncules. Le calice commun est composé de plusieurs folioles lancéolées, velues, zigrées à leur sommet; les intérieures plus courtes. Les corolles sont de couleur de chair, un peu plus longues que le calice commun; celles du contour disposées en rayons, plus grandes que les corolles du centre, rubulées; le tube presque filiforme, velu extérieurement, divisé à son limbe en cinq lobes presque égaux, droits, arrondis à leur sommet ou obtus. Le calice propre extérieur est membraneux, trisé, tronqué; l'intérieur composé de cinq filets sétacés, plus longs que le calice extérieur, les semences solitaires, velues, anguleuses.

Cette plante offre plusieurs variétés, soit dans la couleur des fleurs, qui sont quelquefois d'un bleu tirant sur le pourpre, soit dans les feuilles plus ou moins divisées, plus ou moins velues, soit enfin dans l'élevation des tiges, dans leur dureté & leur grosseur.

Cette plante croît en Afrique, au Cap de Bonne-Espérance. h (V. f)

36. SCABIEUSE à tiges dures. *Scabiosa indurata.* Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; foliis ovato-lanceolatis, erectis, basi dentatis; caule rigente.* Linn. Syst. veg. pag. 146. n. 23. — Mantill. 196. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 555. n. 18. Botanique, Tome VI.

*Scabiosa altissima.* Jacq. Hort. 2. tab. 185.

Cette espèce a de tels rapports avec l'*Scabiosa africana*, qu'il est très-douteux qu'elle n'en soit pas une des variétés à feuilles moins divisées.

Ses tiges sont roides, dures, pubescentes, rameuses, hautes d'un & de plusieurs piés, garnies de feuilles simples, opposées, sessiles, ovales, lancéolées, longs de six à sept pouces, vertes, velues, presque rombueuses, rondes ou dentées en scie à leurs bords, plus profondément dentées à leur base, d'une à trois dentelures de chaque côté; celles des feuilles supérieures plus fines.

Les fleurs sont disposées en une panicule dichotome; la première bifurcation produit des pédoncules; les autres sont prolifères à leur sommet. Les pédoncules sont très-longs. Le calice commun est composé de dix folioles courtes, ouvertes, presque égales, point imbriquées. Les corolles sont d'un bleu-pâle; celles de la circonférence disposées en rayons, plus longues que le calice commun, divisées à leur limbe en cinq découpures. Les semences sont oblongues, marquées de huit filets. Le calice propre extérieur est membraneux; l'intérieur forme par cinq filets ouverts en étoile, plus longs que le calice extérieur. Le réceptacle est garni de paillottes sétacées.

Cette plante croît en Afrique. (Description, ex Linn.)

37. SCABIEUSE à feuilles de statice. *Scabiosa limonifolia.* Vahl.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, aequalibus; foliis cuneiformibus, integerrimis, subtus rugosis, incanis.* Vahl. Symbol. 2. pag. 27. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. n. 33.

*Scabiosa caphanensis, frutescens, laureola folia crassa, rotunda, lucida, molli, subtus incano.* Hort. Cathol. 196. — Rai, Hist. 3. pag. 238. n. 55.

*Scabiosa ficula, frutescens, laureola folio, subtus incano.* Tournef. Inst. R. Herb. pag. 465.

Ses tiges sont droites, simples, frutescentes à leur base; les feuilles inférieures, assez semblables à celles du *statice limonium*, mais plus petites, sont oblongues, agrégées, longues à peine d'un pouce, épaisses, glabres & sans nervures à leur face supérieure, veinées & ridées en dessous, entières, réfléchies à leur contour, échanquées à leur sommet, rétrécies en périole à leur base; ce qui les rend presque cunéiformes, blanchâtres à leur face inférieure.

Du centre de ces feuilles s'élèvent d'autres tiges florifères; elles sont munies, à la base des pédoncules inférieurs, de deux feuilles opposées, lancéolées, aiguës à leur sommet, garnies à leur partie inférieure, d'une dent de chaque côté; les

Y y y

feuilles supérieures sont linéaires. De l'aisselle des feuilles inférieures sortent deux pédoncules opposés, & trois autres des supérieures : ils sont latéraux & un peu tordus. Les corolles sont toutes égales, divisées à leur limbe en cinq découpures.

Cette plante se rencontre dans la Sicile. *h* (*Descript. ex Vahl.*)

18. SCABIEUSE de la Palestine. *Scabiosa palestina*.

*Scabiosa corollatis quinquefoliis, radiatis; laciniis omnibus trifidis, foliis indivisis, subserratis; fimbria basi pinnatifida.* Linn. Syst. veget. pag. 146. n°. 29. — Mantf. 37. — Jacq. Hort. tab. 87. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. n°. 36. — Lam. Illust. Genet. vol. 1. pag. 253. n°. 1334.

*Scabiosa corollatis radiantibus, multifidis; foliis caulinis appendiculatis.* Gouan. Illust. 5.

*Scabiosa minor, capitulo globoso, odore.* C. Bauh. Pin. 271. — Tourn. Inst. R. Herb. 465.

*Scabiosa parva, odorata; foliis maculis infestis.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 6.

*Scabiosa flore parvo, foliis ocyimi laciniatis, atque odoris.* Col. Echsp. 32.

Cette plante a des tiges cylindriques, hautes d'environ un pied. Les feuilles inférieures sont longuement pétiolées, très-larges, lancéolées, dentées ou incisées; les découpures rates, distantes, pubescentes; les feuilles supérieures linéaires-lancéolées, pinnatifides à leur base.

Les fleurs sont disposées en petites têtes globuleuses, supportées par de très-longs pédoncules. Leur calice commun est de la longueur des fleurs. Les corolles sont blanches ou d'un jaune-citron; & celles de la circonférence sont disposées en rayons, ou elles produisent un très-bel effet par les découpures de leur limbe, qui se divisent en cinq parties inégales; deux supérieures plus petites, trois inférieures plus grandes; les unes & les autres également divisées en trois découpures. Les semences, ainsi que les calices propres, extérieur & intérieur, & le réceptacle, sont les mêmes que dans le *scabiosa bellata*. Les feuilles ont une odeur approchant de celle du basilic.

Cette plante croît dans la Palestine & le Levant. *h*

39. SCABIEUSE en lyre. *Scabiosa lyrata*. Forsk.

*Scabiosa corollis radiantibus, laciniis integris; foliis inferioribus oblongis, serratis; superioribus basi pinnatifidis.* Vahl, Symbol. 2. pag. 27. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 558. n°. 35.

*Scabiosa lyrata, foliis radicalibus ovatis; cauli-*

*nis pinnatis.* Forsk. Flot. ægypt.-atab. pag. 203. n°. 6.

Cette espèce, qui a des rapports avec le *scabiosa palestina*, en diffère principalement par les corolles de la circonférence, dont le limbe est seulement partagé en trois lobes; elle a aussi quelques rapports avec le *scabiosa argentea*.

Ses tiges sont droites, cylindriques, légèrement tomentueuses, à peine rameuses ou simplement dichotomes à leur partie supérieure. Les feuilles sont opposées, pétiolées, un peu velues ou pileuses; les radicales ovales, presque entières, quelquefois un peu en lyre vers leur base; les feuilles caulinaires inférieures, oblongues, dentées en scie à leurs bords ou médiocrement incisées; les supérieures pinnatifides, à pinnules étroites, linéaires, presque entières, inégales.

Les fleurs sont terminales, soutenues par de longs pédoncules simples, glabres, un peu striés. Le calice commun est composé de plusieurs folioles linéaires, de la longueur des fleurs. Les corolles sont de couleur violette; celles de la circonférence radiales, tubuleuses, divisées, à leur limbe, en trois découpures simples; les corolles du centre plus courtes, à cinq lobes. Le calice propre extérieur est campanulé, membraneux, assez grand, strié, à nervures divergentes; le calice intérieur pédiculé, ouvert en étoile en cinq rayons sétacés. Les semences sont très-velues, cannelées; le réceptacle garni de paillettes concaves.

Cette plante croît dans le Levant, vers le détroit des Dardanelles. (*V. f. in herb. Lam.*)

40. SCABIEUSE d'Ukraine. *Scabiosa ucranica*.

*Scabiosa corollis quinquefoliis, radiantibus; foliis radicalibus pinnatifidis, caulinis linearibus, basi ciliatis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 144. — Syst. veget. pag. 146. n°. 31. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 559. n°. 38.

*Scabiosa foliis planis, carnosis; inferioribus pinnatis; ramis integerrimis, linearibus.* Gmel. Sibit. vol. 2. pag. 213. tab. 87.

Cette plante a des tiges droites, cylindriques, hautes de deux à trois pieds, glabres ou à peu velues, rameuses; les rameaux opposés, très-étalés, d'un vert pâle, un peu rougeâtres à leur sommet, garnis de feuilles opposées, pétiolées; les radicales pinnatifides, un peu charnues, à pinnules étroites, confluentes, obtuses; les inférieures simples, plus courtes que les autres; les supérieures monies de deux ou trois dentelures obtuses; la foliole terminale élargie, lobée ou incisée. Les feuilles caulinaires également ciliées, à pinnules plus étroites, entières, aiguës; les terminales très-étroites, simples, alongées, aiguës, très-

souvent ciliées vers leur base, ainsi que les feuilles inférieures.

Les fleurs sont assez nombreuses, petites, terminales, d'un vert-jaunâtre, longuement pédonculées. Le calice commun est composé de plusieurs folioles simples, inégales; la plupart plus longues que les fleurs, très-étroites, linéaires, aiguës. Les corolles sont radiales, divisées, à leur orifice, en cinq lobes inégaux; celles du centre plus courtes, moins irrégulières; les étamines & le pistil saillans. Le calice propre extérieur se termine par un limbe membraneux & blanchâtre; & l'intérieur par cinq filets bruns.

Cette plante croît dans plusieurs contrées de la Sibérie. ♀

41. SCABIEUSE d'Iser. *Scabiosa isetenfis*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus, calice longioribus; foliis bipinnatis, linearibus*. Linn. Syst. veget. pag. 146. n°. 30. — Mantiss. 37. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 253. n°. 1327. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 559. n°. 37.

*Scabiosa corollulis quinquefidis; foliis duplicatopinnatis, setacis*. Emel. Sibir., vol. 2. pag. 214. tab. 88. fig. 1.

Cette plante ressemble beaucoup par son port, au *scabiosa gromunda*; mais elle en diffère par sa frutification, qui la rapproche du *scabiosa steltata*.

Ses tiges sont un peu couchées à leur base, ascendantes, cylindriques, légèrement tomentueuses, simples ou très-peu rameuses, hautes d'environ un pied. Les feuilles sont opposées, pétiolées, garnies de poils roides; les inférieures sont presque deux fois ailées; les pinnules linéaires, irrégulièrement découpées à leurs bords; les feuilles supérieures simplement pinnatifides; les pinnules très étroites, presque sétacées.

Les fleurs sont terminales, solitaires, réunies en une tête un peu arrondie, supportées par de longs pédoncules un peu pubescens, simples, uniflores. Le calice commun est presque aussi long que les fleurs, composé de plusieurs folioles linéaires ouvertes, inégales. Les corolles sont blanches, rubulées, un peu velues sur leur tube; celles de la circonférence disposées en rayons, un peu plus longues que les corolles du centre, divisées à leur limbe en cinq lobes. Les semences sont velues, couronnées par le calice propre extérieur, membraneux, allongé, campanulé, muni de nervures roussâtres, divergentes. Le calice intérieur est composé de cinq filets sétacés, très-ouverts, un peu plus longs que le calice extérieur; le réceptacle garni de paillettes scarieuses.

Cette plante croît dans la Sibérie, sur les rochers.

42. SCABIEUSE pâle. *Scabiosa pumila*. Linn.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus, subcaulis; foliis pilosissimis; radicalibus lyratis; caulinis pinnatis, incis.* Linn. Mantiss. 156. — Burm. Prodrum. 4. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 556. n°. 31.

*Scabiosa (acaulis), corollis quinquefidis, radiantibus; calicis squamis, lanceolatis, brevioribus; foliis obovatis, incis.* ? Thunb. Prodrum. 29.

♂. *Scabiosa (nudicaulis), corollis quinquefidis, subradicantibus; caule nudo, unifloro; foliis pinnato-lobulatis, pilosis*. Lam. Illust. Gener. vol. 1. pag. 252. n°. 1331.

Cette plante a des tiges simples, souvent très-courtes, presque nulles, velues, cylindriques, garnies à leur base de feuilles, les unes radicales, entières, échancrées à leurs bords en forme de lyre, velues à leurs deux faces; les autres inférieures, caulinaires, opposées, pétiolées, simplement ailées, les pinnules incisées irrégulièrement, la plupart aiguës, hérissées d'un grand nombre de poils cendres.

Les fleurs sont réunies en une seule tête terminale, dont le calice commun est composé de plusieurs folioles presque imbriquées, simples, lancéolées, velues particulièrement à leur base, très-aiguës, inégales, plus courtes que les corolles; celles-ci sont radiales, divisées à leur orifice en cinq découpures inégales. Le calice propre extérieur est très-court, un peu campanulé, velu, comme tronqué à ses bords; l'intérieur est composé de cinq filamens noirâtres, droits, sétacés, à peine plus courts que les corolles.

La plante ♂ ne paroît différer de celle de Linné que par ses tiges plus élevées, hautes de six à huit pouces & plus, nues, très-simples, uniflores; les feuilles inférieures pinnées, très-velues.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance. La variété ♂ y a été également recueillie par M. Sonnerat, qui en a communiqué un exemplaire M. Lamarck. ♀ (V. f. in herb. Lam.)

43. SCABIEUSE sétifère. *Scabiosa setifera*. Lam.

*Scabiosa corollulis quinquefidis, radiantibus; calice brevi; foliis pinnatis, inferioribus ovato-foliatatis*. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 251. n°. 1321.

Cette espèce est remarquable par les corolles blanchâtres, son réceptacle conique, convexe; le calice propre intérieur formé de longs poils noirâtres, très-roides, sétacés.

Ses tiges sont cylindriques, médiocrement striées, un peu quadrangulaires à leur partie supérieure, rameuses, hautes au moins de deux pieds, pubescentes, garnies de feuilles opposées, pétiolées; les inférieures entières, ovales, spa-

Y y y 2

tulées, crénelées ou incisées à leur contour, légèrement velues; les supérieures ailées, à pinnules distantes, linéaires, lancéolées, oblongues, obtuses, presque entières, alternes, à peine décurren-tes; la foliole terminale plus grande, forte-ment incisée ou lobée.

Les fleurs sont terminales, solitaires, suppor-tées par des pédoncules opposés, longs, très-ou-verts, glabres, striés, unilocles : le calice com-mun composé de plusieurs folioles presque imbric-quées, lancéolées, aiguës, pubescentes, beau-coup plus courtes que les fleurs. Celles-ci sont blanchâtres, radiées, divisées à leur orifice en cinq découpures presque irrégulières. Le calice propre extérieur est presque membraneux, cam-panulé, à rebords courts, entiers, l'intérieur composé de cinq filaments tubulés, noisâtres, ou-verts en étoile; le réceptacle allongé, oval, convexe, un peu conique, garni de paillettes coriaces, étroites, un peu plus courtes que les se-mences, un peu aiguës.

Cette plante croît dans les départements méridi-onaux de la France. Je l'ai recueillie aux environs de Marseille. ♀ (V. v.)

#### 44. SCABIEUSE à aigrettes. *Scabiosa papposa*.

*Scabiosa corollatis quinquefidis, inaequalibus; caule herbaceo, erecto; foliis pinnatifidis; seminibus aristatis, plumosoque papposis.* Linn. Syst. veget. pag. 123. Willd. Illustr. vol. 1. pag. 253. n°. 1335. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 560. n°. 40.

*Scabiosa corollatis quinquefidis; caule herbaceo; calicibus foliosis, flore superantibus; pappo plumoso.* Linn. ed. 1. pag. 161. — Gouan, Monsp. pag. 63. n°. 11.

*Scabiosa cretica, capitulo pappo mientente.* Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. pag. 34. — Boerh. Lugd. Bat. 1. pag. 130.

*Scabiosa corollatis quinquefidis, caule herbaceo; calicibus foliosis, flore superantibus; pappo plumoso.* Royen, Lugd. Bat. 189.

Cette espèce est distinguée par la finesse des pinnules de ses feuilles, plus particulièrement par le calice propre intérieur ou l'espèce d'aigrette plumeuse qui couronne ses semences.

Ses tiges sont droites, filiformes, cylindriques, à peine pubescentes, divisées en quelques rameaux opposés, très-grêles. Les feuilles sont pétiolées, opposées, ailées, composées de pinnules distantes, point confluentes, très-fines, presque filiformes, presque glabres, un peu pinnatifides vers leur sommet ou trifides; les découpures courtes, iné-gales, aiguës; les feuilles supérieures & termi-nales bien moins composées, feilées.

Les fleurs sont peires, supportées par des pé-doncules axillaires, filiformes, allongés, un peu tomenteux. Le calice commun est composé de plusieurs folioles simples, point imbriquées, cou-tes, ovales, aiguës, velues, blanchâtres & pubes-centes à leurs bords, terminées par une pointe molle, subulée, plus courte que les fleurs. Les corolles sont inégales, à cinq radiées, divisées à leur orifice en cinq lobes iné-gaux. Les semences sont couronnées par quelques arêtes peu subulées, & par une aigrette de poils fins, blanchâtres, plumeux.

Cette plante croît dans le Levant & dans l'île de Crète. ○ (V. f.)

#### 45. SCABIEUSE ptérocéphale. *Scabiosa pteroccephala*. Linn.

*Scabiosa corollatis quinquefidis; caule procumbente, fruticofo; foliis laciniatis, herbatis; pappo plumoso.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 146. — Syst. veg. t. pag. 146. n°. 34. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 213. n°. 1336. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 560. n°. 41.

*Pteroccephalus perennis, humilis, laciniatus & in-canus.* Vaill. Act. Acad. Paris. ann. 1722. pag. 184.

Cette plante a de grands rapports avec le *scabiosa papposa*; elle en diffère par son port & par la nature d'arbrisseau.

Ses tiges sont ligneuses, très-basses, couchées, garnies de feuilles opposées, pétiolées, oblon-gues, blanchâtres, velues, laciniées à leur contour. Les pédoncules sont simples, très courts, & sup-portent une seule fleur, dont les corolles, presque point radiées, sont divisées à leur orifice en cinq découpures presque égales. Les semences sont sur-montées d'une sorte d'aigrette plumeuse.

Cette plante croît dans la Grèce. ♀

#### 46. SCABIEUSE de Crète. *Scabiosa cretica*. Linn.

*Scabiosa corollatis quinquefidis, radiantibus; foliis lanceolatis, subintegerrimis; caule fruticofo.* Linn. Syst. veget. pag. 146. n°. 37. — Hist. Cliff. 31. — Royen, Lugd. Bat. 169. — Miller, Dict. n°. 11. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 253. n°. 1332. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 557. n°. 32.

*Scabiosa bellata, folio non dissecto.* C. Bauh. Pin. 271. — Tournef. Inst. R. Herb. 465. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 49. §. 6. tab. 15. fig. 31.

*Scabiosa fruticosa, folio non dissecto, peregrina.* J. Bauh. Hist. 3. pag. 11. Icon.

*Scabiosa peregrina.* Lobel. Icon. 540. — Idem, Observ. 292. Icon.

*Scabiosa peregrina Lobelii.* Dalech. Hist. 2. pag. 118. Icon.

*Scabiosa cretica*, frutescens, auricula urti folio. Tournef. Inst. R. Herb. Coroll. 34.

*Scabiosa arborea*. Prosp. Alpin. Plant. exot. pag. 35. tab. 34.

*Astercephalus frutescens*, leucoti folio longiore, angusto. Vaillant, Act. Academ. Paris. ann. 1722. pag. 247.

Cette espèce se distingue à ses feuilles foyeuses, entières, lancéolées; elle diffère du *scabiosa graminifolia* par ses tiges ligneuses, & par ses feuilles plus larges, moins alongées.

Ses racines sont dures, ligneuses; ses tiges droites, frutescentes, peu élevées, rameuses, blanchâtres, cylindriques, pubescentes, médiocrement striées, garnies de feuilles opposées, pétiolées; les intérieures très-rapprochées, nombreuses, presque imbriquées, lancéolées, simples, entières à leur contour, obtuses à leur sommet, rétrécies à leur base & decurrentes sur le pétiole, pubescentes, blanchâtres, presque foyeuses & luisantes, surtout dans leur jeunesse; marquées en dessous de nervures simples, peu apparentes, qui se dirigent vers leur sommet.

Les fleurs forment des têtes convexes, un peu arrondies, terminales, solitaires, soutenues par de longs pédoncules grêles, striés, simples, pubescens. Le calice commun est composé de plusieurs rangs presque imbriqués de folioles linéaires, inégales, pubescentes, blanchâtres, obtuses à leur sommet, beaucoup plus courtes que les fleurs. Les corolles sont radiales, un peu purpurines ou blanchâtres, teintes légèrement en bleu; les extérieures un peu plus grandes que celles du centre, tubulées; le tube grêle, velu en dehors; le limbe divisé en cinq découpures presque égales; les semences entièrement recouvertes par une touffe épaisse de poils foyeux, très-bânes. Le calice propre extérieur est grand, membraneux, plissé, campanulé, strié, denticulé à ses bords, inégal, un des côtés plus court que l'autre. Je n'y ai point vu de calice intérieur; peut-être est-il très-caduc. Le réceptacle est garni de paillettes sétacées, un peu élargies à leur sommet, au moins aussi longues que les semences.

Cette plante croît dans l'île de Crète & dans le Levant. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (V. f.)

La variété *s* s'élève beaucoup plus haut. Ses feuilles sont plus grandes; les fleurs blanches ou couleur de chair; elle se rencontre dans les mêmes lieux.

47. SCABIEUSE à feuilles de graminée. *Scabiosa graminifolia*.

*Scabiosa corollulis quinquefida, radiantibus; foliis linearibus lanceolatis, integerrimis; caule herbaceo.*

Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 145. — Amoen. Academ. vol. 4. pag. 267. — Miller, Dict. n.º 3. — Scopol. Carn. edit. 2. n.º 139. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 213. n.º 1331. — Idem, Flor. franç. vol. 3. pag. 313. n.º 936. XX. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 124.

*Succisa foliis gramineis, tomentosis*. Haller, Helv. n.º 203.

*Scabiosa argentea, angustifolia*. C. Bauh. Pin. 270. — Prodrom. 127. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 464.

*Scabiosa argentea, graminea*. J. Bauhin, Hist. 3. pag. 12. lc.

*Scabiosa stellata, argentea, angustifolia*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 49. 5. 6. tab. 15. fig. 36.

*Astercephalus argenteus, gramineifolius; flore carulea*. Vaill. Act. Academ. Paris. ann. 1722. pag. 183.

On distingue cette espèce à ses feuilles simples, très-étroites, foyeuses, assez semblables à celles des graminées.

Ses tiges sont herbacées, hautes d'environ un pied, noueuses, articulées, couchées à leur base, uniflores, nues dans leur partie supérieure, très-simples, à moins qu'on ne les considère comme autant de rameaux simples qui s'élèvent des mêmes racines; garnies de feuilles très-rapprochées, opposées, sessiles, linéaires, très-étroites, lancéolées, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, rétrécies à leur partie inférieure, s'élargissant à leur base en une gaine amplexicaule, chargées de poils courts, nombreux, couchés, luisants, argentés, longues de trois à quatre pouces, larges d'environ six lignes.

Une fleur solitaire, espitée, plane en dessus, termine chaque tige, dont la partie supérieure, nue, cylindrique, blanchâtre, pubescente devient le pédoncule. Le calice commun est très-velu, composé de plusieurs folioles linéaires, presque égales, aiguës, presque une fois plus courtes que les fleurs. Les corolles sont de couleur bleue, tubulées, velues sur le tube, divisées à leur limbe en cinq découpures inégales; les corolles de la circonférence radiales & plus grandes que celles du centre; les découpures denticulées à leur sommet. Le calice propre extérieur est d'une grande largeur médiocre, membraneux, campanulé, strié, un peu ondulé à ses bords; l'intérieur pédicelle, composé de cinq filets sétacés, à peine plus longs que le calice extérieur. Les semences sont courtes, velues, cylindriques, cachées entièrement par la touffe de poils blancs & fins qui les environne. Le réceptacle est oblong, garni de paillettes étroites, ciliées, concaves, mucronées.

Cette plante croît sur les rochers arides & les

montagnes alpines, dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, en Italie, dans l'Allemagne. M. Desfontaines l'a observée sur les côtes de Barbarie. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.  $\pi$  (V. v.)

48. SCABIEUSE des roches. *Scabiosa saxatilis*. Cavan.

*Scabiosa corollatis subquinquefidis, subaequalibus; foliis lanceolatis, integerrimis, subtus tomentosis; caulibus connatis, caule herbaceo.* Cavan. Icon. rar. pag. 68. tab. 184. — Persoon, Synopf. Plant. vol. 1. pag. 121. n°. 43.

Il s'élève de ses racines plusieurs tiges droites, anuelles, hautes d'un pied & plus, cylindriques, très glabres, d'un vert gai, fragiles, presque nues, garnies de feuilles lancéolées, très-entières, rétrécies en pétiole à leur base, vertes à leur face supérieure, de couleur plaine, blanchâtres & tomenteuses en dessous; les feuilles radicales nombreuses, étendues en rosette sur la terre; celles des tiges, opposées, conniventes à leur base.

Les fleurs sont réunies en tête; leur calice commun est composé de deux rangs de folioles, au nombre de douze, ovales, aiguës. Le calice propre extérieur est blanchâtre, membraneux, frangé à ses bords; l'intérieur terminé par cinq fiets capillaires, blancs, prenant ensuite une couleur purpurine. La corolle est blanche, légèrement tomenteuse en dehors; son limbe divisé en quatre ou cinq lobes ovales, presque égaux; les filaments des étamines une fois plus longs que la corolle; les anthères violettes, échancrees à leur base; l'ovaire turbiné, hérissé de quelques poils; le style plus court que les étamines; le stigmate épais, échancré. Les semences sont solitaires, couronnées par les calices, un peu velues.

Cette plante croît entre les fentes des rochers, particulièrement sur les montagnes ombragées de Cabelo, au royaume de Valence; elle fleurit au mois de mai.  $\pi$  (Description ex Cavan.)

\* *Especies incertae ou peu connues.*

\* *Scabiosa (usulata), corollis quadrididis, aequalibus; calicis squamis acutis, foliis lyratis.* Thunb. Prodr. pag. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 545. n°. 1.

Cette plante a des feuilles découpées en lyre & dentées; ses calices communs composés d'écaillés imbriquées, aiguës; ses corolles divisées, à leur orifice, en quatre lobes égaux; elle croît au Cap de Bonne-Espérance.  $\pi$

\* *Scabiosa (humilis), corollis quadrididis, inaequalibus; calicis squamis obtusis; foliis linearibus, dentato-pinnatifidis.* Thunb. Prodr. pag. 28. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 549. n°. 12.

Ses feuilles sont linéaires, dentées, pinnatifides; ses corolles tubuleuses, partagées, à l'orifice de leur tube, en quatre découpures inégales. Son calice commun est composé d'écaillés imbriquées, concaves, obtuses à leur sommet; on trouve cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scabiosa (decurrens), corollis quadrididis, inaequalibus; calicis squamis ovatis, foliis pinnatifidis, pinnis decurrentibus.* Thunb. Prodr. p. 28.

Cette espèce est munie de feuilles opposées, pétioles, pinnatifides; les pinnules décurrentes sur le pétiole commun. Ses corolles sont tubuleuses; leur orifice divisé en quatre lobes inégaux; le calice commun est composé d'écaillés imbriquées, ovales; elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scabiosa (uralensis), corollis quadrididis, radiantis; foliis radicalibus simplicibus, caulibus decussatis pinnatis; paleis aridis, apice reflexis.* Murr. Comment. Goett. 1782. pag. 12. tab. 4. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 550. n°. 16.

Ses feuilles radicales sont simples, entières; celles des tiges, opposées, pinnatifides; les pinnules croisées; les corolles de la circonférence disposées en rayons, divisées à leur limbe en quatre découpures. Le réceptacle est garni de paillettes sèches, coriaces, réfléchies à leur sommet. Cette plante croît en Sibérie.  $\odot$

\* *Scabiosa (hacquetii), corollis quadrididis, subradiantibus; foliis inferioribus pinnatifidis, calice imbricato.*

*Scabiosa trenta.* Hacq. Carniol. pag. 13. tab. 4. fig. 1.

*Scabiosa leucantha.* Var.  $\beta$ . Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 548. n°. 8.

Cette plante pourroit bien n'être qu'une simple variété du *Scabiosa leucantha*, dont les tiges sont beaucoup plus courtes, hautes d'environ six pouces, très-simples, terminées par une seule fleur, dont les corolles, médiocrement radiées, sont divisées à leur orifice en quatre découpures; les calices imbriqués; les feuilles inférieures pinnatifides; elle croît dans la Carniole.

\* *Scabiosa (crenata), corollis serratis, foliis radicalibus spatulatis, tridentatis; caulibus pinnatis; caulinis plurimis tripartitis.* Cyrrill. Plant. rar. — Neap. Fasc. 1. tab. 3. — Gmel. Syst. Nat. pag. 229.

Ses feuilles radicales sont spatulées, tridentées; celles des tiges ailées; les pinnules très-souvent partagées en trois découpures; les corolles tubuleuses, divisées à leur orifice en quatre lobes légèrement crénelés à leurs bords. Cette plante croît dans le royaume de Naples.

\* *Scabiosa (tenuifolia), corollis subquinquefidis, radiantis; foliis radicalibus bipinnatis, an-*



*g. flis ; caulibus pinnatis, linearibus.* Roth. Flor. germ. vol. 1. pag. 59. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 229. n°. 15.

Cette plante paroît n'être qu'une variété du *Scabiosa graminifolia*, dont les feuilles radicales, deux fois ailées, ont des pinnules très-étroites ; les caulinaires ailées & linéaires. Les corolles sont radicales, à peine découpées en cinq lobes à leur orifice. Cette espèce croît en Allemagne.

\* *Scabiosa* (heterophyllis), *foliis radicalibus bipinnatis*. S. G. Gmel. Iter 1. tab. 28. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 229. n°. 19.

\* *Scabiosa* (tomentosa), *corollulis radiantibus, foliis tomentosis, pinnatis ; caule unifloro, subnudo.* Allion. Flor. pedem. tab. 25. fig. 2. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 229. n°. 43.

Cette plante est-elle une espèce distincte ? Ne seroit-elle pas une variété du *Scabiosa cinerea* Lam. ? Elle croît dans le Piémont.

\* *Scabiosa* (alba), *corollulis quinquefidis, radiantibus ; foliis rameis, simplicibus, linearibus, alba-pinnulatis ; caule suffruticoso.* Scopol. Del. Inf. 3. pag. 33. tab. 16. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 230. n°. 36.

Ses tiges sont presque ligneuses ; les feuilles caulinaires simples, linéaires, marquées de quelques points blancs ; les corolles radicales, divisées à leur orifice en cinq lobes.

\* *Scabiosa* (dubia), *corollulis radiantibus, involucri tetraphyllo.* Mœnch. Flor. hafn. n°. 116. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 230. n°. 37.

SCABRE (Tige, feuille). (*Scaber caulis, &c.*) On donne ce nom aux tiges, aux feuilles, &c. en général à toutes les parties des plantes qui sont chargées, soit de poils très-courts & roides, soit de petits tubercules qui rendent leur surface âpre au toucher. Les feuilles sont scabres dans un grand nombre de borraginées, dans les *Sylphium*, dans plusieurs espèces de campanule, &c.

SCAPIFORME (Tige). (*Scapiformis caulis.*) Les tiges sont scapiformes lorsqu'elles imitent une hampe, qu'elles sont absolument privées de feuilles, si l'on en excepte les radicales, &c. qui sont paniculées ou rameuses, terminées par la fructification. La plupart des botanistes ne les distinguent guère de la hampe ; mais celle-ci est ordinairement moins roide, plus tendre ; souvent fistuleuse, très-simple & non rameuse, uniflore ou supportant plusieurs fleurs à son sommet.

SCARIEUSES (Feuilles). (*Scariosa, arida folia.*) On donne ce nom aux feuilles qui sont sèches, arides, sonores au tact, souvent blanchâtres & gercées, ou remplies de cicatrices : quelquefois

le bord ou le contour des feuilles, ou leur sommet, est feut scarieux. Ce nom s'applique également aux folioles du calice, aux bractées, aux stipules, aux écailles, &c.

SCHEFFÉRIE. *Schafferia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïques, polypétales, dont la famille naturelle n'est pas encore déterminée, qui ne renferme jusqu'aujourd'hui qu'une seule espèce, exotique à l'Europe, dont les tiges sont ligneuses, grimpantes ; les feuilles simples, entières ; les fleurs petites, latérales ; les pédoncules uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs diviées ; un calice à quatre folioles ; quatre pétales ; quatre étamines ; un ovaire supérieur, stérile dans les fleurs mâles ; deux styles ; une baie pulpeuse, à une seule loge, à deux semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs mâles sont séparées des femelles, sur des pieds différens.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice composé de quatre folioles un peu arrondies, petites, concaves, échancrées.

2°. Une corolle formée par quatre pétales très-ouverts, en ovale renversé, concaves, obtus.

3°. Quatre étamines, dont les filamens sont droits, subulés, un peu plus courts que les pétales, insérés latéralement à la base de l'ovaire, terminés par des anthères droites, comprimées, légèrement arrondies.

4°. Un ovaire stérile, fort petit, arrondi, terminé par deux petites pointes, sans style ni stigmate.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice persillant, semblable à celui des fleurs mâles.

2°. Une corolle à quatre pétales, comme dans les fleurs mâles.

3°. Un ovaire ovale, un peu plus court que la corolle, surmonté de deux styles courts, subulés, un peu courbés, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une baie presque globuleuse, à une seule loge, surmontée par une pointe courte : cette baie renferme deux semences ridées, convexes d'un côté, planes de l'autre, médiocrement pulpeuses.

#### E S P È C E S.

SCHEFFÈRE arbrisseau. *Schafferia frutescens*, Jacq.

*Schafferia foliis ovato-subrotundis, glaberrimis ; pedunculis lateralibus, unifloris.* (N.)

*Schefferia frutescens* Jacq. Scrp. Amer. pag. 259.  
— Lam. Illust. Gener. tab. 809. — Just. u. Gen. Plant. pag. 426.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes d'environ dix pieds, rameuses, & dont les rameaux sont alternes, souvent très - alongés, droits, striés, glabres, verticillés, luisans. Les feuilles sont alternes, médiocrement pétiolées, ovales, quelquefois un peu arrondies, luisantes, glabres à leurs deux faces, un peu grasses au toucher, entières à leurs bords, aiguës ou obtuses à leur sommet, longues de deux pouces, réunies souvent au nombre de deux ou trois au même point d'insertion ou sur le même tubercule; supérieures par des pétioles très-courts.

Les fleurs naissent un peu avant les feuilles; elles sont latérales, solitaires ou agrégées, & réunies par petites paquets; soutenues par des pédoncules simples, uniflores. La corolle est petite, composée de quatre pétales blancs, ovales ou arrondis, obtus. Les fruits consistent en de petites baies, à peine de la grosseur d'un pois, d'un rouge rosé de jaune, médiocrement pulpeuses, à une seule loge, renfermant deux semences blanchâtres.

Cette plante croît en Amérique. On la rencontre fréquemment parmi les buissons, aux environs de Carthagène, où elle a été découverte par Jacquin. Les insectes & les petits oiseaux sont très-avides de la pulpe de ses semences, qu'ils dévorent, & laissent les semences à nu, persistantes sur le pédoncule.  $\text{h}$

**SCHIFFLÈRE.** *Scheffera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétales, dont la famille & les rapports naturels ne sont pas encore bien déterminés, qui comprend des plantes exotiques à l'Europe, dont le caractère essentiel est d'avoir :

Un calice fort petit, urcéolé, à cinq dents; cinq pétales situés entre les dents du calice; cinq étamines; un ovaire supérieur à huit ou dix styles; une capsule à autant de loges monospermes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice fort petit, d'une seule pièce, supérieur, persistant, à cinq dents subulées.

2°. Une corolle composée de cinq pétales oblongs.

3°. Cinq étamines, dont les filamens sont filiformes, à peine plus longs que les pétales, terminés par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur, globuleux, un peu comprimé, surmonté de huit ou dix styles courts,

cylindriques, persistans, terminés par des stigmates simples.

Le fruit est une capsule globuleuse, un peu comprimée, à huit ou dix loges, contenant des semences foliaires, comprimées.

#### ESPÈCE.

**SCHIFFLÈRE digité.** *Scheffera digitata*, Forst.

*Scheffera digitata*, Forst. Gen. pag. 21. tab. 23.  
— Idein, Prodr. n°. 146. — Schreb. Gen. Plant. n°. 537. — Lam. Illust. Gener. tab. 211. — Just. Gener. Plant. pag. 429. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 520. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1563.

Les différens auteurs qui ont parlé de cette plante, ne l'ont fait que d'après Forster, & n'en ont pas pu dire plus qu'il n'en a dit lui-même : nous n'en connoissons que les caractères généraux. Il paroît, d'après son nom spécifique, que les feuilles sont digitées. Selon Dryander, elle paroît être une espèce d'*aralia*, ou du moins voisine de ce genre, puisqu'elle s'en trouve séparée par son caractère générique.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande.

**SCHUCHZÈRE.** *Scheuchzeria*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des juncs, qui a des rapports avec les *tri-glochis*, & qui comprend des plantes indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont disposées en petits épis lâches, & les feuilles semblables à celles des graminées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à six divisions égales; point de corolle; six étamines à longues anthères; point de style; et trois à six capsules renflées, à une ou deux semences.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice divisé en six folioles oblongues, aiguës, ouvertes, sessiles, persistantes.

2°. Point de corolle.

3°. Six étamines, dont les filamens sont capillaires, mous, très-courts, terminés par des anthères droites, obtuses, très-longues, comprimées.

4°. Trois ovaires, quelquefois quatre, cinq ou six, ovales, comprimés, de la longueur du calice, dépourvus de style, surmontés chacun d'un stigmate oblong, obtus à leur partie supérieure, adnés aux ovaires extérieurement.

Ces ovaires se convertissent en autant de capsules arrondies, comprimées, renflées, distinctes entr'elles,

entr'elles, à deux valves, contenant une, quelquefois deux semences oblongues.

## E S P È C E.

SCHEUCHZÈRE des marais. *Scheuchzeria palustris*. Linn.

*Scheuchzeria foliis gramineis, spicis brevibus, paucifloris.* (N.)

*Scheuchzeria palustris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 482. — Flor. lappon. 133. tab. 10. fig. 1. — Flor. suec. 297. 320. — Royen, Lugd. Bat. 45. — Haller, Helv. n°. 1310. — Gmel. Sibir. vol. 3. pag. 73. — Berg. Viadr. 67. — Weder. Flot. dan. tab. 76. — Pollich. Pal. n°. 363. — Hoffm. Germ. 130. — Roth. Germ. vol. I. pag. 159. — vol. II. pag. 419. — Lam. Flor. franç. vol. 4. pag. 301. n°. 887. — Idem, Illustr. Gen. tab. 268. — Mich. Flor. boreal. Auer. vol. 1. pag. 209.

*Juncus floridus, minor*. C. Bauh. Pin. 12. — Profr. 43. — Idem, Theatr. 190. — Rudb. Elyf. 1. pag. 110. fig. 2. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 525. — Rai, Hist. 1913.

*Juncoidi affinis palustris*. Scheuchz. Gramin. 336.

*Gramen juncum, aquaticum, semine racemoso*. Loef. Prull. 114. tab. 28.

C'est une petite plante qui a presque l'apparence d'un jonc, dont les racines font rampantes, blanchâtres, fibreuses, & poussent plusieurs tiges simples, feuillées, hautes de six à huit pouces, foibles, striées, presque anguleuses, garnies à leur base de quelques écailles blanchâtres & vaginales. Leurs feuilles sont sessiles, alternes, très-étroites, assez semblables à celles des graminées, en gaine à leur base, pliées en gouttière dans toute leur longueur, glabres, un peu striées, aiguës à leur sommet, longues de deux à trois pouces.

Les fleurs sont disposées en une petite grappe ou à l'ordinairement terminale ; elles sont distantes, pédonculées, quelques-unes axillaires, solitaires, assez petites, dépourvues de corolle, dont le calice est composé de six folioles très-étroites, glabres, verdâtres, aiguës, toutes égales ; elles renferment six étamines à peine plus longues que le calice, munies de longues anières. Les fruits sont de petites capsules ovales ou un peu arrondies, dont le nombre varie d'une à deux jusqu'à six, mais plus ordinairement au nombre de trois ; garnies à leur base du calice persistant & réfléchi ; elles ne contiennent ordinairement qu'une seule semence ou deux, rarement trois. Chaque capsule s'ouvre en deux valves glabres, concaves, tendues.

Cette plante se rencontre dans les départemens méridionaux de la France, en Suisse, en Allemagne, en Suède, en Laponie, dans les lieux bas Botanique. Tome VI.

& marécageux, où elle forme des gazons touffus. ¶ (V. v.)

SCHISANDRE. *Schisandra*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs dioïques, de la famille des ménispermées, qui a des rapports avec les *menispermum*, & qui comprend des arbrisseaux grimpans, exotiques à l'Europe, dont les feuillets sont alternes & les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Des fleurs dioïques ; un calice à neuf folioles caduques ; cinq étamines presque sessiles ; point de corolle ; plusieurs ovaires acuminés chacun par le stigmate ; des baies monospermes.

## C A R A C T È R E G É N É R I Q U E.

Les fleurs mâles sont séparées des fleurs femelles sur des individus différens.

Chaque fleur mâle offre :

1°. Un calice composé de neuf folioles concaves, presque rondes, disposées sur trois rangs ; les intérieures graduellement plus petites, plus colorées.

2°. Point de corolle.

3°. Cinq étamines presque sessiles, ou dont les filamens sont très-courts ; les anthères contiguës à leur base, conées à leur sommet, au dessus des loges ; séparées latéralement par des enfoncemens entre chaque anthère.

Chaque fleur femelle offre :

1°. Un calice de la même forme que les fleurs mâles.

2°. Point de corolle.

3°. Plusieurs ovaires réunis presque en tête sur un réceptacle qui se prolonge, de forme ovoïde, acuminés par un stigmate court, aigu.

Le fruit est constitué par plusieurs baies disposées presque en épi sur un réceptacle allongé, presque ovoïdes, ne renfermant chacune qu'une seule semence ovale, oblongue, arrondie, presque lisse.

L'embryon est droit, renfermé dans une substance charnue & verdâtre ; la radicule oblongue, cylindrique, contenus tous deux dans des cotylédons planes, ovales, rapprochés.

## E S P È C E.

SCHISANDRE à fleurs écartées. *Schisandra coccinea*. Mich.

*Schisandra glabra, foliis lanceolato-ovatis, utrinque acutis, rariter subdentatis ; floribus coccineis*. Z z z

neis. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 219. tab. 47.

C'est un arbrisseau dont les tiges sont ligneuses, cylindriques, foupies, grimpantes, glabres, rameuses, garnies de feuilles alternes, pétiolées, distantes, ovales, lancéolées, glabres à leurs deux faces, à peine dentées ou un peu sinuées à leurs bords, acuminées à leur sommet, téréciées à leur base; les supérieures longues de deux ou trois pouces & plus, marquées de nervures latérales, simples, alternes; les pétioles beaucoup plus courts que les feuilles.

Les fleurs sont solitaires ou presque disposées en une petite grappe courte, soutenues par un long pédoncule simple, grêle, filiforme, glabre, plus ou moins résléhi. Les calices sont d'une belle couleur écarlate, composés de neuf folioles concaves, arrondies, disposées fur trois rangs; les intérieures plus fortement colorées. Les baies sont petites, & présentent, à l'époque de la maturité, un petit épi alongé par le prolongement du réceptacle commun.

Cette plante croît dans la Géorgie & à la Caroline, dans les lieux ombragés. 5

**SCHIZANTHE.** *Schizanthus*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, qui paroît appartenir à la famille des pédiculaires, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, à feuilles ailées, & dont les fleurs sont disposées en panicules terminales; les pédoncules munis de bractées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Une corolle à cinq découpures; une corolle irrégulière, tubulée; la lèvre supérieure à cinq lobes; l'inférieure à trois lobes; quatre étamines, dont deux inférieures stériles, sans anthères; une capsule à deux loges.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, à cinq divisions oblongues, linéaires, persistantes.

2°. Une corolle tubulée, irrégulière, dont le tube est comprimé, de la longueur du calice; le limbe divisé en deux lèvres; la lèvre supérieure à cinq lobes, dont les quatre latéraux sont bifides; celui du milieu plus grand, lancéolé, entier; la lèvre inférieure à trois découpures linéaires, courbées en faux; celle du milieu tronquée, & en forme de carène.

3°. Deux étamines fertiles, dont les filaments sont filiformes, insérés sur la lèvre inférieure, terminés par des anthères ovales; le rudiment de

deux autres filaments stériles, attachés sur la lèvre supérieure.

4°. Un ovaire oblong, surmonté d'un style bulbuleux, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule oblongue, à deux loges, à deux valves, qui contiennent plusieurs semences rudes, presque réniformes.

#### E S P È C E.

**SCHIZANTHE ailé.** *Schizanthus pinnatus*. Ruiz & Pavon.

*Schizanthus foliis interruptè pinnatis*. Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 13. tab. 17.

Plante herbacée, chargée de poils très-longs, terminés par une petite glande. Ses racines sont fibreuses, diffusées; elles produisent des tiges droites, hautes d'environ deux pieds, médiocrement rameuses, cylindriques; les rameaux alternes, garnis de feuilles amples, velues, médiocrement pétiolées, alternes, ailées, dont les folioles sont sessiles, opposées ou alternes; celles des feuilles inférieures plus grandes, pinnatides ou lacinées; celles des feuilles supérieures linéaires-lancéolées, munies de quelques dents rares, obtuses.

Les fleurs sont disposées en une panicule terminale, droite, médiocrement étalée, dont les rameaux ou pédoncules sont presque simples, alternes, filiformes, velus, uniflores, solitaires, munis à leur base de deux petites bractées sessiles, opposées, lancéolées, aiguës. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'un bleu-violet, tubulée, irrégulière; sa lèvre supérieure panachée, marquée, dans son centre, d'une tache purpurine, supportant deux filaments stériles, velus. Le stigmate est échancré; la capsule est oblongue, un peu plus longue que le calice persistant qui la soutient; à deux loges, à deux valves; les valves bifides.

Cette plante croît dans les sols incultes au Chili; elle fleurit en février & en mars. (*Descrip. ex Ruiz & Pav.*)

**SCHLECHTENDALE.** *Schlechtendalia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs composées, radiées, de la famille des corymbifères, qui a des rapports avec les tagètes, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, ailées, glanduleuses; les fleurs axillaires; les pédoncules uniflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Un calice double; l'extérieur à plusieurs folioles striées; l'intérieur à folioles épaisses; les fleurs au centre à six ou huit découpures; les semences surmon-*

cées de cinq arêtes droites ; le réceptacle garni de paillettes.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Les fleurs sont composées de fleurons dans le centre , & de demi-fleurons à la circonférence ; elles offrent :

1°. Un calice double, l'un & l'autre composé de plusieurs folioles. L'intérieur est cylindrique, formé par des écailles nombreuses, égales, linéaires ; l'extérieur plus court, étalé, dont les écailles sont petites, terminées par un long filet serré.

2°. Une corolle radiée ; huit demi-fleurons femelles à la circonférence ; la languette ovale, arrondie, entière ; plusieurs fleurons hermaphrodites dans le centre, tubulés, divisés à leur limbe en six ou huit découpures linéaires, aiguës, très-étroites.

3°. Cinq étamines dans les fleurons hermaphrodites, nulle dans les demi-fleurons ; les filaments capillaires ; les anthères réunies en cylindre.

4°. Plusieurs ovaires oblongs, couronnés par cinq arêtes alternes, avec autant de petites écailles très-courtes ; surmontés d'un style simple, à demi-divisé en trois, terminés par trois stigmates séparés.

Le réceptacle est garni de paillettes très-courtes, urcéolées & dentées.

Les semences sont solitaires, oblongues, presqu'à cinq faces, rétrécies à leur base, surmontées de cinq arêtes droites.

Observations. Ce genre a été établi, par M. Canaville, sous le nom de *willdenowia*, consacré à M. Willdenow, savant botaniste, qui a donné plusieurs ouvrages très-estimables, & en particulier un *Species plantarum* qui n'est pas encore entièrement terminé. Mais comme il existe un autre *willdenowia* établi par Thunberg, M. Willdenow a cru devoir substituer un autre nom à celui donné par Canaville.

Ce genre, très-voisin des *tagetes*, en diffère par son double calice, par les fleurons du centre à six ou huit divisions, par le réceptacle garni de paillettes, & par le nombre des stigmates.

#### EST À CE.

*SCHLECHTENDALIA glandulosa*. *Schlechtendalia glandulosa*. Willd.

*Schlechtendalia foliis pinnatis, pinnis ovatis, dentatis, glandulosis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 2125.

*Willdenowia glandulosa*. Cav. Icon. rar. vol. 1. pag. 61. tab. 89. — Lam. Illustr. Gener. tab. 685.

C'est une très-jolie plante, qui a l'aspect d'un *tagetes*, & qui se fait remarquer par les belles fleurs de couleur écarlate.

Ses racines sont persistantes, & produisent des tiges annuelles, glabres, cylindriques, rougeâtres, hautes d'environ trois pieds, garnies de feuilles alternes, très-rapprochées, quelquefois presque opposées, rigides, ailées, avec une impaire ; les pinnules ovales, opposées, légèrement décurrentes sur le pétiole, munies à leurs bords de petites dents, terminées, surtout dans les jeunes feuilles, de longs filets sétacés ; ces filets se retrouvent également entre les pinnules : ces mêmes feuilles portent, vers leur circonférence, de petites glandes ovales, jaunâtres, transparentes.

Les fleurs sont situées à l'extrémité des tiges, & forment, par leur ensemble, une sorte de corymbe lâche. Les écailles des calices sont terminées par un petit filament soyeux & rougeâtre. La base de chaque écaille est une glande, solitaire dans le calice extérieur, double dans le calice intérieur. La corolle est d'une grandeur médiocre, d'un rouge-écarlate, plus foncé dans les fleurons du centre. Les anthères sont d'un jaune-écarlate ; les semences oblongues, très-aiguës à leur base, surmontées de cinq arêtes droites, égales.

Cette plante croît au Mexique ; elle est cultivée au Jardin royal des Plantes de Madrid, où elle fleurit au mois de décembre. x. (*Descript. ex Cavan.*)

SCHOPPIE. *Schaffa*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétales, campanulées, qui comprend des arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, entières ; les fleurs axillaires, pédonculées.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice double ; l'extérieur bifide & inférieur ; l'intérieur entier & supérieur ; une corolle campanulée ; cinq étamines ; un stigmate cupité ; un drupe monopérme.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice double ; l'extérieur divisé en deux découpures profondes, inférieur ; l'intérieur entier & supérieur, turbiné, un peu anguleux.

2°. Une corolle monopétale, campanulée, marquée inférieurement de dix sillons, à cinq découpures triangulaires, aiguës & réfléchies.

3°. Cinq étamines, dont les filaments sont très-courts, les anthères droites, situées à l'orifice de la corolle, à deux loges.

4°. Un ovaire turbiné, couronné par le calice intérieur, surmonté d'un style cylindrique, droit,

ZZzz 2

plus court que la corolle, terminé par un stigmate capité, à trois lobes peu sensibles.

Le fruit est un drupe presqu'à trois loges, qui ne renferme qu'une seule semence.

## E S P À C E.

SCHOFFIE d'Amérique. *Schaffia americana*. Willden.

*Schaffia foliis alternis, ovatis, integerrimis, glabris; pedunculis axillaribus, subsulcatis.* (N.)

*Schaffia americana*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 956. — Schreb. Gener. Plant. n° 323.

*Schaffia Schreberi*. Lam. Illustr. Gener. vol. 2. pag. 51. n° 4188.

*Codonium arborescens*. Vahl, Symbol. 3. pag. 36. — Idem, Act. Soc. Hist. Nat. Hafn. 2. pars 1. pag. 256. tab. 6.

C'est un arbrisseau qui s'élève à huit ou dix pieds de haut, & se divise en rameaux glabres, cylindriques, garnis de feuilles pétiolées, alternes, simples, très-entières, ovales, glabres à leurs deux faces, insensiblement rétrécies, obtuses.

Les fleurs sont presque solitaires ou géminées dans l'aisselle des feuilles, supportées par des pédoncules simples, uniflores, quelquefois à deux ou trois fleurs. Les étamines sont au nombre de cinq; quelquefois il n'y en a que quatre. Le fruit est un drupe plutôt à une seule qu'à trois loges, & qui ne renferme qu'une seule semence.

Cette plante croît naturellement dans l'Amérique, à l'île de Sainte-Croix & à Montserrat.  $\text{f}$

SCHOUALBÉ. *Schwalbea*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, tubulées, irrégulières, affilié à la famille des scrophulaires, voisin des *schwenkia*, qui renferme des herbes exotiques à l'Europe, dont les tiges sont simples, garnies de feuilles alternes, & les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice ventru, tubulé, à quatre divisions; le lobe supérieur fort petit; l'inférieur beaucoup plus grand, échancré; quatre étamines didymes; un seul stigmate; une capsule à deux loges.

## CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice monophylle, tubulé, ventru, strié, divisé à son orifice en quatre découpures obliques; la découpure supérieure très-courte; les latérales plus longues; l'inférieure beaucoup plus large, plus longue que toutes les autres, échancrée à son sommet.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, irrégulière, dont le tube est de la longueur du calice; le limbe droit, divisé en deux lèvres; la supérieure droite, concave, très-entière; l'inférieure aussi longue que la supérieure, à trois découpures obtuses, presqu'égaux.

3°. Quatre étamines, dont les filaments sont filiformes, de la longueur de la corolle, dont deux un peu plus courts, terminés par des anthères pendantes.

4°. Un ovaire arrondi, surmonté d'un style de la même longueur & de la même forme que les étamines, terminé par un stigmate épais, recourbé, un peu globuleux.

Le fruit est une capsule à deux loges, à doubles cloisons, renfermant plusieurs semences, petites, un peu comprimées, aiguës.

## E S P À C E.

SCHOUALBÉ d'Amérique. *Schwalbea americana*. Linn.

*Schwalbea foliis lanceolatis, pubescentibus; caulibus simplicissimis, floribus sessilibus.* (N.)

*Schwalbea americana*. Linn. Spec. Plant. vol. 2. pag. 844. — Mantiss. pag. 414. — Walter. Flor. carol. pag. 187. — Willden. Spec. Plant. vol. 3. pag. 201. — Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 19. — Juss. Gener. Plant. pag. 123. — Gærtn. de Fruct. & Sem. Centur. 4. tab. 55. fig. 3. — Lam. Illustr. Gener. tab. 520.

*Schwalbea*. Gronov. Virgin. 92.

*Euphrasia major, mariana; floribus spicatis, amplis; tubis longioribus; summis oris profundè incis.* Pluken. Mant. pag. 73. tab. 348. fig. 2.

Plante herbacée, dont les tiges sont très-simples, droites, quadrangulaires, pubescentes, garnies de feuilles alternes, sessiles, lancéolées ou ovales-lancéolées, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, élargies & presqu'à demi-amplexicaules à leur base, pubescentes & légèrement ciliées à leur contour; les supérieures ou celles qui accompagnent les fleurs sont petites, presque ovales, que l'on peut considérer aussi comme des bractées; dans ce cas les fleurs formeroient un épi droit, simple, terminal.

Ces fleurs sont solitaires, axillaires, alternes, supportées par un pédoncule court, velu. Leur calice est également velu, à quatre découpures très-irrégulières; l'inférieure plus longue que les autres, & médiocrement échancrée à son sommet. La corolle est d'un rouge-pourpre, un peu inclinée, presqu'une fois plus longue que le calice. Son limbe est renflé, divisé en deux lèvres concaves; la supérieure entière & recourbée presqu'en

caques; l'inférieure à trois lobes; celui du milieu un peu plus large, concave. Le fruit est une capsule ovale, aiguë, qui se divise en deux loges séparées par une double cloison, contenant plusieurs semences fort petites, comprimées, palmées, très-aiguës.

Cette plante se rencontre dans l'Amérique septentrionale & dans la Caroline inférieure. (V. f.)

**SCHOUINQUE.** *Schwenkia*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, tubulées, irrégulières, affilié à la famille des labiées, qui a de grands rapports avec les *browallia*, & qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont alternes, les fleurs axillaires.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice tubulé, à cinq dents; une corolle tubulée; son orifice renflé, fermé par cinq plis glanduleux; cinq étamines, trois plus courtes, stériles; une capsule comprimée, à deux loges, à deux valves polypermes, enveloppées par le calice renflé.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice d'une seule pièce, tubulé, strié, droit, persistant, divisé en cinq dents à son orifice.

2°. Une corolle monopétale, tubulée, dont le tube est cylindrique, de la longueur du calice; le limbe presque régulier, de la longueur du calice; l'orifice renflé, & fermé par cinq plis glanduleux, disposés en étoile, les deux glandes supérieures plus longues.

Cinq étamines, dont trois ont les filaments plus courts, étacés, stériles, sans anthères; deux supérieures plus longs, fertiles, terminés par des anthères ovales, aiguës, à deux loges.

4°. Un ovaire globuleux, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate obtus.

Le fruit est une capsule comprimée, lenticulaire, glabre, à deux loges, à deux valves, environnée à la base par le calice renflé, & contenant plusieurs semences fort petites, un peu anguleuses. Le réceptacle est un peu globuleux.

#### E S P È C E.

**SCHOUINQUE d'Amérique.** *Schwenkia americana*. Linn.

*Schwenkia foliis alternis, floribus axillaribus.* (N.)

*Schwenkia americana*. Linn. Syst. veget. pag. 64.

— Gener. Plant. 567. — Schwenk. Hort. med. Hag. 1766. Octob. pag. 328. tab. 1. — Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 29. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 106.

*Schwenkia guineensis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 55. n°. 233.

Cette espèce, jusqu'alors l'unique de ce genre, se rapproche beaucoup par les caractères naturels de *browallia*; les tiges sont droites, herbacées; les feuilles simples, alternes; les fleurs frisées dans l'aiselle des feuilles supérieures, dont l'ensemble forme une sorte d'épi. Les calices sont tubulés, entiers, munis à leur orifice de cinq dents aiguës. La corolle est également tubulée, remarquable par son orifice renflé, & fermé par cinq plis en forme d'étoile, glanduleux intérieurement. Les étamines sont au nombre de cinq, trois beaucoup plus petites, dont les filaments sont étacés, stériles, sans anthères; deux supérieures, fertiles, plus longues, dont les anthères sont ovales, à deux loges. Le fruit est une capsule glabre, bivalve, bi-oculaire, portée sur un placenta globuleux, renfermant un grand nombre de semences fort petites, un peu anguleuses.

Cette plante croit proche Bethice, dans la Guinée. a

**SCHREBÈRE.** *Schrebera*. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des nerpruns, qui a de grands rapports avec les *celastrus*, & qui comprend des arbrisseaux exotiques à l'Europe, à feuilles alternes, & dont les fleurs sont axillaires, supportées par des pédoncules multiflores.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice à cinq découpures; une corolle à cinq pétales, cinq étamines; l'ovaire entouré d'un rebord qui supporte les étamines; un drupe sec, renfermant une noix partagée jusque vers sa moitié en deux loges.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice inférieur, persistant, un peu plane, à cinq divisions courtes, élargies, arrondies.

2°. Une corolle à cinq pétales arrondis.

3°. Cinq étamines, dont les filaments fort courts, insérés sur un appendice orbiculaire qui environne l'ovaire & persiste avec lui; les anthères oblongues, cylindriques, à deux loges.

4°. Un ovaire enveloppé par l'appendice qui soutient les étamines, prolongé en un style court, conique, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est un drupe sec, ovale-oblong, acu-

miné, muni à la base, du calice & de l'appendice, renfermant un noyau à demi-divisé en deux loges.

*Observations.* Ce genre n'est point le même que celui qui avoit été d'abord établi sous ce nom, & la plante qui y avoit donné lieu, décrite sous le nom de *Schrebera schinoides*, Spec. Plant. pag. 1661. Ad. Upsal. nov. 1. pag. 91. tab. 5. fig. 1, & auparavant le *schinus myricoides*, Spec. Plant. 1. pag. 388, a été reconnue une espèce fautive, composée du *myrica atropica* & du *cuscuta africana*.

Le genre dont il est ici question a été rétabli pour une autre plante par Retzius, & consacré au favant Schreber, très-voisin des *celastrus* : il en diffère par ses fruits, qui sont des drupes & non des capsules ; il se distingue des *manisera* par ces mêmes drupes secs, renfermant des noix divisées en deux loges jusque vers leur moitié.

## E S P È C E.

*SCHREBÈRE* blanchâtre. *Schrebera albens*. Retz.

*Schrebera foliis alternis, ellipticis, subferratis ; floribus cymosis, axillaribus.* (N.)

*Schrebera albens*. Retzius, Observ. 6. pag. 25. tab. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 1091.

*Celastrus* (glaucus), *inermis ; foliis ellipticis, subferratis, acutis ; cymis axillaribus ; dichotomis folia aequantibus*. Vahl, Symbol. 2. pag. 41.

*Manisera* (glauca), *foliis oppositis, oblongis, glaucis ; pedunculis oppositis, divaricatis, dichotomis*. Rotb. Nov. Ad. Havn. vol. 2. pag. 534. tab. 4. fig. 1.

*Pajari* seu *Kavukkwataj*. Tamul.

C'est un arbre dont les rameaux sont alternes, épars & distans, garnis de feuilles opposées, pétiolées, ovales, huiantes, d'un vert-pâle, dentées en scie à leurs bords ou légèrement sinuées, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, longues de deux ou trois pouces & plus, larges d'environ un pouce & demi, à nervures simples, latérales & parallèles, soutenues par des pétioles grêles, longs d'un à deux pouces.

Les fleurs sont blanches, disposées en corymbes latéraux & terminaux, dichotomes, dont les ramifications sont tétragones ; munis à la base de leurs divisions, d'échailles opposées.

Les pédoncules sont courts, inégaux, uniflores. Les calices glabres, verdâtres ; la corolle petite ; les pétales arrondis, chargés depuis leur base jusques vers leur milieu d'un duvet brun, tomenteux ; blancs à leur partie supérieure. Le rebord qui entoure l'ovaire & qui supporte les étamines est ridé & saillant.

Cette plante croît dans l'île de Ceilan & à la côte de Coromandre. *Hy*

*SCIE* (Feuilles dentées en). (*Serrata foliis*.) On dit que les feuilles sont dentées en scie lorsqu'elles bords sont garnis de petites dents aiguës, dont la pointe est tournée vers le sommet, comme dans le pêcher, l'amarantier, &c.

*SCILLE*. *Scilla*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, bilabées, de la famille des *asphodèles*, qui a les plus grands rapports avec les *ornithogales*, & qui renferme des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les racines sont bulbeuses, & les fleurs disposées en épi.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Une corolle ouverte, à six divisions profondes, épaisses ; six étamines ; les filamens comprimés, & tous également dilatés à leur base ; une capsule supérieure à trois loges, à trois valves, contenant plusieurs semences.

## C A R A C T È R E G É N É R I Q U E.

Chaque fleur offre :

1°. Un calice nul, à moins qu'on ne prenne pour lui la corolle.

2°. Une corolle composée de six pétales ovales, très-ouverts, caducs.

3°. Six étamines, dont les filamens sont comprimés, subulés, tous élargis à leur base, terminés par des anthères oblongues, pendantes.

4°. Un ovaire supérieur arrondi, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines, terminé par un stigmate simple.

Le fruit est une capsule presque ovale, glabre, à trois sillons, à trois loges, à trois valves, renfermant plusieurs semences un peu arrondies.

*Observations.* Ce genre n'est que très-peu distingué des *ornithogales* & des *antheris*. (Voyez notre article ORNITHOGALE.) Son principal caractère est d'avoir tous les filamens élargis, membraneux, aigus à leur sommet, caractère que j'ai reconnu dans toutes les espèces que j'ai pu examiner : je ne peux pas l'affirmer des autres. Ces espèces ont d'ailleurs un port qui leur est particulier : leurs fleurs sont petites & bien inférieures à celles des *ornithogales*. Leur couleur la plus ordinaire est d'un beau bleu, quelquefois blanche ou légèrement jaunâtre.

La distinction des espèces se tire, 1°. des feuilles qui en général sont un peu étroites, planes, charnues ; 2°. de la disposition des fleurs, dans laquelle on doit considérer l'époque plus ou moins



avancée de la floraison, qui leur donne une forme un peu différente; 3°. dans la proportion de la longueur des bractées avec les pédoncules, & des pédoncules avec la corolle, proportion qui cependant varie, soit dans les fleurs inférieures ou supérieures, soit d'après leur âge; car j'ai remarqué que dans plusieurs espèces ces pédoncules s'allongeoient un peu, surtout après la floraison; enfin ces mêmes pédoncules sont ou droits, appliqués contre les hampes, ou horizontaux ou plus rarement un peu réfléchis. Les étamines, quoi qu'en général à peu près de la longueur de la corolle, sont aussi ou plus longs ou plus courtes qu'elle. Quant aux capsules & aux semences, elles m'ont paru offrir peu de différences entr'elles.

## E S P È C E S.

1. *SCILLA maritime*. *Scilla maritima*. Linn.

*Scilla nudiflora, bracteis refractis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 442. — Mater. medic. pag. 94. — Mill. Dict. n°. 1. — Poiret, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 148. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 297. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 276. n°. 802. Sub *ornithogalo*.

*Scilla radice tunicatâ*. Hort. Cliff. 123. — Hort. Upsal. 89. — Royen, Lugd. Bat. 32.

*Ornithogalum maritimum, seu scilla radice rubrâ*. Tourn. Inst. R. Herb. 381.

*Scilla vulgaris, radice rubrâ*. C. Bauh. Pin. pag. 73.

*Scilla rasa, magna, vulgaris*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 615. Ic.

*Pancratium*. Cluf. Hist. 171. Icon. — Dodon. Pempt. 691. Icon. — Tabern. Ic. 630. — Gerard, Hist. 172. Ic.

*Scilla major, radice rubrâ*. Math. Comment. 454. Ic.

*Scilla rubentibus tunicis radicis, folio aloë caricato*. Lobel. Ic. 152. — Idem, Observ. 76.

*Scilla*. Fusch. Hist. 782. Ic.

*Scilla Maithioli*. Dalech. Hist. 2. pag. 1576. Icon.

*Scilla officinalis*. Blackw. tab. 591.

*Scilla femina*. Plin. Hist. Nat.

La SQUILLE. Regn. Botan. Ic.

Oignon de scille. Pharm.

1. *Scilla radice albd.* C. Bauh. Pin. 73. — H. Fyft. Vern. 2. pag. 3. fig. 1. — Desfont. L. c. — Seb. Mus. 1. tab. 44. fig. 4, 5.

*Ornithogalum maritimum, seu scilla radice albd.* Tourn. Inst. R. Herb. 381.

*Scilla magna, alba*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 68.

*Scilla hispanica*. Cluf. Hist. 151. Ic. — Gerard, Hist. 171. Ic. — Math. Comm. 453. Ic.

*Scilla absque caulâ*. Dodon. Pempt. 690. Ic.

*Scilla hispanica, sine flore*. Dalech. Hist. 2. pag. 1576 & 1577. Ic.

*Scilla five cepa marina*. Lobel. Ic. 151. — Idem, Observ. 75. Ic.

*Scilla mascula*. Plin. Hist. Nat.

C'est une des espèces de ce genre, la plus belle & la plus distincte par la longueur de ses épis, le grand nombre de ses fleurs & la grosseur de ses bulbes, composées de plusieurs tuniques épaisses, charnues, blanches ou rougeâtres, selon les variétés, souvent de la grosseur d'une tête d'enfant, glabres, ovales, visqueuses, garnies en dessous d'un grand nombre de fibres épaisses, charnues.

Les feuilles sont toutes radicales, très-grandes, amples, larges, longues d'environ un pied, ovales, oblongues, très-entières, obtuses à leur sommet, presque charnues, très-lisses, en grande partie couchées sur la terre. De leur centre s'élève une hampe droite, cylindrique, de la grosseur du doigt, haute de trois à quatre pieds & plus, nue inférieurement, garnie, dans plus des trois quarts de sa longueur, d'un très-bel épi dense, conique de fleurs blanches, ouvertes en étoile.

Chaque fleur est pédunculée; les pédoncules glabres, filiformes, un peu inégaux, deux & même trois fois plus longs que les fleurs, garnis de bractées droites, subulées, membranées. La corolle est d'un blanc-pâle, très-ouverte, à six pétales ou six découpures très-profondes, elliptiques. Les étamines, au nombre de six, sont de la même longueur que la corolle. L'ovaire est presque rond; il lui succède une capsule un peu ovale, triangulaire, à trois loges.

Cette plante est très-commune sur les côtes de Barbarie. Il est difficile d'imaginer des champs d'une plus grande beauté que ceux dont toute la surface est garnie de ces beaux & longs épis, pressés & nombreux. Les feuilles se montent pendant l'hiver, & les fleurs ne paroissent que vers l'automne. On la rencontre également en Espagne, en Sicile, sur les côtes sablonneuses de la Syrie, & sur les bords de la mer dans les ci-devant provinces de Bretagne & de Normandie. (V. v.)

Ses bulbes sont d'un très-grand usage en médecine; elles passent pour incisives, apéritives, diurétiques. On en fait plusieurs préparations qui conviennent dans les hydropysies; elles excitent puissamment les urines. Ses tuniques hachées, broyées, mélangées avec de la viande ou du pain, sont un poison très-violent pour les rats & les souris.

L'oignon de scille, dit Miller, est un des meil-

leurs remèdes du regne végétal ; aussi en fait-on un fréquent usage dans un grand nombre de circonférences. Cet oignon a une saveur âcre & amère, qui s'attache à la langue, se fait long-tems lentir, & a une odeur subtile, fort acide, & pénétrante comme celle du raifort. Les principes actifs de cette racine sont une substance volatile, âcre & piquante ; un principe mucilagineux, extrêmement âcre & amer, & une portion résineuse, fixe, presque aussi mordicante que la partie gommeuse.

Cette substance, prise intérieurement, aiguillonne, irrite & agace les parties solides, dont la contraction est augmentée par ce moyen ; ce qui accélère la circulation des fluides, dissipe les stases, excite les sécrétions & les excrétions, &c. ; elle produit d'excellents effets dans les affections glaireuses & catarrhales de la poitrine, dans les maladies comateuses, l'apoplexie séreuse, l'asthme humide, l'hydropisie, les obstructions invétérées, & enfin dans toutes les maladies qui reconnoissent pour cause le relâchement & l'atonie des fibres.

On donne cette racine en poudre, à la dose de trois ou quatre grains, & en infusion à la dose de trois jusqu'à six grains, ou bien l'on emploie le vinaigre & l'oxymel scillitique : la dose du premier est depuis un gros jusqu'à une once ; & celle du second, depuis une demi-once jusqu'à une once & demie.

### 2. SCILLE d'Italie. *Scilla italica*. Linn.

*Scilla racemo conico, oblongo*. Linn. Syst. veget. pag. 128. — Retz. Observ. 1. pag. 15. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 126. n°. 3. — Bess. Eynfl. Vern. 42. fig. 1.

*Scilla corymbis conferto, hemisphaerico*. Linn. Spec. Plant. edit. 2. vol. 1. pag. 447. — Miller, Dict. n°. 3.

*Scilla radice solidâ, floribus corymbosis, confertifimis*. Hort. Cliffort. 123. — Royen, Lugd. Bat. 12.

*Hyacinthus stellaris, spicatus, cinereus*. C. Bauh. Pin. 46. — Motif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 11.

*Hyacinthus stellaris, italicus*. Bess. Eynfl. Vern. 42. fig. 1.

*Hyacinthus stellatus, cinereicoloris*. Clus. Hist. 1. pag. 184. Icon.

*Ornithogalum spicatum, cinereum*. Tourn. Inst. R. Herb. 380.

*Hyacinthus stellatus, multiflorus, cinereicoloris*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 182. Ic.

On distingue cette espèce à ses épis coniques, oblongs ; à ses fleurs d'un bleu-pâle, en partie de couleur cendrée.

Ses racines sont des bulbes ovales & presque rondes, charnues, blanchâtres. Les feuilles sont toutes radicales, lancéolées, entières, planes, lisses & glabres, presque obuses, & à peu près de la longueur des hampes : elles s'élèvent à la hauteur d'environ un pied ; elles sont nues, simples, glabres, cylindriques ou un peu anguleuses, fermes, légèrement striées.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des hampes, en un épi court, plus ou moins dense, conique, garni de bractées subules, membranculeuses, un peu colorées, de la longueur des pedoncules. Ceux-ci sont filiformes, redressés, au moins aussi longs que les fleurs. La corolle est d'un bleu-blanc, cendré, quelquefois blanchâtre, assez grande, composée de six pétales ovales, oblongs, obtus à leur sommet, ouverts ; les deux latéraux réfléchis ; les étamines, ainsi que le pistil, plus courts que la corolle.

On soupçonne que cette plante, cultivée dans quelques jardins, est originaire de l'Italie. Allioni la cite des environs de Nice, où elle croît dans les lieux pierreux & ombragés. ( V. f. )

### 3. SCILLE du Pérou. *Scilla peruviana*. Linn.

*Scilla corymbis conferto, conico*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 442. — Mill. Dict. n°. 4. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 258. — Poir. Voy. Flor. Barb. vol. 2. pag. 143. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 127. n°. 1.

*Ornithogalum caraleum, lufitanicum, laisifolium*. Tourn. Inst. R. Herb. 381. — Shaw. Specim. n°. 447.

*Hyacinthus indicus, bulbosus, stylatus*. C. Bauh. Pin. 47. — Rudbeck, Elyf. 1. pag. 37. fig. 1.

*Hyacinthus stellatus, peruvianus*. Clus. Hist. 1. pag. 182. Icon.

*Hyacinthus peruvianus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 181. Icon. — Gerard, Hist. 109. Icon.

*Hyacinthus stellatus, peruvianus, multiflorus ; flore caruleo*. Motif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 11. fig. 10.

*Eriophorus peruvianus*. Clus. Hist. pag. 171.

p. Eadem, flore albo.

*Ornithogalum lufitanicum, laisifolium, flore albo*. Tourn. Inst. R. Herb. 381.

La belle & grosse touffe de fleurs bleues, disposées en un épi conique, ainsi que les feuilles larges & ciliées, rendent cette espèce facile à distinguer.

Ses bulbes sont grosses, ovales, composées de tuniques visqueuses d'un blanc jaunâtre, munies inférieurement d'une portion épaisse, charnue, solide, d'où sortent un grand nombre de fibres

fibres simples, fasciculées. Il sort des racines un grand nombre de feuilles étendues sur la terre, ou médiocrement redressées, allongées, lancéolées, longues de huit à dix pouces & plus, larges d'un à deux pouces, vertes, glabres à leurs deux faces, épaisses, velues & ciliées à leurs bords, planes, canaliculées à leur partie inférieure, quelquefois un peu ondulées, plus ou moins aiguës à leur sommet.

Les hampes sont glabres, cylindriques, épaisses, beaucoup plus courtes que les feuilles, terminées par une belle pyramide large, touffue, conique, de fleurs d'un bleu-vif, ou un peu violettes, extrêmement nombreuses & serrées, se présentant aussi très-souvent sous la forme d'un corymbe convexe. Chaque fleur est supportée par un pédoncule simple, glabre, filiforme, long au moins d'un pouce & demi, muni de bractées membraneuses, lancéolées, aiguës, aussi longues que les pédoncules. La corolle se divise en cinq découpures ouvertes horizontalement, lancéolées, elliptiques, un peu aiguës. Les étamines sont beaucoup plus courtes que la corolle.

Cette plante varie dans la couleur de ses fleurs, qui deviennent souvent blanchâtres ou d'un bleu très-tendre. Leur épi varie aussi beaucoup dans ses formes; il s'allonge en une longue pyramide; les fleurs sont alors plus distantes, les pédoncules plus longs. Ces accidents sont dus particulièrement à la culture.

Cette plante croît naturellement en Barbarie, où je l'ai recueillie vers la fin de l'hiver & au commencement du printemps, dans les bois, sur les collines, à Terrailane, sur le chemin du bastion de France: on la trouve aussi en Portugal. Il paroît que le nom de *scilla* du Pérou ne lui a été donné d'abord que parce qu'on la croyoit originaire de ce pays. (V. v.)

#### 4. SCILLE de Portugal. *Scilla lusitanica*. Linn.

*Scilla racemo oblongo, conico; petalis linearis*. Linn. Syst. veget. pag. 171. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 129. n°. 12.

*Hyacinthus stellaris, caruleus; flaminibus à viridi luteis*. C. Bauh. Pin. pag. 46. — Rudb. Elyf. 2. pag. 14. fig. 4.

*Ornithogalum caruleum, flaminibus à viridi luteis*. Tournef. Infl. R. Herb. 180.

*Hyacinthus stellaris, italicus*. Eyt.

Cette plante, voisine du *scilla amœna*, mais bien plus garnie de fleurs, en diffère encore par ses hampes cylindriques & non anguleuses, terminées par un épi oblong, un peu conique, composé de fleurs distantes, un peu plus courtes que le pédoncule qui les soutient. La corolle est de couleur bleue; elle se divise en six pétales elliptiques, un

peu obtus à leur sommet, ouverts en étoiles, sillonnées par plusieurs lignes longitudinales. Les étamines sont plus courtes que la corolle; leurs filaments élargis, d'un vert-jaunâtre; les anthères jaunes.

Cette plante croît dans le Portugal. (Defcript. ex Linn.)

#### 5. SCILLE élégante. *Scilla amœna*. Linn.

*Scilla scapo angulato; pedunculis alternis, flora brevioribus; bracteis obtusis, brevissimis*. Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 127. n°. 7.

*Scilla floribus lateratibus alternis, subnutantibus; scapo angulato*. Linn. Syst. veget. pag. 128. n°. 1. — Hort. Cliff. 123. — Royen, Lugd. Bat. 33. — Jacq. Auth. tab. 128. — Müller, Dick. n°. 4. — Knipf. Centur. 11. n°. 21. — Hoffm. Germ. 130. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 151. — Il. pag. 196.

*Hyacinthus stellaris, caruleus, amœnus*. C. Bauh. Pin. 46. — Rudb. Elyf. 2. pag. 14. tab. 7.

*Hyacinthus stellaris, bizantinus*. Berl. Eyt. Vern. 43. fig. 2. — Clus. Hist. 1. pag. 124.

*Ornithogalum caruleum, bizantinum*. Tournef. Infl. R. Herb. pag. 180.

*Hyacinthus stellaris, bizantinus, aliter, elegantissimus, serotinus, bullatus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 182. Icon.

*Hyacinthus peregrinus, pluribus floribus praeditus, caruleo violaceus*. Swarr. Florileg.

6. *Ornithogalum bizantinum, flore à caruleo-purpureo*. Tournef. Infl. R. Herb. 180.

*Hyacinthus stellaris, amœnus, flore à caruleo-purpureo*. C. Bauh. Pin. 461.

7. *Ornithogalum bizantinum, flore albo*. Tournef. Infl. R. Herb. 180.

*Hyacinthus stellaris, amœnus, flore albo*. C. Bauh. Pin. 46.

Ses bulbes sont d'une grosseur médiocre, solides, charnues; d'une chair blanche en dedans, rougeâtre en dehors. Les feuilles sont radicales, planes, glabres, lisses, longues d'environ un pied, entières, très-obtus à leur sommet, un peu rétrécies & vaginales à leur base.

Les hampes sont plus courtes que les feuilles, glabres, anguleuses, grêles, terminées par un épi de fleurs blanches, alternes, supportées par des pédoncules plus courts que la corolle, simples, presque droits; munies à leur base de petites bractées très-courtes, blanchâtres, obtuses, un peu élargies. La corolle est d'un beau bleu-foncé, divisée jusqu'à sa base en six découpures ouvertes en étoile, linéaires, obtuses, marquées à leur base & même à une grande partie de leur contour

de deux lignes blanchâtres. Les filamens sont élargis, tubulés, membraneux, de couleur bleue, ainsi que les anthers. L'ovaire est globuleux, jaunâtre, surmonté d'un style droit, aigu, de la longueur des étamines.

Cette espèce varie particulièrement dans la couleur de ses fleurs, qui sont quelquefois d'un pourpre bleuâtre, d'autres fois plus clair, rarement entièrement blanche.

Cette plante croît dans le Levant, aux environs de Constantinople, d'où elle a été rapportée en Europe; elle est cultivée au Jardin des Plantes de Paris & dans plusieurs autres. (V. v.)

6. SCILLE à racines de lys. *Scilla lilio-hyacinthus*, Linn.

*Scilla racemosa pauciflora*, pedunculis breviteratis; foliis lanceolatis, humi adpressis; bulbo squamato. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 126. n°. 2.

*Scilla radice squamata*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 441. — Hort. Clifford. 123. — Royen, Lugd. Bat. 32. — Miller, Dict. n°. 2.

*Ornithogalum squamesum*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 274. n°. 862. IV.

*Lilio-hyacinthus vulgaris*, flore caruleo. Tournef. Inst. R. Herb. pag. 372.

*Hyacinthus stellaris, folio & radice lilii*. C. Bauh. Pin. 46. — Moris. Oxon. Hist. 2. pag. 375. 5. 4. tab. 12. fig. 2.

*Hyacinthus lilio-folius, bellatus*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 589. Icon.

*Hyacinthus stellaris, lilio-folius, floridus, mutoni*. Lobel. Icon. 101. — Idem, Observat. Append. pag. 459. Icon.

*Hyacinthus stellaris, liriophyllos*. Clus. Hist. & Append. alter. Icon.

*Hyacinthus lilaceus vel septimus*. Tabern. Icon.

*Hyacinthus lilaceus Lobelii*. Dalech. Hist. 2. pag. 1515. Icon. *Aut varietas?*

• *Hyacinthus stellaris, alias lilifolius*. Dalech. Hist. 2. pag. 1514. Icon.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *scilla amara*; elle en diffère en ce que, dans cette dernière, les racines sont bulbueuses & non écailleuses, & ses feuilles plus longues que la tige.

Celle-ci a une racine ovale, oblongue, aiguë à son sommet, composée d'écailles imbriquées, jaunâtres, garnies en dessous de fibres un peu charnues, fasciculées. Les feuilles sont toutes radicales, au nombre de six ou sept, beaucoup plus courtes que les hampes, lisses, planes, entières, obtuses à leur sommet ou un peu aiguës, lancéolées, étendues en rond au bas de la plante.

Les fleurs sont disposées en un épi court, peu garni, placées à l'extrémité d'une hampe nue, glabre, haute de six à sept pouces; dépourvues de bractées, soutenues par des pédoncules plus longs que les fleurs. La corolle est bleue, ouverte en étoile.

Cette plante croît dans les départemens méridionaux de la France, dans les Pyrénées, en Espagne, &c. (V. f.)

7. SCILLE en ombelle. *Scilla umbellata*. Ram.

*Scilla foliis linearibus, corymbo pauciflora, plano*. Bullet. Philom. an 8. n°. 41. pag. 130. tab. 8. fig. 6.

*Hyacinthus stellaris, minimus*. C. Bauh. Pin. 47.

*Hyacinthus stellaris, pumilus, vernus*. Lobel. Adv.

*Hyacinthus stellaris, vernus, parvulus; flore ex carulo-cinereo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 581.

*Ornithogalum pumilum, vernum*. Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Cette espèce me paroît très-rapprochée du *scilla verna*, dont elle n'est peut-être qu'une variété, remarquable par sa grappe de fleurs presque disposée en ombelle; mais comme je ne la connois point, & que M. Ramond, qui l'a observée dans les Hautes-Pyrénées, la regarde comme une espèce distincte, je me bornerai à citer ce qu'il en dit.

« On ne confondra pas cette espèce, dit cet auteur, ni avec le *scilla amara*, dont les fleurs sont disposées en grappes, ni avec le *scilla italica*, qui les a en épi conique. Toutes deux ont d'ailleurs les feuilles bien plus larges & plus longues, & dans la dernière les bractées sont doubles & colorées en bleu, tandis que dans la première elles sont à peine visibles.

« Rien de plus commun que cette jolie espèce à l'entrée des Hautes-Pyrénées; elle y fleurit, suivant les expositions & les hauteurs, dès le commencement jusqu'à la fin du printemps. Sa bulbe est ovoïde; elle produit trois à cinq feuilles étroites, épaisses, légèrement plies en gouttière, & qui se soutiennent dans une situation redressée; elles sont toujours plus courtes que la hampe. Celle-ci est parfaitement cylindrique, sans angles & sans fibres, assez menue, mais ferme & droite; elle se termine par quatre à huit fleurs disposées en corymbe ombelliforme, & dont les pédoncules sont accompagnés chacun d'une bractée blanche, qui les égale à peu près en longueur. Ces fleurs ont beaucoup de ressemblance, pour la grandeur & la couleur, avec celles du *scilla lilio-hyacinthus*; elles sont d'un bleu très-pâle & cendré, avec une nervure plus foncée. L'ovaire est d'un bleu plus décidé, & les anthers d'un bleu très-intense. »

Cette plante croît dans les Hautes-Pyrénées.  
(*Ramon, L. c.*)

8. SCILLE printanière. *Scilla verna*. Ait.

*Scilla bulbo tunicato, racemo paucifloro, bracteato; corollis campanulatis; foliis linearibus, canaliculatis, radicibus pluribus*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 443. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 129. n° 11. — Lam. Illustr. Gener. tab. 238. fig. 1. — Miller, Icon.

*Scilla corymbo hemispherico, paucifloro, bracteato; foliis subulato-linearibus, canaliculatis*. Hudf. Augl. 142. — Rudb. Camp. Elyf. pag. 36. fig. 16.

*Ornithogalum hispanicum, minus*. Clus. Hist. 188. Icon. — Gerard, Emac. 166. — Park. Par. 139. — Rai, Hist. 1153.

*Ornithogalum umbellatum, floribus ex alio subaequalibus*. C. Bauh. Pin. 70.

C'est une petite plante dont les bulbes sont un peu arrondis, & produisent quelques feuilles radicales, droites, presque linéaires, quelquefois un peu élargies, lisses, entières, obtuses à leur sommet, canaliculées, enveloppant les hampes par leur base. Celles-ci sont droites, foibles, grêles, cylindriques, à peine aussi longues que les feuilles, terminées par une petite grappe ou un épi court, composé de très-peu de fleurs.

Les corolles sont bleues ou d'un blanc-bleuâtre, un peu campanulées, divisées en six découpures ouvertes, ovales, oblongues, presque elliptiques, obtuses, soutenues par des pédoncules au moins aussi longs que les fleurs, munis de bractées membraneuses, de la longueur de ces mêmes pédoncules. Les étamines sont plus courtes que la corolle; leurs filamens élargis, comprimés; les anthères bifides à leurs deux extrémités; l'ovaire presque globuleux, surmonté d'un style droit, court, épais.

Cette plante croît en Espagne, dans les pâturages & les prés. x

9. SCILLE précoce. *Scilla praecox*. Willd.

*Scilla scapo angulato, racemo subcorymbose; pedunculis flore duplo longioribus; bracteis obscuris*. Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 128. n° 8.

Cette espèce a quelques rapports avec le *scilla amara*, dont néanmoins elle se distingue aisément, dès le premier aspect, à sa petitesse & à l'apparition de ses fleurs bien plus précoces.

Les fleurs sont radicales, linéaires, constamment aiguës, rétrécies à leur base: il s'élève de leur centre une hampe anguleuse, qui soutient à son sommet un épi de fleurs presque disposées en corymbe, supportées par des pédoncules inégaux en grandeur; les inférieurs au moins trois fois

plus longs que les fleurs; les supérieurs à peine deux fois; munis de bractées obtuses, très-petites, à peine sensibles. La corolle est campanulée, à six divisions, trois fois plus petite que celle du *scilla amara*.

Le lieu natal de cette plante, cultivée dans quelques jardins, est encore inconnu. x (*Descript. ex Willd.*)

10. SCILLE du Japon. *Scilla japonica*. Thunb.

*Scilla florum, umbellâ terminali, sessiliatâ*. Thunb. Flor. jap. pag. 137. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 127. n° 6.

Ses hampes sont simples, droites, glabres, hautes de six à sept pouces, munies dans presque toute sa longueur & sous les fleurs, de bractées alternes, membraneuses, lanceolées, droites, appliquées contre les hampes, plus longues que les intervalles.

Les fleurs sont terminales & presque disposées en ombelle, soutenues par des pédoncules courts. La corolle est ouverte, d'un pourpre un peu blanchâtre, composée de six pétales oblongs, rétrécis en onglet à leur base, obtus-à leur sommet; les filamens, insérés à la base des pétales, un peu plus courts que la corolle, terminés par des anthères oblongues & bleuâtres. Le style est un peu plus long que les étamines. Les feuilles ne sont point connues, & ne paroissent jamais tant que la plante est en fleurs.

Cette plante croît au Japon. x (*Descript. ex Thunb.*)

11. SCILLE de Byzance. *Scilla byzantina*. Hort. Paris.

*Scilla foliis linearibus, obtusis, scapo subaequantibus; spica conica, multiflora; bracteis pedunculo longioribus*. (N.)

Cette espèce, qui paroît presque tenir le milieu entre le *scilla amara* & le *scilla verna*, ne peut être confondue avec ces deux espèces; elle diffère de la première par ses fleurs plus blanchâtres, & de la seconde par ses fleurs bien plus nombreuses, serrées, disposées en un épi conique.

Ses feuilles sont étroites, linéaires, très-glabres, striées, entières, longues de six à huit pouces & plus, larges de trois à quatre lignes, obtuses à leur sommet, droites, planes, vaginales à leur base. Les hampes sont foibles, glabres, cylindriques, à peine de la longueur des feuilles, terminées par un épi court, serré, élargi inférieurement, conique, obtus à son sommet, composé de fleurs bleuâtres, soutenues par des pédoncules filiformes, inégaux, plus longs que la corolle, munis à leur base de bractées membraneuses, colorées, un peu élargies, subulées à leur sommet.

plus longues que les pédoncules & les fleurs. La corolle est ouverte en étoile, divisée en six découpures lancéolées. Les éamines sont plus courtes que la corolle.

Cette plante est originaire du Levant, & cultivée au Jardin des Plantes de Paris. (V. v.)

12. SCILLE hyacinthe. *Scilla hyacinthoides*. Linn.

*Scilla racemo cylindraceo, multiflora; petalis germine squis longioribus; pedunculis coloratis, foliis lanceolatis*. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 445. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 130. n°. 14.

*Scilla racemo longifloro, floribus pedunculo colorato longioribus*. Linn. Syst. veget. pag. 329.

*Scilla racemo longifloro, floribus subverticillatis, pedunculis patentibus*. Gouan, Illustr. pag. 16.

*Bulbus eriophorus, orientalis*. C. Bauh. Pin. 47.

*Ornithogalum eriophorum, orientale*. Tournef. Inst. R. Herb. 381.

*Bulbus eriophorus*. Clus. Hist. 172. Icon. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 721. Icon. — Dodon. Pempt. 692. Ic. — Lobel. Icon. 110. — Idem, Observ. pag. 56. Icon. — Dalech. Hist. 2. pag. 1304. Ic.

*Hyacinthus eriophorus, orientalis, seu bulbos eriophorus Clusi*. Morif. Oxon. Hist. 2. 6. 4. tab. 12. fig. 20.

*Scilla (eriophora), radice solidâ; corymbo conferto, hamisphérico; scapo longifloro*. Miller, Dict. n°. 10.

Ses racines sont grosses, tomenteuses, composées de tuniques blanchâtres, accompagnées ordinairement de plusieurs autres bulbes latérales, garnies en dessous de fibres épaisses, oblongues, fasciculées. Il en sort des feuilles droites, médiocrement épaisses, larges, concaves, oblongues, lancéolées, presque eniformes, aiguës, se recouvrant presque par imbrication à leur base, autour des hampes : elles fourmillent, en se détruisant, une forte de filasse velue ; elles ont un pied & plus de longueur, sur environ un pouce de large.

Les hampes sont fermes, roides, cylindriques, plus hautes que les feuilles, glabres, verdâtres, terminées par un long épi dense, cylindrique, composé de fleurs nombreuses, petites, de couleur bleue, soutenues par des pédoncules filiformes, épais, trois fois plus longs que les corolles, de couleur bleuâtre. La corolle est partagée en six pétales ouverts en étoile, courts, elliptiques, aiguës, rayés, d'un bleu plus foncé. L'ovaire est ovale, triangulaire, une fois plus court que les pétales. Les éamines, surtout les anthères, sont légèrement bleuâtres.

Cette plante croît à l'île de Madère & dans le Levant ; elle fleurit au commencement de l'été. Il est extrêmement difficile d'en obtenir des fleurs, d'après la remarque de M. Gouan, si l'on ne prend soin, tous les ans, d'enlever les jeunes bulbes qui accompagnent la principale. (V. f.)

13. SCILLE campanulée. *Scilla campanulata*. Ait.

*Scilla bulbo solido; racemo multiflora, oblongo-subconico; corollis campanulatis, erectis; bracteis bipartitis, pedunculo longioribus, foliis lanceolatis*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 444. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 128. n°. 9.

*Scilla hyacinthoides*. Jacq. Icon. tat. 1. tab. 65. — Idem, Collect. 1. pag. 61. — Lam. Illustr. Gen. tab. 238. fig. 2.

*Hyacinthus stellatus, saturate caeruleus*. C. Bauh. Pin. pag. 46.

*Hyacinthus hispanicus, stellato flore*. Clus. Cur. 20.

*Scilla (hispanica), radice solidâ; floribus paniculatis, subnutantibus*. Miller, Dict. n°. 8.

*Ornithogalum hispanicum, saturate, caeruleum*. Tournef. Inst. R. Herb. 381.

Ses bulbes sont ovales, solides, charnues, d'une grosseur médiocre, blanchâtres, garnies en dessous de fibres courtes, presque filiformes ; elles produisent plusieurs feuilles glabres, d'un vert luisant, lancéolées, longues d'environ un pied, sur un peu plus d'un pouce de large ; planes, aiguës à leur sommet, presque imbriquées à leur base, réfléchies ou tombantes à leur partie supérieure.

Les hampes sont droites, glabres, simples, cylindriques, terminées par un épi oblong & presque conique, de fleurs médiocrement distantes, d'un beau bleu-foncé, portées sur des pédoncules à peine de la longueur des fleurs, droits ou médiocrement recourbés, munis de bractées linéaires, aiguës, membranées, à peine plus longues que les pédoncules, quelquefois bifides. La corolle est presque campanulée, à six découpures profondes, lancéolées, obtuses, droites à leur partie inférieure, ouvertes & un peu recourbées à leur moitié supérieure. Les éamines sont un peu plus courtes que la corolle ; l'ovaire ovale, le style subulé, incliné ; le stigmate aigu.

Cette plante se rencontre en Espagne & dans le Portugal. (V. f.)

14. SCILLE de Numidie. *Scilla numidica*. Poir.

*Scilla foliis linearibus, planis; floribus racemosis; pedunculis flore longioribus*. Poir. Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 150.

*Scilla* (patviflora), *foliis linearilanceolatis*, *acutis*, *glabris*, *scapo brevioribus*; *floribus racemosis*, *confertis*; *bracteis brevissimis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 300. tab. 87.

Cette espèce a des rapports avec la *Scilla linguata*, surtout avec la variété  $\beta$ . Mais les bractées sont beaucoup plus courtes, ses fleurs en épis allongés, point coniques. Les fleurs plus grandes, aiguës, point étendues sur la terre.

Ses bulbes sont assez grosses, blanchâtres, ovales, solides, tuniqueuses; les tuniques extérieures membraneuses, de couleur brune: il en sort des feuilles radicales, au nombre de cinq ou six, glabres, inégales, très-entières, un peu épaisses, légèrement striées, lancéolées, un peu plus larges à leur base, insensiblement rétrécies jusque vers leur sommet, plus ou moins aiguës, longues d'environ six pouces, sur cinq à six lignes de large.

Les hampes sont droites, simples, cylindriques, glabres, hautes d'un pied & plus, terminées par un épigée de fleurs d'abord court & un peu conique, qui s'allonge & devient peu à peu cylindrique. Les pédoncules s'accroissent proportionnellement & ont alors au moins trois fois la longueur des fleurs; ils sont glabres, filiformes, horizontaux, munis à leur base de bractées fort petites & caduques. La corolle est violette, & se divise en six découpures profondes, obtuses; les étamines sont aussi longues que la corolle, les filaments élargis à leur partie inférieure, les anthères bleuâtres, le style aigu, le stigmate simple.

J'ai recueilli cette plante sur les collines, dans les environs d'Hyppone en Afrique. M. Desfontaines l'a également observée dans les environs d'Alger. Elle croît dans l'automne, & varie de grandeur, depuis huit pouces jusqu'à un pied & demi.  $\gamma$  (V. v.)

15. SCILLE ANTHÉRIOÏDE. *Scilla anthericoides*. Poiret.

*Scilla racemo longo*, *spicato*; *floribus pedunculis aquantibus*, *basi bracteis*. Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 150.

*Scilla* (anthericoides), *racemo longo*, *bracteis subulatis*, *pedicellis corollæ brevioribus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 301.

La grandeur & la couleur de fleurs donnent à cette espèce l'aspect d'un *anthericum*, & la distinguent des autres de ce genre.

Ses bulbes sont ovales, oblongues, solides, tuniqueuses, blanchâtres, d'un brun-rougeâtre à l'extérieur: il s'en élève deux ou trois hampes droites, glabres, fermes, quoique fistuleuses, un peu comprimées, hautes d'un à deux pieds, terminées par un long épi lâche, un peu cylindrique,

de fleurs d'un jaune-pâle, supportées par des pédoncules filiformes, aussi longs & quelquefois plus longs que la corolle, plus courts aux fleurs supérieures, peu écartés des hampes, garnis à leur base de bractées membraneuses, très-étroites, subulées, égales ou plus courtes que les pédoncules, selon que ceux-ci varient dans leur longueur.

La corolle est médiocrement ouverte en six découpures profondes, oblongues, elliptiques, obtuses, marquées d'une raie milieu d'une raie brune. Les étamines sont un peu plus courtes que la corolle; les filaments élargis à leur partie inférieure, aiguës à leur sommet, les anthères courtes, ovales, jaunâtres; le pistil de la longueur des étamines. Je n'ai pas vu les capsules ni les feuilles; ces dernières n'existent point quand la plante est en fleur. La base des hampes est garnie de larges membranes scarieuses, lancéolées, striées.

Nous avons trouvé cette espèce, M. Desfontaines & moi, dans le bois de Fréje, en allant de Bonne à la Calle, sur les côtes de Barbarie; elle fleurit en automne & au commencement de l'hiver.  $\gamma$  (V. v.)

16. SCILLE D'AUTOMNE. *Scilla autumnalis*. Linn.

*Scilla foliis filiformibus*, *linearibus*; *floribus corymbosis*; *pedunculis nudis*, *adscendentibus*, *longitudine floris*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. — Miller, Dict. n.º 7. — Cavan. Icon. rar. vol. 3. pag. 38. tab. 274. fig. 2. — Curtis, Lond. Icon. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 301. — Gouan, Monsp. pag. 174. n.º 5. — Getard, Flor. gall. Prov. pag. 149. n.º 1.

*Anthericum autumnale*. Scopoli. Carn. n.º 415.

*Scilla radice solida*; *foliis setaceis*; *floribus sagittatis*; *pedunculis arcuatis*, *ex alâ tuberculi mamillaris*. Guett. Stamp. 131. — Dalib. Paris. 102.

*Scilla radice solida*, *scapo multifloro*, *floribus capitatibus*. Sauvag. Monsp. 19.

*Hyacinthus stellaris*, *autumnalis*, *minor*. C. Bauh. Pin. 47. — Magn. Botan. Monsp. 134.

*Hyacinthus autumnalis*, *minor*. Clus. Hist. r. pag. 185. Icon. — Dodon. Pempt. 219. Icon. — Gerard, Hist. r. 110. Icon.

*Ornithogalum autumnale*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 274. n.º 862. V.

*Ornithogalum autumnale*, *minus*, *floribus caruleis*. Tournel. Inst. R. Herb. 381. — Gaidel, Aix. pag. 344. tab. 76.

*Hyacinthus autumnalis*. Lobel. Icon. 102. — Idem, Observ. pag. 51. Icon.

*Hyacinthus autumnalis Dodonæi*. Dalech. Hist. 2. pag. 1513. Icon.

*Hyacinthus autumnalis, minimus & major.* J. Barih. Hist. 2. par. 574. Icon. — II. Eyller. autumn. 3. pag. 5. fig. 2.

*Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor.* Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 12. fig. 18.

3. *Ornithogolum autumnale, minus, flore dilute purpureo.* Tournef. Inst. R. H. 1. 1. 381.

*Hyacinthus stellaris, autumnalis, minor, flore purpurea ditioris.* C. Bauh. Pin. 47.

Cette espèce est assez distincte. Ses bulbes sont blanchâtres, arrondies, un peu ovales; elles produisent un assez grand nombre de feuilles radicales, faibles, recouvertes, très-ménues, filiformes, glabres, vertes, plus courtes que les tiges, & qui très-souvent se fanent & disparaissent avant le développement des fleurs.

Les hampes sont droites, nues, grêles, très-simples, hautes de six à huit pouces, cylindriques, terminées par un assez long épi de fleurs presque disposés en corymbe, alternes, assez nombreuses, médiocrement rapprochées, soutenues par des pédoncules redressés, au moins de la longueur de la corolle, dépourvus ordinairement de bractées; du moins je n'y en ai jamais observé. La corolle est de couleur bleuâtre ou purpurine, ouverte médiocrement en étoile, à six découpures, linéaires, un peu obtuses, d'une grandeur médiocre; les étamines à peine plus courtes que la corolle.

Cette plante croît dans les terrains argileux, au bois de Boulogne, dans les environs de Paris, en France, en Espagne, en Italie; elle fleurit dans l'automne. (V. v.)

17. *SCILLE à feuilles obtuses. Scilla obtusifolia.* Poiret.

*Scilla scapo laterali, foliis linguiformibus, undulatis; floribus racemosis, ebracteatis.* Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 299, tab. 86.

*Scilla (obtusifolia), foliis ovato-oblongis, obtusis; racemo longissimo, floribus pedunculo brevioribus.* Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 149.

Cette espèce se trouve distinguée des autres de ce genre par plusieurs caractères très-saillans, par ses hampes latérales, par la privation de bractées, & par ses feuilles obtuses, en forme de langue.

Ses bulbes sont grosses, ovales, solides, tuniquees; 1/2 tunique extérieure membraneuse; elles produisent des feuilles toutes radicales, oblongues, en forme de langue, glabres à leurs deux faces, entières, obtuses à leur sommet, un peu ondulées à leurs bords, quelquefois légèrement mucronées, longues de trois à quatre pouces, larges presque d'un pouce, rétrécies, presque membraneuses & concaves à leur base.

Les hampes, au nombre de deux ou trois, sortent latéralement des bulbes; elles sont fermes, assez dures, cylindriques, un peu rugueuses à leur base, droites ou un peu courbées, hautes d'environ un pied & plus, terminées par un long épi de fleurs lâches, d'un bleu-bleu dans leur jeunesse, & qui prennent une teinte violette en vieillissant; supportées par des pédoncules glabres, filiformes, longs au moins d'un pouce, épaiss, écartés des hampes, dépourvus de bractées. La corolle est petite, assez voisine de celle du *scilla autumnalis*, partagée en six découpures elliptiques, un peu obtuses. Les étamines sont de la même longueur que la corolle. L'ovaire est un peu ovale, surmonté d'un style simple, de la longueur des étamines. Les capsules sont courtes, presque rondes, obtuses, à trois côtes, à trois valves, à trois loges; elles renferment des semences oblongues & noires.

Nous avons recueilli cette plante, M. Desfontaines & moi, en Barbarie, sur les collines boisées des environs de la Calle. (V. v.)

18. *SCILLE ondulée. Scilla undulata.* Desf.

*Scilla foliis lanceolatis, undulatis; floribus laxè racemosis, bracteis brevissimis.* Desfont. Flor. atl. vol. 1. pag. 300, tab. 88.

Cette espèce est fort jolie, remarquable par ses feuilles lancéolées, élégamment ondulées à leurs bords, & par ses fleurs d'une couleur de rose-pâle.

Ses bulbes sont ovales, compacts, tuniquees; les enveloppes extérieures membraneuses & détachées; elles produisent des feuilles étendues en rond sur la terre, lancéolées, assez larges, glabres à leurs deux faces, ondulées à leur contour, longues de trois à quatre pouces, sur environ un demi-pouce de largeur, rétrécies, un peu aiguës à leur sommet.

Les hampes sont grêles, simples, cylindriques, droites, plus longues que les feuilles, hautes d'un à deux pieds, terminées par un épi de fleurs lâches, alternes, pédonculées; les pédoncules filiformes, plus longs que les fleurs, munis à leur base de bractées subulées, extrêmement petites. La corolle est campanulée, ouverte, à six découpures très-profondes, linéaires, un peu obtuses, plus fortement colorées dans leur milieu. Les étamines sont plus courtes que la corolle; les filamens étroits, tous égaux; les anthères jaunes; le style aussi long que les étamines. Le fruit est une capsule obtuse, triangulaire, à trois valves, à trois loges, appliquée contre la hampe, renfermant un grand nombre de semences.

Cette plante a été découverte, par M. Desfontaines, sur les collines incultes des environs de Tunis, d'Alger, de Constantine; elle fleurit vers



la fin de l'automne ou au commencement de l'hiver. Les feuilles ne paroissent qu'après la floraison. 7.

19. SCILLE lingulée. *Scilla lingulata*. Poir.

*Scilla foliis lanceolatis, planis; racemo florum denso, conico; bracteis subulatis, pedicellis aquantibus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 298. tab. 85. fig. 1.

*Scilla (lingulata), foliis lineari-lingulatis; floribus spicatis, pediculis longioribus*. Poiret, Voyage en Barb. vol. 2. pag. 151.

1. *Eadem, scapis folisque triplo longioribus*.

Cette espèce a des bulbes ovales, petites, blanchâtres, tuniquees, foliées, garnies en dessous de fibres chatnues, alongées, fasciculées; elles produisent environ six feuilles radicales, planes, linéaires, lingulées ou lancéolées, molles, élabres, vertes à leurs deux faces, entières à leurs bords, un peu ciliées, obtuses, quelquefois un peu aiguës à leur sommet, longues d'un pouce & demi à deux pouces, larges de trois à quatre lignes, étendues sur la tette ou tombantes, enveloppées à leur base par une gaine blanchâtre & membraneuse.

Les hampes sont droites, grêles, tendres, cylindriques, glabres ou légèrement pubescentes, d'environ un tiers plus longues que les feuilles, terminées par un épi court, épais, presque ovale, composé de fleurs pédonculées, d'un bleu-vif; les pédoncules filiformes, au moins de la longueur des fleurs, garnis à leur base de bractées subulées, presque scarées, membranées, aussi longues & même un peu plus longues que les pédoncules. La corolle ressemble beaucoup à celle du *scilla italica*; elle est petite, partagée en six découpures profondes, elliptiques, obtuses, marquées dans leur milieu d'une ligne plus foncée. Les étamines sont plus courtes que la corolle; les filaments élargis à leur partie inférieure; l'ovaire un peu arrondi.

La variété 1 est au moins trois fois plus élevée que la précédente. Ses épis sont plus alongés; les fleurs moins rapprochées, alternes.

J'ai recueilli cette plante en Barbarie, sur les collines & dans les contrées habitées par les Nadis; elle fleurit à la fin de l'hiver & au commencement du printemps. 7. (P. v.)

20. SCILLE velue. *Scilla villosa*. Desfont.

*Scilla foliis lanceolatis, planis, villosis; floribus corymbois*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 299. tab. 85. fig. 2.

Cette espèce a le port de notre *scilla lingulata*, mais ses feuilles sont un peu plus étroites & ve-

lues, ses fleurs plus longuement pédonculées & disposées en une sorte de corymbe.

Ses bulbes sont ovales, solides, tuniquees; elles produisent des feuilles toutes radicales, lancéolées, velues, planes, très-entières, étendues sur la terre, obtuses ou un peu aiguës à leur sommet, inégales, longues d'environ quatre à cinq pouces, larges de deux à trois lignes.

Du centre de ces feuilles s'élève une hampe droite, un peu plus courte que les feuilles, simple, glabre, cylindrique, terminée par un épi de fleurs presque en forme de petit corymbe. Les pédoncules sont filiformes, inégaux, plus longs que les fleurs; les inférieurs longs au moins d'un pouce & plus; les supérieurs plus courts, munis de bractées lancéolées, concaves, membraneuses, aiguës; les unes plus longues, d'autres plus courtes que les pédoncules. La corolle est d'une belle couleur bleue, semblable à celle du *scilla amena*, partagée profondément en six découpures ouvertes, elliptiques, un peu obtuses; elle renferme six étamines plus courtes que la corolle, & dont les filaments sont planes, plus larges à leur partie inférieure; un style de la longueur des étamines, un stigmate simple, un ovaire arrondi.

Cette espèce a été découverte, par M. Desfontaines, sur les côtes de Barbarie, dans le sable, aux environs de Keroan; elle fleurit dans l'hiver. 7.

21. SCILLE à deux feuilles. *Scilla bifolia*. Linn.

*Scilla floribus racemosis, foliis lanceolato-linearibus, subinis, in fereis elevatis*. Ait. Hort. Kew. vol. 1. pag. 444. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 128. n°. 10.

*Scilla radice solidâ, floribus erectiusculis, paucioribus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. — Horr. Cliff. 123. — Royen, Lugd. Bat. 33. — Sauvag. Monsp. 18. — Jacq. Austr. 2. pag. 17. tab. 117. — Oeder. Flor. dan. tab. 568. — Miller, Dict. n°. 6. — Hoffm. Germ. 120. — Retz. Obsev. 6. pag. 27. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 274. n°. 862, sub Ornithogalo. — Gouan, Monsp. pag. 174. n°. 6.

*Phalangium radice bulbosâ, foliis latissimis, obtusis; spica pauciflora, stipulis minimis*. Haller, Helv. n°. 1211.

*Anthericum bifolium*. Scopol. Carn. n°. 414.

*Ornithogalum biflorum*. Neck. in Act. Pal. vol. 2. pag. 46.

*Hyacinthus stellaris, bifolius, germanicus*. C. Bauh. Pin. 45. — Morif. Oxon. Hist. 2. §. 4. tab. 12. fig. 15.

*Hyacinthus stellatus, bifolius, vernus, dumetorum; flore catuleo*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 579. Icon.

*Hyacinthus Fafihil.* Dodon. Coroll. 181. Hist. 219. Icon.

*Hyacinthus caruleus, mas, minor.* Fusch. Hist. 837.

*Ornithogalum bifolium, germanicum, caruleum.* Tournet. Inst. R. Herb. 380.

*Hyacinthus stellatus, albo flore.* Cluf. Hist. 1. pag. 184.

Ses bulbes sont pleines, fermes, ovales, garnies en dessous de fibres charnues, fasciculées; elles ne produisent ordinairement que deux feuilles radicales, lancéolées, linéaires, glabres, planes, striées, larges d'environ quatre à six lignes & plus, longues de six à huit pouces, nues, entières à leurs bords, obtuses à leur sommet, droites, & engageant longuement la hampe par leur base.

Les hampes sont droites, simples, glabres, cylindriques, lisses, charnues, de la longueur des feuilles, terminées par un petit épi lâche & court, composé de deux à six fleurs & plus, pédonculées, munies de bractées fort petites, blanchâtres, membranées, à peine sensibles; les pédoncules inégaux, deux ou trois fois plus longs que les fleurs. La corolle est d'un bleu très-vif, variable dans ses couleurs, tantôt d'un bleu-pâle, cendré, quelquefois tout-à-fait blanche; elle se divise en six découpures très-profondes, ouvertes en étoile, oblongues, elliptiques, obtuses, traversées dans leur longueur par un ligne rouffâtre. Les filamens sont comprimés, membraneux, fusulés, plus courts que la corolle; les anthères grosses, colorées, vacillantes; le pistil de la longueur des étamines.

Cette plante croit en France, en Allemagne, dans l'Abbaye, dans les lieux couverts & les pâturages; elle fleurit au commencement du printemps. (V. v.)

## 21. SCILLE à une feuille. *Scilla unifolia.* Linn.

*Scilla folio trietiafalo, latere subfufcato.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 443. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 131. n.º 16.

*Ornithogalum spicatum, unifolium, flore niveo, odorato.* Criff. Luitan.

*Bulbus monophyllus, flore albo.* J. Bauh. Hist. 2. pag. 622, 1c.

*Ornithogalum spicatum, unifolium, flore n'vo, odorato, quantum, lufitanicum.* Tournet. Inst. R. Herb. 380.

*Dontellas Lufitanorum.*

Cette espèce est rare, & distinguée des autres en ce qu'elle ne produit guère qu'une seule feuille étroite, junciforme, glabre, qui s'accroît de plus en plus, & acquiert quelquefois jusqu'à un

piéd de long, étendue sur la terre, & accompagnée, quoique rarement, d'une seconde qui paraît un peu plus tard.

Les hampes sont très-courtes, droites, lisses, cylindriques, de couleur verte, enveloppée, à sa partie inférieure, par la base de la feuille, & terminée par un épi court un peu unilatéral, ne supportant que quelques fleurs odorantes, d'un blanc de neige, ouvertes en étoile par six découpures courtes, ovales, un peu aiguës, presque sessiles, munies de bractées très étroites, à peine aussi longues que la corolle. Les filamens des étamines sont blancs, & les anthères jaunâtres; l'ovaire triangulaire, surmonté d'un styl: blanchâtre, de la longueur des étamines. Les bulbes sont solides, orbiculaires, de la grosseur d'une noisette, recouvertes d'une membrane noirâtre, garnies en dessous de fibres blanches, charnues.

Cette plante se rencontre dans le Portugal.

## 23. SCILLE à quatre feuilles. *Scilla tetraphylla.* Linn. f.

*Scilla acaulis, floribus sessiculis; foliis quaternis, ovato-lanceolatis.* Linn. f. Suppl. pag. 200. — Willd. Spec. Plant. vol. 2. pag. 126.

Cette espèce a de racines bulbeuses: il en sort quatre feuilles ouvertes, disposées en croix, en forme de cœur, lancéolées, sessiles, lisses, nerveuses. Les hampes sont presque nulles. Les fleurs sont très-nombreuses, réunies en un faisceau dense, une fois plus courtes que les feuilles, supportées par des pédoncules filiformes, sétacés, uniflores. Les pétales sont lancéolés, membraneux à leurs bords. Ils renferment six étamines, dont les filamens sétacés sont plus courts que la corolle, terminés par des antières oblongues. L'ovaire est presque arrondi, à six angles obtus, surmonté d'un style filiforme, & termine par un stigmate obtus.

Cette plante croit dans l'Afrique.

## 24. SCILLE orientale. *Scilla orientalis, erectis, racemosis; foliis elliptico-ensiformibus.* Thunb. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 334. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 129. n.º 13.

*Scilla bifolia.* Thunb. Flor. japon. 138.

Cette plante pousse plusieurs feuilles radicales, élabres, elliptiques, ensiformes, retrécies à leur partie inférieure, haute de quatre à cinq pouces, du milieu de laquelle s'élève une hampe droite, glabre, haute de deux pieds, garnie, dans sa longueur, d'écaillés alternes qui ont la forme de spatules. Les fleurs sont disposées en une grappe terminale.

Cette plante se rencontre au Japon. (Descript. ex Thunb. L. c.)

## 25. SCILLE à fleurs géminées. *Scilla biflora.* Ruiz & Pavon.

*Scilla*

*Scilla racemo laxo, floribus geminis.* Ruiz & Pav., Flor. peruv. vol. 3. pag. 69. tab. 302. fig. A.

C'est une plante glabre, dont les racines ont une bulbe arrondie, tuniquee, garnie de plusieurs filamens fibreux : il s'en élève une hampe droite, cylindrique, grêle, haute d'un pied & demi, nue, à sa base, de feuilles glabres, ensiformes, striées, entières, rabattues, un peu plus courtes que les hampes, longues d'un pied & plus, larges d'environ un pouce.

Les fleurs sont disposées en une grappe simple, lâche, terminale, sur laquelle les fleurs sont distantes, alternes, placées deux par deux, soutenues par des pédoncules droits, cylindriques, filiformes ; une bractée ovale, petite, aiguë, membraneuse, qui se dessèche & perit, fixée à la base des pédoncules geminés. La corolle est blanche ; les pétales lancéolés, les filamens subules ; les anthères inclinées. La capsule est globuleuse, de la grosseur d'un pois, marquée de trois sillons, acuminée à son sommet.

Cette plante se rencontre au Pérou, sur les collines (sublunaires) elle fleurit en juin & juillet. (Description de Ruiz & Pav.)

SCIODAPHYLLE. *Adinophyllum*. Flor. peruv.

*Sciophyllum*. Brown. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, de la famille des *aralia*, qui a des rapports avec les *cussonia* & les *penaeas*, & qui comprend des arbres ou arbrustes exotiques à l'Europe, dont les feuilles sont digitées ; les fleurs disposées la plupart en ombelle, ramassées en tête.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

Un calice entier à ses bords ; une corolle en forme de coiffe ; de cinq à sept étamines ; sept styles ; une baie à sept angles, à sept loges ; des semences solitaires, presque ovales.

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur est :

1°. Un calice supérieur, persistant, entier, fort petit, formant un rebord membraneux.

2°. Une corolle monopétale, en forme de coiffe, s'ouvrant transversalement & avec élasticité, vers les bords du calice, par le redressement des étamines.

3°. Les étamines sont au nombre de cinq à sept, dont les filamens sont filiformes, étalés, terminés par des anthères ovales.

4°. Un ovaire petit, tronqué, surmonté de sept styles très-courts, ouverts en étoile, terminés par des styles simples.

Le fruit est une baie à sept angles, à sept loges, couronnée par le calice, surmontée des styles persistans. Botanique. Tome VI.

filans, contenant des semences solitaires, oblongues, presque effusées.

#### ES P È C E S.

1. *Sciophyllum anguleux*. *Sciophyllum angulatum*.

*Sciophyllum foliolis septem seu undecim, racemis solitariis geminisque ; corollis obovatis, angulatis, truncatis.*

*Adinophyllum angulatum.* Ruiz & Pavon., Flor. peruv. vol. 3. pag. 73. tab. 367.

*Sciophyllum*. Griseb. Virgin. pag. 150. tab. 19. fig. 1, 2.

C'est un assez bel arbre, haut de vingt-quatre à trente pieds, dont le tronc est droit, cylindrique, tameux à son sommet, marqué de cicatrices annulaires, dont les rameaux sont droits, étalés, granuleux, chargés, à leur sommet, de feuilles alternes, longuement pétioles, divisés en folioles radiées, presque longues d'un pied, larges d'environ trois pouces, pétioles, oblongues, acuminées, concaves à leur base, très-entières, vertes, luisantes en dessus, pulvériscentes, lanugineuses en dessous, d'un jaune de rouille, un peu ridées, chargées de veines presque horizontales, réticulées, rabattues, pendant le jour, depuis dix heures du matin jusqu'à la nuit. Les pétioles communs sont cylindriques, filés, plus longs que les folioles, quelquefois granuleux ; les partiels longs d'un pouce, persistans à leur base & à leur sommet, sillonnés en dessus. Les bourgeons sont axillaires, aigus ; les stipules solitaires, en forme de spathe, amplexicaules, à demi-lancéolées, conniventes avec le pétiole, granuleux en dehors, d'un pourpre-foncé, longues d'un pouce & demi, persistantes.

Les fleurs sont disposées en grappes terminales, solitaires ou geminées, droites, granuleuses, longues d'un pied. Les pédoncules sont courts, épais, munis de petites bractées ovales ; chacun d'eux est terminé par une grosse tête de fleurs globuleuses, sessiles, agrégées ; ces têtes, au nombre de cinq à neuf sur chaque grappe, sont de la grosseur d'un œuf de poule, jaunâtres pendant la floraison, d'un pourpre-noirâtre à la maturité des fruits : le réceptacle est alvéolé. La corolle est oblongue, anguleuse, tronquée à ses deux extrémités, eu coiffe, s'ouvrant transversalement avec élasticité. Les étamines sont ordinairement au nombre de huit, quelquefois de sept ou neuf, avec quatre, cinq, six, quelquefois sept styles. Le fruit est composé de baies d'un pourpre-noirâtre, cunéiformes, anguleuses, à quatre, cinq ou six loges, rarement sept, couronnées par les styles, renfermant des semences solitaires, oblongues, presque effusées.

Cet arbre produit une gomme transparente, B5555

entièrement soluble dans l'eau. Il croît sur les montagnes froides & dans les forêts, au Pérou; il fleurit depuis le mois de juillet jusqu'à celui d'octobre. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

2. *SCIODAPHYLLE* pédicellé. *Sciodaphyllum pedicellatum*.

*Sciodaphyllum foliolis novem seu tredecim; racemis sessilis; floribus pedicellatis, umbellatis; corollis hemisphaericis.*

*Acinophyllum pedicellatum.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 74. tab. 308.

Arbrisseau grimpant, dont les tiges sont radicantes, cylindriques, rameuses, médullaires, marquées de cicatrices annulaires, divisées en rameaux de couleur purpurine, étalés, cylindriques, feuillés à leur extrémité, granuleux, les grains oblongs; les bourgeons axillaires, aigus. Les feuilles sont alternes, longuement pétiolées, composées de neuf à treize folioles radiales, planes, ouvertes, oblongues, finies, ombrées à leurs bords, acuminées à leur sommet, et légèrement concaves à leur base, entières, glabres à leurs deux faces, longues d'environ six pouces, larges d'un pouce & demi. Le pétiole commun est cylindrique, d'un pourpre-obscur, renflé à ses deux extrémités; les partiels sillonnés en dessus, comprimés latéralement, pourpres & velus en dessous, épais à leur base & à leur sommet, longs d'un pouce & demi; les folioles, en forme de spathe, sont solitaires, à demi-lancéolées, conniventes avec les pétioles, purpurines, granuleuses en dehors, longues d'un pouce.

Les fleurs sont réunies en grappes terminales, agrégées, au nombre de sept environ, étalées, longues d'un pied & demi, purpurines. Les pédoncules partiels sont disposés en ombelle, ouverts, courts, au nombre de sept à treize à chaque ombelle; chaque fleur munie d'une bractée en écaille, petite, ovale, ciliée. La corolle est petite, purpurine, hémisphérique, s'ouvrant transversalement par le redressement des étamines, qui sont au nombre de six ou sept, & dont les filaments sont de couleur purpurine; sept, rarement six styles. Les baies sont arrondies, anguleuses, d'un pourpre vert, couronnées par les styles; les semences solitaires, oblongues, relevées en bosse en dehors.

Cet arbrisseau croît au Pérou, dans les forêts. Il fleurit depuis le mois d'août jusqu'en novembre. De l'aisselle des rameaux, des pétioles & des pédoncules, il découle une gomme transparente. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

3. *SCIODAPHYLLE* conique. *Sciodaphyllum conicum*.

*Sciodaphyllum foliolis septem seu tredecim, racemis ternis binisque, corollis conicis.*

*Acinophyllum conicum.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 74. tab. 309.

Cet arbrisseau, comme le précédent, des tiges grimpantes & radicantes, granuleuses, cylindriques, rameuses; les rameaux légèrement violets, granuleux, garnis à leur partie supérieure de feuilles alternes, ouvertes, longuement pétiolées, composées de sept à treize folioles radiales, pétiolées, oblongues, glabres, très-entières, coriaces, veinées, réticulées, luisantes à leur face supérieure, longues d'un pied, larges de trois pouces, surmontées à leur sommet d'une pointe oblique; le pétiole commun plus long que les folioles, rougeâtre, cylindrique, renflé à ses deux extrémités, granulé; les partiels longs d'un pouce, comprimés latéralement, cannelés en dessus. Les stipules sont solitaires, amplexicaules, en forme de spathe, conniventes avec le pétiole, rougeâtres, à demi-lancéolées, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs sont réunies en deux ou trois grappes terminales, droites, longues d'un pied & plus; les pédoncules tomenteux, garnis de petites bractées ovales, argues, supportant environ quatre fleurs foliolées, réunies entières, séparées par autant d'écailles. La corolle est petite, conique, obtuse à son sommet, d'un blanc-rougeâtre. Les étamines sont ordinairement au nombre de neuf, très-rarement de sept, plus souvent de huit, dix ou onze, mais toujours en même nombre que celui des stigmates & des semences. Le fruit est composé de baies globuleuses, luisantes, de la grosseur d'un pois; elles contiennent des semences solitaires, oblongues, réniformes, comprimées, relevées en bosse.

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts; elle fleurit dans les mois d'août, de septembre & d'octobre. *h* (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

4. *SCIODAPHYLLE* acuminé. *Sciodaphyllum acuminatum*.

*Sciodaphyllum foliolis septem seu undecim, racemis duobus seu quinque, corollis acuminatis, acumine obliquo.*

*Acinophyllum acuminatum.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 74. tab. 310.

Ses tiges sont cylindriques, cendrées, grimpantes, granuleuses, radicantes, divisées en rameaux diffus, garnis à leur partie supérieure de feuilles alternes, longuement pétiolées, ouvertes, composées de sept à onze folioles radiales, pétiolées, oblongues, coriaces, très-entières, glabres à leurs deux faces, terminées à leur sommet par une pointe un peu oblique, quelques-unes concaves à leur base; les inférieures insensiblement plus allongées, veinées, réticulées; les veines principales horizontales & courbées; le pétiole commun

est cylindrique, un peu plus long que les feuilles, renflé à ses deux extrémités; les partiels longs de deux poudres, comprimés latéralement. Les stipules foliaires, amplexicaules, à demi-lancéolées, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs sont disposées en deux ou cinq grappes terminales, blanchâtres, tomenteuses; les pédoncules pariels épars, distans, garnis de bractées petites, ovales, longues à peine de trois lignes; chaque pédoncule supporte à son sommet des fleurs stériles, d'un blanc-jaunâtre, ramassées en têtes globuleuses, séparées par autant d'écaillés, ovales, membraneuses, fort petites; le réceptacle des fleurs est alvéolé & velu. La corolle est jaune, hémisphérique, surmontée d'une petite pointe recourbée. Les étamines sont ordinairement au nombre de huit, quelquefois de six ou de sept. Il y a cinq styles, quelquefois plus, souvent en nombre égal à celui des étamines. Les baies sont anguleuses, à cinq loges, quelquefois à six, sept ou huit; elles renferment autant de semences ovales, oblongues. Il découle des aisselles, des pétioles & des pédoncules, une gomme transparente, soluble dans l'eau.

Cette plante croît dans les grandes forêts du Pérou; elle fleurit dans le courant des mois d'août & de septembre. *H* ( *Descript. ex Ruiz & Pav.* )

5. SCIODAPHYLLE à cinq étamines. *Sciodaphyllum pentandrum*.

*Sciodaphyllum foliolis septem seu undecim; racemis solitariis ternisque; corollis concis, obtusis.*

*Aëtinophyllum pentandrum.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 3. pag. 75. tab. 311.

Arbrisseau dont les tiges sont droites, hautes de quinze à dix-huit pieds & plus, cylindriques, rameuses; les rameaux garnis vers leur extrémité de feuilles alternes, longuement pétioles, composées de sept à onze folioles ovettes en rayons, graduellement plus longues, très-entières, oblongues, terminées par une pointe subulée, longue d'un pouce, oblique; coriaces, revêtues en dessous d'un duvet d'un brun-noirâtre, formé de poils ouverts en étoile lorsqu'on les examine à la loupe, glabres à leur face supérieure, aiguës, cartilagineuses & réfléchies à leurs bords, longues d'un pied & demi, larges de six pouces. Le pétiole est cylindrique, de la longueur des feuilles, renflé à ses deux extrémités; les partiels filonés en dessus, comprimés latéralement, longs de deux à trois poudres, épaissis à leur base & à leur sommet. Les stipules sont foliaires, conniventes avec les pétioles, en forme de spathe, à demi-lancéolées, longues d'un pouce & plus.

Les fleurs sont disposées en très-longues grappes terminales, solitaires ou ternées, lanugineuses, d'un rouge-pâle, sur lesquelles les fleurs sont ren-

nies en petites têtes éparées, globuleuses, presque sessiles, chacune d'elles séparée par trois écaillés ovales, membraneuses. Le réceptacle est alvéolé, velu. La corolle est conique, obovée, anguleuse, d'un blanc-pourpre. Les étamines sont au nombre de cinq. Les anthers sont jaunes, inclinées; les baies ovales, blanchâtres, à cinq angles. Le nombre des étamines, des styles & des semences, ordinairement au nombre de cinq, varie quelquefois.

Cette plante croît dans les forêts du Pérou; elle fleurit en juillet & en août. *H* ( *Descript. ex Ruiz & Pav.* )

SCIRPE. *Scirpus*. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumacées, de la famille des fouchets, qui a de grands rapports avec les *cyperus*, & qui comprend des herbes tant exotiques qu'indigènes de l'Europe, dont les fleurs sont disposées en épis imbriqués; les chaumes cylindriques ou anguleux; les feuilles graminiformes, leur gaine entière, point fendue.

Le caractère essentiel de ce genre est d'avoir :

*Des épillettes un peu ovales, composés de paillettes imbriquées de toutes parts; point de corolle; trois stigmates; une semence supérieure, nue, recouverte par les écailles.*

#### CARACTÈRE GÉNÉRIQUE.

Chaque fleur offre :

1°. Un *calice* composé d'écaillés planes, ovales, courbées en dedans, séparant chaque fleur, formant par leur ensemble un épi imbriqué de toutes parts.

2°. Point de corolle.

3°. Trois *étamines* dont les filamens s'accroissent & deviennent plus longs que les écailles, terminés par des anthers oblongues.

4°. Un *ovaire* supérieur, fort petit, surmonté d'un style filiforme, allongé, terminé par trois stigmates capillaires.

Point de *péricarpe*. Une seule semence nue, ovale, à trois faces, quelquefois environnée de poils plus courts que le calice.

*Observations.* Les *scirpes* ne se distinguent essentiellement de quelques autres genres dont ils sont très-voisins, que par la disposition des écailles dont leurs épis sont garnis. Ces écailles sont imbriquées de tous côtés, tandis que dans les fouchets (*cyperus*) elles sont placées par imbrication sur deux rangs opposés. Les choins (*setaria*) ont leurs écailles amoncées, conniventes, fusiculées. On peut ajouter qu'un grand nombre d'espèces de *scirpes* ont la base de leurs semences environnée de quelques poils. Dans les *hystrix*, les semences

B b b b b 2

sont renfermées dans deux valves calicinales, tantôt qu'il n'en existe qu'une seule dans celles des genres ci-dessus mentionnés.

Quant aux espèces, qui sont très nombreuses, elles se prêtent à plusieurs divisions qui donnent plus de facilité pour les reconnaître. Les unes n'ont qu'un seul épi sessile, terminal ou latéral; d'autres ont plusieurs épis tous sessiles, fasciculés, terminaux ou latéraux; dans d'autres enfin, ces épis sont, ou tous pédonculés, ou quelques-uns seulement disposés en panicule, plus souvent en ombelle simple ou composée.

Les tiges fournissent aussi des caractères généraux; elles sont ou cyindriques, ou triangulaires, ou plus rarement comprimées, à deux angles, dépourvues de feuilles, ou feuillées dans toute leur longueur, ou simplement à leur base. Ces dernières font ou ne font pas quelquefois qu'en une fine alongée, terrée contre la tige, tronquée à son orifice.

Les caractères spécifiques peuvent être pris des involuques à une ou plusieurs folioles, de la forme des épillets, de celle des écailles dont ils sont garnis, des semences nues ou munies de poils à leur base, &c. de plusieurs autres considérations appuyées sur les proportions de ces différentes parties, sur les étamines, le pistil, &c.

#### ES P È C E S.

##### \* Un seul épi.

#### 1. SCIRPE des marais. *Scirpus palustris*, Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica terminali, ovato-oblonga, su. acuta; squamis lanceolatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 650. tab. 38. fig. 1.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica subovata, terminali*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 70. — Oeder. Flor. dan. tab. 271. — Flor. suec. 41. 42. — Pollich. Pal. n°. 43. — Gmel. Sibir. 1. pag. 83. n°. 8. — Leers. Herbort. n°. 34. tab. 1. fig. 3. — Hoffm. Germ. 16. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 21. — vnl. II. p. 52. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 291. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 47. — Poir. Voyages en Barbarie, vol. 2. pag. 91. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 350. n°. 1163.

*Scirpus culmo nudo, spica terminali, subovata*. Royen, Lugd. Bat. 48.

*Scirpus equiseti, capitulo majori*. Tournef. Inst. R. Herb. pag. 528. — Scheuch Gram. 360. — Flor. Lapon. 19. — Monti. Prodom. 15.

*Juncus capitulis equiseti, major, C. Buh. Pin. 12. — Theatr. 186. Icon. — Moxil. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 10. fig. 52.*

*Juncus aquaticus, minor; capitulis equiseti*. Lobel. Icon. 86. — G. G. G. Hist. 1631. Icon.

*Juncus cyperoides, ca. lulo sim. dic. Læf. Piss. pag. 131. tab. 36.*

*Scirpus caule tereti; spica unica, tereti, multiflora*. Haller, Helv. n°. 1336.

*Juncus capitulis longis, fove clavatas*. C. Bauh. Hist. 2. pag. 523. Icon.

*Scirpus equiseti, capitulo majori, alter*. Scheuch. Gram. pag. 361. tab. 7. fig. 17.

*Juncus capitulis equiseti, longioribus*. Moxil. Oxon. Hist. 3. pag. 233. tab. 10. fig. 53.

*Scirpus (intermedius), aphyllus; spica oblongo-ovata, subacuta; bracteis rotundatis; squamis ciliatis, ovatis, obtusifolius*. Thuill. Flor. parif. éd. 2. pag. 21.

*Scirpus (repans), radice repante; culmis cespitosus, plurimis sterilibus, r. curvatis; spica oblonga; squamis lanceolatis, acutissimis*. Thuill. Flor. parif. edit. 2. pag. 22.

Cette plante a des racines plus ou moins rampantes, de couleur brune, fibreuses, garnies quelquefois d'écailles membraneuses, roussâtres; il s'en élève plusieurs tiges droites, touffues, glabres, en forme de jonc, très-flexibles, flexées, cylindriques, hautes de six à quinze pouces, dépourvues de feuilles, filuleuses, enveloppées à leur base d'une gaine membraneuse, cylindrique, longue d'un à deux pouces & plus, tronquée à son sommet.

Ses tiges sont terminées par un peris épi foliaire, cyindrique, un peu ovale, aigu ou obtus, sans feuilles, composé d'écailles brunes, oblongues, imbriquées, un peu aiguës, légèrement membraneuses & blanchâtres à leurs bords, marquées sur leur dos d'une nervure filante; les deux écailles inférieures opposées, un peu plus larges, obtuses; chaque fleur, séparée par une écaille, contient trois étamines, un style bifide. Les semences sont ovales, presque rondes, un peu comprimées, peu luisantes, enroulées à leur base de quelques poils courts.

Cette espèce varie beaucoup dans le port de toutes ses parties. Souvent les racines sont rampantes au loin, comme dans la variété 6. Ses tiges sont nombreuses, un grand nombre d'entre elles stériles & recourbées à leur partie supérieure; les épis alongés; les écailles plus aiguës, lancéolées. Dans la variété 7, les tiges sont plus courtes, plus roides; les épis ovales, oblongs, un peu aiguës; les écailles presque obtuses; enfin dans la plante 8, les épis sont grêles, alongés, presque subulés. Ces variétés & quelques autres dépendent en partie du lieu natal de cette plante, soit dans les marais humides, soit dans les sèches desséchées. Au reste, on les retrouve quelquefois en partie sur les tiges de les fleurs du même pied. Il faut donc nécessaire-

ment, quelque tran- bées que puissent paroître ces vari- tés, évi- r d'en faire des espèces.

Cette plante croît partout en Europe dans l s endroits marécageux, les lieux humides & les fossés aquatiques. On la rencontre également dans la Barbarie. (V. v.)

Ses racines fraî- s sont recherch- s avec beaucoup d'avidité par l s cochons. En Suède on les fait sécher pour leur servir de pâture pen- lant l hiver. Les chèvres & les chevaux mangent cette plante, mais les vachs & les moutons n'en veulent point.

## 2. SCIRPE à épis panachés. *Scirpus variegatus*.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica simplici, terminali, conica; glumis apice rotundatis, variegatis.* (N.)

Ce scirpe a quelques rapports avec le *scirpus palustris*. Ses racines sont fibreuses, tri- angles; il s'en élève plusieurs tiges droites, cylindriques, nues, filuleuses, striées, hautes d'un à deux pieds, enveloppées à leur base d'une gaine membraneuse, allongée, tronquée, souvent purpurine. Elle se termine par un épi solitaire, d'environ un pouce de long, cylindrique, un peu conique, obtus, indiqué d'écaillés ovales, longues de deux lignes & plus, un peu élargies, arrondies à leur sommet, d'un vert-pâle ou blanchâtres dans leur milieu, membraneuses & purpurines à leurs bords. Il existe parmi les étamines quelques filaments stériles. Le style, plus long que les écaillés, se termine par trois stigmates. Les semences sont comprimées, acuminées par une portion persistante du style. Quelquefois les écaillés sont d'une seule couleur.

Cette plante croît dans les marais, à l'île de Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

## 3. SCIRPE filuleux. *Scirpus filulosus*.

*Scirpus culmo subtriangulo, moli, nudo; spica terminali, cylindrica; glumis ovatis, obtusis, apice membranaceis.* (N.)

Cette espèce a des rapports avec le *scirpus variegatus*; mais les tiges sont presque triangulaires, les balles d'une seule couleur; les épis plus allongés, plus épais.

Ses racines sont pivotantes, un peu épaisses, garnies d'un grand nombre de fibres; elles produisent des tiges fasciculées, molles, striées, triangulaires, très- lisses, épaisses, filuleuses, hautes d'un pied & demi à deux pieds, enveloppées à leur base par des gaines longues de deux pouces environ, très-minces, souvent purpurines, obtuses. Ces tiges se terminent par un épi solitaire, cylindrique, obtus, un peu plus épais que

les tiges, long du plus d'un pouce, composé d'écaillés ovales, un peu allongées, d'un fleur-clair, très-obtuses & arrondies à leur sommet, surmontées d'une bordure scarieuse & blanche. Les étamines ont trois filaments fertiles, & quelques autres stériles. L'ovaire est ovale, un peu comprimé, surmonté d'un style articulé, trifide.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-Thouars, dans les marais, à Madagascar. (V. f. in herb. P. Th.)

## 4. SCIRPE à trois styles. *Scirpus trigynus*. Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica cylindrica; squamis lanceolatis, basi laterali membranaceis.* Linn. Mart. ff. 180. — Lam. illust. Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 647.

*Scirpus (bulbosus), radice bulbosa; scapis teretibus, caudiculatis; foliis fuscis, rigidis; spica cylindrica, terminali.* Roth. Gramin. pag. 46. tab. 16. fig. 2.

*Schanus (deustus), culmo tereti, nudo; solid aquante; capitulo oblongo; glumis calicinis subquadratis, mucronatis, spicam involventibus.* Berg. Plant. Capen. 10.

*Schanus (scariosus), culmo tereti; capitulo oblongo, involucri monophyllo, glumis margine scariosis.* Thunb. Prodr. pag. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 261. n°. 8.

Cette plante appartient presque autant aux *schanus* qu'aux *scirpus*; aussi l'a-t-on alternativement placée dans ces deux genres. Elle a le port du *scirpus palustris*, & s'approche d'un autre côté du *schanus nigricans*. On la distingue par ses ovaires, surmontés de trois styles.

Ses racines sont oblongues, fibreuses, entremêlées de membranes vaginales, d'un brun-noirâtre, munies à leur partie supérieure de bulbes ovales, nombreuses, de la grosseur d'un pois. De chacune de ces bulbes s'élève une tige cylindrique, haute de huit à dix pouces, gâbre, nue, striée, un peu épaissie à sa partie supérieure, environnée à sa base de plusieurs feuilles radicales, filiformes, droites, glabres, un peu roides, canaliculées, environnant les tiges par une large membrane latérale & blanchâtre; d'autres tubulées, cylindriques, biffées à leur orifice.

Les fleurs sont réunies en un épi terminal, solitaire, cylindrique, long d'environ un pouce, composé d'écaillés lancéolées, acuminées, concaves; les inférieures membraneuses, tenant lieu de spathe, inégales, allongées. Les étamines ont des filaments capillaires; les anthères sont linéaires; l'ovaire est ovale, petit, surmonté de trois styles stécés, terminés par trois stigmates très-fins.

Cette plante croît dans les Indes orientales & au Cap de Bonne-Espérance. ♀

5. SCIRPE variable. *Scirpus mutatus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetra, nudo; spicis cylindricis, terminali*. Linn. Amoen. Acad. vol. 5. pag. 391. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 390. n°. 1.

*Scirpus culma triquetra, nuda; spicis oblongis, striatis, terminali*. Brown, Jam. 126. n°. 4.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *scirpus geniculatus*; elle n'en diffère essentiellement que par les tiges triangulaires & non cylindriques, bien moins roides & point articulées, nues dans toute leur longueur, terminées par un épi droit, oblong, cylindrique.

Cette plante croît à la Jamaïque. ♀

6. SCIRPE à tige quadrangulaire. *Scirpus quadrangulatus*.

*Scirpus aphyllus, culmis striatis erectis, acutis quadrangulatis; spicis longo cylindricis, squamis rotundato-abbreviatis*. Mich. Flor. bot. Am. r. vol. 1. p. 30.

Cette plante a beaucoup de rapports avec le *scirpus mutatus*, dont elle diffère par les tiges quadrangulaires, roides, droites, très-glabres, simples, dépourvues de feuilles, à quatre angles tranchans; elles sont terminées par un seul épi cylindrique, alongé, muni d'écaillés imbriquées, un peu arrondies, obtuses à leur sommet.

Cette espèce a été découverte par Michaux dans la Caroline. (Descript. ex Mich.)

7. SCIRPE en grans. *Scirpus caespitosus*. Linn.

*Scirpus culma nuda, striata; spicis terminali, bivalvi, paucifloris; valvulis spicis longioribus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 654.

*Scirpus caule striata, nudo; spicis terminali, bivalvi; calicinis glumis inaequalibus, ovali-oblongis, mucrona viridi terminatis, altera majore spicam aemulans; radicibus squamosis*. Roth. Catal. Bot. pag. 7. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 292. n°. 9.

*Scirpus culmo striata, nudo; spicis bivalvi, terminali, longitudine calicis; radicibus squamulosis inflexis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. — Flor. suec. n°. 42, 43. — Pollich. Pal. 44. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 21. — vol. II. pag. 52. — Hoffm. Germ. 16. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 550. n°. 1163.

*Scirpus caule tereti, aphyllis; spicis paucifloris, acumina, calicina gluma longitudine*. Hall. n°. 1332.

*Scirpus folio calmi unico*. Flor. lappon. 305 d. Roy. Lugd. Bar. 49.

*Scirpus montanus, capitula breviora*. Scheuch. Gram. 363. tab. 7. fig. 18. — Pluken. Phytot. 40. fig. 6. — Rai, Angl. 4. pag. 32. — Tournef. Inst. R. Herb. pag. 528.

*Juncus parvus, montanus, cum parvis capitulis lateis*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 523. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 333. tab. 10. fig. 35. Medio-cris.

*Gramen juncum, foliis & spicis junci, minus*. C. Bauh. Pin. 6.

Cette espèce a des racines composées de fibres nombreuses, blanchâtres, presque filiformes, garnies souvent à leur collet de quelques écailles rouffâtres, ovales, membraneuses; il s'en élève des tiges presque sans feuilles, droites, striées, hautes de six à dix pouces, d'un vert-glaucque, munies à leur base d'une gaine setée, cylindrique, glabre, qui se prolonge & se termine en une sorte de petite feuille courte, droite, subulée, aiguë, de couleur de paille.

Les épis sont solitaires, terminaux, petits, ovales, oblongs, d'une couleur rouffe-faive, composés d'écaillés alongées, jaunâtres, pointues; les deux inférieures, en forme de spathe, sont opposées, stériles, inégales; l'une d'elles prolongée en une pointe verdâtre, aiguë. Ces épis contiennent peu de fleurs; chacune d'elles est composée de trois étamines dont les anthères sont jaunâtres; les semences un peu comprimées, munies à leur base de quelques poils fins.

Cette plante croît en Europe, dans les marais tourbeux, au milieu des forêts, & sur les montagnes des départemens méridionaux de la France, & ailleurs. ♀ (V. v.)

8. SCIRPE des tourbières. *Scirpus bazoethryon*. Linn. f.

*Scirpus culma striato, nudo; spicis bivalvi; glumis calicinis inaequalibus, ovatis, obtusiusculis, membranaceis; altera majora, spicis duplo breviora*. Roth. Catal. Bot. 1. pag. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 293. n°. 10.

*Scirpus (bazoethryon), culma tereti, striata, nudo, basi vaginata; vagina truncata; spicis terminali, paucifloris, bivalvi; valvulis ovatis; spicis brevioribus, margine scariosis, exteriori breviori*. Linn. f. Suppl. pag. 103. — Hoffm. Germ. 16. — Roxb. Germ. vol. 1. pag. 21. — II. pag. 54. — Wedd. Flor. dan. tab. 167. — Ehrh. Beitr. 2. p. 81.

*Scirpus culma striata, tereti, nudo, basi vaginata; vagina truncata; spicis terminali, paucifloris, bivalvi; valvulis ovatis, spicis brevioribus, margine scariosis, exteriori breviori*. Timm. Prodrum. n°. 603.

*Scirpus (Halleri), foliis teretibus, culmi vaginam truncatam; spicis terminali, trifloris; seminibus villis,*



*pauis circumvallatis*, Villars, Dauph. vol. 2. pag. 188.

*Scirpus pauciflorus*, Lightf. Scot. pag. 1078. — Hulf. Angl. 648.

*Scirpus caule tereti*; *spica nuda*, *pauciflora*; *glumis calcarinatis* Halk. Hist. n°. 1335.

*Scirpus minimus*, *capitulo squamoso*, *brevisiore et crassiore*, Jusq. Scheuch. Agrost. pag. 366. tab. 7. fig. 11.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *scirpus caespitosus*, dont elle ne paraît être qu'une variété; cependant elle a des caractères qui semblent lui convenir uniquement. Ses épis sont extrêmement petits; les deux écaillés inférieures, quoiqu'inégales, n'ont point ce prolongement subulé qui se trouve dans l'autre espèce à la plus longue écaille.

Ses racines sont brunes, fibreuses, filiformes, presque fasciculées: il s'en élève plusieurs tiges fines, d'un vert-jaunâtre, droites, striées, cylindriques, filuleuses, grêles, hautes de trois à quatre pouces, garnies à leur partie inférieure d'une ou de plusieurs gaines cylindriques, un peu lâches, glabres, sans écaillés particulières entre les racines.

Ses tiges sont terminées par un épi fort petit, solitaire, très-court, oblong, un peu aigu, composé de deux ou trois fleurs séparées par autant d'écaillés renflées, ovales, membraneuses & un peu blanchâtres à leur contour, obtuses à leur sommet; les deux inférieures en forme de spathe, à deux valves, courtes, inégales, ovales; l'extérieure plus petite, l'intérieure un peu prolongée, & médiocrement subulée. Les semences sont fort petites, triangulaires, garnies inférieurement de quelques poils d'un brun-roux.

Cette plante croît en France, en Allemagne, en Angleterre, dans les marais tourbeux. On la trouve aussi à Saint-Léger, dans les environs de Paris. (P. v.)

#### 9. SCIRPUS RADICANS. Retz.

*Scirpus culmis subcompressis, striatis, filiformibus, nudis; spica minimis, solitariis, terminalibus; radice repente, stolonifero.* (N.)

An *scirpus* (arropurpureus), *culmis setaceis, teretibus, fasciculatis; spicis terminalibus, ovatis, solitariis; floribus monandris*? Retz. Observ. 5. pag. 14. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 294. n°. 14.

Idem, *culmis multo brevioribus, subretroflexis.* (N.)

Je n'ai pas cru devoir séparer cette espèce du *scirpus atropurpureus* de Retz, dans la crainte de faire un double emploi, ayant d'ailleurs avec elle les plus grands rapports, d'après la description qu'en donne cet auteur.

Cette plante a des racines fibreuses, capillaires, fasciculées; elles produisent des rejets rampans & stolonifères, divisés en plusieurs nœuds, d'où s'élèvent des tiges fasciculées, très droites, simples, inégales, hautes de six à dix pouces, un peu comprimées, striées, faibles, presque filiformes, un peu anguleuses, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, enveloppées à leur base par une gaine membraneuse, très-mince, glabre, d'un pourpre-rougeâtre, un peu striée, tronquée obliquement à son orifice, ou prolongée en une poignée subulée. On remarque aussi quelques tiges stériles très-faibles, que l'on seroit tenté de prendre pour des feuilles.

Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en un seul épi fort petit, presque ovale, obtus d'un vert-pâle, composé de quelques écaillés umbrées, membraneuses, très-glabres; les deux inférieures en forme de spathe, & presque de la longueur des fleurs.

Cette espèce a été recueillie à Porto-Ricco, dans les terrains marécageux, par M. Ledru, qui a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (P. f.)

J'en ai observé dans l'herbier de M. du Petit-Thouars une variété trois fois plus petite, & dont les tiges sont beaucoup plus grêles, ayant presque le port de notre *scirpus retroflexus*. Elle croît à Madagascar.

#### 10. SCIRPUS DES CHAMPS. *Scirpus campestris*, Roth.

*Scirpus culmo striato, nudo; spica terminali, calicem bivalvem vix superante; glumis calcarinatis oblongis, apice membranaceis, obtusis, subaequalibus.* Roth. Catal. Bot. 1. pag. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 293. n°. 11.

*Scirpus minimus, spica brevior, squamosa, spandica.* Scheuch. Agrost. pag. 364. tab. 7. fig. 19. Bona.

Il existe de grands rapports entre cette espèce & le *scirpus baeothryon*; elle en diffère par la petitesse, par ses épis bien plus courts & munis de très-peu de fleurs.

Ses racines sont petites, fibreuses, capillaires; les tiges basses, simples, grêles, nues, striées, hautes à peine d'un à deux pouces, terminées à leur sommet par un seul épi, contenant à peine trois à cinq fleurs; munies à leur base de deux écaillés opposées, spatiformes, oblongues, presque égales, un peu courbées en carène, obtuses & membraneuses à leur sommet, presque aussi longues que l'épi. Les semences sont un peu allongées, triangulaires, glabres, un peu pédicellées, garnies à leur base de quelques poils fins.

Cette plante se rencontre dans les départements

méridionaux de la France, & dans quelques contrées de l'Allemagne. (V. f.)

11. SCIRPE capillacé. *Scirpus capillaceus*. Mich.

*Scirpus pergrissus, culmis foliisque omnium tenuissimis capillacis, floccidis; spica oblongo-ovoides, acuta, imbricata; glumis paucis, oblongis, costatis.* Mich. Fl. boreal. Amer. vol. 1. pag. 30.

Cette plante, qui a les plus grands rapports avec le *scirpus acicularis*, dont en être distinguée, selon Michaux. Ses tiges sont extrêmement fines, molles, sétacées, glabres, fasciculées, très-droites, simples, hautes de deux à trois pouces, dépourvues de feuilles, si l'on en excepte une fort petite qui les engage à leur base.

Ses tiges sont terminées par un fort petit épi d'un jaune-pâle, ovale, oblong, composé de quelques écailles imbriquées, peu nombreuses, membraneuses, un peu scarieuses à leurs bords, obtuses à leur sommet; les deux inférieures un peu plus grandes; les semences extrêmement petites.

Cette plante croît dans la Nouvelle-Angleterre, ainsi que dans la Caroline, où M. Bosc l'a recueillie; il a bien voulu m'en communiquer un exemplaire. (V. f.)

12. SCIRPE à feuilles de féruque. *Scirpus festuoides*.

*Scirpus culmo triquetra, filiformi; foliis capitis, setaceis; spica terminali, ovata; glumis squarrosis, inferioribus mucronatis.* (N.)

Cette espèce a presque le port d'un *festuca*, tant par ses feuilles que par la forme de ses épis.

Ses racines sont composées de fibres dures, filiformes, brunes, alongées, garnies de beaucoup de chevelus courts & très-fins; elles produisent un grand nombre de feuilles réunies en un gazon touffu, roides, fines, droites, sétacées, plus courtes que les tiges, dont quelques-unes embrassent la base par une petite gaine striée, serrée. Les tiges sont droites, très-grêles, triangulaires, filiformes, hautes de six à dix pouces, un peu glauques, terminées par un feuillage ovale, un peu comprimé, composé d'écailles imbriquées, très-serrées, oblongues, lancéolées, concaves, verdâtres sur leur carène, blanchâtres, très-minces & scarieuses à leurs côtés; les supérieures obruses à leur sommet; les inférieures, dont deux servent d'involucre, surmontées d'une petite pointe droite.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

13. SCIRPE en épingle. *Scirpus acicularis*. Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo, setiformi; spica ovata,*

*terminali, bivalvi, v. hula spica brevioris.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 133. n°. 653.

*Scirpus culmo tereti, nudo, setiformi; spica ovata, bivalvi; seminibus nudis.* Lin. Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. — Oeder. Flor. dan. tab. 187. — Flor. suec. n°. 43, 44. — Dilib. Paris. 17. — Pr. Mich. Palat. n°. 41. — Hoffm. Germ. 17. — R. & C. Germ. vol. 1. pag. 21. — vol. II. pag. 55. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 549. n°. 1163. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 195. n°. 16.

*Scirpus magnitudine scicula.* Flor. Japon. 21. — Royle, Lugd. Bat. 40.

*Marfous foliis setaceis, mollibus; spica nuda, pauciflora.* Haller, Helv. n°. 1346.

*Juncellus minimus, capitulis equiseti.* Pluk. A'm. pag. 201. tab. 40. fig. 7. — Moiss. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 10. fig. 37. — Boccon. Sic. Plant. rar. pag. 47. tab. 41.

*Scirpus omnium minimus, capitulo longiori.* Tournef. Inst. R. Herb. 318.

Ce scirpe est très-remarquable par la finesse de ses tiges, par ses épis terminaux, solitaires, fort petits, plus longs que les deux écailles inférieures qui leur servent de spathe.

Ses racines sont presque sétacées, fasciculées, de couleur brune; elles produisent un grand nombre de tiges très-fines, presque en gazon, serrées, simples, filiformes, dépourvues de feuilles, hautes de deux ou trois pouces & plus, glabres, verdâtres; les unes stériles, aiguës, aciculées, qui ne saut point prendre pour des feuilles; d'autres fertiles, toutes munies à leur base de gaines courtes, serrées & tronquées à leur sommet.

Chaque tige fertile est terminée par un petit épi solitaire, ovale, oblong, aigu, verdâtre ou panaché de blanc & de brun, composé de très-peu de fleurs; les deux écailles ou valves inférieures concaves, ovales, inégales, plus courtes que l'épi. Les semences sont fort petites, dépourvues de poils à leur base.

Cette plante croît en Europe dans les lieux humides, sur le bord des étangs. (V. v.)

14. SOUCHET en érin. *Cyperus crinitus*.

*Cyperus culmo setaceo, triquetra; foliis setaceis; spica sublaterali, obtusa, compressa; glumis obtusis, membranaceis.* (N.)

Cette espèce a des rapports avec le *cyperus festuoides*, & plus encore avec le *cyperus acicularis*, dont elle diffère par ses tiges & ses feuilles beaucoup plus élevées, & par ses épis obus & latéraux. Peut-être n'est-elle qu'une variété du *scirpus setaceus*.

Ses racines sont composées de fibres très-déliées, brunes, fasciculées; elles produisent un très-grand nombre de tiges réunies en un gazon dense, hautes de six à huit pouces, très-fines, triangulaires, striées, nues dans toute leur longueur, excepté à leur base. Les feuilles sont nombreuses, radicales, aussi hautes que les tiges, aussi fines qu'un crin de cheval, très-glabbres, d'un vert-glaucue. L'épi est latéral, situé à un pouce environ au dessous du sommet, surmonté par un prolongement de la tige, droit, subulé, un peu renflé en spathe à l'insertion de l'épi. Les valves calicinales sont élargies, vertes sur leur carène, scarieuses à leurs côtés, très-obtusées; l'inférieure un peu mucronée.

Cette plante croît à Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (*V. f. in herb. P. Ta.*)

15. SCIRPE à feuilles recourbées. *Scirpus retroflexus*.

*Scirpus caule angulato, sulcatis, setiformi, folio vix longiore; foliis capillaceis, retroflexis, diffusis; spica minimâ terminali.* (N.)

Cette espèce a de grands rapports avec le *Scirpus acicularis*; elle en diffère par son port, par ses tiges, ainsi que par ses feuilles fortement courbées; par ses épis beaucoup plus petits.

Ses racines sont fibreuses, capillaires, fasciculées, d'un blanc-cendré ou grisâtres; elles produisent quelques tiges basses, très-grêles, presque sétacées, glabres, hautes de trois à quatre pouces, médiocrement cylindriques, anguleuses, un peu courbées, très-simples, à peine plus longues que les feuilles.

Celles-ci sont toutes radicales ou embrassent les tiges par une gaine courte, cylindrique; elles sont fines, glabres, capillaires, verdâtres, à peine striées, diffuses, fortement courbées en arc, inégales, mais la plupart plus longues que les tiges. Les fleurs sont réunies en un seul épi terminal, fort petit, ovale, composé de quelques écailles glabres, ovales, membraneuses, d'un vert-pâle; les deux écailles inférieures un peu plus longues que les autres, opposées & en forme de spathe.

Cette plante m'a été communiquée par M. Ledru, qui l'a recueillie à Porto-Ricco, dans les lieux marécageux. (*V. v.*)

16. SCIRPE tubercule. *Scirpus tuberculosus*. Mich.

*Scirpus aphyllus, erectus; spica turgidè ovatâ, subacutâ; squamis subrotundis, obtusis; semine setis ipso longioribus stipato, & tuberculo crassiore terminato.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. p. 30.

*Scirpus (filiformis), culmo filiformi, subangulo-bocanique, Tame VI.*

*lato, nudo; spica terminali ovatâ, squamis obtusis.* Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 138. n° 651.

Ses tiges sont simples, dépourvues de feuilles, très-glabbres, médiocrement anguleuses, grêles, presque filiformes, striées, droites, hautes d'environ un pied, terminées par un seul épi ovale, assez gros, renflé, médiocrement aigu, composé d'écailles ovales, presque rondes, un peu jaunâtres, blanches & scarieuses à leurs bords, obscurées à leur sommet; les inférieures stériles & semblables aux supérieures. Les semences sont petites, environnées, à leur base, de poils plus longs qu'elles; ces poils sont terminés par un tubercule épais.

Cette espèce m'a été communiquée par monsieur Bosc, qui l'a recueillie dans la Caroline, où elle a été également découverte par Michaux. (*V. f.*)

17. SCIRPE capité. *Scirpus capitatus*. Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo, setiformi; spica subglobosâ, terminali.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 70. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 294. n° 12. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 138. n° 652.

*Scirpus (caribæus), culmis fasciculatis, setaceis, sulcatis, triquetris; spica minimâ, ovatâ, terminali.* Rottb. Gram. pag. 46. tab. 15. fig. 3.

*Scirpus culmo setaceo, nudo; spica subglobosâ.* Gronov. Virgin. 12.

*Scirpus minimus, nudus; capitulo strido, ovato; radice fibrosâ.* Brow. Jam. 126. n° 3.

*Juncus aquaticus, capitulis equiseti minimis.* Sloan, Jam. 122.

On distingue cette espèce à ses tiges peu élevées, terminées par de petits épis en têtes arrondies ou globuleuses.

Ses racines sont composées de fibres rassemblées en touffes, filiformes, d'un blanc-jaunâtre, d'où s'élèvent des tiges fasciculées, simples, droites, cylindriques, glabres, striées, un peu anguleuses, hautes de quatre à six pouces; quelques-unes stériles, dépourvues de feuilles, environnées, à leur base, de membranes courtes, vaginales, serrées, légèrement teintes en rouge, tronquées à leur sommet.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une petite tête un peu ovale, plus ordinairement globuleuse, composée d'écailles imbriquées, un peu concaves, glabres, ovales, un peu arrondies, à peine membraneuses à leurs bords, obscurées à leur sommet, d'un brun-rougeâtre; les inférieures semblables aux supérieures. Les semences sont fort petites, un peu anguleuses, luisantes, dépourvues de poils.

Cette plante croît en Amérique, aux Antilles, dans la Virginie; elle n'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

18. SCIRPE flottant. *Scirpus fluitans*. Linn.

*Scirpus caule folioso, flaccido; pedunculis alternis, nudis, teretibus; spicis terminalibus, minimis, paucifloris*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 138. n°. 655.

*Scirpus culmis teretibus, nudis, alternis; caule folioso, flaccido*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 71. — Neck. Gallob. pag. 25. — Hoffm. Germ. 17. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 22. — vol. II. p. 55. — Lam. Flor. franc. vol. 3. p. 548. n°. 1162. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 295. n°. 17.

*Scirpus foliis linearibus, planis, alternatim fasciculatis; spica terminali*. Guett. Stamp. pag. 141.

*Scirpus caule folioso, flaccido; scapis alternis, capitatis*. Royen & Lugd. Bat. 49. — Sauvag. Monsp. 9.

*Scirpus equiseti, capitulo minori*. Tournef. Inst. R. Herb. 518. — Scheuch. Gram. pag. 365. tab. 7. fig. 20.

*Juncellus capitulis equiseti, minor, fluitans*. C. Benth. Pin. Prodrum. 23. — Idem, Theatr. 187.

*Gramen junceum, clavatum, minimum*. Rai, Hist. 1310. — Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 230. §. 8. tab. 20. fig. 31. — Pluken. Almag. pag. 180. tab. 35. fig. 1.

β. *Scirpus (Stolonifère), culmo canaliculato, basi folioso; spica terminali, bivalvi, subcylindrica*. Roth. in usuri. Ann. 4. pag. 36.

On distingue cette espèce à ses tiges foibles, feuillées; à ses pédoncules alternes, nus, cylindriques : cette plante d'ailleurs flotte ordinairement à la surface de l'eau.

Ses racines sont composées de filaments très-fins, capillaires. Les tiges sont rampantes ou flottantes, très-grêles, simples, filiformes, flaccues, alongées, produisant des racines de leurs articulations inférieures; & aux supérieures, des feuilles fasciculées, très-étroites, glabres, planes, linéaires, aiguës, en forme de gaine à leur base.

Il s'élève, d'entre les aisselles des feuilles, des pédoncules nus, filiformes, droits, un peu divergens, longs d'environ deux à trois pouces, terminés par un petit épi solitaire, très-grêle, court, ovale, à peine aigu, un peu blanchâtre, composé de très-peu de fleurs, garni, à sa base, de deux écailles plus courtes que les fleurs. Les semences sont fort petites, blanchâtres, un peu triangulaires, point garnies de poils.

La variété α a des tiges plus courtes, plus ra-

meufes; les pédoncules un peu creusés en gouttières. Les épis ont rarement plus de deux fleurs.

Cette plante croît en France, en Angleterre, en Allemagne, dans les fossés aquatiques, dans les mares, les terrains boueux. Lorsqu'elle est flottante, les tiges sont plus longues, un peu entrelacées; elles sont plus courtes, plus nombreuses, & donnent lieu à la variété β laquelle cette même plante croît dans les terrains simplement humides & boueux. On la trouve à Fontainebleau, à Saint-Léger; je l'ai recueillie dans les environs de Rennes & de Fougères en Bretagne. (V. v.)

19. SCIRPE ovale. *Scirpus ovalis*. Roth.

*Scirpus culmo subcompresso, nudo, filiformi; spica ovali, terminali, nuda; floribus durarioribus*. Roth. Catalog. Botan. 1. pag. 5. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 294. n°. 13.

*Scirpus (compressus), radice fibrosa, non repente; culmo nudo, castro, subcompressa, erecto, sciformi; spiculis terminalibus solitariis, subglobosis, nudiis, staminibus duobus, trifloris; stylo bifido*. Murchn. Method. pag. 349.

*Scirpus capitatus*. Sereb. Spicil. p. 60. — Krock. Silf. n°. 71. — Hoffm. 17. — Roth. Germ. vol. I. pag. 21. — vol. II. pag. 54. — Ehrh. Beitr. 4. pag. 155. n°. 16.

*Scirpus caule aphylo, spicis imbricatis, subrotundis; glumis obtusis*. Bergen. Francof. 315.

*Scirpus capitulis equiseti crassioribus & habitioribus, fumilis & multicaulis*. Rupp. Jcu. 319.

*Juncus clavatus, minor, capitulis rotundioribus*. Moris. Oxon. Hist. 3. pag. 233. §. 8. tab. 10. fig. 34.

*Scirpus (annuus), confertissimè multicaulis, erectus, aphyllus; spica tergitur ovali, obtusa, compressa, fusco-ferruginea; squamulis parvulis, avallibus, ovatis*. Thuill. Pat. édité. 2. pag. 22. n°. 5.

*Scirpus equiseti, capitulo rotundiori*. Vaill. Paris. pag. 179.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées, de couleur rouffâtre; elles produisent un très-grand nombre de riges simples, touffues, droites, grêles, dépourvues de feuilles, un peu comprimées, très-glabres, hautes d'environ un pied, garnies, à leur partie inférieure, d'une membrane vaginale, cylindrique, serrée, tronquée à son sommet.

Ces tiges se terminent par un épi presque ovale, un peu arrondi, solitaire, droit, obtus, composé d'écailles imbriquées, d'un brun-rouffâtre, membraneuses & blanchâtres à leurs bords, obtuses; les deux inférieures semblables aux autres. Chaque écaille ne renferme ordinairement que deux éta-

mines, quelquefois trois. Le stigmate est binate, les semences fort petites, un peu arrondies, presque ovales, luisantes, légèrement comprimées, munies de quelques poils courts à leur base.

Cette plante croît dans les lieux humides en France, en Allemagne; elle se trouve aussi aux environs de Paris, dans les marais, autour des étangs de Meudon. ○ (V. f.)

Je ne doute pas que le *Scirpus annuus* de Thuiller ne soit la même plante que le *Scirpus ovatus* de Roth, d'après les individus que j'ai vus de l'un & de l'autre, & d'après les caractères que leur indiquent ces deux auteurs.

## 20. SCIRPE confervoides. *Scirpus confervoides*.

*Scirpus caule setaceo, radicante-nodoso; foliis subverticillatis, c. pilliculis; culmo nudo; brevi; spicis minimis, foliatis, terminalibus.* (N.)

Ce scirpe, qui a quelques rapports avec notre *Scirpus fluitans*, offre, par ses tiges & ses feuilles extrêmement déliées & flottantes, l'aspect d'un conferva.

Ses tiges sont très-longues; elles sont garnies, de distance en distance, de petits nœuds qui produisent des feuilles allongées, fasciculées, plus fines qu'un cheveu, & qui paraissent presque verticillées. De leur centre s'élève un ou plusieurs chaumes longs d'environ un pouce, filiformes, enveloppés à leur base par une gaine étroite, membraneuse, un peu lancéolée à son sommet: chacun de ces chaumes est terminé par un petit épi solitaire, ovale, composé de quelques écailles plutôt éparées qu'imbriquées, ce qui rapproche cette plante des *Scheuchzeria*; blanchâtres, membraneuses, enveloppées par deux écailles extérieures, opposées, beaucoup plus longues que l'épi, subulées, aiguës.

Cette plante a été recueillie dans les mares d'eau, à Madagascar, par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

## 21. SCIRPE pigme. *Scirpus pigmaeus*. Lam.

*Scirpus culmo setiformi, nudo, subangulato; spica terminali, nudâ, subuniploâ.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n° 656.

C'est une fort petite espèce, qui a de très-grands rapports avec le *Scirpus acicularis*, & qui n'en est peut-être qu'une variété.

Ses tiges viennent par touffes, en gazons courts; elles sont droites, nues, presque anguleuses, aussi déliées qu'une soie, simples, glabres, dépourvues de feuilles, munies, seulement à leur base, d'une petite gaine rouscâtre, cylindrique, très-serrée: ces tiges se terminent par un fort petit épi ovale, aigu, privé de spathe ou d'involucre, composé

d'une à deux fleurs, dont les écailles sont glabres, membraneuses, rouscâtres, un peu aiguës, concaves.

Cette plante croît dans les Indes orientales; elle a été communiquée à M. Lamarck par M. Thunberg. (V. f. in herb. Lam.)

## 22. SCIRPE g-niculé. *Scirpus geniculatus*. Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica oblongâ, terminali; squamis ovalibus, convexis, subcarinatis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 138. n° 649.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spica oblongâ, terminali.* Rotb. Gram. pag. 44. n° 58. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 291. n° 7.

*Scirpus culmo nudo, spica terminali, subrotundâ.* Hort. Cuscut. 21. — Roy. Lugd. Bat. 43.

*Scirpus culmo rotundo, nudo; spica striatâ, oblongâ, terminali.* Brown. Jam. 126. n° 5.

*Juncus aquaticus, geniculatus, capitulis equiseti, major & minor.* Sloan, Jam. 17. Hist. 1. pag. 122. tab. 75. fig. 2, & tab. 81. fig. 3. — Raf. Suppl. 623.

Ses tiges ont beaucoup de ressemblance avec celles du *Scirpus lacustris*; elles sont droites, hautes de plusieurs pieds, très-glabres, cylindriques, articulées, molles, presque fistuleuses, finement striées, de couleur glauque, de la grosseur d'une plume de cygne, un peu rouscâtres vers leur sommet, enveloppées à leur base par une gaine cylindrique, très-mince, serrée, tronquée à leur sommet.

Les fleurs sont disposées en un épi terminal, cylindrique, long d'environ un pouce, à peine plus épais que les tiges, muni d'écailles membraneuses, imbriquées, oblongues, creusées en carène. Les étamines & le pistil sont saillans, de couleur brune; l'épi est environné à sa base par un involucre composé de quatre écailles obtuses, ovales, fort petites.

Cette plante croît à Surinam, à Cayenne & dans la Jamaïque. (V. f. in herb. Lam.)

## 23. SCIRPE plantaginé. *Scirpus plantaginæus*. Retz.

*Scirpus culmis acutibus, geniculatis, nudis; spica terminali, cylindricâ, nudâ.* Retz. Oûl. 5. pag. 14. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 291. n° 4.

*Scirpus (plantaginoides), culmis ventricosâ, sulcatis, nudis; spica cylindricâ-subulatâ, terminali; squamis oblongis, carinatis.* Rotb. Gram. 45. tab. 15. fig. 2.

Je suis très-porté à croire que cette espèce n'est presque point différente du *Scirpus geniculatus*, & qu'elle n'en est peut-être qu'une légère variété;

Ccccc 2

mais comme elle ne m'est pas connue, je me bornerai à en présenter ici la description qu'en donne Rottb.

Ses tiges sont cylindriques, ventruës, géniculées, très-simples, striées, nues, terminées par un épi long de deux ou trois pouces, cylindrique, subulé, couvert d'écaillés oblongues, carénées, imbriquées, blanchâtres, verdâtres sur leur dos, membraneuses à leurs bords; l'écaillé inférieure beaucoup plus courte & tronquée. Les éamines ont des filaments très-longs, linéaires, membraneux; les anthères sont longs & linéaires; le style plane, terminé par trois stigmates filiformes, filueux & velus.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Amérique. (Description ex Rottb.)

#### 24. SCIRPE conifère. *Scirpus coniferus*.

*Scirpus culmo tereti, articulat; spica solitaria, coniformi; glumis latissimis, obtusis.* (N.)

C'est une très-belle espèce, remarquable par la grosseur de ses épis, ressemblans à un petit cône de pin.

Ses tiges sont droites, cylindriques, subulées vers leur sommet, articulées, très-glâbres, striées, d'un vert glauque, nues, hautes de deux à quatre pieds; les articulations d'autant plus courtes, qu'elles sont plus rapprochées du sommet; quelques écaillés à la base, fendues longitudinalement. Ces tiges supportent un épi solitaire, situé à environ un pouce au dessous du sommet: cet épi est conique, sessile, presque de la grosseur d'une petite noix, un peu renflé à sa base, composé d'écaillés fortement imbriquées, un peu concaves, obtuses, presque aussi larges que longues, d'un brun-foncé, coriaces, un peu scarieuses, & souvent déchiquetées à leur sommet: chacune d'elles renferme trois éamines; les anthères sont longues que les écaillés; six petites écaillés, mêlées parmi les filaments; un ovaire comprimé, acuminé à ses deux extrémités; un style adhérent à l'ovaire, & binié. Les semences sont ovales, brunes, comprimées, très-glâbres.

Cette plante a été recueillie par M. du Petit-Thouars, dans les marais, à l'île de Madagascar. (V. f. in herb. P. Th.)

C'est avec les chaumes de cette plante que les habitans de Madagascar font leurs nattes les plus fines. P. Th.

#### 25. SCIRPE en spirale. *Scirpus spiralis*. Rottb.

*Scirpus culmo triquetris, subnudo; spica cylindrica, terminali; squamis cuneiformibus, truncatis, spirali-ter dispositis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 138. n°. 648.

*Scirpus culmis aggregatis, subnatis, triquetris; spica cylindrica, terminali; squamis cuneiformibus, truncatis, spirali-ter dispositis.* Rottb. Gram. 47. tab. 75. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 290. n°. 1.

Ses racines sont traçantes, cylindriques, grêles, stolonifères, fibreuses à leurs articulations, de chacune desquelles s'élève une ou plusieurs tiges droites, fongueuses, renflées, triangulaires, hautes d'un pied & demi, striées, nues à leur partie supérieure, enveloppées, au-delà de leur nœud, par une gaine longue, cylindrique, terminée par une pointe courte, ovale.

Chaque tige se termine par un épi long d'un pouce & demi, cylindrique, solitaire, étroit, de la grosseur d'une plume d'oie, muni à sa base d'une écaïe le tronquée, très-obtuse, & dans le reste de sa longueur, d'autres écaïes cuneiformes, élargies à leur sommet, glâbres, tronquées, médiocrement striées, formant, par leur disposition autour de l'épi, une sorte de spirale. Les éamines sont saillantes, ainsi que le piltis; les semences presque triangulaires, relevées en bosse, garnies de quelques poils à leur base.

Cette plante croît aux Indes & sur les côtes du Malabar. Très-voisine du *scirpus geniculatus* & du *scirpus plantagineus*, elle s'en distingue particulièrement par la disposition de ses écaïes en spirale.

#### 26. SCIRPE jaunâtre. *Scirpus flavescens*.

*Scirpus culmo strillo, tereti, striato, nudo; spica minimâ, subuliflora.* (N.)

Cette espèce a de grands rapports avec le *scirpus caespitosus*, dont elle n'est peut-être qu'une variété; mais ses épis sont bien plus petits, son port un peu différent.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées, très-fines: il s'en élève des tiges nombreuses, très-droites, simples, d'un vert-jaunâtre, cylindriques, striées, hautes de deux à trois pouces, presque filiformes, glâbres, fort roides, dépourvues de feuilles, enveloppées à leur base par une gaine membraneuse, prolongée en une pointe presque subulée; terminées par un très-petit épi ovale, d'une à trois fleurs, jaunâtre, garni à sa base de deux écaïes opposées, hérissées, concaves, obtuses, un peu plus courtes que les fleurs.

Cette plante a été découverte par M. Ledru à Porto-Ricco; il a bien voulu nous en communiquer un exemplaire. (V. f.)

#### 27. SCIRPE penché. *Scirpus nutans*. Retz.

*Scirpus culmo compresso, subterragano, nudo; spica ovali, solitaria, terminali, nutante.* Retz. Obs. 4. pag. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 291. n°. 5.

Ses racines sont fibreuses, & produisent plusieurs tiges filiformes, hautes de six à sept pouces, comprimées, nues, presque tétragones par la strie profonde de leurs côtes; garnies à leur base de quelques écailles courtes, brunes, & enveloppées par une ou deux gaines longues d'un pouce, entièrement dépourvues de feuilles, terminées par un épi nu, solitaire, ovale, penché, composé d'écailles ovales, imbriquées, brunâtres, scarieuses, entières.

Cette plante croît à Malacca, dans les lieux marécageux. (*Descript. ex Retz.*)

28. SCIRPE polytrich. *Scirpus polytrichoides*. Retz.

*Scirpus culmis compressis, setaceis; spicis terminalibus, solitariis, subnatis, monandris*. Retz. Observ. 4. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 295. n°. 15.

*Gramen polytrichum*. Rumph. Amboin. vol. 6. pag. 17. tab. 7. fig. 1.

Cette plante a des racines capillaires & noirâtres: il s'en élève des tiges nombreuses, disposées en gazon, sétacées, comprimées, hautes de cinq à six pouces, striées, engainées à leur base, & garnies de feuilles radicales, courtes, filiformes.

Les fleurs sont réunies en un épi solitaire, un peu ovale, muni à sa base d'une seule bractée acuminée, un peu plus courte que l'épi. Les écailles calicinales sont ovales, imbriquées, relevées en carène, scarieuses, obtuses, de couleur brune à leur sommet; chacune d'elles ne renferme qu'une seule étamine, rarement deux.

Cette plante se rencontre à l'île de Ceylan, dans les pâturages humides. (*Descript. ex Retz.*)

29. SCIRPE monandrique. *Scirpus monander*. Rottb.

*Scirpus culmo setaceo, triquetro; involucri triphylo, longo; capitulo fissili, glomerato; flosculis monandris*. Rottb. Gramin. pag. 50. tab. 14. fig. 3. *Exclusis synonymis*. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 311. n°. 69.

Ses racines sont noirâtres, composées de fibres simples, flexueuses; elles produisent plusieurs tiges sétacées, hautes de cinq à six pouces, glauques, triangulaires, garnies à leur base de feuilles linéaires, sétacées, molles, plus courtes que les tiges, qu'elles engainent par leur base: ces gaines sont blanches, membraneuses.

Les fleurs sont réunies en une tête sessile, composée d'épillets agglomérés, imbriqués, cylindriques, longs d'environ trois lignes, accompagnés d'un involucre à trois folioles inégales, étalées, au moins trois fois plus longues que les fleurs.

Chaque épillet est composé d'écailles concaves, imbriquées, perles, lancéolées, obtuses, toutes renfermant une seule étamine; un pistil turbiné, blanchâtre, un peu relevé en bosse; un style plane, un peu pyramidal, terminé par deux stigmates capillaires & recourbés.

Cette plante croît sur les côtes du Malabar. (*Descript. ex Rottb.*)

\*\* Plusieurs épillets sessiles, réunis en un seul paquet.

30. SCIRPE sétacé. *Scirpus setaceus*. Linn.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spiculis minimis, sessilibus; sub apice culmi*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 662.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spicis lateralibus, subsolitariis, sessilibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 73. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 49.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spicis terminali, sessili*. W. der. Flor. dan. tab. 311. — Leers, Herborn. n°. 35. tab. 1. fig. 6. — Hoffm. Germ. 17. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 22. — vol. II. pag. 58. — Rottb. Gramin. 47. tab. 15. fig. 4, 5, 6. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 551. n°. 1161. — Gærtn. de Fruct. & Sem. vol. 1. pag. 10. tab. 2. fig. 3.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spicis lateralibus subsolitariis, sessilibus*. Iter Scan. 127. — Flor. suec. edit. 2. n°. 45. — Pollich. Pal. n°. 47.

*Mariscus setaceus, capitulis lateralibus perpancis*. Hall. Helv. n°. 1345.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spicis pedunculatis*. Roy. Lugd. Bat. 49.

*Scirpus foliaceus, humilis*. Diill. Synop. 3. p. 430. Cat. Gieff. pag. 158.

*Scirpus omnium minimus, capitulo breviori*. Tourn. Inst. R. Herb. 528. — Scheuch. Gramin. 358.

*Juncellus inutilis*. C. Bauh. Pin. 12. — Idem, Prodr. 22.

*Juncellus omnium minimus*. Motif. Oxon. Hist. 3. 5. 8. tab. 10. fig. 23.

*Juncellus*. Lobel. Adver. pag. 44.

g. *Idem major, caule multoties longiore*. (N.) Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 90. *Sub scirpo setaceo*.

Cette plante est distinguée par l'extrême finesse de ses tiges & leur peu d'élevation; par ses petites épillets sessiles, situés un peu au dessous du sommet des tiges.

Les racines sont très-fines, composées de petites fibres capillaires, un peu blanchâtres; elles produisent un très-grand nombre de petites tiges

baïsses, hautes d'un à trois ou quatre pouces, fines, glabres, sétacées, droites, un peu striées, garnies à leur base d'une gaine très-fermée, glabre, cylindrique, un peu rouffêtrée, terminée par un prolongement foliacé, aigu, subulé, plus court que les tiges.

Les fleurs sont réunies en un ou deux épis, quelquefois trois, petits, sessiles, ovales, un peu obus, striées vers le sommet des riges, qui se prolongent en une sorte de spathe plus ou moins courte, droite, aiguë, qui rend les épis latéraux. Les écailles sont brunes, imbriquées, marquées dans leur milieu d'une ligne verdâtre; quelquefois elles paroissent comme panachées de brun & de blanc. Les semences sont fort petites, planes d'un côté, relevées & presque anguleuses de l'autre, striées dans leur longueur, dépourvues de poils à leur base.

Dans la variété  $\beta$ , quoique les tiges soient également capillaires, elles s'élèvent à la hauteur de dix à douze pouces, très-droites, en rouffes serrées. Les épis sont également petits & presque terminaux, caractère qui sépare évidemment cette espèce du *Scirpus squarrosus*, avec lequel plusieurs auteurs l'ont réunie comme variété: j'ai recueilli celle-ci sur le bord des ruisseaux & des lacs en Barbarie, dans les environs de la Calle.

Cette plante croît en Europe au bord des étangs, & dans les lieux maritimes. On la rencontre également aux environs de Paris dans les petites ruisseaux des prés, & dans presque tous les marais voisins des bois: elle fleurit au commencement de l'été.  $\gamma$  (V. v.)

### 31. SCIRPE scarieux. *Scirpus squarrosus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetris, nudo, setaceo; spiculis ternis, sessilibus, ovatis, squarrosis*. Linn. Mantiss. pag. 181. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 658. tab. 38. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. n°. 61.

*Scirpus culmo setaceo, triquetris; capitulis subternis, sessilibus, squarrosis; involucri diphyllo, striato*. Rottb. Gram. pag. 49. tab. 17. fig. 5.

*Scirpus (chinensis), culmo triquetris, subnudo; spiculis ternis, sessilibus, terminalibus; involucri diphyllo, reflexo*. Osbeck. Iter. 220.

*Motta-pulia*. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 72. tab. 38.

*Gramen cyperoides, orientale, perpusillum; capitulis subrotundis, hispatis*. Pluken. Mantiss. 98. tab. 350. fig. 6.

*Avenacu*. Rheed. Malab. 12. pag. 72. tab. 36.

Cette plante a des racines fibreuses, fasciculées; elles produisent une tige simple, droite, à peine anguleuse, un peu cylindrique, striée, nue, très-

grêle, sétacée, haute de huit à dix pouces & plus, garnie à sa base de quelques feuillets radicaux, droites, glabres, sétacées, aiguës, canaliculées, plus courtes que les tiges; la plupart médiocrement vaginales à leur base.

Les fleurs sont composées de trois ou quatre épillets terminaux, sessiles, ramassés, ovales, obtus, un peu comprimés, garnis d'écailles imbriquées, très-fermées, un peu relevées en bosse à leur base. L'involucre est composé de deux folioles opposées, sétacées, aiguës; l'une d'elles plus courte, à peine de la longueur des épillets; l'autre droite, un peu roide, deux ou trois fois plus longue que la première.

Cette plante croît naturellement dans les Indes orientales. (V. f.)

### 32. SCIRPE de Vahl. *Scirpus Vahlitii*. Lam.

*Scirpus culmo triquetris, subnudo; spiculis oblongis, fusculato-capitatis; involucri polyphyllis, setaceo, prelongo*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. p. 139. n°. 660.

Cette espèce a quelques rapports avec le *Cyperus pygmaeus* de Rottb. mais les caractères généraux doivent nécessairement le faire placer parmi les scirpes.

Ses tiges sont très-petites, grêles, sétacées, triangulaires, presque nues, fort glabres, hautes d'environ deux à trois pouces au plus, enveloppées à leur base par une gaine mince, membraneuse, un peu touffée inférieurement, prolongée à son orifice en un filet capillaire beaucoup plus court que les tiges.

Les fleurs sont terminales, réunies en une tête sessile, composée de quatre à cinq épillets fasciculés, oblongs, d'un brun-clair, munis d'écailles étroites, aiguës, membraneuses, nombreuses. L'involucre est formé par plusieurs folioles, de trois à cinq, inégales, sétacées, très-longues, surpassant de beaucoup les épillets.

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. C'est par erreur qu'elle a été indiquée par M. Lamarck comme originaire de l'Espagne: elle lui a été communiquée par M. Vahl. (V. f. in herb. Lam.)

### 33. SCIRPE de Micheli. *Scirpus michelianus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetris, capitulo globoso; involucri polyphyllis, longo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. p. 76. — Hoffm. Germ. 18. — Schkuhr. in *affari*. Annal. 1. pag. 20. tab. 2. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 51. — Allion. Flor. pedem. n°. 2370.

*Scirpus culmo triquetris, capitulo globoso, involucri javanico*. Gouan. Illustr. pag. 3.



*Juncus foliatus, minimus*. J. Bauh. Hist. 2. p. 523. *Sub matura frustu*. Linn.

*Gramen juncum, marium; capitulo squamoso*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 509. *Sine icon.*

*Cyperus italicus, omnium minimus*. Till. Pis. p. 51. tab. 21. fig. 5.

*Cyperus humilis; spicis brevibus rotundis, glomeratis*. Buxb. Cent. 1. pag. 34. tab. 55. fig. 1.

Cette plante a des racines fibreuses, des tiges droites, grêles, triangulaires, très-variables dans leur grandeur, longues de trois à huit ou dix pouces, accompagnées à leur base de deux feuilles en carène, lisses, d'environ une ligne de largeur plus courtes que les tiges.

Les fleurs sont composées d'épillets d'un vert-pâle, réunis en têtes épaisses, terminales, tantôt simples, quelquefois composées, un peu arrondies, munies d'écaillés oblongues, concaves, un peu lâches, accolées à la base des têtes environnées par un involucre d'environ cinq folioles étalées, très-inégaux, beaucoup plus longues que les fleurs. Les semences sont blanchâtres, triangulaires, dépourvues de poils.

Cette plante se rencontre dans les Départemens méridionaux de la France, en Italie, en Allemagne, dans les lieux humides, marécageux, sablonneux; elle croît aussi sur les bords du fleuve Sébou dans le royaume de Maroc. (V. f.)

#### 34. SCIRPE nain. *Scirpus nanus*.

*Scirpus culmo subtriquetro, filiformi, foliis breviori; spicis agglomeratis, terminalibus; involucri triphylo, capitulis longiore*. (N.)

Plante remarquable par sa petitesse, dont les racines sont composées de fibres dures, noirâtres, très-longues; elles produisent des tiges ramassées en gazon, feuillées, très-glaises, d'un vert-gauleux, filiformes, un peu triangulaires, hautes d'un à deux pouces au plus, environnées à leur base de feuilles planes, très-étroites, lisses, roides, plus longues que les tiges, dont les gaines sont larges, scarieuses, blanchâtres.

Les tiges sont terminées par un très-gros paquet d'épillets ramassés en tête, muni d'un involucre à trois folioles inégales, étroites, plus longues que les fleurs. Les épillets sont oblongs, cylindriques, sessiles, inégaux, obtus, d'un gris-cendré, longs de deux à trois lignes, composés d'un très-grand nombre d'écaillés calicinales fort petites, ovales, concaves, un peu aiguës. L'ovaire est très-petit; le style bide, articulé; les semences sont petites, un peu arrondies.

Cette plante croît dans l'Inde. (V. f. in herb. Petit-Thouars.)

35. SCIRPE du Sénégal. *Scirpus senegalensis*. Lam.

*Scirpus culmo angulato, subnudo; spiculis terminalibus, sessilibus, glomeratis, involucri*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 668.

Cette espèce se reconnoît à ses épillets blanchâtres, agglomérés, sessiles, garnis de très-petites écaillés.

Ses racines sont composées de fibres un peu rougeâtres, droites, simples, fasciculées; il s'en élève plusieurs tiges droites, simples, lisses, anguleuses, très-glaises, hautes d'environ un pied, grêles, un peu fistuleuses, d'un vert-blanchâtre, nues dans toute leur longueur, garnies à leur partie inférieure d'une ou de deux feuilles courtes, glabres, lisses, environnant les tiges par une gaine cylindrique, un peu lâche, se terminant par une lame subulée, un peu toulée sur elle-même, aiguë, de deux tiers plus courte que les tiges. Il existe quelques autres feuilles radicales entre les tiges, libres & fort élargies à leur base, un peu imbriquées.

Les fleurs sont terminales, réunies en plusieurs épis sessiles, blanchâtres, ovales, oblongs, un peu coniques, fasciculés, au nombre de trois à cinq, dont le rachis alvéolé s'offre comme un pédoncule épais, mis à nu par la chute des fleurs inférieures. Les écaillés sont fort petites, imbriquées, très-serrées, ovales, obtuses, glabres, scarieuses, d'un blanc-jaurâtre à leur sommet, munies d'une petite pointe mucronée. L'involucre est composé de deux folioles inégales, très-ouvertes, roides, élargies à leur base, striées, canaliculées, subulées, très-longues.

Cette plante croît au Sénégal; elle n'a été communiquée par M. Dupuis. (V. f.)

36. SCIRPE à trois épis. *Scirpus tristachyos*. Linn. f.

*Scirpus culmo nudo, setaceo; spicis ternis, sessilibus; involucri triphylo, setaceo*. Linn. f. Suppl. pag. 103. — Rottboil, Gramin. pag. 48. tab. 11. fig. 4. — *Excluso synonymo Plukenetii*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 664.

*Scirpus (tristachyos), culmo capillari, capitulo tristachyo, glumis integris, involucri triphylo*. Thunb. Prodr. pag. 17. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 300. n°. 35.

Cette espèce a de très-grands rapports avec le *Scirpus capillaris*; peut-être même n'en est-elle qu'une variété; elle en diffère par ses épis non pédonculés.

Ses tiges, ainsi que ses feuilles ou tiges stériles, sont setacées, très-glaises. Les fleurs sont réunies en une tête latérale, située un peu au dessous du sommet des tiges, composée de trois à

sept épillets sessiles, munis d'écaillés entières, imbriquées, & d'un involucre setacé, à deux folioles. Elle varie beaucoup dans les proportions de sa grandeur.

On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

37. SCIRPE des Hottertois. *Scirpus hottentotus*, Linn.

*Scirpus culmo triquetro, folioso; capitulo globoso, composito; glumis lanceolatis, hirtis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 669.

*Scirpus culmo triquetro, folioso; capitulo globoso, squamis calycinis lanceolatis, hirtis*. Linn. Mantiss. 182. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 310. n°. 66.

*Scirpus culmo trigono, folioso; capitulo globoso, glumis hirtis, involucri triphylo*. Thunb. Prodr. pag. 18.

Cette plante a des tiges hautes d'environ un pied, feuillées, droites, roides, triangulaires, très-filles, garnies dans leur longueur d'environ trois feuilles alternes, très-écartées, semblables à celles des graminées, droites, filles, médiocrement carénées sur leur dos, entières à leurs bords, aiguës à leur sommet, beaucoup plus courtes que les tiges qu'elles embrassent par une gaine cylindrique, entière.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en un paquet capité & globuleux, composé d'un très-grand nombre d'épillets sessiles, très-ferrés, agglomérés; chaque épillet muni d'écaillés imbriquées, lancéolées, velues, terminées à leur sommet par une pointe presque en forme d'arête, velue. La base de chaque paquet est environnée d'un involucre à trois folioles inégales, à peine plus longues que les fleurs.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance, dans les lieux marécageux & sur le bord des ruisseaux. (*Descript. ex Linn.*)

38. SCIRPE antarctique. *Scirpus antarcticus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; capitulo globoso, composito, monophyllo*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 670.

*Scirpus culmo triquetro, nudo, capitulo globoso, involucri monophyllo*. Linn. Mantiss. 181. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 310. n°. 67.

*Scirpus (antarcticus), culmo capillari; capitulo fasciculato, rotundato; glumis glabris, involucri monophyllo*. Thunb. Prodr. 17.

Ses tiges sont nues, triangulaires, filiformes, hautes d'environ un pied, garnies de feuilles radicales filiformes, à demi-cylindriques à l'extré-

rieur, canaliculées à leur partie intérieure, de la longueur des tiges.

Les fleurs sont réunies, à l'extrémité des tiges, en une tête globuleuse, composée d'épillets nombreux, sessiles, tous égaux, ovales, imbriqués sur trois rangs, à trois faces, de couleur brune, plus pâles & presque cartilagineux sur le bord de leurs écaillés, obtus à leur sommet, munis à leur base d'un involucre général d'une seule pièce, setacé, fixé latéralement, plus long que les têtes des fleurs.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance & dans la Guinée. (*Descript. ex Linn.*)

39. SCIRPE barbu. *Scirpus barbatus*, Lam.

*Scirpus culmis setacis, triquetris; vaginis ore barbatis; spiculis fasciculato-capitatis, terminalibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 666.

*Scirpus (barbatus), culmo triquetro, vaginis suboppositis, supra barbatis; capitulo terminali, subrotundo, polyflachyo*. Rottb. Gram. n°. 68.

Quoique cette plante paroisse avoir des rapports avec le *Scirpus antarcticus*, elle présente néanmoins des caractères suffisants pour l'en distinguer, quoique Willdenow l'ait rapportée au *Scirpus antarcticus*. Linn.

Ses racines sont composées de filaments capillaires, simples, touffus, un peu jaunâtres, d'où s'élèvent un grand nombre de tiges grêles, simples, droites, setacées, triangulaires, hautes d'environ six pouces & plus, très-glabres, dépourvues de feuilles dans toute leur longueur, excepté à leur base, où ces feuilles sont nombreuses, réunies en touffes gazonneuses, très-fines, setacées, longues à peine de la moitié des tiges, aiguës à leur sommet, membraneuses & vaginales à leur base; les unes libres, presque imbriquées; d'autres embrassant les tiges par une gaine cylindrique, garnie à son orifice de poils fins & blanchâtres.

Les fleurs sont réunies à l'extrémité des tiges en une tête composée de plusieurs épillets fasciculés, sessiles, oblongs, cylindriques, presque aigus, composés d'écaillés membraneuses, un peu lâches, aiguës à leur sommet; les inférieures caduques; ce qui fait paroître les épillets un peu pédonculés. L'involucre manque souvent, ou bien il est formé par deux folioles courtes, aiguës, élargies, un peu concaves à leur base, oppo-  
sées, à peine de la longueur des fleurs.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*V. f. in herb. Lamarck.*)

40. SCIRPE couché. *Scirpus supinus*. Linn.

*Scirpus*

*Scirpus culmo tereti, nudo; spicis sessilibus, in medio culmo glomeratis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. — Dalib. Parif. 16. — Roth. Germ. vol. II. pag. 18. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 661. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 199. n°. 32.

*Scirpus supinus, minimus, capitulis conglobatis; foliis rotundato-teretibus.* Tournef. Inst. R. Herb. 518. — Vaillant, Parif. 179.

*Scirpus setaceus.* Var.  $\beta$ . Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 551. n°. 1163.

Cette plante ressemble beaucoup au *Scirpus setaceus*, dont elle ne paroît être qu'une variété; mais elle est constamment bien plus grande dans toutes ses parties; ses épillets sont situés vers le milieu des tiges & non vers le sommet, remarquables par leur grosseur & leur forme, relativement à ceux du *Scirpus setaceus*.

Ses racines font fasciculées, composées de filaments blanchâtres, nombreux, presque capillaires: il s'en élève un très-grand nombre de tiges en touffe, qui tombent & s'étendent sur la terre; elles sont glabres, nues, cylindriques, fistuleuses, longues de six à dix pouces, d'un vert-pâle, un peu striées, garnies à leur base de membranes écailleuses & de gaines cylindriques, longues d'un à deux pouces, serrées, allongées & subulées à leur partie supérieure. Ces tiges se prolongent vers leur milieu en une sorte de spathe subulée, à la base de laquelle les fleurs sont situées, d'où vient qu'elles paroissent occuper le milieu des tiges.

Ces fleurs sont disposées en deux ou trois épis sessiles, agglomérés, assez gros, ovales, obtus, d'un roux-clair, imbriqués d'écailles ovales, membraneuses, un peu scarieuses à leurs bords, obtuses; celle du bas, qui répond à la spathe, est aiguë, subulée à son sommet. Les semences sont petites, triangulaires, striées transversalement, dépourvues de pois à leur base.

Cette plante croît dans les lieux humides, aux environs de Paris, à Fontainebleau, &c.; elle fleurit vers le commencement de l'été. (V. v.)

#### 41. SCIRPE droit. *Scirpus erectus.*

*Scirpus culmo gracili, subtereti, nudo; spicis lateralibus, glomeratis; glumis lanceolato-acuminatis; involucri monophyllo, subulato.* (N.)

Cette plante a des rapports avec le *Scirpus supinus*, mais ses tiges font bien plus grêles & droites, ses épillets plus étroits.

Ses racines sont composées de fibres simples, un peu tortueuses, brunes, courtes, fasciculées; elles produisent un grand nombre de tiges droites, grêles, presque filiformes, striées, presque cylindriques. Tome VI.

drigues, réunies en gazon, longues de six à dix pouces & plus, enveloppées à leur base par une gaine étroite, cylindrique, longue de deux à quatre pouces, souvent terminée par une pointe subulée, les plus longues un peu renflées depuis leur milieu jusqu'à leur sommet, & légèrement articulées à la base de ce renflement.

Les fleurs sont placées aux deux tiers des tiges, réunies en un paquet d'épillets sessiles, inégaux, un peu lancéolés, quelquefois un ou deux pédoncules, composés d'écailles imbriquées, lancéolées, mucronées à leur sommet, de couleur pâle, bordées de brun; elles renferment trois étamines, dont les filaments sont très-courts. L'ovaire est comprimé; le style un peu plus long que l'écaille, bifide à son sommet. Les semences sont fort petites, ob rondes, comprimées, de couleur brune, tranchantes à leurs bords.

Cette plante croît sur les rochers, dans le lit des rivières, à l'île de Madagascar, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

#### 42. SCIRPE à grosse tête. *Scirpus cephalotes.* Linn.

*Scirpus culmo triquetro, subsessilibus; spiculis numerosissimis, in caudulam maximam glomeratis; involucri praelongo.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 140. n°. 671. — Jacq. Hort. 1. tab. 97.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; capitulo ovato, squaroso; involucri triphylo, longo.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 76.

*Setanus (cephalotes), culmo folioso, triquetro; involucri tetraphyllo, deflexo; capitulo oblongo, terminali.* Roth. Giam. 61. tab. 20.

Ses tiges sont lisses, très-élevées, triangulaires, feuillées, striées, arundinacées, coupantes, très-aiguës, au moins de la longueur des tiges; leur gaine triangulaire; les feuilles larges, très-longues, dures. Ses fleurs sont réunies en une très-grosse tête terminale, ovale, composée d'épillets très-nombreux, agglomérés, presque sessiles, ou dont les pédoncules sont à peine visibles, garnis d'écailles imbriquées, acuminées, scarieuses, rousses, un peu recourbées; la base des têtes munie d'un involucre très-long, composé de trois à quatre folioles réfléchies, scarées à leur base, semblables aux feuilles.

Cette plante croît dans l'île de Cayenne & à Surinam. (V. f. in herb. Lam.)

#### 43. SCIRPE à deux têtes. *Scirpus bicapitatus.*

*Scirpus culmo filiformi, striato, subcompresso; foliis setaceis, vaginâ nuda; spicatis sessilibus, bicapitatis; involucri monophyllo, setaceo.* (N.)

D d d d

Ses racines sont grêles & fibreuses; les tiges ramassées en gazon, hautes de huit à dix pouces, droites, filiformes, striées, glabres, légèrement comprimées, garnies inférieurement de feuilles imbriquées, scabres, plus courtes que les tiges, munies d'une longue gaine très-lâche, mince, scabreuse, d'un blanc de neige, traversée latéralement par une nervure verte qui forme la partie inférieure des feuilles. Quelques-unes de ces feuilles, les plus inférieures, sont fortement roulées en spirale, surtout à l'époque de leur dessèchement.

Les fleurs sont disposées en un épi court, terminal; les épillets sessiles, agglomérés, ordinairement séparés en deux paquets peu distans; l'un supérieur terminal, l'autre inférieur latéral, muni chacun d'un involucre à une foliole assez longue, scabreuse, semblable aux feuilles. Les épillets sont courts, petits, assez semblables à ceux des *Sclanua*, ovales, un peu élargis à leur sommet, longs de deux à trois lignes, au nombre de huit à dix à chaque paquet. Les écailles calicinales sont oblongues, aiguës, roussâtres, scabieuses, terminées par une petite pointe; elles renferment trois étamines, un ovaire trigone, un style trifide.

Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance; elle m'a été communiquée par M. du Petit-Thouars. (V. f.)

#### 44. SCIRPE pubescent. *Scirpus pubescens*. Desf.

*Scirpus culmo folioso, triquetrum, superne pubescent; spiculis paucis, secundis, terminalibus, ovatis; glumis mucronatis*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 52. tab. 10.

*Scirpus culmo triquetrum, folioso; spiculis ovatis, congestis, sessilibus, pubescentibus*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 139. n°. 663.

*Carex (pubescens), spica composita, brevissima; spiculis ovatis, congestis, sessilibus, pubescentibus*. Poir. Voy. en Barb. vol. 2. pag. 254.

*Carex Poir. Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 140. n°. 112.*

Cette plante, que j'ai découverte sur les côtes de Barbarie, me paroît avoir les plus grands rapports avec le *Scirpus ciliaris* de Rottb. Cette dernière me n'étant pas suffisamment connue, je n'ose prononcer sur l'identité.

Ses racines sont fibreuses, capillaires; les tiges simples, molles, feuillées, triangulaires, anguleuses, hautes de huit à dix pouces, un peu blanchâtres & légèrement pubescentes à leur partie supérieure, comprimées, garnies dans toute leur longueur de feuilles graminiformes, d'un vert blanchâtre, longues, aiguës, striées, presque planes, marquées par leur dos d'une carène tranchante, entières à leurs bords, larges d'environ

deux lignes, longues de quatre à cinq pouces; les inférieures plus courtes, munies d'une gaine cylindrique, entière, serrée contre les tiges, longues de plus d'un pouce, striée, garnie à son orifice d'un petit bourletet roussâtre.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en plusieurs petits épis, de trois à six, ovales, obtus, d'un blanc-pâle, sessiles ou un peu pédonculés, très-rapprochés. Les pédoncules sont triangulaires, très-courts, pubescens, inégaux; les inférieurs un peu plus longs; les écailles imbriquées, ovales, concaves, striées, verdâtres, légèrement velues, membraneuses à leurs bords, terminées par une pointe roide, subulée, droite; les filamens des étamines, ainsi que le pistil sailant, d'une grande blancheur.

Cette plante croît en Barbarie. Je l'ai rencontrée aux environs de la Calle, sur les coteaux humides & vers le bord des lacs; elle fleurit à la fin du printemps & dans l'été. (V. v.)

#### 45. SCIRPE mucroné. *Scirpus mucronatus*. Linn.

*Scirpus culmo triangulo, nudo, acuminato; spicis conglomeratis, sessilibus, latralibus*. Linn. spec. Plant. vol. 1. pag. 73. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 303. n°. 47. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 140. n°. 672. — Idem, Flot. franç. vol. 3. pag. 552. n°. 1163.

*Scirpus glomeratus*. Scop. Carn. n°. 63.

*Scirpus caule triquetrum, panicula laterali, ramosa; locustis ovatis*. Haller, Helv. n°. 1338.

*Cyperus maritimus, capitulis glomeratis*. ? Tourn. Inst. R. Herb. 527.

*Scirpo-cyperus maritimus*. Michel. Gen. 47. ord. c. 2, 3.

*Scirpo-cyperus, panicula glomerata, à spicis imbricatis composita*. Scheuch. Gramin. pag. 404. tab. 9. fig. 14.

Cette plante, qui a des rapports avec le *Scirpus triquetrum*, s'en distingue par ses tiges bien plus fortes & plus élevées, par ses épillets conflamment sessiles, plus épais; et enfin par l'extrémité des tiges, qui surpassent les fleurs, recourbée horizontalement.

Ses racines sont fibreuses, presque fasciculées, point triquetres; il s'en élève des tiges droites, triangulaires, rudes, à trois faces concaves; les angles ciliés, comprimés, terminés à leur sommet par une longue pointe souvent réfléchie. Les fleurs sont sessiles ou en panicule grêle, latérale, un peu rameuse, composée d'environ une vingtaine & plus d'épillets pédonculés, plus ou moins sessiles, réunis en paquets, ovales, très-épais, garnis d'écailles imbriquées.

Cette plante croît en Suisse, en Italie, en Angleterre, dans plusieurs des départements méridionaux de la France, ainsi que dans les Pyrénées, sur le bord des étangs. (V. f.)

46. SCIRPE de Sparmann. *Scirpus Sparmanni*. Lamarck.

*Scirpus culmo angulato, nudo; spicis terminalibus, teretibus, sessilibus, nudis*. Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 240. n°. 667.

*Scirpus trifidus*, Linn. f. Suppl. pag. 103. — Thunb. Prodr. pag. 17. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. n°. 44.

Il s'élève des mêmes racines plusieurs tiges simples, hautes d'environ un pied & même quelquefois de deux, nues, anguleuses ou cannelées, très-glisses, munies à leur base de quelques écailles d'un brun-noirâtre, courtes, qui tiennent lieu de feuilles.

Ces tiges se terminent par trois épillets sessiles, fort petits, oblongs, droits, égaux, dont l'involucre est composé de plusieurs folioles subulées, très-courtes.

Cette plante croît naturellement au Cap de Bonne-Espérance. (V. f. Descript. ex Linn.)

47. SCIRPE argenté. *Scirpus argenteus*. Rottb.

*Scirpus culmis setaceis, triquetris; involucrio tetraphyllo, longissimo; spicis cylindricis, plurimis, in capitulum glomeratis*. Rottb. Gram. pag. 51. tab. 17. fig. 6. — Lam. Illustr. Genet. vol. 1. pag. 139. n°. 665. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 311. n°. 68.

*Mullen pulla*. Rheed. Malab. vol. 12. pag. 101. tab. 54.

Ses racines sont fasciculées, fibreuses, presque simples, allongées, d'un brun-noirâtre: ils s'en élèvent des tiges droites, hautes de quatre à six pouces, nues à leur partie supérieure, grêles, simples, triangulaires, enveloppées à leur base par des feuilles toulées, glauques, étroites, presque sétacées, aiguës, un peu plus courtes que les tiges, vaginales à leur base, & entre-mêlées de membranes spathacées, presque imbriquées, blanchâtres.

Les fleurs sont composés de pistils étroits, cylindriques, fort petits, oblongs, sessiles, réunis à l'extrémité des tiges en une seule tête globuleuse, munie d'écailles petites, membraneuses, imbriquées, aiguës, très-fertiles; l'involucre est composé de quatre folioles inégales, sétacées, beaucoup plus longues que les fleurs.

Cette plante croît dans l'Inde, sur les côtes du Malabar; elle a été communiquée par M. Vahl à M. Lamarck. (V. f. in herb. Lam.)

48. SCIRPE à tiges grêles. *Scirpus gracilis*.

*Scirpus culmo tereti, subcompresso; foliis filiformibus, striatis; involucrio diphylo; capitulo globoso, terminali*. (N.)

Ses racines sont fibreuses; les tiges grêles, dures, fasciculées, cylindriques, un peu comprimées, presque filiformes, hautes d'un pied ou d'un pied & demi; garnies à leur partie inférieure de feuilles roides, très-étroites, presque sétacées, subulées, longues de cinq à six pouces; leurs gaines brunes, lâches, allongées, scarifiées.

Les tiges sont terminées par une tête de fleurs, un peu globuleuse, composée d'environ une douzaine d'épillets inégaux, assez courts, petits, ovales, obtus, d'un brun-foncé, munis d'écailles imbriquées, longues d'environ une ligne & demi, élargies & obtuses à leur sommet, contenant trois étamines, un ovaire oblong, un style trifide; les semences sont brunes, oblongues, convexes en dessus, planes en dessous; l'involucre est composé de deux folioles roides, inégales; l'une presque droite, subulée, plus longue que les fleurs; l'autre plus courte; quelquefois une troisième fort petite, en forme de spathe.

Cette plante se rencontre au Cap de Bonne-Espérance (V. f. in herb. Petit-Thouars.)

49. SCIRPE de Buenos-Ayres. *Scirpus bonariensis*.

*Scirpus caule filiformi, subrigido, nudo; foliis setaceis; spiculis glomerato-capitatis, sessilibus; involucrio diphylo, capillari longo*. (N.)

g. *Idem, culmis foliisque latioribus*. (N.)

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges droites, hautes de six à huit pouces, glabres, filiformes, presque triangulaires, nues dans toute leur longueur, munies seulement à leur base d'une feuille très-fine, capillaire, d'un tiers environ plus courte que les tiges qu'elle embrasse à leur base par une gaine un peu purpurine, très-fertile.

Les fleurs sont réunies en une seule tête terminale, un peu globuleuse, composée d'épillets sessiles, filiformes, petits, ovales, oblongs, munis d'écailles membraneuses, d'un jaune-clair, un peu striées, les pistils & les étamines saillants; l'involucre composé de deux folioles sétacées, inégales, beaucoup plus longues que les fleurs.

Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres par Commerson. (V. f. in herb. Lam.)

La variété g. a des tiges au moins une fois aussi élevées, plus épaisses; les feuilles plus larges, les têtes de fleurs beaucoup plus grosses; elle croît dans les mêmes lieux.

50. SCIRPE articulé. *Scirpus articulatus*. Linn.

D d d d d 2

*Scirpus culmo tereti, nudiuscula, femigeniculato; capitulo glomerato, laterali.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 70. — Rottb. Gram. 53. — Vahl, Symb. 1. pag. 8. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 673. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 290. n°. 3.

*Scirpus (hystulosus), culmo subulato, nudo, basi vaginato; capitulo laterali.* Forsk. Flor. ægypt-arab. pag. 14. n°. 45.

Ses tiges sont hautes, nues, épaisses, cylindriques, jaunâtres, finement striées, glabres, luisantes, géniculées à leur partie supérieure, terminées par une grosse tête de fleurs latérales, sessiles, nues, qui forment plusieurs épillets ovales, assez gros, argus, renflés à leur base, imbriqués d'écaillés grandes, ovales, membraneuses, concaves, aiguës, striées, panachées de pourpre & de brun, vertes sur leur carène; chaque éaille renferme trois étamines, dont les filaments sont membraneux. Les semences sont solitaires, à trois faces, très-glabres, assez grossières, brunes dans leur jeunesse, très-blanches à l'époque de leur maturité.

Cette plante croît en Egypte & dans les Indes orientales. (Descript. ex Roib.)

#### 51. SCIRPE à tige prolongée. *Scirpus prolongatus.*

*Scirpus culmo tereti, articulato, nudo; spicis sessilibus, subsiculato-globosis, inferiore parte culmi inferis (N.)*

Ce scirpe diffère du *cyperus articulatus* par la situation remarquable de ses épis, placés à la partie inférieure des tiges.

Ses racines sont fibreuses, fasciculées : il s'en élève des tiges nombreuses, droites, très-inégales, hautes d'environ un pied, cylindriques, fistuleuses, articulées, subulées à leur sommet, nues, garnies à leur base de quelques gaines (spathacées); les fleurs sont placées un peu au dessus, à l'extrémité de la plus longue gaine, qui paroît alors lui servir de spathe; elles sont réunies en un paquet d'épillet sessile, globuleux, très-fermé. Ces épillets sont courts, inégaux, un peu coniques, obtus, composés d'écaillés lancéolées, un peu aiguës, de couleur fauve-clair, marquées latéralement de deux raies vertes, contenant trois étamines, un ovaire trigone, un style plus long que les écaillés, trièbre à son sommet.

Cette plante croît dans les Indes. (V. f. in herb. Petit-Thouars.)

#### 52. SCIRPE austral. *Scirpus australis.* Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; capitulo conglobato, bractea reflexa, foliis canaliculatis.* Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 140. n°. 674.

*Scirpus culmo tereti, nudo, capitulo laterali, bractea reflexa, foliis canaliculatis.* Linn. Syst. veget. pag. 85. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 27.

Cette espèce, dit Linné, ressemble beaucoup au *scirpus romanus*; mais les petites feuilles, ou plutôt les chaumes stériles, qui ressemblent aux feuilles, au nombre de deux, tout droits, lisses, canaliculés, en gaine à leur base, scarieux à leurs bords.

Les tiges fertiles sont lisses, cylindriques, hautes à peine d'un pied, terminées par une pointe droite, canaliculée, plus longue que les fleurs, opposée à une bractée plus courte, rabattue sur les tiges. Les fleurs sont réunies en une petite tête globuleuse, arrondie, sessile, obtuse, de couleur brune-foncée, munies de valves imbriquées, dont le sommet est divisé presque en trois lobes obtus; les deux latéraux bruns à leur sommet.

Cette plante croît dans les contrées méridionales de l'Europe. (Descript. ex Linn.)

\*\*\* Epillets pédonculés, en paquets.

53. SCIRPE à têtes rondes. *Scirpus holoschanus.* Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spicis subglobosis, pedunculatis, glomeratis; involucrio diphylo, inæquali, mucronato.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 140. n°. 675.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spicis subglobosis, glomeratis, pedunculatis; involucrio diphylo, inæquali, mucronato.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 72. — Wedd. Flor. dan. tab. 454. — Pluk. Phytograph. pag. 40. fig. 4. — Hoffm. Germ. 17. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 22. — vol. II. pag. 58. — Poir. Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 90. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 49. — Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 552. n°. 1163. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 116. n°. 6. — Gouan, Monip. pag. 30. n°. 4.

*Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus, glomeratis.* Tourn. Inst. R. Herb. 528. — Moench, Prodr. 16. — Garid. Aix. pag. 432.

*Juncus acutus, maritimus, capitulis rotundis.* C. Bauh. Pin. 11. — Theatr. Botan. 174. Icon. — Morif. Oxon. Hist. 3. 8. tab. 10. fig. 17. — Magn. Botan. Monip. pag. 143.

*Scirpus paniculatus solum foliosus; spicis globosis, pedunculatis, lateralibus.* Sauv. Monip. 8.

*Scirpoides maritimum; capitulis sparsis, glomeratis.* Scheuch. Gramin. 371. tab. 8. fig. 2, 3, 4, 5. *Holoschanus.* Dalech. Hist. 1. pag. 987. Icon.

Des épillets réunis en têtes globuleuses, soutenues par de longs pédoncules presque disposés en

ombelle, caractérisent cette espèce, & la rendent très-facile à distinguer.

Ses tiges sont droites, cylindriques, un peu comprimées, très-lisses, fermes, glabres, presque de couleur glauque, hautes de deux à trois pieds, pleines, solides, finement striées, aiguës, presque piquantes à leur sommet, assez semblables à celles des joncs, au moins de la grosseur d'une plume d'oie, intérieurement amincies vers leur sommet, munies à leur base de gaines membraneuses, larges, très-fermes, striées, un peu aiguës, souvent déchirées longitudinalement à leur partie antérieure ; leurs bords rapprochés par des fibres transversales, distantes, qui partent d'une nervure longitudinale. Ces gaines sont roulées en dedans à leur partie supérieure, & se prolongent en une pointe roide.

Les fleurs sont disposées, vers l'extrémité des tiges, en épillets ramassés en plusieurs têtes globuleuses, composées d'épillets sessiles, très-fermes, de couleur brune, soutenus par des pédoncules inégaux, allongés, roides, comprimés, striés, presque en ombelle. Quelquefois une ou deux de ces têtes sont sessiles; elles sortent d'un involucre ou d'une sorte de spathe générale, à deux folioles inégales, une plus courte, réfléchie; une autre bien plus longue, droite, très-roide, piquante, qui paroît être la continuation des tiges. Les écailles sont convexes, imbriquées, obtuses, un peu dentelées à leur contour; les semences petites, anguleuses, sans poils à leur base.

Cette plante croît dans les terrains humides en France, particulièrement dans les départements méridionaux. Je l'ai également recueillie sur les côtes de Barbarie. (V. v.)

#### 54. SCIRPE muriqué. *Scirpus muricatus*. Lam.

*Scirpus culmo triquetris, foliis; umbellâ simplicis; capitulis pedunculatis, subglobosis, muricatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 676.

*Scleranthus holoscleranthus*. Richard, Act. Soc. Hist. Nat. Paris. vol. 1.

Cette plante offre l'aspect du *scirpus holoscleranthus*, avec lequel elle a beaucoup de rapports, mais dont elle diffère par ses tiges feuillées, & par les écailles de ses épillets très-aiguës.

Ses racines sont fibreuses, touffues: il s'en élève plusieurs tiges, presque fasciculées, droites, hautes de quinze à dix-huit pouces, simples, droites, glabres, très-lisses, triangulaires, feuillées dans toute leur longueur. Les feuilles sont longues, roides, graminiformes, presque triangulaires, striées, aiguës, assez semblables à celles de quelques carex, d'une largeur médiocre, vaginales à leur base, entre-mêlées avec quelques membranes larges, spatulées, dirigées au collet des racines.

Les fleurs sont disposées en une ombelle ter-

minale, très-simple, avec une ou deux autres fleurs latérales, solitaires, pédonculées, axillaires. Les pédoncules sont peu nombreux, roides, simples, triangulaires, allongés, terminés par une tête de fleurs, globuleuse, composée d'épillets fort petits, munis d'écailles glabres, membraneuses, roussâtres, imbriquées, ovales, aiguës, un peu lâches, & qui, par leur écartement, font paroître les épis comme hérissés de petites pointes; une tête presque sessile à la base de l'ombelle. L'involucre est composée de plusieurs petites folioles inégales, roides, subulées, plus courtes au moins de moitié que les pédoncules.

Cette plante croît en Amérique, dans la Guiane. (V. f. in herb. Lam.)

#### 55. SCIRPE difpaccé. *Scirpus difpaccus*. Rottb.

*Scirpus culmis setaceis, triquetris; umbellâ simplicis; involucrio setaceo, majori; glumis subulatis, recurvis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 680.

*Scirpus culmis setaceis, triquetris; umbellâ simplicis; capitulis oblongis, squarosis; foliis subulatis, recurvis, dianthis, germine echinato*. Rottb. Gramin. pag. 56. tab. 12. fig. 1. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 62.

Cette espèce a des rapports avec le *scirpus obtusifolius*, auquel elle ressemble par le port & la disposition de ses ombelles, mais dont elle diffère par les écailles de ses épillets, subulées & recourbées à leur sommet.

Ses racines sont fibreuses, capillaires, presque simples, fasciculées: il s'en élève plusieurs tiges grêles, sétacées, triangulaires, droites, glabres, environnées seulement à leur base de feuilles très-fines, sétacées, aiguës, dont souvent il n'existe qu'une gaine cylindrique, terminée par une pointe tubulée & courte.

Les fleurs sont disposées en une ombelle simple, terminale, dont les pédoncules sont droits, inégaux, un peu anguleux, courts, sétacés, supportant un seul épi, très-rarement deux, outre un épi sessile à la base des pédoncules. Ces épis sont petits, ovales, obtus, d'un brun-clair, munis d'écailles imbriquées, membraneuses, traversées dans leur milieu par une nervure qui se prolonge au sommet en une petite pointe recourbée; ce qui donne à ces épis l'aspect d'une petite tête de bardane ou de cardère. L'involucre est composé de quelques folioles très-déliées, plus courtes que l'ombelle.

Cette espèce croît dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Juss. & Lam.)

#### 56. SCIRPE globuleux. *Scirpus globulosus*. Retz.

*Scirpus culmo compresso, nudo; panicula terminali;*

*spicula unica, sessili; pedunculatis pluribus, globosis.* Retz. Observ. 6. pag. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. n° 41.

Ses tiges sont nues, très-simples, hautes de six à sept pouces, comprimées, très-grêles, filiformes, terminées par un seul épillet sessile, brun, globuleux, de la grosseur d'un grain de millet, accompagné de trois à cinq autres pédoncules. Ces pédoncules sont simples, à un seul épi, quelquefois un second sessile; inégaux, longs de deux à huit lignes, accompagnés à leur base d'une gaine très-courte, libre à sa partie supérieure; les épillets composés d'écaillés imbriquées, arrondies, concaves, très-obtuses, brunes, blanchâtres à leurs bords; chacune d'elles renferme trois étamines, un style, trois stigmates bruns & velus.

Cette plante croît dans les Indes orientales. (*Descript. ex Retz.*)

57. SCIRPE latéral. *Scirpus lateralis*. Retz.

*Scirpus culmis triquetris, nudis; spicis subternis, lateralibus; involucri monophyllo brevi.* Retz. Obs. botan. 4. pag. 121 & 5. pag. 16. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. n° 45.

Ses tiges sont filiformes, triangulaires, hautes de six à sept pouces & quelquefois d'un pied, enveloppées d'une gaine à leur base; elles n'ont que des feuilles radicales, assez semblables aux tiges, mais plus courtes.

Un peu au-delà du milieu des tiges sortent environ deux, trois & jusqu'à huit épillets latéraux; les uns médiocrement pédonculés, d'autres presque sessiles, munis à leur base d'un involucre court, d'une seule pièce. Les épillets sont ovales, composés d'écaillés calicinales imbriquées, ovales, concaves, aiguës, de couleur brune, traversées par une ligne verdâtre; chacune d'elles renferme trois étamines, dont les anthères sont linéaires; un ovaire triangulaire, aigu à ses deux extrémités, surmonté d'un style court & d'un stigmate légèrement bilobé.

On trouve cette plante dans les Indes, à l'île de Ceilan. (*Descript. ex Retz.*)

58. SCIRPE aggloméré. *Scirpus glomeratus*. Retz.

*Scirpus culmo nudo, teretifolius; umbellâ glomeratâ; involucri diphylo, brevi; floribus dionariis.* Retz. Observ. 4. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 296. n° 19.

Ses racines sont longues & filiformes; elles produisent des tiges nues, foliaires, hautes d'environ trois pouces, un peu cylindriques, cannelées. Les feuilles sont toutes radicales, nombreuses, serrées, roides, courtes, recourbées en dehors. Les fleurs forment une ombelle composée, agglomérée, munie à sa base d'un involucre de deux

folioles courtes, & chaque pédoncule de quelques écaillés scarieuses. Les épillets sont ovales, composés d'écaillés calicinales brunes, bordées de blanc à leur contour, larges, concaves, obtuses; chacune d'elles renferme deux étamines.

Cette plante se rencontre sur le bord des champs, à l'île de Ceilan. (*Descript. ex Retz.*)

59. SCIRPE renversé. *Scirpus retrofractus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetris, umbellâ simplici, spicarum fasciculis retrofractis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 141. n° 677. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 304. n° 50.

*Cyperus genus indianum, panicula speciosa, spiculis propendens, atris.* Pluken. Phytogr. 415. fig. 4.

Cette espèce a des tiges droites, glabres, triangulaires, garnies, dans toute leur longueur, de feuilles distantes, alternes, graminifolies, aiguës à leur sommet. Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle simple, dont les pédoncules sont droits, longs, filiformes, presque égaux, renfermant dans leur milieu un épi sessile. Les épis sont composés d'épillets grêles, subulés, sessiles, pendans, d'un brun-noirâtre. La base des ombelles est munie d'une collerette composée de quatre à cinq folioles inégales, semblables aux feuilles; les plus longues au moins de la même longueur que l'ombelle.

Cette plante croît dans la Virginie. ✕

60. SCIRPE romain. *Scirpus romanus*. Jacq.

*Scirpus culmo tereti, nudo; capitulo laterali, conglobato; bracteis reflexis.* Pallas, Iter 3. pag. 537. — Jacq. Austr. 5. pag. 23. tab. 448.

*Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa.* Barr. Icon. rat. n° 1249. tab. 255. fig. 3.

*Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato, foliario.* Scheuch. Gramin. 373. — Michel. Gener. 52.

*Sp. Juncus minor, acutus, maritimus, profler, ex uno capitulo multo.* Pluk. Almag. pag. 200. tab. 40. fig. 5.

Cette espèce ne me paroît être qu'une simple variété du *Scirpus australis*, la principale différence consistant dans toutes les tiges cylindriques, tandis que celles qui, dans le *Scirpus australis*, sont fertiles, se trouvent en même temps canaliculées; on peut y joindre la finesse de ces tiges; elles ne sont guère plus grosses qu'un fil, droites, toutes cylindriques, glabres, peu élevées, aiguës. Les racines sont fibreuses, un peu tomenteuses.

Les fleurs sont ordinairement réunies en une seule tête globuleuse & sessile; cependant on en



rencontre quelquefois à deux têtes, l'une d'elles pédonculée; ce qui rapproche singulièrement cette espèce du *Scirpus holufchanus*, dont le nombre & la disposition des têtes varient beaucoup.

Cette plante se rencontre dans les départements méridionaux de la France, dans les environs de Rome & en Sibérie. x

61. SCIRPE intermédiaire. *Scirpus intermedius*.

*Scirpus culmo tereti, subangulato, panicula cordata, subultrix; bractea erecta.* (N.)

Cette espèce paroît tenir le milieu entre le *Scirpus australis* & le *Scirpus romanus*; elle diffère de tous deux par ses fleurs disposées en une petite panicule presque latérale, & par la disposition des folioles de son involucre.

Ses tiges sont nues, glabres, denses, cylindriques, striées, tendres, sillonnées, marquées, surtout à leur partie supérieure, de deux angles presque opposés, peu fertiles; elles supportent vers leur sommet une petite panicule, composée de pédoncules très-inegaux, ferrés, droits, glabres, comprimés, anguleux, supportant chacun à leur sommet deux ou trois épillets ovales, oblongs, obtus, quelques-uns presque sessiles ou à peine pédonculés à la base de la panicule, composés d'écaillés imbriquées, d'un brun-roussâtre, membraneuses, scarieuses à leurs bords, ovales, obtuses, munies dans leur milieu d'une nervure saillante; la base de la panicule garnie en avant d'une bractée élargie, ovale à sa partie inférieure, allongée & subulée à son sommet, droite, plus courte que les plus longs pédoncules. La tige est prolongée par une seconde bractée droite, striée, canaliculée, aiguë, beaucoup plus longue que la panicule. Les individus de cette plante, que je possède en herbier, ne m'ont point offert de feuilles; mais les tiges n'étant point entières, je ne suis pas certain qu'il n'en existe pas.

J'ai recueilli cette plante dans les départements méridionaux de la France, dans les prés humides, aux environs d'Aix. x (V. v.)

62. SCIRPE à feuilles pubescentes. *Scirpus puberulus*.

*Scirpus culmo filiformi, angulato, striatissimo; foliis setosis, pubescentibus; spicis pedunculatis, umbellatis; involucri subtriangulo; glumis glabris, himaculatis.* (N.)

On distingue cette espèce à ses feuilles, à ses involucri & à ses pédoncules légèrement pubescents.

Ses racines sont composées de longues fibres brunes, setacées, presque filiformes, fasciculées; elles poussent un grand nombre de tiges droites, faibles, filiformes, anguleuses, presque triangu-

laïres, hautes de six à quinze pouces, garnies à leur partie inférieure de feuilles sétacées, presque de deux tiers plus courtes que les tiges, beaucoup d'autres radicales de même forme, tamassées en gazon, un peu courbées en spirales, pubescentes particulièrement sur leur gaine, dont l'orifice est munie de quelques poils plus longs, très-fins.

Les fleurs sont terminales, disposées en une petite ombelle simple; plusieurs épillets sessiles dans le centre; l'involucre est composé au moins de quatre folioles inégales, semblables aux feuilles, une ou deux fois plus longues que l'ombelle; les rayons sont courts, pubescents, terminés par un, deux ou quelquefois trois épillets étroits, lancéolés, un peu anguleux, aigus, longs de deux à trois lignes, munis d'écaillés ovales, concaves, aiguës, verdâtres sur leur carène, deux taches purpurines à leurs côtés; contenant trois étamines, un ovaire trigone, surmonté d'un tubercule court, d'où s'élève un style trifide à son sommet, d'après l'observation de M. du Petit-Thouars. Les stigmates sont velus, les semences petites, trigones, d'un jaunec clair, terminées par le tubercule du style.

Cette plante croît à Madagascar, sur les pelouses, où elle a été recueillie par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

63. SCIRPE ombellaire. *Scirpus umbellaris*. Lam.

*Scirpus culmo nudo; umbellâ terminali, simplici; involucri bivalvi, brevissimo.* Lam. Illust. Genes. vol. 1. pag. 141. n. 683.

Ses tiges sont droites, simples, striées, très-glabres, presque cylindriques ou un peu comprimées, dépourvues de feuilles caulinaires, terminées par des fleuts disposées en une ombelle simple, dont les pédoncules inégaux, très-simples, grêles, un peu anguleux; un épi solitaire, ovale, un peu renflé, obtus, muni d'écaillés imbriquées, d'un brun-jaunâtre, membraneuses, concaves, ovales, presque obtuses; l'involucre est composé de deux valves très-courtes. Il existe ordinairement un épillet sessile à la base de l'ombelle.

Le lieu natal de cette plante n'est pas connu. (V. f. in herb. Lam.)

64. SCIRPE tétragone. *Scirpus tetragonus*.

*Scirpus culmo quadrangulati, foliis gladiatis; umbellâ decompositâ; spicellis convexo-fuscatundis, brevibus; involucri diphylo.* (N.)

g. Idem, humilior, foliis angustioribus, convolutis.

Nous devons à M. du Petit-Thouars la découverte de cette singulière espèce, la plus remarquable de ce genre, par ses tiges à quatre angles inégaux, saillans, comprimés, un peu rudes sur leurs bords, à leur partie supérieure. Ses tiges sont droi-

tes, un peu foibles, élançées, hautes d'un à deux pieds, verdâtres; les feuilles sont radicales, fermes, un peu imbriquées, comme celles des iris, en forme de sabre, longues de sept à huit pouces, larges d'une à deux lignes, tendues à la partie supérieure de leur gaine; plusieurs gaines longues, alternes, tronquées obliquement, enveloppent la partie inférieure des tiges.

Les fleurs sont disposées en une ombelle composée ou paniculée, munie à sa base d'un involucre à deux folioles spathacées, subulées, plus courtes que l'ombelle; celle-ci se bifurque, dans son entier développement, en deux rayons principaux, écartés, plus longs que les autres, se subdivisant en ombellules assez régulières ou presque paniculées, avec deux petites bractées sétacées, très-courtes à la base de chaque division. Les épillets sont, les uns axillaires & sessiles à la base des bifurcations; les autres, terminaux, peints, un peu arrondis, presque coniques, composés d'écaillés scarieuses, un peu blanchâtres, ovales, très-obruses; elles renferment trois étamines, un ovaire très-petit, un style trifide, trois stigmates un peu velus. Les semences sont fort petites & comprimées.

Cette espèce a été recueillie par M. du Petit-Thouars, à l'île de Madagascar, dans les mares, autour de Montplaisir. (V. f. in herb. P. Th.)

La variété a ses tiges plus basses, plus roides, plus grêles; ses feuilles bien plus étroites, roulées à leurs bords; les ombelles moins étalées, les épillets un peu plus gros. Elle croît dans le même pays.

#### 65. SCIRPE maritime. *Scirpus maritimus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, paniculâ conglobatâ, foliâ; spicularum squamis trifidis, intermedia subulata*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. — Wed. Flor. dan. tab. 937. — Curtis, Lond. Ic. — Desf. Flor. atlant. vol. 1. pag. 50. — Flor. suec. 39. 47. Pollich. Pal. n°. 49. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 79. — Gunn. Norveg. n°. 340. — Hoffm. Germ. 18. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 23. — vol. II. pag. 60. — Poiret, Voyage en Barbarie, vol. 2. pag. 91. — Willden. Spec. Plant. vol. 2. pag. 306. n°. 55.

*Scirpus (macrostachyos), culmo triquetro, umbellâ compositâ, foliosâ; spiculis crassâ, glomeratis, sessilibus*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 692.

*Scirpus cyperoides*. Lam. Flor. franç. vol. 3. pag. 553. n°. 1163.

*Scirpus caule triquetro, paniculâ foliosâ, ramosâ; locustis ovatis, natanibus; glumis dentatis, aristatis*. Haller, Helv. n°. 1319.

*Cyperus culmo triquetro, paniculâ foliâ; pedunculis simplicissimis, spicis confertis*. Roy. Lugd. Bat. pag. 50.

*Cyperus paniculâ subsessili, paniculis subovatis*. Guett. Stamp. vol. 1. pag. 414.

*Cyperus vulgarior, paniculâ sparsâ*. Tournef. Inst. R. Herb. 527.

*Gramen cyperoides, paniculâ sparsâ, majus*. C. Bauh. Pin. 6. — Idem, Theatr. 86. Icon.

*Gramen cyperoides aquaticum, vulgatum*. Lobel. Ic. 20. — Gerard, Hist. 1. Ic.

*Gramen cyperinum majus*. Tabern. Ic. 221.

*Gramen cyperoides, vulgatum, aquaticum*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 495. Ic.

*Cyperus longus, inodorus, latifolius; spicis tumidiorebus*. Morif. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 11. fig. 25.

*Cyperus paniculâ compellâ, à spicis cæteribus, crassioribus compositâ*. Scheuch. Gramin. pag. 420. tab. 9. fig. 9, 10.

β. *Cyperus rotundus, inodorus, anglicus*. C. Bauh. Pin. 14.

*Cyperus rotundus, litorreus, inodorus*. Lobel. Ic. 77. — Morif. Oxon. Hist. 3. §. 8. tab. 11. fig. 8. — J. Bauh. Hist. 3. pag. 503. Icon.

γ. *Scirpo-cyperus palustris, radice repente, nodosâ, inodora; paniculâ sparsâ, capitulis majoribus*. Mich. Gen. 48.

δ. *Scirpus (maritimus macrostachyos), culmo acutissimè triquetro, folioso; bracteis pluribus, longissimis; spicis sessilibus pedunculatisque, crassius ovatis, ferrugineis; squamis mucronis abrupto & subulato, quasi aristatis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 32.

Cette plante a tellement l'apparence d'un fouchet, que, sans la disposition des écaillés florales, il seroit difficile de ne pas la ranger parmi eux; elle est d'ailleurs reconnoissable par ses panicules, dont les pédoncules sont simples, inégaux & par ses épillets oblongs, quelquefois sessiles; enfin par les écaillés tridentées à leur sommet.

Ses racines sont dures, un peu traçantes, ramifiées, fibreuses; elles produisent des tiges hautes d'environ un pied, droites, glabres, triangulaires, à angles fort tranchans, un peu rudes à leurs bords, nues dans leur partie supérieure, garnies inférieurement de feuilles glabres, alternes, relevées en carène sur leurs dos, aussi longues & même plus longues que les tiges, striées, un peu planes, larges d'environ trois pouces, fermes, très-aiguës, rudes ou très-finement denticulées tant à leurs bords que sur leur carène, émanant des tiges par leur base, roussâtres sur le bord de leur gaine.

Les fleurs sont disposées en une panicule presque ombellée, les unes en gros paquets presque sessiles,

feilles; les autres, c'est le plus grand nombre, portés sur des pédoncules simples, inégaux, triangulaires; ceux du centre, extrêmement courts ou nuls: ils forment tous du milieu de trois ou quatre grandes folioles, en forme de collerettes, inégales, très longues, assez semblables aux feilles, mais plus étroites. Les épillets sont assez nombreux, fasciculés à l'extrémité de chaque pédoncule, feilles, ferrés, ovales, oblongs, obtus, garnis d'écaillés membraneuses, ovoïdes, imbriquées, obtuses, terminées par trois dents; celle du milieu prolongée en une barbe torse, setacée. Les semences sont grosses, blanchâtres, triangulaires, planes à leur face antérieure, luisantes, un peu rétrécies à leur base, & garnies inférieurement de quelques poils rares.

Cette plante varie dans le nombre de ses épillets & dans leur disposition. Dans les individus moins développés ou souffrants, ces épillets sont presque feilles. Les variétés *β*, *γ* ont leurs racines noueuses, tuberculeuses; elles servent de passage au *scirpus tuberosus*; peut-être n'en sont-elles qu'une variété.

Cette plante se rencontre presque partout en Europe, sur le bord des eaux & des étangs; je l'ai également recueillie sur les côtes de l'Afrique septentrionale. (V. v.)

66. SCIRPE tubéreux. *Scirpus tuberosus*. Desfontaines.

*Scirpus radice rotundâ, culmo triquetris, spiculis congestis, squamis trifidis; laciniaâ intermediaâ lamtioribus*. Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 50.

*Cyperus rotundus, inodorus, germanicus*. C. Bauh. Pin. 14. — Idem. Prodr. 24. & Theatr. botan. pag. 215. Icon. — Tourn. Inst. R. Herb. 527.

*Cyperus rotundus, inodorus, aquaticus, septentrionalis*. Morif. 5. 8. tab. 11. fig. 9. Bona.

*Cyperus paniculâ parvis, à spicis longioribus, tenuioribus, teretibus, compressis*. Scheuch. Gramin. pag. 398. tab. 9. fig. 7. 8. Excluse synonymis que *scirpus maritimum* præstat.

An *scirpus compressus*? Hoffm. Germ.

Cette plante a tant de rapports avec le *scirpus maritimus*, surtout avec les variétés que j'ai indiquées, qu'il est difficile de la regarder comme une espèce distincte, à moins d'être très-assuré de la constance des caractères qui l'en distinguent.

Ses racines sont traçantes, noueuses, tuberculeuses, les tubercules durs, blanchâtres, un peu arrondis. Les tiges sont droites, un peu grêles, triangulaires, striées, garnies de feilles graminiformes. Les fleurs sont réunies en paquets presque feilles, à l'extrémité des tiges; les épillets peu nombreux, étroits, d'un brun-noirâtre, fascicu-

Botanique. Tome VI.

lés, environnés d'un involucre à trois folioles très-inegales, fort étroites, très-longues, aiguës; les écaillés ovales, oblongues, tridentées à leur sommet; la dent du milieu aiguë, prolongée.

Cette plante croît en Barbarie; sur le bord des lacs aux environs de la Calle; elle se trouve aussi en Europe: je l'ai recueillie aux environs d'Aix en Provence. (V. v.)

67. SCIRPE glauque. *Scirpus glauca*. Lam.

*Scirpus culmo triquetris, foliisq; umbellâ compressâ, subpaniculatâ; spiculis pedicellatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 693.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec le *scirpus maritimus*; elle en diffère par ses épillets pédicellés, plus étroits, plus allongés.

Ses tiges sont droites, triangulaires, très-glauques, lisses, striées, à angles tranchants, hautes de deux à trois pieds, feillées dans toute leur longueur, très-simples; les feilles sont alternes, assez semblables à celles des *arundo*; presque planes, larges au moins de trois lignes, finement striées, relevées en carène sur leur dos, très-aiguës, au moins aussi longues que les tiges qu'elles embrassent par une gaine cylindrique très-entière, un peu membraneuse à son orifice, de couleur glauque, ainsi que les autres parties de la plante.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, assez ample, presque paniculée, dont chaque pédoncule se termine par un paquet d'épillets inégalement pédicellés; les pédoncules sont roides, triangulaires; les épillets ovales, oblongs, un peu obtus, d'un roux-clair, mués d'écaillés imbriquées, un peu molles, membraneuses, traversées par une nervure saillante. L'involucre général est composé de trois ou quatre folioles inégales, la plupart plus longues que l'ombelle, semblables aux fruttes, mais plus étroites; les paquets d'épillets sont environnés à leur base par une sorte de spathe jaunâtre, scarieuse, concave, médiocrement subulée à son sommet, à peine de la longueur des épillets.

Cette plante se rencontre au Sénégal, où elle a été découverte par M. Roussillon. (V. f. in herb. Lam.)

68. SCIRPE bivalve. *Scirpus bivalvis*.

*Scirpus culmo nudo, subcompressis; umbellâ terminali, compressâ; involucri bivalvi, brevissimo*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 686.

Ses tiges sont droites, médiocrement comprimées, presque à deux angles, simples, très-glauques, hautes de plus d'un pied, lisses, striées, dépourvues de feilles, terminées par des fleurs disposées en une ombelle presque simple, ou divisée

E e e e

en quelques autres petites ombellules, dont les pédoncules communs sont droits, filiformes, anguleux; munis à leur base d'un involucre divisé en deux découpures courtes, linéaires, obtuses.

Les épillets sont assez gros, ovales, obtus, de couleur brune, composés d'écaillés imbriquées, luissantes, ovales, un peu aiguës, lâches, très-glabres, membraneuses; un épillet sessile à la base de l'ombelle; les autres pédicellés, ou sessiles à l'extrémité de l'ombelle générale.

Cette plante a été observée à l'île de Madagascar, par Joseph Martin. (*V. f. in herb. Lam.*)

69. SCIRPE de Caroline. *Scirpus carolinianus*. Lam.

*Scirpus culmo nudo, subtriqetro, filiformi; umbellâ decompositâ; involucri aphylo, longisculo*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 687.

Ses tiges sont droites, simples, nues, presque triangulaires, grêles, striées, hautes d'environ un pied & demi, dépourvues de feuilles, très-glabres, lisses, terminées par une ombelle de fleurs médiocrement composée, dont les pédoncules communs sont inégaux, anguleux, les uns ne soutenant qu'un seul épillet, d'autres terminés par des épillets fasciculés de deux à quatre ou cinq, les uns sessiles, d'autres pédicellés, outre un épillet sessile à la base de l'ombelle générale.

Ces épis sont ovales, assez gros, un peu renflés, obtus à leur sommet, composés d'écaillés brunes, un peu noirâtres, imbriquées, glabres, ovales. L'involucre commun est divisé en plusieurs folioles étroites, inégales, de deux à trois, à peine plus longues que les fleurs.

Cette plante a été recueillie dans la Caroline, par Frater. (*V. f. in herb. Lam.*)

70. SCIRPE miliacé. *Scirpus miliaceus*. Linn.

*Scirpus culmo triqetro, nudo; umbellâ suprà decompositâ; spicis intermediis sessilibus, involucri setaceo*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. — Burm. Flor. ind. pag. 22. tab. 9. fig. 2. — Retz. Obs. 5. pag. 16. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 690. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 305. n°. 54.

*Scirpus culmo triqetro, nudo; involucri setaceo; paniculâ verticillatâ, suprà decompositâ; spicis centralibus, sessilibus*. Rottb. Gram. pag. 57. tab. 5. fig. 2.

Cette plante pousse des mêmes racines plusieurs tiges simples, nues, très-lisses, grêles, triangulaires, foliolées, hautes presque d'un pied, garnies à leur base de feuilles semblables à celles des graminées, très-glabres, droites, striées, larges d'environ deux lignes, planes, aiguës, aussi lon-

gues & même plus longues que les tiges qu'elles engainent par leur base.

Les fleurs sont terminales, disposées en une ombelle lâche, diffuse, plusieurs fois composée, ou divisée en plusieurs verticilles, dont les pédoncules, tant communs que partiels, sont simples, sétacés, inégaux, unifoires. Les involucre des ombelles universelles & partielles sont composés de plusieurs feuilles très-fines, sétacées, plus courtes que les pédoncules; les épillets sont ovales, fort petits, de la grosseur d'un grain de millet, solitaires à l'extrémité de chaque pédoncule, quelques-uns sessiles à la base des ombelles, d'un brun-clair; les écaillés ovales, légèrement carénées sur leur dos, obtuses; la plupart terminées par une petite pointe particulière.

Cette plante croît dans les Indes orientales; elle m'a été communiquée par M. Dupuis. & (*V. f.*)

71. SCIRPE d'Egypte. *Scirpus agyptiacus*.

*Scirpus culmo triqetro, folioso; corymbis terminali, foliaceo; spiculis sessilibus, confertis*. Forsk.

*Scirpus carymbosus*. Forsk. Flor. ægypt. arab. pag. 14. n°. 44.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété du *scirpus sylvaticus* de Linné, dont les fleurs sont disposées en corymbe, plutôt qu'en ombelle, & les épillets sessiles & ramassés.

Les tiges sont droites, triangulaires, hautes d'environ un pied & demi, feuillées; les fleurs forment un corymbe terminal, dont chaque pédoncule est muni à sa base d'une feuille pour bractée. Ces pédoncules sont alternes & non réunis en un centre commun, simples, point rameux, mais terminés à leur sommet par environ quatre épillets sessiles, un peu velus, alternes, ovales, cylindriques, d'un brun-noir, munis d'une bractée lancéolée; plusieurs épillets sessiles dans le centre du corymbe. Chaque fleur renferme trois étamines, dont les anthères sont jaunes, un pistil, trois stigmates bruns. Les écaillés qui composent les épillets sont dentées, tronquées à leur sommet, traversées par une nervure qui se prolonge en une pointe courte & recourbée.

Cette plante se rencontre en Egypte, aux environs du Caire, sur le bord des champs, dans les lieux inondés; elle fleurit au commencement de l'hiver. (*Descript. ex Forsk.*)

72. SCIRPE des bois. *Scirpus sylvaticus*. Linn.

*Scirpus culmo triqetro, folioso; umbellâ foliolatâ; pedunculis nudis, suprà decompositis; spicis confertis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. — Flor. suec. 38. 48. — Weder. Flor. dan. tab. 307. — Pollich. Pal. n°. 50. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 81. n°. 5.

— Jacq. Vend. 19. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 98. — Lectr. Herbar. n°. 36. tab. 1. fig. 4. — Hoffm. Germ. 18. — Roth. Germ. vol. 1. pag. 23. — vol. II. pag. 61. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 694. tab. 38. fig. 2. — Idem, Flor. Franç. vol. 3. pag. 554. n°. 1163. — Poirer, Voyag. en Barb. vol. 2. pag. 91. — Gouan, Monip. p. 32. n°. 9. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 117. n°. 11.

*Scirpus (silvaticus), culmo triquetro, foliis spiculis ramulos panicula laxi decomposita glomeratim terminantibus, viridulis, brevi ovatois.* Michaux, Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 33.

*Scirpus planifolius, panicula ramossissima, locustis ovatis.* Haller, Helv. n°. 1340.

*Scirpus gramineus.* Necker, Gallob. pag. 27.

*Cyperus culmo triquetro, panicula foliacea; pedunculis nudis, supra decompositis; spicis confertis.* Roy. Lugd. Bat. pag. 49. — Sauvag. 21.

*Gramen cyperoides, miliaceum.* C. Bauh. Ph. 6. — Id. Theatr. bot. pag. 90. Icon. — Magn. Monip. pag. 118.

*Cyperus gramineus.* Tourn. Inst. R. Herb. p. 527. — J. Bauh. Hist. 2. pag. 504. Icon. — Scheuch. Gemin. pag. 393. — Dillen. Giff. 86.

*Cyperus longus, latifolius; locustis plurimis, minoribus & brevioribus.* Morif. Oxon. Hist. 3. p. 235. tab. 11. fig. 15.

*Gramen arundinaceum, foliis acutissimis; panicula multiplici, cyperi facie.* Lxf. Pruff. 119. tab. 33.

*Cyperus gramineus, sive miliacea.* Lobel, Icon. 79. — Idem, Adverf. pag. 38. Icon.

*Cyperus gramineus, seu miliaceus pens.* Dalech. Hist. 1. pag. 993. Icon. *An juncus latus?* Idem, L. c. 988. Icon.

*p. Scirpus (radicans), culmo triquetro, foliis umbellat foliatis; culmis sterilibus, flexis apice radicanibus.* Schkuht. in asteri. Annal. 4. pag. 48. tab. 1.

Cette espèce est une des plus remarquables de ce genre, par la hauteur de ses tiges, la largeur & l'ampleur de ses feuilles; par ses grandes panicules diffusées en ombelles, foliacées.

Ses racines sont dures, presque ligneuses, cylindriques, fibreuses, assez profondément enfoncées en terre: il s'en élève une tige droite, haute d'un à deux pieds & plus, roide, médiocrement épaisse, striée, glabre, verdâtre, anguleuse, presque triangulaire, lisse, feuillée dans toute sa longueur. Ses feuilles sont grandes, alternes, très-larges, presque ensiformes, un peu obtuses à leur sommet, relevées en carène sur leur dos, planes, larges de six lignes, longues de six à huit pouces, rudes tant à leurs bords que sur leur carène lors-

qu'on les glisse entre les doigts, embrassant les tiges par une gaine un peu lâche, dont l'orifice est garni antérieurement d'une petite membrane scarieuse, obtuse. Les feuilles de la base de l'ombelle, & qui tiennent lieu d'involucre, ressemblent à celles des tiges.

Les fleurs sont disposées en une ombelle générale très-ample, terminale, dont les pédoncules se divisent en plusieurs autres ombelles partielles, composées d'un très-grand nombre de fleurs. Ces pédoncules sont inégaux, diffus, striés, trigones, glabres, la plupart un peu rameux à leur sommet, munis de bractées membraneuses à la base de leurs divisions. Les épillets sont petits, foliaires, pédicellés, presque fasciculés, quelques-uns sessiles, d'un brun-noirâtre ou un peu verdâtres; les semences triangulaires, munies de quelques poils à leur base.

La variété s'est remarquable en ce qu'elle pousse des tiges stériles, dont le sommet se recourbe vers la terre, acquiert des racines, & produit de nouvelles tiges.

On rencontre cette plante en Europe, dans les bois & les lieux humides & couverts. Je l'ai aussi observée en Barbarie. Celle que l'on rencontre dans les contrées septentrionales du Canada est une fois plus petite que la même plante née en Europe.  $\frac{7}{8}$  (P. v.)

#### 73. SCIRPE réticulé. *Scirpus reticulatus.* Lam.

*Scirpus culmo gladiato, nudo, aspero; umbellâ compositâ, foliacea; involucri foliis superheie reticulatis.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 695.

Il existe quelques rapports entre cette espèce & le *scirpus silvaticus*; elles diffèrent cependant par des caractères assez tranchés pour ne point les confondre.

Celle-ci a des tiges nues, à moins qu'elles ne soient feuillées à leur base; elles sont droites, simples, un peu comprimées, presque triangulaires, finement & très-régulièrement striées, rudes & coupantes à leurs angles, terminées par des fleurs disposées en une sorte d'ombelle composée, médiocrement étalée.

Les pédoncules communs sont inégaux, roides, anguleux, & supportent d'autres petites ombelles partielles, composées d'épillets fasciculés, étroits, assez petits, oblongs, aigus, pédicellés, presque sessiles, un peu fauves, munis d'écaillés étroites, lancéolées, aigues. L'ombelle générale est soutenue par un involucre de six à huit folioles graminiformes, simples, assez larges, inégales, rudes à leurs bords, striées, réticulées, beaucoup plus longues que les fleurs. Les ombelles partielles sont accompagnées d'une spathe membraneuse, à deux folioles opposées, lancéolées, aigues, plus longues que les épillets.

Cette plante croît naturellement dans la Caroline, où elle a été découverte par Frazer. (V. f. in herb. Lam.)

74. SCIRPE mucronulé. *Scirpus mucronulatus*. Mich.

*Scirpus culmo subancipiti, nudo; umbellâ compositâ; spiculis minimis, oblongo-ovatis, apice mucronatis.* (N.)

*Scirpus foliis radicalibus planis; culmo nudo, subancipiti; umbellâ compositâ, laxâ; spiculis minimis, oblongo-ovatis, glabris; squamis lanceolatis; carinâ prominulâ, aïscolor, in minutum mucronem æfinescente; setulis sæ genitalibus seu fæmine nullis; stylo glabro, trifido.* Michaux, Flot. boreal. Amer. vol. 1. pag. 31.

Cette plante, très-voisine du *Scirpus dichotomus*, ne doit pas être confondue avec lui, ayant des caractères qui lui sont propres.

Ses racines sont composées de fibres très-déliées, fasciculées : il s'en élève plusieurs tiges grêles, nues, simples, droites, un peu striées, très-glabbres, à deux angles opposés, peu marqués; hautes de huit à dix pouces & plus, garnies à leur base de feuilles planes, glabres, étroites, graminiformes, un peu aigues à leur sommet, environnant les tiges par une gaine courte, un peu lâche, plus courtes que ces tiges.

Les fleurs sont terminales, disposées en ombelles dont les pédoncules communs sont sétacés, inégaux, la plupart supportant une ombellule composée d'épillets fort petits, ovales, oblongs, très-étroits, munis d'écaïlles lancéolées, traversées longitudinalement par une faille en carène de deux couleurs, qui se prolonge en une petite pointe courte, terminale. L'involucre est composé de quelques filets sétacés, inégaux, plus courts que les pédoncules. Le style est glabre & trifide; les semences fort petites, dépourvues de poils à leur base.

Cette plante croît sur les montagnes de la Caroline; elle m'a été communiquée par M. Bosc. ? (V. f.)

75. SCIRPE cariné. *Scirpus lineatus*. Mich.

*Scirpus culmo latiusculæ folioso; paniculis lateralibus & terminalibus; spiculis parvulis, oblongiusculæ ovatis; squamis lanceolatis, subcarinatis, rufis; lineâ carinæ, viridulâ, prominulâ.* Michaux, Flot. boreal. Amer. vol. 1. pag. 32.

Cette plante, d'après Michaux, a de grands rapports avec le *Scirpus siliquatus*. Ses tiges sont droites, simples, garnies dans toute leur longueur de larges feuilles graminiformes.

Les fleurs sont disposées en panicules, dont les

unes sont terminales; les autres latérales, situées dans l'aisselle des feuilles, garnies d'épillets fort petits, ovales, oblongs, munis d'écaïlles imbriquées, lancéolées, rouffâtres, dont le dos est relevé par une ligne failante, verdâtre, en forme de carène.

Cette plante a été découverte par Michaux dans la Caroline. ?

76. SCIRPE luzule. *Scirpus luzula*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliosâ, proliera; spiculis subrotundis.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 75. — Burm. Flor. Ind. pag. 22. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 307. n° 57.

*Gramen cyperoides, orientale.* Pluken. Mantiff. pag. 97. tab. 417. fig. 3.

Ses tiges s'élèvent à plus d'un pied de haut; elles sont nues, droites, lisses, triangulaires. Les fleurs sont disposées à l'extrémité des tiges, en une ombelle feuillée, souvent composée, dont les pédoncules sont très-inégaux, les intermédiaires très-courts, tous terminés par une tête composée d'épillets un peu arrondis, agglomérés, très-souvent prolifères dans leur centre. L'involucre universel est composé de plusieurs folioles ensiformes, plus longues que les ombelles; les involucre partielles sont presque nuls, & ne consistent souvent qu'en un filet sétacé très-court.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. (Descript. ex Linn.)

77. SCIRPE à grosse tige. *Scirpus grossus*. Linn. f.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; umbellâ supra de-compositâ; spiculis pedicellatis; involucre triphylo, lanceolato, subulato, longissimo.* Linn. f. Supplém. pag. 104. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 306. n° 56.

Cette espèce, qui a beaucoup de rapports avec le *Scirpus miliaceus*, s'en distingue, & se fait remarquer par la hauteur & la grosseur de ses tiges, qui s'élèvent à six ou sept pieds; elles sont droites, simples, de la grosseur du doigt, à trois angles très-glabbres, planes à leurs faces, dépourvues de feuilles à leur partie supérieure. Leur base est enveloppée de feuilles radicales, lancéolées, très-glabbres, chargées de quelques vertues.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle composée de plusieurs autres ombelles partielles, dont les pédoncules supportent à leur extrémité plusieurs épillets pédicellés, ovales, de couleur brune-foncée. L'involucre se divise en trois folioles élargies à leur partie inférieure, subulées à leur sommet, rudes & accrochantes à leurs bords, inégales; l'une d'elles beaucoup plus longue que les autres, & surpassant les ombelles.

- Cette plante croît naturellement dans les Indes orientales.

78. SCIRPE hérissé. *Scirpus echinatus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; umbellâ simplicî; spicis ovatis*. Linn. Flor. zeyl. n°. 38. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 304. n°. 49.

*Cyperus floribus capitatis, erectis, pedunculatis*. Gronov. Virgin. 12.

*Gramen cyperoides, americanum; spicis grandioribus, oblongo-rotundis, sparganis in madum echinatis, ad summum caulem pediculis longis inintitibus*. Pluken. Almag. 179. tab. 91. fig. 4.

*Gramen cyperinum, zeylanicum, parcinum; capitulis conglobatis, rotundis*. Burm. Zeyl. 107.

Urukiri. Herm. Zeyl. 7.

Cette plante a des tiges très-basses, droites, simples, glabres, triangulaires, dépourvues de feuilles, excepté quelques-unes à leur base, qu'elles embaissent par leur gaine, assez semblables à celles de quelques espèces de carex, &c. de la longueur des tiges.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle simple, dont les pédoncules inégaux supportent un épi ovale, oblong, dont les écailles se terminent par une petite pointe roide, &c. le rendent hérissé. La base de l'ombelle est munie d'un involucre composé de quatre ou cinq folioles allongées, inégales.

Cette plante se rencontre également dans les deux Indes.

79. SCIRPE globifère. *Scirpus globiferus*. Linn. f.

*Scirpus culmo nudo, tereti; umbellâ terminali, compressâ; capitulis globosis, ex spiculis pluribus arcte congestis*. Linn. f. Suppl. pag. 104. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. n°. 42.

Cette plante a des tiges très-glabres, simples, cylindriques, dépourvues de feuilles, droites, terminées par une spathe très-courte, composée de deux folioles égales, subulées, mucronées. Il en sort plusieurs pédoncules anguleux, à deux angles principaux opposés, soutenant de petites têtes globuleuses, formées par des épis très-courts, agglomérés.

De la base de ces globules s'élèvent de nouveaux rayons ou pédoncules également globulifères, qui souvent se divisent de nouveau : d'où il suit que les fleurs offrent, dans leur développement, une ombelle composée d'ombellules prolifères à leur base.

Cette plante se rencontre dans l'île de Ténéridie. (*Descript. ex Linn. f.*)

80. SCIRPE anormal. *Scirpus anomalus*. Retz.

*Scirpus culmo triquetro, folioso; paniculâ terminali, brevi; spiculis ovatis; floribus corollatis, in fasciis monanariis, superioribus diandris*. Retz. Obs. 5. pag. 15. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. p. 305. n°. 53.

Le genre de cette plante, dit Willdenow, est très-incertain; elle ne convient que très-imparfaitement au *Scirpus*, ayant des corolles à deux valves. Peut-être seroit-il plus convenable de la placer parmi les *hilinga*.

Quoi qu'il en soit, les tiges sont droites, simples, glabres, triangulaires, feuillées dans une partie de leur longueur, les feuilles alternes, graminiformes. Les fleurs disposées en une panicule courte, terminale, dont les pédoncules inégaux soutiennent des épillets ovales, qui sont composés de fleurs munies d'une corolle à deux valves & les fleurs inférieures n'ont qu'une seule étamine; les supérieures en ont deux.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales.

81. SCIRPE spathacé. *Scirpus spathaceus*. Michx.

*Scirpus culmo tereti, folioso; foliis linearibus, planis; racemis axillaribus terminalibusque, sessilibus; spiculis alternis, subulato-linearibus*. (N.)

*Scirpus culmo tereti, copiosè folioso; foliis proximè alternis, patulis, linearibus, planis; racemis axillaribus & terminalibus, sessilibus; singulorum spiculis paucioribus, approximatis, alternis, subulato-linearibus, subflexuosis*. Michx. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 32.

*Cyperus (spathaceus), culmo triquetro, foliosâ racemis axillaribus*. Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 289. n°. 76.

*Cyperus (spathaceus), culmo vaginis foliorum vestito; pedunculis pinnatis, lateralibus*. Linn. Syst. veget. pag. 84.

*Schanus (spathaceus), culmo tereti; spathâ alternis, mucronatis, paniculas involventibus; spinis alternis, patentibus*. Linn. Spec. Plant. edit. 2. vol. 1. pag. 63.

*Cyperus ferrugineus*. Linn. Spec. Plant. edit. 1. pag. 44.

*Cyperus racemis simplicibus; lateralibus, foliatis, distichis; spicis alternis, patentibus*. Gronov. Virgin. pag. 131.

*Gramen junceum elatius; caule articulo, virginianum; cyperi paniculis interfoliis, propè summitatem prodeuntibus*. Pluken. Almag. pag. 179. tab. 301. fig. 1.

*Gramen fusciatilis, geniculatum; paniculâ folioceb,*

*virginianum*. Morif. Oxon. Hist. 3. pag. 183. §. 8. tab. 3. fig. 17.

Cette plante a été alternativement placée parmi les *cyperus*, les *sihanus*, les *scirpus*, tant les limites de ces trois genres sont peu marquées; elle parait néanmoins appartenir davantage au *scirpus*, parmi lesquels Michaux l'a récemment placée.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de plusieurs pieds, noueuses, presque entièrement enveloppées par les gaines des feuilles, qui sont alternes, graminiformes, nombreuses, rapprochées, très-ouvertes, planes, glabres, linéaires, aiguës. Les fleurs sortent en grappes paniculées, de l'aisselle des feuilles supérieures; d'autres sont terminales, garnies de grandes spathes d'une seule pièce, alternes, caduques.

Les épillets sont alternes, pédonculés, étalés, presque disposés sur deux rangs, rapprochés, subulés, étroits, oblongs, linéaires, munis d'écaillés étroites imbriquées, contenant environ six fleurs; chacune d'elles munie de trois étamines, rarement moins; un pistil terminé par deux stigmates, un ovaire environné de cinq à huit filets sétacés, mais plus ordinairement au nombre de six.

Cette plante croît dans la Virginie & dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale, depuis la baie d'Hudson jusque dans la Floride, dans les marais des bois. 4.

#### 81. SCIRPE capillaire. *Scirpus capillaris*. Linn.

*Scirpus culmo nudo, capillari; spicis pedunculatis, ternis, intermedii sessil.* Linn. Mantiss. pag. 321. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302.

*Scirpus culmo teretiusculo, seminudo; spicis capicatis, sessilibus; involucri diphyllo, setaceo.* Flor. aeylan. 39.

*Cyperus culmo tereti, spicis infra apicem ferente.* Hort. Cliff. 21.

*Gramen pusillum; juncti capitulis minimis, ab basi foliolis binis, acutis.* Burm. Zeyl. pag. 109. tab. 47. fig. 2.

*Gramen glareosum; juncti capitulis ad basin foliorum foliosis.* Muf. Zeylan. pag. 45.

Cette plante a quelques rapports avec le *scirpus setaceus*; mais ses tiges sont bien moins fines, & ses épis en partie médiocrement pédonculés.

Ses racines sont simples, capillaires, blanchâtres, un peu fasciculées; ses tiges droites, nues, nombreuses, très-simples, hautes de trois à quatre pouces, environnées à leur base de feuilles presque aussi longues que les tiges, très-fines, vaginales à leur partie inférieure. Une foliole spatulée très-fine, allongée termine les feuilles, & tient lieu d'involucre avec une autre petite foliole

bien plus courte, sétacée; elles accompagnent les épis à leur base, ordinairement au nombre de trois, petits, ovales; les deux latéraux médiocrement pédonculés; le troisième sessile, muni d'écaillés d'un brun-noirâtre, imbriquées, obtuses à leur sommet, traversées par une nervure longitudinale, de couleur verdâtre.

Cette plante croît dans l'Inde & à l'île de Ceilan.

#### 83. SCIRPE à corymbes. *Scirpus corymbosus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, folioso; corymbosis lateribus, simplicibus; terminali proliifero, spicis subulatis.* Linn. Amoenit. Academ. vol. 4. pag. 303. n°. 112. — Burm. Flor. ind. pag. 23. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. n°. 59.

*Kodira-pulla.* Rheed. Malab. vol. 12. pag. 97. tab. 43.

Cette plante a des tiges droites, simples, triangulaires, glabres, hautes d'environ deux pieds, garnies de feuilles graminiformes, dont la base embrasse les tiges par une gaine serrée, cylindrique.

Les fleurs sont disposées en un corymbe composé, terminal, dont les pédoncules sont inégaux; les intermédiaires beaucoup plus longs & prolifères. L'involucre universel est beaucoup plus long que les fleurs. Les épillets sont subulés, pédicelles, garnis d'écaillés imbriquées; les supérieures plus longues, roulées sur elles-mêmes en forme d'alcène; chaque pédicule muni à sa base d'une petite foliole sétacée. Outre les corymbes terminaux, il y en a aussi très-souvent de latéraux, mais simples, pédonculés, situés dans l'aisselle de chacune des feuilles caulinaires.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales.

#### 84. SCIRPE annuel. *Scirpus annuus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; involucri diphyllo; pedunculis nudis; spicis solitariis.* Allion. Flor. ped. n°. 2371. tab. 88. fig. 5. — Desfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 51.

*Scirpus culmo triquetro, nudo, foliis vix longioribus; umbellâ compositâ, foliolis terminali.* Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 689.

*Scirpus (dichotomus), culmo triquetro, nudo; umbellâ decompositâ; spicis dichotomis, sessilibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. — Flor. zeylan. 40. — Rottb. Gram. 57. tab. 13. fig. 1. — Retz. Observ. 4. pag. 12. — Vahl, Symbol. 1. pag. 8. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 304. n°. 48.

*Scirpus (bisumbellatus), culmo basi vaginatus;*



*spiculis pedunculatis, terminalibus bifimbrellatis.* Forsk.  
Flor. ægypt. arab. pag. 15. n°. 46.

*Scirpus-cyperus aquaticus, annuus, minimus; capitulis ferrugineis; semine striato, pulchro.* Michel.  
Genet. 49.

*Cyperus supinus, minor; sparsa panicula, ex rarioribus locustis confecta.* Monr. Prodr. 13.

8. *Gramen cyperoides, maderaspatanum; juncelli Gesneri capitulis sparsis.* Pluken. Almag. pag. 179.  
tab. 179. fig. 3.

*Cyperus maderaspatanus, culmo compresso, spicis minoribus, fuscis.* Scheuch. Gram. 395.

Ses racines sont fibreuses, capillaires; elles produisent des tiges simples, droites, striées, nues, fort grêles, triangulaires, hautes d'environ six à huit pouces; elles sont accompagnées à leur base de quelques feuilles étroites, linéaires, planes, aiguës à leur sommet, molles, presque setacées, un peu pubescentes, légèrement dentées en scie à leurs bords, un peu plus courtes que les tiges.

Les fleurs sont disposées en une sorte de corymbe ou de panicule composée de pédoncules inégaux; ceux du centre beaucoup plus courts, presque simples; les latéraux subdivisés en pédicelles inégaux, très-courts, au nombre de trois ou quatre, qui supportent des épillets ovales, rouffâtres, un peu oblongs, munis d'écaillés ovales, membraneuses à leurs bords, mucronées à leur sommet, marquées sur leur dos d'une nervure verdâtre, & longitudinale. Quelques-uns des épillets sont sessiles, situés entre les pédoncules partiels, ainsi qu'entre les pédoncules communs. Ces fleurs sont enveloppées, à la base du corymbe, d'un involucre composé d'environ cinq folioles inégales, dont quelques-unes sont plus longues que le corymbe. Les semences sont petites, blanchâtres, striées longitudinalement, anguleuses, planes à leur face inférieure.

Cette plante varie par sa grandeur, par le nombre de ses pédoncules, de deux à huit; elle croît dans les lieux humides, sur le bord des lacs, dans le Piémont, l'Italie; dans l'Afrique septentrionale, en Arabie, & même dans les Indes. ○ (V. f.)

85. SCIRPE onciné. *Scirpus uncinatus.* Willd.

*Scirpus pilosus, culmo tereti, foliis; spicis in capitulum conglomeratis, terminalibus axillaribusque.* Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 300.

*Scirpus capitatus.* Burm. Flor. ind. pag. 21. t. ?

*Gramen hirsutum, indicum; glomeratis capitulis lagopi caruleis; glomâ à squamulis plurimis.* Et. Pluken. pag. 178. tab. 190. fig. 7.

Ses tiges sont droites, cylindriques, hautes de deux à trois pouces, feuillées & pileuses, garnies, dans presque toute leur longueur, de feuilles

étroites, graminiformes, aiguës, pileuses à leurs deux faces, ensières.

Les fleurs sont réunies en côtes agglomérées; les unes terminales, d'autres latérales, situées dans l'aisselle de la feuille supérieure. Les fleurs terminales sont accompagnées, à leur base, d'un involucre composé de deux folioles courtes, velues. Les latérales sont nues, pédonculées; les épillets munis d'écaillés paléacées, traversées par une nervure saillante, qui se prolonge au sommet en une pinnule courbée en crochet.

Cette plante se rencontre dans les Indes orientales. (Descript. ex Willd.)

86. SCIRPE d'automne. *Scirpus autumnalis.* Linn.

*Scirpus culmo acicipii, nudo; umbellâ decompositâ, spiculis ovatis.* Linn. Mantiss. 180. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. n°. 38.

*Scirpus foliosus, pusillus, autumnalis; culmo plano, utrinque paululum compresso.* Clayton. 772.

*Scirpus (autumnalis), involucre diphyllo; panicula supra decompositâ; spicis terminalibus, foliariis, lanceolatis, subtetragestris.* Rottb. Gram. pag. 58. tab. 17. fig. 3. ?

Cette plante a l'aspect du *juncus pilosus*. Ses tiges sont droites, hautes de cinq à six pouces, nues, comprimées, à deux angles, l'un des deux plus saillant & presque en carène; munies à leur base de feuilles radicales lâches, graminiformes, un peu scabres, lâches, souvent de la longueur des tiges.

Les fleurs sont terminales, disposées en une sorte d'ombelle composée, munie à sa base d'un involucre à deux folioles, assez semblables aux feuilles, un peu plus longues que l'ombelle. Les pédoncules sont étalés, mégaux; ils soutiennent souvent trois épis ovales, un peu allongés, garnis d'écaillés ovales, d'un brun-noirâtre, traversées longitudinalement d'une carène verdâtre, qui se termine par une très-petite pointe.

Cette plante se rencontre à la Jamaïque & dans la Virginie. & Malgré les grands rapports que le *scirpus autumnalis* de Rottballe paraît avoir avec cette espèce, elle offre quelques différences qui pourroient bien ne pas permettre de la regarder comme la même plante.

87. SCIRPE trigone. *Scirpus triquetus.* Linn.

*Scirpus culmo triquetris, nudo; spicis subsessilibus pedunculatisque, mucronem aquantibus.* Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 73. — Mantiss. 29. — Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 678. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 302. n°. 46.

*Scirpus mucronatus*. Pollich. Pal. n°. 48. — Scop. Carn. n°. 60. — Hoffm. Germ. 18.

*Scirpus (triqueter), culmo triquetro, nudo; spiculis lateralibus, ovatis, obtusis, subsessilibus pedunculatisque; mucrone erecto.* Roth. Germ. vol. 1. pag. 23. — vol. II. pag. 38.

*Scirpo-cyperus palustris, caule molli; panicula sparsa minore; capitulis subrotundis, plurimis simul junctis, subsessilibus.* Michel, Gener. 47.

*Juncus acutus, maritimus; caule triquetro, molli, procerior.* Pluken. Almag. pag. 200. tab. 40. fig. 2. — Rai, Suppl. 629.

*Scirpus (triqueter), culmo aphylo, triquetro; spiculis infra mucronem his longiorem sessiliter conglomeratis, oblongo-ovatis, rufis.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 30.

*Scirpus (mucronatus), culmo triangulo, nudo; spiculis lateralibus, oblongis, conglomeratis, sessilibus; mucrone erecto.* Roth. Germ. vol. 1. pag. 23. — vol. II. pag. 60.

*Juncus acutus, maritimus; caule triquetro, rigido & molli.* Pluk. Almag. pag. 200. tab. 40. fig. 1, 3.

*Juncus acutus, maritimus; caule triangulo.* C. Bauh. Pin. 11. — Idem, Prodr. 22. — Morif. Ox. Hist. 3. pag. 232. §. 8. tab. 10. fig. 20.

Il y a tant de rapports entre cette plante & le *Scirpus mucronatus*, qu'on pourroit ne considérer ces deux espèces que comme des variétés; cependant elles se trouvent séparées par des caractères si constants, quoique peu importants en apparence, qu'il est plus convenable de les tenir séparées. Il suffira, pour les sentir, de comparer ce que nous en allons dire avec la description du *Scirpus mucronatus*.

Ses racines sont rampantes, fibreuses, de couleur noirâtre : il s'en élève des riges fermes, droites, simples, triangulaires, à trois faces planes & non concaves, à trois angles non faillans, presque grêles; médiocrement élevées, environnées à leur base de quelques feuilles étroites, glabres, étalées, creusées en gouttière, vaginales à leur partie inférieure.

Les fleurs sont latérales vers l'extrémité des riges ou terminales, surmontées par une des deux folioles de l'involucre, longue, très-roide, droite, un peu triangulaire, aiguë, jamais réfléchie à son sommet. Ces fleurs forment des paquets agglomérés, composés d'épillettes plus ou moins nombreux, la plupart médiocrement pédonculés, tous sessiles dans la variété *p*. Les semences sont petites, un peu ovales, médiocrement comprimées, munies de quelques poils à leur base.

Cette plante croît dans les départements méridionaux de la France, dans les lieux humides &

marécageux, en Italie, en Allemagne, & dans l'Amérique septentrionale.  $\mp$  (V. f.)

88. *SCIRPE* brun. *Scirpus castaneus*. Mich.

*Scirpus caule subtereti, nudo; umbellis terminali; spiculis subrotundo-ovatis; squamis suborbiculatis, paucifolius; stylo bifido, fimbriato.* (N.)

*Scirpus foliis radicalibus, angustifolius, longis, strictè erectis, rigidulis; culmo subtereti, striato; umbellis terminali; bracteis pluribus erectis involucreto; ramulis 1-4. flachyis; spiculis subrotundo-ovatis, luciat nigricanti-castaneis; squamis suborbiculatis, paucifolius; stylo fimbriato, bifido.* Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 31.

Ses tiges sont droites, simples, roides, striées, médiocrement cylindriques, garnies à leur base de feuilles longues, très-étroites, roides, glabres, droites, aiguës, vaginales à leur partie inférieure.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, dont les pédoncules sont grêles, inégaux, divisés à leur sommet en d'autres pédoncules courts, au nombre de trois ou quatre, quelquefois simples, terminés par des épis solitaires, ovales, un peu arrondis, luisans, couleur de châtaigne-foncée, composés d'un très-petit nombre de fleurs; munis d'écaillés presque orbiculaires, & soutenus à leur base par un involucre divisé en plusieurs folioles droites, inégales. Le style est frangé, divisé en deux.

Cette plante a été découverte par Michaux, dans la Floride.  $\mp$

89. *SCIRPE* cilié. *Scirpus ciliaris*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, folioso; umbellis sparsis; squamis callicinis aristatis, ciliatis.* Linn. Mantiss. 182.

*Scirpus pedunculis lateralibus & terminalibus multifloris; spicis oblongis, hirsutissimis; squamis triearinatis, aristatis.* Roth. Gram. pag. 55. tab. 17. fig. 1.

*Gramen cyperoides, India orientalis; foliis hirsutis, pubescentibus, intervallo panicula pulchra.* Poonar-repile Malabarorum. Pluken. Murrill. pag. 98. tab. 417. fig. 6. ?

Malgré les grands rapports que cette plante peut avoir avec notre *Scirpus pubescens*, je l'en crois cependant différente, surtout par la disposition des fleurs en petites ombelles, dont quelques-unes sont latérales.

Ses tiges, d'après Linné, sont triangulaires, droites, hautes de six à sept pouces, liches, feuillées. Les feuilles sont radicales & caulinaires; ces dernières, au nombre de quatre ou cinq, alternes,

alternes, lâches, semblables à celles des graminées, vaginales à leur base, couvertes de la longueur des tiges.

Les fleurs sont axillaires & terminales, supportées par des pédoncules plus courts que les feuilles, terminés à leur sommet par trois ou cinq épis sessiles, ovales, munis d'écaillés imbriquées, ovales, obtuses, hérissées de quelques poils rares, mucronées à leur sommet par une pointe plus courte que les écaillés, droites, ciliées, écartées. Chaque réte de fleurs est munie en dessous, assez ordinairement, d'une à deux folioles petites, subulées.

Cette plante croît dans les Indes orientales. *H. (Descript. ex Linn.)*

90. SCIRPE des étangs. *Scirpus lacustris*. Linn.

*Scirpus culmo tereti, nudo; umbellâ compositâ, subterminali; spiculis ovatis*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 141. n°. 685.

*Scirpus culmo tereti, nudo; spiculis ovatis, pluribus pedunculatis, terminalibus*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 72. — Flor. Suec. 40. 46. — Pellich. Pal. n°. 46. — Gmel. Sibir. vol. 1. pag. 79. — Hoffm. Germ. 17. — Roth Germ. vol. 1. pag. 22. — vol. II. pag. 17. — Lam. Flor. franc. vol. 3. pag. 553. n°. 1163. — D. Sfont. Flor. atlant. vol. 1. pag. 48. — Gerard, Flor. gall. Prov. pag. 115. n°. 5. — Gouan, Monsp. pag. 30. n°. 3.

*Scirpus teres, paniculâ subapice culmi ramosâ*. Sauvag. pag. 8.

*Scirpus caule tereti, paniculâ laterali, ramosâ; locustis ovatis*. Haller, Helv. n°. 1337.

*Scirpus (lacustris), elatior, aphyllus; culmis teretibus; spiculis solitariè gregatimque pedunculatis, ovatis, rebus; squamis lato-ovalibus, dorso prominulè punctulosis, margine suberosis*. Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. pag. 31.

*Scirpus palustris, altissimus*. Tournef. Inst. R. Herbat. 528. — Scheuch. Gramin. pag. 454. — Michel, Gen. 49. tab. 31. — Monti. Prodr. 15. — Garid. Aix, pag. 432.

*Scirpus spicis copiosis*. Lugd. Bar. 48.

*Juncus maximus, seu scirpus major*. C. Bauh. Pin. 12. — Idem, Theatr. 178. Ic.

*Juncus palustris, major*. Tragus. 674. Ic. — Abfq. que flore. Descript. pag. 685. — Tabern. Icon. 249.

*Juncus aquaticus, marinus*. Lobel. Icon. 85. — Gerard, Hist. 35. Ic.

*Juncus holoschanos*. Dodon. Pempt. 605.

*Juncus maximus, holoschanos*. J. Bauh. Hist. 2. pag. 12. Ic. 522.

Botanique. Tome VI.

*Juncus lev's, maximus*. Morif. Oxon. Hist. 3. 8. tab. 10. fig. 1.

Il seroit difficile de méconnoître cette belle espèce, la plus grande & la plus remarquable de ce genre, si commune d'ailleurs dans les lacs & les étangs qu'elle domine par ses hautes tiges, & dont elle garnit les bords qu'elle embellit d'une belle verdure.

Ses racines sont épaisses, noueuses, rampantes, garnies d'un grand nombre de radicules fibreuses, allongées, blanchâtres, très-déliées. Ses tiges sont simples, droites, nues, élançées, cylindriques, très-lisses, d'un beau vert, de l'épaisseur du doigt, haute de cinq à six pieds, décroissant insensiblement de leur base à leur sommet, aiguës, remplies d'une moëlle très-blanche, légère & celluleuse, garnies, à leur base, de longues & larges membranes vaginales, qui se terminent en une sorte de feuille molle, verte, allongée, aiguë.

Les fleurs sont terminales, disposées en une panicule umbelliforme, dont les pédoncules communs sont inégaux, comprimés, un peu anguleux & rudés, simples ou rameux, supportant des épis un peu unilatéraux, ovales, couffettes, obtus, réunis d'un à quatre ou cinq, sessiles ou pédicellés, composés d'écaillés imbriquées, scarieuses, obtuses ou un peu échancrées à leur sommet; la base de la panicule garnie d'un involucre de deux grandes folioles inégales, membraneuses, concaves à leur base, longuement tubulées & aiguës à leur partie supérieure, beaucoup plus longues que la panicule entière. Les semences sont brunes, luisantes, presque triangulaires, environnées, à leur base, de quelques poils noirâtres.

Cette plante est commune partout dans les lacs & les étangs, en Europe, en Barbarie, &c. *¶ (V. v.)*

On fait, avec la moëlle des tiges de cette plante, plusieurs petits ouvrages très-agréables : on se sert de ces mêmes tiges pour couvrir des cabanes ; les enfans en font des faisceaux qui les aident à nager. Les chèvres, les vaches, les cochons, mangent cette plante quand elle est verte ; mais les moutons n'en veulent point. On a essayé d'en faire du papier ; le succès n'a pas été très-heureux : on l'emploie dans plusieurs ouvrages de vannerie.

91. SCIRPE entre-mêlé. *Scirpus intricatus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetro, nudo; umbellâ foliolis, simplicibus; squamis calicinis subulatis, recurvis*. Linn. Mantiss. 181. — Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 279.

*Scirpus (intricatus), culmo trigono; umbellâ simplici; spiculis oblongis, squarrofis; involucre triphylo*. Thunb. Prodr. 18.

FFFF

*Scirpus (capitatus)*, culmo tereti, folioso & capitulis axillaribus, pedunculatis; involucrio diphyllo, lineari. Burm. Ind. 21.

*Cyperus (aristatus)*, capitulis oblongis, sessilibus & pedunculatis; spiculis linearibus, minimis; glumulis subulatis, reflexis. Rottb. Gramin. pag. 23. tab. 6. fig. 1.

*Cyperus (aristatus)*, culmo triquetro; umbellâ simplici, spiculis cylindraceo-spicatis; glumis mucronato-mucronatis. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 275. n°. 27.

β. *Scirpus (lappaceus)*, culmo triquetro, subnudo; capitulo terminali, foliario, involucrio; glumis striatis, recurvis. ? Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 139. n°. 657.

La disposition des écailles dans les épis de cette plante la rapproche beaucoup des *Cyperus*; elles sont presque disposées sur deux rangs, mucronees & recourbées à leur sommet.

Les tiges sont nues, grêles, simples, très-glabres, triangulaires, à angles tranchans, munies à leur base de feuilles graminiformes, droites, lisses, étroites, presque aussi longues que les tiges. Les fleurs sont disposées en une petite tête terminale, composées ordinairement de trois ou quatre épillets, très-ouverts, pédonculés, de la forme d'une petite ombelle, un d'eux sessile; munit, à leur base, d'un involucre à trois folioles assez semblables aux feuilles, & beaucoup plus longues que les fleurs. Les épillets sont ovales, un peu cylindriques, obtus, très-chargés de fleurs, disposés horizontalement presque sur deux rangs; munis d'écailles lisses, subulées, recourbées, très-aigües, presque aristées.

La plante β ne paroît être qu'une variété de la précédente, beaucoup plus petite, haute d'environ un pouce, dont les épillets, assez petits, sont presque sessiles; les écailles striées.

Cette plante croît dans les Indes orientales & au Cap de Bonne-Espérance.

92. SCIRPE à feuilles obtuses. *Scirpus obtusifolius*. Lam.

*Scirpus culmo nudo, umbellâ parvâ, subsimplici; foliis brevibus, angustis, glaucis, obtusis*. Lam. Ill. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 681.

Ses tiges sont droites, grêles, filiformes, un peu comprimées, presque triangulaires, nues, très-glabres, hautes d'environ six pouces, disposées presque en gazon, munies, à leur base, de feuilles en touffes, courtes, à peine aussi longues que la moitié des tiges, un peu glauques, très-glâbres, étroites, un peu obtuses à leur sommet, membraneuses, presque imbriquées à leur base.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des

tiges, en une ombelle presque simple, petite; les pédoncules droits, inégaux, anguleux, courts, terminés par un épi foliaire, quelquefois deux, ovales, obtus, assez petits, munis d'écailles membraneuses, imbriquées; l'involucre général presque nul ou composé de quelques folioles courtes, sétacées; souvent un épillet sessile dans le centre & à la base de l'ombelle.

Cette plante se trouve dans les Indes orientales. (V. f. in herb. Lam.)

93. SCIRPE à style frangé. *Scirpus fimbriatus*.

*Scirpus (puberulus)*, foliis radicalibus angustissimis, longis; umbellâ terminali, sparsâ; ramulis 1-4 flachyis, spiculis crassiusculis ovatis; squamis minutim pubentibus, lato-ovalibus; stylo fimbriato, bifido Mich. Flor. boreal. Amer. vol. 1. p. 31.

Cette plante a beaucoup d'affinité avec le *Scirpus dichotomus*. Ses tiges sont droites, simples, triangulaires, garnies, à leur base, de feuilles toutes radicales, alongées, glabres, très-étroites, environnant les tiges par une gaine à leur partie inférieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle diffuse, dont les pédoncules sont capillaires, inégaux, rameux à leur sommet, contenant d'un à quatre épillets ovales, un peu épais, pédicellés, munis d'écailles larges, ovales, légèrement pubescentes, un peu obtuses. Le style est bifide & comme frangé.

Cette plante a été découverte par Michaux, dans la Caroline & la Géorgie.

94. SCIRPE visqueux. *Scirpus viscosus*. Lam.

*Scirpus culmo compresso; umbellâ compressâ, foliis; spiculis capitato-ovalibus; squamis dorso striatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 666.

*Cyperus (viscosus)*, culmo triquetro; foliis convolutis-teretibus; umbellâ compressâ; spiculis oblongis, capitato-glomeratis; involucrio longissimo. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 276. n°. 30.

*Cyperus culmo triquetro, nudo; foliis convolutis-teretibus; umbellâ foliolâ, decompositâ; spiculis confertis; spiculis compressis, ovatis, patentibus*. Swartz, Prodr. 20. — Jacq. Icon. 2. tab. 295. — Collect. Suppl. 32.

*Cyperus (viscosus)*, culmo compresso, basi viscido; foliis asperis, apice triquetris. Aiton, Hort. Kew. vol. 1. pag. 79.

*Cyperus odoratus, viscosus, subteris, maritimus; spiculis compressis, conglobatis & radiatis*. Brown, Jam. 129. n°. 11.

Ses racines sont brunes, fibreuses, fasciculées, épaissies à leur collet par la base membraneuse &

imbriquée des feuilles radicales ; les tiges hautes d'environ un pied , un peu visqueuses à leur partie inférieure , feuillées presque dans toute leur longueur , comprimées , striées , presque à trois angles , glabres , simples , droites , épaisses au moins de deux lignes. Les feuilles sont planes , graminiformes , assez larges , glabres , fermes , aiguës , striées , plus courtes que les riges ; les radicales nombreuses ; les caulinaires de deux à trois , alternes.

Les fleurs sont réunies en épis ovales , capités , assez gros , obtus , supportés par des pédoncules simples , droits , inégaux , disposés en une ombelle simple , quelquefois composée , munie à sa base d'un involucre à plusieurs grandes folioles semblables aux feuilles. Les épis sont formés de plusieurs épillets fort petits , très-serrés , sessiles , agglomérés , munis d'écaillés membraculées , striées sur leur dos , ayant quelquefois pour involucre une ou deux petites folioles filiformes.

Cette plante croît à l'île de Cayenne & à la Jamaïque. ꝯ ( V. f. in herb. Lam. )

95. SCIRPE arifé. *Scirpus arifatus*. Willd.

*Scirpus culmo striato , tereti , folioso ; panicula terminali , diphylla ; spiculis ovatis , squarrosis-echinatis*. Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 300. n°. 37.

*Scirpus pilosus*. Retz. Obferv. bot. 6. pag. 19.

Il ne faut pas confondre cette espèce avec un autre *Scirpus pilosus* , mentionné par Thunberg dans son Prodrome des plantes du Cap de Bonne-Espérance.

Ses tiges sont grêles , striées , pileuses vers leur partie supérieure , hautes de six à sept pouces ; elles n'ont qu'une seule feuille caulinaire , située vers le milieu de chaque tige , un peu plus longue , large de deux lignes , nerveuse , & pileuse tant à ses bords qu'à sa face supérieure. Les feuilles radicales n'ont pas été observées.

Les fleurs sont disposées en une panicule courte , presque filigée , dont les pédoncules sont très-velus , soutenant chacun un ou deux épillets. A la base de la panicule est un involucre de deux feuilles , l'inférieure presque cinq fois plus longue que la panicule , l'inférieure une seule fois au plus , de la même forme que la feuille caulinaire , mais velue à ses deux faces. Les épillets sont ovales , longs d'environ deux lignes , scarieux , hérissés de poils blanchâtres , très-nombreux , composés d'écaillés ovales , imbriquées , minces , transparentes , striées , terminées par un filer blanchâtre de la longueur de l'écaïlle , un peu réfléchi ; garnies à leurs bords de cils droits & blancs. Les étamines sont brunes , au nombre de trois , de la longueur des écaïlles. L'ovaire est brun , à trois faces ; le style de la longueur des étamines , terminé par trois stigmates.

Cette espèce se rencontre dans les Indes orientales. ( *Descript. ex Retz.* )

96. SCIRPE en cime. *Scirpus cymosus*. Lam.

*Scirpus culmo nudo , tenui , subcompresso ; umbellâ cymosâ , congestâ , compositâ , nudâ ; glumis ovatis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 141. n°. 682.

Espèce remarquable par ses fleurs disposées en une cime courte , touffue , & par le grand nombre de feuilles qui enveloppent les tiges à leur base.

Ses racines sont composées de fibres droites , touffues , assez roides : il s'en élève plusieurs tiges droites , simples , grêles , un peu triangulaires , hautes de huit à dix pouces , quelquefois d'un pied & plus , glabres , triangulaires , striées , de couleur un peu glauque , nues dans toute leur longueur , munies seulement à leur base de feuilles nombreuses , en gazon touffu , graminiformes , roides , d'une largeur médiocre , élargies , membraculées , & presque imbriquées à leur base , striées , un peu canaliculées , aiguës , presque épaissies moitié aussi longues que les tiges , quelquefois plus longues.

Les fleurs sont disposées , à l'extrémité des tiges , en une cime courte , presque ombelliforme , plane , munie d'un involucre à deux folioles roides , striées , presque planes & obtuses , coriaces , à peine de la longueur des fleurs ; elles manquent quelquefois. Les pédoncules sont très-courts , inégaux , un peu rameux à leur sommet , ou terminés par des épillets sessiles , oblongs , cylindriques , petits , garnis d'écaillés roussâtres , ovales , obtuses , scarieuses & un peu blanchâtres à leurs bords , très-serrés.

Cette plante croît au Brésil & à l'île de Java , où elle a été découverte par Commertion. ( V. f. in herb. Lamarck. )

97. SCIRPE dichotome. *Scirpus dichotomus*. Lam.

*Scirpus culmo triquetro , nudo ; umbellâ decompositâ , foliis hirsutis*. Lam. Illustr. Gener. vol. 1. pag. 142. n°. 688.

Cette espèce ne doit pas être confondue avec le *Scirpus dichotomus* de Linné , que nous avons décrit sous le nom de *Scirpus annuus* d'Allioni ; elle se distingue à ses feuilles légèrement velues , à ses ombelles plusieurs fois composées.

Ses tiges sont droites , hautes au moins d'un pied , striées , triangulaires , d'une grosseur médiocre , glabres , depourvues de feuilles à leur partie supérieure , munies à leur base de feuilles assez larges , planes , larges au moins de deux lignes , fermes , striées , presque aussi longues & quelquefois plus longues que les tiges , garnies dans leur longueur , & surtout vers leurs bords , de quelques poils fins , blanchâtres , épars. Leur base

est large, membraneuse, cylindrique autour des tiges, ou imbriquée lorsqu'elle est libre.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une ombelle plusieurs fois composée, dont les pédoncules sont longs, striés, inégaux, se ramifiant à leur sommet en d'autres ombellules, quelquefois séparées par dichotomie, soutenant des épillets ovales, un peu aigus, d'une grosseur médiocre, pédicellés, quelques-uns féconds, surtout dans le centre des ombelles, munis d'écaillés rouffâtres, imbriquées, un peu oblongues, aiguës, scarieuses. L'involucre général divisé en folioles linéaires, plus courtes que l'ombelle, assez semblables aux feuilles; les involucre partiels étroits, subulés, aigus, plus courts que les épillets.

Cette plante croît dans les Indes orientales & dans l'Amérique. (V. f. in herb. Lam.)

98. SCIRPE rouge-brun *Scirpus spadicus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetris, nudo; umbellâ compositâ, laxâ; spiculis ovatis, spadicis*. Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 142. n°. 691.

*Scirpus culmo triquetris, nudo; paniculâ laxâ; spiculis alternis, subfiliis; pedunculis longis, terminalibus*. Gronov. Virg. 132.

*Scirpus culmo triquetris, umbellâ subnuda, spiculis oblongis, sessilibus terminalibusque*. Linn. Spec. Plant. pag. 74.

*Gramen cyperoides, majus, spiculis oblongo-rotundis, compositis, ferrugineis*. Sloan. Jam. 36. Hist. 1. pag. 118. tab. 76. fig. 2.

g. *Scirpus culmo triquetris, longifolius, foliis filiformibus; paniculâ umbellatâ, subcompositâ*.

La plante que je décris ici, & que j'ai indiquée sous la lettre g comme une variété du *Scirpus spadicus* de Linné, y a trop de rapports pour être séparée. D'ailleurs, l'espèce de Linné ne m'est pas assez connue pour prononcer affirmativement sur l'identité de ces deux plantes.

Celle-ci a des tiges très-grêles, filiformes, triangulaires, nues dans toute leur longueur, hautes d'environ un pied & demi ou deux pieds, très-simples, munies à leur base d'une feuille filiforme, striée, droite, de moitié plus courte que les tiges qu'elles engainent à leur partie inférieure, dans une longueur de deux à trois pouces.

Les fleurs sont disposées en une sorte d'ombelle terminale, un peu composée, dépourvue d'involucre partiel; l'involucre général composé de deux folioles très-inegales, très-étroites, subulées, plus courtes que l'ombelle. Les pédoncules sont, ou simples, à un seul épillet, ou ramifiés à leur sommet en une petite ombelle; tous les épillets pédonculés, quelquefois un seul solitaire. &c

fécond à la base de l'ombelle. Ces épillets sont ovales, un peu obtus, d'un brun-clair, munis d'écaillés imbriquées, ovales, oblongues, un peu scarieuses à leurs bords.

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à Porto-Ricco; celle indiquée par Linné croît à la Jamaïque, sur le bord des fleuves. (V. f.)

99. SCIRPE couleut de fer. *Scirpus ferrugineus*. Linn.

*Scirpus culmo triquetris, subnudo; involucri longiusculâ paniculâ, ciliatis*. Linn. Spec. Plant. vol. 1. pag. 74. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 304. n°. 51.

*Schanus* (polymorphus), *culmo subnudo, triquetris; involucri mucronato, diphyllis, inaequali, ciliato*. Rottb. Gramin. 67.

*Cyperus culmo triquetris, nudo; paniculâ diphyllâ, pedunculis quibusdam subdivisis; spiculis ovatis, solitariis*. Roym. Lugd. Bat. 50.

*Gramen cyperoides, majus, spiculis ex oblongo-rotundis, compositis, ferrugineis*. Sloan. Jam. 36. Hist. 1. pag. 36. tab. 77. fig. 2.

g. *Scirpus* (debilis), *culmo filiformi, nudo; umbellâ simpliciter, depauperatâ; involucri bivalvis, subciliato; umbellâ longiore*.? Lam. Illustr. Gen. vol. 1. pag. 141. n°. 684.

Cette plante, malgré ses variétés nombreuses, surtout dans les proportions de sa grandeur, se distingue par l'involucre de ses fleurs, composé de deux folioles allongées & ciliées à leurs bords.

Ses tiges sont droites, glabres, triangulaires, un peu comprimées, striées, grêles, hautes depuis trois à quatre pouces, jusqu'à un pied & plus; nues dans une grande partie de leur longueur, garnies à leur base de feuilles foliées, junciformes, droites, striées, un peu roulées en dedans à leurs bords, glabres, aiguës, d'environ deux tiers plus courtes que les tiges, vaginales inférieurement; leur gainé brune, un peu lâche, presque membraneuse.

Les fleurs forment, à l'extrémité des tiges, une petite panicule presque ombellée, dont les pédoncules sont courts, anguleux, inégaux, simples ou quelquefois un peu ramifiés, médiocrement inclinés, supportant un épi ovale, presque obtus, de couleur brune, muni d'écaillés ovales, concaves, imbriquées; l'involucre divisé en deux folioles inégales, loides, ciliées à leurs bords.

Cette plante croît dans les prés secs, à la Jamaïque. M. Ledru l'a également recueillie à Porto-Ricco, & m'en a communiqué un exemplaire. (V. f.)

100. SCIRPE velu. *Scirpus villosus*.

*Scirpus totus villosus, caule striato, triquetra, inferni foliolo; foliis planis, erectis, ferè longitudoine caulis; umbellâ compositâ; involucri diphyllo, longissimo. (N.)*

β. *Idem, altior, subpubescens, umbellâ decompositâ. (N.)*

Cette espèce est facile à distinguer par les poils d'un blanc-cendré qui recouvrent toutes les parties; elle se rapproche un peu du *Scirpus ferrugineus*.

Ses racines sont fibreuses, un peu blanchâtres, en petites touffes; elles produisent plusieurs riges droites, simples, triangulaires, striés, grêles, presque filiformes, hautes au moins d'un pied, pubescentes, cendrées, nées à leur partie supérieure, garnies inférieurement de deux ou trois feuilles alternes, très-étroites, filiformes, un peu planes, striées, velues, de couleur cendrée, au moins aussi longues que les tiges; droites, aiguës, embrassant les riges par une gaine lâche; quelques autres feuilles sont radicales, concaves, élargies à leur base, presque imbriquées avec celles des tiges.

Les fleurs sont disposées en une ombelle terminale, médiocrement composée, munie à sa base d'un involucre à deux folioles inégales, plus longues que les fleurs, semblables aux feuilles; les pédoncules inégaux, velus, simples ou terminés par une petite ombelle; les épillets ovales, un peu renflés, d'un brun-jaunâtre, munis d'écaillés imbriquées, glabres, ovales, un peu aiguës; les deux inférieures ciliées.

La plante β, qu'on pourroit peut-être distinguer comme espèce, est presque une fois plus haute. Ses riges sont glabres, ses feuilles velues sur leur gaine, légèrement pubescentes dans leurs aures parties; les ombelles plus amples, presque deux fois composées; les épillets un peu plus gros, quelques-uns féconds à la base des pédoncules, d'autres femelle, pour le reste, à l'espèce précédente; elle a de grands rapports avec le *Scirpus spadicus*, var. β.

Ces deux plantes m'ont été communiquées par M. Ledru, qui les a recueillies à Porto-Ricco, dans les terrains marécageux. (V. f.)

#### 101. SCIRPE d'été. *Scirpus affinis*. Retz.

*Scirpus culmis depressis, triquetris, nudis; umbellis compositis, involucrius; floribus monandris.* Retz. Observ. botan. 4. pag. 12. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 308. n°. 60.

Ses racines sont noirâtres & capillaires; ses tiges nues, filiformes, comprimées, triangulaires, longues de deux pouces, garnies à leur base de feuilles filiformes, canaliculées, ordinairement plus

longues que les tiges, hérissées de quelques poils, engainant les tiges par leur base.

Les fleurs sont disposées en ombelle. Les pédoncules sont, ou simples, ou supportent d'autres ombelles plus petites. L'involucre est composé de cinq à huit folioles filiformes, velues, dont trois plus longues que l'ombelle; les involucri partiels sont courts, capillaires; les épillets cylindriques, médiocrement anguleux, composés d'écaillés imbriquées, brunes, relevées en carène, acuminées, écartées à leur sommet, ne renfermant chacune qu'une seule étamine.

Cette plante croît à l'île de Ceilan, dans le fond vaseux des rivières, lorsqu'il est mis à sec par les chaleurs de l'été. (*Descript. ex Retz.*)

#### 102. SCIRPE odorant. *Scirpus fragrans*. Ruiz & Pavon.

*Scirpus culmo tereti, striato, nudo; spicis ovatis, pedunculatis, inaequalibus, terminalibus umbellatis.* Ruiz & Pav. Flor. peruv. vol. 1. pag. 47.

Plante herbacée, dont les racines sont fasciculées, fibreuses, capillaires, très-odorantes, & produisent des tiges droites, solitaires, hautes de huit à neuf pouces, très-simples, point articulées, cylindriques, nues, filiformes, striées, pubescentes, presque une fois plus longues que les feuilles; celles-ci sont sétacées, droites, pubescentes, à demi-cylindriques, planes & sillonnées à leur face supérieure.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en cinq ou six épis ovales, pédoncules, presque en ombelle, inégaux; ceux du milieu plus courts, munis d'une coarcture à plusieurs folioles sétacées, inégales, une fois plus longues que les épis; chaque épi ovale, imbriqué d'écaillés droites, en carène, un peu purpurines, recouvrant chacune trois filaments de la longueur de l'ovaire, terminés par des anthères oblongues. L'ovaire est petit, le style filiforme, de la longueur de l'écaille calicinale, terminé par trois styles capillaires. Les semences sont solitaires, à trois faces, nues, glabres, acuminées.

Cette espèce croît au Pérou, dans les forêts. (*Descript. ex Ruiz & Pav.*)

#### 103. SCIRPE des campagnes. *Scirpus arvensis*, Retz.

*Scirpus culmis compressis, striatis; umbellis simplicibus, involucri monophyllo, brevi.* Retz. Obs. 4. pag. 11. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 20.

Cette plante a des racines fibreuses, qui produisent des tiges hautes de deux pieds, comprimées, striées, environnées, à leur partie inférieure, d'une gaine brune, anguleuse, longue

d'environ deux pouces : il sort de cette même gaine, en même tems que la tige, une seule feuille courte.

Les fleurs sont disposées, à l'extrémité des tiges, en une ombelle simple, composée de cinq à huit épillets bruns, ovales, pédonculés, munis d'écaillies calicinales, lancéolées, qui tombent insensiblement les unes après les autres, à commencer par celles de la base; le pédoncule intermédiaire porte rarement deux épillets pédicellés. L'involucre est ordinairement à une seule feuille, plus courte que l'ombelle.

Cette plante croît à l'île de Coilan. (*Descript. ex Retz.*)

104. SCIRPE NOUEUX. *Scirpus nodosus*. Rottb.

*Scirpus culmo compresso, nodoso; capitulo mucronato, glomerato*. Rottb. Gramin. pag. 52. tab. 8. fig. 3. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 298. n°. 29.

Cette plante pousse des tiges simples, nues, très-filles, comprimées, fermes, striées, presqu'à trois faces, noueuses & resserrées par la dessiccation, un peu tortueuses, terminées à leur sommet en une longue pointe subulée.

Les fleurs sont réunies, à environ un pouce au dessous du sommet, en une grosse tête qui environne une partie de la tige, & qui est composée d'épillets nombreux, fort petits, sessiles, ovales, aigus, de couleur brune-rouge, composés d'écaillies calicinales, lancéolées, obtuses, concaves, en carène, chacune d'elles renfermant trois étamines, dont les filamens sont planes, les anthères linéaires. L'ovaire est nu, ovale, presqu'à trois faces, surmonté d'un style simple & de trois stigmates en forme de vrilles. Les capsules sont triangulaires, à une seule semence.

Cette espèce se rencontre au Cap de Bonne-Espérance. (*Descript. ex Rottb.*)

105. SCIRPE à deux folioles. *Scirpus diphyllus*. Retz.

*Scirpus culmis semi-cylindricis, striatis, diphyllis; umbellâ compositâ, involucri diphyllo, longiore*. Retz. Obsér. botan. 5. pag. 15. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. n°. 39.

Ses racines sont courtes & fibreuses : il s'en élève des tiges filiformes, hautes de deux ou trois pieds, à demi-cylindriques, striées, munies à leur base de deux feuilles courtes; les feuilles caulinaires graminiformes, glauques, presque de la longueur des tiges.

Les fleurs sont disposées en une ombelle inégale & composée, munie à sa base de deux folioles assez semblables aux feuilles radicales, mais

plus longues, outre une ou deux autres feuilles filiformes, plus courtes. Les épillets sont ovales, pédicellés, garnis d'écaillies brunes, ovales, concaves, aigues, marquées d'une ligne verte sur leur dos. Les filamens sont planes & comprimés; l'ovaire ovale, aigu, comprimé, convexe à ses deux faces, strié longitudinalement, avec des rides fines & transverses. Le style est élargi, comprimé, hérissé de poils des deux côtés; le stigmate est bifide.

Cette plante se rencontre dans les Indes, à Tranquebar. (*Descript. ex Retz.*)

106. SCIRPE junciforme. *Scirpus junciformis*. Retz.

*Scirpus culmo nudo, filiformi, subtrigono; panicula spiculâ sessilibus pedunculatâque; involucri diphyllo*. Retz. Obsér. botan. 6. pag. 19. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 309. n°. 63.

Les tiges sont filiformes, hautes d'un pied, à trois angles, l'un desquels est médiocrement comprimé, & rend ces tiges presqu'irrégulièrement tétragones. Toutes les feuilles sont radicales, lisses, linéaires, plus courtes que les tiges.

Les fleurs forment une panicule terminale, assez semblable à celle du *juncus bersonius*, mais plus courte, munie à sa base d'un involucre à deux folioles, plus courtes que la panicule. Les épillets sont aigus, à trois faces, composés de peu de fleurs, garnis d'écaillies imbriquées; les trois extérieures aigues, en carène, mucronées, qui renferment une ou deux étamines, ou seulement le pistil; les écaillies intérieures calicinales bien moins relevées en carène, hermaphrodites, renfermant chacune trois étamines & un pistil. L'ovaire est grêle, oblong; le style simple, surmonté de trois stigmates velus, allongés.

Cette plante croît à la Chine. (*Descript. ex Retz.*)

107. SCIRPE à deux tranchans. *Scirpus anceps*.

*Scirpus caule compresso, ancipiti; foliis latis, ensiformibus; paniculis axillaribus, paucifloris; spiculâ glomeratis*. (N.)

Cette espèce, ainsi que le *scirpus lavarum* & l'*iridifolius*, ont un port qui leur est particulier, & qui les éloigne des autres espèces de ce genre, tant dans la disposition de leurs fleurs en longues panicules axillaires, que dans leur forte tige, comprimée & feuillée.

Ses racines sont fibreuses; les tiges étroites, comprimées, droites, striées, à deux angles tranchans; hautes d'environ un pied, garnies, surtout à leur base, de feuilles larges, ensiformes, très-fermes, embrassant les tiges par leur base latéralement, comme les feuilles des iris; droites,



striées, un peu aiguës, plus longues que les tiges ; les caulinaires peu nombreuses, plus courtes.

De l'aisselle des feuilles supérieures sortent de petites panicules roides, peu rameuses ; les ramifications lisses, très-glabres, courtes, supportant à leur sommet un paquet de fleurs agglomérées en tête, munie, à sa base, de deux écailles larges, coriaces, concaves, servant d'involucre. Les épillets sont courts, peu nombreux, sessiles, composés de trois ou quatre fleurs, dont les écailles calicinales sont d'un brun-clair, ovales, luisantes, aiguës, un peu divergentes ; elles renferment trois étamines ; les filaments aplatis, plus longs que les écailles ; les anthères sagittées ; un ovaire trigone, surmonté d'un style trifide ; les semences triangulaires, à trois arêtes tranchantes.

Cette plante croît dans les marais, à l'île de Madagascar, d'où elle a été rapportée par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

#### 108. SCIRPE des laves. *Scirpus lavarum*.

*Scirpus caule compresso, striato ; foliis latis, ensiformibus, longissimis ; paniculis axillaribus, compatis ; spiculis numerosissimis.* (N.)

Vulgairement canne maron à Madagascar.

*Gramen cyperoides, madagascatanum, caule compresso, sparsis paniculis juncti.* Pluken. tab. 199. fig. 5.

On distingue aisément cette plante à sa grandeur, à ses panicules longues & touffues, semblables à celles des grandes espèces d'*halcus* ; enfin, à la couleur maron très-foncée de ses épillets.

Ses racines sont fibreuses, & produisent de longs rejets rampans, écailleux. Les tiges sont très-fortes, droites, comprimées, à deux tranchants, hautes de trois à quatre pieds, très-lisses, garnies de feuilles diluées, ensiformes, très-lisses, fermes, au moins aussi longues que les tiges ; les caulinaires supérieures plus courtes, spatiformes.

Les fleurs sortent en panicules touffues, épaisses, des aisselles des feuilles supérieures ; elles sont très-ramifiées ; les ramifications courtes, réunies presque en verticilles le long d'un rachis commun & aplati, ayant, à la base de chaque verticille, une gaine courte, mucronée. Les épillets sont agglomérés, sessiles ou pédicellés à l'extrémité des rameaux, courts, obtus, un peu élargis à leur sommet. Les écailles sont petites, brunes, luisantes, oblongues, obtuses, concaves, contenant trois étamines, un style trifide, un ovaire ovale, un peu comprimé, aigu.

Cette espèce se rencontre sur les hauteurs, à l'île Bourbon & à Madagascar. C'est une des premières plantes qui croissent sur les laves, d'après

l'observation de M. du Petit-Thouars, qui en a fait la découverte. (V. f. in herb. P. Th.)

#### 109. SCIRPE à feuilles d'iris. *Scirpus iridisfolius*.

*Scirpus caule compresso, alutiformi ; foliis ensiformibus, amplexis ; paniculis axillaribus, sagittatis, laxis ; spiculis obtuso-conicis.* (N.)

Cette plante a des tiges fort élevées, comprimées, presque larges d'un pouce, finement striées, d'un vert glauque, très-lisses. Ses feuilles sont disposées à leur base comme celles des iris, engageant les tiges latéralement ; hautes de deux à trois pieds & plus, très-roides, larges d'environ un demi-pouce, ensiformes, tranchantes à leurs bords, mais sans aspérités ; les inférieures longuement vaginales.

De l'aisselle des feuilles supérieures sortent des panicules grêles, un peu lâches, sautillantes, légèrement recourbées, longues d'un pied & demi & plus ; les ramifications presque simples, enveloppées à leur base d'une gaine courte, aiguë à un des côtés de son orifice. Les épillets sont d'un brun-foncé, alternes, sessiles ou pédicellés, un peu coniques, très-obtus & élargis à leur sommet ; les écailles concaves, étroites, oblongues, obtuses, peu nombreuses ; elles renferment trois étamines & un style trifide.

Cette plante a été recueillie à Madagascar par M. du Petit-Thouars. (V. f. in herb. P. Th.)

\* Espèces bien moins connues.

\* *Scirpus (truncatus), culmo tereti, capitulo glomerato, globofo ; involucri diphyllo, foliis linearibus.* Thunb. Prodr. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 21.

Cette plante a des tiges cylindriques, terminées par une tête de fleurs globuleuses, agglomérées, soutenues à leur base par un involucre divisé en deux folioles. Les feuilles sont linéaires. On rencontre cette plante au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (lacinialis), culmo tereti, capitulo triangulari ; glumis ovatis, ciliatis ; involucri diphyllo.* Thunb. Prodr. pag. 17. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 296. n°. 22.

Ses tiges sont droites, simples, cylindriques ; les fleurs réunies en une tête triangulaire, terminale, munie d'écailles ovales, ciliées à leurs bords, soutenues par un involucre à deux folioles. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (membranaceus), culmo tereti, capitulo angulato ; glumis ovatis, membranaceis ; involucri triphylo.* Thunb. Prodr. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 23.

Cette espèce a des tiges cylindriques, droites, simples, terminées par une tête de fleurs, de forme

anguleuse, munie d'écaillés ovales, membraneuses; garnie à sa base d'un involucre composé de trois folioles; elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (pilosus)*, *culmo compresso, capitulo ovato; glumis lanceolatis, ciliatis; involucri tetraphyllo*. Thunb. Prodr. pag. 18. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 24.

Ses tiges sont simples, comprimées; elles supportent à leur extrémité une tête de fleurs, ovale, garnie d'écaillés lancéolées, ciliées à leurs bords. L'involucre est composé de quatre folioles. Cette plante se trouve au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (histris)*, *culmo capillari, capitulo subdistachyo; glumis acuminatis, squarrosis; involucri monophyllo*. Thunb. Prodr. pag. 17. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 297. n°. 25.

Cette espèce a ses tiges simples, droites, capillaires, terminées par une petite tête de fleurs, composée d'environ deux épillets, munis d'écaillés scabieuses, acuminées; fourrés par un involucre d'une seule foliole; elle croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (natanis)*, *culmo compresso, foliofo, flexuoso, cretulo; spicis duabus lateralibus*. Thunb. Prodr. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 299. n°. 33.

Ses tiges sont simples, droites, comprimées, feuillées, flexueuses, terminées par deux épillets latéraux. On la rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (vaginatus)*, *culmo filiformi; capitulis lateralibus, alternis, involucri brevioribus*. Thunb. Prodr. pag. 17. — Willd. Spec. Plant. vol. 1. pag. 300. n°. 34.

On distingue cette espèce à ses tiges simples, droites, filiformes; elle supporte, vers son sommet, des épillets latéraux, alternes, beaucoup plus courts que l'involucre; elle se rencontre au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (stelligatus)*, *culmo filiformi, capitulo convexo, compresso; glumis eximie mucronatis, involucri nullo*. Thunb. Prodr. pag. 18. — Willden. Spec. Plant. vol. 1. pag. 301. n°. 40.

Ses tiges sont filiformes, les fleurs réunies en une tête convexe, comprimée, munie d'écaillés imbriquées; les dernières mucronées, dépourvues d'involucre. Cette plante croît au Cap de Bonne-Espérance.

\* *Scirpus (juncus)*, *culmo teretifolio, filiformi, nudo; spicis ovatis, terminali, involucri aquante*. Forst. Flor. austr. pag. 6.

Dans cette espèce les tiges sont filiformes,

droites, médiocrement cylindriques, nues, terminées par un seul épi, aussi long que l'involucre.

\* *Scirpus (schænoides)*, *culmo setaceo, compresso, striato; spicis ovatis, involucri monophyllo, membranaceo, seminibus turbinate compressis*. Retz. Obs. botan. pag. 14. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 125. n°. 12.

Cette plante a des tiges comprimées, sétacées, simples, droites, stées, terminées par un épi ovale, accompagné d'un involucre d'une seule pièce, membraneux; les semences sont turbines, comprimées.

\* *Scirpus (ellyphniarius)*, *culmo tereti, nudo; spicis globosis, quaternis*. Molina. Hist. Natur. Chili. p. 129. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. p. 126. n°. 60.

Cette espèce se trouve au Chili. Ses tiges sont droites, nues, cylindriques; ses fleurs disposées en quatre épis globuleux, situés à l'extrémité des tiges.

\* *Scirpus (kuli)*, *culmo tereti, foliofo; spiculis terminalibus, confertis, filiformibus; involucri longitudine foliorum*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 15.

Cette plante, dit Forsk. a des racines bulbueuses, divisées en longs rejets rampans sous terre, entre-mêlés d'écaillés imbriquées. Ses tiges sont droites, cylindriques, feuillées; les feuilles subulées, coriaces, un peu charnues; les fleurs disposées en épis terminaux, sessiles, agglomérés; les involucre d'une longueur des feuilles; trois stigmates plus longs que le style. Elle croît dans les environs d'Alexandrie.

\* *Scirpus (laxialis)*, *spicis ovatis, pedunculatis, sessilibus, lateralibus*. Forsk. Flor. ægypt.-arab. pag. 15. n°. 47. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 127. n°. 38.

Ses tiges sont hautes d'un pied & plus, droites, presque triangulaires, nues dans leur partie supérieure, feuillées à leur base. Les fleurs sont latérales, supportées par des pédoncules longs d'un pouce, filiformes, fasciculés, inégaux, terminés par des épillets ovales, sessiles, munis d'écaillés ovales, d'un brun-noirâtre, membraneuses à leurs bords.

Cette plante croît dans l'Arabie. Les Arabes se servent de ses chaumes pour couvrir leurs cabanes.

\* *Scirpus (lateriflorus)*, *culmis triquetris, nudis; spicis subternis, lateralibus, involucri monophyllo, brevi*. Retz. Obs. botan. 4. pag. 12. — Gmel. Syst. Nat. vol. 1. pag. 127. n°. 37.

Ses tiges sont nues, triangulaires, supportant, vers leur extrémité, environ trois épis latéraux, munis à leur base d'un involucre court, d'une seule pièce.



# T A B L E

*Des noms latins des genres de Plantes, contenus dans ce Volume.*

<p><b>A.</b></p> <p><i>A. B. R. E. ,</i>  <i>Acalypha ,</i>  <i>Achras ,</i>  <i>Agarophyllum ,</i>  <i>Arenaria ,</i>  <i>Arundinaria ,</i>  <i>Arundo ,</i>  <i>Asperugo ,</i>  <i>Astragylis ,</i></p>	<p><b>A.</b></p> <p>voyez Sapin.  Ricinelle.  Sapotillier.  Ravenara.  Sablina.  Rofinaire.  Rofeau.  Rapette.  Quenouillette.</p>	<p><i>Lecythis ,</i>  <i>Lythrum ,</i>    <i>Matthiola ,</i>  <i>Myofuros ,</i>    <i>Oncoba ,</i>  <i>Ostrya ,</i>  <i>Oryza ,</i>  <i>Oryzopsis ,</i></p>	<p><b>L.</b></p> <p>voyez Quatrelé.  Salicaire.</p> <p><b>M.</b></p> <p>Rategal.  Ratuncule.</p> <p><b>O.</b></p> <p>Rimbor.  Rouvet.  Riz.  Rizole.</p>
<p><i>Biferrula ,</i>  <i>Bixa ,</i>  <i>Bladhia ,</i>.....</p> <p>( Ce genre a été répété par  <i>Borassus ,</i> erreur de nom.)</p>	<p><b>B.</b></p> <p>Rateau.  Rocouier.  Quakite.  Sanchite.  Rondier.</p>	<p><i>Penaa ,</i>  <i>Phallus ,</i>  <i>Phytium ,</i>  <i>Plukenetia ,</i>  <i>Polygonum ,</i>  <i>Pistura ,</i></p>	<p><b>P.</b></p> <p>Sarcocolier.  Satyre.  Ratuncule.  Sajore.  Renouée.  Saturier.</p>
<p><i>Calamus ,</i>  <i>Cenchrus ,</i>  <i>Cinchona ,</i>  <i>Coccoloba ,</i>  <i>Coriaria ,</i>  <i>Crocus ,</i>  <i>Cuphea ,</i>  <i>Cypripedium ,</i></p>	<p><b>C.</b></p> <p>Rotang.  Racle.  Quinquina.  Rafimier.  Redoul.  Safran.  Saliquier.  Sabot.</p>	<p><i>Quadria ,</i>  <i>Qualea ,</i>  <i>Quapoya ,</i>  <i>Quararibaa ,</i>  <i>Quaffia ,</i>  <i>Quebitea ,</i>  <i>Queria ,</i>  <i>Quillaia ,</i>  <i>Quina ,</i>  <i>Quinchamalium ,</i>  <i>Quirivelia ,</i>  <i>Quisqualis ,</i>  <i>Quivifia ,</i></p>	<p><b>Q.</b></p> <p>Quadrie.  Qualier.  Quapoyer.  Quararibée.  Quaffier.  Quebite.  Querie.  Quillai.  Quinier.  Quinchamali.  Quirivel.  Quisquale.  Quivi.</p>
<p><i>Dalibarda ,</i>  <i>Drofera ,</i></p>	<p><b>D.</b></p> <p>Roncinnelle.  Roffolis.</p>		
<p><i>Embelia ,</i>  <i>Eriogonum ,</i></p>	<p><b>E.</b></p> <p>Ribelier.  Renouelle.</p>		
<p><i>Flacurtia ,</i></p>	<p><b>F.</b></p> <p>Ramontchi.</p>	<p><i>Racaria ,</i>  <i>Rajania ,</i>  <i>Ranunculus ,</i>  <i>Rapanea ,</i>  <i>Rapatea ,</i>  <i>Raphanus ,</i>  <i>Raputia ,</i>  <i>Ravenala ,</i>  <i>Rauwolfia ,</i>  <i>Reaumuria ,</i>  <i>Redutca ,</i>  <i>Relbania ,</i>  <i>Remirea ,</i>  <i>Renalmia ,</i>  <i>Refeda ,</i></p>	<p><b>R.</b></p> <p>Racariér.  Raiane.  Renoncule.  Rapane.  Rapate.  Radis.  Raputier.  Ravenala.  Rauvolfe.  Réaumur.  Redutca.  Relbania.  Remirea.  Renealmie.  Réfeda.</p>
<p><i>Cerropogon ,</i>  <i>Glycirrhiza ,</i></p>	<p><b>G.</b></p> <p>Salfigrame.  Régliſſe.</p>		
<p><i>Harungana ,</i>  <i>Hedyſarum ,</i>  <i>Hura ,</i></p>	<p><b>H.</b></p> <p>Rougo.  Sainfoin.  Sablér.</p>		
<p><i>Ipomaa ,</i>  <i>Janthus ,</i></p>	<p><b>J.</b></p> <p>Quamoclit.  Sarricole.</p>		

*Reticularia*,  
*Retzia*,  
*Rhanterium*,  
*Rheum*,  
*Rhetia*,  
*Rhizomorpha*,  
*Rhizophora*,  
*Rhodiola*,  
*Rhododendron*,  
*Rhodora*,  
*Riana*,  
*Riccia*,  
*Richardia*,  
*Ricinus*,  
*Ricotta*,  
*Rinorea*,  
*Ripogonum*,  
*Riqueuria*,  
*Rivina*,  
*Rivularia*,  
*Rizea*,  
*Robinia*,  
*Rochefortia*,  
*Roella*,  
*Rokijia*,  
*Ronabea*,  
*Rondeletia*,  
*Ropourea*,  
*Roridula*,  
*Rosa*,  
*Rosmarinus*,  
*Rotala*,  
*Rothia*,  
*Rottbolla*,  
*Rouhamon*,  
*Roupala*,  
*Rourea*,  
*Rouffea*,  
*Roxburghia*,  
*Royena*,  
*Rubus*,  
*Rudbeckia*,  
*Rudolfia*,  
*Ruellia*,  
*Ruizia*,  
*Rumphia*,  
*Rupinia*,  
*Rurpia*,  
*Russelia*,  
*Ruta*,  
*Rayschia*,  
*Ryania*,

Ret  
 Rhubarbe.  
 Quadrette.  
 Rhizomorphe.  
 Rhizophore.  
 Rhodiola.  
 Rhodore.  
 Riane.  
 Riccie.  
 Richarde.  
 Ricin.  
 Ricotte.  
 Rinore.  
 Ripogone.  
 Riqueure.  
 Rivine.  
 Rivulaire.  
 Rizoé.  
 Robinier.  
 Rocheforte.  
 Roelle.  
 Rokije.  
 Ronabe.  
 Rondelier.  
 Ropourier.  
 Roridule.  
 Rosier.  
 Romarin.  
 Rotale.  
 Rothe.  
 Rottbolle.  
 Rouhamon.  
 Roupale.  
 Rourelle.  
 Rouffseau.  
 Roxburge.  
 Royène.  
 Ronce.  
 Rudbecke.  
 Rudolphe.  
 Ruellie.  
 Ruize.  
 Rumphe.  
 Rupinie.  
 Ruppie.  
 Ruffellie.  
 Rue.  
 Ruyfche.  
 Rynie.

S.

*Sabicea*,  
*Sagina*,  
*Sagonea*,

Sabice.  
 Sagine.  
 Sagone.

*Salpiglossis*,  
*Salvadora*,  
*Salix*,  
*Salvia*,  
*Salvinia*,  
*Samara*,  
*Samolus*,  
*Samyda*,  
*Sanchezia*,  
*Sanguinaria*,  
*Sanguisforba*,  
*Sanicula*,  
*Sansevieria*,  
*Santalum*,  
*Santolina*,  
*Sanvitalia*,  
*Sapindus*,  
*Saponaria*,  
*Saraca*,  
*Saracha*,  
*Sarcophyllum*,  
*Sarmienta*,  
*Sarothra*,  
*Sarracenia*,  
*Sassia*,  
*Satureia*,  
*Satyrium*,  
*Saururus*,  
*Sauvagefia*,  
*Saxifraga*,  
*Scabiosa*,  
*Schefferia*,  
*Scheffera*,  
*Scheuchzeria*,  
*Schizandra*,  
*Schizanthus*,  
*Schlechtendalia*,  
*Schapparia*,  
*Schrebera*,  
*Schwalbea*,  
*Schwenkia*,  
*Scilla*,  
*Sciodaphyllum*,  
*Aittonophyllum*,  
*Scirpus*,  
*Sloanea*,  
*Rue*,  
*Sparganium*,

Sagouier.  
 Salice.  
 Salicorne.  
 Salomone.  
 Salpiglossie.  
 Salvadore.  
 Saule.  
 Sauge.  
 Salvinie.  
 Samare.  
 Samole.  
 Samyde.  
 Sanchèze.  
 Sanguinière.  
 Sangsforbe.  
 Sanicle.  
 Sansevieta.  
 Santalin.  
 Santoline.  
 Sanvitale.  
 Savonier.  
 Saponaire.  
 Saraca.  
 Sarsquier.  
 Sarcophylle.  
 Sarmiente.  
 Sarothre.  
 Sarracène.  
 Sasse.  
 Sarriete.  
 Satyrion.  
 Sature.  
 Sauvagefe.  
 Saxifrage.  
 Scabieuse.  
 Scheffere.  
 Scheffière.  
 Scheuchzère.  
 Schifandre.  
 Schizanth.  
 Schlechtendale.  
 Schopfie.  
 Schreber.  
 Schoualbé.  
 Schouinque.  
 Scille.

T.

W.

*Tragopogon*,  
*Willdenowia*,

Salsifs.  
 Reftiole.

Fin de la Table du sixième Volume.







